




6594

Medyc.

metri. 6594



J O. B A P T I S T Æ
M O R G A G N I

P. P. P. P.

DE SEDIBUS, ET CAUSIS
M O R B O R U M

PER ANATOMEN INDAGATIS

L I B R I Q U I N Q U E.

DISSECTIONS, ET ANIMADVERSIONES, NUNC PRIMUM EDITAS,
COMPLECTUNTUR PROPEMODUM INNUMERAS, MEDICIS,
CHIRURGIS, ANATOMICIS PROFUTURAS.


Multiplex præfixus est Index rerum, & nominum
accuratissimus.

T O M U S S E C U N D U S

TRES RELIQUOS LIBROS CONTINENS.

EDITIO SECUNDA

Ab Auctore recognita, atque a mendis omnibus expurgata.



P A T A V I I,

M D C C L X V.

S U M P T I B U S R E M O N D I N I A N I S.

S U P E R I O R U M P E R M I S S U, A C P R I V I L E G I O.

IO. BAPTISTA
MORGAGNI

P. P. P.

DE SEDIBUS ET CAUSIS
MORBORUM

PER ANATOMEN INDAGATIS

LIBER QUINQUE

DISSECTIO ET ANIMADVERSIONES, NUNC PRIMUM EDITAE
COMPLUTURUS PROPOSIUM IN ANATOMIA
CIRCUITUS ANATOMIA PROPOSITA

Multiplex praefatus est Index tertius, & notandum
accuratissimus

TOMUS SECUNDUS

TERES RELIGIOS LIBROS CONTINENS

EDITIO SECUNDA

Ab Augusto recodit, adque a mendis omnibus expurgata

PATAVI

MDCCLXX

Superiorum permissu, & auctoritate

Amplissimo Viro

PETRO SENAC

Potentissimi Galliarum Regis Archiatro Meritissimo

Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.



UM REGIÆ isti Scientiarum ACADEMIÆ anno 1731:
placitum fuerit (id quod , Vir Amplissime , qui vel ante id
tempus magno Tuo merito jam eras ex eo Illustri Cœtu , mi-
nime ignoras) ut me honorem tantum non modo non speran-
tem , sed ne cogitantem quidem REGI Maximo proponeret
quem inter Vos in Summi Anatomici Ruyschii locum substitueret , neque
ego nisi obsequiosi animi officiis unquam potuerim eximiae illi Vestræ erga
me Liberalitati respondere , quippe hic assiduis occupationibus districtus meis
quas , siqui alii , hi præsertim libri testantur de Sedibus , & Causis Mor-
borum per Anatomen indagatis ; nunc tandem in mentem venit ab Huma-
nitate Tua petere , ut hos ipsos velles , tanquam meos veridicos excusato-
res , Academiæ offerendos curare . Nec dubium quidem erat , quin beni-
gne esset auditura , si per Te mitterentur , sicque ipsis daretur locus te-
stificandi , quot , & quanta ab illa didicerim , & quoties Experientissimo-
rum Academicorum , quos nominatim persæpe laudo , bene meritis de Me-
dica Anatome laboribus meos illustraverim . Sed altera ex parte a pri-
mo verebar , ne viderer minus verecunde facere , si primis , quas ad Te
darem , litteris , adeo magnis in me Tuis , nullis meis in Te promeritis ,
non pro illis gratias agerem , sed ut illis alia adderes , orare auderem .
Egissem vero cumulatiflime vel multo antea , imo & retulissem , si volun-
tati par esset in me facultas , sicuti est ad gratiam habendam , quam cer-
te , quantam maximam possum , & habeo , & semper habebō . Ea enim
ultro in me contulisti , propter quæ fera posteritas (ad illam enim Tuus
de Cordis Structura , Actione , & Morbis immortalis perveniet Tractatus)
eum hoc sæculo , fuisse me , credet , quem ipsemet , hujus meæ conscius
mediocritatis non esse me fateor . Dedisti , opinor , hoc nostræ , cui tan-
tum ipse faves , Italiæ , quantum certi quidam homines adversari viden-
tur ; neque enim reapse adverso animo esse , existimo , quos Italia , aut
certe Gymnasium hoc nostrum nunquam provocaverit . Quod interea con-
tentum erit Tuo , & aliorum , Tui similibus , Magnorum Virorum ,
& Regiæ in primis Academiæ istius judicio honorificentissimo , neque
a posteris reticendo , quæ cum lege cautum sit , ne de exteris Nationibus
universis plures sibi optet Socios , quam octo ; binos ex uno hoc Gymnasio
optavit , me benigne , liberaliterque , ut dixi , meritissimo autem Amicum
meum summum Marchionem Celeberrimum Joannem Polenum . Verum , ad
Te ut redeam ; quanquam de Academia loquens , a Te minime digressus sum ; ea
ipsa quæ sponte pro Tua singulari Humanitate tribuere mihi voluisti , ea , inquam ,
ipsa faciunt , ne , siquid Te rogem , vereri debeam , ne Tibi videar rogasse pa-
Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II. A 2 rum

4
rum pudenter. Quin animum adderent, ut præter id quod supra exposui, alia peterem, nisi excellens Tuus, de quo dicebam modo, Tractatus meas omnes ante occupasset petitiones.

Scilicet superiore extremo sæculo Medicus floruit, quem si diligentem morborum Observatorem fuisse, inficiaremur; non minus in ipsum injusti essemus, quam ipse in Anatomen fuit, ad quædam de ea pronuncianda decurrens, quæ, evidenter a me convicta, ne illius quidem amantissimi alioquin Admiratores defendere potuerunt. Imo cum forte animadvertissent, ex præcipuo ejus pronunciato in imperitorum animis consequi posse, ut vel morbis confectorum dissectio ad morborum causas indagandas prorsus inutilis videretur; pronunciatum quidem illud esse verissimum, falsi sunt, consecutionem autem esse injustissimam, ostenderunt, jure utrumque, & merito. Erat enim illud pronunciatum, ut sanitatis, ita & morborum, plerorumque saltem, causas esse nostris sensibus omnino inaccessas, quippe in occultis invisibilium particularum conformationibus, & nexibus, & motibus, & viribus eos motus & nexus efficientibus, positas. Quod ut verum sit; non inde tamen sequitur, effecta quoque illarum causarum sensus fugere; cadunt enim in partes manifestas, suntque ex ipsæ quas in his deprehendimus, prævar mutationes, evidentes internæ causæ, plerorumque morborum. Itaque non injuria adversus illum Medicum, ejusque Consiliarium & quicumque cum iis diligentiorum Anatomicorum labores credunt inutiles ad medendum, idem ferme dici posse, vel ipsi illi Admiratores concluderunt, quod generatim, ut commemoravi etiam alias, contra ejusmodi rerum utilissimarum contemptores juste Fontenellius Vester dixerat inter ea quæ ad Regiæ Scientiarum Academiæ Historiam A. 1699. præfatus est, & ante omnes antiquæ illius Epistolæ Auctor, quæ cum Hippocraticis libris circumfertur, ad Dionysium scriptæ, *unusquisque ex his quæ ipse non habet, judicet id quod in alio abundat, superfluum esse*. Quæ omnia, ut in Italia non plurimis ante annis acta, nostroque sermone edita, hic Tibi memorare volui, Vir Doctissime, ut continuo intelligeres siquis mihi forte ex magni illius Medici sententia exiguus scrupulus superfuisset, hunc penitus evulsura fuisse quæ Tuis in Scriptis animadverti, cum securus abditissimarum illarum causarum, quas nullo pacto assequi homines possunt, internas istas evidentes, quas in morbidis cadaveribus perspicere licet, attendis, & quæ consecutiones ex ipsis proxime fluant, acerrimo judicio constituis.

Ex iisdem quoque Scriptis simul cognovi quid respondendum aliis censeas, qui cum istas evidentes internas morborum causas per corporum dissectiones inveniri, fateantur, illud objiciunt morbos tamen haud paucissimos non sanari. Neque enim semper verum esse, ajunt, quod vetustissimus Auctor tradidit ejus, qui de Arte inscriptus est, libri, *Medicum, si quidem sufficiat ad cognoscendum, sufficere etiam ad sanandum*, itemque is qui inde videtur sumpsisse, M. Tullius libro *Tuscul. Quest. 3. Medicos, causa morbi inventa, curationem esse inventam, putare*. Quæ utinam falsa esset objectio, nec sæpe adeo ægri, vel cognita causa, morentur. Veruntamen nonne censores hi similes sunt priorum? Illi, quia causæ invisibiles cognosci nequeunt, frustra alias quæri, contendebant; hi, quia cognita causa, non omnes morbi sanari possunt, inutilem esse causarum perquisitionem, contendunt. Quæ, malum, hæc utrorumque injustitia est?

Aut

5
Aut præsta, inquiunt, per Anatomen quæ supra hominum sunt vires; aut si id non potes, cætera nihili facimus quæ potes. Hoc enim denique ii Medici dicunt qui illa dicunt. Nihili igitur facient tunc etiam cum Anatome famam ipsorum tuebitur, ostendendo, revera insanabilem fuisse morbum quem vituperantium malevolentia, aut inscitia falso dietiter, fuisse sanabilem; aut cum morborum quorundam vulgata signa Anatome vel dedocēbit, vel dubia reddet, vel alia minus dubia indicabit, vel quæ nova, minime sint nota, suggeret ad obscurum morbum, aut ad certam quandam, inter multas, morbi causam, sedemve dignoscendam. Quæ omnia, aliaque ejusmodi siquis forte ad curandum nihili faceret; haud scio, an non ipse potius nihili esset faciendus. Quod si nihil utile ad sanandum cadaverum sectiones docerent, quæ complura ad id necessaria docent, & solum qui morbi insanabiles sint, patefacerent; non levem tamen, præter veræ diagnosis, & prædictionis honorem, afferrent utilitatem, ne ægros videlicet tot supervacuis, & fortasse noxiis remediis fatigantes; eorum obitum acceleraremus, sed contra, levaremus symptomata palliativa, ut vocant, curatione, morbiq; incrementum, quo ad liceret, tardaremus, nec temere pronunciantes committeremus, ut cadaveris incisio errorem detegeret nostrum. Hæc autem cuncta, summopere gaudeo, vidisse a Te, Vir Doctissime, confirmata, cum Tui Tractatus locis aliis, tum maxima ex parte extremo capite 5. libri 4. Huc merito addo, ex dissectionibus ipsis Tuis, præter cætera, monitum posse colligi pertinens ad caute prædicenda illa quæ post certos morbos deberent secundum plerorumque expectationem in corporibus deprehendi. Nimirum sicuti olim præcellens Medicus Ballonius Vester scite adnotavit (a), post terrifica, gravissimaque ab affecto cerebro symptomata, *magno medicorum dedecore, sæpe capita hominum morbo capitis consumptorum aperta esse, in quibus nihil commemorabile repertum est, quod mortem intenteret, quum alioquin medicus aut abscessum, aut simile quid repertum iri, pronunciasset*; sic Tu quoque libro 4. capite 3. in malignis febribus, & pestilentibus verissime admones, veneni illius subtilissimi a quo præcipientes mortes sunt, in nonnullis quidem casibus visibilem effectum in visceribus occurrere; at sæpius nullum, quod sub sensu cadat, ejus vestigium apparere.

Me Tuum eximium attente, ut par erat, perlegisse Tractatum, ex his intellexeris; id quod vel magis intelliges, si Tibi per gravissimas occupationes otii aliquid interdum erit ad hos meos libros inspiciendos. Utinam quod ex me habent, probare ita possis, ut Præfatio Tua ostendit, probaturum fuisse meam Inventorem Anatomicorum Historiam. A qua perscribenda plures abduxerunt me causæ, quarum non postrema fuit mihi satis cognita hinc mediocritas, atque adeo tenuitas mea, inde vero natura plerorumque hominum, qui, si alium alii præferas, aut siquid forte vel juste non ad eorum voluntatem pronuncies, continuo irascuntur, & fremunt; quapropter in his etiam libris, quibus alicubi attingo quædam ad Pathologicorum potius, quam ad Anatomicorum Historiam, sed nonnunquam tamen ad horum quoque pertinentia, morem tueor meum, ne viventium, sicubi forte discrepo, quenquam

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.


A 3

quam

(a) l. 3. Confil. 71.

quam nominem ne eorum quidem a quibus nominatim provocatus esse videor, sed ita respondeam, ut, nisi se ipsi indicent, non omnes continuo intelligant. Verum præcipua causa, pro eo ac debeo, mihi fuit, quod magis quam illam Historiam, hæc crediderim morborum, & dissectionum historias studiofæ nostræ, pro qua potissimum scribo, Juventuti profuturas: hujus enim utilitas mihi commendata est a Munificentissima, eademque omnium, ut jure ipse appellas, Sapientissima REPUBLICA, cui mea, qualiscunque est, obsequentissima desudat industria. Quod reliquum est, si Tua mihi Humanitas id quod initio ostendi, & majorem in modum rogo, præstare voluerit; magna ad merita erga me Tua, Vir Amplissime, fiet accessio. Vale.

D. Patavii Prid. Kal. Septembr. A. CIO DCCC LX.



JO. BAPTISTÆ MORGAGNI

A D A M I C U M

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXVIII.

Quædam de Fame præter naturam, & de morte ex Inedia scribuntur: reliqua de Læsa Deglutitione.



De quatuor Libris in quos Sepulchretum Anatomicum divisum est, multo longissimus est Tertius, qui nimirum vitia complectitur Partium omnium, quæcunque peculiariter ad Ventrem attinent, nec vilem modo, sed etiam muliebrem. Quo magis a me opera jam danda erit, quod hujus pro te laboris aliquem finem reperire. Dare autem eam operam posse videor in iis maxime argumentis quæ singula in singulis primis quatuor Sectionibus proponuntur, *Inappetentia, Fames Præternaturalis, Stitis Morbosa, Deglutitio Læsa*. Neque enim; si ultimum demas; ulla est a Valsalva, aut a me instituta dissecio, quæ potissimum ad hæc attineat argumenta. Quod ne mireris; fac cogites, quam raro accidat, ut aliquis moriatur quem, nullo graviore juncto, aut insequente morbo, defectus ciborum appetitus, aut nimia fames, sitive consumperit. Quamobrem ubi de graviore illo egimus, aut agemus morbo, si ibi ea etiam vitia simul invenies commemorata; quid opus est, ut alibi necessario dicta, aut dicenda, hic inutiliter repetantur? Versa, quæ hæc tres primas Sepulchreti Sectiones. Languentem, aut nullum appetitum cum magnis viscerum læsionibus, id est cum magnis morbis; ingentem autem sitim cum febribus, cum inflammationibus, cum hydropse, fere conjunctam videbis. Itaque Bonetus passim easdem Observationes alio loco proferri ab se, indicat, & nonnullæ etiam de quibus non indicatum est, alibi proferuntur. Quod minus mirandum est, quam in una eademque Sectione iterari Observationes easdem. In Sectione enim I. hæc alia sunt Observationes III. & IV. quæ in IX. Observatione est §. 7. & in X. §. 1. Neque alia in III. Sectione Observationes pariter III. & IV. quæ in V. sunt §. 7. & 3. ut una eademque est quæ Observatione VII. §. 2. & quæ in Additamentis legitur Observatione IV. §. 1. præter alias quas ipse fortassis animadvertes.

2. De II. autem Sectione hæc quidem non dico. Illud tamen dico, nimiam famem ipsam quoque fuisse cum graviore aliquo morbo conjunctam, ut varia passim aut in vivis incommoda, aut in mortuorum visceribus mala commonstrant. Præterea si certas quasdam excipias quam rarissimas, easque jam inde a primordiis inditas conformationes, puta deficientem pylorum, aut latiore eundemque multo brevior, minisque in gyros contortum intestinum tubum, ad quas miror non esse additas duas illas adeo vulgaras, quarum alteram adventitiam vidit Ruyschius (a), alteram congenitam Dionisius (b); si illas, inquam, excipias; in plerisque aliis Observationibus erit cur dubites, vera, an falsa insolitæ famis causa proponatur, ut cum in liene, quasi aliquid in ventriculum immittente, ea causa quæritur (c), aut cum in ventriculi amplitudine (d), quam potius nimia ingestorum copiarum effectum dixeris, quam causam, non fecus atque in Sectione I. (e) in eo qui nihil jam diu comederat, exiguum contracti ventriculi capacitatem males effectum credere intermissæ comestionis, quam Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

causam cur nihil ederet. Sed de liene, & de ventriculi magnitudine eo magis dubitabis, cum mox Appendicem legeris post Observationem VII. ipsamque X. Observationem. Hepatis vero insolitam magnitudinem (f) an famis insolitæ causam credes, si ve quod ventriculum magis foveret, si ve quod plus bilis separaret? an effectum, quod aucta ex copia molle viscus haud aliter ac in faginatæ anseribus, amplificasset? Quod si de hepate illud censeres; num de pancreate quoque (g) censeres? quasi vero quia ductu erat præditum duplici, distinctoque loco intestina adeunte (id quod in aliis, etiam non famelicis, haud semel deprehensum est) ideo multo plus fecerneret succi, quæ res non ex ductuum numero, qui modici esse potuerunt, sed ex visceris, quod alioquin sanum erat, ampliori si forte erat, magnitudine omnino fuerat deducenda. Denique, ut alia omittam; dicendane erat *pica a ventriculo* exorta? Non certe; nam lethalis hæc ventriculi dispositio, ut in muliere fuerit jam morti proxima; tum procul dubio esse non poterat, cum carbonem illi in delitiis fuerant.

3. Sed nihilne, inquis, in tota hac Sectione probas? Ego vero plura; tamen in aliis meliorem delectum, in aliis acius iudicium desidero. Alia quoque sunt quæ non sine dubitatione aliqua accipere possim: alia contra, quæ confirmare etiam possim. Vides exempli causa, quæ de pediculis aliquot a puero icterico devoratis Observatione IX. proposita sunt, ut in ventriculo in *monstruosam magnitudinem*, & in *numerosissimam multitudinem* excreverint, ut *famem insatiabilem*, sumptum *alimentum absumendo*, intulerint. Num iisdem illi, quibus homo, gaudent alimentis? num his adaugentur felicius? num ea sedes satis idonea est, ut in ea vivant, neque potionibus obruantur, indeque simul cum iis quibus avide inhæreant, cibis ad intestina abripiantur; imo ut se se adeo propagent? Denique si in ea sede vixissent; nonne cito intolerabilem, ut in ejusmodi viscere, erosionem, erosionisque sensum potius fecissent, quam famis? Sed nulla, quæ in mortuo tandem conspecta sit, memoratur erosio. Itaque non una de causa aliquanto minus incredibilis videri possit Observatio quæ in Scholio adjungitur, alibi autem (b) sub hoc titulo proponitur *Ventriculi dolor a vesiculis, pediculis plenis, illi affixis*: quamquam eo inclinatur animus, ut suspicer, in utraque corpuscula, & si mavis, animalcula conspecta esse quadantenus pediculorum similia, præsertim quando eum qui hanc alteram narrat, non affuisse ipsum, constat; ille vero qui primam scripsit, diserte se affuisse, non dixit; neuter autem an pediculi etiam tum viverent, ut ex motu saltem, animalcula fuisse, pateret. Sed quoniam non uni ex Doctis amicis meis rem visam esse credibilem, postquam hæc scripseram, animadverti; idcirco eo magis velim, ut scripta memineris non tanquam a pernegante, sed potius tanquam a dubitante. Contra, ubi in Appendice quæ Scholiis Observationis subjicitur, de humanis lumbricis sermo est, singulari sua magnitudine, aut numero famem rabidam afferentibus, nihil est cur hæream. Sua hi in fede, suoque pabulo versantur: quod

(a) Obs. Anat. Chir. 74. (b) Anat. de l'homme Demonstr. 2. (c) Obs. 4. & seqq. (d) Obs. 1. & 3. (e) Obs. 5. (f) Obs. 2. (g) Obs. 13. (h) l. hoc 3. S. 6. Obs. 38.

quod si eorum magnitudini, aut certe multitudini par non sit; manifestum est, animal in quo insunt, nutrimento fraudatum suo, incredibili fame, & saepe etiam siti vexari oportere. Utamque enim inde cum alii saepenumero, tum ipse animadverti, & praesertim in eo catello, quem post illas mortuum cum diligentissime persequerem, nihil usquam morborum invenire potui praeter ingentem vermium numerum, sicuti in Epistola scripti, quae a Vallisnerio nostro (i) olim vulgata est. Sic etiam cum Bontii observationes indicantur (k) *boulimi, ac appetentiae, caninae* dictae mesenterii infartus consequentium, in memoriam redeunt quae mihi quondam narraverat Albertinus, se in quibusdam, hoc mali genere laborantibus, praecipue autem in puero adeo famelico, ut hinc saepe caperetur animi defectionibus, reperisse glandulas quae in ventre sunt tartarizatas, uti loquuntur, sic ut duritie cultri aciem eluderent. Alvi autem fluxus, & qualis, intercepto videlicet per mesenterium chyli comaeatu in his fuerit, an nullus fuerit; apud Bontium (l) enim leges fuisse lenteriam; pro certo non memini.

4. Dissectiones quoque illae placent quae extremo loco productae sunt (m) hominum duorum quos diuturna cibi, potusque abstinentia confecit, placiturae etiam magis, si quemadmodum *venas, & arterias mirabiliter inanitas ostendunt, ut ex vena cava vix duo, aut tria cochlearia sanguinis effluerent, ex aorta autem nihil*; ita alia pariter quae adnotatione sunt digna, ostenderent, puta eorum virosum annos, temperamentum, habitum, vires, abstinentiae dies ad unum omnes, symptomata quae mortem antecesserant, constitutionem viscerum, & si qua alia sunt ejusmodi. Quae diligentia perutilis fuisset praesertim in primo, quippe qui corpore erat *alioqui sano*, cum se per inedia interitum consilium cepit. Nam quos aut morbus cogit, aut morbi cruciatus eo adducunt, ut nihil fumant, nec vivi, nec mortui quidquam certi docere possunt, cum ignores videlicet, quot dies ipse fortasse morbus de vita detraxerit, & quid insoliti ipsa per se inedia visceribus attulerit. Sic apud Cl. Peyserum, filium dico, (n) viri, ac mulieris dissectiones habemus, quibus causa mortis inedia fuit; sed in utraque via ejusmodi legimus internarum Partium, ut cum ad morbos haec attinuisset, agnoscamus, cetera illa quae paulo ante commemoravimus, non magnopere decideremus. Contra, a Praestantissimo Fontano (o) illorum pleraque adnotata sunt diligenter in muliere quae ad quinquagesimum, quo obiit, diem cibum pertinacissime repudiavit. Sed cum paucillimum tamen bis fumpserit, & quod pluris faciendum est, aquae potu, quamvis paucissimo, uteretur; non est cum eo viro de quo primo loco mentionem fecimus, comparanda. Aquae enim potus quantum, humorum inopiam minuendo, & acrimoniam temperando, quae duo famelicis maxime nocent, juvare possit ad eorum vitam producendum, Redii (p) experimenta comprobant, qui plures sine ullo cibo capones servans, eorum quibus potum quoque negavit, nullum ultra nonum diem vixisse, animadvertit, cum ille cui quantum aquae voluit, praebuit, quam diebus primis sexdecim avidissime, saepissimeque bibebat, vigesimum superaverit diem. Nec facile credo, cum Pomponius Atticus (q) vitam simul cum morbo gravissimo finivit intra quintum inediae diem, primum futurum fuisse, ut subito febris decederet, leviorque morbus esse inciperet, si ut *biduum cibo*, sic potu quoque se abstinuisset. Ceterum breve illud Attici levamen num forte sit ex Hippocratis Aphorismo 47. Sect. 2. explicandum, quasi pus tunc confici desisset, quod per lumbos postmodum erupit, an potius abstinentiae a cibo sit tribuendum, quando Redius (r) incredibile esse, affirmat, quam pulchra inveniantur viscera eorum animalium quae fames extinxerit, arbitrium tuum esto. Ego aliud tibi Redii dictum, quod ad ea pertinet, quae supra in hujusmodi observationibus requisivi, Valsalvae quodam experimento confirmabo. Multum, Redius inquit (s), robur atque aetas possunt in animalibus ad famem diutius ferendam. Experimentum autem Valsalvae ea quam requirimus, diligentia scriptum, sic habet.

5. CANIS paulo postquam editus fuerat, a maternis uberibus ablatus est, omnique alimento prohibitus. Tertia inedia die convulsis motibus toto corpore tenta-

ri cepit modo vehementioribus, modo remissioribus. Die quarto interit. VENTRE aperto, vesicula fellis inventa est bile abundans. Thorace recluso, pulmones in latere dextero nigerrima oblonga macula tincti: cordis auriculae multum dilatatae a concreto sanguine: quo & ventriculi erant pleni. Sed in omnibus quoque sanguiferis vas praesertim autem in venis quidquid erat sanguinis, erat concretum, ut nusquam inventus sit fluidus. Denique cranio exsecto cerebrum compertum est molle, & flaccidum, idemque necdum satis in duas substantias distinctum, vix ut corticalis internosci posset a medullari. Utrumque auris Tympanum, pellucida gelatina plenum, Officula habebat exacte quidem conformata, sed membranaceam etiam tum mollitiem servantia.

6. Qui mortem praesecerant motus convulsivi eorum quadantenus similes sunt, quos Valsalva animadvertit ante mulieris illius (t) obitum quae sex dies cibo, potuque se abstinerat. Quae vero in mortuo catulo sunt animadvertenda, pleraque sunt fœtus magis, quam animalis propria quod jejunium interemerit, nonnulla tamen utriusque communia, ut fellis copia, quippe vesicula a flaccido ventriculo, proximove intestino haud compressa. Sed & quidquid bilis ex jecinore ad intestina deflavit, eo magis in his apparuit, quod assumptorum miscela non tegitur. Nec ratio solum, sed observatio quoque hoc confirmat tum in illis ferme omnibus animantibus quas fame necaverat Redius, ut ex Caldesii (u) testimonio cognoscimus, tum in hominibus inedia absumptis, quod Peyseri (x), Fantoni (y) Halleri (z) conjunctae Observationes ostendunt. Ratio quoque indicat, quoniam ab diuturna omnis potus, cibique abstinentia, corporis humores acerrimi fiunt, & ad putredinem tendunt, facile fore, ut eorum qui inedia pereunt, cadavera gravissime oleant, quemadmodum a Celeberrimo Scriptore cum de hominibus, tum praesertim de canibus traditum est: quod indicium, ad alia additum, haud inutile profecto esset non solum scire aventibus an aliquos homines jejunium magis, an morbus fultulerit; verum etiam interdum, ut video, dubitantibus, an canes quidam ex inedia, an ex institutis experimentis sint mortui. Sed nos haec alii, periculum facturus, modo relinquentes, aliaque insuper praetereuntes, in eo quod promissimus, insistamus. Canes quos Redius (a) omni prohibuerat cibo, & potu, quando vi xixerint, ex eo intelliges quod aliqui ad triginta quatuor, aliqui ad triginta sex pervenerint dies, parvus autem catulus, nisi vigesimo quinto die se ex altissima fenestra praecipitasset, plures alios videbatur esse victurus. Verum hic ut parvus esset catulus, non erat tamen modo natus, ut is qui, Valsalva observante, quartum superare non potuit diem. Equidem miras esse posse in his rebus varietates, eo libentius fateor, quo magis tot, & tam varia exempla attendo longae inediae, quae ab Doctissimo viro Beccario (b) & erudite producta sunt, & diligenter pensitata. Illud tamen, si quam rarissimas quasdam excipias rerum, & corporum constitutiones, satis cum vero consentire, crediderim quod ab Hippocrate (c) traditum est, minus facile adolescentibus, omnium autem minime pueris jejunium ferre, quod contra facilius ferant qui aetatem consistentem habent, senes autem facillime, nisi forte sint aetate confecti, ut sapienter Celsus (d) Hippocratem interpretatur, sic ejus sententiam latine reddens: *inediam facillime sustinent media aetates, minus juvenes, minime pueri, & senectute confecti*. . . . maxime vero is cibo eget, qui incrementum, quod diserte Hippocrates quoque in proximo (e) docuerat aphorismo.

7. Hippocratis autem sententiam mirifice una confirmaret historia, si ea quidem, ut perperam Cardanus (f) & Zambecarius (g) credidere, historia esset, non poeticum Dantis (h) commentum de Hugolino Comite, & quatuor ejus filiis, inedia mori coactis (quod unum certum est) sic ut omnes vixerint aliquot dies, triennis autem puer quarto, reliqui aliquanto majores pueri, aut adolescentuli quinto, aut sexto die, pater denique, ut constanti erat aetate, aut cruda certe, viridique senectute, octavo decesserit: quae omnia a Poeta, ut erat ea tempestate doctissimus, facile secundum Hippocratis aphorismum, certe secundum veri fimi-

similitudinem esse excogitata, Poeta ipse, quod Clari illi Viri non attenderunt, satis loco indicat, ubi Hugolini animam haec sibi narrante inducit, quae aliunde, ut dicitur ait, non posset intellexisse, quippe quae in tenebrosis acciderant turris penetralibus, cujus claves statim postillos inclusos, adversarii in flumen abjecerant. Quod si igitur ad multiplices Hippocraticae sententiae partes, ut a Celso expositae sunt, comprobandas forte plures historias quaeris, nonnullas quae scribenti suppetunt ex Romanis commemorabo. Aegrum Pomponium Atticum supra (i) diximus die quinto inedia mortuum. Sextius autem Baculus, ut est apud Caesarem (k), cum ita egrotaret, ut diem jam V. cibo caruisset, adeo a morte procul erat, ut arma caperet, hostesque arceret, quippe aetate ea, ut non ita pridem munere functus esset primipili; Atticus vero VII. & LXX. annos compleverat. Sic mirari non oportet, Suetonium (l) cum Tiberium scripsit, cibo per quadriuum abstinuisse, non modo quid noxae inde retulerit, non adjecisse; imo ut *confestim Oslum descendit*, docuisse; Tiberium enim tunc erat maxime constanti aetate. His alia ipse juniorum exempla addes: nec facile, opinor, reperies, ubi ad pueros, infantisque perveneris, qui istiusmodi jejunia sic tulerint. Nec vero ex Fernelii (m) observatione mihi setum objecias qui mirando sane exemplo bimestre jejunium videtur pertulisse. Nam etsi mater quae, *adstantium omnium judicio, nihil cibi potusve bimestri tempore vorasset*, tandem in extrema, qua confecta est, febre edidit partum, quem *vita superstitem reliquit*; tamen quotiescunque cibum potumve ad infimam usque oesophagi partem detrucebat, inde vero mox retrahebat, rejiciebatque, credibile est, semper aliquam ingelorum portionem ultro citroque comaeantium absorbentia oscula oris, faucium, oesophagi subiisse, sicque hanc non fecus quadantenus ac alia gravida apud Hildanum (n) per solos fere clysteres nutrities spatio sex hebdomadam una cum foetu, servatam esse. Quin credibile etiam est, tuberculum quod ventriculi ostium clauderat, ut in mortua conspectum est, in vivente, nisi forte extremo tempore, non tantum fuisse, ut officium illud omnino obtureret; increpant enim jugiter ejusmodi vitia, ut deum eo se extendant quo paulo ante non perveniebant.

8. Redigit in memoriam haec Fernelii observatio Quartam, in qua & ipsa est (o), Sepulchreti Sectionem, de qua ita initio (p) mentionem fecimus, ut non desse nobis indicarem quae ad ipsam, id est ad laesam deglutitionem attinerent. Nec desse utique si quod in Sectione quoque haec sit, imitari placeret. Videbis enim, Observationem in ea IV. non nisi verbis aliquanto paucioribus differre ab XVII. idemque multo magis miraberis in XIX. collata cum eadem proxime subjicitur XVIII. In ipsa autem Additamentis nonne altera pars Observationis II. totidem verbis iterat quod satis jam fuerat Sectione eadem in parte altera Scholii propositum ad VIII. Nos vero ne illa quidem hic repetemus quae in aliis Epistolis ex Valsalvae, aut nostra observatione protulimus. Sed quidquid restat, huc afferemus; cetera illa vix indicabimus. Restant autem ex Valsalva historiae duae. Quarum prima ad hunc modum se habet.

9. VIR annos quinquaginta natus qui incipit de impedita deglutitione. Impedimentum paulatim augeatur: vox amittitur: in deglutitione non levis dolor: cibi portio in faucibus remanebat, quae sensim postea in os redibat, interdum, ut videbatur, corrupta: macefecit corpus: nihil exterius praeter naturam conspiciatur; sinistra dumtaxat Maxillaris Interna glandula percipitur indurata. Repente, quasi suffocatus, moritur. GLANDULA modo memorata, dura, habebat ad lacus internum materiam albuminis similem. Plures autem in pharynge, & ad summam laryngem tumores conspiciuntur, qui carcinomatis habebant naturam.

10. JUVENIS quoque post consimilia morbi signa, eodem ferme pacto mortuus, ejusdem naturae tumores ostendit, praesertim ad supremam laryngis partem, & proximam pharyngis latera. Sed tumores nonnullis in locis jam erant exulcerati: ipsamque epiglottidem ulcus perforaverat.

11. Quod ad utriusque repentinam attinet mortem, hic confirmare poteris quod Valsalvam, hos duos fortasse spectantem, mihi dixisse, alias (q) scripsi, ex gravi laryngis vitio se bis ejusmodi mortem observasse. A me quoque in Virgine observata est, de qua ibidem commemoravi, & fortasse etiam in Cantore praestantissimo, quem manifestum in faucibus ulcus vexabat, summam afferens

difficultatem deglutendi. Sed quoniam id ulcus ad quas usque partes se extenderet, neque in vivo definiri, neque in mortuo quaeri licuit, idcirco rem pro certa computaque non posui, praesertim quoniam istiusmodi ulcera aliquando eo non perveniunt quo putares, eademque perveniunt quo non putares. Quod praclare ostendit casus viri, eodem mortis genere abrepti: quem casum etiam ex parte attigi in Epistolis Anatomicis (r), ex parte in alia quam ad te misi (s); nusquam tamen totum exposui, sed consulto huc distuli, tanquam ad laesam deglutitionem pertinentem.

12. VIR erat, cui inter deglutendum, potionum pars redibat per nares. Huic palatum osseum erat integrum; at molle, simul cum uvula, non recens ulcus absumperat, ad cicatricem, quantum oculis perspicere poterat, iam perductum; sed qua perspicere non licebat, etiam tum perfans, ut vellea quae creatu reddebantur, significabant. Cum his tussis aliquando, & alia ejusmodi, quamvis levia, & ambigua, suspicionem movebant ulceris se se deorsum extendentis. Quam auxit subita mors suffocati instar. PHARYNGIS tamen inferior pars, & quae hac intercipitur larynx, & huic subiectus arteriae Asperae canalus erant omnino illesae: quanquam sinistri pulmonis superiorem lobum, cum attrectarem, durum, cum secarem, magna ex parte pessime corruptum offendi. Ulcus autem ad altiores pharyngis partes, & ad posteriora nasi foramina se perduxerat, ibique perstabat. Ceterum Ventre aperto, jecur, & intestina quibusdam locis, intimosque abdominis musculos inveni quasi ex praegressa inflammatione liventia, & grave olentia.

13. Ubi, & quo tempore id cadaver secuerim, in his Epistolis reperies, quas paulo ante (t) indicabam, ibidemque, & Epistola quoque ad te XXII. (u) quae de origine, & causis attigi illius pulmonum vitii. Quae vero ad causas, modumque attinent, quo deglutitio in eo viro, aut in duobus quos a Valsalva dissectos proposui, laedebatur, adeo manifesta sunt universae pharyngis, & laryngis necessarios in deglutitione motus non ignoranti, ut minime opus sit declarare. Huc spectant in Sectione hac IV. Sepulchreti, Observationes XVII., quae in duabus sunt Appendicibus quae XX. Observationi subijciuntur. Et quamvis ego, cum in senibus plures, ut alias dixi, laryngis cartilagine saepenumero ossae factas inveni (x), epiglottidem nunquam ossae prehenderim; tamen quin minus flexilis, minusque obsequens fieri interdum possit, non dubito: quae res alioquin ciborum magis, quam potionum deglutitioni videtur adversari. Potiones enim ubi ad epiglottidem pervenerunt, hinc & hinc, qua ad laryngis latera quasi sulcus est, defluunt, & ad pharyngis imum labuntur: neque tunc quidem accidunt, ut laryngem subeant, nisi aut nimia copia & sulcis redundant, aut hi inflammatione, & intumescencia delectantur, aut ab irritatione excitata convulsio quadam, aut impar ob resolutionem officio suo musculari aliquis facilem potionum defluxum turbent: quorum hoc in Femina Principe post insultum apoplectici generis, illud vero in nobili Comite animadverti, cujus ad te alias (y) permolestam, & convulsivam, sed brevissimam, anginae ex parte similem, affectionem perscripsi. Hic autem nolim, epiglottidis considerationem, ubi de laesa deglutitione agitur, a te superfluum credi postquam Cl. Targionius (z) in cadaver incidit viri cui, quamquam epiglottis omnino deesset, fortasse ab ulcete olim exesa; non defuerat tamen in acuto saltem, ex quo novissime interierat, morbo loquendi vis, & deglutitio sine ulla difficultate. Nam etsi Arytaenoidae muscoli, qui crassiores in illo erant, & validiores, potuerant adeo glottidem exacte occludere, ut insolito in hominibus quidem exemplo, epiglottidis supplerent officium, sicut aliae partes nonnullae uvulae, nonnullam linguam aut ab ortu, aut a morbo deficientium munus suppleverunt (a), live accuratae, dum ille viveret, observationes, & interrogatio- nes aliud fuerant fortasse ostensurae; cavendum certe est nobis, non quid monstrare in uno aliquo, sed quid secundum naturam in ceteris fiat, spectantibus, ne illuc decurramus, ut epiglottidem in deglutitione quasi inutilem existimemus. Non sum nescius, esse hoc tempore Cl. Viros, quibus adeo aliter ac aliis deglutitio explicanda videatur, ut si cum iis facias, eam quam paulo ante attigimus, discriminis quo fluida, & solida ex ore transeant in fauces, explicationem haud requiras. Mihi vero, quamvis hic neque locus, neque tempus sit totum,

(i) Consideraz. int. alia generaz. de vermi. (k) Obs. 12. (l) Vid. Sepulchr. l. 3. Sect. 10. Obs. 1. (m) Obs. 18. §. 1. & 2. (n) Obs. Anat. l. 7. (o) Dissert. Anat. Renovat. (p) Observaz. int. agili animalium viventium &c. (q) Vid. ejus Vitam apud Caro. Nepot. (r) Observ. cit. (s) Ibid. (t) Epist. 17. n. 25. (u) Observ. int. alio Tartarughe. (v) Obs. 7. cit. supra ad n. 4. (w) Diss. ibid. cit. (x) ad Boerh. Praelect. §. 68. not. 2. & Opusc. Pathol. Obs. 24. (y) Observaz. cit. supra ad n. 4. (z) Vid. de Bonon. Sc. Acad. T. 1. P. 1. inter Medicas. (a) Sect. 2. Aph. 13. (b) De Medic. l. 1. c. 3. (c) 14. (d) Comment. in cit. Aph. 13. (e) Experim. circa diversa & viventibus exsecta. (f) Intern. anat. 33.

(i) n. 4. (k) De Bello Gall. l. 6. c. 38. (l) De duodecim Caesarib. l. 3. c. 10. (m) Pathol. l. 6. c. 1. in fin. (n) Cent. 4. Obs. 30. (o) Obs. 21. (p) n. 1. (q) Epist. 22. n. 25. (r) Epist. 9. n. 9. & 10. (s) Epist. 19. n. 50. (t) n. 11. (u) n. 26. (v) Advers. l. 2. c. 23. (w) Epist. 14. n. 37. (x) Prima Rascolta di Observ. Med. verso il fine. (y) Ephem. N. C. Dec. 3. A. 9. Obs. 212. & Slevogt. Diss. de Gurgul. §. 61. 63.

tam, ut res posceret, eorum sententiam considerandi, certe in ea non unum est quod accipere non possim. Nec me præterit, quod hic etiam in Sepulchreto (b) legitur, a Paulo Barbeta, adnotatum, minime cum ea quæ supra exposita est, explicatione consentire. Verum si loquela simul erat abolitio, vitia alia fuerint, necesse est, præter epiglottidis in potionum transitu laryngem non satis claudens, rigorem, siue indurationem cui uni omnia Paulus tribuit. Quid vero præter epiglottidem in alia quadam Observatione peccaret, in qua deglutitionem tam solidorum, quam liquidorum, impeditam fuisse lego, conjicere fortasse possem, si quod in cadavere deprehensum est, intelligerem. Deprehensa autem scribitur epiglottis per spasmus catarrhalem versus œsophagi orificium adeo retracta, ut asperæ arteriæ orificium maxime apertum existeret, ac neque liquida, neque solida propter metum suffocationis ingeri poterint. Nimirum assequi non possum, quomodo epiglottide illuc versus adeo retracta, laryngis orificium esse posset maxime apertum, cum maxime opertum esse debuisset. Atque hoc fortasse modo ab Auctore scriptum putarem, nisi tunc non de glutendo, sed de respirando unice ægrum cogitare oportuisset.

14. Quod vero, ut ad Pauli Observationem redeam in Sepulchreto propositam; illa deglutitionis læsio in Scholio quod continuo additur, explicanda suscipitur per convulsos musculos hyoideos, quia tunc sursum erigitur larynx; id clari exponi oportebat, præsertim cum musculi qui eo possint nomine designari, & plures sint, & ex iis aliqui contrarium quoque præstent officium. Neque tamen dubium est, quin non modo os hyoideos, & larynx, sed & quæ ad ipsa attinent, si gravius quid forte patiantur, deglutitioni afferre possint impedimentum. Hoc enim ortum meminimus a luxatis appendicibus illius ossis superioribus, aut a Valsalva (c) proditum est, itemque a luxatis laryngis cartilaginibus, ut Boerhaavius (d) scribit ex observatione Cowperi, Thyroide puto a Cricoidæ dimota; nam librum in quo Cowperus id doceat, in manibus non habeo; quorsum an illa pertineant quæ legere potes in Actis Cæsareæ Academiæ (e), cogitabis; at modus tamen curationis ad Valsalvæ modum satis accedit. De musculorum autem, vel ipsius etiam vincte morbum, Jobus Balterus A. 1682. cum Stalpartio (f), idemque raro exemplo vividus Senex A. 1744. cum Cæsareâ Academiâ (g) communicavit. Et minus diuturnam quidem paralyfim, at sine molestia illius instrumenti in gulam intrusionem, superatam vidit Ramazzinus (h), cum ægram absque ullo prorsus cibo, aut potu per clysteres nutrites, quorum diuturnioris usum, utilioreque legisse non memini, dies sex, & sexaginta servasset, auxilii genus indeglutitionis, non modo ex paralyfi, sed etiam ex quacunque alia causa, impedimento, semper vel quod facile, vel quod innocuum est, a Medicis tentandum. Porro ad levem quandam paralyfim referendum mecum, ut opinor, existimabis, quod a Cel. Heistero narratum leges in Dissertatione quadam Joh. Caroli Spies (i). Scilicet Vir nobilis, isque jam senex, a longo tempore hoc patiebatur, ut cum deglutire omnia posset, ultimum tamen bolus non posset, qui propterea ab uno sæpe pastu ad alterum in faucibus remaneret, donec in subsequenti deorsum protruderetur, nisi forte prius creatu, aut levi ruffi o-pitulante rejiceretur. Nimirum haud aliter id contigisse, credidi, quam in senioribus urina omnis, alia aliam urgente, extruditur donec ad ultimas guttas ventum sit, quas infirma vis musculorum jam nequit, ut in validiore ætate, prorsus expellere. Sic etiam in illo Viro priores boli insequentium pondere propellebantur, donec ultimus eo auxilio carens, a pharyngis autem musculis non satis adjutus, cogeretur subsistere.

15. Sed ut hoc, & pleraque de quibus hæcenus dictum est, vitia ad pharyngem, & proximas huic partes attinebant, sic alia in œsophago ipso, vicinifve ei partibus occurrunt. De convulsione, & paralyfi nihil est opus iterare. Sunt autem alia duo, inter se pariter contraria, vitia, quæ difficile possint facere deglutitionem, glandularum œsophagi ariditas (n), & œdematosa turgentia (o). Præterea exulceratur gula aliquando: cujus rei habes in Sepulchreto (p) memorabile exemplum. Et quamquam ipsum per se ulcus si dolorificum, aut saltem si amplum sit, aut prominentibus labris, cujusmodi erat a Brunnero (q), hic tibi perlegendo, conspectum, deglutitionis usu prohibet; tamen vel si nihil eorum est, ulcusque ipsum ad sanitatem spectare incipit, aut ex parte etiam pervenit; existeret haud raro ex eo possint quæ obstant deglutitioni, ut caruncula, callus, angustia, aut coarctatus denique, a Francisco Sylvio (r) memoratus. Et carunculam quidem ad gulæ finem indicasse olim videtur Galenus (s), cum scripsit, accidere aliquando, ut etiam carnosum aliquid (qualia sæpe foris videmus) in stomacho nascatur, quod vel omnino ciborum viam obscurat, vel aliquatenus impedit. Certe autem carunculam ex fanato œsophagi ulcere subortam, vides hic in Sepulchreto (t) observatam. Gulæ autem calli etsi non omnes ab ulceribus sunt repetendi, puta ubi apud Celsium (u) legitur initia atque summitas stomachi callosa, ut neque omnis angustia, velut illa quæ Sectione hac (x) post febrem ardentem, nisi forte in ea apthæ, aut internæ variolæ (y) fuerint, proposita est; tamen ubi ulcus præcessit, aut adhuc perstat ex parte, velut in milite (z) qui magnam in deglutendo difficultatem, nullum autem prorsus dolorem sentiebat, coarctatione œsophagi, & callositate erofioni quæ in hoc simul deprehensa est, non sublatâ undique, tribuimus. Nec dubium est, quin eadem causa, ut angustiam, ita & coarctum possit inducere, quo nomine cum Docto Viro Mauchartio (a) hic intelligo eam coarctationem, quæ viam aut nullam, aut vix aliquam relinquit. Et sane coarctus quem vidit ipse (b) callosum, & vix admittentem stylum tenue, non fuit sine ichore purulento. Veruntamen & ab aliis causis interdum coarctus fit, ut ille ex parte fortassis factus, quarum alias infra (c) dicemus, aliæ autem ad tumores attinent in ipsis gulæ tunicis incrementis, cujusmodi observationes Sectio hac Sepulchreti (d) exhibet, additque etiam lectu dignam Cl. Widmannus (e). Memorabile autem præ cæteris illud coarctus genus est quod fit per cartilaginem, cujus tria Sepulchretum præfert exempla (f): tu autem duo præsertim adjunges, quorum alterum eruditissima insuper Dissertatione (g) a Cel. Trillero est illustratum. Sunt Viri Præstantissimi quibus id vitii oriri videtur a potu aquæ fervidæ, hoc ævo adeo frequenti: quod ego omnino inficias non eam. Sed mirabor tamen, cum sæpe etiam Veteres, & certe cum Sinæ, suarum consuetudinum retinentissimi, potu sint usi, utanturque ferventi, non sæpius apud eos inventos esse, & inveniri qui læsa, aut impedita laborant deglutitione, sed nec sæpius apud nos, imo raro adeo cartilagineum œsophagum deprehendi, ut in Italia non meminerim qui adhuc reperiret præter Vallisnerium, qui tamen in eo homine, & loco, & tempore id reperit, ut abs theæ, aut coffi abusu repeti posset non videatur: omitto autem, Trillerum in suo a contraria omnino causa repetisse (i). Ut ut est; coarctum dixi per cartilaginem, quia hic quoque œsophagum a cartilagine, si non omnino obturatum, ut in Stofelli Observatione (k), at certe sic impeditum in cæteris exemplis animadverto, vix ut exiguum restaret foramen. Quid vero si cartilago non extrorsum extuberaret; sed patentem naturali amplitudine viam relinqueret? num putas, illasam futuram deglutendi facultatem? Mecum certe Victorius Gornia Medicus Experientissimus dissectionem communicavit, in Germania habitam, cadaveris Celsissimi, & Eminentissimi Principis, cujus œsophagus exterius membraneus, interius autem erat cartilagineus, imo stomachum versus ad pollicis latitudinem osses. Princeps tamen ille non modo ultimo biennio quotidie duabus a prandio horis vomuerat; sed de nulla unquam in deglutendo molestia, aut difficultate conquestus fuerat. An igitur non secus ac sanguis per osseam arteriam cordis vi, & retro positam arteriarum propellitur, cibus quoque a validioribus pharyngis musculis impelli potest per gulam non

non conniventem, neque explicandam, sed patulam a rigidis parietibus perpetuo servatam? Tu ergo hoc videris, simulque Observatione hac ad quinque addita, quas superius memoravimus, rursus tecum reputabis, num fervidæ aquæ abusus illud sit vitium imputandum quod non linguam, non fauces, non superiorem gulæ tractum, sed infimum maxime occupasse de sex istis exemplis quatuor ostendunt. De duobus autem reliquis alterum a claviculæ regione incipiens proponit; ut unum sit in quo cum pharyngis fine œsophagi initium cartilagine occlusum legatur: quapropter Stofellius id quod cæteri ne cogitare quidem potuissent, quærebant, an ad laryngotomiam, quam vocant, imitationem, institueret liceret pharyngotomiam, seu potius summi œsophagi incisionem per quam fistula, alimentum invehens, immitteretur; certæ mortis, ut ait, præferendo incertum remedium; sed simul, quod dolendum; difficile adeo, & periculosum; ut omnes intelligant qui cum obvia Aspera arteria, sedem comparant summi œsophagi, profundam illam, & tot musculis, nervisque, & vasis insignibus stipatam.

16. Partes autem œsophagi proximæ ut non uno modo possint deglutitionem impedire, vel ex ostendunt Observationes, quas cum alias perscruperimus, hic satis erit, ut promissimus, indicare. Neque enim eæ Partes nocere dumtaxat queunt ita comprimendo, ut via intercipiatur, quemadmodum tumefacta illa in oſtogenaria muliere glandula (h), aut dilatata in Tubicinis arteria Magna (m), aut ambe etiam facile in Viro, a Valsalva adoleſcente dissecto (n); sed & absterrendo a deglutitione, quando via etiam aperta, compressæ ipsæ a deglutitis alimentis, suffocationis periculum afferunt, ut dilatata Aorta in femina, ab eodem secta (o), in Marchione Pauluccio (p), & in Medico Ferrarino (q). Sed ad glandulas œsophagum comprimentes ut redeam, quid thymus possit tumefactus, & Sepulchreti hæc Sectio (r) indicat, & Verdrii Observatio (s) confirmat. Aliæ autem sunt glandulæ, quæ, nulla re intercepta, gulam sua diffentione prementes angustiam, & coarctum quoque efficiunt, in primis quæ Dorsales appellantur: idque intelliges ex eadem Sectione (r), magisque ex quibusdam tot Professorum Observationibus, quas a me in Epistolis Anatomicis (u) indicatas, Sepulchreto poteris adjungere, securus Mauchartius (x) hæsitacionis, cum eas falem quæ ex Laurentio, & Diemerbroeckio sunt; cæteras enim satis accepit; in suis eorum exemplaribus non occurrere, mirabatur, haud miraturus, si animadvertisset, cum post A. 1595. Laurentius; post A. autem 1679. Diemerbroeckius sua uterque Scripta recensuisset, auxilientem, par fuisse, me non illis prioribus, sed posterioribus uti editionibus, in quibus, si quæres, illa ipsa verba occurrunt quæ a me ex utroque producta sunt. At Mauchartus, ut pote Vir non minus hic cautus, quam humanus, falem id dixit quod negari, ut puto, non potest, se in suis illis exemplaribus ea verba non reperisse. Alius autem Vir, cæteroquin Doctissimus, cum in Disputatione sua de Fistula Lacrymali inter alia quæ ex me sumptis, in locum Aristotelis forte incidisset ex libro II. de Generat. Animal. C. V. a me obiter in Adversariis VI. (y) prolatum, eaque, ut a me producta sunt, verba descripsisset; satis fidenter pronuntiavit, verba hæc loco quidem citato haud reperiri, minime cogitans, alios aliter divisas ac sua forte essent, exemplaribus uti posse. Et ego quidem cum Sylvetro Mauro tum communem Operum Aristotelis in libros, & capita divisionem, tum communem pariter versionem, vel potius ipsa Aristotelis verba secutus, sperabam, si qui vellent conferre, secundum communem divisionem quæsituros, aut, si forte ea carerent, in suis libri illius secundi editionibus locum facile in quo de secunditatis probationibus agitur, in eoque eadem verba, aut certe eandem sententiam reperturos. Sententiam dixi, ne forte in verbo illo uno hæreas colore; id enim Aristotelem voluisse, & ratio indicat, & Medici affirmant, in istique Niphus (z) qui centum viginti ante Mauri paraphrasin (a) annis eundem Aristotelis & librum, & locum explanaverat. Quin imo cum graeco in textu, ut par erat, verbum quo usus est Aristoteles, inspicere, & quædam, quod colore, & riant, insicant certe significat; minime dubitavi, sic esse reddendum, & facile errore Operarum esse factum, ut in versione pro insicant inepte legatur perficiant. Quæ interdicere hic volui, nequid ejusmodi hæsitaciones, aut censuras in laudatis, nec semel excusis Dissertationibus legentes, ex meo perpetuo silentio, magisque ex eorum qui utramque scripserunt, auctoritate, justas illas esse, existimarent. Nam quod aliquis, cujus nomen quidem volui quærare, sed illud tantum, num forte a me, quod negarunt, provocatum se posset dicere; quod, inquam, aliquis nescio ineptus magis, an iniquus, annis supe-

rioribus mihi dictus est quiddam aliter ac Summi Viri, Judicæque idonei censuerunt, de mea olim in quosdam libros necessaria, neque inutili, scribendi ratione temere, injurioseque effutire; nunquam usque adeo ineptiam, ut sapientes homines credam quidquam expectare quod reponam: itaque ipsum, ejusque similes, si qui sunt, suis somniis, quorum illum ridiculis audio delectari interpretationibus, relinquam. Dignis autem quibus respondeam Viris, si humaniter aliqua mihi obijciant (atque utinam ne multa essent quæ obijci possent) libens semper, si non aliter, at modestia certe responsionis satisfaciam. Nunc ad propositum revertens, præter glandulas Dorsales, a quarum turgentia Mangerum quoque coarctum gulæ vidisse, Mauchartus (b) memorat, alias esse dico non semper Anatomicis occurrentes; quamquam nec Dorsales semper occurrunt; imo potius, aut saltem sæpius morbosas, quæ facere idem possent, ut quæ ab eodem Mauchartio (c) proprius œsophagi finem, & ad ipsum finem confectæ sunt, facturæ erant, si magis intumuiscent, ut ille intumuerant quas Vallisnerius (d) simul cum ea in cartilagine mutatione deprehendit. Idemque in fine ipso œsophagi factum esse a tumore siue scirrhus, siue dura pinguedine compacto, Boneti (e) præ cæteris, & Chirurgi a Mauchartio (f) laudati Observationes ostendunt. Porro alia, & ea quidem in omnibus, Pars est, quæ infimam gulam præter modum contringens, impedimentum afferat deglutitioni. Ea Pars diaphragma est, cujus inter lacertos extrema gula trajicitur. Quam obrem vides, cur infero villo, cujus diaphragma Cel. Heisterus (g) valde inflammatum confexit, fuerit deglutitionis impotentia, & cur hysterica aliæ quæ mulieres in loco modo designato obicem deglutitioni oppositum sentiunt, velut illa (h) in qua id deduxi a convulsis iis ipsis diaphragmatis lacertis, quos inter foramen est infimam gulam transmittens; ea enim mulier cum cibum jam prope ventriculum detruſerat, obſtaculum ibi percipiebat. Id ego foramen cum in nonnullis multo brevius, ut in fene quodam bajulo (i) invenerim, in alio autem fene, de quo alias (k) scribam, non secus atque œsophagum, qui ad eam sedem multo latior erat, & rubicundior, amplissimum in latitudinem præsertim, offenderim; egre tuli, de neutro fieri me potuisse certiorer, num quid ibi molestiæ aut difficultatis in deglutendo perciperent.

17. Præter ea quæ dicta sunt, animadverti, aliam esse Partem quæ gulam possit, & infimam quidem, comprimere. Ea jecur est. Cum enim in posteriore hujus margine excavatio sit, a Cel. Winslowio (l) commemorata, quæ locum cedit tum Spinæ, tum extremo œsophago jam in ventriculum se explicaturo; facile potest intelligi, si hepar ad eam potissimum sedem prætumidum fiat, ac durum, Spinæ apprimere œsophagum posse. Et video quidem in sectione hac sepulchreti (m) inter causas læsæ deglutitionis memorari jecur, sed non hac ratione officiens: quamquam ad hanc aliquanto propius accedere videtur Ballonius (n). Vera quidem, sed in parte, longe alia ratio est, quæ Cl. Fantonus (o) docet, cur ingenti hepatis mole, & pondere ventriculo in umbilicalem regionem detruſo, ejusque orificio superiore compresso, alimenta difficile, præsertim liquida, deglutirentur. Ait enim, œsophagi, ita per vim elongati, caritatem evaſisse angustioris, ipsumque compressione arctatum stomachum ingressuris cibis obſtitisse. Explicationis autem hujusmodi priorem partem ad cætera addi posse, cenſeo, ut tanto facilius intelligatur in Sectionis hujus Observatione. Cur miles opſiſſimo corripus, nihil posset deglutire. Cervicem enim ad posteriora reflexa, distendit gula, & sic quanto longior, tanto etiam angustior fit, anteriore ejus pariete ad posteriorem accedente. Idemque explicationum genus habere in parte locum potest ubi Hippocrates (p) de superveniente colli perversione loquitur, ut æger vix possit devorare.

18. Non me fugit, proferri alias posse causas læsæ deglutitionis, quarum aliquas in Sepulchreto ipso invenies. Non facile tamen inter has illam pro certo referes, quæ Observatione promittitur xxi. hoc præfixo titulo Deglutitio difficilis ob œsophagum diviſum. Hunc enim Blasius in eo puero describit quidem intra thoracem, ita diviſum, ut aliquanto inferius in unum rediret, siue ut Anatomici nunc loquuntur, infulam faceret. Sed de ulla deglutitionis difficultate ne unum quidem interjicit verbum; ut ea conformatio magis insolita videatur fuisse, quam noxia. Longe aliter de illa censendum est quam Egregius Vir Joannes Grashuis (q) deprehendit, nempe œsophagi circa medium thoracis morboſam in faciem lateralem dilatationem, a qua subinde variantia deglutitionis pendebant symptomata quæ nunquam sine diffinitione intelligi potuissent. Litteras quamprimum paulo fortasse longiores, expectabis, & valebis.

(b) Obs. 6. (c) De Aure Hum. c. 2. n. 20. (d) Prælect. ad Instit. §. 806. (e) Tom. 6. Obs. 90. (f) Pharm. Rat. P. 1. S. 1. c. 2. (g) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obs. 147. (h) Sect. hac 4. in Addit. Obs. 2. in fin. (i) Cent. Post. P. 1. Obs. 27. (k) Aët. T. 8. Obs. 21. (l) Conf. Epidem. A. 1691. n. 22. (m) De Degl. c. 2. n. 9. (n) Eph. N. C. Cent. 1. Append. n. 10. Obs. 161. (o) Earund. Cent. 5. Obs. 59. ubi I. M. Hoffm. & Benedict. Sylvatic. citantur. (p) in Addit. ad hanc Sect. Obs. 1. (q) Gland. Duoden. c. 10. (r) Prax. Med. l. 1. c. 5. (s) De Symp. Caus. l. 3. c. 2. (t) Obs. 11. (u) Morb. Chron. l. 3. c. 1. (v) Obs. 14. (w) Vid. Aët. Hafn. T. 1. Obs. 109. & Eph. N. C. Dec. 2. A. 9. Obs. 257. (x) Comm. Litt. A. 1741. Hebd. 15. n. 1. (y) Diff. de Struma Œsoph. §. 18. 22. (z) Obs. §. 11. (a) n. 16. (b) Obs. 22. §. 1. & in Addit. Obs. 2. (c) Aët. N. C. T. 6. Obs. 149. (d) Obs. §. 9. 20. (e) Opere T. 3. Observ. 36. (f) De Fame lethali ex callosa oris ventric. angustia. (g) Ibid. §. 42. (h) 20. hic in Sepulch.

(1) Epist. 15. n. 15. (2) Epist. 18. n. 22. (3) Epist. 17. n. 19. (4) Ibid. n. 25. (5) Ibid. n. 26. (6) Epist. 18. n. 17. (7) Obs. 10. (8) Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 90. (9) Obs. 16. (10) Epist. 9. n. 46. (11) Differt. supra ad n. 15. cit. §. 6. (12) Animad. 45. (13) Expos. in l. 2. Aristot. de Generat. Animal. (14) ejusd. l. 2. c. 5. art. 3. ad n. 11. (15) Diff. cit. §. 12. (16) §. 11. (17) Obs. supra cit. ad n. 15. (18) Sect. hac Sepulch. Obs. 22. §. 2. (19) Diff. cit. §. 9. (20) Differt. sist. Obs. Med. Miscell. Obs. 15. (21) Epist. 22. n. 4. & seq. (22) Epist. 10. n. 19. (23) Epist. 37. n. 30. (24) Expos. Anat. tr. du bas ventre n. 250. (25) Obs. 26. §. 1. (26) in Schol. ad Obs. 25. (27) in Schol. ad Patris Obs. Anat. Med. 24. (28) Sect. 4. Aphor. 35. (29) Aët. N. C. T. 6. Obs. 73.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXIX.

Perpauca de singultu, & de hominum Ruminatione attinentur. Cætera attinent ad Ventriculi Dolorem.

DE proximis etiam Ventriculi vitiis, *Singultu, Concoctione Læsa, & Dolore* et in Sepulchreto tres Sectiones invenies, in singula singulas; noli a me totidem Epistolas expectare. Duo enim priora, gravia cum sunt, ejusmodi sunt, ut alterum cum febribus, inflammationibus, vulneribus, aliisque ejusdemmodi, alterum cum aliis quos aut sequatur, aut fecerit, majoribus morbis sicuti conjuncta reperitur, ita sint a nobis, easdem repetere historias nolentibus, simul cum illis proponenda. Quod tu præclare intelligere statim poteris ac duas istas Sectiones inspicies quæ de ipsis conscriptæ sunt. In VI. enim quæ de Concoctione Læsa est, pleræque Observationes quem ad morbum magis attineant, & quo loco fufus productæ fuerint, diserte indicatum leges. Ex reliquis autem quæcunque scriptæ sunt accuratius, satis per se ostendunt, an alio sint referendæ. Sunt etiam aliquæ in quibus ne unum quidem de læsa concoctione verbum invenias, velut quæ sub numero VIII. habetur §. 2. & quæ in Additamentis sub numero I. Quid? quod aliqua, ut quæ proximè sequitur, cum ad eos pertineat qui *concoquere, nedum continere cibum, & appetere ad extremum fere vitæ potuerunt*, cur istuc relata sit, non apparet.

2. Sectionis autem V. quod demum quæque Observatio est, de qua ad Sectionem aliam non rejiciatur? aut si aperte non rejiceris, id fieri potuisse, ne dicam debuisse, non sentias? Et tamen vel sic quoque universæ denique Observationes non sunt plurimæ; quamquam aliqua (a) non semel poni videatur. Quamobrem ne præter modum brevis esset tota Sectio, interjectas fuisse crediderim Appendices quatuor, in quarum nulla inspectum cadaver memoratur, eandemque ob causam dissectiones adjectas duas, quæ minas mirarer, si ubi de Vomitu agitur, propositæ essent, hominum ruminantium: neque id satis est; novissime ex Peyer tam longus de ruminatione sermo est additus, ut Sectionem superet universam. Ne tamen hæc a me notari credas quasi omnino improbarem, fac tibi mei propositi veniat in mentem. Quin accipe nonnulla, quæ cum Appendices illas de Singultu, & ruminantium hominum Observationes perlegerem, aliud ex alio, ut fit, succurrebant.

3. In secunda Appendice cum Thomas Bartholinus inter singultus causas tumorem memoret, nervos, qui stomachum adeunt, comprimenter; qualem, inquit, illi adfuisse suspicio fuit quem Patavii perpetua singultuendi molestia novimus: in memoriam redit Jo. Rhodius Observatio (b) ad eundem pertinens casum, quæ, ut subobscura sit, inspicere tamen a te poterit. Idem Bartholinus in Appendice tertia querit, cur sola *brachii vena secla* juvaret in quodam raro sane quem describit singultu? Quid? si Phrænica Superior vena, comes, ut nosti, Phrænici nervi, repente imminuta copia sanguinis, illic quo ea vena influit, reditur, & quod consequitur, ipsa quoque parte oneris sui levata, aut focum nervum minus premebat, aut aliquid unde hic irritaretur, absorbebat? Et quando in his omnibus Appendicibus mentio fit auxiliorum adversus singultum, neque externa in prima, atque altera reticentur; Valsalva memini facile, obviumque remedium in Nobili Comite respondisse, lac videlicet, quo fovebat abdomen; quamdiu enim lintea lacte madebant, tandiu singultum, ægro molestissimum, sistebant: in quo tamen nec inutilis fuerat theriaca imposita. Quod vero in Scholio quodam (c) tertiam inter & quartam Appendicem interjecto, adnotatum est de singultu qui cum febre cuidam, pessimis signis stipatæ, supervenisset, lethalis non fuit, raræ quidem est observatio, negantibus inter cæteros duobus nobilissimis Medicis Francisco Valleio (d), & Hieronymo Mercuriale (e), sibi unquam in ejusmodi casu aliter observare contigisse, atque Hippocrati in ea muliere quæ decumbebat in foro mendacum. Quin pariter in malignis febribus quas noster describit Ramazzinus (f), quotquot fuerunt singultuosi, omnes periere, quorum uno dissecto, *ventriculus nigris notis sparsim compunctus* repertus est: quid autem in singultuosi cujusdam ventriculo deprehensum sit, discas ex Cel. Halleri Opusculis Pathologicis (g). Ledelius (h) tamen, postquam Epiphanius Ferdinandum produxit, *Deum testan-*

tem, singultum in febribus malignis & ardentibus ad mortem prædicendam se nunquam decepsisse, sapienter monet, ægrum non esse delevinquendum quousque anima adeat, quia multoties monstrata sunt in curationibus morborum, velut in panifica quodam ipsi accidit. Neque ei solum, sed & aliis, ut Lanzoni (i), Cl. Delio (k), & mihi in Forolivienfi illa Constitutione A. 1711. quæ a me tibi alias (l) descripta est. Duo enim ægri quos in ea primo loco nominavi, cum hæc scriberem, adhuc vivebant; tamen eos quicumque tunc viderat, & Garavinum præsertim, mortui, quam vivi, dies jam aliquot familiorem, & crebrum insuper utriusque singultum audierat, continuo spem omnem eorum salutis abjecerat.

4. Quod vero ad homines attinet ruminantes, quorum exempla quotquot potuit, collegit Peyerus (m), & alia ad ruminationem quasi ingentiam atque connatam, alia ad excitatam a morbo retulit; singulas ad singula hæc genera idem censuit attinere Observationes duas Viri nobilis, & Monachi, quarum utramque hic vides in Sepulchreto (n). Ambæ Patavii habitæ sunt, primæque sunt omnium; & solæ præterea quæ cum dissectione conjunctæ sint: Unum hic perperam additum est, *Monachum illum duo habuisse cornua*. Nam neque Rhodius (o) id scribit, in quo hallucinatur Peyerus (p), merito aliquin reprehendens Bartholinum, qui (q) addidit, & qui Bartholinum secuti sunt. Certe Fabricius ab Aquapendente (r) cum eundem illum Monachum commemoraret, illud minime omisit, ut qui modo sibi addendum omnino putasset, nobilis illius Viri ruminantis Parentem corniculum in capite gessisse. Inter cæteros autem qui eam Bartholini hallucinationem descriperunt, Ettmüllerus fuit (s), qui suam alteram insuper addidit, nempe in his ruminantibus observatum fuisse stomachum solito fibrosiorem & carnosiores, quasi vestimento musculofo esse indutus. Utinam sic tueri possemus, quasi stomachi nomine oesophagum intellexisset; hunc enim in illo saltem Monacho revera undequaque carnosum instar muscoli reperit Plazonus (t), id est non modo qualem habent omnes plane homines, ut Peyerus (u) credi vellet; nam nisi multo magis fuisset carnosus, Anatomicus haud ignobilis non id unum adnotasset, cum reliquis universis corporis partes se recte habuisse, pronuntiavit. Sed pro Ettmüllero: si tamen ipse illa scripsit; hæc uti defensione non possumus; quippe qui, ut omnia quæ eo capite præstus erat, ostendunt, stomachi appellationem ventriculum designabat. Gravior tamen ea Bartholini hallucinatio est qua scriptum reliquit in Anatome quartum renovata (x): *quin ventriculus duplex fuerit in homine ruminante apud Salmuthum, & alios, dubitare non licet*. Quod relatum miror in Sepulchreto eo in Scholio quod duabus subjectum est observationibus, contrarium docentibus, de quibus hæcenus locuti sumus, præsertim cum præter has, nullam, quod sciam, ruminantis hominis dissectionem, ne ex Salmutho quidem, proferre posset Bartholinus, cumque insuper lepores, & cuniculi ruminant, neque duos tamen ventriculos habeant.

5. Ut vero nec Valsalva, nec mihi unquam contigit ut ruminantes homines videremus, nedum ut eorum cadavera incideremus; ita haud raro utrique accidit, ut hominum corpora dissecaremus, quos gravis affligerat Ventriculi Dolor, de quo Sectionem inscribi VII. supra indicavimus. Quarum Observationum illas quæ in hanc magis Epistolam, quam in alias convenire credidimus, continuo accipies. Et has primum tres ex Valsalva.

6. VIR sexaginta annos natus, temperamenti biliosi, a multis jam annis de ventriculi debilitate, & dolore conqueri cœperat, cum circa eam regionem durities accessit, infra quam nonnulli præterea duri globuli, sed hi quidem facile mobiles, percipiebantur cum aliqua totius ventris tensione. Agitatus venter effusus intra se humorem manifestabat. Crebri erant intestinorum rugitus, crebræ flatuum eructationes. Vomitus, aliquot ab assumpto cibo interjectis ho-

horis semel redibat, qui aliquin primis morbi annis raro accidebat. Homo interim parum mingeat, multum stitibat, & de linguae siccitate querebatur: pulsus debilis, & parvus erat. Tandem multo fero per urinarias vias amando, & derumefacto ventre, cum tamen cætera incommoda in dies magis ferverent, vomitusque mense vitæ ultimo esset quasi feri fuligine infecti, & grave olentis, ut ager ipse referre diceret putridæ carnis fetorem; sensum diminutis viribus, & balbutienti ore defecit.

VENTER libram etiam cum unam aut alteram feri continebat, aquæ similis in qua caro recens lota est. Totum omentum contractum erat in quoddam varii coloris extuberantias, quæ, ipso moto, movebantur. Ventriculus fero scatebat ejusdemmodi ac vomitu rejiciebatur: durus autem erat factus parte circiter tertia; hæc autem pylorum pertinebat, ipsumque adeo coarctaverat, vix ut transire confecta alimenta possent. Quamvis autem tota ea dura pars secta, albam intus solidamque, ex qua constabat, substantiam ostenderet; ea tamen facie qua cavum ventriculi spectabat, putridam carnem & colore, & fetore omnino referebat, quibusdam sanguineis punctis distinctam.

7. Duros illos, mobilesque infra regionem ventriculi globulos extuberantias fuisse vides in quas omentum se contraxerat: duritiem autem superiorem fuisse ventriculi scirrhum, qui donec incrementum suo non se extendit ad pylorum coarctandum, vomitus non ita frequens accidit. Dolor quoque primis temporibus levior fuit, quippe ab scirrhi pondere dumtaxat aliquo, & repugnantia tunnicarum quas obidebat, ne cum opus esset, iusta extensio ventriculi fieret; aut si fieret, ne pars earum quæ sana erat, sola omnem distentionem pati ipsa posset sine molestia. Verum ubi scirrhus & auctus est, & in cancerum tandem, huncque exulceratum, degeneravit; magis magisque dolores incrementum debuerunt. Sic autem affecto ventriculo, vigiataque concoctione, & natura sanguinis, mirum non est, si cætera contingeret; cum præsertim & durities illa ventriculi, & extuberantia in quas se omentum huic alligatum, contraxerat, libero humorum cursui obstant. Ex his rugitus, flatus, vomitus, æscites, debilitas, mors intelliguntur.

8. MULIER quadraginta annorum, carnosa, colore subflavo, cum capam aceto, & sale conditam, simulque panem comederit ex castanearum farina confectum; illico de stomachi dolore queri cœpit. Quo magis, magisque sævient, tribus ab eo cibo horis, cum sudoribus frigidis lethali syncope ingruente, mortua est. VENTRE ob veneni suspicionem inciso, omnia reperta sunt secundum naturam se habentia, nisi quod ventriculus majorem in modum distensus erat, & nonnihil inflammatus; sanguis autem fluorem quasi naturalem servabat.

9. Et Valsalva quidem videbatur sic consociendum, excitata ab ejusmodi cibis incongrua effervescencia, concoctam esse tantam illam ventriculi distentionem, quæ hujus sanguifera vasa comprimendo, sanguini injecerit moram, unde inflammatio, & ab hac stomachicorum nervorum irritatio, unde syncope. Verum ut de castaneis, earumque insani vi experientia comprobet quæ Diaphilus, & Mnesithæus ajunt apud Ludovicum Nonnium (y); eandem tamen multis Alpini gentibus in frequentissimo usu esse, neque idem negat, & vulgo non ignoratur, imo parari etiam ex illarum farina panem, quo vescantur ubi ipsarum, ut Avantiis quoque (z) scribit, copia suppetit. Num igitur capæ ad ejusmodi panem addita, dum acrimonia sua crassas castanearum particulas incidendo, nimiam aeris copiam educit, hic nobis accusanda est? quasi vero non iidem in albis rusticis capas, ut res fert, cum eo pane manducarent. At enim mulierculæ huic, ut videtur, inassuetus, & infirmior fortasse stomachus; illis vero dura, ut Horatius (a) loquitur, *messorum illa*. Credo equidem hæc multo iis magis qui mulierem norant, quam nobis cognita fuisse. Unde ergo veneni suspicio, cum hæc omnia non ignorent? Quod si mulier saltem immodica ejus cibi copia se ingurgitasset; minus de veneno suspicati essent. Vides enim in VII. hac ipsa Sepulchreti Sectione (b) puellum quoque ab immoderato uvarum esu trium horarum spatio extinctum. Sed tamen alia simul apparuit causa cur puellus sic interiret. Ventriculus enim perforatus copiosum ichorem viridem continebat, qui proculdubio; inquit Observationis Scriptor Rhodius, erat bilis eruginosa, cujus ingens erat acrimonia. Quid ergo est? In hac etiam muliere peculiare aliud ali-quod, quamquam sub oculis non cecidit, subfuisse, omnino crediderim, ut disposita jam esset, si modo causa accede-

ret aliqua, velut insolitus cibus iste, & flatulentus, disposita, inquam, ita esset, ut quod inde tot aliis minime solent, ipsa pateretur, sive illud in iis esset succis quos in ventriculo is cibus invenit, sive in nervis quoque exquisitiore sensu præditis ad irritationem fuscipiendam, & alio, id est ad cor potissimum, cui iidem ac ventriculo nervi inserviunt, transferendam. Sic igitur, aut ad hunc fere modum intelliges quod Valsalva consociabat: quamquam præva dispositionis in hac muliere vix indicium aliquod habemus ex colore cutis subflavo. In duabus certe aliis foeminis, quas post cucurbita comestionem fere capite piperate, & in clibano assate, mox e pota frigida, sive in lacte coctæ atque pipere bene condita, mox bibita cerevisia frigida acidulaque, cita mors abstulit; in iis, inquam, mala dispositio magis patebat, cum alteri menstruum trimestris esset suppressio, alteri præter septuagenariam ætatem, diuturna ventriculi debilitas, virumque imbecillitas. Sed nimirum graviora quoque in alterius cadavere ante sectionem, & in utriusque, aut saltem in alterius ventriculo per sectionem Christophorus Seligerus (c), & Michael Ernestus Ettmüllerus (d) adnotarunt.

10. BONONIENSIS Patricius, unum supra sexagesimum annum agens, cum multos jam annos modo hemiplegia, modo arthritide interdum vaga, alias fixa, modo renum calculis esset vexatus, novissime arthritide corripitur in manu dextera sine ullo dolore, dolore autem miti, & qui, mox sentiendi vi hebetiore facta, vix percipitur. Sana omnino sit manus, sed interea ren dexter dolet. Hic quoque dolor, inani sæpius, recurrente vomitione sedatur: at cessante vomitu, arthritidis dexterum pariter inferiorem artum prehendit, ægrumque ad suam, & ad cruris tarsique articulum valde torquet. Un o, aut altero interjecto die, is totus extremus pes sentiendi, movendique facultate omnino privatur. Postridie tamen resoluta pedi aliquis redit doloris sensus, ægro autem bonus & animus, & pulsus, qui intermittens alias, & inæqualis plerumque erat in brachio dextero. Tandem pridie quam moreretur, cibum rejicit aquosa materia permixta: levemque dolorem cum pulsatione, atque ardore, ad stomachi regionem perferent. Paulo post humorem flavum bis evomit. Infecuta nocte parum dormit. Mane humili voce de tribus quæ a morbi initio assidue molesta fuerant, valde conqueritur, sitis, pravo oris sapore, amisso appetitu: & febris, quæ aliquoties se ante ex pulsu tantummodo prodiderat, manifesta fit. Stomachi autem dolore, & pulsatione perstantibus cum ingenti ad dorsum calore, pulsus, qui vespere jam erat languidus, ex multa sanguinis dejectione aboletur. Sanguini erat admixta materia gravissime olens, & quæ liquatæ picis instar, immixtum bacillum, si retraheres, sequebatur. Interea pes multum dolet; reique sensus per crus ascendens habetur, sensusque postmodum quasi ponderis in imo ventris. In brachio autem dextero movendi vis sensim deficit, liventibus ungibus: idque brachium mox plane paralyticum redditur. Non paucis ante mortem horis crebri ad præcordia tremores percipiuntur. Postremo sanguinis dejectione redeunte, ejusdemque materiæ vomitu fortasse imminente, ut nausea, & similis ex ore quasi fecum graveolentia indicabant, æger suffocari se dicens, post sextam & trigessimam a stomachi dolore ineunte horam decedit. AB-

DOMINE diducto, omnis intestinorum substantia invenitur a ventriculo usque ad Recti finem dira inflammatione occupata, ut ne minima quidem eorum pars illa se relinqueretur. Intestinis autem materia sanguinolenta, dejecta similis, continebatur. Ventriculus, & renes sani erant. In Thorace, posteriora pulmonum, sinistri præsertim, leviter erant inflammata. In pericardio mediocris aquæ copia. In corde polyposæ concretiones nullæ.

11. Hippocratis aphorismus (e) *Quibus ex morbis acutis, aut diuturnis, vel ex vulneribus, sive alio quovis modo extenuatis, atra bilis, sive uti sanguis niger infra exierit, postridie moriuntur*, nisi quod paulo citius videtur expletus, vel magis quadrat in hunc casum, quam in eum ad quem a Ballonio, ut hic vides in Sepulchreto (f), traductus est. Ejus enim æger, quem dolores pariter ad ventriculi regionem vexarant, pridie quam e vita excederet, atrabilarium quidem excrevit sanguinem; sed per os. Cæterum nec Ballonius quidquam vitii in ipso ventriculo, & Valsalva hunc sanum proposituit. Uterque prope ventriculum illa indicavit, unde hic simul affici posset. Pulsatio autem quæ a Valsalva adnotata est, facile & resistentis sanguinis in proximorum intestinorum parietibus, effectus erat, & ejusdem exitus causa

(a) Confer Obs. 6. cum §. 6. Obs. 7. (b) Cent. 2. Obs. Med. 61. (c) ad §. 6. Obs. 7. (d) Comment. in Hippocr. Epidem. l. 3. s. 1. Aeg. 12. (e) Prælect. Pisan. in cand. hist. que ibi 26. (f) Constit. A. 1692. & duor. segg. n. 22. (g) Obs. 14. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 7. Obs. 127. (i) Earund. Cent. 1. Obs. 61. (k) ex Act. T. 8. Obs. 108. (l) Eph. 7. n. 16. (m) Mercur. l. 1. c. 6. & l. 3. c. 3. (n) Obs. 10. & 9. (o) Cent. 2. Obs. 59. (p) c. 6. cit. (q) Cent. 5. Hist. Anat. 61. (r) De Ventric. Intell. &c. ubi de Variet. Ventric. in fin. (s) Prax. l. 1. s. 4. c. 1. (t) Vid. Rhod. Obs. cit. 59. quæ 9. in Sepulchr. (u) c. 6. cit. (v) l. 1. c. 9.

(y) Diastet. l. 1. c. 45. (z) Not. ad Fieræ Cœnam, ubi de Pane non frumentac. (a) Ephod. 3. (b) Obs. 19. (c) Eph. N. C. Dec. 3. A. 1. Obs. 139. (d) Earund. Cent. 9. Obs. 66. (e) 23. §. 4. (f) Obs. 19.

causa in eorum cavum. Urgendo enim usque, & usque aliqua demum ex infarctis vasculis ruperit. Quo trahi fortasse potest; ut ad Hippocratem redeamus; pars quaedam ejus prædictionis (g): *circa ventrem palpitantes... sanguinis eruptionem significant*. Utrumque hæc sunt; illud certum est, pene omnem vim tam longi, & varii morbi, in vasa denique intestinorum repente incubuisse, & conjunctum per vasa, imo continuatum per substantiam ipsam ventriculum in consensum rapuisse. Sic in alio videbis in consensum tractum qui toto morbi tempore nigra dejecerat, itemque in alio, in quo intestinorum superna pars livefcebat. Historias habes has duas in superiore Sectione V. (h), quæ ad singultum attinet. Habereque facile in hac quoque tertiam (i) ubi intestina omnia ex inflammatione valde rubentia proponuntur; si ut dissectio, ita morbus indicaretur, sine quo illam, & fortasse alias, miror quomodo inter cæteras, quæ de Ventriculi Dolore sunt, relatas legamus. Certe autem in Cæsareæ Academiæ Notis luminibus (k) tum laborantis ventriculi in vivis, tum non hujus, sed intestinorum aut inflammationis, aut malæ constitutionis haud unam in mortuis Observationem reperies. Sed de ea potius quæ modo ex Valsalva descripta est, si forte illud quæras, cur intestina ipsa, tam graviter affecta, dolore igitur non cruciarentur, quo contenti ventriculus tentabatur; a veri similitudine non longe abhorrebo, si quo in homine tam crebro, tam facile tot nervi resolvebantur, in eodem conjiciam eos quoque nervos resolutos fuisse qui ad intestina pertinebant. Jam vero huc quædam ex nostris etiam, ut promissimus, Observationibus adscribamus.

12. FEMINA annorum ad quadraginta, quæ falsa plerumque comedere, vino autem generoso uti consueverat, a plurimis jam annis obnoxia erat ventriculi doloribus, quos dejectionis ciborum appetitus & nausea, mox etiam iterata sanguinis vomitiones cum febre continua, vigiliis, siti sequebantur. Et quamvis contraclusus venter nihil usquam duri observandum præberet; ab regione tamen ventriculi etiam tum cum graviori aberat dolor, vel nulla pressione adhibita molestus aliquis subinde sensus non aberat. Querebatur etiam de lumbis; sed tunc solum cum aut aliquem majorem solito laborem ferebat, aut onus attollebat. Accesserat insuper aliquando capitis dolor pertinacissimus. Adversus omnia, quæ memorata sunt, ventriculi incommoda, quotiescumque gravius recurrebant, levamen semper attulerat sanguinis missio: valde etiam profuerant copiosæ potiones aquæ in qua nihil nisi panis bulliret: ab diuturno autem laetis usu non semel convalescere visa est, animusque addebat sanguis qui semper singulis mensibus per uterum ad mortis usque tempus respondit. Hæc lente ad hunc modum advenit. Non ita pridem supra clavicular quæ Externa jugularis vena decurrit, tumor utrinque apparuerat durus, dolorem creans, nec remediis cedens sic ut in dies augeteretur, & respirationem jam difficilem redderet. Huc accessit febris assidua, vespere increvens, quæcum aliquando rigor aliquis adnotatus est. Caput dolere, querebatur, præter stomachum qui perpetuo dolorem faciebat: quocum tamen nunquam hoc tempore sanguinis vomitus foret. Assidue sitis molesta erat, & sensus maxime in ore amaritudinis, ex quo novissimis diebus gravis existebat nidor: pus autem, quod animadversum fuerat, nunquam exiit. Per hæc diutius vitam traxit, quam pulsus ex parvis, & imbecillis minores sæpe, & infirmiores facili promittere videbantur, præsertim cum ultimis diebus quindecim nil nisi jus, & vini paucillum sumeret, nullum præterea alimenti genus, nedum remedium, jam ferens. CADAVER macilentum in Gymnasium illatum est, ubi cum Anatomen docerem Februario mense A. 1744. & jam Virilia demonstrassem, Muliebria ex ordine requirebantur. Ventre igitur aperto, omentum vidi sursum revolutum & extensum, ut statim in oculos incurreret transversus Coli intestini tractus qui infra ventriculum esse solet, hic autem erat infra umbilicum. Quam in sedem etsi non omnino detru-di, tamen quadantenus urgeri potuisse a ventriculo videbatur, quippe cujus fundi sinistra pars inferius quam solita sit, descendebat. Erat autem ventriculus vel exterior lividus non modica præsertim ex parte, idemque crassioribus & durioribus tunicis, nisi qua jam frigidæ adeo erant factæ, ut tangendo rumpere, effunderentque materiam cinereo colore, & gravissime olentem, quæ pulcra inftar fluidioris, ventriculi cavo continebatur. In hoc eruperat ex ventriculi pariete posteriore, præter modum crasso magnum ad tractum & introrsum tumente, ibique inequali, feodo, fracido, gangrenoso, & eodem

quo materia illa, colore lurido, ut pessimi generis tumorem, aut abscessum ibi fuisse disruptum, constaret. Sanus erat pylorus, & intestina omnia, ex quibus Colon fuit, ut par erat post longam cibi abstinentiam, ab initio ad finem usque contractum. Lien quoque sanus, nisi quod proportionem erat major, intusque pallidulus. Sed jecinoris pars dextra albos aliquot ostendebat scirrhos subrotundos inftar mediocrium uvæ acinorum. Erant ii disjecti per superficiem sic ut ex parte intra visceris substantiam conderentur; sed aliquem vidi, jecur incidens, penitus conditum, cæteris prioribus similem. Bilis multa fuit in sua vesicula, & valde flava, quo colore viciniam infecerat. Renis sinistri posterior facies lineam obliquam habebat longam, & subalbam ex substantia quasi tendinea, quam alte, cum renem fecerem, productam perspexi, ut ad tubulos perveniret, quibus papillæ excipiuntur. Credidisses facile anticum vulneris cicatricem, adeo erat hujus similis: verum nusquam apparebat quærenti in proxima Adiposa tunica, & musculus ventris læsionis indicium. Parvus, humilisque uterus, & dextrorsum valde inclinat, eique lateri multo vicinior, quam sinistro. Sed & ab illo brevius, quam ab hoc latere Rotundum erat ligamentum. Uteri cervix, & magis osculum qualia in virginibus fere inveniuntur; ita erat, illa introrsum extantibus obliquis læcertis, hoc vero foramine angusto, & rotundo. Neque hymenis annulus, quamvis valde humilis, deerat, nullumque ruptionis ostendebat vestigium. Nihil tamen post illum subrotundum caruncularum, & paucæ omnino, levæque in vagina rugæ, & cutis quam ad imum abdomen animadverteram quasi ex subalbo maculosa, cum iis quæ dixi, non satis consentiebant. Testes pro ætate, & mole uteri, magni, anfractuosi exterius, intus autem finitè quidem parvas inanes cellulas, crassiuscula alba membrana comprehensas, alter vero in cellula non paulo majori nigrum semiconcretum sanguinem continebat. Tubarum dextera ad tellem pervia, cætera occlusa; contra, sinistra ad uterum dumtaxat aperta. Mirum in cadavere macilento, nisi muliebri esset, pinguedinem in mesaræo fuisse non modicam, neque in omento defuisse, in dorso autem & artubus inter musculos, qui eleganter rubebant, multo plus pinguedinis quam voluisset, eos qui apparuerunt, invenisse. Subca flava pinguedine quæ mesaræum lumborum vertebat, & his adherentes operiebat magnorum vasorum truncos, latebant glandulæ valde amplificatæ, arctique adeo iis truncis annexæ, ut non sine magno labore separari potuerint. Erant eæ omnes glandulæ intus alba, non præduræ, sed purulento ichore scatentes. Cæteræ per mesaræum non tumeant. At prope ventriculum unam ex lymphaticis animadverte crassiorē factam, & duriorē, eaque erat colore lurido. Pancreas quoque tunc vidi crassius totum, & simul aridulum, ac duriusculum factum, si quandam ejus partem excipias, quæ excreverat in albam, & propemodum thymi similem substantiam. Thoracem recedentes, primum omnium duas infimas Jugulares glandulas vidimus albicantes, & ad duos saltem transversos digitos in omnem dimensionem amplificatas. Hæc tumorem illum de quo dictum est, utrinque faciebant, durum; nam duræ ipsæ quoque inventæ sunt; licet intus purulentum ichorem, cujus pars effluxit dum clavicular, sub quibus, & proximo sterno subibant illæ, detraherentur. Erant his similes colore, duritie, & ichore glandulæ reliquæ Jugulares. Hæc tamen multo minus excreverant. Axillares vero nec creverant, nec ullam aliam passæ erant mutationem. Contra, quæ ad primam locatæ sunt divisionem Asperæ arteriæ, ex nigris alba; ex parvisque factæ erant mediocribus uvæ acinis haud minores, firmiores præterea, & eodem quo tot alias glandulas dixi, purulento ichore scatentes. Sana tamen vel ad jugulum arteria Aspera, ut totus pariter ab imo ad summum œsophagus. Neque in pulmonibus qui erant aere turgiduli, quidquam vitii animadversum est: neque in corde, si tubercula exciperes subrotunda, depressa, ex duriuscula, compactaque substantia, crebra adeo ut fere conringerent inter se, quæ totis limbus insidebant Mitralium valvularum; in una autem Semilunarium quandam, quæ accreverat, quasi squamulam, necdum tamen offeam. Cerebrum denique non modo non laxum, sed ad durum vergens, secundum naturam se habuit, nisi quod in Lateralibus ventriculis copia erat aliqua pellucidæ aquæ, & plexus Choroides pallescent. Pinealis autem glandula fuit aliquanto magis quam solet, & firma, & globosa & magis ad album inclinabat. Quod, tamen ipsam nunc plerique pro glandula non habeant, placuit

placuit tamen non omittere in eo corpore in quo tot glandulas viciosas animadvertisimus.

13. Animadversio eadem facit, ut initium diuturni, & qui mulierem tandem confecit, morbi, in aliqua fuisse ventriculi glandula, suspicemur, sensim aucta, & duriore, ac tumore suo obstaculum sanguini afferente, ut ex dilatatis propterea vicinis vasculis non semel erumperet, in femina præsertim quæ generoso vino, & falsis cibis abuteretur. Quæ intemperantia posteaquam glandulæ non moles dumtaxat, & extensio paulatim aucta est magis, magisque; sed & humoris inclusi natura pejor est facta, demum purulenta corruptio accessit, unde priusquam dehisceret tumor, tantum pravi ichoris in venulas, & in vasa lymphatica se coniecerat, ut aliæ atque aliæ glandulæ eadem labe inficerentur. Si diutius mulier vixisset, quid pancreati, quid scirrhui hepatici accidere posset, non difficile est conjectura prospicere. Quod autem in vesicula multa esset bilis, mirum non est, ut superiore Epistola (l) scripsimus, ubi diutius in ventriculo, proximisque intestinis nihil fuit, quod hæc ditendendo, illam comprimeret. Quod vero bilis colore tincta vicinia esset, id sæpe adeo in cadaveribus occurrit, ut de noxa inde repetenda aliquanto magis pronum sit Scholium extremum sequi, in Sectione hæc Sepulchreti adscriptum Observationi XVI., quam ipsam Observationem hic præsertim ubi tanta passim certarum læsionum copia est. Cæterum si forte alia cupis tumorum, aut abscessuum in ventriculo exempla; præter ea quæ in hac, & proxima VIII. Sepulchreti sectione occurrunt; habebis quæ addas ex Cæsareæ Academiæ Monumentis (m), ex aliisque præterea, & nominatim Friderici Hoffmanni (n) Voluminibus.

14. ANICULA aliquot jam menses in hoc Nofocomio decumbebat tumoris causa abdomen attollentis, ad umbilicum, & infra, sed dextrorsum magis. Quamobrem in sinistram latus cubare non poterat. Magnus erat tumor, eoque major videbatur, quod hypochondria, & pleræque aliæ ventris partes plurimum ob maciem subsidebant, universum quidem corpus obtinentem, sed magis sinistram latus, an quod mulier semper in dextrum decumbebat? Si tumorem, manibus interceptum, huc illuc ageres; sic satis mobilem percipiebas. Nihil autem fere dolebat. Contra, querela erat perpetua de molesto quodam in ventriculo sensu. Quas ob causas non deerat qui coniecerent, in omento esse tumorem qui ventriculum deorsum traheret, eoque male afficeret. Cum molesto illo ventriculi sensu vomendi interdum voluntas fuerat; non vomitus. Nunc autem erat præterea assidua quædam febris, quæ cum cæteris, de quibus dictum est, omnibus ad dexteram usque perstitit id est ad Octobris medium A. 1735. VENTRE adaptato, manifestum fuit, tumorem esse in ovario dextero: quod in cellulas excreverat, materia plenas molli quidem, nec tamen fluida, colore autem ex cinereo flavescens, odore non gravi. Tumorem augebat adnata proxima Tuba, ipsa quoque multo amplior, & crassior facta; cum uterus, & quæ ad ipsum attinent reliqua parva essent, & sana. Alligatus erat tumor ad contiguum pelvis latus, ex parte autem quadam ad proxima etiam intestina sic ut cum his moveri quadantenus posset. Et inflammatione intestina livebant: nec male olebant tamen, ut nec ventriculus, quem ad me attulit is qui cadaver fecit, & cætera quæ hæcenus scripta sunt, diligenter narravit, Mediavia noster. Causa afferendi fuit, ut dubitationem quandam ipsi eximerem postquam ventriculum perlustrassem. Erat hic contractus, facie interiore passim hic illic inflammatus, in ipsoque jugi medio habebat ulcus circuli ferme ambitu, cujus diameter aliquanto erat brevior tribus digitis transversis, profunditate exigua, quippe cum crebra in eo apparente lenticularis glandulæ mediocri magnitudine, & adeo manifestæ, ut per osculum quod in earum centro conspicebatur, setam immiserim. Labris tamen paulo crassiusculis ejusmodi ulcus cingebatur: & crassa erat facta, dura, & magis quam alibi, etiam illa ventriculi substantia toto eo spatio quod ulceri exteriori respondebat. Cum autem esset in medio fere ulcere ventriculus penitus perforatus; ex me querebat Mediavia, num censerem, potuisse forte id foramen per incuriam cultro fieri, dum ventriculus eximiebatur; nihil enim vel diligenti perquisitione reper-

tum esse, affirmabat, in ventre, præter aliquid feri in ima pelvi, quod fortasse ex ventriculo dici posset effusum, cum tamen in muliere perpetuo decumbente multum videretur effundi debuisset. Ego vero etsi minus veri simile existimabam, si cultro lædi fortuito ventriculus debuisset, in ea potissimum sede læsum esse quæ medio ulceri responderet, nec forma, & magnitudo foraminis, quod capax erat propemodum apicis minimi digiti, eæ viderentur quæ facile ad cultelli mucronem, aut aciem referri possent; tamen ut ipsi, mihi quæ simul verum dignoscere cupientibus satisfacerem, iterum ac tertio foraminis oras accurate inspexi. Quas cum viderem non modo callosas, sed inæquales, & quo magis extrorsum foramen pergebat, eo minorem ambitum complectentes, quæ duo certe ab exterioribus introrsum illapsus culter minime facere potuisset; non huic, sed morbo imputandum esse foramen censeui. Nam quod nihil effusum esset in ventrem, inde fieri potuisse quod paulatim quidem extenuata esset membrana extima, nec tamen penitus nisi extremo tempore erosa demum atque pertusa, cum videlicet moribunde mulieris contractus, & corrugatus ventriculus nihil haberet quod effunderet.

15. Incidi postea in Observationem Mercklini, quam hic quoque in Sepulchreto (o) relata invenies, foraminis videlicet quod facile pollicis extremum admitteret, in elatiori pariter ventriculi sede, ad quam a multis jam annis continuus fuerat dolor aliquis, non magnus quidem, sed tamen satis molestus. Id foramen ab illo quoque Docto Viro creditum est post antiquam erosionem apertum esse dumtaxat novissimo vitæ tempore; censebat enim, hanc diu protrahi non potuisse, si ut quædam pridie comesta in ventrem effusa animadverit, sic alia etiam antea fuisset effusa. Sic pariter multo recentior Observationem explicabis, quæ in Commentariis legitur Inclytæ Sc. Academiæ Imp. Petropolitane (p), scissuræ ventriculi per quam nihil in ventrem effluerat, & quam tamen cultro suo factam esse, sincerus, expertusque professor sacramento pernegabat; erat autem is quoque ventriculus manifeste erofus, præsertim in parte quæ fundo opposita est, hominisque fuerat exacte referentis speciem phthisici, quem vomitus, fere assiduus, nulla arte sedandus, necaverat. Sed neque a Tyfone (q) (qui humanis etiam in ventriculis perforationem ter dicitur invenisse) eadem in Marsupiali Americano deprehensa, quidquam effusi in ventris cavum repertum est. Non hic eas memoro perforationes e quibus nihil defluere in ventrem poterat vel quod in agglutinatum ventriculo intestinum Colon pertinerent (r), vel quod ab adnata jecinoris parte obturerentur (s), Illas quoque prætereo in quibus effusio fuerat, an non fuerit, minime lego (t). Cum effusione vero mortem aut citissimam conjunctam (u) video, aut certe post perpaucos dies non raro subsequenter (v), si a morbi gravioris facti die, perforationis dies numeremus, velut in lectu sane digna Observatione Cl. Baronii (y); qui tamen octavo die mortem consecutam refert, admonet tamen, in summa anteriore ventriculi parte foramen fuisse, ut perdifficile fuerit positiones in ventrem effundi, nisi tandem interfecto tempore, & in quibusdam ægri moribus. Dixi autem non raro propterea quod etiam quædam extare scio perforati ventriculi Observationes in quibus aut illud non liqueat (z) aut contrarium potius apparere videatur (a). Sed hæc tu conferes, & perpendes.

16. Quæ etsi aut omnia, aut pleræque in ventriculo deprehensa foramina ad ulcera pertinent, quæ citius, aut serius cunctas ejus tunicas pervaserunt; hic tamen habes in Sepulchreto (b) plures alias ejusdem visceris tum intus, tum extra ulcerati Observationes, tamen quædam repetuntur, ut V. posterior; idem enim numerus V. per incuriam bis ponitur; in XLIII. §. 4. & VI. in XXVII. §. 2. Sed cum repetitiones sint etiam aliarum ad alia ventriculi vitia attinentium, ut ejus quæ in XXVI. §. 5. est, in XXIV; nulla est quæ excusatione dignior sit, quam ubi XX. iterata est in Additamentis sub numero II. Quis enim ea quæ Blancardus tanquam in Crue suæ Crivatis à Mstelodamensis observata proponit, eadem esse suspicaretur quæ Riverius in Aurifabro Montpelienfi jam propofuerat; nisi qui Blancardi in historiis transformandis ingenium edoctus, eum similia ab Riverio tradita esse, meminisset, utramque in-

(g) Prædict. l. 1. n. 20. (h) Obs. 1. & 6. (i) Obs. 50. (k) Dec. 3. A. 9. Obs. 232. & Act. T. 2. Obs. 108. 1. loco.

(l) m. 6. (m) Dec. 3. A. 5. Obs. 177. & A. 7. Obs. 125. & Cent. 3. Obs. 13. (n) Med. Rat. T. 2. §. 1. c. 7. §. 26. (o) Obs. 48. (p) Tom. 7. (q) Vir. Act. Erud. Lips. Suppl. T. 3. S. 49. (r) Sepulchr. S. hac 7. Obs. 13. S. 1. & Brunner. Gland. Budden. c. 9. & Haller. Opuscul. Pathol. Obs. 23. (s) Sect. ead. 7. Obs. 5. secunda, & in Add. l. Obs. 3. & E. N. C. Cent. 3. Obs. 14. (t) in Schol. ad Obs. 3. modo cit. primo, & tertio loco, & Sect. ead. Obs. 7. §. 1. (u) Eph. N. C. Cent. 3. Obs. 43. (v) Eandem. Cent. 3. & 5. Obs. 120. & Sepulchr. l. 3. S. 21. Obs. 25. (w) Memoir. présent. à l'Acad. R. des Sc. Tom. 14. (x) Sepulchr. l. 3. S. 8. Obs. 14. (y) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. Obs. 91. & Cent. 1. & 2. Obs. 154. (z) Adde & seq. VIII. Sectio. em.

inter se Observationem conferret, nec similem modo, sed unam eandemque prorsus esse, evidentissime deprehenderet? Verum ut ad eas quæ ad ulcera spectant, redeamus; inter cæteras digna est quæ legatur XLVIII. quæ si ante centum viginti annos extrare potuisset, fecisset, ut opinor, ne tam facile, ut de aliis taceam; a Gelsnero ederetur quæ hic est XXXVI. de lacertis videlicet, ac serpentibus intra viscera obortis, & per gravissimos dolores circiter tria hominum milia, si Superis placet, enecantibus. Namque, ut Vallisnerii nostri (c) rationes, & monita prætereamus, quæ utinam ab pluribus eorum qui ejusdem generis Observationes postea tradere sine ulla dubitatione perrexerunt, lecta fuissent, atque perpensa; certe in ea quoque XLVIII. quam modo laudabamus, historia viri ab Harmanno descripti, qui lacertam sibi in ventriculo inesse, firmè adeo credebat, ut ejus formam delineare non dubitaret, alius autem apud Lucam Antonium Portium (d) se ibidem ranam habere, asseverabat, coxantem aliquando, & in aquis, si quas ipse potasset, natantem, & ne multis, apud Brunnerum (e) mulier propter stomachi morbum, aliæque vivum animal in ventre alere credebatur. Hæc tamen pro eo animali, & ille pro rana, & primus prolacta, ventriculi tumores, & plerisque exulceratos habuerunt. Fac igitur ad Sepulchretum addas duas ex his tribus recentiores historias cum suis quamque signis, & dissectionibus. Sunt autem cum aliæ aliquæ addendæ ex minus recentibus, ut puta quam apud Freherum (f) legeris de famigeratissimo Cardinali Baronio, quem tria ulcera in ore ventriculi per insuperabilem nauseam absumperunt, tum, ex recentioribus præsertim, plures, ut Brunneri altera (g) cum ulcero tumore, ut Balteri (h) generatim non ita dissimilis, ut Præcl. Planci (i) duæ, callosi ulceris utraque, item aliæ, in hisque Illustris Halleri quædam; nam præter illam scirrhusi ex aceti abusu ventriculi (k), binas habet alias, quarum altera (l) in eo tubercula proponit plura, puris plena, altera (m) ventriculorum scirrhusi, & abscessibus inter membranas deorsumissimum quæ Colo intestino adhærebat, quocumque per ulcerosam patentem viam communicabat. Quas omnes Observationes attente relegens, ab illa Hermannii initio ducto, additæ insuper alia Cl. Goritzii (n), facile animadvertes, perpaucas omnino esse in quibus læsio non esset aut in pyloro, aut prope pylorum; ut hac quoque de causa Frid. Hoffmanni (o) sententia plerumque, saltem a vero non abhorre videri possit, scilicet pylorum potius & primario affici in cardialgia, præsertim cum in proxima quoque Sepulchreti Sectione VIII. (p) juxta illud orificium ventriculi intus exelus, in hac autem (q) orificium ipsum, & exterius valde tumens legatur, nec sine vomitibus albo pure refertis, interius autem scirrhusum, & induratis albicantibus glandulis magis quam ventriculi pars reliqua, abscessum. Porro autem cum in laudatis Hermannii, & Balteri Observationibus ita cum pylori ulceribus excrecentias ejusdem five glandulas, five fungosas conjunctas videris, ut hæc quidem credi possint ex ulcerata pylori substantia procrevisse; facile quæres, num excrecentiæ quoque cæteræ, quas alii, nosque ipsi tum ad eam, tum ad alias ventriculi partes aliquando conspeximus, sint ex aliquo ejus ulcere prognatæ omnes existimandæ? Vides enim, exempli causa, in Aditamentis ad hanc Sectionem (r) a Paulino observatas in ventriculo verrucas duas circa sinistram orificium cum radice sua firmè annatas, alteram minoris pomi, alteram grandioris, avellanæ magnitudine, nullam autem ulceris unde existerent, mentionem fieri; quamvis antea massa, glandem æquans, multo cum sanguine fuisset per vomitum rejecta; & sane cutis verrucas videre soliti sumus sine ulcere. De ventriculi autem verrucis quæ Medici Arabes scripserunt, leges apud Marcellum Donatum (s), & ex parte etiam habes in Scholio ad Appendicem quæ a Boneto subijcitur Observationi XIII. hujus Sectionis: quanquam verruca quæ ibi ex Avenzoare commemoratur, cum pomi effectus magnitudine, non facile intelligitur, quomodo ex ventriculo egredi, & per Tenuia intestina ejici in Crassa potuerit; ut proclive sit suspicari, non in ventriculo, sed in ea parte Coli (t) enatam quæ ventriculi fundum contingit, præsertim cum vomitus nunquam, sed dejectiones semper, modo varii coloris, modo sanguineæ in illo agro memorentur.

17. Quoniam vero quæ Arabes verrucas nominarunt,

ea si non polypi intestinorum, aut ventriculi (cujus ferme generis fuisse crediderim molem istam carneam, quæ post complures sanguinis vomitiones rejecta describitur in Appendice de qua modo indicatum est) carneæ excrecentiæ, ut verrucæ etiam Paulini esse potuerunt quæ pendulas ex radice verrucas quadantenus imitarentur; si ipsas quoque exulcerationi cuidam, aut erosioni suam debuissent originem velis, non repugnabo. Sed potius quæram, idemne de quibusdam aliis sis crediturus, ut puta de illa non parva glandulosa caruncula per oblongum petiolum ventriculo affixa prope anulum pylori, quam Epistola XVI. (u) a me tibi descriptam, poteris cum ea conferre quæ ex Prævio nostro in Sepulchreto (x) proponitur ad eandem ventriculi sedem annexa per oblongam membranam, meæque in eo etiam similes, ut opinor, quod fuisset innoxia. Cum enim sic de ipsa scribatur, hoc corpore in pylorum incidentem, facile chyli exitus omnino præpediri, & varia symptomata oriri potuissent; non ille igitur præpeditus fuisse dicitur, aut hæc orta; ut minime appareat, cur ei Observationi hic titulus præfigatur *Tabes a glandula pyloro adnata*. Mihi quidem istiusmodi excrecentiæ, & quæ ex cute pendula in quibusdam spectantur, ac inter nervos maternos referuntur, originem videntur non valde habere dissimilem, neque ad ulcera pertinentem. Nec tamen negaverim, posse facile, ut nervos illos, ab advenientibus injuriis abrumperet, & exulceraret. Sic in uno, aut altero, & præsertim in Sene quem tibi alias (y) inter eos describam qui ex icthu capitis mortui sunt, vidi a pylori anulo pendere laciniam quandam membranæ nervæ, lace ram, ut majorem olim fuisse, non dubitares, neque extremitatem adhuc omnino sanam. Sunt etiam aliæ a me in eodem annulo animadvertæ, non pendulæ, sed sessiles quasi verrucæ, ut in Bajulo quem ex tecto delapsam fractis pene omnibus costis alias (z) proponam, itemque in Sene de quo mentionem iniciam (a), cum in Gonorrhæa tractatione vicia attingam Prostata glandulæ. In utroque enim illi infidebant anulo bina subrotunda corpuscula ciceris magnitudine, in primo sublivida, in altero rubentia, substantia in utroque glandulosa. Quin etiam in altero sua singula sub obscure ostendebant foraminula, quæ majora, & luculentiora videre licebat in proximis glandulis lenticularibus. Has enim habebat is homo amplificatas in continuato pylori anulo, per quod duæ tresve ducebantur in longitudinem extantes lineæ ad duo illa subrotunda corpuscula, desinentes: ipsæ autem lineis singulis binæ vel ternæ infidebant glandulæ, intervallo aliquo disjunctæ. Revocant hæc lenticulares ventriculi glandulæ mihi in memoriam Observationem earum aliam, huc maxime attinentem, quippe non in viro habitam in quo nulla, quod scirem, ut in modo memoratis, laborantis ventriculi extitissent indicia, sed qui brevibus quidem, sed acerbissimis, ejus doloribus confectus est.

18. VIRO annos nato ad quadraginta, lacertoso, & gravibus distento cogitationibus, ante dies aliquot coeperat caput dolere, & sensus ardoris esse in mingeando, cum post cenam, in qua neque nimium, nec insalubris quidquam sumperat, sævis est doloribus in regione ventriculi correptus. Dolor capitis persistebat. Dolores ventriculi augebantur. Per alvum, & per os multa viridis materia ejiciebatur. Per hæc, ineunte die tertio decessit circa medium Sextilem A. 1707. Venetiis. VENTRICULI apertæ pars dextera sana erat: in eaque confertissimas lenticulares glandulas cum doctissimis Amicis spectavi ita uti in III. Adversariis (b) scriptum est. Sinistra in fundo multis erat maculis sanguineis, & his vividis, distinctis: quas inter, aliquot fæda ferruginea crustula obduci incipientes, rem ab inflammatione ad gangrenam vergere, ostendebant. Ab eadem parte qua nulla erant maculæ, & sana interior tunica videbatur, nullo negotio sanguinem exprimebam. Duodenum, & reliqua intestina vel interiora spectata nihil morbi habuerunt. Biliæ vesicula duorum, aut trium digitorum intervallo ab infimo fundo se contraherebat, & rursus antequam in meatum deflueret Cysticum, dilatatur sic ut in duas videri posset divisa. Thoracis parietibus omnibus pulmones per se adhærebant, mediastino quoque ad eundem modum annexi; sani tamen; nam quod posterior eorum pars rubebat, eodem pariter colore dorsum, & posteriora brachiorum infecta erant. Neque in corde neque in auriculis quidquam sanguinis. In cæteris, quas, cerebro excepto, inspicimus, partibus nihil adoratione dignum fuit.

19. Nullum

19. Nullum ab hoc Viro in vivendi norma grave peccatum admittum fuerat, ut ab illo cuius ventriculum inflammatum, maculisque nigris oblitum vidit Cl. Koehlerus (c): nulla erat prorsus aut incongrui medicamenti, ut apud Klauingium (d), aut, sicuti non semel in hac Sepulchreti Sectione, veneni seu fraude, seu casu ingesti suspicio. Imo quædam, ut animavertere potuisti, præcesserant quæ sanguinis acrimoniam indicarent. Tamen si quid forte miraris, magis miraberis in muliere, cuius historiam a me tibi alias (e) promissam, jam accipe.

20. PAUPERCULA rusticana femina, annorum, ut videbatur, circiter quinquaginta, obnoxia erat per intervalla difficultati respirationis, cum angustia sensu, & pulsu duro conjuncta, magnaque artierum omnium agitatione, ut harum alternus motus sub oculis cadere in ipsis manibus, non modo in collo, atque temporibus. Ubi respiratio angebat, Nofocomium hoc adibat, missoque multo sanguine, qui erat durissimus, liberabatur. Sic annos quatuor vixerat, cum domi ventriculi doloribus correpta, ibi intra horas viginti quatuor mortua esset.

CADAVER nobis ad Anatomen publice tradendam A. 1737. ante Januarii finem concessum est. Omnia ordine intervalla difficultati respirationis, cum angustia sensu, & pulsu duro conjuncta, magnaque artierum omnium agitatione, ut harum alternus motus sub oculis cadere in ipsis manibus, non modo in collo, atque temporibus. Ubi respiratio angebat, Nofocomium hoc adibat, missoque multo sanguine, qui erat durissimus, liberabatur. Sic annos quatuor vixerat, cum domi ventriculi doloribus correpta, ibi intra horas viginti quatuor mortua esset. CADAVER nobis ad Anatomen publice tradendam A. 1737. ante Januarii finem concessum est. Omnia ordine intervalla difficultati respirationis, cum angustia sensu, & pulsu duro conjuncta, magnaque artierum omnium agitatione, ut harum alternus motus sub oculis cadere in ipsis manibus, non modo in collo, atque temporibus. Ubi respiratio angebat, Nofocomium hoc adibat, missoque multo sanguine, qui erat durissimus, liberabatur. Sic annos quatuor vixerat, cum domi ventriculi doloribus correpta, ibi intra horas viginti quatuor mortua esset. CADAVER nobis ad Anatomen publice tradendam A. 1737. ante Januarii finem concessum est. Omnia ordine intervalla difficultati respirationis, cum angustia sensu, & pulsu duro conjuncta, magnaque artierum omnium agitatione, ut harum alternus motus sub oculis cadere in ipsis manibus, non modo in collo, atque temporibus. Ubi respiratio angebat, Nofocomium hoc adibat, missoque multo sanguine, qui erat durissimus, liberabatur. Sic annos quatuor vixerat, cum domi ventriculi doloribus correpta, ibi intra horas viginti quatuor mortua esset.

in quibus plus sanguinis fuit, quam in venis inferioribus; aliquid polyposi. Cordis parietes a sinistris evidentius crassiores quam par esset, cum a dextris viderentur æquo tenuiores. Nulla tamen ventriculorum, aut venarum, aut arteriarum Pulmonaris dilatatio, aut trunci denique arteriarum Magnæ. Erat quidem in hujus valvulis aliquid subduri, in ipsoque trunco tum prope cor, tum alibi passim initia futura olim in os mutationis, flavo dumtaxat quodam colore indicata, quin etiam dura jam facta paulo supra diaphragma, ubi ampliora erant, & magis extantia: sed iusta erat truncus ubique diametro. Non sic in ramis omnibus hæc se habebat. Nam præter Coronariam illam de qua dictum est, cum arterias Carotides inter se compararem, evidenter major latitudo vixerebat sinistræ, quam dexteræ. Cumque illa, vix seculi quipollis ab origine spatio emenso, in duos, insolito exemplo, divideretur ramos, sub ea divisione aliquanto magis se dilatabat, quam in plerisque arteriæ soleant ad suas partitiones: idemque ad Subclaviæ utriusque divisionem primam in majores ramos animadverti.

Cranio denique circumsecto die a mulieris obitu duodevigesimo, cerebrum non modo sine ulla noxa, sed neque fetens, neque pejus cæteris quæ simul dissectimus, longe recentioribus, inventum est.

21. Habes in crassitudine æquæ majori sinistrorum cordis parietum cause illius partem quæ violentius agitabat arterias, in harum autem nonnullis dilatationibus, pluribusque mutationis in os initis effectus ejusdem agitationis: quæ omnia cum iis conferas quæ alias (f) scripsimus de Spuriis, ut Lancisius vocabat, Aneurysmatibus. Habes præterea quod ad propositum in primis attinet, acerbissimi doloris ventriculi causas in hujus erosionibus. Quarum non ita dissimiles cum brevi post tempore in ebrii quoque, Epistola XIV. (g) descripti ventriculo invenimus: ut illa mitam quæ paulo ante (h) in Veneto illo Viro a me conspecta proposui; animi pendeo, num omnes ingestsis necesse quibus, an succis veneticis imputem intus genitis. Quod etsi in aliqua velim facere historiarum harum, minus in ultima posse videor, in qua via quoque ad ventriculorum, gula, iisdem erosionibus affecta erat. Sed de observatis per anatomen, venenorum in ventriculo effectibus cum ipse malim suo loco semelagere, quam ibi, atque hic, ut in Sepulchreto factum video; propterea illuc (i) rejiciam quæ huc addere superfedeo: ut pari de causa alio differam quæ ad dolorem ventriculi spectant ex consensu cum aliis partibus, & nominatim cum renibus.

22. De iis autem ventriculi doloribus, qui neque a veneno sunt, neque a causis sunt extra illum herentibus, si quæ ad ea, quæ supra legisti, adjungere forte cupis; adjungas in primis, censeo, Observationem Illustris Viri Heisteri (k) quæ cardialgiæ vehementissimam describit a magno acervo lumbricorum illatam, qui ventriculorum circa sinistram orificium, ubi herentes inventi, ita leserant, ut sanguinolentus esset, & quasi erosus: idque in adulta muliere; non in pueris, in quibus minus est mirum, a Boneto, & Saxonia nostro, ut in hac habes Sepulchreti Sectione (l) haud dissimilia fuisse deprehensa. Quamvis autem Sectione eadem complura proponantur exempla (m) doloris ventriculi a calculis in ipso concretis; tamen nova ex Lanzono (n), ex Contulo (o), ex aliis adjicias licet. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXX.

De Vomitu verba sunt.

CUM Ventriculi Dolo, de quo superioribus Litteris scriptum est, sepe numero conjungitur Vomitus, de quo hic scribendum. Animadvertere id poteris cum illas relegens, tum Sectionem VIII. Sepulchreti pervolvens, & cum VII. conferens. Invenies enim Observationes plurimas, in quibus uterque illorum proponitur, nec paucas, quæ in utraque pariter Sectione exhibentur. Nos vero nostrum tuebimur institutum, nec quas alibi aut protulimus, aut sumus prolaturi, earum ullam hic producamus.

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

B

fem-

(c) Considerat. int. alla generaz. de Verm. (d) Vid. Act. Lipl. A. 1704. M. Septembr. (e) Gland. Duod. c. 9. (f) Theatr. Vitor. grad. elar. P. 1. S. 2. (g) Act. N. C. T. 8. Obl. 16. (h) Epist. ad Put. A. 1726. & Epist. al. eund. de Monfr. (i) Opusc. Pathol. Obl. 21. (j) Ibid. Obl. 22. (k) Ibid. Obl. 23. (l) Ibid. Obl. 24. (m) Ibid. Obl. 25. (n) Ibid. Obl. 26. (o) Ibid. Obl. 27. (p) Ibid. Obl. 28. (q) Ibid. Obl. 29. (r) Ibid. Obl. 30. (s) Ibid. Obl. 31. (t) Ibid. Obl. 32. (u) Ibid. Obl. 33. (v) Ibid. Obl. 34. (w) Ibid. Obl. 35. (x) Ibid. Obl. 36. (y) Ibid. Obl. 37. (z) Ibid. Obl. 38. (a) Ibid. Obl. 39. (b) Ibid. Obl. 40. (c) Ibid. Obl. 41. (d) Ibid. Obl. 42. (e) Ibid. Obl. 43. (f) Ibid. Obl. 44. (g) Ibid. Obl. 45. (h) Ibid. Obl. 46. (i) Ibid. Obl. 47. (j) Ibid. Obl. 48. (k) Ibid. Obl. 49. (l) Ibid. Obl. 50. (m) Ibid. Obl. 51. (n) Ibid. Obl. 52. (o) Ibid. Obl. 53. (p) Ibid. Obl. 54. (q) Ibid. Obl. 55. (r) Ibid. Obl. 56. (s) Ibid. Obl. 57. (t) Ibid. Obl. 58. (u) Ibid. Obl. 59. (v) Ibid. Obl. 60. (w) Ibid. Obl. 61. (x) Ibid. Obl. 62. (y) Ibid. Obl. 63. (z) Ibid. Obl. 64. (a) Ibid. Obl. 65. (b) Ibid. Obl. 66. (c) Ibid. Obl. 67. (d) Ibid. Obl. 68. (e) Ibid. Obl. 69. (f) Ibid. Obl. 70. (g) Ibid. Obl. 71. (h) Ibid. Obl. 72. (i) Ibid. Obl. 73. (j) Ibid. Obl. 74. (k) Ibid. Obl. 75. (l) Ibid. Obl. 76. (m) Ibid. Obl. 77. (n) Ibid. Obl. 78. (o) Ibid. Obl. 79. (p) Ibid. Obl. 80. (q) Ibid. Obl. 81. (r) Ibid. Obl. 82. (s) Ibid. Obl. 83. (t) Ibid. Obl. 84. (u) Ibid. Obl. 85. (v) Ibid. Obl. 86. (w) Ibid. Obl. 87. (x) Ibid. Obl. 88. (y) Ibid. Obl. 89. (z) Ibid. Obl. 90. (a) Ibid. Obl. 91. (b) Ibid. Obl. 92. (c) Ibid. Obl. 93. (d) Ibid. Obl. 94. (e) Ibid. Obl. 95. (f) Ibid. Obl. 96. (g) Ibid. Obl. 97. (h) Ibid. Obl. 98. (i) Ibid. Obl. 99. (j) Ibid. Obl. 100.

(c) Commenc. Litter. A. 1743. Hebd. 3. n. 2. (d) Eph. N. C. Cent. 3. & 4. Obl. 145. (e) Epist. 14. n. 35. (f) Epist. 24. n. 35. & seqq. (g) n. 34. (h) n. 18. (i) Epist. 59. n. præsertim 21. (k) Eph. N. C. Cent. 5. Obl. 86. (l) Obl. 14. (m) Obl. 29. 31. & 32. (n) Act. N. C. T. 1. Obl. 64. (o) De Lapidibus, Postraga & cæc. c. 9.

semper, deieciatur. Interea vixillus in ventriculi regione percipiebatur dolor. Sed cum Medicus salabrinthii dedisset, eas stomacho molestias creavit, ut nunquam postea datum sit. Tandem faviente vomitu cum ejusdem materiae excretionem, languidis sensum factis pulsibus confecta mors est Idibus Novembris. CADAVERIS omnes articuli flexiles erant: quod in aliis haud ita crebro occurrit. In ventriculo pylorum versus, tumor erat cancrifolius exulceratus, hicque fieri visus est ex glandularum congerie, quae pressa, humorem promebant similem humani feminis. Ventriculus autem tres libras materiae continebat ejusdem ferme naturae ac quae vomitu ejiciebatur. Inter ventriculum, & lienem erant duo glandulosa corpuscula fabae magnitudine, colore, & substantia non multum ab similia tumori qui in ventriculo descriptus est, haec in Ventre. In Thorace autem pulmo dexter nonnihil a tergo inflammatus: ex omni autem utriusque incisus pulmonis parte serum prodibat. A cordis ventriculo dextero polyposa concretionem in Pulmonarem arteriam pertinebat; minor ab sinistro in venam ejusdem nominis.

3. Si compares inter se tumores ventriculi duos, hunc, & quem pariter ex Valsalva descriptum Epistola superiore (a), quorum utrumque in brevibus suarum Observationum Indicibus cancri nomine designavit, & conjunctum vomitum habuisse, scripsit, quasi aquae fuligine infecta; miraberis fortasse, cur saevos ille, hic levis adeo asseret dolores, & cur hic cum pressus humorem daret non fuliginosum; hoc tamen colore tantam humoris copiam tingeret. Verum nigerrima reiji ab iis quoque in quibus nullus hujus generis tumor est, tum ex alijs Observationibus, tum ex aliqua earum intelligens quae infra proferuntur; ut minime necesse sit, illiusmodi colores a cancri deducere, in ventriculo exulceratis. Discrimen autem illud dolorum nisi ab humoribus repetas in primo agro magis, quippe seniore, & bilioso temperamento, quam in hoc, irritantibus, qui tamen, addito sale ablinthii, lacescentes adeo facti sunt; conjicies, leves dolores non secus atque in illo, primum quidem fuisse, verum postea quam per sal ablinthii sic irritatus tumor est, ut demum exulceraretur, multo acerbiores & factos esse, & ad finem usque perstitisse.

4. VIR nobilissimus annos natus duos & quadraginta, cum ex Germania in Italiam venisset, paucis post mensibus Bononiae in febrem incidit tertianam duplicem, mitioribus, in primis quidem accessionibus, stipatam symptomatibus; sed in quarta vehementissime affligentem. Nam frigus quod vigesima hora invalerat, vixertia noctis hora remittebat: molestissima erat sitis, lingua aspera, difficilis respiratio, lassitudo, pulsus parvus, ac debilis, dolor, & plenitudinis sensus in ventriculo, anxietas denique, & inquietudo tanta, vix ut paulisper in eadem lecti parte consisteret. Haec omnia non nisi postquam, magis faviente calore, stillatarum aquarum potio tandem concessa est, mitiora sunt facta; sed paulo dumtaxat, & breve ad tempus. Nam paulo post omnia, magis exacerbata, totam illam noctem vexarunt. Diluculo vomitum instare, sensit; nec tamen vel digitis saepius sibi in fauces immisis vomitionem primum ciere poterat; mox tamen materiam ejecit ad libras quatuor, colore aquae similem in qua coccolata soluta sit. Innatabant quaedam quasi membranarum portiones ejusdem prorsus coloris: odor autem erat qualem saepe solent febricitantium corpora exhalare. Ab hoc vomitu etiam ventriculi affectio paululum remissa videbatur; reliqua tamen non modo perstabant, sed vel acrius torquebantur incommoda. Mane secta vena sanguinem Medicus detraxit; is in primo vasculo concrementum aequo mollius, tenuem in summo crustam, lacteam serum ostendit, sed in altero minus ea omnia ab naturae norma recedentia. Hoc, aliisque praesidiis in usum tractis, iterum paucas post horas tantundem ferme ejectum per vomitum est descripta materia: quod paulo post iterum, iterumque accidit; ut quae eo die sic reddita sunt, sexdecim circiter libras aequaverint universa. Infecuta nocte eadem saeviebant symptomata, accedente insuper sinistro brachii tremore; qui, praecedente delirio, saepius recurrens, praesertim dum aeri brachium exponeretur: mane in paroxysmum quasi epilepticum degeneravit, quo non brachium modo, sed & os, oculi, femur quoque sinistram immanissime convellebantur. Haec longo horarum spatio perduravit: tandem paralyticis illud corripuit brachium. Redire nihilominus pergebant epileptici insultus tam crebro, ut intra horam plus viginti numerarentur. Inter-

ea crebriores quoque erant vomitiones, & materiae quidem porracei coloris, in qua fragmenta quasi membranarum innatabant. Singultus insuper, qui post memoratam paralyticam circa meridiem inceperat, jam vehementius torquebat. Et licet omnia nonnihil a prandio sedata viderentur, tamen cum advesperasceret, graviora fiebant; ut pulsus, & viribus magis magisque tota nocte fatiscens, cum aeger nunc modicis vomitionibus, nunc delirio, & singultu, saepius autem diris, quamvis brevioribus, spasmodicis insultibus vexaretur, mane duodecima hora deficeret. ABDOMEN erat tumidum, ut intestina quoque. Haec, & ventriculus qua facie anteriora spectabant, eodem illo erant colore infecta quo materiam diximus fuisse quae vomitu ejiciebatur. Ventriculus intus inflammatus, minimis quibusque vasculis multum sanguine turgentibus. Bilis vesicula etiam inanis erat, turgida tamen, aere videlicet, conspiciebatur. In Thorace pulmo dexter arte adhaerebat ad pleuram: ispeque, & sinister nigro erat colore tincti, & ichorosa materia plena. In dextero cordis ventriculo tenuis polyposa concretio fuit.

5. Exitum quod indicaverat quarta, huic Viro dies attulit septima. Quod si priusquam tanta vis morbi ventriculo incubuisset, ex indicibus quibusdam priorum dierum quid immineret suspicatus Medicus, quicumque is fuit, maturo atque apto corticis Peruviani usu occurrere potuisset; fortasse agrotantem servasset. Verum contingere haec, quantum ex superiore etiam Observatione conjicio, eo tempore quo necdum febrifugo cortice uti audebant ratione illa qua nunc consuevimus, & quaprimus Bononiae annis post paucis feliciter usus est ingeniosissimus Medicus Dominicus Gulielmus in generosissimo Viro ex Gente Malvezia, quem proxima alioquin exacerbatio perniciose febris, ut alijs acciderat, interemisset. Ceterum unde porracea tinctura esset qua rejectus humor inficiebatur, inanis vesicula fellea ostendit. Sed alii in ventriculo, & intestinis succi cum bile convenerunt etiam antea, cum longe alio colore tincta rejiciebantur. Utro autem horum colorum ea viscera tincta essent, cum satis Valsalva suis in schedis non aperuerit; nec mihi diserte in historia licuit indicare.

6. Jam vero accipe historias alias, in duo pariter genera divisa, vomitionum aut ad diurnas, aut ad breves attinentium. Ex illis autem prima esto quae exemplum profert vomitus quo diuturniores non multi reperiuntur; eademque est quam tibi, cum de Palpitatione Cordis scriberem (b) a me peculiariter promissam memin.

7. NOBILIS Matrona Patavina, quae ab ortu usque saepe adeo lac rejiciebat, ut nutritrix victuram desperaret, adulta nihilominus, nupta, & jam plurimum liberorum parens, cum quantum annum ageret & trigessimum, coepit in puerperio saepius vomitu laborare, a quo duobus post mensibus se liberam fore in postremum, credidit, cum globum rejectisset quandam, diametro duos pollices superantem, materiae tunc mollioris, sed quae mox aeri exposita, durissima post triduum inventa est. Verum spei non respondit eventus. Vomitus perstitit, & quamvis a pluribus Medicis diu, multumque modo leniter, alias vehementius oppugnata; ad mortem usque, id est viginti quatuor ipsos annos perduravit. Redibat quotidie duabus a prandio horis. A cena non redibat, nisi postmodum mane. Et licet alimenti genera mutarentur; semper recurrebat ad eundem modum, materiamque semper ejiciebat subalbam crassam, ductilem. Quam si mulier conaretur retinere; magnas in ventriculi regione patiebatur molestias donec redderet; reddebat autem non sine conatibus; sed a vomitu omnia sedabantur. Alvus nihil, nisi sollicitata, egebat: quod jam diu uno, sine agra noxa, obtineri poterat remedio, pilulis, ut Venetis vocant, S. Fuscæ, quarum perpaucas, nocte retenta, mane leniter, ut solent, alvum solvebant, sed nihil fere praeter aquosa deicientem. Coccolata quoque retinebatur, & ventriculus juvabat. Hujus regionem si manu explorares, nihil ibi, ut neque in reliquo ventre, percipiebas quod esset praeter naturam. Ad ea quae narravimus, accesserat biennio ante obitum pulsus intermissio, Matrona tamen solita vitae munia domi forisque obire non destitit, donec minus bene se habere, sentiens, & debiliior facta, novissimum vitam mensem in lecto exigere coacta est. Ibi cum omnia, & in his coccolata quoque, nauseosa jam essent, febris animadversa est quae horis pomeridianis quotidie, vix aliqua tamen pulsus facta mutatione, increfcebat, nocteque calorem augebat. Pulsus erat potius ma-

gnus,

gnus, sed, ut solebat, intermittens. Cum propter alvi duritiam Medicum exorasset, ne obstaret sibi consuetis pilulis uti cupienti; immanis oborta est cordis palpitatione: quae etsi paucis unciis sanguinis e brachio palpatibus, ferme statim sedata est; mox tamen iterum ingravescens totidem e pede coegit detrahare, unde rursus imminuta est, non sic tamen, ut postea in finistram latum cubare fineret. Nulla misso sanguini crusta infidebat. Dies post aliquot, duritia alvi rursus urgente, leue clystma palpitationem incitavit. Cum adversus hanc externa remedia nihil prodesse, interna autem ab agra quae alimenta vix aliqua, & invita fumeret, pauca omnino admitterentur, in quibus stillata ceraforum, aut melissa aqua, & compositionum castoreum habentium nonnihil, quibus semel opii granum ad junctum est, nec quidquam esset quod aut vomitum averteret, aut palpitationem sedaret; postremis quinque diebus pulsus infirmissimo, perexili, & formicante tacto, palpitationem autem peristente, alvus sponte soluta est vel nimium; ut saepe, & multa, etiam dura, ejiceret. Itaque perstantibus ceteris, & paulatim extremis corporis frige centibus, vivendi finem fecit Matrona optima, & ob id etiam vita multo longiori digna, quod mandavit moriens, id quod perpaucas mulieres facerent; ut diuturni sui vomitus causa per anatomen quaeretur, si forte illa inventa, auxilium ferri posset filiis, in quibus erat quae jam vomitionibus tentari inciperet, adversus hereditarium morbum; eodem enim quo ipsa vomendi incommodo, mater quoque, jam ante plures annos extincta, laboraverat. Itaque cum a me petisset Nobilissimae Familiae nomine Collega meus Ornatisissimus Valsalvianus filius, ut dissectioni praesse vellem, cumque a Medico Spectatissimo qui annos postremos duodecim, mitti, ut decebat, curationis generosae Matronae affuerat, Petro de Marchettis, Petri Equitis nepote, ea omnia quae haecenus scripta sunt, accepissem; coram ipso, aliisque Medicis, in quibus Cl. Vir fuit, auditor olim meus, Dominicus Militia, dissectionem accurate instituendam curavi sub noctem ejus diei, quo die mane agra decesserat, VI. Idus Aprilis A. 1744. CADAVER macilentum erat, nec tamen plurimum, & sine artuum oedemate.

Venter aquam habuit sublavam non paucam: omentum pauca pinguedine instructum, magnam intestinorum partem obtegens, annexumque ad peritonaeum latere finistro: ventriculo contractum, & ubi accedere incipiebat ad pylori antrum, ibi contractum magis, ut in duos quadrantibus esset divisus, parietibus & colore, si exterius aspiceres, secundum naturam; sed facie interiore quasi ab inflammatione rubentem. Inerat pars aquae, an junculi novissime sumpti, cum quibusdam crassioribus portionibus viscidae illius materiae quae vomitu ejici consueverat. In pyloro ipso, & Duodeno intestino nihil morbidum praeter internae faciei colorem, ejus similem qui in ventriculo dictus est. Pancreas juxta alioquin magnitudine, quantum quantum erat, adeo candidum fuit, lobulis autem, cum diffecari jussissem, distinctis adeo, & exsuccis, ut si aliquanto duriores fuissent; erant enim duriusculi; non modo ad scirrhi naturam accedere, sed in scirrhum jam prorsus conversum pancreas esse, pronuntiasset. Lien, & jecur interius sana, etsi ille exteriori tota facie, hoc interiore a dextris pallescent. Sed sellis vesicula parietibus cunctis tam crassus erat, ut nunquam sic visidisse meminim: itaque etsi bile erat plena, quippe in ea quae tot dies tam pauca sumpsisset, eaque bilis nigra erat adeo, ut interiore vesiculae faciem atro colore infecisset; facies tamen ejusdem exterior albicabat. Ob illam quam modo attigi causam, ut ventriculus fuerat, sic intestina omnia, & Tenuia praesertim, valde erant contracta, ut ea etiam quae nuperrime praecesserat, nimia alvi evacuatione requirebat. Una ex omnibus intestinis Appendicula Vermiformis paulo erat turgidior: eademque exterius rubebat. In mesenterio, & reliquis Ventris Partibus nihil non secundum naturam animadvertimus.

In Thorace autem utrinque erat aqua, nec pauca, nec parum sanguinolenta. Utrinque pariter pulmones, alioquin sani, per crebra, crassa, longiuscula membranacea filamenta ad latera alligabantur. Pericardium arctissime adhaerebat omni cordis superficiei, & auriculae dexterae, & magnorum vasorum ad cor pertinentium. Cor tamen juxta fuit tum parietum crassitudine, tum capacitate ventriculorum. Quorum uterque plenus erat pariter sanguinis, qualis ex in-

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

cisa quoque vena Cava multus extitit, attri, & magna ex parte in grumos coacti, sine ulla vel minima polyposa concretionem. Valvulae quae cordis orificiis venosis praeficiuntur, etsi albicare visae sunt; non duriores tamen fuerunt. Ex reliquis autem ea quae ad initium appositae sunt Arteriae Aortae, summos limbos & crassiores, & cartilaginea duritia habuerunt. Arteria ipsa bene intus, extraque constituta: neque ulla omnino praeter ea quae dicta sunt, in Thorace vitia apparuerunt. Caput cur attingeremus, causa nihil fuit.

8. Quae vitia in pericardio, & corde reperta sunt, quatenus ad palpitationem, & intermittentem pulsus attineant, alijs a me locis (c) est indicatum. Quae vero in sellis vesicula, & pancreate, illa ad vomitum spectare, existimo. Crederem fortasse illam etiam ventriculi contractionem, per quam in duos quadrantibus videbatur divisus; nisi eandem tibi structuram in duabus alijs mulieribus (d) descripsissem, quarum neutra vomitioni obnoxia fuerat, ut neque Foemina Princeps, neque alia praeterea (e) in quibus ita se ventriculus habuisse, memini. Mihi enim forte accidit, ut conformationem istam cum vidi, in mulieribus, sicuti & Valsalva (f), viderem: unde suspicari coepissem, an haec quoque annumeranda esset detrimentis ceteris quae sibi illa creant per contractos ad summum ventris thoraces duos, & quae duriora his addunt ad umbilicum ferme producta; nisi animadvertissem, in cujusquomodi fortis foeminae illam fuisse, nec in foeminae solum, sed & in viris ab Riolo (g), & a Celeberrimis Auditoribus Heistero (h), & Fantono (i) esse deprehensam. Horum autem nemo, ut neque Cl. Viri Perschius (k), & Amyandus (l) qui in foemina videbunt, ullam cum possent, & aliqui, si ita accidisset, etiam deberent, ullam, inquam, de vomitu in iis viris, foeminae mentionem injiciunt. Quod si in VIII. hac Sepulchreti Sectione Observationem (m) invenies Blasii, qui ventriculum duplicem offendit in viro, creberrimis vomitionibus diu vexato, has illum videbis non ab ea duplicitate, sed a magna angustia repetere ejus foraminis per quod alter ventriculus cum altero communicabat: cujusmodi angustia in iis quas ego observavi, nunquam fuit. Quid? quod si Observationem illam apud Blasium (n) legas; conjunctam cum altera animadvertes ejusdem generis, in qua etsi angustia inter ventriculum utrumque non modo magna, sed maxima, & summa fuit, homo tamen, nisi quod valde famelicus, erat bene sanus, & quod consequitur, vomitionibus haud obnoxius. Quod si nihilominus in propolita Matrona istam ventriculi structuram ipsam quoque aliquid ad vomendum fecisse, malueris, quippe a primordiis facile junctam cum prava illa vesicula, & pancreatis dispositione, quae, crescente aetate, manifestior facta vomitum induxerit insanabilem; non pertinaciter repugnabo. Certe autem crassitudo tanta in vesiculae tunicis minus obsequentem hanc reddebat ventriculi, primumque intestinorum pressioni, ut fortasse non satis ex ea bilis, quae erat insuper adeo visida, exprimeretur. Pancreas vero exsuccum, & ad scirrhi naturam vergens, quanto minus succi, minusque ad suos usus apti fecerneret, facile potes existimare, simulque colligere, quam imperfecta ob utriusque illius humoris defectum, ac vitium in Duodeno intestino fieret chyli elaboratio, quantumque ibi restitaret crassi, viscidique, & ejus intestini tunicas in diurnis praesertim corporis agitationibus sic irritantis, ut in motum denique inversum ciceret. Quo si tibi liceat addere structuram illam ventriculi minus fortasse idoneam ad alimenta, si non conficienda, at satis expedite in id intestinum compellenda; tanto erit proclivius causas intelligere vomitus istius tam diuturni.

9. Verum ut de una earum dumtaxat, id est de pancreatis vitio, brevitate gratia, verba faciamus, videbis hic in Sepulchreto non modo Observationem LIII. & quae sequuntur, sed alias etiam cum supra, tum praesertim infra sub num. LVII. (o) & LVIII. (p) aliisque indicatas; & cum pancreatis vitiiis conjunctum vomitum reperies. Equidem ex iis non sum qui nescio quos non morbos, & vomitus vel sanguinis, a solo pancreate deducendos arbitrabantur (q); imo hoc viscus, nec raro, sine vomitu male affectum fateor a me, ab aliisque deprehensum. Eiusdem tamen morbos a vomitionibus non sejunctos & me confexisse, & ab alijs saepe confectos audivisse, negare non

B 2

non

(a) n. 6. (b) Epist. 23. n. 21. in fin.

(c) Epist. 23. n. 21. & 23. & alibi. (d) Epist. 26. n. 38. & Epist. 26. n. 31. (e) Epist. 27. n. 28. (f) Epist. 36. n. 2.
(g) Anthropol. 1. 2. c. 20. (h) Diff. sist. Obs. Med. Miscell. Obs. 6. (i) De Obs. Med. & Anat. Epist. 3.
(k) Syllab. Anat. Obs. §. 84. (l) Vid. Commere. Litter. A. 1734. Hebd. 25. in fin. (m) n. 26. (n) P. 4. Obs. Med. 9.
(o) §. 5. 7. (p) §. 2. 4. (q) Vid. Ibid. Obs. 74. in fin.

non possum. Sed meis quidem Observationibus erit alibi opportunior locus. Hic vero nonnullas aliorum commemorabo. Et primum accepi a Malpighii Affecta, Praeceptore meo, docto, cum viveret, Bononia Medico, Jacobo Sandrio, plures sibi adnotatas esse dissectiones eorum qui vomitionibus obnoxii fuerant, humoris praesertim colore *tabacum* referentis; in iis autem omnibus male pancreas habuisse. Heraclitus autem Manfredius, is quem tibi alias merito laudavi, cum ex Patria in quam ad menses aliquot fecerant, Bononiam rediisset anno, opinor, 1704. hanc suam mihi narravit Observationem: quam hic tecum magis quia ad susceptionem de pancreate sermonem, quam ad ordinem promissum attinet, communicabo.

10. VIR robustus, nulla manifesta causa praecedente, conatu vomendi assiduo angebatur, sed praeter remedia, & alimenta, quorum retinere nullum poterat, pauca, & raro, & haec aequa, ac fere amara evomebat. Ad haec, torquebatur magna siti, crebris quibusdam animi defectionibus, & dolore praesertim non secus ac si a canibus discerneretur, ad communes fines thoracis, & ventris: quem si tangeres, duri, aut renitentis percipere nihil posses. Cum his, humilique pulsu, intra undecimum circiter diem est mortuus.

VENTRE aperto, jecur maximum conspectum est, sed sanum. Sana quoque intestina, & ventriculus. Et mesenterium quidem non sine aliqua obstructione. Sed pancreas aequo majus, totumque & tuberculis subrotundis, neque exiguis, inaequale, & duritie ad cartilagineam accedente.

In Thorace multum, in pericardio autem plurimum aquae, ejus similis in qua caro recens lota est. Cor valde parvum: in ejusque auricula dextera quidpiam albitantis polyposae concretionis.

11. Cur tumores pancreatis, nisi forte & ipsi maximi sint, & aegri valde macilenti, difficillime tactu percipi queant, retrusa visceris sedes facit, & quidquid manui se interponit, praesertim vero turgens flatibus ventriculus, aut jecur, ut in hoc viro, ampla, & dilatata magnitudine. Quam difficultate quibus aliis signis uti liceat, cum indicaret Riverius (r), in iis petenda a proximi ventriculi dolore, aliisque symptomatibus non omisit. Ceterum pancreas multifariam potest vomitum concitare, ut cum ventriculum continguum, qui sensu praesertim sit exquisitior, duritie, aut asperitate irritat sua, aut adaucta etiam magnitudine obstat, ne satis possit dilatari. Assumptorum enim omnium vomitus impeditur ventriculi dilatationem consequitur, si ipse dilatari se, non patitur, quippe crassius scirrhusque factis ejus tunicis, ut in Cel. Virorum Observationibus Laubii (f), & Halleri (g): five; nam perinde se res habet, opposita sint obstacula ejus dilatationi, velut ingentia steatomata, quae juxta ventriculum confixit Cl. Verdrius (u), aut maximum illud corpus, quod ibi pariter in duabus feminis inventum, descriptum leges apud Praestantissimum Heisterum (x). Obstatula autem esse posse etiam ipsa ventriculo contigua viscera, si praeter nodum tumida, & dura fiant, annis superioribus comprobavit immaturus interitus doctissimi, amicissimi Archiatri, cujus insanabilem vomitum fuisse, accepimus, ab jecinore, & pancreate, quae sua & mole, & duritie interceptum ventriculum comprimebant. Sed pancreas; ut de eo potissimum loqui pergamus, praesertim cum facile adeo sit quae de eo dicuntur, ad jecur quoque transferre; tunc etiam provocare vomitum potest, cum cum seernit succum qui aut acrimonia molestus sit Duodeno intestino, aut inertia, aliove quopiam vitio faciat, ut in eo intestino male absoluta alimentorum confectio relinquatur ibi quae sint incommoda, aut denique paucitate impar sit ceteris visibus, & in his illi quo fellis simul influentis, praesertim acrioris, vim temperat, ne acius afficiat eas tunicas, motumque invertat: qua de re consulere etiam poteris Frid. Hoffmannum (y), censentem, istam ipsam fuisse causam, cur uno eodemque osculo & bilis, & pancreaticus succus intestinum illud adire soleant, & cur Brunneri canes, dempto pancreate, vomitibus biliosis finem vivendi fecerint. Itaque ubi humanum pancreas eo redactum sit, ut nihil prorsus humoris separet; quanto facilius sequi illa possint quae diximus, praecare vides. Sed & aliter induci a pancreate vomitio potest, ut si memoratum intestinum, ad quod latiori extremo se pancreas affigit, sua asperitate & duritie, aut aucta magnitudine ad eundem modum irriter, aut premat ad quem

de ventriculo indicatum est. Secundum haec, aut alia ejusmodi, licebit tibi pleraque omnes, huc attinentes, historias explicare, multoque illas magis, quae simul pancreatis, simul Duodeni intestini vitium conjunctum habeant, velut hanc quam continuo subijciam ab exercitissimo Professore Mediavia nostro sub initium Octobris habitam A. 1733. & mecum ab eo usque tempore communicatam.

12. MONACHUM, genere, & moribus nobilem ex sacra Capuccinorum, ut vocant, Familia, multiplex morbus, hydrops praesertim, vomitusque confecerant annum agentem trigelimum tertium. CADAVERIS universae cuti aquae aliquid suberat; itaque & pedes cedemate tumebant aliquantum. Venter autem nec valde tumebat, nec plus aquae intus habuit, quam libras circiter duas. Jecur, & lien aequo majora: illud praeterea subalbum, lobulis conspicuis, durum. In ventriculo nihil adnotatione dignum fuit, si plexum excipias digitos latum ad duos, longum ad quatuor, ex glandulis confertissimis, lente quidem minoribus, sed manifesto osculo praeditis: si plexus erat in ventriculi fundo prope antrum pylori. Digni autem intervallo infra pylorum Duodenum intestinum nigricabat, & paulo inferius scirrhus erat. Pancreas quoque durius fuit. In Thoracis utroque cavo aqua non pauca. Pulmones contracti. Cor non sine concretionibus polyposis: & ejus valvularum aliqua non sine ossa portione. Ossis autem olim futuri initia in facie interiore apparebant arteriae Magnae ab ramis superioribus usque ad Emulgentes. Ea arteria, in procerio alioquin corpore, vix digitum crassitudine superabat: erantque caetera sanguifera vasa ipsa quoque proportione angustiora.

13. Ut haec vasorum, in ejusmodi praesertim corpore, magna angustia initium fortasse fuerat morborum omnium, ita pancreatis, magisque Duodeni intestini duritiam vomitionum fuisse causam, non dubito. Sive enim id intestinum a compressione stringatur, ut olim animadvertit Riolanus, quem hic in Sepulchreto laudatum videbis (z), five ob scirrhus tunicas se minime possit confringere, oppositas hasce causas idem effectus sequitur, ut illapsum ex ventriculo cum minus facile aut excipiantur, aut ulterius promoveantur, nempe in ventriculo resistent pleraque, ibique corrupta, aut mora ipsa gravia, & molesta impellant ad vomitum: cujus rei luculentum exemplum etiam protulit Cl. Molinellius (a). Idem contingat, necesse est, cum pylorus vitii afficitur ejusdemmodi. Plurima autem hic in Sepulchreto habes exempla, ut Observatione XI. & XVII. & plerisque aliis insequentibus ferme usque ad XXVI. & rursum in LVI. §. 13. in Additamentis autem Observatione I. & VIII. quin etiam alibi, ut libro I. Sect. IX. Observatione non solum XXXIV. sed insuper, si *subversiones* illas attendas, XXXIII. Inter illas autem quae Sectione VIII. hac leges, cum ad Observationem perveneris XXI. non ita dissimilem alterius quae a Joanne Bohmio (b) est, in illaque vomitionem ciborum omnium, & mortem denique intra decimum diem consecutas invenies pylori occlusionem a nummo devorato exiguo argenteo; venit procul dubio in mentem nummi illius argentei tanto majoris quem solers Chirurgus *du Luc* (c) inde, atque adeo extra corpus cum aliis auxiliis, tum hydrargyri praesertim & pondere urgentis, & *amalgamatione*, ut Chymici loquuntur, immittentis feliciter deturbavit, cum jam laevi ad pylorum dolores inceperant cum vomendi voluntate. Sed ne longius ab iis pylori impedimentis quae non casus, sed morbus facit, abeamus; praeter Observationes illas quas in Sepulchreto indicavimus, aliae sunt, nec paucae, quas adjicias, ut quae in Voluminibus extant *Cæsareae Academiae* (d), in *Adis Eruditorum Lipsiensibus* (e), in *Commercio Litterario* (f), & siquae praeterea aliae sunt inter multas ab Eruditissimo Trillero commemoratas (g). Ex quibus omnibus Observationibus reperies aliquot simul ea confirmantes quae paulo ante attigimus cum de Pancreate, & Duodeno intestino diceremus, & nonnullas etiam ad Epistolas nuper ad te missas attinentes. Hujus generis sunt duae quoque Cl. Fantoni (h) hic nequitiam praetermittenda. Nec denique nobis desunt, quamvis non ita mirabiles, ut ejus secunda est, quaedam aliae: quarum unam cum Epistola superiore scripserimus (i), non hic iterabimur: alteram autem, quam in Episcopo Brixianum habuimus, ad eas dif-

differimus quae spectant ad Ventris Tumores (k): tertiam, nobiscum ab laudato alibi Mariano communicatam, in qua calculi, & callus arte adeo pylorum obturabant, ut ne a mercurio quidem pervadi potuerit, cum abolutam acceperimus, ad te mittimus. Una est quae non incommode proferri hic possit, Bononiae habitam A. 1703. sub initium Decembris, consulto autem ad hunc locum servata, cum alio etiam ex parte aliqua convenisset, ut ex pulsum obscuritate intelliges conjuncta cum summa fibrarum cordis laxitate.

14. SACERDOTI ex Inclito Ordine S. Augustini, cujus nomen inter Sacros Oratores, non erat obscurum, aliquot annos nato supra quadraginta, post studia, itinera, labores alios coeperat non ita multis ante mensibus tensio quaedam percipi ad dexterum hypochondrium. Accessit deinde frequens vomitus quarta a sumpto cibo hora. Alia deinceps addita sunt. Novissimis denique morbi hebdomadis ita res se habebant. In ventre magna durities, in dextero autem hypochondrio maxima; sed nullus, si premeres, dolor qui contra per se oriebatur, & acerbis quidem, in altero hypochondrio hora confectionis ciborum. Rejeciebatur humor aliquando colore infectus quasi *tabacum*, alias multo magis fusco, atque atro, alias vario, & maxima ex parte ab his diversis: nec deerant qui dicerent, se non mucosa tantum, ut alii, sed & quaedam quasi ramenta membranularum in eo humore animadvertisse. Hi ob hanc etiam causam ab resina terebinthina non esse temere discendum, aiebant, quae una ab stomacho retinebatur, cum remedia caetera rejicerentur. Pilulas autem improbabant, aloem, gummi ammoniacum, & tartarum, ut vocant, vitriolatum habentes, quas alter Medicus proponebat, aeger autem in dejectionibus, ut plerique solent, magnam spem ponens, praeprobat. His igitur sumptis, immanes secutae sunt vomitiones, atque inde ex malis res fieri multo deteriores coeperunt. Nam pulsus obscurus antea, & obscurissimus factus, febris lipyriae similis: urinae velut ietericoe. Itaque intra paucos dies, pedibus cedemate nonnulli tumebant, pulsu jam nullo, sine gravi spirandi difficultate, ullave mentis perturbatione, aeger vivendi finem fecit. ABDOMINE diducto, jecur longe maximum inventum est, steatomatibus plenum, & substantia his interjecta, thymi excocti instar, alba, & lobulosa, sed dura. In fellis vesicula cum livida bile novem calculi, alii alia forma, qui omnes primum ad viridem colorem vergentes, postquam ficcati sunt, flavesciebant. Lien perpulillus, ut nummi argentei quem scutum vocant, magnitudinem non superaret. Pancreas extenuatum adeo, ut deesse a primo videretur. Ventriculus intus fuit nigris maculis distinctus: flaccidus alibi, sed in pyloro callosus, ut cedere opportune, & satis dilatari non posset. Thoracis quoque viscera flaccida, & laxa; ut cordis caro, si distraheres, facillime sequeretur. Praeter haec, nihil animadvertum est morbidum; ut ne humoris quidem esset in thorace, aut ventre effusi quidquam.

15. Sive lien a primordiis usque, ut credibilis fortasse est, huic Sacerdoti exiguis obtigit, sive per Hepaticam arteriam averfus a Splenica in amplificatum jecur sanguinis cursus lieni simul, & pancreati extenuationem attulit, five hanc demum magis magisque praeter omnem modum adaucta hepatis moles, durities, pondus induxerunt; vides utique, nec satis auxiliis ad bilis secretionem ab ejusmodi liene hepar, neque fatis succi ad bilem contemperandam a tali pancreate Duodenum intestinum habere potuisse. Mutata igitur cum ob eam causam, tum magis ob jecinoris vitia, bilis natura, quod vel hujus color, & concretus in vesicula calculi ostenderunt, & quod consequitur, mutato chylis, & sanguine, & secretis ab hoc tum alibi, tum in ventriculo, intestinis, pancreate humoribus, minime difficile est eorum perspicere originem, quae homini acciderunt, praesertim vero tanta illius quae in rejectis apparuit, colorum varietatis. Ex humoribus enim ab natura modo recedentibus non mirum est, si colores praeter naturam existant, ut neque ex varia, quippe in ejusmodi morbis, & conatibus, eorum tum omnium, tum singulorum secretionem, mixtura, mora, si modo hi, modo illi magis colores exoriantur. Mirum est potius, siquando in iis qui nullum pravatum istiusmodi se-

cretionum indicium dedere, vomitus repente fiat succi alicujus, eo infecti colore quem minime expectares. Cuius generis Observatio est quam A. 1718. ad me scripsit idem quem supra (l) nominavi, Doctissimus Vir Manfredius. Ea vero ad breves attinet vomitus, ut continuo perspicies.

16. FABER ferrarius mane domo egreditur cum perlevi stomachi dolore. Quo postea gravissimo facto, homo ex ore ejicere humorem incipiens atramenti similimum, ante vespere moritur. VENTRIS CULUS aequae atrum, inodorum, grumofumque humorem continebat ad libras duas. Intestini Duodeni interior facies pene tota, ventriculi autem tota eodem colore infecta erat. Extima quoque hujus tunica in ea facie qua respicit diaphragma, nigerrimam habebat maculam, digitos quatuor amplam quoquoque versum: mirumque erat, intermedias tunicas non alio usquam colore quam *tabacum*, tinctas esse vel qua illi suberant maculae, ut ibi non nigrae ipsae, nigerrimo tamen utrinque colore interciperentur.

17. Macula haec gangranosa fortasse fuit. Nigredinem autem internam ventriculi, & Duodeni intestini negangranosam tantummodo credam, humor facit, qui sic tingere per se poterat, in ventriculo repertus, & ex parte ejectus, atramenti similissimus. Quem si bitem atram fuisse, putes; miraberis paulo minus hominis mortem, cum Hippocratici aphorismi (m) meminisses, hanc illi praenunciantis, cui *protinus in recenti morbo, bilis atra vel infra, vel supra se ostendit*, ut Celsi (n) versione utamur. Sed undenam tanta ista nigredo? An ab effusa in illud intestinum bile quae per se esset nigerrima? Videre enim potes in Cl. Virorum Budai (o), & Schoberi (p) Observationibus fellis vesiculam magnam, eadem illa materia nigricante turgidam quam aegri vomitu ejiciebant. An bilis cum antea esset subnigra, ab admittis in eo intestino certis quibusdam aliis humoribus, tanto nigrior facta est? An atrum aliquid etiam a sanguine accessit, ex erosio in gravissimo illo dolore vasculis effluente? Cave enim credas, eum omnem humorem sanguinem fuisse. Nam neque cadere istiusmodi hallucinatio potest in solertem adeo, ac peritum Observatorem: neque ea demum fuisset effusi sanguinis copia, quae tam cito posset ejusmodi virum interimere. Sane etiam Hoffmannus (q) juvenem describens a nigris vomitibus, & dejectionibus mortuum, est in ventriculo disrupta apparuerunt sanguifera vasa, non tamen a sanguinis effusione, quippe quae vel major tam cito non occidat, sed a sanguinis putredine, cerebrum inficiente, mortem deduxit: secuta autem haec erat non, ut in nostro, intra paucas, sed intra viginti quatuor horas, neque inodora, sed intolerabili foetore tum ejecta, tum in ventriculo reperta materia fuerat. Nec Matrona Budai, nec Mercator Schoberi, quamvis multo citius hic, quam illa, interiit, celeri adeo ac is de quo loquor, Faber, letho abrepti sunt, & tamen corrupta, & foetida ejecerant, eaque copia ut sanguinis parum in valis restaret. Sed qualis, dum viverent, hic fuisset, tum praegressa, tum internae in mortuis gangraenae, aliaque ostenderunt. De ejusmodi autem sanguine, humorem nigrum quem Veteres atramentum vocabant, aut praeter ceteris augente, aut in ipsum degenerante legere poteris quae Doctissimi Archiatri duo scripserunt, nempe laudatus Schoberus (r), & multo fufius, ac luculentius Illustrius Sietenius (s). Et nomine tenus ab iis differre credes Hoffmannum, cum juvenis de quo dictum est, & mox feminae (t) casum, dissectionemque attente legeris. Nigras enim utriusque vomitiones, & dejectiones ex sanguine quidem, sed putrido, foetidoque deducit, explicatque juvenis citiorem mortem eodem modo ac eorum qui *sphacelo partium tantum externarum afficiuntur*; infectis enim ab ejusmodi sanguine cerebri, nervorumque spiribus, vitam cum viribus subito perdunt. At si quis alius, is certe pessimus, & perniciosus, quocunque appellemus nomine, in Fabro humor, aut ea potius humorum mixtura fuit, & cum veneno ingenito comparanda. Neque enim quisvis niger succus tantos inferre stomacho cruciatibus potest, neque tam praecipiti letho abripere: quod ex superiore quoque cognoscas Sepulchreti Sectione VII. cum post dolorem ventriculi, hunc inventum leges *nigro succo ex dimidio plenum* (u) aut in ejus fundo *atramento similis materiam*, (x) aliave ejusdemmodi.

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tmo. II.

B 3

18. In-

(r) Prax. Med. I. 13. c. 4. (f) Eph. N. C. Cent. 7. Obs. 41. (g) Opusc. Pathol. Obs. 24.
(u) Eph. cit. Cent. 6. Obs. 16. (s) Eph. de Piliis, Ossib. p. n. (y) Diff. de Pancreat. Morb. §. 4.
(z) Schol. ad Obs. 23. (a) Comment. de Bonon. Sc. Acad. T. 2. P. 1. inter Medica Obs. 1.
(b) Eph. N. C. Cent. 3. & 4. Obs. 121. in Schol. (c) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1740. Obs. Anat. 4.
(d) Cent. 7. Obs. 87. & Cent. 8. Obs. 20. & Cent. 10. Obs. 10. & 13. & T. 6. Obs. 151.
(e) A. 1711. M. Sept. ex Dionis Dissert. (f) A. 1743. Hebd. 16. n. 2. cum Hebd. 17. n. 2.
(g) Dissert. de Fame Lethali &c. §. 29. (h) De Obs. Med. & Anat. Epist. 2. & 3. (i) n. 6.

(k) Epist. 39. n. 21. & seqq. (l) n. 9. (m) 22. S. 2. (n) De Medic. I. 2. c. 6. (o) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obs. 105.
(p) Erruod. Cent. 3. & 4. in Append. n. 12. c. 1. (q) Medic. Rat. T. 2. P. 2. S. 1. c. 3. Obs. 2.
(r) Append. cit. c. 3. §. 5. & 6. (s) Comm. in Boerh. Aphor. §. 1091. & seq. passim.
(t) c. 3. cit. Obs. 3. (u) Obs. 23. (x) Obs. 26. §. 1.

18. Iniectione sanguinei vomitus, & veneni mentione, fortasse ex me quæres, cur exempla præferam nulla vomitus veri sanguinis, neque ulla ejus qui pleraque hausta, aut devorata venena consequitur; cum præsertim in VIII. hac Sepulchreti Sectione tot utroque ex genere producantur? Sed venenorum effectus quo differam in extremis ferme superioribus Litteris (y) indicatum est. Vomitus autem sanguinei Observationes præter illam quæ iisdem Litteris (z) est proposita, restant quidem aliae, sed commodiorem aliis in Epistolis locum habituræ. Ibi fortasse quid de pluribus sentiendum sit, non silebimus quæ in Sectione hac sanguinem vomitu rejectum ab aliene deducunt. Nam quæ a pulmonibus repetunt (a), illæ saltem cum ea confessione proponuntur, unde intelligatur, in hac Sectionem non convenisse; quæ tamen confessio ibi desideratur ubi puris vomitus ex ingenti derivatus est pulmonis vomica (b). Est contra, ubi qui vomitus verus fuit, ut similes circa idem tempus dejectiones ostendebant, sanguinis videlicet cum frustulis carnis, id est polyposis, repetitur, si Superis placet, ex corde per pulmones & asperam arteriam! (c) nempe quia cor repletum inventum est materia tali qualis vomitu ejecta fuerat. Nec vero expectabis, ut opinor, in hac Epistola eas a me Observationes, quæ etsi vomitum conjunctum habent, proprie tamen aut ad Iliacam Passionem spectant, & ad Hernias quas vocant *incaeratas*, aut ad Vulnera certarum Partium, ipsiusque in primis ventriculi, aut ad morbos alios quorundam viscerum quibuscumque ventriculus consentit. Nimirum ejusmodi omnes Observationes quo sint a nobis differendæ, præclare intelligis: quin etiam pleraque de hoc genere ita in hac Sectione produci, animadvertes, ut ad alias in quibus fufius conscriptæ sunt, deferre rejiciamus. Sed ad satis magnum harum numerum aliae insuper accedunt, quæ his in hac ponuntur Sectione: quod intelliges, XXIX. comparando cum LIX. §. 5; XXXVIII. cum XLIII. §. 1; LVII. §. 9. cum VI. earum quæ in Additamentis leguntur, & fortassis alias. Idemque de Scholiis dictum puta, in quibus eadem iterantur, ut ostendunt quæ I. & quæ III. Observationi subjiciuntur, cum iis collata quæ XIII. & quæ item V. & alii fortasse adjecta sunt.

19. Cum I. illam quam modo commemoravi, Observationem relegerem, & quæ de rejectis polyposis frustis, & quæ de vomitu sunt morbos consequente Partium cum ventriculo consentientium; redi in memoriam quorundam rerum, quas si huc addam, legas fortasse non inviam. Willisius igitur in ea Observatione affirmat, si bilis confusus suffusio in partibus vicinis, aut contiguis ventriculo, accidat; quia tunica hujus extima propterea multum ac crebro irritatur, frequentem vomitionem excitari, idque se in pluribus post obitum dissectis observasse. Quæ ego non modo a Præstantissimo Viro conspecta credo, sed etiam fateor, eam aliquando esse tellis acrimoniam, & irritandi, ac penetrandi vim posse, ut vomitus inde fortassis accidat in hominibus præsertim exquisitiore sensu præditis, & si bilis tinctura late se expandat, & ad ventriculi interiora pervadat: quod Platerus, ut in superiore VII. Sectione (d) est, in iis maxime animadvertit quibus viventibus perpetui ventriculi ardores molesti erant. Non una tamen causa est quæ me ab assensu non nihil tardet. Nam primum dubito, num viciniam inficiens bilis particula, vivo adhuc homine, & vesicula elabatur, an post mortem dumtaxat, cum tunicarum vis se remittit, & quæ inter fibras & fibras sunt, interstitia laxantur. Deinde sæpe adeo, quod proximis quoque Litteris (e) scripsi, vesiculæ vicinas partes in cadaveribus flavere, conspicimus, ut inde non peculiare quorundam noxæ, sed plerisque, dum viverent, communes repetendæ esse viderentur. Denique nisi constet, id autem non constet; cum eam ibi tincturam animadvertent Egregii Viri, nihil aliud in iis corporibus fuisse, cui aut ardoris sensus, aut vomitus posset imputari; dubitare fas est, num ei causæ hi sint effectus adscribendi. Exemplum justæ hujus dubitationis in catella dabo quam juvenis Bononiæ perfecui. Huc enim attinet maxime, & Observationes, in canibus quoque habitas, tum alibi haud raro proferri video in Sepulchreto, tum in hac ipsa etiam Sectione (f).

20. CATELLA junior post magnos vomitus repente erat mortua. PYLORI antrum qua bilis

vesiculam contingebat, flavedine infectum reperi, quæ ab exterioribus ad interiora pervaserat, in tunica tamen subsistens intima, ut materia quæ ventriculo continebatur, ovi albumen referret etiam colore. Dum quæro, siue aliud annotatione dignum, flavam pariter esse video in diaphragmate centri ejus tendineæ partem, quod cum pertineat sit, ea præsertim ætate, flavedinem in thoracis cavum transierat sic ut contigua aliqua particula, quamvis levissime, flavesceret. Cunctis Partibus jam inspectis, & sanis inventis, subiit animum interstina secundum longitudinem perfercare. Multus erat in iis mucus, in eoque prope ultimam Tenuium partem lumbrici teretes decem, singuli parvis ferme crassitudinis, & longitudinis quoque; hæc autem erat digitorum transversorum septem.

21. Num igitur flavæ illi tincturæ, quamvis non ventriculo modo, sed & tendinem istiusmodi inficenti, an lumbricis tot, ac talibus, siue in ventriculo irreperant, siue ubi erant, persisterent, eas tribuere males irritationes, quæ convellendo, magnos illos vomitus, & repentinam demum mortem intulerint? Hærebis saltem, nec primum illud pro certo affirmabis.

Sed longe magis hæres; ut ad alterum transeam; si forte credes quæ in Additamentis ad hanc Sectionem (g) posita sunt de Altemburgensi ancilla quæ lacertas, bufones, ranas, aliquando etiam non mortuas, sed in sextum diem, si Superis placet, viventes, ex ore, ano, aut etiam, quod aiebat ipsa, genitalibus ejiciebat! Factum bene, quod Viri Docti qui hæc primi scripserunt, non ajunt, se cum vivæ istæ bestię excluderentur, affuisse; ne sub ipsis eorum oculis fucum iis factum a feminis præstigiaticibus inviti dicere cogere. Equidem nihil veri fuisse existimo in rebus istiusmodi quas reapse mulier excerneret, nisi extimam quandam, & fortuitam eorum animalium similitudinem: corpus autem materiamque illarum ex polyposis concretionibus, viridi bilis colore infectis coaluisse. Accidit forte multis ante annis, ut optima Virgo, & honesto loco nata, extremis solemnium jejuniorum diebus queri inciperet de molesto quodam angoris, & ponderis sensu quo ventriculus hora potissimum confessionis ciborum afficiebatur. Accessit deinde faciei pallor, & manifesta corporis macies. Exactis denique a querelarum initio mensibus circiter duobus, corripitur paulo ante meridiem tribus immanibus, & cum summa virium, animique defectione conjunctis, vomendi conatibus, quorum primo nihil quidquam, altero non multum amarissimi, & subflavi humoris, tertio autem, cum adesset is qui hæc ad me scripsit Medicus, in puram argenteam pateram id rejicit quod ut mihi ab eodem accurate descriptum est, sic a me tibi describetur. Parva planta, seu mavis herbula, digitum circiter longa, radicularis, caule, & tribus in summo foliis prædita, quorum unum erat denticulatum, reliqua fœmiculorum plane referebant, viridia omnia. Caulis autem superius albus, inferius viridis, nisi quod sanguinolentis quibusdam stris perexilibus distinguebatur. Post tres quatuorve horas jam sicca herbula se quidem contraxerat, colorem tamen retinuerat. A multis, & in his ab nonnullis rei Herbariæ peritis priusquam crebra contrefactione decreveret, & propere friabilis fieret, cum diligenter inspecta esset, nemo omnium fuit, qui cuius esset generis, diceret. Caterum Virgo, illa ejecta, nullam postea ventriculi molestiam sensit; quin colorem, & corpus, cum hæc ad me non multis post diebus scriberentur, jam manifesto reparabat. Ex me autem quærebatur, quid de inaudito hoc vomitus genere sentirem. Nec vero erat, cur hic cogitarem, idem forte potuisse accidere quod in quorundam Observationibus, ut puta Lentilii (h) qui vidisse se, ait, vomitu rejectas lactucas, cum floribus nasturtii Indici, borraginis, rosarum, colore suo parum aut nihil immutatis, quos ante dies quatuordecim & ultra mulier Illustissima comederat. Ut enim cætera prætermittam; ea Virgo ab herbarum usu, & ab acetariis natura abhorrebat. Alterutrum igitur relinquebatur, ut herbiformem aut excrementum, aut polypum e ventriculo ejecisset. Hujus præcedentia incommoda, & immanes in evomendo conatus, & ejecti corporis sanguinolentæ stris, & albus color; nam quidquid viridis erat, id a bile induci potuerat cum acidis succis commista; ea, inquam, omnia conjecturam alterutram confirmare videbantur. Utram autem sequi præstaret, id vero aut novæ quædam stomachi molestiæ, aut nul-

læ, ut tunc quidem se res habebant, esse a me quidem putabantur indicatur. Huc igitur summa rediit eorum quæ consulenti statim rescripsi: neque postea quidquam audiui amplius de hac Virgine.

22. Utilius tibi fortasse erit quod ultimo adjiciam loco de vomitu ad Partium morbos spectante quibuscumque ventriculus consentit. Id ne, ut cætera, ad morbos differam earum Partium, hoc unum facit quod nulla est quam adjiciam cadaveris dissectio. Collega fuit noster Vir Nobilissimus, celebris Scriptoris nepos, & sua ipse quoque laude dignus. Qui cum annos esset natus ad sexaginta, vomitibus cepit vexari crebris, & permolesitis, quamvis uno interdum die quiescentibus. Rejecla peculiare nihil habebant. Medici pro Viri dignitate aderant tres qui tunc peritiores existimabantur, & facile erant; certe erant seniores. Hi cum mali sedem in ventriculo esse, non dubitarent; quæ ad fanandum hunc facerent, & plurima, & varia, & diu satis adhibuerunt; sed in cassum omnia; donec æger, macilentior jam factus, remediis peractis, consilium per se cepit hæc cuncta abiciendi, & rus secedendi. Unde, neque ita multo post, in urbem regressus, ecce tibi magno sine causa frigore toto corpore sub noctem corripitur, eaque ipsa nocte multum cum urina sanguinem reddit. Hunc eadem via mox consequitur multum puris. Itaque sanguinis, & purulentis urinis alterne se excipientibus, cito dejectæ vires sunt, & intra dies quam paucissimos vivendi finis factus. Ex hoc mor-

bi exitu proclive fuit intelligere, vomitus causam non in ventriculo, sed in iis Partibus fuisse quæ ad lotum pertineant, renibus præsertim, qui nempe illum solent facile adeo in consensum trahere, & ad vomitiones concitare. Simulque intellectum est quid significarent crurum non stupores quidem, sed dolores tamen, de quibus jam inde ab initio morbi plurimum queri solebat æger, quid insolitus mingendi stimulus, ut urinam vix ac ne vix quidem retinere posset dum matulam fumeret, noctu potissimum, quid denique duritia quædam circa regionem, ut Glissonius (i) vocabatur, epipolicam dexteram. Hæc utique, etsi de lumbis conqueri æger non solebat, indicia aliquid dare poterant, cum inutilibus præsertim curandi ventriculi experimentis conjuncta, alibi quam in hoc, vomitus, causam hære, & in renibus, dexteroque potissimum, congestum fortasse aliquem materię morbosicæ esse factum. Cui suspitionis pondus addi aliquid ex eo potuisset, quod tu semper in obscuris ægrotationibus quæres, & curationi pertinacius resistentes, nimirum cui morbo obnoxii fuerint Majores. Hæc enim interrogatione compertum esset, in Generosissima hac Familia frequentia fuisse renum mala. Atque hæc quæ audito Collegæ casu, & prægressis indicis cognitis, mecum ipse reputavi, non ut quenquam, mortuum præsertim, infirmularem, cuius rei causas procul habeo, sed ut tua adjuvarem studiis, scripta putabis, & valebis.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXXI.

De Alvi Profluviis agituri Incruentis, & Cruentis.

Quæ in Sepulchreto Anatomico sunt in sectiones quatuor distributa, Cholera Morbus, Alvi Profluvia Incruenta, Dysenteria, & Excrementa Alvi præter naturam, ea omnia malum his unis Litteris complecti. Nostri autem hujus consilii sic causas accipe. Primum Cholera commune stomachi atque intestinorum vitium videri potest, ut recte ait Corn. Celsus (a); nam simul & dejectione & vomitus est. Nos autem de stomachi vitii agentes, aut de intestinorum acturi, non possumus in istud utriusque simul commune vitium non incurrisse, aut incurere; ut minime necesse sit hic seorsum de eo verba facere, perpaucis præsertim; nam Bonetus ipse qui Sectionem de eodem IX. conscripsit, vix tres paginas, quarum multo maximam partem Scholia faciunt interiecit, complevit. Deinde nihil, ut nosti, iterare nos volumus. Ipse vero longe aliud consilium secutus, adeo non dubitavit istud quoque hic uti quas alibi habet, Observationibus, ut vel in Sectione ista brevissima aliquam earum posuerit, Sectionem autem XII. non modo pluribus earundem, ut duas reliquas, reserperit, sed totam ex iis concinnaverit. Huc accedunt Scholiorum partes non solum in diversis Sectionibus repetitæ, ut quod ex Graæo in X. (b) exhibetur, in XII. (c) repetitur, sed in una etiam eademque Sectione, ut puta cum in X. & quæ ex Willisio, & quæ ex Ballonio Observationi VII. subjiciuntur, illa in Appendice (d) quæ Observationem sequitur XXVIII. hæc vero huic ipsi Observationi continuo adscribantur. Præterea, ne ab eadem Sectione X. recedamus; tot sunt quæ de Sanguinis Transfusionem, & de Chirurgia, ut vocant, Infusoria adjecta sunt ad Observationem VI. ut superent totam Sectionem IX. Denique ad Dysenteriam, de qua inscripta est XI. Sectio, illa profecto non attinent sanguineæ dejectiones quæ vulnus cito consequuntur inflatum ventriculo, aut jecinori. Binas tamen allatas huc video sub num. XXV. istiusmodi Observationes. Quorum cum mihi imitari nihil liceat; propterea nec tanta esse rerum copia potest, ut nequeat una Epistola comprehendere. Alvi igitur profluvia in ea quæ Incruenta sunt, & in ea quæ Cruenta, dividens, de primis duas continuo proferam Valsalvæ Observationes.

2. ADOLESCENS, cui roto vitæ spatio vel cum egregie valeret, lubrica alvus fuerat, ad vigesimum accedebat annum, cum in tormina, & crebras sanguinis dejectiones, id est in dysenteriam incidit. Hæc post duode-

cim, aut quindecim dies in flavam diarrhœam, sine torminibus, mutata est: quæ cum remedium ope non nihil remissa videretur; febris tertiana simplex accessit, quæ intra mensem finiebatur. Dejectione persistente, improvise acuta febre correptus est, quæ manifestas accessiones habebat. Pulsus erant frequentes, celeres, molles, parvi, debiles. His se addidit mentis stupor, non levis furditas, peculiaris quædam intumescencia anterioris sinistræ partis thoracis. Ita obiit circa diem ab acuti morbi initio XIV. cuius morbi tempore qualia essent quæ deiceret, affidenter non adnotavit. VENTER, etsi nullo modo tumere videbatur; tamen multum continebat saniosi ichoris, qui ex intestinis prodibat, pluribus in locis ad quandam tractum perforatis. Is tractus Ileii finem, & proximum insuper Colon, ad duorum palmorum longitudinem, comprehendebat. Erant ibi hæc intestina erosa, exulcerata, & facie interiore etiam gangræna affecta, ut facilius perforari potuisset, intelligeres. Prope hunc tractum nonnullæ mesenterii glandulæ excreverant in tumorem, in quo ichor non absimilis ejus in ventris cavum eruperat: ipsa autem tumoris substantia mollis, ac flaccida erat, & ad corruptionem inclinare videbatur. Lien triplo major quam secundum naturam. Thoracis cutis, & musculi, quæ intumescencia erat, cum secarentur, multum feri emittebant, præsertim ad sterni superius latus: inde enim a finibus Pectoralis musculi, & Subclavi ferum, quasi rivulorum in modum scaturiebat. Cæterum pulmones sani. Intra pericardium, serum, aquæ simile in qua caro recens lota est. Cor si tangeres; molle adeo laxumque inveniebas, ut non musculolum, sed membraneum videretur. In ejus ventriculis sanguis fluidus, atque ita spumofus, ut agitatam Tonforum lixivium referret. Sed & omnes venæ tantam concludebant aeris copiam, ut tametsi paucum sanguinem continerent, valde tamen essent turgidæ, in primis ramus quidam major earum venarum quæ attinent ad lienem; ille enim ramus cum magis dilatari non posse videretur, vix ullum sanguinis vestigium servabat. Intra Cranium paululum feri inventum est: cerebrum ipsum nullum usquam læsionis ostendit indicium.

3. Magna vis putredinis; ut a posterioribus incipiamus, ad priora illa statim reverturi; in hoc cadavere apparuit ex tanta aeris qui se evoluerat, copia. Summa cordis laxitas cum parvis illis, ac debilibus pulsibus conveniebat.

(g) n. 27. (z) n. 12. (a) Obs. 75. §. 1. & 2. (b) Obs. 65. (c) in Additamentis Obs. 10. (d) Obs. 16. (e) n. 13. (f) Obs. 62. (g) Obs. 5. (h) Vid. Append. ad A. 1. Dec. 3. Eph. N. C. in Pa. all. ad Obs. 92.

(i) Tract. de Partib. Continet. c. 2. n. 10. (a) De Medic. l. 4. c. 11. (b) ad Obs. 25. (c) ad Obs. 15. (d) §. 2.

bat. Lienem magnum haud raro alias post non breves, eademque multiplices febres fuisse, adnotavimus. Sed, ut nullis aliis, ad ea veniamus quorum potissimum gratia hanc tibi hoc loco Observationem retulimus; vides primum, quanto demum feterit ei adolescenti alvum perpetuo lubricam habuisse, id est non jam moderate humidam; neque enim Hippocratis aphorismum (e) ignoramus; sed æquo demum, & facile etiam ab incongrua vivendi norma, humidior em effecit. In laxa itaque intestina is ab redundantibus vitiosisque humoribus factus est impetus, ut ferendo paria non fuerint. Dyfenteria primum vexata fuerant. Hæc exulcerationum, ut videtur, reliquit initia, minus animadversa, quia tum intestina jam magis laxata, doloribus non ita acriter percellabantur, tum saniosus ichor a flavo occultebatur, quod succederat, alvi profluvio. Hoc autem succederat, relata in sanguinem ex intestinis vitata in ipsis vel magis, deterioris materiae parte. Quæ reduce iterum in intestina simul cum bile, aliisque succis, quorum conceptacula, & sedes hæc irritabat admista, non profluvium modo servabatur, sed & erosiones augebantur; ut infirmissima demum ubi erant hæc facta intestina & gangræna prebenderentur, & pessimo ichore perunderentur. Relatam autem, ut paulo ante dicebam, in sanguinem pravam illam materiam non tam consecuta febres, quam proximus exulcerato intestinorum tractui mesenterii tumor ostendit. Mali enim ichores cum ex eo tractu ad vicinas glandulas per chylicos ductus assidue traducerentur, earum denique intimam structuram depravarunt, ut sibi intercepto transitu, jam in iis manifeste subsisterent, eademque in tumorem attollerent.

4. Hinc autem causa accedebat alia, quæ profluvium auget, videlicet resistentes in canali intestinorum ichores illi qui antea per vias, nunc interclusas, efferebantur. Cujusmodi causa cum in plerique est earum viarum, non modo augeat alvi profluvia, sed facit, illudque in primis quod appellant celiacum: quocum vide neceliacum, qui a Celso (f) describitur, morbum confundas. In hoc enim *alvus nihil reddit*; in illo autem ipse quoque chylus profluit, permixtus nimirum cum recrementis, ut cinereo ferme colore sint ea quæ egeruntur, non candida, ut putant qui chylum, minime animadvertunt, non nisi intra sua vascula secretum haberi a cæteris inutilibus alimentorum partibus. Nec qui alba egerit se vidisse, scripserunt, aliud significarunt quam albicantia, si videlicet cum recrementis naturalibus conferrentur, aut si alba voluerunt, vel pos illud fuit, vel puris similis mucus, vel res alia ejusmodi; ut puta si quis non tam celiacus, quam lientericus, ingestum lac deiecerit non mutatum. Neque enim ut in celiaco, ita in lienterico profluvio conficiuntur alimenta, sive inepti sint ad id quibus confici debent, fucci, sive accepta, præpropere moruejiciat ventriculus, sive laxas ipse, aut resolutus, minusque confectio pylori elabi finat; quamquam lienterici nihil fuit in Senes illo cuius pylori orificium tibi alias (g) descripsi, cum ipsum per se multo quam soleat, amplius, tum præsertim nullo extante annulo instructum majori ex parte. Sed neque celiacus quidquam erat; quo tamen etiam in morbo sunt Viri Doctissimi qui *nimis amplum pylorum* credant. Ego vero tunc in ventriculo nihil dedero; sed aliquando in tubo potius intestinorum, sive accelerato motu antea deturbet excepta, quam satis chyli fecedere ab his possit, sive retardato, & languido eum qui secessit, ulterius non impellat; ut resistans in primis suorum vasculorum radiculis, secessuro non secus obster, ac quando obstruatur, ut paulo ante dicebamur, glandularum mesenterii vitio porro pergere prohibetur: ne de cicatricibus, radicularum oscula occacantibus, quidquam addam; cuius tu rei, ut obstructionis quoque earum glandularum in celiacis, exempla reperies in Sepulchreto (h). Lienterici autem fluxus, vel ad ipsum accedentis Observationes habebis quas addas ex Cæsareæ Academiæ Voluminibus (i) non sine illarum quidem, aliarumque glandularum obstructionibus, sed cum ventriculi simul, omni robore orbati, alias & ejus, & intestinorum prope omnium parietibus ad papyri tenuitatem redactis. Verum ab his in quæ forte incidimus, & quæ nihilominus hic attigisse haud inutile profus fuerit, ad Valsalvæ Observationes redeamus.

5. INFANS menses natus XVII. diarrhoea tentabatur. Huic febris accessit cum tussi, & quodam gingiva-

rum, ac narium pruritu, quem crebra digitorum ad eas partes affricatione significabat. Crescere interim diarrhoea, & cum dejectiones antea flavæ, aut virides fuissent, primum sanguinea tinctura infici, tandem, idque circa diem septimum, & cum singultu, in nigerrimas commutari. Nono ineunte die, sponte, an vi adstrictorii cujusdam remedii, de mulierculæ consilio ad pedes appliciti, omnino sublitere. Verum septem, aut octo vix horis interjectis, præcordiorum angustis pressus, & assidua totius corporis jactatione concussus, nono eodem moritur die. INTESTINA aere turgida paucam nigerrimam, qualem antea excreverant, materiam continebant. In mesenterio multi adiposi sacculi, etsi hora a morte jam transierat vigesima quarta, minimas tamen pinguedinis ostenderunt particulas quæ tumultuario inter motu agitabantur. Pulmones ad dorsum nonnihil nigricabant, dexter præsertim: sani erant tamen. In pericardio aquæ parum: in corde autem nullum polypum concretionis indicium. In Cerebro paucum serum inventum est.

6. Diarrhoea cum tussi, & narium pruritu conjuncta, lumbricorum in hoc puellulo suspicionem movere poterat: qui nulli tamen sunt deprehensi. Sed gingivarum pruritus reapse dentitionem significabat. Sic enim is qui hæc vidit, Valsalva censuit cum Observationem hanc in suo parvo Indice sic designavit, *Diarrhoea cum dentitione difficili, atque convulsivis motibus*. Dentitio autem quam facile convulsiones exciter, neque ignotum est, & nos alias (k) duobus ad te scriptis funeltis infantum casibus confirmavimus, simul indicantes ubi ostenderimus, quam ratione alvi fluxus etiam moveat, & qua hi, si intra modum sint, convulsiones arceant. Hinc intelligis, eisdem fluxus, qui semper aliquin non sine periculo repente ex toto subsistunt, quanto majori subsistunt eo tempore. Quod si quæ deiciuntur, sint insuper deteriora, ea vero cohibita, non mortem solum, sed celerrimam, acerbissimamque possunt afferre. Hic autem maligna atque exitialis fuisse natura, & eorum color, & singultus, & quicunque is fuit in pinguedinis particulis motus, insolitus adeo ut paucis præter Valsalvam id crederem, satis superque commonstrant. Sed ut de colore tantum dicam; noli credere, quia sanguineæ tincturæ nigerrimus ille successit egestorum color, nihil hæc fuisse nisi sanguinem. Neque enim is erat Valsalva, qui aut ejectionem, aut residuum in mortui intestinis sanguinem, si quidem sanguis fuisset, facile agnoscere nesciret. Igitur aut tinctura illa quæ sanguinea a mulierculis credita est, aliqua pessimi humoris portio fuit, tunc primum erumpere, & quæ intestinis antea continebantur, inficere incipientis, aut si revera sanguinea fuit, ex vasculis quibusdam stillavit quæ deteriori humoris acrior quædam pars exonerat. Is autem humor recens additis sive in cysti fellea, sive in cavo intestinorum succis aliis, qui cujus generis esse potuerint, Graafii experimentum, in Sepulchreto quoque (l) descriptum, quadantenus indicabit, nigerrimum illum colorem adscivit, & pessimam Veterum bilem atram perniciosius effectibus representavit. Quam acerbam, & celerrimam mortem illi quoque Fabio ferrario attulerit, de quo proxima Epistola (m) scriptum est, certe meministi. Nonnunquam tamen, sed perraro, & difficillime accidit, ut aliquis fervetur. Quod in altero Fabio ferrario cum videre mihi contigerit A. 1710; summa ejus observationis capita huc tibi adscribere non gravabor.

7. Gracilis, sed ætate, & viribus validus Juvenis, nec arte minus sua, quam temperatura adultus, hæmorrhagis per nares obnoxius, cum diutius iis caruisset, primo vere febris mali moris prehenfus fuerat. Primarii in mea Patria Viri qui fabrum hunc ingeniosissimum diligebant, a me petierunt, ut vellem me focium addere seniori, id non abnuenti, illius Medico. Petendi causa fuit res in angustum redacta. Ad cætera enim accesserat eo die tantus sanguinis e naribus cursus, ut cum intra horas quinque ad libras septem effluxisset, neque ulla hæcenus arte tardari posset; vires jam hominem, ipsique propemodum pulsus deficerent. Data communiter ab utroque nostrum opera est, ut his omnibus occurreretur. Sed vix sanguis subsistere inceperat, cum id accidit quod metuebamus, ne exacerbata, uti sub meridiem fieri consueverat, febris sanguinis fluxum renovaret. Dum rursus opem ferimus, ecce tibi, nigra dejectiones incipiunt. Quas cum proclive esset credere partem esse sanguinis, quæ per posteriora narium forami-

ramina in fauces, & stomachum defluxisset; negabat æger, quidquam sibi perceptum sanguinis in gulam ex faucibus descendit: idque confirmabant ea quæ interim per vomitum forte rejecerat, in quibus sanguinei, aut atrii nihil fuerat. Tunc vero inspectis linteis omnibus quibus dejecta exceperant, cum atrum quidem, at sanguineum nusquam colorem cernerem; non modo vulgarum Hippocratis prædictionum venit in mentem, sed & Juvenis illius apud Ballonium (n), qui nostri admodum simili casu cum post nimiam per nares hæmorrhagiam, deiecit nigricantem; decimo septimo interit febris die. Eoque major erat metus, quod cum Ballonius in suo nihilominus suspicaretur, sanguinem in ventriculo e faucibus defluxisse; in nostro minus id licebat, ut diximus, eoque minus, quo magis omnia pendebamus. Cum enim Veteres Medici quibuscum facit Sennerius (o), nigras dejectiones in eas dividant quæ sunt ex sanguine, & quæ ex humore melancholico naturali, & quæ demum extra bile, duasque primas minori cum periculo esse, doceant, ultimas vero omnium pessimas quæ videlicet *nigrae sint, splendentes, atque acres*; nigerrimæ erant certe quas nos videbamus, eademque splendide, atque, ut æger querebatur, etiam acres. Insecuta nocte eadem egestit, nisi quod fluida erant paulo minus. Postea vero non amplius talia: sed lac quod clysteribus injiciebatur, primum quidem coloris *tabacci* infectum reddidit, proximis autem diebus ex fusco subflavum: nihil autem quod non gravissimo esset odore. Verum quamquam hæc ita se omnia habuerunt; Dei tamen benignitate evasit æger, pristina omnino sanitate restituta; sed non ante diem vigesimum quartum a nigris dejectionibus, quæ sexto circiter contigerant febris die, nec sine multis, variis, gravibus incommodis, quibus post illas etiam confictatus. In iis fuisse ventris dolores, fitis, lingua aspera, nigra, & quamvis sæpe biberet, arida; dum biberet autem, sonus quasi potionem in profundum deieceret, vox rauca, & humilis, manuum tremores, & tendinum subfultus in carpis, pulsuum inconstantia, sæpe autem parvitas, & magna, si premeres, infirmitas, nonnunquam summa, & vix explicanda inæqualitas, frequentia autem semper, maxime vero cum febris, id quod sæpenumero accidit, vehementius urgebat, respiratio varia, ut aliquando alta fuerit, aliquando etiam non sine difficultate, somnus primam laborem faciens, deinde nimia, & prope assidua dormitatio, sopor etiam palpebris coincidentibus, & oculis tamen non omnino operitis, nonnunquam mens haud satis constans, tarditas in respondendo, & difficultas in conformandis vocibus, & oblitio monendi, cum alvus, aut vesica erant exoneranda, auditus gravitas, supinus decubitus, quasi sublata eo tempore se in latum convertentes facultate, quando alias musculorum vires, & promptitudo ad alimenta capiendos majores plerumque in toto hoc morbo fuere, quam ejus gravitas, & ea quæ memoravimus, finire posse videbantur. Quorum cum plura, & pessima omnium præsertim, non semel, nec breve ad tempus simul se ostenderent; diu fecerunt, ut nos quidem metui effemus, quam spei, propiores, cæteri vero, quicunque ægotantem videbant, jam desperatum pronunciarent. Nihil vero æque adjuvisse, nobis visum est, atque urinæ, quæ ubertim profluxerunt; nam sudores pauci, & rari, neque unquam toto corpore apparuerunt, alvus autem nec multa, nec quæ prodesse possent, fere egestit, quamquam in his aliquis interdum lumbricus est animadversus.

8. Sed nigra istiusmodi dejectiones pessimæ sunt non tam copia, quam effectibus sæpenumero, significatione autem causæ, deterriori videlicet humoris, semper. Alia vero pariter incuræta, ut flavæ, virides, aquæ, aliæque hujusmodi interdum non doloribus tantum, sed & copia ipsa exitiales sunt. Hæc autem omnes plerumque originem debent irritamento cuiusdam intestina vellicanti, undecunque in ipsa descenderit: perinde enim ut a medicamentis violentissime purgantibus immodicam humoris copiam deici videmus, ita ab ingento, aut de immiso illuc ex arteriis succo aliquo stimulante idem contingere, credendum est. Nam præter pancreas, jecur, & hujus vesiculam, exigua quidem, sed propter amplissimam intestinorum superficiem innumera viæ sunt per quas in hæc quidpiam insoliti ex sanguine venire possit. Eademque innumerales viæ, ubi diu, atque acius intestina incessantur, feri incredibilem vim convehunt. Neque enim

cum vulgo putandum est, quidquid flavi, aut viridis humoris egeritur, id omne esse bilem, præsertim postquam ex Diemerbroeckii experimento, quod in Sepulchreto etiam habes (p), satis intelligi licet, quantillo bilis quantum aquæ tingatur. Nec quod tormina tunc affligant, id copiam imputare admittæ bilis necesse est; quando diarrhoeas *aquosas & fere limpidas* Willilius (q) descripsit, quas tamen ob adjuncta ventris tormina dyenterias maluit appellare. Et illæ quidem Londini autumnino præsertim A. 1670. plures, pridie sanos, & valde robustos, adortæ, intra XII. horas eo redigebant, ut jam jam morituri viderentur, non ob maximam egesti humoris copiam; nam tanta, inquit, *meri sanguinis effusio non id parere potuisset*. Contra autem copia ipsa immanis dejecti feri cum mulieri de qua narrat Marcellus Donatus (r) statim attulit animi defectionem, tum Notarium de quo Poterius (s), ad mortem propemodum perduxit; neuter enim Auctor de doloribus quidquam memorat; sed ille tantum *aquæ claræ quantitatem*, ait, *unica excretionis expulsum, ut subjectum vas multæ capacitatis repleverit*, hic vero per integrum diem supra 40. libras *materiæ ferossæ ejectiones*. Neque tamen aliquid irritamenti in his fuisse, negaverim, cum feri in sanguine redundantia, & aliqua fortasse intestinorum laxitate conjunctum. Hoc tantum ajo, neque dolores videri fuisse ea acerbitate quæ commemoratione digna esset, neque post effusam tam cito feri tantam copiam quidquam præterea requiri, ut ea quæ utrique acciderunt, intelligantur. Tam cito enim vasa sanguifera se contrahere non possunt: ut adeo imminutum sanguinem arde contingant quantum opus est ut iustum in motum agatur, orbatus præsertim magna ex parte humore suo, ideoque magis resistens, ne quid dicam de ejusdem humoris necessitate, ut prompte, ac rite ea secerantur a sanguine, sine quibus vita stare non potest, nec quæram, pessime igitur sit, ubi de ingenti, & celeri e vasis effusione agatur, serum solum, an ipsum quoque sanguinem simul exiisse; nam etsi citius, ac facilius reparabile serum est; sanguis tamen qui non sine feri necessaria portione in vasis restet, neque secretionibus ineptus est, nec magis quam antea, resistit causis in motum adigentibus.

9. Atque utinam mihi hæc potius disputando agitare, quam ulla ex parte unquam contigisset experiri. Sed A. 1733. dum permotus, ut parerat, litteris Amplissimi Cardinalis Annibalis Albani, consilii cujusdam medici causa Forolivio Pisaurum, & Pisauri Forolivium mutatis ad celeritatem equis eo, & redeo, alvi fluxu aqueo corripior tanto, ut intra horas duodecim egestim libras, minimum, sexdecim aquæ propemodum limpidæ. Leves erant dolores: non creberrimæ, sed magnæ egestionis: quæ nescio quem habituræ fuissent finem, nisi me quædam molesta nauseola admonuisset, ut tepido jure hausto experirer vomitionis auxilium. Quæ, etsi ad eam minime natura proclivis fuit, prompte adeo feliciterque successit, ut subviridi rejecto corpulculo quod parvum coctæ herbe folium videbatur, simul nausea, simul alvi fluxus omnino conquieverint. Sed verumne folium esset, & si erat, quando, aut ubi comedissem, invenire non poteram, nisi forte in via, cum quidpiam, dum equi mutabantur, cito, ut fit, in diversorio cape-rem, illud quidquid erat, non animadversum devoravi. Quanto autem in periculo fuero, tunc magis intellexi, ubi postridie mihi corpus vidi, & faciem intellexi, ac manus haud secus subfedis, quam ab diuturno, gravissimoque morbo, tantam vero oris, & faucium ariditatem sensi, ut quamvis identidem colluerem, nihil proficerem, aquam autem qua ejus rei gratia usus essem, cum ex ore in pelvim ejicerem, subnigram in ipso ore factam spectarem. Hæc autem, & lassitudo duos tresve dies ita duravit, ut sensim minuerentur. Sed dejectus ciborum cujusque modi, & quod in tanta ariditate magis mireris, etiam potionum appetitus perstiterunt aliquanto diutius, donec assus piscis, & vini quoddam genus suapte natura subamarum ab stomacho appeti, & bene ferri coepit. Quæ volui omnia minute persequi, & ad te scribere, quippe non ab alio accepta, aut in alio animadversa, sed a me in me ipso percepta, eaque, si cuncta diligenter contuleris, apud eos qui de Diarrhoeis scribere, minus obvia, ne Carolo quidem Pisone excepto, qui perfectam hujus diarrhoeæ (aquoas) descriptionem dicitur dedisse (t). Ut enim totum, quod simul citatur, caput

(e) 52. S. 2. (f) l. 4. c. 12. (g) Epist. 21. n. 15. (h) Scit hæc 10. Obf. 2. & 4. ac 5. (i) Act. N. C. Tom. 2. Obf. 65. & Cent. 6. Obf. 94. (k) Epist. 5. n. 4. & Epist. 10. n. 9. (l) ad Obf. 15. Sect. 12. (m) c. 16.

(n) l. 1. Confil. 98. (o) Medic. Præf. 1. 3. P. 2. S. 2. c. 10. (p) in Sin. Schol. ad Obf. 3. §. 1. Scit. 9. (q) Pharmac. Ration. S. 2. c. 3. (r) De Med. Hist. Mir. l. 4. c. 20. (s) Obferv. Cent. 2. c. 62. (t) Vid. Commere. Litter. A. 1734. Hebd. 42. post num. III.

caput perlegas de *Diarrhoea Serosa* inscriptum (u), casum quem cum meo compares, non reperies.

10. Cujus si forte causas quæris, primariam in ventriculo fuisse vides: nec dubita, quin possit ab irritamento, ventriculum afficiente, motus & irritatio, unde feri expressio est, ad intestina propagari. Inspice præceteris Jo. Riolani, parentem dico, Observationem, quam hic etiam habes in Sepulchreto (x): Matronam videbis intra horas circiter quatuordecim extinctam dejectionibus similibus aquæ albæ, chylosæ, guidem, sed liquida ea copia ut impleveret magnam pelvim quoties deiebat, causam autem hanc esse repertam, ventriculum in suo fundo ulceratum. Sed undenam tanta aquæ copia? Quod ad meum quidem attinet casum, hoc primum dicam, ea proxima ætate usum esse me ad temperanda generosa illa vina, quorum dumtaxat copia est in mea Patria eo tempore, majori quam pro consuetudine, aquæ portione, cuius pars aliqua, etsi cum eo fluxu correptum, egregie valere mihi, & aliis videbat, fortasse aliquanto plus quam opus esset, in meis substituisse humoribus poterat. Deinde iis qui ante biduum præcesserant, tribus diebus, eoque ipso quo fluxus cœpit, magnos fuisse imbres & prope assiduos, ut multum aquæ ex pluvio aere combibere pulmonibus, & toto corpore potuerim. Denique ad mihi accidisse ineunte Octobri; videri autem, aqua profluvia, a Willisio descripta (y), & videre poteris quod a Poterio descriptum indicavi (z), autumnum contigisse, & prope idem anni tempus, illud etiam quod a Marcello Donato (a), nec alio tria prima quæ a Pisone (b) memorantur. Scilicet cum refrigerari aer incipit, is aqueus humor qui per æstivos calores & corporibus cum per sudores, tum per inconstitutam perspirationem ubertim manabat, retinetur jam, & ad eum additur quo certis de causis certorum hominum corpora tunc magis abundant, ut minime mirandum sit, ubi accedat intestinorum irritamentum, ut in me accessit cum magna præterea ob celeritimum itum, & reditum, nec via brevi, corporis, sit mirandum, si nonnullam accideret quod tunc mihi.

11. Quod si pluribus, quas attigi, causis non contentus, aliam insuper aliquam inquirendam putas. fatius id erit, quam si in illarum una, tempore videlicet autumnali, acquiesceres. Idem enim tempus, idem annus, eadem Londinensis Civitas incruenta quidem, & conjuncta cum torminibus, alvi profluvia grassantia per populum habuere; sed adeo tamen discrepantia, ut si Willisii (c), & Sydenhamii (d) descriptiones inter se conferas; mireris plurimum, cum profluvia uterque proponat quæ autumnus A. 1670. Londinensem populum vexavere, alterum aquosa, alterum mucosa describere, neque illum aliqua saltem mucosa, hunc aquosa commemorare. Quid ergo est? Equidem crediderim, in Urbe, siqua alia, tum amplissima, tum frequentissima utrique accidisse, ut nulla fere alia profluvia viderit, quam quæ descripsit. Discrimen autem inde fuisse, quod ut in variis magnæ Urbis partibus varia esse aeris constitutio, ac mixtura potest, & variæ hominum artes, aliæque ejusmodi, ita alia hominum corpora sero abundaverint magis fluido, alia autem magis lento, ac mucoso; ut licet commune esset omnibus ad intestina irritamentum; idem tamen haud esset quod in omnibus exprimeretur.

Quod si mucus, aut serum colore etiam subinde alioque infecta egerantur, si hunc bilis addat, si ita per se prodeant; plures jam diu sunt Medici, qui Anglorum illorum exemplum secuti, modo crebra, nec sine acerbis torminibus sint dejectiones, minime dubitent profluvia ejusmodi, quamvis incruenta, dyfenterias appellare. Sic meminimus, cum Bononiæ olim degerem, epidemica istiusmodi profluvia quæ Mutinæ grassabantur, fuisse a Mutinensibus Medicis Dyfenterias vocitata in litteris quas dabant ad Bononienses, his illam appellationem haud improbantibus. Quales præ ceteris litteras apud Albertinum legebam, missas ab eo quem tibi alias (e) laudavi, Jo. Franciscus Bernardonio, in iisque inter alias historiam hic minime prætermittendam, quippe cum dissectione conjunctam. Cum enim ob eadem quæ in dyfentericis, tormina suspicio orta esset sanguinis sub aliis coloribus delitescens; Bernardonio per anatomen voluit eam aut tollere, aut comprobare.

Rem autem, ut præsens quoque mihi postea confirmabat, ad hunc modum invenit.

12. SACERDOS, alvi profluvio laborans, varios cum acerrimis intestinorum doloribus humores egerebat, in quibus tamen nec sanguinei, nec purulenti apparuit quidquam. Is decimo tertio obiit morbi die. INTESTINA omnia diligenter, nec semel, intus perlustrata, nusquam erosionem ullam, nedum exulcerationem, ostenderunt. Imo, quod mirabilis visum est, illo quo obliniuntur, mucus, uti vocant, non carebant.

13. Sed num sic pariter in cruentis dyfenteris? Cruentæ enim hic dicam, ut ab incruentis fecernam, de quibus proxime dictum est; dyfenterias alibi, & mox quoque sine alterius vocis adjunctione eas appellaturus, ut Græci folebant Medici, quæ sunt cruentæ; tormina antiqui Latini Medici vocitare consueverant. Utrumque ex Celso (f) in primis est notum. Hic vero non dubitat, in dyfenteria intus intestina exulcerari, cruoremque ex his modo cum quibusdam quasi mucosis excerni, interdum simul quadam carnosa descendere, vetustiores Medicos, & in iis Hippocratem (g) secutus, qui tamen velut carunculas dixerat. Et sæpe quidem exulcerantur intestina: non tamen semper. Quorum utrumque ostendendum est. Sunt enim primum nonnulli, quales audivit etiam Cl. Fantonus (h), qui vix unquam id fieri, ajunt. Quibus ut ipse proprias Observationes opposuit duas, sic tu alias addes tum ex Sectione hac XI. Sepulchreti, tum aliunde petitas; & nominatim ex Brunneri Commentario (i). Hic enim in Dyfenteria oscula glandularum Duodeni intestini arrosa vidit: quin & in aliis diuturno alvi fluxu laborantibus ulcera seu cancræ intestinorum conspexit (k), in alio autem (l) quem fluxus coeliacus, & in alio (m) quem lienteria male habuerat, ulcerosam in hoc Coli intestini dispositionem, in illo per totum intestinorum tractum ultra sexaginta numeravit ulcuscula: quæ commemorare hic volui simul ut nosceres, quæ causæ interdum accedant, ut irritatis ubi ulcera sunt, intestinis contactu eorum quæ illac transeunt, tanto citius hæc propellantur, chylo nec perfectio, nec extractio, simul autem ut intelligeres, si in hujusmodi fluxibus intestina ulceribus interdum corripiuntur, quanto facilius corripit istidem possint ubi dolorum acerbities indicat, tanto majorem esse acrimoniam, nempe in dyfenteria. A qua ne recedere videamur; duas attende Valsalvæ Observationes, id est non eam modo quæ supra (n) descripta est, adolescentis in quo post dyfenteriam diarrhoea sine torminibus succedente, ultimam partem Ileii intestini, & primam Coli invenit exulceratas; sed & hanc quam protinus subjiciamus.

14. VIR annos triginta natus, dyfenteria corripitur. Diu hæc durat donec accedit sanguinis sputum, & mors.

IN VENTRE Tenuia quidem intestina illa repleta sunt: at Crassa nonnullis in locis atro colore infecta, glandulifera, aliis penitus erosis, reliquis omnibus cruento humore in ipso excretorio osculo imbutis. In hepatis vesicula pauca bilis. In Thoracis cavo inferiora versus non parum sanguinis effusi. Ad inferiora quoque pulmones infarcti erant, archæque adhaerebant suis lateribus pleuræ, quæ & ipsa evidenter læsa. Ventriculus dexter cordis polyposam concretionem habebat.

15. Quæ in thorace spectata sunt, alio attinent. Quæ autem in ventre, sunt hujus loci. Sed quoniam ea quæ de intestinorum glandulis Valsalva adnotavit, cum iis consentiunt tum quæ in Sectione hac Sepulchreti (o) videbis ex Peyero produci, tum quæ in prima videri ex paulo ante (*) indicatis Brunneri Observationibus; id tantum quod de pauca in cysti bile, Spigelio adversaretur, si hic, quod aliqui Docti Viri ajunt, cystim magnam in dyfentericis esse, pronunciasset, cum sæpe dumtaxat se videri, tradiderit (p). Quod; si totam hanc Sectionem excutiamus; ab aliis semel observatum videbimus. Unus enim Cummenus (q) in femina folliculum fellis maximum & bile repletissimum animadvertit. Nam Bontius (r), & Lamoniarius (s) distentum quidem invenerunt; sed hic pure, ille albo humore instar pulvis ex amylo, ut bilis ne vestigium quidem relictum esset; cum Spigelius a copia bilis qua impleatur, adeo grandem indicaverit. Sed Franciscus Platerus (t) non modo bile non distentum, ut neque alii videntur, qui silent, sed plano vacuum in-

venit. Porro ager Plateri, ulcerata habuit intestina post diuturnum aliquot dyfenteriam; ne forte putes, non nisi in diuturna hoc accideret. Innumera autem erant ulcuscula, quippe in toto Ileo intestino, eaque trium digitorum latitudine inter se distantia, ut conferri hæc quadantenus possint cum Observatione Cl. Bassii (u) qui post dyfenteriam idem intestinum vidit ulceribus ad distantiam pene transversæ digiti, nonnunquam pollicaris articuli uno fere tractu seu serie procedentibus, quemadmodum pictura quoque (x) expressit; nisi quod Jejunum magis, quam Ileum videtur representare; descriptionem confirmante, in qua eadem quæ paulo ante indicavimus, Peyeri placita comprobantur verisimili conjectura, quod cum illius dicti glandulosi plexus deessent, horum autem sedes singulas occupare viderentur singula ulcera, credibile fieret, initia erosionum in istis plexibus qui tandem omnino consumpti essent, extitisse. Quin Brunnerus in ea Observatione (y) in qua plus sexaginta numeravit ulcuscula, non alibi hæc, quam in ipsis plexibus, sedem habuisse, testatus est. Sane autem in alvi fluxibus per has potissimum, aut alias glandulas irruere humores in intestina, ipsarum etiam magnitudo ostendit, ut in aliis quibuslibet dum plus fecerunt, adaucta, in quo post diuturnum alvi fluxum idem Brunnerus (z) circa finem Jejunii intestini ulcera deprehendit, non modo ibi pariter tubera vidit glandulosa, sed & intestinorum tunicam interiorem crassam faciam, & quæ a principio usque ad exitum tota quantæ glandulosa, glandulisque luxurians videretur. Et de suis Duodeni glandulis (a), solent, inquit, crassiores esse in iis qui ex morbo intestinorum, diarrhoea aut dyfenteria moriuntur, easdemque induruisse etiam, ait (b) in dyfenteria illa in qua earum oscula arrosa vidisse, diximus.

16. Cæterum hæc ultima Brunneri Observatio, & duæ quas paulo ante (c) ex Platero, & Bassio retulimus, & pars illius quæ sub initium hujus Epistolæ (d) ex Valsalva proposita est, vel solæ satis ostendunt, præpropere scriptum esse a Panarolo, sicuti hic in Sepulchreto (e) habes, in superioribus dyfentericorum intestinis non posse fieri exoriationem & corrosionem, ut accidit in crassis, præpueque in Colo. Video quidem in plerisque Observationibus, quas inter duæ illæ etiam sunt Cl. Fantoni (f), sic esse repertum, & facile Panarolo crediderim, sic pariter in sectione fuisse quamplurimum quos indicat: ejus quoque rationi altipulbor, humorem corrodentem in Tenuibus intestinis facillime fluere; in Colo autem ob cellulæ resistere: quin etiam addiderim, in Tenuibus sæpe chyli, sæpius remedium aquæ, & mucilaginosæ portione admixta temperari; in Crassa autem intestina, postquam illa fecesse maxima ex parte in vasa chyli, tunc ipsum descendere. Hæc, inquam, omnia & video, & fateor. Attamen, ut rationes alias omitram quibus oppositum interdum accidere posse, ostenderem; nulla non dico rationum vis, sed ne Observationum quidem tanta multitudo esse potest, qua id quod reapse aliquando conspectum est, fieri non posse, evincatur.

17. Sed si in Tenuibus, si in Crassis intestinis sint ulcera; satis ex his cunctis Observationibus apparet, in iis dyfentericis in quibus habitæ sunt, exulcerata fuisse intestina. Num vero in iis quoque dyfentericis quorum non liceat dissectionem instituire, ideo exulcerata credenda sunt, quod cum cruore quadam quasi mucosa, ut ait Celus (g), & carnosa interdum egresserint, operæ pretium est diligenter considerare. Et olim quidem non dubitabant, quin ab ipso hujus morbi initio corpora quadam pingua excernerentur, quæ intimam esse pinguedinem intestinorum, censabant. Quorum errorum illi rejecerunt qui non ad intimam, sed ad extimam intestinorum faciem pinguedinem esse, demonstrarunt, & cum ipsis Casparus Hoffmannus (h), qui etiam alvo egestum quoddam corpus albicans quod exliccatum aserebatur, pro pinguedine perperam haberi, ostendit, quia flammam, ad quam admovebatur, nullo modo conciperet, flammamque prorsus inodorum emitteret. Nunc autem quæ indidem egesta, factio hujusmodi periculo revera adiposa deprehenderunt Tulpius (i), ac Stalpartius (k), non desunt Viri Docti qui procul dubio provenisse doceant ex ea pinguedine quæ in cellulosa est exteriori intestinorum tunica. Mihi vero ubi nulla, ut in iis casibus, aut tabifica colligationis suspicio sit, aut profundæ intestinorum exulceratio-

nis; minus displicebit cum Stalpartio, & quem hic citat (l), Riverio ejusmodi pingues dejectiones a pinguibus largius devoratis, neque consecutis repetere; tunc a cellulosa illa usque tunica repetiturus, cum ulcera esse, agnoscam quæ pinguedini aditum in cavum intestinorum aperiant, si modo hæc in puris tunc, aut ichoris modum non prodeat. Sed quia multo rarius, ac tardius in dyfenteria intestina exulcerantur, quam alba ista quæ pinguedo credebatur, materia appareat; quid igitur ipsam esse, aut unde dicemus? Nimirum mucosam, ut Celus quoque, sicut paulo ante dictum est, appellavit, & vocitant recentiores, si minus crassa sit, aut si magis, etiam polyposam. Scilicet ut irritata vesicæ glandulæ, sic glandulæ quoque intestinorum plus secernunt humoris sui, eumque non qualem solent, cum recte valent. Itaque mucosa, & alba utrobique apparet materia. Quod si insuper ea in sanguine dispositio sit, ut facile in polypos coalescat, erit ille humor magis ad concrendum pronus, eoque magis ubi ejusmodi sanguis, in cavum intestinorum aut exsudans, aut effusus, ad illum se addiderit. Sic enim dum sanguinis pars in Coli intestini cellulis resistit, fecedente aquea, & subsidente rubra portione, ea quæ relinquuntur sanguinis, ut vocant, fibræ facile poterunt in concreciones polyposas compingi, quæ sua albedine, ut toties olim in corpore, aut vasis fucum fecerunt, & pro pinguedine acceptæ sunt, ita mox cum recrementis detruant, hic quoque pro pinguedine haberi poterunt.

18. Alterutra igitur, vel utraque, vel aliqua etiam ratione alia ex iis quas indicavit Lancisius (m), poterit pro varia ægotantium constitutione, & pro varia morbi natura, & tempore, ac loco denique, & modo quo lentæ retineantur, disponanturque materię, non solum origo intelligi pinguium istorum, ut videbantur, corporum, sed & ramentorum, imo & grandium quæ egeri dictæ sunt, membranarum, facillime autem quorundam ex illis aliis corporibus quæ carnosa a Celso sunt appellata, si videlicet non tota rubra sanguinis portio sit ex ejus albis coalescentibus fibris expressa. Unde etiam intelligas licet, quam caute uti oporteat illa Hippocratis (n) prædictione: *A dyfenteria habito si veluti caruncula exeat, lethale est*; nec sane is qui de polyphis præclare egerat, illud prætervidit Doctissimus Palta (o). Cæterum quam nunc mucosam, aut polyposam materiam dicimus, eam Majores piuriosam fere, ac viscidam vocitare consueverant, & aliqui in his etiam quæ hic explicamus, agnoscere. Sic, ne multo vetustissimos quæram, animadverto, Jacobum Berengarium (p) hæc scripsisse: *Et ego vidi in intestinis meis generari coria ex flegmate, & carnem flegmaticam aliquam inter rubeam ad quantitatem notabilis nucis*. Nec aliam Fernellius (q) materiam credidit firmi illius corporis, medioque ductu pertuli quod pedis longitudine egressit Caroli V. Imper. Legatus, sic pristina valetudini restitutus. De Gabucino, & Platero sileo, quorum sententiam commemoravit Sennertus (r), nec Lancisius ignoravit, cum utrumque ultro fassus est (s) ante se teneas intestinorum quadam vermes non esse, docuisse. Ipsum autem Sennertum (t) vel magis laudo, quod ejectiones dyfentericis qui convalescant, membranas mucosam esse excrementum, censuit, quod in intestinis hanc formam accipiat; neque necessarium esse, ut ipsum seu sua, seu sanguinis admixti forma semper excernatur; sed posse aliam induere; nam videmus quotidie, inquit, *fibras sanguinis in aquam calidam effusas albescere*. Vides, ut propius ad id accesserit quod magis diserte anno demum 1685. indicabit Zollicoferus (u), cum videlicet de iis polyphis verba faciens, qui extra alveos sanguinis reperiuntur, & in illis de polypo tunc reposito a Sponio in pelvi renali, quo forte, ait, etiam referri posset concretio illa pituitosa, quam Justus Lipsius per alvum, intestinorum forma, & illa ipsa esse autumans excerevit. Quod ipsum denique disertissime, nec dubitantis in modum, præclare ac multifariam illustravit, & confirmavit Lancisius.

19. Apparet igitur, posse in dyfenteria pingua ad speciem corpora, & carnosa, & membranæ quoque desici, nullo ulcere intestina afficiente: quanquam Sennertus (x) neget, se, & Cratonem talia videri, & membranas quas describunt alii, videre potuisse, etiam ubi essent ulcera. Hæc enim fuerant certe in iis quorum ipsi minus credibiles videbantur sanationes a Meischnero, (y), & Saxonia

(u) Obs. Anat. Chir. Med. Dec. 3. Obs. 7. (x) Tab. XI. Fig. 1. (y) supra ad n. 13. (z) e. 7. ibid. cit. (a) in ear. demonstratione anatomica. (b) ibid. (c) n. 13. (d) n. 2. (e) Obs. 15. (f) supra, n. 13. (g) supra ibid. (h) Apolog. pro Gal. 1. 2. S. 4. c. 122. (i) Obs. Med. 1. 3. c. 13. (j) Diff. de tripli. intest. polypos. (k) S. 4. Aphor. 26. (l) in Not. ad hunc Aphor. (m) super Anat. Mundin. Comm. 7. (n) Pathol. 1. 6. c. 9. (o) in Not. ad hunc Aphor. (p) Diff. cit. Epist. 3. ad Biancardi. (q) qu. cit. (r) Diff. de Polypo cord. S. 6. (s) qu. cit. (t) apud Schenck. Obs. Med. 1. 3. ubi de Dyfent. Cur. Obs. 4.

xonia propofita. Illius enim æger cum pure fæpe excreverat membranas *spithamæ longitudine*; hujus autem ægra *ulnæ longitudine* membranam ex Recto intestino exulcerato. Equidem in Pantheo, quod citat Sennertus, quid Saxoniz nomine editum fit (z) minus attendendum crediderim post iustas hujus de Panthei editore Uffenbachio querelas (a), præsertim cum in Prælectionibus Saxoniz Practicis, quæ hic postea editæ sunt, nihil a me quidem istiusmodi reperiatur, sed hoc tantum (b); quod & ipsum Sennerto displicet; Saxoniam quatuor vidisse dysentericos in quibus in dies exercebantur portiones intestini tam magnæ, ut fæpe excederent mensuram trium vel quatuor digitorum; ex quibus duæ mulieres sanatae sunt. Harumque una fortasse fuit, quam sibi Patavii a Præceptore Saxoniz Casparus Hoffmannus (c) scribit ostentam quæ in dysenteria excreverat partem intestini palmum longam, videlicet, ut opinor, si universæ illæ excretae portiones conjunctæ intelligerentur. Illud tamen ibi egregie fecit Sennertus quod ultro fassus est, multa fieri posse quæ ipse non vidisset. Sane si perpauci anni additi essent ejus vitæ; Tulpii (d) legisset Observationem qui ab acerbis intestinorum torminibus eorumque exulceratione accidisse vidit, ut tota intestini Recti interior membrana ita ex hoc prodiret, ut inde pendula ab ipso, & pluribus Medicis duos tresve dies spectari potuerit, prohibente illius firma ad podicem adhesionem celeriore delapsam. Sed & mihi hic obtingit Kalendis Junii A. 1729. ut obconfimilem casum enixe rogaret ut Hebraum Mercatorem Jacobum del Vecchio consilio juvarem meo. Huic in febris malignæ declinatione dolor ad Rectum intestinum molestissimus obortus erat cum ponderis, & impedimenti sensu; & denique cum sanguine exire nuper ex ano inceperat, quam inde pendentem conspexi, crassa quædam, ut videbatur, membrana, ad sex digitos transversos longa, pollice latior, colore ex cinereo livida, ut gangræna tentata membranae solent: neque excedebat tamen, quippe intra intestinum continuata, eique annexa, quantum animadvertere Chirurgus poterat, lenissime explorans; nam etsi ab ejus exitu dolor factus erat mitior; sanguis tamen subinde prodibat, febris autem ea hora major erat, quam mane fuerat. Itaque iis quæ visa sunt convenire, cum seniore ægri Medico tunc constitutis, discessi. Hic autem infectis diebus certior me fecit, excidisse membranam, per sphincteris potius contractionem, ut videbatur, abruptam, quam integram: sanguinem iterum, & prævum ichorem exiisse; singultum, qui omnes perterreret, accessisse. Sibi tamen aliquam propterea spem superesse, quod meminisset ægri patrem, cui jam grandævo, similis, sed brevior, membrana e podice exciderat, se medente, evasisse, cum hoc quidem ut recrementa continere postea non potuerit: hunc autem filium; etsi in parente neque maligna febris præcesserat, neque singultus accesserat; annum tamen vix ageret quadragesimum quintum. Nec spes fessellit probabilem illum Medicum, cognomento Marina, quocum iterum statutis iis quæ, ut res tunc se habebant, ad priora addi possent, factum est ut pure dejecto, nec paucio, ægrum extra lectum viderim pridie Nonas Julias, jam vires, & corporis habitum, coloremque manifeste reparentem, nec facies modo, sed & ea quæ injiciebantur retinentem. Dolor quidem aliquis tum etiam erat; sed is plane levior, neque in ea ipsa sede amplius, in qua antea fuerat molestissimus. Itaque bicetiam, ut æger Tulpii, atque alii quos, brevitatis gratia, sciens prætereo, sanatus est, atque adeo sanus adhuc vivebat, cum hanc historiam ex scripto dictarem sub finem A. 1747. (e)

20. Etsi vero hos evaluisse, constat; tamen si ex me quæras, an æque constet, veras membranas deiecisse, facile negabo. Neque enim video satis earum naturam quasitam esse, quod fortasse, ut mihi, ita aliis quoque non licuit in corruptis fracidisque corporibus. Video autem, etiam ubi ulcerata intestina sunt, imo ibi facilius polypofas formari posse concretiones, five teretes, quales trium aut quatuor palmorum longitudine se vidisse a dysentericis excretas, affirmavit Lancisius (f), five planas membranæ forma, qualem unum ferme palmum longam, egestam a Matrona conspexit ulcere intestini Recti laborante, ejusdemque esse generis, suspicatus est Vir Cl. Joseph Ant. Pujatus (g). Sed priores illas ut con-

stare nego fuisse membranas, sic constare nego non fuisse, easque præsertim quæ intestino magis adherere, quam polypi soleant, visa sunt. Atque ut meam tibi opinionem aperiam; credo, posse interioris tunicae intestinorum partem aliquam morbi vi separari, atque excidere haud aliter ac fæpe videmus, idem contingere a fervidiorum alimentorum contractu ei membranulæ quæ oris partes convelluntur. Quod certe fit sine ulla, nedum sine plurima sanguinis effusione, sine convulsionibus, aliisque perniciosi incommodis quæ timent nonnulli ab innumeris vasculis, nervisque ad intimam tunicam intestinorum pertinentibus, si quidem hæc separari credatur; cum tamen ad intimam quoque oris tunicam maximus pertineat vasculorum numerus, & nervulorum. Nec dicas, eam quæ tunc in ore abscedit, membranulam cuticulæ esse continuationem, aut certe ei proportionem respondere. Nam idem qui in prolabiis, & buccis hanc epibeliæ vocavit, ejus similem epibeliæ in gula quoque, stomacho, & intestinis ostendit Ruyschius (h), itaque me, si de alia parte non vis, de hac saltem loqui, credito, quam humorum acrimonia, aut post inflammationem superficiali gangræna ab reliqua interioris tunica parte solvat, & recrementis secum abripiendam, & devolvendam relinquit. At enim aliquando membranæ deiciuntur, inquit, ut Saxoniz (i) loquitur, satis crassæ; cuticula autem est tenuis. Utiq;e, nisi humore plurimo imbuatur; hinc enim fieri, censuit Cl. Fantonus (k), ut fæpe eam videamus ex vesicantium usu crassefcere adeo, ut inde in plures laminas esse divisibilem, aut constare ex spongiosa substantia conjecerit. Quod si rem ne sic quidem satis a me explicari, contendas; at tu vicissim mihi explica Benevoli Chirurgi Experimentissimi Observationem (l) detracti ex ano canalis membranæ longi digitos transversos ad sex, latum quantum solet intestinum Rectum, crassi autem adeo, ut ani sphincter at totus, aut pene totus cum eo canali excidisse videretur; & sane cum ad intestini ulcus, & cætera quæ ab eo pendebant incommoda, tum ad assiduam quæ ab illius canali exitu relicta fuerat, retinendorum excrementorum impotentiam medicis, & chirurgicis præsidis tollendam anno propemodum opus fuit. Quæ igitur ratione tam crassam intestini partem salva vita excidere potuisse, intelliges, eadem intelliges multo facilius, quæ tanto minus crassa interior tunica nonnunquam exciderit. Si hoc autem vel in iis qui evaserunt, facile agnosces; quanto in illis magis qui perierunt? Et vero si militi affluisse de quo Bontius, aut ægris illis de quibus Sylvius in hac XI. loquitur Sepulchreti Sectione (m), & membranas quas facile in lethali dysenterico fluxu egerant, vera esse interioris tunicae frusta, dixisset; num incisus eorum cadaveribus, te tui dicti penitusisset? Minime gentium. Cum Sylvio enim abrasam hinc inde eam tunicam, cum Bontio autem plane abrasam invenisset. Num undique? Quod satis diserte Bontius non dicit, Piccolhomini (n) dicit in Observatione, quæ quocunque modo intelligatur, digna erat certe quæ in Sepulchretum referrentur. In dysenterico enim immaniter cruciatus, qui primo cibos capiens levi quodam horrore quatiebatur, vidit totam & ventriculi, & intestinorum tunicam interiorem, a summo ad imum (mirum visu, auditu, & creditu) abrasam; quod autem reliquum erat, & apparebat, carnosum videbatur, inquit, ab ore ventriculi ad podicem usque, ut dices, esse veluti fasciam latam totam carnosam; ventriculum item tanquam vesicam quandam totam carnosam. Sed de hac Observatione, in qua, ut ea quæ mox subjicit, ostendunt, carnearum fibrarum inflammationem Auctor ipse agnoscebat, infra quoque (o) merito fiet.

21. Nunc quando satis superque ostensum est quæ a dysentericis ejiciuntur membranæ forma, fæpe falsas, nonnunquam veras esse membranas, nec nisi cum verè deprehenduntur, intestina exulcerata significare; eadem proportionem ostendenda esset de iis pariter quæ ad speciem carnosam egerantur, nisi jam supra (p) satis esse indicatum, quomodo polypi hæc quoque referre possint absque ulla intestinorum exulceratione. Unum igitur commonstrandum relinquitur, non semper ex falsa carne ea corpora omnino compingi, cumque id ex eorum constabat examine, ulcus aliquod intestinorum esse ponendum, si modo in ventriculo indicium ulcers nullum sit: quod ob verrucas illas, ut Arabes vocabant, excipio, de quibus Epistola scriptum est XXIX. (q). Ibi autem etsi carnes excrecentias esse posse dixi-

diximus sine exulceratione, cum abruptuntur tamen, & excidunt, ulcus fieri debere in eo unde abruptæ sunt, loco, id vero neque negavimus, & per se manifestum est. Porro tunc ita de ventriculo verba faciebamus, ut eadem transferri posse ad intestina, appareret, imo quandam Avenzoaris verrucam ob magnitudinem quam in ventriculo, si epigastrium tangeres, habere videbatur, non in isto, sed in attiguo potius Colo natam esse, suspicabamur. Quam suspicionem juvat hic exemplis ejusdem in universum generis ita confirmare, ut simul denique id quod proposuimus, ostendamus. Jo. Baptista Cortesius (r) locum Galeni proferens ex quo intelligatur, non modo indurata sterora, sed & moles aliquid corporis præter naturam in intestinis existentes, jam ab eo recensitas fuisse inter causas quæ alvum obstruant. Galenicum dogma hac sua Observatione confirmavit, habita in cadavere Comitissæ de Caldarinis Patriciæ Bononiensis. Scilicet in cavitate Coli intestini reperta fuit ingens portio carnis, quæ sua mole erat impedimento, quo minus excrementa descendere possent. Ex hujusmodi morbo male intestinorum compositionis interemptus est. Quam ego causam maximè, ut ipse ait, considerationis hic tibi volui Auctoris verbis ob id etiam describere, quod in eorum Catalogo quorum Observationes in Sepulchretum sunt relate, ut Piccolhomini, ita & Cortesii nomen frustra quævis: itaque nec Observatio hæc in Sectione XIII. quæ de Adstrictione Alvi inscribitur, usquam invenitur; sed ejus loco alia quædam (s) memoratur Willisii, quasi constaret, excrecentias quasdam carneas, quæ intestinorum majoribus instar auricularum muris adnascantur plurimè ex utroque intestinorum Coli, & Recti late ad certa quasi studia instar ramorum arboris gemellæ prodeuntes, quasi, inquam, constaret, non exterius has, ut mihi quidem videtur, fuisse, nec fortasse aliud quam Adiposas Coli, Reliquæ Appendiculas, in quibus, absumpta pinguedine, sanguifera vascula ruberent: in tabido enim Viro hæc observabat Willisius, qui simile quiddam in alio tabido conspexisse se, ait. Sed perinde ac si certum esset, interiora tenuisse, & sic alvi adstrictionem fecisse, casus puelli in Scholio subjicitur, qui egesta massa carnea ingenti & notam servante qua intestinis adhaererat, a pertinace alvi obstrukione liber evaserat. Tu vero aut Willisio inspecto, aut alio Sepulchreti libro (t) in quo fufius Viri ejus historia proposita est, cum ea quæ dixi, recognosces, tum illud in primis intelliges, qui spuria paralyfi teneretur totius corporis membra quævis occupant, ut nullam fere se movendi facultatem haberet, in illo alias præterea causas alvi, nisi irritaretur, adstrictæ, magnopere non fuisse quærendas. Verum ut ad excrecentias quæ certe in cavo essent intestini Coli redeamus; præter carnosam illam, quam in Sepulchreto frustra quærimus, intestinum colon interceptientem, ab Joanne Rhodio (u) in Monacho adnotatam, qui colicis doloribus cum vomitu obyli vexatus, clysteres sine excrementis reddebat; unius, sed maxime huc attinentis, exemplum est in altera de duabus illis Cl. Fantoni Observationibus quas supra (x) tantummodo nominavimus. In viro quem gravis dysenteria tandem interfecerat, non procul a Cæco ulceratum Colon invenit, unde purulentus, & sanguine permixtus humor manabat; ibique præterea carnosum, crassum, & rotundum corpus, transversos fere octo digitos longum, quod tenui principio exortum, coque uno tanquam pediculo alligatum ulcerosa tunica, cæterum in tubo intestinali pendulum non modicam ejus partem occupabat: magnum, inquit, intestini polypum dices; id enim totum corpus libere unius medicæ pondus superabat. Excrecentiam hanc cum ulcere, & facile, ut in longa dysenteria, ab ulcere fuisse, vides: nec dici ideo magnum polypum potuisse, quod polyporum de quibus supra dictum est, naturam haberet, sed quia nati polypum, a cuius similitudine sunt illi appellati, non figura modo referret, sed natura quoque; hanc enim folers ille cautissime Anatomicus carnosam pronuntiavit.

22. Nec tamen dubito, quin excrecentiæ intestinorum interdum possint ex utraque natura constare, ut si carneis fimbriis, & inæqualibus, impolitique superficiebus adherere incipiant viscida puris, aut succi intestinorum, aut sanguinis effusi particula: hisque aliæ deinceps, aliæque, ut radix, & nucleus ex vera sint carne, circumjectum autem adjunctumque molis corpus, hujusque appendices ex non vera. Consultus sum A. 1736. pro Nobili Viro, qui post fæpe repetitas sanguinis dejectiones, mox cum bilioso alvi fluxu, & assidua, primum levi, deinde acuta febre conjunctas, cum hæc, & gra-

via ejus symptomata ab remedium maxime convenientium usu nihil remitterent, imo illud eorum quoderat præ cæteris grave, nempe ventris dolor, ex acerbore repente factum esset acerbissimum, post multum sanguinem egerat. Chirurgi manu adjuvante, corpus quoddam longitudine propemodum palmi unius, & semis, crassitudine autem, & figura aliis in partibus alia. In summo enim informe caput referebat quasi ranæ grandioris, ore hiantes; reliquum corpus exterius ferme teres, intus cavum, erat transversos duos digitos crassum donec paulatim gracilescendo in caudam defineret, semipalmum longam, & prope extremum bifidam. Qui meminere, quid in extrema ferme censuerim Epistola superiore (y) de ranis, bufonibus, lacertis ano ejectis, facile existimabis quid crederem cum ea legerem quæ modo referebam: nec vero occasio hic ulla erat suspicandi quod de Molitore quodam (z) scriptum leges, cujus dissectio ob recrementa semper chylosa per seculumnum egesta, digna alioquin est quæ inspicatur, & cum iis quæ de Cœliaco fluxu supra (a) attigimus, pro veri studio conferamus. Dicebatur autem per dormientes os bufo irrepsisse, multumque intus nocuisse, donec per alvum deturbatus est obesus & mortuus: quem utinam Præcl. Observationis Auctor teterrimo, noxiæque fetore minime prohibitus esset per se attente inspectare, & scalpelli ope examinare. Certe autem quod ad nostrum attinet, doctus quoque Medicus a quo consulebar, spretis vulgaribus opinationibus, ad Lancisianos polypos ejusmodi corpus attinere, arbitrabatur. Attamen cum præter fibrosam exteriora ligamenta per quæ intestino videbatur annexum fuisse, mollem & distractilem substantiam atri fere coloris describeret ex qua constabat, eamque ex fat validis fibris quibus variæ glandulæ interjicerentur, compactam; cum sanguinem qui antea effluerat, nec semel ad libras, eo detracto corpore, defuisse, memoraret, purulentas autem albicantes, subcinereas, gravissime olescentes successe materias, quæ recrementorum exitum modo præcedebant, modo sequebantur, & maximo semper cum dolore, hæque, & acutam febrem perstitisse donec vulnerariis datis remediis, quæ deinde balsamica exceperunt, ipsæ, & incommoda reliqua primum minuerentur, & denique tollerentur; ut nulla a me ferme, nisi quæ ad præservandum faceret, eger (qui multos postea annos vixit) postularer; eo inclinavi animum, ut conjicerem, initium, & radices istius corporis excrecentias fuisse prope extremum intestini Coli obortas. Hanc enim sedem dolor ille acerbissimus indicabat, qui nimirum ubi Colon priusquam in Rectum destinat, quoddam solet habere flexus, infra umbilicum incipiebat, illinc autem Mesocoli adhesiones secutus, ad dorsum usque extendebatur. Eas igitur radices, cum erodi, exulcerari, abruptum ceperunt, sanguinem effudisse, cum vero profundius, & circumcirca, dolorem insuper, & cætera crevisse: interea autem sanguinis destillantibus fibrosis, aliasque viscidiores partes excrecentiis adhæsisse, easque auxisse, conjunxisse, in eamque speciem qua penitus denique avulsæ exierunt, conformasse. Quoniam tamen ex ejusmodi corporibus quæ per anum ejecta legi, vix unius modo venit in mentem, a Peyero (b) memorati, quod vasis sanguineis fuerit præditum; sicuti ubi aliquod his prædictum vasis præclare videam, pro certo ad excrecentias referendum esse, pronuntiabo; sic contra, probe conscius, quam facile a polyposis concretionibus fieri fucus, & imponi multifariam possit, non nisi suspicando, & conjiciendo, aliquid ejusmodi, de reliquis respondebo, quæ aut veris illis vasis careant, aut cauti, experientisque Chirurgi judicio pro certissimis excrecentiis non agnoscantur. Sic Valsalvæ olim credidi, cum mecum sanguineos ichores inspiciebat a dysenterico desperato egestos, in iisque frustulum quoddam, si coloris dumtaxat crederes, nihil nisi grumum sanguinis representans, ille ubi perattente examinavit, penitusque perpexit, pro ulcerati intestini excrecente particula sine ulla dubitatione agnovit. Sic etiam Viro peritissimo Molinello (c) credidisse, si cavum corpus, spithamam longum, quod homo diu multumque dysenteria cruciatus, ipse sibi ex ano eduxerat, ex fungosa ulcerum carne esse, pronuntiasset, id quod, ut est prudens in primis, cautusque, minime voluit, sed ei carni baud ab simile tantum dixit. Neque aliud spectavit fortasse Cl. Struvius (d), qui cum æque longam, & pollicem latam membranofo-carneam, ut diserte ait, quandam massam cum multa

(z) Panth. l. 3. c. 23. ut citat. Sannert. (a) Vid. Saxon. Præf. ad libros 3. de Pulsib. (b) P. 2. c. 19. (c) c. 125. cit. supra ad n. 17. (d) Obs. Med. l. 3. c. 17. (e) imo Vid. etiam Epist. 65. n. 6. (f) Diff. cit. Epist. 1. ad B. ancard. (g) Dec. Medic. Obs. n. 6. Obs. 1. (h) Theat. Anat. 7. n. 40. (i) c. 19. supra ad n. 19. cit. (k) Anat. corp. hum. Diff. 2. (l) 18. delle Quantità. (m) n. 17. & 18. (n) n. 16. & 17. (o) Obs. 6. & 16. (p) l. 2. Anat. Præcl. 15. (q) n. 26. (r) Miscell. Med. Dec. 4. c. 8. (s) Obs. l. 5. d. 4. (t) l. Sect. 13. Obs. 1. (u) Act. Hafn. Vol. 4. P. 1. pag. 86. (x) n. 13. & 16. (y) n. 21. (z) Eph. N. G. Cent. 3. & 4. Obs. 103. (a) n. 4. (b) Exercit. l. de Gland. intestina circa finem. (c) Vid. Comment. de Bonon. Sc. Acad. T. 2. P. 1. inter Medica Obs. 2. (d) Aft. N. Cur. T. 1. Obs. 195.

(r) Miscell. Med. Dec. 4. c. 8. (s) Obs. l. 5. d. 4. (t) l. Sect. 13. Obs. 1. (u) Act. Hafn. Vol. 4. P. 1. pag. 86. (x) n. 13. & 16. (y) n. 21. (z) Eph. N. G. Cent. 3. & 4. Obs. 103. (a) n. 4. (b) Exercit. l. de Gland. intestina circa finem. (c) Vid. Comment. de Bonon. Sc. Acad. T. 2. P. 1. inter Medica Obs. 2. (d) Aft. N. Cur. T. 1. Obs. 195.

multa pinguedine intertexta, fortissimo nifu indidem detrusam, proponeret; dubitationem, ut opinor, ostendere voluit suam, hunc Observationi titulum præfigendo *De massa polyposa per alvum excreta*: & præcellerant tamen ea quæ non secus ac dysenteria, potuerant excrementi carniæ iustam suspicionem movere.

23. Dum hæc ostenderem, posse in dysenteria egeri cum sanguine adiposa, membranæ, carnosæ corpora, nec intestina tamen esse exulcerata propterea quod ea corpora sæpenuero non sunt reapse quæ videntur; subinde veritus sum ne forte ipse mirareris, non videre me, vel solum sanguinis exitum satis indicare erosa, aut rupta ejus vasa; ut exulceratio aut jam facta, aut inchoata saltem, necessario sit agnoscenda. Verum si forte miratus es; mirari continuo defines, cum hæc quæ paucis perscrutabor, attenderis. Est Cl. Wagneri Observatio (e), in qua cum alia in dysentericæ visceribus a se conspecta proponit, in hisque illud pro Spigelio adnotandum (f), vesicam bilis fuisse turgidam, tum hoc præsertim, nihil usquam intestina habuisse vitii, nisi quod cuncta pariter tenuia, & crassa omni humore mucoso destituebantur, & Rectum erant gangrænosum. Quod si ullum in ipsis adnotasset ulcusculum; tum vias sanguinis quem ægra deiecerat, querere non debuisset in extremis ipsis venarum osculis, quippe quas scirrhusæ in mesenterio glandulæ, spasmiq. contrinxissent, ut sanguis immediate per ea oscula intestina regurgitaret non secus ac cœruleus in easdem venas injectus humor, cœrulei sudoris indicium tunc ipsi exhibuit intra intestina manifestissimum. Præterea est Observatio Whartoni, a Glissonio proposita in Tractatu de Ventriculo, & Intestinis, quæ cum aliquantulo aliter in Sepulchreto (g) ex Tractatu eodem describatur, nullo certo hujus indicato loco; si a te legetur cap. 23. n. 11. ostendet, post enormem, a pharmaco, sanguinis vomitum, nullam in ventriculo, qui nonnihil sanguinis vel post mortem continebat, comparuisse venam sine rupta, sive exesam, sed dorso cultri interiore tunica deterfa, tunc innumera sanguinis punctula in superficie deterfa sensim comparuisse. Num vero detersione istiusmodi, ut censet Glissonius, quasi cuticula quadam abrafa fuerit, neque aliter in vivente pharmaco egerit, cum ipsa quoque interior tunica non secus ac cutis derafa cuticula, cruenta cerneretur; an potius sanguinis copia quam pharmaci violentia acciderat, dilatata extremæ arteriorum viæ & sanguinem paulo ante effuderint, & tunc dorso cultri quidquid sanguinis habebant reliquum, exprimente, protulerint, malum, te ex iis quæ Boerhaavius (h) non uno loco de anastomosi scripsit, existimare, quam ipse dicere. Exempla attende quæ ibi profert, & alibi etiam, ut puta cum de retento menstruo sanguine per alias vias emissio verba faciens, (i) vidi, inquit, hujusmodi hæmorrhoides, quæ in consuetudinem abierat, ut sanguis floridus singulis mensibus, absque detrimento sanitatis, cum levi fuscilla excrearetur. Vidi ubi vomebatur sanguis: vidi per alvum deponi, & per sudorem. Confer insuper exempla alia, quæ bene multa addit ad singula ista Eruditissimus Hallerus (k); & in quocunque inventis id factum absque detrimento sanitatis, absque exulceratione pariter factum credito non secus atque cum per sudorem sanguis exibat, cutem ibi integerrimam visurus fuisses, neque aliud in hac deterfa, quam innumera illa sanguinis punctula quæ in deterfa ventriculi interiore tunica conspexit Whartonus. Transfer hæc a ventriculo ad intestina, & sine horum exulceratione, sanguinis fluxum intelliges. Aut si adhuc nonnihil hæres; sepone jam Observationem istam Whartoni, & præter exempla quæ dicta sunt, fac tibi sanguinis fluentis & naribus veniat in mentem. Num ruptæ semper, aut exesæ venæ, arteriæve? num exulcerata semper narium tunica? Si illa rupta, aut exesæ; qui fit ut sanguis sæpe nullo prorsus remedio adhibito, per se subsistat; Si hæc exulcerata; quomodo nihil, non dico puris, sed ne doloris quidem consequitur? Nunc quod in narium tunica fieri, intelligis, idem cogita fieri posse in tunica intima intestinorum, præsertim cum injecti per arterias humores facile adeo per utramque tunicam in narium caveas, & intestinorum trajiciantur (l). Pone igitur auctam sanguinis copiam, auctum impetum, latiores autem factas in iis præcipue qui natura laxas antea habent, arteriarum ad intima intestinorum ultimas vias aut resolutione quadam, aut causa alia aliqua, ut puta nimia in alvi profuvis humectatione; nec difficile cum Boerhaavio

sanguinem illinc effluere per anastomosi, intelliges. 24. Vide autem, ne unum dumtaxat, sed plura simul eorum ponas quæ dicta sunt. Nam cum Boerhaavius sic docet (m): quando sanguis per portarum venam, ejusque ramos nequit transire, tunc ipse purus sanguis per anastomosi ex vasis mesentericis effundi potest; nisi hæc continuo adderet, quorum oscula dilatata sunt: dubitare aliquis posset, qui Ortlobium (n) legisset, constricta vinculo in vivis canibus illa vena, sanguinem ad intestina sincerum prorumpere, nunquam se observare potuisse, quamvis tota intestinorum tunica coccineo quasi colore imbueretur. Nimirum in fanis iis canibus vasorum oscula non erant dilatata. Erant autem vel maxime ob circumjectarum fibrarum laxitatem in Comitibus illius de quo ibidem loquitur Ortlobius, intestinis sphacelatis; in his enim venas mesentericas orificiis apertis, sanguine grumescito, quasi cera revertisse, biasse, vidit. Hæc autem attigi propterea quod aliquando in dysenteria vera inflammatio adeft, & fenestra gangræna sequitur, ut paulo post illa quæ retulimus, scripsit Boerhaavius (o). Et sane vera scripsisse, ostendunt in Sectione hac Sepulchreti XI. complurium Observationes (p), Valsalvæ autem præteream, quæ superius (q) allata est, hæc quoque altera confirmat.

25. MULIER ex dysenteria moritur. INTESTINA reperiuntur inflammata. Huic mulieri rem sinister omnino deerat; supplebat autem dexter, duplo quam secundum naturam major, duplici pelvi, ac duplici uretere instructus. Ureter autem uterque ad dexteram tendebat vesicæ partem.

26. Sepositis iis quæ a primordiis fuisse, intelligis; ad dysenteriam attinet intestinorum inflammatio. Revoca nunc ad memoriam, & cum hac Observatione, alique conjunge quam ex Piccolhomino supra (r) descripsi. In ea namque sive abrasio tanta fuit, quæ Observatori ipsi usque adeo mira visa est, sive potius cum abrasione, si vis, non modica, inflammatio ejusmodi, ut quemadmodum in Ortlobii canibus (s), tota intestinorum tunica multum ruberet; certe Piccolhomini quoque inflammationem agnovit. Cum autem hæc esse non possit quin sanguinis transitus per illos venæ portarum ramos impeditus intelligatur; quid hinc consequi posse, dixerimus (t), si aliquid aliud accedat, jam nostri, vel prius quam intestina, impetu sanguinis adhuc persistentem, vergere incipiant in gangrænosam laxitatem. Sic Brunnerus (u) in milite quem diarrhœa laborantem supervenientes sævissimæ convulsiones occiderant, simul per totum intestinum, Tenuium præsertim, tractum, insignem qua nec ventriculus carebat, inflammationem, simul in hoc grumos sanguinis, in illis mucum rubundum deprehendit, indicio manifestissimo, diarrhœam jam incepisse in dysenteriam degenerare, quamvis nihil adhuc gangrænosum in iis visceribus appareret. Facile autem in gangrænam, atque adeo, ut dixi, in sphacelum transire potest intestinorum inflammatio: unde factum fortasse est quod adolescenti mihi Medicus exercitissimus narrabat, sibi aliquando accidisse, ut in dysentericis, postremis ante mortem diebus febris abissee videretur, ut si cetera non attendisset signa, turpiter falli potuisset. Verum de intestinorum morbo fallacissimo, sphacelo erit alias (x) opportunitur scribendi locus.

Nunc de membranæ dejectis sive cum sanguine, aut pure, sive absque his, sive in dysenteria, sive extra ipsam aliquid adea quæ scripsimus supra, addendum est. Desideravimus certe, nonnullarum naturam diligentius examinari potuisse. Lentilius (y) puta, quodnam esset intestinum egregie statuit, unde membranæ provenirent quæ per intervalla cum, vel sine cruore plures, paucioresve per alvum fecerent. Quod autem hæc censuit valvulæ esse conniventes, liberum cuique est credere, aut non credere; imo vel hoc ipsum, fuisse membranas. Ut enim ab ægra quantum apparet, ille aberat; nihil aliud videre potuit, nisi eas fuisse diverse magnitudinis, & quæ siccata pelliculas & vesica suilla retorrída mentirentur. At Jo. Mauricius Hoffmannus (z) cum ab alia excretas attentius examinaret, quas pro intima tunica intestinorum alii acceperant, mucum esse agnovit viscidiorum supra valvulas conniventes coagulatum, & in speciem membranæ condensatum: neque ab eo discrepat, Actor. N. C. Volumine V. (a), Cl. Treylingii judicium de examinata ab ipso quasi membranacea vagina quadam, ab Rustica dejecta, quamvis figuram intestini Coli cum valvulis con-

niventibus adæquaret. Contra, in alio Apitius (b) minime dubitavit, quin egestæ membranæ essent frustra intima tunica intestinorum: & plura quidem vel ex earum inspectione protulit cur id crederetur: quanquam illud quod primo loco posuit fuisse tubulosa forma exa-Estis præditas, tum ea quæ modo laudata est, tum Observatio quoque infirmat Cl. Verdiesii (c), qui alio in viro penitus contemplatus, non aliud esse quam fistulosam pituitam manifestissime deprehendit, quæ convalescens, ad continentis intestini figuram se accommodaverat. Sed num dicemus, inquit, idem accidisse intra Cæcum intestinum, quod olim Beckerus (d) pene affirmabat, se vidisse dejectum, quippe corpus membranosum, digitum majorem longitudinem & latitudinem adæquans, patulum & erosum ab una, ab altera vero parte clausum? Hæc enim continuo subiecit, triplici tunica, tenui, carnosâ, ac rugosa constans. Imo quid dicemus, aio ego ad tres alias Observationes, in quibus non Vermiformis Appendix quæ a latere est videlicet, sed ipsius intestinorum tubi non brevis pars per anum egesta proponitur? Utinam Georgio Franco (e); nam ejus æger, non, ut Beckeri, aliorumque, superstes fuit, sed paucis ab ejusmodi egestionis horis decessit, permixtum fuisse in cadavere sedem recognoscere, unde integra tenuis intestini pars, spithamæ longitudine & ultra cum annexa mesenterii adhuc portione, avulsa esset, quam ipse ob conniventes, quibus intus prædita erat, valvulas, ex Jejuno esse, suspicabatur: quanquam si hujusmodi avulsio miranda est; coalitus est longe magis mirandus, quem inter eas intestini partes, unde intermedia portio avulsa est, concipere oportet in duobus aliis ægris, quorum neuter, si ex intestinis apertus aditus in ventris cavum relictus esset, superstes esse potuisset. Verum Jo. Petrus Albrecht (f) & Andreas Westphal (g) cum eorum historiam protulerunt, ingeniose excogitarunt, præcessisse intusceptionem, sive prolapsam inversæ superioris intestini partis intra proximam sequentem sic ut per inflammationem, & gangrænam abruptio prolapsæ partis non ante contigerit, quam aliqua esset in abruptionis loco inter excipiens, exceptumque intestinum conglutinatio. Nam quod ea quæ dejecta est, vera fuerit intestini portio, etiam non pauci, quod ad primam attinet Observationem dubitant, Bruchmannus autem, & Hoffmannus, quod ad secundam, aut intestini dumtaxat tunicam, aut mucum, tunica similem, crediderunt; tamen nec primæ testes defuerunt, & Docti alii Viri, in primisque Magnificus Ordo Medicorum Gryphiswaldensium, ad quos missum fuisse dicitur examinandum quod in secunda egestum est, pro hujus veritate pronunciarunt. Unum animadverti quod excogitata intusceptioni in neutra satis respondere videri possit. Nam valvulæ, ut in inverso, quemadmodum ponunt, intestino non interiori in facie, sed in exteriori occurrere debuissent, neque exteriori adhærere omenti, aut mesenterii quadam portio, sed interior: quanquam dici potest, non ut tunc erant ex facies, sed ut ante secundum naturam fuerant, esse indicatas, aut intestinum ex inverso fuisse in statum pristinum revolutum sive dum per reliquum ad anum usque canalem, inter acerbissimos dolores multifariam se agitantem, devolveretur, sive dum per ani angustias exiret, sive tandem postquam exierat, per manus ipsas examinantium. Utrumque id est, ubi cuncta perlegeris, quidquid hujus Observationibus dandum existimaveris: per me enim tibi liberum est sive cum accipientibus, sive cum dubitantibus, sive cum aliquo concedentibus facere, minus, opinor, miraberis, si quos dysentericos vel postquam veras ex intestinis aut membranas, aut carunculas egerint, posthac audiveris evasisse.

27. Etsi de Dysenteria multo plura scripsi, quam initio constitueram, tamen priusquam finem facio, ali-

quid placet addere de Tenefmo, non ut in Sepulchreto (h) hic fieri video, ab aliis causis, de quibus alibi dicitur, sed ab dysenteria dumtaxat illato. Credo equidem in hujusce fluxus sine id quo intestinum Rectum ad egerendum irritatur, sæpe in vitio ejusdem intestini non consistere, sed ab reliquiis provenire acrimiarum, & sanguinis, si hujus præsertim obsoletus in mucis sit color, in cellulis proximi intestini Coli resistantibus, ab iisque paulatim, & identidem per Rectum ad partem hujus imam, & irritationis minus patientem demissis. Mirum dictum est, quamdiu quadam, non pauca etiam, nec per se viscida, in Coli cellulis subfuisse videantur. Quæritum est ex me A. 1744. docti, atque ingenui Medici nomine, ubinam censerem, comesta pisa quinque ipsos menses in hominis ventre morari potuisse? Affirmabat enim sua in civitate virum esse qui cum Junio mense multum, ac sæpius illa edisset, correptus Octobri dysenteria, & singultu, non ante sanari potuerit, quam, Decembri ineunte, pisa ad duas libras deiecit integra adeo, ut a pluribus mirantibus Medicis plura sint eorum servata. Idem autem ejus viri patri olim, sed ad pauciores menses, accidisse, narrabant. Respondi, si hæc vera essent; neque enim rem in ea civitate, multis testantibus, pervulgatam, negare honeste poteram, præsertim qui multo difficiliora creditu apud idoneos Auctores legissem; & si duobus illis hominibus eadem esset quæ cæteris, ventriculi, & intestinorum structura; non videre me, ubi minus difficile hæreret illa potuissent, quam in Coli intestini cellulas complures dispersita: conjuncta enim viam ejus intestini, nedum Tenuium, obstruxissent, ventriculo autem oneri gravissimo, & molestissimo fuissent, quippe ad id pondus, nec mania, ut res ostendebat, nec satis fortasse antea cocta, nec ex viridibus, & tenerioribus, sed ex flavescens jam, & durescentibus. Esse forsitan iis hominibus illas cellulas natura aliquanto ampliores, & laxioribus fibris, sed certe propemodum iis esse in tubo intestinorum viscidissimas, tenacissimæque materias, ut pote qui parum adeo cibos mandere consueverint; per eas igitur irretita pisa, & quasi agglutinata ad cellularum parietes, tandiu subfuisse, donec dysentericæ torminibus, & deiciendi conatibus deturbarentur.

28. Verum etsi in tenefmo illo explicando qui dysenteriam excipit, sæpe, quemadmodum vidisti, cum Sydenhamio (i) ita faciam, ut ulcus in Recto intestino minime agnoscam; noli tamen credere, me ejus dogmati sic adhærere, ut interdum non verear, ne ulcus, aut aliud ibi grave vitium dysenteriam consequatur, jam usque ab adolescentia edoctus exitu cujusdam post dysenteriam in illo intestino doloris, de cujus causa alia alii meorum Præceptorum sententia fuerat. Cum enim in Fœmina Primaria post dies circiter quindecim per se defuisset dysenteria, quereretur autem illa de infimi intestini dolore, semper quidem cum recrementa egereret, sed tamen subinde etiam punctuibus quibusdam molesto; credebatur alter, hunc esse, ut in delicata muliere, ab levi dumtaxat intima tunica abrasione; alter autem, id est Albertinus, qui animadverteret, cum eo dolore conjungi præter febrem, assiduum lumbos sensu, non sine quodam ad femora, imosque ponderis sensu, tenefmum autem nullum, aut fere nullum; gravius aliquid verebatur, donec aucta febris cum rigore, aperte jam abscessus manifestationem prædixit. Quam prædictionem cito comprobavit exitus, dejecto pure ad uncias duas, & eo qui disenserat, ut Senex erat ingenuus, non fatente modo, sed, id quod pauci faciunt, veram alterius prædictionem laudante. De graviore autem, & minus in vulgus noto ejusdem intestini vitio sermonem injiciendi occasio dabitur Litteris proximis (k). Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXXII.

Sermo est de Alvi Adstrictione, & de Hæmorrhoidibus.

Contrarium illi de quo nuper ad te scripsimus, vitium Alvi adstrictionis in multis quidem animadvertimus tum sine manifesto valetudinis detrimento, etsi ad hebdomadas, atque adeo (quod & Cl. Zevia-

nus noster (a) adnotavit) ad mensem nonnulli deicere solerent nihil tum, idque sæpius, cum evidenti læsione, quam mors ipsa consequeretur, sociatum. Tamen ejus vitii Observationem, cum dissectione conjunctam, vix unam

(e) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obs. 171. (f) Vid. supra n. 15. (g) 1. 3. S. 8. Obs. 7. in Additum.
(h) Prælect. ad Instit. §. 707. 775. 814. &c. (i) ad §. 667. (k) in not. ad cit. mod. §.
(j) Vid. not. Haller. ad §. 497. earund. Prælect. (m) ad §. cit. 814. (n) Ibid. Part. & Econ. hom. Diff. 8. §. 7.
(o) ad §. 815. (p) 3. 9. 19. §. 1. & 2. (q) n. 14. (r) n. 20. (s) supra, n. 24. (t) Ibid.
(u) Exercit. de Gland. Duoden. §. 4. (x) Epist. 35. (y) Eph. N. C. Dec. 3. A. 3. in Append. n. 6. ad Obs. 68.
(z) Dec. ead. A. 9. & 10. Obs. 60. (a) Obs. 126.

(b) Dec. cit. A. 9. & 10. Obs. 179. (c) Ephem. earund. Cent. 1. Obs. 90. (d) Earund. Dec. 1. A. 4. Obs. 68.
(e) Earund. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 177. (f) Dec. ead. A. 3. Obs. 129. (g) Disput. quæ partem intell. Jejuni &c.
(h) Obs. 29. & seq. (i) Obs. Med. circa morb. acut. S. 4. c. 3. (k) n. 6. & seq. (a) Del Stato &c. l. 2. c. 11.

unam habemus, quam hic tibi describamus; nam cæteras, quippe vomitionibus, vulvulo, aliisque ejusmodi affectibus adjunctas, ab his sejungere non est visum. Quod si in Sepulchreto quoque factum esset; ad multo minorem numerum hujus XIII. Sectionis Observationes redirent. Videbis enim ad plerasque adnotatum, quam in Sectione alia legendum id sit quod ab eisdem avulsam est. Sed & alias esse, ad quas idem fuerat adnotandum, tres dumtaxat quas inspicias, pagina præclare demonstrabunt, 193. 197. 203. Lege enim in prima, Observationis III. §. 2. Credes, huc unice attinere. Sed continuo §. 2. indicium dabit, idem ibi esse bis positum, & quod utrobique deest, alibi querendum, id est hujus III. Libri Sectione VIII. Obs. XV. Similem repetitionem indicabit in altera illa pagina, Observationis IX. §. 2. cum §. 8. collatus; neque enim quia in hoc, turpi errore, typographus scripsit in latere sinistro sub regione hepatis; res non eadem est quæ in illo bene scribitur in latere dextro, quod perspicue ostendit tibi quæ ibi designatur proxima Sectio XIV. paulo fufius hanc historiam proponens Obs. 8. §. 1. Tertia demum pagina quid iteretur, & quid nihilominus omittatur, continuo significabit, ubi Observationis XII. §. 9. cum §. 3. comparaveris, utrumque autem cum indicata ab hoc Sectione VII. ubi rem fufe descriptam leges Obs. XXIII. Sed repetitiones has, adeo inter se vicinas, monstrasse satis esto. Ex magis diffitis, quas tibi inquirendas relinquo, unam prætermittere non possum, difficilior ob solitum Blancardi fucum agnoscendam. Legas, quæso, Observationis I. §. 6. & quæ de Sutore narravit Formius, conferas cum iis quæ in Additamentis, Obs. III. de Bajulo scripsit Blancardus: eandem utrobique rem esse, intelliges; sed Formii Sutorem, ne facile agnosceretur, in Bajulum a Blancardo mutatum. Cujus talia artificia si ad te scribens, sapius retego; ideo facio, ut assensum sustineas cum apud doctum aliquem Scriptorem leges, Blancardum in Anatomia quidem sua Reformata plagis vix excusandi rem se se fecisse. Majorem vero laudem mereri ejusdem Anatomiam Præticam Rationalem, eum videlicet librum, ex quo illa quæ tibi exempla produco, in Sepulchreto sunt relata.

2. Nec tamen alia historia deerant quæ ad hanc attinerent Sectionem, five aliunde, five ex Sepulchreto ipso petenda. Exempli causa, fabrum in hac Urbe viderat Saxonia noster (b), post longam alvi suppressionem, & ingentes ventris dolores, partim usu clysterum acgrum, partim aliorum remedium multos ejicientem lapillos magnitudine nucis avellaneæ, coloris flavi, usque adeo duros, ut vix infringi potuerint. Cui Observationi non incommodus in Sectione hac locus, aut ibi fuisset, ubi (c) alvi adstrictio a calculis deducitur biliaris vesiculæ, aut si duriores illi, majoresque viderentur, quam ut inde possent repeti; quamquam bilis canales nonnunquam multum dilatati inveniuntur; ibi saltem, (d) ejusdem adstrictionis causa proponitur calculus, castaneæ magnitudine, Colo intestino adhaerens. Vel cum aliæ plurimæ, aliis Sectionibus jam fufius exposita, Observationes in hac iteretur; cur hic omittitur admiranda illa Maniaci historia (e), qui cum omnia quæ offendeat, ingurgitaret; nonnunquam ad quindecim & sexdecim hebdomadas ex pratumida alvo nihil dejiciebat? aut, ne hinc longius abeamus; cum inter exempla hic prolata infantum qui oculo podice nati, ea via egerere nihil poterant, Observatio Holtzschii (f) in uno eorum habita qui sterco per colem reddebant, ex proxima Sectione (g) repetatur; cur altera confimilis prætermittitur, quæ ibi (h) ex Hildano producta fuerat, aut duæ Meibii (i), quarum prima per similes earum est, secunda autem ad puellulam semestrem attinet, quæ alvi faeces per vulvum exercebat?

3. Ex genere hoc ultimo est Mercurialis Civis mei (k) Observatio, quæ maxime, siqua alia, celebris est apud Medicos scriptores Danielem Sennertum (l), Thomam Bartholinum (m), Joannem Rhodium (n), alios. Sed ab Rhodio, quippe annos triginta septem Patavii commorato, & hic Observationes suas colligente, atque edente A. 1657. mirum est, non quæsitum, quid accidisset isti eidem puellæ Hebraei, Theutonici dicti,

quam clauso podice natam Mercurialis in hac Urbe viderat faeces per vulvum emittentem, & nihilominus contra atque dubitari a quibdam poterat, superviventem. Verum cum minime ignoraret Rhodius ex simili, & æque celebri Benivenii (o) Observatione, puellam alteram non ultra sextum decimum annum vixisse; facile crediderat, hebraeam quoque istam non plurimis postquam Mercurialis viderat, annis; viderat autem ante A. 1583, mortem obiisse fortasse eandem, ex intestinorum cruciatu videlicet, induratis, puta, & crassioribus aliquando factis recrementis quam ut via non naturali prodire possent, nec idonea fortasse ut emollientes lubricantesque clysteres commode transmitteret ad intestina. Sed five in puella Benivenii id facilius accidit quod non nisi octavo quoque die alvum exonerabat, five hebraea Patavina felicitas fuit, certe, si Rhodius quævisset; vivere etiam tum anno exacto septuagesimo (non modo ut Hierbomenis quædam (p) vigelesimo) deprehendisset: quin etiam fuit Rhodio superstes annos multos, ut quæ raro vel in fanissimis exemplo, centum ipsos annos vixit, sicut mihi testabatur is qui illi anni nonnunquam fuerat Medicus, Isaac Cantarinus, cum de Mercuriale, ut erat doctus Senex, mecum forte verba faceret A. 1719. Semper autem suum illa pertulerat malum, probe memor consilii quod parens acceperat a Mercuriale. Et sane ubi alia via ab natura ipsa aperta est per quam satis amandare liceat recrementa, incommoditas prærenda est multis, variisque periculis, quæ, nisi necessitas ipsa cogat, minime sunt, de prudentis quidem hominis consilio, subeunda. Nam nisi podicis foramen membrana dumtaxat opertum esse, intelligatur, ut facili, turaque incisione parari exitus possit urgentibus desuper excrementis, quemadmodum in puellam quem Cl. Baverus descripsit (q), potuisse, ostendit anatome, temere instituta sectio accelerabit haud raro infantis mortem, & infamia horrendum faciet auxilium, pluribus, si prudenter adhibeatur, profuturum. Quid enim? si Rectum intestinum, quantum quantum sit, nullum habeat meatum, sed instar funis solidum sit, ut hic in Sepulchreto, XI. proponit Observatio (r), aut si; ut alia aliorum viriorum omittam exempla; si, inquam, totum illud desit intestinum, cuius rei ibidem (s) reperies Observationem. Nonne incisionis idem est exitus quem ibi leges, aut apud Schenckium (t), cum in Sichardi pharmacopolæ puella sectionem quidem aggressus est Chirurgus, sed Rectum intestinum minime invenit? ut neque ille alter qui perforavit ad longitudinem fere minimi digiti in uno videlicet de duobus infantibus quos carentes toto illo intestino vidit Ruyschius (u). Nec vero hujusmodi exempla quam rarissima sunt, cum etiam Cel. Vir Heisterus (x) femel, atque iterum sibi vix confirmaverit, unumque (y) plene descriperit: nec deest præterea quod a libi legas, quamvis obiter a Cl. Hoyer (z) memoratum. Quin aliquando illud quoque accidit quod decipere facilius possit, nempe ut Recti intestini pars infima non desit, quæ immisso per anum digito ad spatium perbreve satis patens, spem faciat felices incisionis, quasi nihil nisi interfecta aliqua membrana communicationem intercederet cum superiore intestini parte, & tamen pars hæc reliqua nusquam sit, sed Rectum alterum sit intestinum, quod facibus plenum, longius ab ano ad summum Sacrum os se inflectat, oclusumque ibi, & firmiter concretescens finiatur, quemadmodum a Cl. Petro Christophoro Wagnero (a) conspectum est. Equidem Chirurgum non semper culpaverim, si recens natus postmodum quam factus est, intereat, ut ille cujus duo fraterculi ipsi quoque imperforato podice nati fuerant (b). Ut enim tot alios, eodem vitio affectos, vixisse legi septem, decem, duodecim, pluresve dies; sic etiam legi, aliquos, cetera fanos, nulla pariter sectione vexatos, triduum non superasse. Veruntamen nisi per anatomen constet, Chirurgi opus mortis causam non attulisse; omnem accelerati interitus suspicionem non effugiet is præsertim qui, non cunctis rite perpensis, præceps, quasi ad minime periculosum auxilium, ad sectionem decurrerit. Quamobrem cum via alia, quamvis incommoda, satis patet, non constat autem, Rectum intestinum ad inter-femineum usque sic descendere, ut cute, aut membrana non

non crassissima ejus canalis operiatur; non est ibi per sectionem querendum quod fortasse in supremam, exempli causa, vaginæ partem finitur. Nam nisi eo usque perveniat incisio; nihil efficitur; si vero eo usque perveniat; præter hæmorrhagiæ, aut nervorum diffentionis periculum, duo alia restant, ne via ab natura in vaginam aperta nihilominus claudi prorsus non possit, itemque ne altera ab arte patefacta, propter sphincteris defectum, incommodum non tollat, sed duplicet.

4. Quod si nullus omnino exitus pateat alvi fecibus, certa infantis morti anceps curatio est præferenda. Neque enim ita a natura cum cæteris animantibus actum est, ut cum insecto illo quod Gallis dicitur *Formica-leo*, cui secundum observationes Historicorum insectorum incomparabilis, Reaumuri (c) nec podex est, nec fenibilia alvi excrementa. Quod si vacca, de qua Aristoteles (d) ea quæ acceperat, memorie tradidit, clauso podice fuit Perinthis, cui cibi excrementum extenuatum, per vesicam transmittatur, dissectisque anus denovo prope coalescat, nec resecando evincere vitium poterant; nempe ultimum intestinum fortasse, ut ego suspicor, in vesicam desinebat; inutiles autem sectiones ea quæ paulo ante dixi aut de perveniendi illuc quo opus est, aut de viæ ab natura aperta occultandæ difficultate confirmant. Neque alia mihi suspicio olim fuit, cum Bononia esse Virginem audivi, quæ nihil per intestina, sed omnia, dissoluta lotio, redderet per vesicam. In quam non semel illud intestinum se inseruisse, tres, quas in Sepulchreto (e) conjunctas habes, Observationes testantur, aut certe duæ, si tertia eadem ac prima est, quod citata in illa Sectio hæc XII. (f) videtur indicare. Quod si nemo eorum qui in his describuntur, infantum superstes fuit; causa fortasse rejicienda est, si minus in arctam nimis inter Rectum intestinum, & vesicam communicationem, qualis a Cl. Sandenio (g) delineata proponitur, at in angustiam, longitudinem, flexus urethræ virilis, imparis propterea crassissimo ob admista intestinum excrementa lotio diutius emittendo (h). Ut ut est; quotiescumque constat, nullum exitum patere alvi fecibus; non est cunctandum donec hæc retentæ infantem gravius ledere incipiant, eoque ipso curationi minus opportunitatem reddere, sed accipiti hujus exitu omnibus indicato, necessario audendum est, semper tamen caute, ac perite audendum, ne forte ab Anatomes ignaro vesica, aut in femellis vagina convulseretur, præsertim ubi altius ferrum adigendum est. Nam præter crassissimam membranam, spongiosa interdum caro, & adeps ad duos digitos interjecta esse potest, ut ex Sepulchreto (i) intelliges, imo aliquando, ut ibidem (k) leges, ad duos auricularis digiti articulos mediocris viri, intus coactis ascendit; & puer tamen exigua in perforando erantione, & congrua succedente curatione, servatus est, ut ex longe alio morbo anniculus demum, ut videtur, interiret, quod ex perleto alibi (l) qui male ibi omittitur, ejus Observationis fine cognosces. Quarta autem jam anno, & fortasse adhuc vivere, intelliges alterum quem per incisionem, articulo pollicis longior, sanavit supra laudatus Hoyerus (m); ut illum præteream quem servari potuisse, ostendit Cl. Huberus (n), si carne-pinguedinosa massam, quam in mortuo conspexit, jam in vivo ad duos fere digitos latos ferro incisam infantis patris fivisset paulo altius perferri; sic enim in cavum proxime desinentis intestini perventum esset.

5. Verum ut hoc vitii genus aliquando, etiam cum vix sperabilis videtur curatio, sanari potest; sic infanabilia sunt plura, ut cum oclusio, aut adstrictio est in aliquo superiore intestino, cuius rei tum hic in Sepulchreto, tum alibi a me quoque habebis exempla. Quibus adjicies non modo indicatam superiore Epistola (o) carneam magnam excrescentiam, intra Colon a Cortesio repertam, sed & annulum ex glandulis scirrhusum, quem ibidem Præcl. Haafius (p) deprehendit, vix tenui stylo patentem, itemque ejusdem intestini callum, ferme cartilagineum, quem ejus cavum valde coarctantem ex Fratr. Observatione proposuit Cl. Christianus Wenckerus (q), tum Coli antequam ad Rectum accederet, magnam partem contractis adeo tunicis, ut mirum non fuerit, faeces descendere non potuisse, quam Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

lem adnotavit Laubius (r), & multo magis idem vitium, simul ad majorem Recti partem extensum, quale Vir alter, dum viveret experientissimus Waltherus (s) conspexit. Et ne ab hoc ultimo intestino recedamus; sæpe in ipso insanabilis coarctationis causa est externa compressio. Ita in Sectionis hujus Sepulchreti Observatione XI. (t) tumor quidam velut glandulosus, utrinque Recti superiorem partem comprimens, a quonam bene internosci, nedum curari, potuisset? A tumore autem ejusmodi potius, quam a sumptis phar-macis quibusdam calidissimis (u), quæ non secus ac ignis membranas solet, arefacerent, & contraherent intestinum, hujus coarctationem deducendum fuisse, non dubito; si modo coarctatus erat in Recto, cum cereæ candelæ portio ad cubitalem longitudinem intromissa est, ut ait Donatus (x) relata. Scilicet hic vidit a duobus vesicæ calculis depressum adeo illud de quo loquimur, intestinum, ut coarctatum produxerit plurima membranosa filamenta, intertextantia tam arte interiorum ipsius fistulam, ut nihil excrementorum potuerit amplius transmittere, qua plane ratione conspexerat alias (y), similia filamenta obstruxisse gulam, a carcinomate coarctatam. Sed & hic Recti intestini coarctatus erat non una de causa insanabilis, ut perlesta apud Tulpium ipsum (z) illa Observatione cognosces. Porro vel sine parietum nexu arctatum Rectum intestinum quantum alvi exonerationi obliteret, aliæ, quas ad Sepulchretum adjunges, docebunt Observationes, ut Riedlini (a) qui in mortuo ex alvi obstructione massam invenit carneam partem, partem glandulosam, pugno majorem, intestinum prope vesicam urinariam comprimentem, in quo etiam excrescentie carneæ erant plures: ut Jannellii, & Lancisii (b), qui Matronæ insuperabilem alvi adstrictionem inducunt videre a Coli ima præsertim parte ita dilatata, & gravi, ut Rectum versus urgeret uterum, illudque in angustias redigeret: denique ut Cl. Hafeneltii (c), qui plurimas adiposas appendices ad Recti latera exterius pendentes, & pyri minoris figuram referentes, non alvi quidem obstructionem, quippe molles, attulisse, sed ejus tamen exoperationi multum obfuisse, animadvertit.

6. Est præterea ejusdem intestini aliud vitium, de quo nullam in Sectione hac Sepulchreti video fieri mentionem. Ruyschius in Observationibus Anatomico-Chirurgicis (d), itemque in Adversariis (e) describit nomine *scirrhusi intestini Recti incrassationis*, per miræ coarctationis, tunicis videlicet, pollicis crassitiem ferme superantibus, & adeo induratis, ut anceps hæserit, carneæ, an cartilagineæ essent dicenda; cavo autem ad eam angustiam redacto, ut vix tenue specillum immitteri nonnunquam posset, nec nisi summis conatibus recrementa extrudi, eaque aut guttatim, aut culmo gramineo vix crassiora. Hunc affectum raro obvenire, ait, eoque, paucis innovisse: nec sane apparet, ab eo visum esse in pluribus, quam duobus; ut inter ea numeraverit quæ a Bidloo nunquam conspecta existimabat (f). Ego Valsalvam accersitum Faventiam meminisse, me comitante, ad Amplissimum Virum, quem eadem signa eodem teneri morbo, aut certe qui ad hunc propius accederet, demonstrabant. Qualem & in aliis antea, mihi dicebat, a se observatum, per anatomen quoque, ut puto; nam in ejus dissectionibus nihil ejusmodi inveni; sed tantum in aliis chartis quidquid ægros attinet duos quos annis aliquot post vidit, ut Consilia pro iis scripta demonstrant. In utroque eorum difficultatem, & dolorem in egerendo ad glandulas refert in Recto intestino crassiores factas, & in parte exulceratas, ex iisque in altero illorum tumorem, annuli instar circumcirca prominentem intra intestinum percipi, scribit, tribus circiter supra anum podicem digitis. Ipse quoque superiore ætate consultus sum pro Nobili Matrona, cui plures jam menses alvi faeces non nisi in modum institarum compressas dejicienti, & nullo, nisi hæmorrhoidum, vitio se laborare, existimanti, inventum nuper fuerat intestinum circum superiorem partem sphincteris ani undique

(b) Prælect. Præcl. P. 2. c. 19. (c) Obs. 12. t. 3. §. 7. 8. (d) Obs. 9. §. 4. (e) l. 1. §. 9. in Addit. Obs. 1. (f) Obs. 11. §. 6. (g) Obs. 24. §. 1. (h) §. 2. (i) Obs. 23. (k) De Morb. Puer. l. 1. c. 9. (l) Medic. Præcl. l. 4. P. 1. §. 1. c. 1. in fin. (m) Cent. 2. Hist. 61. (n) Cent. 2. Obs. 91. (o) De a. d. morbor. caus. & c. c. 86. (p) Eph. N. C. Dec. 2. A. 10. Obs. 75. (q) Act. eorund. T. 4. Obs. 147. (r) §. 4. (s) §. 17. (t) Obs. Medic. l. 3. ubi de Intest. Recto Obs. 61. (u) Advers. Anat. Dec. 2. c. 19. (x) Inf. Chirurg. P. 2. S. 5. c. 163. n. 1. (y) Eph. N. C. Cent. 3. & 4. Obs. 193. (z) Eandem. Cent. 6. Obs. 59. (a) Commerce. Litter. A. 1735. Hebd. 46. n. 4. (b) Eph. cit. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 282.

(c) Memoir. pour l'Hist. des Insect. T. 6. Mem. 10. (d) De Generat. Animal. l. 4. c. 4. in fin. (e) l. 3. S. XI. Obs. 24. §. 1. 2. 3. (f) Vid. Obs. XI. §. 6. (g) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 194. (h) Vid. tamen Epist. 65. n. 6. (i) Obs. cit. XI. §. 14. (k) Ibid. in Schol. ad §. 4. (l) Eph. N. C. Dec. 1. A. 3. Obs. 257. (m) Obs. 59. cit. supra, ad n. 3. (n) Act. N. C. T. 8. Obs. 24. (o) n. 21. (p) Commerce. Litter. A. 1745. Hebd. 45. n. 2. (q) Dissert. hist. Virgin. ventric. perforatum §. 5. (r) Eph. N. C. Cent. 7. Obs. 41. (s) Dissert. de Intest. angustia §. 20. (t) §. 3. (u) Vid. Schol. subiect. (x) Obs. 14. §. 5. (y) Vid. ejus Observ. Medic. l. 3. c. 2. in fin. (z) c. cit. (a) Vid. Act. Erud. Lips. M. Jul. ubi ejus Cui a Med. referatur. (b) Eph. N. C. Cent. 10. in Append. n. 4. (c) Commerce. Litter. A. 1740. Hebd. 30. n. 1. (d) Obs. 95. & 96. (e) Dec. 2. c. 10. (f) Respons. ad Bidl.

dique ad spatium duorum digitorum tumens, arctumque adeo, ut digiti apex sine vi, & molestia immitti non posset. Huic cum tumores antea fuissent alii ad inguinum, & axillarum glandulas, & pustulae, atque exulcerationes, cumque etiam tum pus, quamvis non multum, ante faeces dejecteretur; idem facile quod Valsalva in illis agris digito perceptorat, in hac quoque esse, censui, & quaerentibus rescripsi, praesertim cum me meae quoque nonnullae Observationes moverent. Quarum quae simul cum dissectione a me adhuc servata est, eo libentius ad te scribetur, quod affectum hunc, aut certe ejus fati, similem, inter rariores, merito describi quidem in Commercio Litterario (g) video quantum in vivente observari potuit; sed acri, ex passione Iliaca alibi mortui (h), nullam anatomicam inspectionem reperio. Et quamvis alio in libro (i) legam, fuisse in puellae intestini Recti eam labem, qualem Ruyschius Observationum Anatomicarum Obs. 95, & 96, duplici specimine refert, scilicet ad sphincterem tendens magna fibrilitate circum circa obvoluta; tamen cum idem viti genus, commune fuisse reliquis etiam intestinis, animadverto, tum illud praesertim, alvum ab initio segnem, temporis autem progressu admodum lubricum, & cibos crudos vix ingestos inanimententer ut plurimum egerentem. Itaque meam Observationem subijcio, quae ad hunc modum se habuit.

7. FEMINA annos nata plus quinquaginta, exaffectione, ut ipsa aiebat, haemorrhoidum incidere jam ante triennium in multo gravius intestini Recti vitium, propter quod denique excepta est in Bononiense Incurabili Nofocomium circa anni finem 1704. Hanc Valsalva feminam cum dumtaxat interrogasset; ne digito quidem ad explorandum immisso, statim desperato morbo teneri pronuntiavit, & ad me, qui proximus aderam, conversus, hoc ejus simile vitii genus est, inquit, quod mensibus superioribus Faventiae, cum mecum esses, deprehendi (k), nempe hic quoque Rectum intestinum circumcirca tumor intus occupat glandulosus. Hac autem mulier etiam cum aliis morbi hujus indicis, nullum percipiebat dolorem; multum tamen foetida, & tenuis, & crassioris materiae egerebat. Itaque ad summam maciem adducta, intra unum aut alterum ex quo advenerat, mensem post febris, cum frigore ingruentes, mortua est.

INTESTINUM Rectum secundum longitudinem incisum, & explicatum cum ipse inspicerem, sic reperiēbam. Sex septemve supra anum transversis digitis incipiebat durius, & crassius fieri, & in conferta corpora figura, & magnitudine maximam fabarum, intorsum undique extuberare. Levi erant singula superficie, substantia autem solida & compacta. Durities ac crassitudo intestini, & moles corporum eorum quae nihil magis quam Conglobatas glandulas colore quoque referebant, eo magis augebantur quo magis descendebatur. Infima tamen pars intestini quanta transverso digito operiri potuisset, cum sana esset, ab ipso demum extremo ano pendebant excrescentiae duae, eratque circum anum cutis leviter exulcerata.

8. Nunc ut intelligas, Valsalva, & nostras Observationes minus quam a primo fortasse apparet, ab Ruyschianis differre, comparando invenies, agrum quoque Ruyschii primum (l) albi faeces cum ichorosa & purulenta materia excrevisse, alterius autem (m) morbum a quibusdam Medicis creditum haemorrhoides esse: quorum utrumque in plerisque etiam accidit aegrotantium nostrorum. Quin credo, inter eas caeteras, quare hoc vitium, quamvis fortasse non ita rarum, paucioribus innotuerit, nec fere nisi serius, immisso tandem digito, agnoscat praeprimam illam esse, quod acri & Medici nihil plerumque subesse mali, nisi haemorrhoidum, arbitrentur. Itaque in illo altero Ruyschii casu eas esse per incisiones auferendas, statuerunt, idque etiam incassum, ut necesse erat, tentatum est. Et sane si vel ejusmodi esset id, quod descripsimus, morbi genus, ut Chirurgi ferro adimi posset; ipsa tamen, sicut ab Ruyschio, & a nobis confecta est, saepe altissima morbi sedes nullum ei curationi locum relinqueret. Non me quidem fugit vetusta illa quae inter Hippocratis libros circumfertur, sententia (n) Rectum intestinum & secans & resicans, & consuens, & urvens, & putrefaciens, etiam si gravissima haec esse videantur, nihil levis. Sed neque illud fugit, hoc dogma a peritissimis Chirurgis ad eam ferme intestini partem referri, a ejus profundiore incisione plerique olim ne sphincterem ani discinderent, ejusque in perpetuum tollerent vim & officium abstinere. Quem metum nisi aliorum observationes magna ex parte sustulissent; possem tibi confirmare, audivisse me Valsalvam cum diceret, se periculo

falso in canibus, deprehendisse, sphincterem illum, quanta quanta erat, crassitudine dissectum, iterum suas recuperasse vires, suoque munere, quamvis non ita valenter ac antea, functum esse, idemque in homine, occasione data, animadvertisse. Quin etiam in scheda ejus quadam, post id tempus scripta, haec legi, perlanatum ab eo esse virum A. 1708. cui abscessus, & huic adveniens gangraena partem alterius natis corroserat cum tota ea sphincteris portione quae illi respondebat, ut faeces praeter voluntatem redderet: hunc igitur, ad vitae extremum adductum, evasisse, & ulcere perfecte conglutinato, sphincterem in pristinum statum rediisse. Verum etiam haec vera sunt, tamen quo magis a sphinctere altius recesseris, eo periculosior incisio accidet, five crassiore aliquo sanguifero vase laeso, sanguinis effluxum coercere non possis, five nervum pungas, unde lethalis is dolor, quem observavit Fabricius noster (o), videtur provenisse, five etiam neutro vulnerato, intestinum dumtaxat perfores, sicque faecibus exitum aperias in ventris cavum: quae pericula in caecis atque abditis incisionibus vitare quis possit?

9. Ob has igitur, aliasque causas satis per se manifestas cum efficaci curationi non sit locus, relinquitur, ut cum Ruyschio (p), & Valsalva quam palatiorum appellitant, necessario amplectamur. Laudabat ille emollientia, & dolorem lenientia enemata. Nec improbat alter, nisi continuo resisterent: quamobrem modicas injectiones potius, & insessus commendabat, addito etiam quo ad aeger sine molestia perferre posset, apto, & perforatis lateribus tabulo, per quem humorem illum in quo insideret, ad morbi ipsam sedem admitteret, admittendumque interea dum insessu uteretur, servaret. Humorem autem varium pro varia morbi constitutione laudabat, modo calcis, quam vocant, aquam, plus, minusve, at semper dilutam; modo thermalem illam quae supra Bononiam est, diciturque Porrectae Veteris, quam interdum quoque potui dabat; alias, cum exulcerationem minime adjunctam esse, censebat, communem aquam incoctis quae magis ex usu futura crederet, medicabat. Sic varia etiam assumenda praebat, in his resistentem terebinthinam, cui aqua superbiberetur medicata herbis vulnerariis (quacum aliquando resina illam, vitello ovi solutam, commiscebat, & ad injectiones utebatur) nonnunquam autem, cum anni tempus esset calidius, resina omitta, aquam in qua eadem, aut aliae pro re nata incoctae essent herbae, sed pro aqua copia pauciores; ut quam largissimus prope instat thermalem aquarum esse posset earum usus; bibi volebat; hyeme vero vinum, in mensa quidem, idque domesticum, in quo, autumnus tempore, cum in dolo ferretur, radices ligna, quae magis convenire, crederet, fuissent macerata. Utriusque ego consilia, & exempla haecenus secutus sum, ut alia aliis magis commendans, fere quae adversantur lui Venereae admiscerem, ut pote quam ejusmodi affectus praecedere plerumque solitam animadverti, multoque minus omitterem quae in duris tumoribus resolvendis magnam interdum tulisse opem, cognovi. His enim saepius quam iis quae proprie emolliunt, utendum credo, ne forte nimium laxatis fibris, partes ingruentis materiae cedant, & tumor increpescat, omnemque exitum faecibus intercludat: itemque dandum quidem operam, ut haec molles sint, ne dura, crassaque sibi ipsae angustiores jam viam obstruant, aut, si transcant, nimia vi in tumorem facta dolores moveant, & ulcera, si qua sint, augeant; nec tamen ad illud obtrahendum, ob has ipsas causas, utendum pharmacis quae aut ipsa acria sint, aut acres, multosque humores illuc versus conciant.

10. Alvi Adstrictionem, de qua breves has ad te Litteras scripsi, duo consequuntur morbi, alter saepius, id est Haemorrhoidum affectio, alter haud ita raro, id est Ani Prolapsus. De hoc, credo quod scires nullam esse in Sepulchreto Sectionem, jam pridem scriptum inaudiveras, ego vero, quale id cunque est, mittam Epistola proxima. De Haemorrhoidum autem affectione Sectio quidem extat in Sepulchreto (q); sed brevis adeo, ut si Scholia demas, vix dimidium paginae impleat. Quapropter malui de Haemorrhoidibus nonnulla huc addere, quam cum eo pervenerimus, Epistolam scribere, praesertim cum dissectiones quae ad earum morbos proprie attineant, neque inter Valsalvae Observationes, neque inter nostras ferme inveniamus. Quod igitur duram alvum sepe,

pe, ut paulo ante dictum est, consequantur haemorrhoides, neque dubium est, & a Boerhaavio (r) sic explicatur, quod in nixibus ad egerendum necessariis comprimuntur intestina, sanguis arteriosus promovetur, venosus retardatur, adeoque stagnat in vasis intestini recti, putrefcit, sicque dispositionem ad haemorrhoides inducit. Non sum neciscus, ob alias etiam causas stagnare sanguinem in venis ejusdem intestini. Cum enim harum intimae ad Portarum denique truncum pertineant; si forte accidat, ut ea five in via, five in termino, aut hic circumjectarum partium convulsione, distentione, obstructione diutius stringantur, premanturque; proclive est intelligere, sanguinem facile iis in venis remoraturum: Sic mesenterio convulso, sic intestinis flatuum copia nimis tumentibus, sic obstructo jecinore, id non difficulter fieri posse. Quo spectat Valsalvi Observatio, quae prima, eademque praecipua est de tribus quae in perbrevis illa quam paulo ante indicavimus, Sectione leguntur. Neque enim in eo qui sanguinis ex haemorrhoidibus fluxu per intervalla laboraverat, lien solus durior fuit, ut fortasse credes quintum libri III. de Fabricia Corporis humani caput inspiciens, quo ex uno ea Observatio in Sepulchreto descripta est; sed & jecur fuit mira duritie, quod ex XV. capite cognoscas libri V. ubi Valsalva paulo minus preste eundem casum proposuit, veramque simul quam iis temporibus ille non poterat, ex parte saltem causam intelliges, cur interna haemorrhoidalis vena sub coli intestini fine, & tota recti longitudine pollicis fere crassitatem aequaret. Nimirum haud facis facile erat, sanguinem per ejusmodi transire. Sed cur igitur, inquis, non substituit in aliis pariter venis ad Portarum truncum pertinentibus? Nempe ob hoc dixi, te causam illam ex parte saltem esse continuo affecturum. Adde igitur; ut alia omittam; maximam, quae inter caeteras illas venas huic uni peculiaris est, longitudinem, ut multo ex hac quam ex illis, difficilior sit sanguinem promoveri fursum, praesertim ut humani corporis requirit situs, quae una haud dubie ex causis est, quare alia animantia haemorrhoidibus non sint obnoxia. Quod si quibus in corporibus expedito fursum sanguinis motui quodpiam est impedimentum, in iis quaeras, cur in tibiis potissimum venae in varices se dilatent, eandem praecipue invenies causam quam haemorrhoidibus assignamus. Haemorrhoides autem nihil aliud esse quam varices venarum ani, diserte vel in Sepulchreto (s) habes docentem Valsalvam: idemque alio loco leges confirmantem Boerhaavium (t), ubi aliquanto fusius, nec ulla putredinis injecta mentione, eadem quae paulo ante ex eo retulimus, declaraverat. Quantum autem ex venae se expandant, in viro quodam (u) animadverti bono corporis habitu, & ad plenum accedente, quem ex vulnere sub axilla mortuum Bononiae fecit A. 1706. Huic extrinsecum intestinum, quod haemorrhoidibus obnoxium fuisset, apparebat, cum esset intus varicosus nodis inaequale; majorem ex his perattente inspiciens, miratus sum, cum ipso qui non modico aliquo diutius stendebatur sanguinis grumo, non nisi tenuissima sanguifera vascula communicare, ut evidens esset, aliquam perexilem venam in eam fuisse amplitudinem dilatatam.

11. Ne igitur haec contingant, quae aut sine acerbis plerumque, & praesertim in egerendo, cruciatibus minime fieri, notum est, si quidem varices isti turgent, nec rumpantur: aut sine profluvio sanguinis; si rumpantur; immodico interdum, & ea post se relinquente quae haemorrhoides non magnopere esse optandas, satis superque docuerunt; primum plenitudo vitanda est; neque enim ut mulieribus in quibus necessarium id erat, ita viris apparatus ab natura viae sunt, per quas opportune sanguis minuatur; sed a morbo aperiantur, oportet, tunc aliquando saluari, saepe autem periculofo, semper incommodo. Deinde illa fugienda sunt quae alvum praeduram faciunt; nec ea tantum dico quae perminuta oscula adstringendo glandularum, intestina, & quae his continentur, humectantium, non satis humoris prodire sinunt, styptica videlicet atque acerbis crebrius, aut largius ingesta; sed consuetudinem etiam dico multo parcius edendi, & praesertim bibendi, quam ferre possit natura. Sic in Sarpii Vita legimus, cum ipse junior parvissime ederet, nihil autem vel plures ad dies biberet, in diuturnam alvi adstrictionem incidisse, qua non modo ante triduum fere, interdum ante dies septem nihil deieceret, verum Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

ut deieceret tandem, iis uti nixibus cogeretur, unde multos ob haemorrhoides dolores, & molestum ani prolapsum pertulit annos plurimos. Quod si iis quae diximus, aliisque ejusmodi vitatis, nihilominus aequo durior esse alvus pergat, neque ufus crebrior adjuvet mollientium ciborum; nulli alii subsidium illud postpones, ne haemorrhoides ob nixus oriantur, quo claros Medicos uti video, ne ortae, sint adeo inter nitendum molestae. Injiciunt hi ante defectionem unciam lenis cuspidiam olei, in primisque feminum lini: quo nos quoque cum duriora recrementa mollienda sunt, imumque intestinum lubricandum, saepe uti ac feliciter conuevimus eodem fere pondere, aut certe non multo majori, ne continuo refluat, imo ut diutius retineatur: quanquam sic olivarum quoque oleum interdum praescripimus ab eo usque tempore ex quo narrabat Ramazzinus, in puerpera Matrona septem jam dies nil deiecente, cum multa, ac varia nihil proficerent, rediisse in memoriam quod legisse dicebat, si recte memini, apud Martinum Rulandum, ut binas horas singulis uncias communis olei injiciendas curaret, eaque ratione alvum solviffe.

12. Matrona haec, ad memoriam redigit, quod ab Illustri alia Foemina remedium adhiberi audivi, quae tumentibus haemorrhoidibus a longo jam tempore vexabatur. Quas, ut me consulendi causa huc venerat, cum ostendisset, ipse autem quaererem, qua ratione tumentes adeo reponere sine intolerabili molestia posset; continuo respondit, se multa & varia expertam, nihil illius invenisse pinguedine quae circa renes sit canis rufi. Ea igitur rite preparata inungere se egressas inter deiciendum haemorrhoides; eaque ratione aut sine dolore, aut certe cum multo leviori, jam diu reponere ex quo ab aliis qui periculum antea fecerant, id fecum pro arcano fuerat communicatum. Equidem canis pinguedine interius, non modo exterius, usos interdum Medicos, antea noveram: ad eum autem usum, & ex certi canis certa parte acceptam, non videor meminisse. Longe facilis causa agnosci potest utilitatis duorum quae dicam; sunt enim magis, quamvis non eundem ad morbum, aut non eundem ad modum, plerisque saltem usitata. Nempe Albertinum vidi tumentium haemorrhoidum cruciatibus in Procere quodam lenire ad motus curcubitaram interaneis, aut injecta aqua in qua haec fuerant decocta. A Procere autem altero generosissimo atque amplissimo quippe Proregis munere nuper functo, cum medica a me pro sibi carissimis consilia quaereret, injecto forte de haemorrhoidibus sermone, accepi, ipsi quidem in harum doloribus ita prodesse linteola, subinde admoda, quae maderent tepida in qua lini femina, & concisae radices althaeae decocta essent ad tertias, ut cruciatus non modo sedarent, verum etiam, si statim atque hi inciperent, admoventur, incrementum haemorrhoidum tumorem non finerent, nec, quod consequitur, disrumpi, & sanguinis profluvium fieri. Ubi autem hoc nimis urgeret, Valsalva; ut ad Medicos redeam; tria praeceteris laudabat, a quibus videlicet acciderat ut mirabiles effectus videret: primum, theriaca recenti, pondere sex circiter drachmarum, admittis quatuor, aut sex etiam, in magno fluxu opii granis, regionem umbilicalem linire. Alterum, vitriolum in calcem redactum, quod Chymici appellant colcothar, parti unde sanguis profluit, adhibere. Tertium, curare, ut aeger imum intestinum extrorsum premit, si forte, ut nonnunquam accidit, apertum vas sanguiferi foramen in conspectum veniat: tunc autem vitrioli frustulum, sicut hamatitem pictores solent, in extrema quapiam fistula aptatum, ei foramini tantisper apprimere, dum crustam inducat. Hoc autem quo proponebat, ordine aliud post aliud adhiberi, volebat, ubi nimirum priora non respondissent.

13. Et quoniam non de novis remediis hic agitur, aut de inusitatis curandi rationibus, sed de iis quae proficua ex ipso Illustrum Aegrotantium, aut gravium Medicorum testimonio comperta sunt, in primisque de Valsalva nostri consuetudine; hanc tibi pernotare cupienti illud quoque adjiciam: Si forte in hominem incidisset, chirurgicam opem non temere flagitantem, ne immodico in postremum cursui sanguinis per haemorrhoides obnoxius esset; non secuturum fuisse, nisi forte in recenti morbo, & curandi quidem ratione alia, non, inquam, secuturum fuisse Auctorem libelli de Haemorrhoidibus inscripti (x), oportere docentem nullam haemorrhoidem sine unctione finire, sed omnes exuvare; sed Auctorem potius Sectionis VI. A-pho-

(g) A. 1744. Hebd. 35. §. 3. n. 1. (h) A. 1744. Hebd. 2. §. 3. n. 2. (i) Act. N. C. Tom. 2. Obs. 65. (k) Vid. n. proximo superiore. (l) Obs. ibid. cit. 95. (m) Obs. 96. (n) l. de Haemorrhoid. n. 1. (o) De Chirurg. Oper. c. de An. Fust. in fin. (p) Obs. cit. 96. in fin. (q) l. hujus 3. Sect. 15. (r) Praelect. in Inst. §. 774. in fin. (s) in Schol. ad 1. Obs. Sect. cit. (t) Praelect. cit. ad §. 122. (u) De hoc Vid. Epist. 44. n. 22. (x) A. 1.

phorismorum (y) admonentem, a diuturnis sanato haemorrhoidibus, si una non servetur, periculum esse, aquam intercutem, vel tabem advenire. Hoc enim vel in ulcerum ani curatione diligenter cavebat. Sic quendam qui sexdecim jam annos iis ulceribus laboraverat, cum mihi octavo a curatione anno satis bene etiam tum valentem ostenderet, unum enim ulcus, inquit, idque minus quam cetera molestum, consulto intactum reliqui. Haemorrhoides autem, an ulcera essent quae primarios duos Equites male haberent, cum in controversia foret; memini, continuo ipsum in utroque ulcera esse, ostendisse. In altero enim cum digitum altius immisisset, certam indicavit ceteris sedem ulceris, in cuius videlicet orificium digiti apex exceptus, annulo quasi quodam constringi videretur; sic enim saepe Recti intestini, ac vaginae ulcera se habere, ut os angustius in capaciorem sinum se dilaret. In altero, ne digito quidem immisso, tum ulcus esse, tum non ita altum esse, ostendit; erant enim inter alios quidem censentes, id quod excerneretur, mucum esse a glandulis Recti intestini etiam altioribus expressum. Quos facile convicit ipso aegri testimonio, qui cum fateretur, id sibi jugiter effluere; conseqeatur, ejus materiae scarutrigines supra sphincterem non esse. Ea autem materia

cum purulenta a Valsalva ipso, cujus in ejusmodi praefertim re spectatissimum erat iudicium, procul dubio pronunciaretur, atque adeo ostenderetur, jam nulla relinqueretur dubitatio, quin ab ulcere esset deducenda. Tanto autem pluris illud ejus iudicium faciebant, quod nemini erat obscurum, praecclare ipsum, si quis alius, nota ea habere atque perspecta quae in Scholiis quoque commemorantur ad Observationem illam (z) I. Sect. XV. de mucosis quibusdam, & subalbis foridibus, e podice interdum prodeuntibus, quae, ut nonnullis pro pure imposuerint, a Medicis tamen Doctissimis agnita sunt non secus ab haemorrhoidalibus venis excerni, quam saepe albus fluor (quae comparatio erat Plateri, in iisdem Scholiis laudati) ab uteri vasis absque ulla ulceris suspitione excernatur. Quod a te facile eadem ratione explicabitur quae ejusmodi uterini fluorem a nobis in IV. Adversariis (a) explicatum videbis, nimirum si, qui vasorum hiatus effundebant, sanguinem, cum magis patebant, eosdem, non profus, sed magis tamen adstrictos, finire, intelligas, non sanguinem amplius, sed ejus dumtaxat serum, viscidum pro se in quibusdam, aut mora mucosum factum, sensim destillare, aut a recrementis expressum, transire. Haec habui quae de Haemorrhoidibus adjungerem. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXXIII.

Agitur de Recti Intestini Prolapsu.

DE Prolapsu Recti Intestini non modo nulla in Sepulchreto Anatomico Sectio est; sed ne ullae quidem usquam extant, quantum ipse in praesentia memini anatomicae Observationes. Quibus, tanquam firmis fundamentis cum inniti soleat quidquid solidi circa plerorumque morborum internas origines, & continentes causas Medici ratiocinantur; propterea haud mirum est, de eo morbo necdum produsse, aut certe meas ad manus pervenisse Tractatum, qualem de nonnullis vel rarioribus, levioribusve vitis habemus, qui satis videlicet praeculare, & minuere laborem possit his quibus super illo prolapsu verba sint non temere, inconculsoque faciendi. Quo nos Tractatu carere nunquam magis intellexi, quam cum illud a me Consilium quaesitum est, cujus exemplum tibi, jam diu petenti, cum his Litteris me sum pollicitus esse misurum. Mitto autem quale tum fudi, nisi quod hic tibi latine reddidi. Quae vero sic, ut Consilia, aut statim fere, aut intra perpaucos dies ab Aegrotantium Amicis flagitata, a me quidem funduntur, nullam scio habere gratiam posse, nisi celeritatis. Quamobrem nemini praeterquam iis pro quibus sunt, illorum copiam facio; ab iisque exierint necesse est, quae re legisse plurima scribis meorum Consiliorum exempla; nisi forte quaedam, sicut interdum accidisse perspexi, mihi temere a describentibus supposita sunt. Quamquam autem neque hoc satis probem quod hic habebis, imo aliud aliquod libentius fuisset missurus; hoc tamen, si non interservire poterit, ut quae Consilia revera sint a me interfectas, indicabit saltem pleraque ex iis rebus quae de hoc morbo vellem ab Anatomicis fuisse quaesitas. Scriptum erat igitur in hanc sententiam.

2. Utinam quantum evidens morbus est, & causa quae morbum auxit Generosi, & Doctissimi Viri, tantum mihi notae essent internae causae, a quibus initio ille est factus, & a quibus adhuc servatur, & quod multo plus interest, quae magis efficaces rationes sint ejusdem bene curandi. Morbus quidem Prolapsus est Recti intestini: Causa autem qua auctus est, nimis ac diuturni egerendi conatus. Sed quo ab his modo auctus fuerit, unde, & quod initium habuerit, & quibus a causis adhuc fervetur, five, ut loquuntur Medici, contineatur; haec vero omnia in tanto praesertim temporum, & locorum intervallo, mihi subjicere est difficillimum, scire autem propemodum impossibile. Quod si quis esset qui symptomata & crises observare potuisset pertinacis illius, molestaeque febbris, cui successit initium morbi hujus; & tunc, & cum postea auctus est, & hoc quoque tempore diligenter perspicere, quale sit superius, & inferius extremum tubi prodeuntis, & quae hujus sit consistencia;

illi forte minus difficile esset veras morbi causas conjicere.

3. Haec; si vel conjunctarum dumtaxat genus spectetur; multae esse possunt, multumque inter se discrepantes. Eruditissimus Civis meus Hieronymus Mercurialis (a), & Ambrosius Paræus (b) unam praecipue asserunt, nimirum sphincteris ani relaxationem, quae intestinum exire sinat. Sed neque medica experientia patitur, ut facile assentiar, quippe ea edoctus, ne vera quidem sphincteris illius paralyti statim succedere solum esse intestini exitum, sed tempore demum interposito: & in nostro praesertim aegro intelligo, quam robustus adhuc is musculus sit, utque alii omni, etiam violento, resistat motui. Joannes autem Riolanus (c), parentem dico, ad sphincteris relaxationem Levatorum quoque ani relaxationem adjungit, hancque pars magna Medicorum agnoscit. Ego vero sine hac, & ab initio fuerit in hoc casu, neque audacter negare velim, neque pro certo affirmare possum. Hoc tantum ajo, si forte etiam sit, certe amplius solum non esse. Ex Anatome enim scio, intestini partem quae extra podicem restare possit ob hanc tantum causam quod ab iis muscularibus non relevetur, esse infimam, & paucorum digitorum; non eam quae supra hanc est, & octo aut decem circiter digitos longa, imo sexdecim, aut viginti, si duplicata, ut est se extrorsum invertendo, spectetur.

4. Alias igitur causas hic cogitare necesse est, illamque inter ceteras quae ab Docto Medico consulente attingitur, id est intestini divulsionem a mesocolo, aut aliam aliquam causam quae eodem redeat, & facilius sit, ut puta relaxationem, sensim factam, ultimae ejus mesocoli partis, quae vinculi loco est tum Recto, tum proximo illi in quem hoc definit, flexuoso, & mobili tractui intestini Coli. Non me fugit, recentissimis quibusdam Medicinæ Magistris veri simile non videri, totum intestini corpus prodire, spectantibus hujus vinculorum firmitudinem, arcumque nexum cum uteri vagina in feminis, cum vesica autem collo, & vicinis partibus in viris, & Observationem praeterea quam ex Cowpero (d) proferunt, hominis, qui post diuturnum ani prolapsu, hujusque tandem ex nimia intemperantia sphacelum, cum propendentium corruptarum partium extirpationem sustinisset, non modo pristinam recuperavit valetudinem, sed etiam ab ani prolapsu immunis omnino vixit. Credunt itaque ipsi, & Cl. Junckerus (e), non totum intestini corpus, sed internam dumtaxat tunicam relaxatam, & crassam factam se se invertere, atque exire: quibus illud favere, non negaverim, quod ad eundem hunc modum accidere in uteri, id est in vaginae frequentioribus prolapsibus creditur, quos

quos multi cum raris utique ipsius uteri prolapsibus male confundunt. Verum est, neque id me praeterit, nec quantum membranae possint relaxatae, & humore imbutae longiores fieri, & crassiores; tamen cum relego quod se in quibusdam vidisse, scribit, Fabricius noster ab Aquapendente (f), ani videlicet procidentiam ita longam, ut cubiti mensuram equaret, atque ita crassam, ut ambos cubitos simul junctos metiretur (qui locus exciderat forte Junckerus (g), cum a Muralto (h) memoratum, pari longitudine prolapsu fidem fere superare, censuit) cum igitur talia relego, eo mihi in certis quibusdam casibus inclinare videtur animus, ut credam cum Viro Cl. Polycarpo Schachero (i), neque prima illa, neque secunda hac ratione rem accidere, sed tertia potius quae ab ipso proposita est. Scilicet immota infima Recti intestini parte, quam firme adeo cum vicinis connexam diximus, superiorem hac partem reliquam intra eam cum recrementis prolabi, inversamque extra anum prodire. Satis enim est mesocolon ibi relaxari, ubi Rectum continet; aut, si prolapsus longior sit, ibi praeterea, ubi ad proximum illum pertinet mobilem, & flexuosum Coli tractum, qui sicuti aliis longior contigit, aliis brevior, ut in Adversariis III. (k) diximus; ita plus minusve extendi, & descendere potest, & Rectum prolabi sinere. Quod si ne additamentum quidem hoc meum satis esset; tum vero de alio insuper cogitarem, ut si praeter illas tres superiores, quarta proponi posset ratio, secundum quam & id fieret quod modo in tertia diximus, & praeterea interna tunica, ut in secunda dictum est, relaxata, & inversa procidens, per infimum excurrentis intestini extremum prodiret, ipsumque, se addendo, longius faceret.

5. Non est quidem mea consuetudinis longiore oratione uti in theoretica medicorum Consiliorum parte; neque enim ignoro, ægorum plerisque esse Empiricorum similes, non dubitantium, ut ait Celsus (l), *has latentium rerum conjecturas ad rem non pertinere, quia non interfit, quid morbum faciat, sed quid tollat*. Hic tamen alter mihi agendum existimavi, non modo quia doctissimus is Aeger est qui consilium requirit meum, verum etiam quia tametsi quaedam animadversiones quas ex iis deducam quae haecenus dixi, non ostensuræ essent adversus Empiricorum opinionationem eorum quae dixi, utilitatem; certe cum prolapsus quo de loquor, cum una possit, aut cum altera, aut cum pluribus ex variis quas attigi, causis esse conjunctus, mihi autem ob ea quae initio (m) sunt indicata, non liceat sine maxima difficultate, & quod consequitur, sine maximo errandi periculo, quacum illarum reapse conjunctus sit, definire; oportet saltem ut per quandam inductionem, id quod facio; colligam, five una, five altera, seu plures hic sint earum causarum, veri semper esse simile, ut in relaxatione quadam consistat, & hac quidem, sicut ejus ostendit effectus, viginti ab hinc annis, eoque amplius inchoata, paulatim autem postea adacta.

6. Ex quo ut indicatio existit relaxatis partibus restituendi primum illum iustae architecturae modum, nexum, situm, vigorem; ita nemo est vel leviter in Re Medica versatus, qui non continuo intelligat, difficillimum, ne dicam impossibile esse id assequi. Quod si, ut generatim Galenus docuit (n), sedis vitia & affectus difficilem curam accipiunt; quae causa fortasse fuit, cur quidam olim Medici in eorum dumtaxat curatione suum omne studium locarent (o); quanto difficilius hoc poterit contumax adeo, & vetustum sanari? Multo quidem majorum prolapsuum, velut is erat quem ex Muralto commemoravi (p), sanationem legisse memini. At antiquorum, & qui a viginti jam annis affligerent, certe non memini. Itaque satis nobis hic esse deberet, si cum tolli relaxationem nequeat; palliativa saltem, ut vocant, curatione aut prohiberetur, aut minor, & levius ferendus redderetur quotidianus illius effectus, qui gravis est adeo cum propter molestiam, tum quia morbum auger, tum etiam quia in summum aliquando periculum potest adducere vel nimis aucto eo quod procidit, vel serius reposito, vel ab aeris injuriis vitiat, vel denique minus cohibito a sphindere, qui temporis decursu relaxari potest tunc praecipue cum fractum atatis robur minus huic relaxationi poterit, & ei quæ jam adest, ne magis augeatur, oblitere.

7. Sed quemadmodum ad hanc tollendam frustra adhibita esse, intelligo, medicamenta quaque validiora; sic pariter video, adversus relaxationis effectum in palliativa curatione incautum tracta fuisse in usum instrumenti Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

ta multa, & varia, ideoque alia a me requiri, illiusque in primis descriptionem, quod fuisse olim dicitur a Monacho ingeniosissimo Paulo Sarpio excogitatum. Ego autem vereor, ne ad ista quae jam sunt adhibita, ea tandem referri possint omnia; si quod praecipuum est, spectemus; quae mihi quidem cognita sunt, interque haec illud quoque Sarpianum, quando ejus nullam descriptionem invenio praeter hanc quae apud Rhodium (q) legitur: *Hæmorrhoides in suum repositæ locum, ne denuo procidant, annulo ferreo dextre cobibeantur: quem summi ingenii Viro Paulo Servite Veneto plures magno commodo acceptum referunt. Annulum vero aluta utrinque continet, quæ perineum, & clunes versus, fasciis quatuor ejus capitibus adjunctis, lineo cingulo innoxius firmatur*. Ad annulos igitur, jam in usum tractos, instrumentum Sarpianum attinet: ad eundemque, nedum ad tabulas Hippocratis (r) angustissimas id redit quod ab Riolo (s), duobusque aliis Gallis Blegnyo (t), & Dionisio (u), & ante hunc etiam a Muralto (x) laudatur, nimirum tabula, foramine pertusa ejusmodi, ut egerentis intestinum transire ne sinat: quam tabulam Muraltus vestiri jubebat panno caruleo ex Indigo, non terre Madagascari, sed insularum Antillidarum. Eodemque tandem recidit quod, nullo instrumento adhibito, suadebat Paræus (y) scribens, *rectus stansque si alvum exonerare possit, nunquam egerendi contentione intestinum exclusum iri*. Verum cum Aeger, nobis propositus, exonerare alvum nequeat, nisi, omni artificio amoto, intestinum exire sinat; terere mihi tempus videar, si alia ejusdemmodi excogitare coner, nec potius causam quaeram, cur inutilis hic usus sit ejusdemmodi instrumentorum, ut hac causa cognita, aut solertis Chirurgi alicujus excitetur ingenium ad longe aliud, quod utile esse possit, invenendum, aut si hoc omnino fieri non posse, intelligatur, pars affecta nullis in posterum instrumentis vexetur.

8. Et primum credibile sane hic non est, ideo exire intestinum necessario esse sinendum, quod recrementa nimis crassa, & dura transire nequeant per instrumentum illa quae sunt memorata; id enim si esset, jam pridem fuisset provisum, & ne accideret, opportuna aut vivendi norma, aut modici aptique humoris injectione perfectum. Itaque relinquatur, ut totius intestini, aut internae ejus tunicae relaxationem tantam esse, credamus, ut illud, aut haec, detrudentibus excrementis, descendens, multis, magnisque rugis, quarum aliae aliis imponentur, valvulae instar efformet, quotiescunque artificio praesertim aliquo cohibetur, se prorsus extendere, & explicare non queat, sicque apertum recrementis exitum dare. Quod si est; omnia ejusmodi artificia sunt removenda, per quae cum ea intestini pars inter desuper adactas faeces, & instrumentum comprimitur; nulla inde sperari utilitas, imo vel major noxa timeri aliquando potest. Illorum loco novum quoddam requireretur instrumentum, quod non solum exterius, ut illa, infimam sustineret intestini partem, sed simul eo perveniret, ut fulciret interior, ac opportune dilatare posset parietes relaxatos, ne rugarum, & valvularum instar, se ante faeces invertendo, his, cum exiturae sunt, intercluderent viam. Oporteret hoc instrumentum esse ejusmodi, ut facile immitti posset, atque intra modum dilatari statim ac inciperet naturalis necessitas poscere, neque ullum sive lateribus, sive praesertim summa sui parte intestino laesionis periculum afferret: ad quod avertendum summa quaque illius partium, priusquam immitteretur, molli aliquo ac recenti conveltiri posset parvi animalis intestino. Notum speculorum, quae vocant, artificium quibus Chirurgi utuntur ad vaginam uteri, ipsumque adeo Rectum intestinum dilatandum, posset fortasse prudenter, ac solerti instrumentorum excogitatori facilius suppeditare multo meliorem, minusque incommodam ideam hujus instrumenti quo satis esset extensam servare eam intestini partem quae facile dilatatur, illam videlicet quae est supra sphincterem; per hunc autem qui magis dilatationi resistit, non plus viæ apertum relinquere quam quod transfuturis mollioribus & quasi fluidis excrementis sufficeret; talia enim ut sint, per vivendi normam, uti dicemus, nihilominus curandum est. Sed cum probe sciam, machinarum pleraque, ubi ad usum trahuntur, spei, & cogitationi minus respondere solitas esse, in hoc autem speciatim casu praecclare videam quae oriri detrimenta possent non modo si in experta manus instrumentum immitteret ac dilataret, verum etiam ex ipsa frequenti immisione, ac dilatatione, atque adeo ab ipso intestini, dum faeces expellerentur, motu, &

C 3

(y) Aphor. 12. (z) supra ad n. 10. (a) Animadv. 27. (b) De Morb. Puer. l. 1. c. 10.
(c) Oper. Chirurg. l. 7. c. 18. (d) Meth. Med. Sect. 3. ubi de Ileosi.
(e) Anat. of hum. 601. T. 39. F. 7. (f) Confp. Medic. Tab. 110.

(f) De Chir. Oper. c. de Ani Procid. (g) Tab. cit. (h) Eph. N. C. Dec. 2. A. 1. Obs. 113. in Schol. (i) Disp. de Morb. a situ intest.
(j) n. 2. § 3. (k) Animadv. 6. (l) De Medic. in Praef. (m) n. 2. (n) De Comp. medic. sec. loc. l. 9. c. 6.
(o) Vid. l. Gal. adscr. de Parib. Art. Med. c. 2. (p) n. 4. (q) Contr. 2. Obs. Med. 94. (r) De Fistul. n. 4. (s) Sect. cit. supra, ad n. 3.
(t) L. Art. de guerir l'herm. P. 2. S. 2. c. 8. (u) Cours d'Oper. de Chir. Dec. 4. (x) Schol. cit. supra ad n. 4. (y) cap. cit. supra ad n. 3.

compreffione , cumque tandem ne illud quidem fore pro
certo quam, relaxationem haud altius incipere quam
quo pervenire infrumentum possit, proficere, de hoc me
non alia mente ferremus instituisse, nisi ut alios ad
commodiorem aliquam, facilioremque ideam querendam
excitarem : quam si tuto, & sine ullius periculi suspi-
catione ad usum deduci posse constaret; tum vero expe-
rimentum ejus capere, neque ab re profecto, neque inu-
tile foret.

9. Quando autem; id quod propter modo indicatas causas plurimum vereor; pro explorato habent omnes, in palliativa curatione nullum hic restare cuius instrumentum locum; tunc nihil negotii Medicina relinquere, nisi ut videret, num forte in curacionibus quæ ad tollendam istam relaxationem jam pridem institutæ sunt, prætermissum fuisset remedium ullum, quo si non vinci, at aliqua saltem ex parte imminui morbus posset.

10. Ex Chirurgia quidem multa olim adversus hunc morbum trahebant auxilia. Laudabat Riolanus (*g*) cucurbitulas duas, singulas ad latera singula imi Sacri affodmas, five ad clunes, ut memorat Schacherus (*a*), inde aliquid commodi tunc expectans, cum principis mali causa hæret in languidis ani mulculis. Ego non multo plus hinc spero, quam a cauteriis duobus ad infimam Spina additis, quæ, Arabum asscias secutus, Mercurlus (*b*) propouit, Marcus autem Aurelius Severinus (*c*) confirmavit; nisi in eo forte adhienda essent, cujus habitus longe alius esset ac Ægri nostri, & prolapsus habuissimus copia aut factus, aut servatus. Quod vero ad famofum auxilium attinet antiqui illius Chirurgi Leonidæ, quem Vir Cl. Daniel Clericus (*d*) eundem credit ac Leonidem Medicum Epifytheticum, a Cælio Aureliano (*e*) memoratur; nec varia aliorum judicia omittam, nec meum reticebo. Igitur cum diæta nihil proficisset, neque medicamenta contulissent, malo jam inveterato, censebat Leonida, & necessarium esse, & minime periculofum externam sedis partem extremam cauteriis aliquot inurere; sic enim cicatrice solida succedente anum in ambitu constringi, & prolapsum tolli. Apud Aetium (*f*), qui hanc, aliase Leonidæ nobis curationes servavit, legi hæc aliquanto distinctius potest: quam Fabricius quoque ab Aquapendente (*g*), & Riolanus (*h*) commemorarunt. Severinus (*i*) autem non modo ipsam memorat; non modo suis multis observationibus confirmat, ignem huic parti, in aliis morbis tamen, adhibuit, sibi feliciter cessisse; fedignavos Medicos vocat, per quos ipsi non licuit eodem ignis præsidio Virum curare ex Æquestri Surgentiorum Familia, cujus prolapsus, ut Ægri nostri, vicennalis erat, nullamque pariter ex omniigenis medicamentis opem retulerat. Contra, Nicolaus Blegnyus (*k*) ejusmodi

tuatur. Contra, *remedia* agnoscenda, quam curationem absjicit, ut non minus molestant, quam no-
xis temporibus insinuant. Petrus autem Dionisius (*l*)
a se unquam negat esse visam, ejus Auctores crudeles
vocat, ipsam vero vel audientibus horribilem: crediteque
si quis forte esset qui eam tentare vellet, neminem fore
qui non adverteretur, idque merito propterea quod sine
illa sanari possunt hac mala: quamquam hoc qua ratio-
ne probare ipse possit, non apparet, quando nullum
proponit auxilium quod sanando huic nostro par esse
videatur. Mihi vero minime necesse hic est aut igna-
vis Severini, aut crudelibus Dionisii atipulari. Nam
est non nego, Leonidæ curationem esse posse utilem
in humili, & parva relaxatione, idque observatione
Cowerpi, quæ supra (*m*) indicata est, quadatenus con-
firmari; in relaxatione tamen hac nostra, quæ tanta
est, & tanto altius videtur incipere, multum vereor,
ut satis, atque adeo ut quidquam omnino esset profu-
tura.

11. Interea melioribus me Iudicibus ultioris exami-
nato relicto harum curationum quibus Chirurgi olim ute-
bantur, ad considerandum transiit instrumentum recen-
tius, cuius usum pluribus in prolapsibus fuisse pro-
ficuum, Auctor testatur. Is Blegnyus est (n), quem
paulo ante memorabam, vir sane ingeniosus. Acci-
piebat hic galli indici ingluviem ejusque orificium arcte
ad extremum alterum brevis tenuisque argentei tubuli
circumligabat; per alterum autem extremum, bacil-
lum, in fummo obtutum, immittebat ad fundum us-
que ingluviis illius, sicque hanc primum, tum deinde
tubuli iustam partem, adstringentibus remediis illi-
tam, in podicem inducebat; partem reliquam extrafer-

vabat ita faciãt, ut cum bacillum detraxisset, hujusque loco extremam fistulam parvorum follium in eandem tubuli partem inferuisset, atque aeris tantum intruisset quantum implendæ ingluviæ fatis esset, redire aer priusquam æger vellet, non posset, itaque retentus partes relaxatas fulcire, efficereque, subinde, ac diu repetito usu, ut ea pristinum situm, vigoremque, quod ad ejus fieri posset, recuperaret. Sed instrumenti hujus accuratam descriptionem, ac delineationem, firmandique modum apud Auctorem videre præstat. Equidem Dionisio (o) facile in eo assentior, quod neque incommodo careat instrumentum hoc, neque usum præstet retinendi in sua sede intestinum eo tempore quo maxime opus esset, id est cum alvus exoneratur, quandoquidem eximi tunc debet, & mox, reposto intestino, reponi. Illud tamen nego, eundem, ut ipse ait, præstare effectum quem faciat, & cætera exterius adhibita. Quin, excepto incommodo non adeo gravi, & quod manu opus est cauta ad instrumenti repositionem, non profus inutile hoc crediderim inter initia præsertim hujusmodi relaxationum. Cogitari etiam posset, an pro ingluvië illa, intestino uti præstaret molli ac tenuibus tunicis prædito bruti aliquis, ææ longitudine, & latitudine qua liceret, ac opus esset, arctè intus clauso ad superius extremum, illito autem exterius eo remedio quod post alvi exonerationem infra (p) commendabo: quod intestinum ubi sic fatis immixtum esset, injecto mox ære aut etiam interdum humore aliquo, ab re non alieno, penitus diftendi posset, aut certe hæcenus, ut deiciens cupiditatem non moveret. Non hoc facilius, simulque innocentius invenire auxilium proclive fortasse est ad reponendam, retinendamque in nativâ fedè relaxatam tunicam, ipsuvne intestinum, ut hac ratione levamen illius vinculis afferatur, unde quantum possunt, se reficiunt, viresque recipiant. Cæterum sicut inter initia, ut dixi, aliqui utilitatis inde sperari possit, credere, & plus certe quam a turundis, quas alii eadem prædhibent, remediis corroborantibus imbutas & illitas; sic quantum expectari indidem posset in morbo inveterato, non videre me, fateor.

12. Quod ad Pharmaceuticam attinet, tanto medecet esse brevior, quam confulentis Medici litteris certior fit, usurpata jam fuisse remedia, quæ poterant, omnia de genere glutinantium, vulnerariorum, adstringentium, & nervos juvantium, & quanto pleniores ejusmodi remediis video omnes Medicorum, & Chirurgorum libros. Quamvis autem iisdem litteris commemorari tantum viderem foris, femicupia, iniectiones, cerata, suffitus, aliasque ejusmodi formas, exteriorum omnes remediorum; non tamen dubito, quin simul in usum venerint quæ is respondent, interiora. Equidem præclare intelligo, quod his præsidis obtineri hæstenu non potuit, id multo minus in posterum esse sperandum, cum factus interea sit gravior morbus, magisque ejus causæ sint confirmatæ. Verumtamen donec ætas, & robur vigent. repetenda fortasse esset, certe repetita caute, prudenterque nihil noceret, diuturna, & valida curatio. In qua optima quæque corroborantia medicamenta propinarentur, quæ potius tamen ex iis essent quæ nervos juvant, quam quæ adstringendi vi pollent; his enim adstricta alvus majoribus ac plurius ad egerendum nixibus opus haberet, quibus magis magisque augetur morbus. Quam etiam ob causam abjicienda omnino illa sunt quæ purgantia nuncupantur, ad læsam enim partem ducunt, in eaque permolesita, & noxia relinquunt irritamenta. Quod si alvum solvere necesse sit; is quæ mox in Dietâ memorabuntur, aut eorum consimilibus plane innocuis utendum est. Ex illis autem remediis quæ exterius adhibentur, summopere mihi placerent, si formam speciem, femicupia, atque iniectiones; si materiam, therमारum aquas corroborantes.

13. Diætica restat, cujus rectus usus omnino necessarius est, cum & vires adjuvet praesidium quæ à Chirurgia, & Pharmacia desumuntur, tum etiam quia, si hæc aut nequaquam, aut frustra repetantur, nulla præter illam jam ratio superest, quæ, & facilius quidem, innocentius, frequentius, curare possimus, ut minus moleste falem, minorque cum periculo ferat morbus. Videtur proponit Mercurialis (g), qui siccandi vim habet: nec dubium est, quin si victus faciat ad roborandum. Verum si recte penduntur gravia, & crebra detrimenta quæ ab alvi fæcibus proveni-

venient ea victus ratione induratis; facile videbitur esse a nobis, præsertim postquam repetita fuissent incaustum medicamentis corroborantia, victui qui succidendi vim habeat, eum qui humectandi vim polleat, anteponendum, qui nempe victus simul excrementa mollia ferveret, simul eorum acrimoniam corrigeret. Medicus cautissimus Franciscus Redius (†) in Consilio adversus dolorem & fluxum hæmorrhoidum, cum intestini prolapsus in alvi exoneratione conjunctum, jubebat, mane bibi ad felibram jus carnis non salutum in quo bullissent fatis multæ violæ martiæ, & postquam hæc non nisi ficcata haberi possent, eorum loco aut chicorea, aut borrago, aut buglossa, aut fonschus, aut prunus recens, ficuæ, appianum malum, aut ejusmodi alulio. Seri usum commendabat depurati, edulcatique *julupio* five ex *inctura* violarum martiarum, five ex appianis malis. Usum quoque lactis asinini, aut caprini laudabat. In prandio, cœnæque inter alios cibos pultem semper, sed hanc simplicem, & jure plurimum abundantem, in qua poma bullissent, aut herbæ aliquæ ex iis quæ supra dictæ sunt, interdum hordei quoque, aut orizæ aliquid. Carnes elixas sæpius malebat, quam afflas. Omisisse aromatisibus, & mero, prandium, cœnamque semper claudi coëto pomo, vel pyro, aquam superbibendo ad uncias tres, *julupio* ex cortice citrei mali edulcatam. Ab his quæ ex Redij Consilio retuli, non multum recederem in hoc casu, aut tantum duntaxat, quantum fatis esset, ne alvus nimis forte lubrica fieret. Quod si Rediana ista vivendi ratio non sufficeret; sufficere autem diuturno usu deberet, alvo hæctenus molli reddendæ, ut ad eam exonerandum neque nixibus opus esset, nec longa mora; tunc vero ne in eo quidem Redium imitari displiceret, ut interdum pulpæ cassiæ drachmas darem binas, mane ante jus de quo dixi, fumentas, totidemque iterum paulo ante cœnam, si necdum quidquam egissent priores duæ. Si vero nihilominus dura, & ficca recrepante fieri pergerent; non ea pernixus & conatus, sed ope enematum excludenda esse, censerem. Hæc autem felibræ pondo, haud amplius, quo facilis retineri possent ad iustum tempus, ex solo autem carnis jure, aut ex emulsionē, ut appellant, hordei, aut orizæ quæ semesta antea, & cocta essent, & id quoque ad Redij imitationem. Quidenique multis esset laudibus unguentum quoddam (*manteca* vocitur) flavum ex rosis, quale a Sepalsiariis conficiebatur Magni Etruriæ Ducis, affirmans, prolapsum intestinum multo facilius, citiusque reponi, si ejus extremum liniatur unguento illo, quo præterquam quod dolor leniri, humorum autem acrimonia retundi, poterit, inquit, læsa, ac debilitata pars non parum corroborari. Cæterum intestini repositionem minus difficilem reddent præscripta vivendi ratio, & in cibo parcitas. Sic enim neque in proximo Coli tractu copia excrementorum cumulabitur, quæ res illi obitare solet repositioni, nec sanguis gignetur qui aut redundantia sua, aut vitio alio infirmam partem faciat craffiorem. Quod cum accidere etiam queat a violentis moribus, & exercitationibus; has quoque omittere oportebit, nec minus; ut paucis complectar omnia; quidquid longo adeo tot annorum spatio, multo experientia ipsa melius, quam possit Medici cujusvis consilium, noxiū esse, demonstraverit.

14. Hæc, multis ac variis occupationibus, studiisque
differtens, habui quæ in difficillimo casu animadvertē-
rem, ac responderem, optans ab Nobili, Eruditoque,
pro quo scripta sunt, Viro, ut qualicunque finis, gra-
tia habeat, ab Experimentissimo autem qui me consiliat,
Medico, ut iis hæcenus utatur quod pro sua prudentia,
rebusque circumstantibus licere, credere, ab Deo
tandem immortalit., ut quicquid decretum, ædumque
fuerit, propitius fortunet.

15. Habes Consilium, quale tum scripsi, anno videlicet 1725. posttridie Idus Sextiles. In quo præter ipsam prolixitudinem, alia quoque sunt quæ ne mihi quidem nunc satis placeant. Verum in res incidens minus tractatas, neque hæc, neque illam vitare potui. Atque utinam ab eo tempore existitit aliquis cujus anatomicæ observationes optatam huc attulissent lucem. Sed eæ, ut Schacherum, doctissimum Virum (f), & me tunc latebant, sic adhuc latent. Quæ autem in cadaveribus quaerenda sint eorum præsertim quorum intestinum procidere confueverit ad miram longitudinem, Consilium tibi indicabit nostrum, nec tamen fortasse omnia. Quis enim sciat, num aliquando aut nimio humore laxata, aut congestorum recrementorum copia, aut violentis, Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

diuturnisque in egerendo nixibus distracta, ac divulsa ea vincula quæ ex supremo Recto in proximum Colon ducuntur, fasciolas tres referentia, et ita finant tum aliquot ex ultimis Colicellulis tum plurimas ex iis quæ intra hæc sunt, transverfis rugis extendi, ut prolapsi intestini longitudo augeatur. Videndum igitur erit, ubi illiusmodi cadavera, quæ adhuc desidero, incidenda observent, quomodo illa etiam vincula, illaque cellulae se habeant, aut si utraque persistant, an interiores saltem rugæ magna ex parte sint explicatae ac deletæ, quares una maxime anteriorem tunicam in qua illæ sunt, deorsum extendi sineret, trahente videlicet continuata anteriore tunica Recti intestini, quam se invertere, & sic prodire, fecuti recentes in primis Rei Medice Scriptores, in Confilio (†) posuimus. Quæ tamen ipsa inversio quatenus fieri, agnosceque possit, nunc in iisdem cadaveribus pariter querendum censuimus. Neque enim hic, ut alibi (u), agitur de parte dumtaxat aliqua, eaque cum quadam quasi curricula quæ abscedit, comparanda, sed de tota ipsa anteriore intestini Recti tunica: quam a muscolosa sic dissolvi, ut tamen non emoriatur, nec gravissima habeat conjunctiæ symptomata, difficile est creditu apud eos qui innumeras, mitto fibrillas, & nervulos; arteriolas tantummodo, ac venulas, utramque tunicam jungentes, animadverterint. Hæc igitur valcula an adeo laxari sensim, extendique possint, ut magnæ præsertim inversiones tunicae interioris requirunt, quas non pauci hic fieri censent; an tumorum exemplum, in quibus constat immanem accidere vasorum extensionem, hic locum habent, ubi crassescere quidem interior tunica dicitur, sed flexilis tamen plerumque, & apta ad repositionem servari; an denique inversiones hæc, quæ non secus in Recto intestino, ac in vagina uteri, proponi solent, cum re ipsa, & quatenus convenient, non aliunde certius, quam ex accuratiori cadaverum incisione addiscetur. Nec vero in magnis præsertim Civitatibus rarissima esse potest ejusmodi cadaverum dissecandorum occasio. Non paucis enim hic morbus funestus est, inflammatione videlicet, gangrænæque intestinum corripientibus, cujus repositio negligenter nimis dilata sit. Sed in iis etiam quos aliud mortis genus suffulcrit, aliquando accidit, ut quædam se offerant quorum ad hanc rem utile esse possit examen, siue Recti intestini prolapsi obnoxii fuerint, siue quacunque ex causa, ut in milite quodam gregario (x) *Coli in intestinum Rectum prolapsus, seu devolutio* occurrit, quæ in illo quidem ad *spitham longitudinem* fuit. Non Rectum autem dumtaxat, verum etiam Colon ipsum procidere, non dubitavit Salmuthus (y), cum lactentis puelli Observationi (z) qui in gravioribus epilepsiæ paroxysmis intestina extrudebat *satis magna longitudo*, hunc titulum fecerit *Procidenda intestini Coli ex Epilepsia*. Atque utinam persecuisset puellam (a) annos natam circiter quatuordecim, cui ex neglecto acriore tenebmo *totum tandem intestinum Rectum cum parte Colæ ad longitudinem spitham arduum*, & *amplius fuit protrusum*. Cum enim satis relictui in suam sedem non posset, gangræna autem Recti extremum jam occupasset; mortua æt, ipso mirante, quomodo tanta intestinorum portio excideret e mesenterio potuisset. Quod si plura, & varia cadavera diligenter perfercari tandem poterint fide eorum qui ex prolapsu tunc primum, aut non ferre antea perlato interierint, fide eorum qui cum eisdem, & ad magnam quidem longitudinem (b) sensim adaucto obnoxii essent, aliquæ alio inde incommodi, & molestiæ modo affecti, ex quocumque morbo decesserint; non dubium est, quin proclivius futurum sit de illius causis, & curatione consulentiis responde-re.

16. Sed me casus tunc propositi condiciones sicuti in theocratica parte ad quadam minus fortasse verisimilita adduxerunt, ita in parte etiam reliqua impulerunt facile ad nonnulla quæ optari queant potius, quam fieri. Quod si agrum non ea peculiaris necessitas tenuisset, ut artificia amoveret omnia, & procidere intestinum fineret, si quidem recrementa vellet ejicere; non defuissent auxilia quæ proponerem, ut cum ea ejicerentur, in sua illud sede peritaret. Erat primum Sarpii annulus: quo de annulo præter ea quæ retuli supra (c) ex Joanne Rhodio, hæc etiam in Sarpii Vita legisse memini: cum ipse hoc morbo diu laborasset, plura autem subiunde, sed frustra omnia tentasset, querere demum instrumentum aliquod cœpisse, quo intestinum contineretur, itaque post multa annos denique invenisse ad id aptum adeo, ut tametsi ad

C 4

finem

(c) Sect. cit. supra ad n. 3. (d) §. 9. cap. cit. supra ad n. 2. (e) cap. cit. supra ad n. 3. (f) De eff. Med. l. 2. P. 1. c. 50. (g) Hist. de la Méd. P. 1. l. 4. c. 1. (h) Acut. Pass. l. 2. c. 1. (i) Medic. Terrab. l. 4. Serm. 2. c. 8. (j) c. cit. supra ad n. 4. (k) Sect. cit. (l) Part. cit. c. 95. (m) cap. cit. supra ad n. 7. (n) cap. paulo ante indic. (o) Demonstr. paulo cit. supra indic. (p) n. 13. (q) c. cit. supra ad n. 4.

(r) Opere dell' ult. Ediz. T. 4. ve lo si fine. (f) §. 3. cit. supra ad n. 4. (t) n. eod. (u) Epist. n. 1. xc. (x) Aft. N.C. Tom. 2. Obf. 103. (y) Obf. Medic. Cent. 1. (z) 31. (a) Obf. 30. (b) Vid. Epist. §. n. 6. (c) n. 37.

finem usque vite morbum pertulerit; nullus tamen actionis propterea impedimentum sentierit, haud secus ac si illo careret morbo, idemque ita facile, & prompti usus, ut aliis pariter, quibuscum ipsum communicaverat, eadem presterit. Quod si Vita illa ob Auctoris (qui eundem is nunc ab laudando alibi Summo Viro fuisse credatur) si ob Auctoris, inquam, aut veram quarundam rerum, aut versute simulatam inscitiam, ut in Epist. Anarom. (d) haud aliter illa uti voluerim, nisi refellendi gratia per ipsam, ut loquuntur, ad hominem qui illam objecerant; si forte igitur hac quoque in re suspecta esset; alterum non defuisset instrumentum, quod a Valsalva nostro videram in quodam Consilio memorari. Scilicet cum eger ad exonerandum ventrem fellam peteret, pressio esset hujus operculum in medio perforatum, ibique firmiter tubo instructum plumbeo, cera exterius, & in summa ora circumlito, non latiore duabus tertiis unciae Bo-

noniensis partibus, & longo quidem uncias circiter duas, sed non ultra semunciam intra podicem admittendo, nec sine cauti Chirurgiope, cum prima ejus fierent experimenta, ut si feliciter cederent, neque in tubi dimensionibus aliquid esset variandum, hac ratione ejici excrementa possent, nec tamen intestinum emitti. At si neutrum instrumentum spei responderet; intelligis enim vel ex iis quae in Consilio attigimus, quae noxae possent, nedum quae molestiae interdum ex ejusmodi praesidiis existerent; alia erant praeterea quae possent excogitari. Vides enim, exempli causa, qualem Cl. Bassius (e) invenierit anulum, qui nullum facibus egerendis ponens obstaculum, facile, uti scribit, & gestetur, & postquam morbum sustulit, extrahatur; sustulisse enim, ait, vel diuturnum, brevi, atque adeo intra menses duos, sed de prolapsu Recti intestini hac attigisse satis sit. Proximis Litteris ad alios morbos pergemus. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXXIV.

Sermo est de Intestinorum Dolo.

ETSI pars maxima Observationum, ex quibus Sectio constat XIV, tertii libri Sepulchreti Anatomici, ad Dolores spectat Intestinorum, tamen multae etiam in ea sunt quae ad alia Ventris attinent viscera, ex utriusque autem nonnullae in quibus non internae, sed extrinsecus accidentis causa, ut ictus, & vulnera dolorem fecerunt. Quod mihi exemplum sequi non placet, ut qui aliarum ventris partium dolores alibi suo quenaque loco tibi aut proposui, aut sum proposuitur, & de ictibus ac vulneribus seorsum pariter scripturus. Molestus autem repetitionibus esse nolo: quae adeo non vitantur in Sepulchreto, ut in hac ipsa Sectione bis posita ostendamus Observationes plures (a), in Additamentis autem ad eandem, non agnito Blancardi fuso, tres sub hujus nomine repetitas XV. XVI. & XXIII. quarum duae postremae in Sectione ipsa (b) jam fuerant, ut prima in praecedente Sectione VIII. (c), veris Auctoribus adscriptis, propositae. Sed neque in eo mihi satis placet Sepulchreti Auctorem imitari, ut Observationes in eas dividam quae ad Colicum dolorem attineant & quae ad Iliacum, non quod omnino improbem hanc divisionem; quamquam Dioecles Carystius, ut Celsus (d) docet, non tenuioris, sed plenioris intestini morbum *ileon* nominabat, Alexander autem Trallianus, ut apud Salium (e) est, non aliud esse *ileon* censuit, quam colici affectus intensiorem, ac incrementum, & Salius (*) in utroque illorum intestinum esse posse illi primariam sedem, & causam, ostendit; sed quia non adeo facile est, ut multi putant, dolores internoscere utriusque intestini, nec, quod consequitur, per animadversam in aegris signa satis luculente hujusmodi observationes dividere.

2. Nam quod dolores dicuntur esse acerbiores Iliaci, quam Colici, & facile etiam sunt, seu valorem copia id fieri censas, ob quam multo quoque saepius Tenuia intestina, quam Crassa, inflammata reperiantur, live potius nervorum numero, praesertim si villi quibus primaeque adeo abundant, ad papillarum genus sunt referendi; certe quidem alius alio doloris impatientior est, & alia in alio, ac magis, minusque gravis doloris causa; ut minime proclive sit, uter revera majori torqueatur cruciatu, statuere: unde etiam fortasse fuit, cur Galenus, cuius adversos inter se locos conciliare studet Ballonius, sicut in Sepulchreti Sectione hac (f) vides, alibi Iliacos, alibi Colicos vehementissimos esse, scripserit. De vomitu autem, quem in illis magis violentum, atque assiduum esse, docuit, recte in Sepulchreto (g) eos Colicos dolores excipi, invenies, quorum sedes sit in eo Coli tractu qui ventriculi fundum contingit. Et ne longius ab Sepulchreto te abducam; ex eodem (h) pariter admoneri poteris, quam saepe exceptionibus obnoxium, & propterea fallax illud quoque signum sit: quod videtur aliquin praecipuum, quippe a sedibus ipsis pe-

ritum tenuioris, pleniorisque intestini. Francisci enim Sylvii verba reperies docentis, saepe ad umbilicum usque, & quandoque usque ad vesicam insigni anfractu per medium abdomen volvi Colon. Quod si verum est, cum suum hoc locum deserat, Tenuium autem intestinum occupet; intelligis plane, quam falli possit is, qui sedibus hac in re plurimum tribuat. Nimirum non illi solum tunc decipiuntur quos redarguit Sylvius; verum etiam praeterea qui Sylvium sequuntur. Cum enim ea Coli pars quae subesse in transversum ventriculo solet, non ibi fuerit, sed deorsum adeo se incurvavit; tunc errabunt certe qui idcirco eam dolore correptam esse, negent, quod ventris superiora transversus, cinguli instar, dolor non torqueat; sed & illi hallucinantur qui in ventris ambitu ac circumferentia exortum dolorem vere colicum dicendum esse, cum Sylvio credant; nam dolor qui tunc in superiore ventris ambitu exoriatur, in Colo quod illinc ablit, esse non poterit.

3. Verum autem id esse quod Colo saepe accidere, Sylvius admonuit, non pauca, tum Valsalvae, tum nostrae, tibi aut jam propositae, aut proponende Observationes confirmabunt: quamquam non omnia in quibus id vidimus, corpora in his Epistolis commemorandi occasionem habebimus; diu enim est ex quo incipimus animadvertere vel priusquam in eum incidissemus Sylvii locum, ut II. nostra Adversaria (i) ostendunt. Sed in III. quoque Adversariis (k) aliam intimi Coli sedis variationem adnotavimus, hic minime praetermittendam; quamvis ibi pariter ob eandem causam eos more nostro laudare non potuimus qui ante nos illam animadverterant, Spigelium (l), & Riolanum (m); quibus tamen contra ac Valsalvae, & nobis videtur saepius Colon occurrisse valde in sine flexuosum, rarius ductu simpliciore. Verum utcumque id est, cum in flexu in quibusdam non modo versus inguen dexterum Colon extendant, sed interdum, ut vidimus, ad umbilicalem regionem attollant statibus praesertim turgidum; hinc certe apparet, quam facile dolor qui in eo fit, temere tunc ad Tenuia intestinum, cuius illa sunt sedes, referri possit. Hoc igitur varietatum utrumque genus minime infrequens est live a primordiis, live a morbo etiam, quod Riolanus (n) verba subinducant: vidi, inquit, Colon intestinum inter jecur & splenem non directe protensum, sed in S. Romani modum inflexum, & ad umbilicum usque PROLAPSUM. Spigelius autem (o) vel clarius, & magis univere scribens, idem intestinum, ait, praeter naturam in colicis doloribus, dum statibus distenditur, e sua sede naturali abire. Quod si ob hanc causam accidisse, velis, ut in apoplectica Muliere (p) quae iis fuerat doloribus obnoxia, Colon invenierim non modo cum paucis, rarisque cellulis, sed etiam amplioribus quam soleat, gyris extremam sui partem umbilicum versus contorqueus, non repugnabo, praesertim cum Franciscum

ciscum Sylvium intelligam ex Observatione quae in Sepulchreti Sectione hac, est XV. fufius autem descripta legitur in IX. Sectione libri I. ubi est XLVIII. intelligam, inquam, iisdem cruciatibus laborasse aliam feminam, censuisse non tam quia omentum non omnia intestina regens, aut hac nonnihil loco mota adnotasset; hoc enim haud raro, illud vero saepissime occurrit; quam, nisi plurimum fallor, quia utrumque paulo ante expostum varietatum genus in eadem femina, ut videre poteris, deprehenderat. Quod si ob ejusmodi tantum eandem sedes mutarentur intestini Coli; esset tamen errandi periculum eo magis timendum, quod illis de sedibus in iis potissimum sermo sit qui ei solent esse causa obnoxii. Verum in iis etiam quorum est ventriculis amplior, aut jecur grandius, transversa illa Coli pars quae his subjicitur visceribus, tanto inferior est, quanto hac majora. Huc causa accedunt quae ventriculum deprimunt, & cum eo Colon, ut in Veneto Juvene accidisse vidimus (q) ex abnormi Spinae inflexione. Sed praeter morbos, constitutiones quoque sunt corporum secundum naturam, in quorum aliis aliis sunt Coli sedes. Nam etiam ab ortu, ut paulo ante indicatum est, aliter potest esse locatum, & gravidis aucto utero ultimis mensibus transversa illa Coli pars altior est, sicuti Spigelius (r) animadverit.

4. Quae cum ita sint, cumque ex his satis appareat quamobrem dolorum quibus intestina torquentur, Observationes non ita dividam, ut alias ad Iliacos, alias ad Colicos referam; qua malim divisione uti, indicandum est. Primum igitur eas afferam in quibus dolores erant a causa non extrinsecus quidem adveniente, sed tamen sub oculis cadente; deinde vero illas in quibus causa omnino intra corpus latebat. Prioris autem generis has duas ex Valsalva accipe.

5. VIR quadraginta annos natus, sanguineo-bilioli temperamenti, qui levem aliquando ad inguina herniam patiebatur, a carduorum usu in Iliacum incidit Passionem. Levis quidem ad inguina apparet tumor: ibi tamen illo se torqueri dolore, ager negat; in ventre fatetur, ob faecum retentionem valde induratum. Remediis irritis, die morbi septimo lethali vomitioni succumbit.

VENTRE aperto, intestina aere turgida conspecta sunt, & ad eam partem livida ac nigra qua se haud ita procul a Caeco duplicabant, & cum annexa mesenterii portione, quae quasi carnea videbatur, in hernia facculum immittebant, digitos quatuor longum, orificio autem angustiore, ut per hoc redire non possent in ventrem postquam ab illapsa materia distenta fuerant. Erat hic facculus in dextero inguine, ex peritonaeo quidem factus productus, & dilatatus, sed non ex hujus processu; ut plures olim crederent; qui vas semen deferens, vasque Spermatica comitatur; imo huius processui, & his valis, sanguine valde tumentibus, ab anteriore parte incumbebat: eratque intus, ut intercepta intestini portio, colore nigricante, live potius ex atro viridi infectus, quasi a vitriolo tinctus esset. In sinistro autem inguine alter erat facculus, ejus quem descripsi, simillimus, nisi quod eam ex qua fiebat, membranam, & fibras, & vasa colore, ac ceteris conditionibus habebat a naturalibus non discrepantia. In Thorace sana omnia. Erant tamen cum grumoso sanguine polyposae concretionis subluteae, major in dextero, minor in sinistro cordis ventriculo; sed neutra extra ventriculos se producebat.

6. Manifesta erat causa doloris hujus videlicet incarcerata, ut loquuntur, hernia. De qua in his Litteris crebra quidem erit commemoratio; sed tantum quatenus compressa intestini parte, hujus, & proximae sanguifera vasa strangulat; ex quo ut dolor, inflammatio, sphacelus fiant, non necesse est explicare. Cetera de herniis, & de portione peritonaei quae comitatur vasa Spermatica, alibi (f) attingemus. De Iliaca autem Passione scribetur subinde in hac Epistola quantum proposito erit satis. Jam vero facile intelligis, cum ea oritur, ut plerumque, ob interceptum intestinum, tunc accervata supra interceptionem materia distendi intestina superiora, ab hac autem distensione alteram existeret doloris causam, quam augeat ipsa quoque accervata materia corruptio ex mora. Verum unde factum esse, dicemus, ut in proposita historia ibi ager dolorem esse, negaret, ubi vitium erat maximum? An quod nulla inflammatione praevia, sphacelus interceptum occupasset intestinum? Id autem an fieri possit, alias (z) vi-

debimus. An potius quia cum ager illud negabat, jam inflammatio degenerasset in sphacelum? Sunt enim alia quoque in ea historia, ut a Valsalva scripta est, quae non accuratissime mandata chartis fuisse, indicent. Sed neque in proxima ullam doloris mentionem injeicit, qui tamen num abesse potuerit, satis ipsa per se monstrabit.

7. VIR annum agens quinquagesimum, laborans enterocoele, ardenti febre corripitur, & nonnullos post dies vomitione humorum, qui fuligine infecti videbantur. Urinam primum difficile, deinde nullo modo reddit. Catheter a Chirurgo incassum immittitur; namque ubi prope vesicam pervenit, in obicem incidit. Itaque his vexantibus incommodis, ager moritur. VENTRE, ac scroto dissectis, intestina in hoc illapsa, inflammatione affecta inveniuntur; & quamquam nulla in ipsis esset exulceratio; tamen paululum saniosi feri in eorum interstitiis conspiciuntur. Indicium quoque saniosi ejusmodi humoris in ventris pelvi animadvertitur. Vesica erat urina plena; quamvis nullam intus haberet lesionem. Obex autem qui prope vesicam, Chirurgo se obtulerat, nihil erat aliud quam unum ex foraminibus per quae semen egreditur, sic dilatum, ut in ipsum extremus catheter se conjecerit: idem enim specillo quoque accedit, per apertam ex parte mortui urethram adrem explorandam immisso.

8. An id foramen Sinus fuit potius, in Seminali caruncula a me postea descriptus, in eo homine praeter modum amplificatus? Nam si alter fuisset ex feminis ductibus; hujus fluxu videtur homo laborare debuisset. Certe autem ejus orificium Sinus nunc minus, nunc majus occurrit, quod a Cl. quoque Viro Henrico Bassio (u) adnotatum est. Sed mihi ex quo Sinus A. 1719. vulgavi (x), quotannis in Theatro, nec uno interdum in cadavere, ostendenti, nunquam amplius obigit, quod nunc meminerim, ut feminis ullum ductum qui in illum influeret, deprehenderem, multo autem minus ut videretur, quemadmodum ipsi, hinc hiatus esse aliquando levis incisura, seu sulcus post flaccescentiam harum partium demum apparet. Num vero, quemadmodum Sinus ille, ita quoque caruncula intra quam est, amplificata esset, sique & Sinus orificium tenuiori fortasse catheteri obicere, & urinam suppressionem facere posset, tamen si simile est; tamen cum Valsalva nihil praeterea addiderit, eo libentius in medio relinquam, quod; ut causam praeterea a Walthero (y) memoratam; graviter affectis vicinis partibus, adeo non insolitum est vesicam in consensum trahi, lotiumque non expellere, ut Sennertus (z) inter signa inflammationum intestinum hoc recensuerit: quin etiam olim Caelius Aurelianus (a) inter caetera Ileon comitantia mala vesicae, & officii ventris perfectam abstinentiam posuit. Verum de suppressione urinæ alibi. Nunc istis duabus Valsalvae Observationibus aliquot ex nostris subiiciamus.

9. JUVENI agricolae cum ante annos septem intestinum delapsum esset in scrotum dexterum, hinc autem in suam sedem repositum, subligaculi ope retentum, nullam donec hujus non omittis est usus, attulerat noxam. Omisso autem denique, accidit, ut cum duos jam circiter menses teneretur intermittentibus febribus, & se nuper laganis, aliisque ejusmodi crassius ex subacta farina edulis impleisset, intestinum eodem relaberetur. Ex eo die qui fuit pridie Kal. Novembres A. 1705. vomitione corripit coepit amara materia. Huc die morbi quarta singultus accessit, & scroti dolor. Hunc imposita mataxa, calente lixivio imbuta, levare visa est. Sed cum vomitus, & singultus peritaret, & ventris insuper dolores, ac sitis affligerent; illatus est die sexta in Bononiense Nosocomium S. Mariae de Morte. Ubi nec Chirurgi manus quidquam profuit, & Medici auxilia vix levamen aliquod attulerunt. Singultus enim sublatu est, ut vomitus quoque; sed hic breve ad tempus cum emplastrum quod vocant de crusta panis, regioni stomachi fuisset adhibuit, enema autem injectum ex oleis seminum lini, & violato. Die septima primum vidi. Dolor in scroto erat levior. Pulsus minus quam heri fuisse, audiveram, frequens: sed humilior, & infirmior quam ejusmodi juveni conveniret. Sitis perstabat. Neque alvus, nisi injectis quae dicta sunt, oleis, faeces reddebat. Quin cum hodie enema te usu essent ex carminativa, ut vocant, decoctione, cui despu-

(d) 17. n. 68. (e) Dec. 1. Obs. 4. (f) Confer Obs. 1. 5. 2. & Obs. 20. 5. 14. Obs. 1. 5. 21. & Obs. 23. 5. 2. Obs. 1. 5. 14. & Obs. 19. 5. 4. Obs. 2. 5. 1. & 5. 2. Obs. 5. 5. 2. & Schol. ad 5. 8. Obs. 19. Obs. 8. 5. 11. & Obs. 14. 5. 1. Obs. 23. & Obs. 30. 5. 4. (g) Obs. 20. 5. 12. Obs. 3. (h) in Advers. Obs. 5. (i) De Med. 1. 2. c. 13. (j) De Affect. Particul. c. 11. (*) Ibid. (l) Schol. ad 5. 5. Obs. 5. (m) Schol. ad 5. 2. Obs. 25. in fin. (n) Schol. ad Obs. 41. (o) Animad. 2. (p) Anim. 6. (q) De hum. corp. fabr. 1. 8. c. 5. (r) Anthropol. 1. 2. c. 14. (s) Ibid. (t) c. cit. (u) Epist. 3. n. 3.

(v) Epist. 4. n. 16. (w) c. cit. (x) Epist. 43. n. 6. & 7. (y) Epist. 35. n. 19. & seq. (z) Dec. 1. Obs. Amr. 5. 5. 9. (a) Advers. & Animad. 3. (b) Dissert. de Collo viril. Vesicae &c. 5. 3. (c) Medic. Pract. 1. 3. P. 2. S. 1. c. 2. (d) Acut. Pass. 1. 3. c. 17.

matum mel additum cum drachmis duabus electuarii quod dicunt benedictam laxativam; vomitus rediit amarorum, in quibus teres lumbricus; injecta vero vix tandem multas post horas reddita sunt. Die octava lumbricus alter eiectionis est. Abdomen cum tenfum esset, id quod etiam pridie adnotaveram, & sub manu resonans quasi ut in tympanite, non erat tactus vel paulo rudioris impatiens ne in epigastrio quidem, ubi quoddam quasi morfus ager sentiebat. Cum quaererem, an etiam calorem negabat. Pulsus hesternus in ceteris similis; sed tamen multo frequentior. Lingua sicca. Urinarum color saturus. Sub oculis livor, & vel sine hoc facies quæ minus placeret. Nox inquieta. Die nona omnia eadem: imo facies, & pulsus pejores. Hi enim vel magis erant frequentes; cum autem premeres, minus resistebant, aut nihil. Illa ad eam accedebat quam vocant Hippocraticam. Et cum anxius superioribus diebus ager esset, ac voce flebili, & corporis, membrorumque situm mutaret identidem; hac cuncta magis animadvertisses hac die. Nam præter dolorem in toto ventre assidue persistentem, morsum sensus per intervalla hic illic recurrebat cum ubique, tum in epigastrio præsertim. Nullus erat; nam quævis; pulsans dolor, nulla usquam pulsatio. Nec dolor quem in fero aut proxima ventris parte sentiebat, erat his ultimis diebus præcipuus. Cæterum cum pulsus tentarem; siccam quidem, & asperam cutem, nec tamen æquocalidiorum animadvertentem. Cibo sumpto, meliuscule habebat. Levare quocumque se, dicebat, enematibus illo ex oleis, & pridie, cum inditum esset, confirmaverat. Hac autem die cum alterum injectum esset ex jure, in quo femina coriandri bullierant, & faccharo; dum redderet, cibum vomuit. Sub vespere dormivit. Postmodum ut se haberet, interrogatus, in epigastrio nescio quid pulsare, & aliquem in ventre esse caloris sensum, respondit. Interea vomitus fluidioris quam hæcenus, materia, hujusque subtilior per intervalla vexabat. Quo totam noctem, & cæteris quæ dicta sunt, persistentibus, mane, die morbi decima, vivere desit.

VENTER magnam vim effusam habuit ejusdem quæ vomitu rejiciebatur, materia: eademque & ventriculus, & Tenuia ad herniam usque intestina valde erant distenta: in eoque universo tractu unus, haud amplius, lumbricus fuit duorum similis qui inter vomendum eiectionis fuerant. Crassa autem intestina erant vacua, & alba, & sana. Sani quoque ventriculus. Sed proximum huic intestinum qui biliarium, & pancreaticum ductum excipit, ibi ad sex circiter digitos, erat adeo ex inflammatione lividum, ut jam gangranam oleret. Levior inflammatio, & nondum livescens, hic illic tenebat Jejunum, & Ileum partem multo maximam. Reliqua enim pars, quæ propius videlicet accedebat ad Colon, gangrena potius quam inflammatio, occupabatur, quemadmodum hernia ostendit descriptione. Erat facculus pyri forma, ex tunica factus non minus crassa & firma quam arteria Pulmonaris. Is non seroto solum, & darto, sed & Cremaster musculo, eaque cui hic incumbit membrana communiter cum testibus, & vasis ad hunc pertinentibus operiebatur. Testibus autem facculo suberat, vasa ab interno latere exterius adhærebant, & prope orificium facculi, non per hoc ipsum, ventrem adibant. Erat id orificium annuli instar crassioris quem peritonæum, & circumjectus tendo efformabant; admittentem præter Ileum intestinum, & annexi huic mesenterii particulam, omentum quoque cujus propterea nullam ferme partem videram, quæ a sinistris intestina obtegeret, quia dextrorsum erat ad herniam tractum: nec modo ad facculi fundum perveniebat, sed inde in teres corpus se conformans, quod nisi incidissem, ex compressa omenti substantia factum esse, non cognovissem, sursum redibat, & ad Ileum interceptum, haud procul ab orificio facculi, se annectebat. Ad facculum autem quicquid in eo omenti erat, annexum passim inveni per interjectum quoddam corpus rubens, & flaccidum, ut facile posset ab omento, & facculo separari, nec aliud quam membranae cellulæ esse videretur, feri, & sanguinis plenæ. Ileum vero nec facculo annexum erat, neque ad ejus fundum perveniebat; sed paulo infra orificium, in arcus modum se curvans, eadem, qua venerat, orificii via redibat in ventrem; ut, si explicares, non plus ex eo intestino quam ad quatuor, aut quinque digitos interceptum esse, invenires. Id omne gangrana affectum, nigricabat; sed multo ibi magis ubi in orificio facculi constringebatur: cujus orificii annulus non minus niger, ac fetens erat, quemadmodum & proxima super-

rior Ileii pars; imo hæc adeo fracula erat, ut distendentis humoris vim ferre non potuerit, sed foramine pervia non ita parvo, illac in ventris cavum effuderit. Ex reliquis ejus visceribus, quæ, ut intestina, non parum adhuc calebant, cum XIII. a morte hora cadaver incisum est, jecur quoque vitium contraxerat; in limbo enim erat nigrum, in cava autem facie, cum cysti, quæ mediocris erat, subnigrum. In Thorace sana omnia, tametsi in dextero cordis ventriculo polyposa fuit concretio subflava, & mollis, quæ inde albidæ appendices suas in venas usque Jugulares extendebat.

10. De multis quæ adnotari huc possent, quædam infra opportunius, nonnulla etiam attingemus statim ac Observationem alteram adscripserimus, quam mensibus circiter quatuor post priorem in eodem Nosocomio habuimus.

11. MULIER annos nata plus quinquaginta, quæ duos jam & triginta, hernias pertulerat binas, a sinistris ambas, alteram ad umbilicum, alteram ad pubem, cum forte ab loco non ita alto cecidisset, nihil inde mali, nisi contusionem retulerat ad alterius scapulæ, & humeri fines. A qua cum facile convalesceret, coepit interea jam aliquot a casu diebus adstrictam alvum habere, & paulo post fluidam subflavam materiam evomere, idem quodcrementa alvi solent, omnino olemtem. Vomitus cum alias, tum præsertim duabus, aut tribus postquam cibum sumptus fuerat horis ingruerat. Pulsus nec frequens, nec digitorum pressioni minime resistens, parvus erat valde, præcipue a vomitu, minorque fiebat in dies. Cum enemata nihil proficerent; bis datus est mercurius ad drachmas duas, primum frustra, secundo autem eo cum effectu, ut alvus ter solveretur, semel quidem atque iterum solidiscrementis dejectis, tertio autem fluidis. Nec detrimentum afferri eo remedio visum est. Mulier tamen hora circiter duodecima ex quo mercurium secundo sumplerat, mortua est, quarta, an quinta postquam vomitus incepserat, die, semi hora autem ex quo novissime vomuerat; cum toto morbi tempore neque manifesta febris, neque convulsione laborasset, dolores autem ventris moderate adeo tulisset, ut de his nihil habeam adnotatum.

ABDOMINE inciso, ac diducto, odor gravis exiit. Jejunum intestinum, & Ileum proxima pars eadem quæ vomitu eiciebatur, materia, tota erant distenta. Ileum autem pars reliqua, & Crassa contracta. Jejunum quibuscumque in locis distinctum secundum longitudinem striis vividius rubentibus, in cæteris rubebat ex fusco, ut Ileum quoque ferme ubique. Sed hoc non ita procul ab Jejunio multo gravius affectum invenimus ad digitos tres, aut quatuor; quam videlicet sui partem cum annexo mesenterio in hernia inferioris facculum immittebat curvatum in arcus modum. Hæc enim est neque ad facculum, neque ad hujus orificium, quod referebat annulum quasi quandam, alligabatur, gangrena tamen correpta, ex sanguineo colore nigricabat, ferroque cruentum diffusebat. Nullum aut intestinum, sed pars omenti dumtaxat, superiorem herniam subibat, quæ exterius inspecta, in duos erat quasi monticulos distincta; interior autem uno ex facculo fiebat, in quem se laxaverat peritonæum. Præter intestina, cum cætera Ventris viscera inspicere; Thoracem enim, & Caput non referavimus; hepar duriusculum, lienem laxum, & quibuscumque tantum locis exterius lividum animadvertimus. Uteri vincula nigricabant: ipse autem valde parvus, & tenuibus parietibus. Quibus incisis, apparuit eorum substantia in medio livens adeo, ut ad gangranam inclinare videretur. Cum utrum paulo inferius quam solet, locatum animadvertissem; subit vaginam inspicere, ut quantum in hanc procideret, perfectum haberem. Accidit autem, ut labiis vix ductis, & vaginæ orificio detecto per hoc propendens appareret quoddam corpus quod a primo accipere aliquis pro uteri osculo potuisset. Verum cum haud ita inferius positum uterum modo vidissem, ut si vel maximus esset, pervenire illuc posset; ipsum cum vagina protinus e cadavere detractum periculi, invenique adeo crassius factum glandulosum uterithæ corpus, & vaginam, laxam alioquin, rugisque omnibus carentem, deorsum trahens, ut extremo suo quod urethræ orificio pertusum est, propendens osculum uteri mentiri posset, minisque perito chirurgo, nedum obstetrici, facile imponere.

12. Sed hæc ultima alio attinent. Quæ huc spectant, nunc attendamus. Quod femina ista de ventris doloribus vix querebatur, eademque sine febre esset, num inde repeti posse, credis, quod Ileos in ea fierat ratione a-

boli-

boliæ virtutis expultricis, ut Salius (b) loquitur, five ab atonia ob nervos intestinum obstruendos, ut Ruyschius (c)? Ille certe fieri tunc, ait, nullo presente dolore; hic vero non dubitabat, quin ob eam causam in muliere quadam sine notabili dolore, & sine febre fuisset.

Verum ne quaeramus nunc quod infra (d) videbimus, num intestinis ita se habentibus, materia ex his in ventriculum retrudi, & compelli possint, ut vomitu rejiciantur, & ne signa cætera istius constitutionis quæ Salius enumerat, num fuerint in descripta a nobis femina, disquiramus, profecto neque Salius, neque Ruyschius tunc inflammationem esse putant intestinum; sed hanc seorsum uterque memorat, & primus diserte in eadem febrem ponit, & una cum ea dolores vehementes, & qui multum ægros disorquant. Num igitur in hac femina in qua intestinum fuisse inflammationem, manifestum est, simul erat eorum atonia? Verum nullam ex tot hujus causis quas Salius commemorat, præcessisse, constabat. Sed de febre an inflammatis intestinis, abesse nonnumquam possit, rursus erit alibi (e) videndi locus.

13. Jam vero si quæ inflammationem consequuntur propolis duabus historiis spectemus; proclive erit intelligere, quam festinare oporteat occurrere volentes huic morbo, & quæ auxilia, ubi jam multum processerit, suspecta habere, globos puta plumbeos, & mercurium. Nam si sphacelo fracula intestina, ut in Juvene illo agricola (f), ne materia quidem resistunt quam contingunt; cavendum hoc ipsum est, ne assumptis, nisi quantum necessitas cogat, illa augeatur, non modo nescimus gravissimis deglutitis, aliam quam quæ oporteret, viam aperientes, interitum acceleremus. Quod multo ibi facilius accidit, ubi ea simul conflictio est quæ nihil, nisi reposito intestino, transire sinat. Eadem enim conflictio tum proximum superius intestinum vitando, impar reddit distentioni, & ponderi sustinendo, tum quæ illud distendant, & gravent, eo ipso in loco remoratur, ubi intestinum maxime infirmum est. At enim, inquit, Hoffmannus (g) tamen in volvulo ex intercepto in bubonice intestino seminam servavit dato ad felibræ argento vivo; quamquam non defuit quibus hic casus ferme incredibilis videatur. Mihi vero eo credibilior videtur, quod jam ante Alphonsus Khonius (h) idem mali ex intercepto in oscheole intestino in viro sustulerat dato eodem argento ad uncias novem. Sed quamvis gravia erant utroque in casu symptomata, minor intestini conflictio esse potuit, nec certe res adhuc ad sphacelum accesserat: ut neque in tot volvolosis accesserat quos passim legimus vel majori assumpti remedia illius pondere fuisse sanatos. De his igitur quibus firma adhuc sunt intestina, nunquam is mihi metus fuit, quippe tunc ortus cum in dissecto illo agricola quam male haberent, conspiciens, quomodo in aliis quoque, multum progressio jam morbo, infirmata esse possent, conjei. Miratusque sum ab eo tempore ad hunc diem quo hæc relegeram, in nullum Practicæ Medicinæ Scriptorem, quod meminerrim, incidisse, qui cum de eo auxilii genere adversus hunc morbum, quod plerique omnes fecerunt, sermonem haberet, de justo hoc metu quidquam moneret, præter unum cujus Opusculum (i) novissime legi, Medicum eximium Meadium, serio admonentem; non diu in Ileo argenti vivi usum, si nihil cetera proficiant, rardare oportere; quoniam metus est, ne, quod non raro fit, inflammationi superveniat gangrena, quæ corruptis intestini tunicis, in abdomen effunditur ponderosum metallum. Non puto autem, a te nobis objectum iri Cl. Wahrendorffii (k) Observationem, quæ Ileosum proponit, cui felibra mercurii data in Colon usque pervaserat, neque tamen fracidum ventriculum, aut Duodenum intestinum sphacelo contaminatum perruperat. Cum enim æger post triduum ab hausto mercurio decesserit; facile intelligis, eo spatio temporis inflammatione quæ in Jejunio, & Ileo adhuc erat, in Duodeno, & ventriculo in sphacelum qui antea non esset, degenerare potuisse. Nec valde absimili responsione usum te credam, si quis Schroekium (l) objiciat, qui in diuturna alvi obstructione libras argenti vivi circiter duas, ad initium, & finem Ileii intestini deprehendit, & in minutissimas disiectum particulas adhaerisse vidit Ileii tunicis, neque has perforasse, est intestina non inflammata quidem, sed infirmata essent adeo, ut paulo durius contractata aliquibus in locis rumperentur. Dies enim inter ultimam

remedii exhibitionem, & mortem interceperant plus viginti, ut distenta aere, & facibus intestina frascere extremo demum potuerint tempore, neque constaret an ita fracula essent ad ea quoque loca, in quibus subtererat argentum vivum.

14. Quæres fortasse, cur ægris a me descriptis repositum non sit intestinum? & cur non reposito, in nonnullis tamen materiae pars a Tenuibus ad Crassa transierit? Quod ad primum attinet, puta, alios serius quam oportuisset, in Nosocomia esse delatos, alios tempestive quidem, sed eo tempore eum fere omnes in plerisque Italiae Civitatibus Chirurghi necdum satis auderent ferro uti ad referandas angustias, intestini repositionem aliter prohibentes. Quod vero has materiae pars in nonnullis trajecerit; primum animadvertas velim, quæ per clysteres educta diximus (m), jam antequam intestinum constringeretur, infra constrictionis locum fuisse, posse autem in volvolosis non modo artis, sed etiam naturæ ope quæ infra eum locum sint, educi, & ratione, & experientia cum sua, tum Hippocratis (n) in muliere quæ cubabat apud Tifanenum, adversus communem eo tempore doctrinam confirmavit Salius (o), nisi quod id accidere, ait, dum sit morbus, non vero dum factus est. Sed in propolis a nobis (p) femina id contingisse in fine lethalis morbi, manifestum est, nec ea tantum quæ infra constrictionem intestinum essent, semel atque iterum fuisse dejecta, sed denique etiam eorum fortasse partem quæ supra, præsertim autem mercurium, nisi forte existimas, hujus & simplicis, & sine ullo dejectorio remedio, & dosi perexigua dati eas fuisse vires, ut per intestini interceptos parietes, necdum quidem sphacelo, sed gangrana tamen correptos propagare potuerint nescio quam irritationem. Quod cum facile credi nequeat: veri similis videbitur, minus arde in hac femina, quam in juvene agricola (q), constrictionem fuisse intestinum, ut mercurii pondus, ac mutatione sitis corporis, & vomitus coagitatione, ac pressione adiutum, potuerit brevem illum intestini tractum emetiri, & ea deinceps quæ infra erant, sanis adjuvantibus, ad exitum promovere. Sed & quodpiam ex his exemplis proferre juvat in quibus aliquid deijci toto morbi tempore non est desitum.

15. MARIA, uxor Antonii Franciscati, aurigæ Patavini (fecit enim rarissimus quem in illius arteria Pulmonari offendi, valvularum numerus, ut nomen, & cætera quæ ad eandem attinerent, diligenter perquirere) annos nata undequadragesima, mediocri corporis habitu, colore non malo, multoque minus iæterico, plurimum viginti liberorum parens, quorum ultimum jam sex menses lactaverat, cum morbo hoc novissimo correpta est, nulli unquam alii obnoxia, si parvam herniam excipias, unde hic demum originem habuit, cruralem, id est femoralem, ex qua cum per se reponere consuevisset quidquid illud erat quod e ventre illabebatur, nunc autem aliquot jam dies conata, non posset, febris, & vomitu, & cæteris quæ accedere solent, afflicta est, nisi quod aliquid tamen deicere semper potuit. Serius quam opus fuisset, in hoc est denique Nosocomium illata, ubi cito moritura similis, vitam traxit complures dies, quorum ultimis se habere meliuscule videri poterat, & ab enematis injectis levari, donec XII. Kal. Decembris A. 1704. mortua est. VENTRE posttridie aperto, simulque hernia facculo resecto, crasso, & in plures quasi tunicarum laminas non difficillime dividendo, animadvertus hic est a Terete quidem ligamento uteri omnino sejunctus, ad Cruralia autem vasa, quibus a latere interno adiacebat, annexus: neque angusto esse orificio; sed angustias omnes ab imposito infimo esse limbo musculi abdominis Obliqui Externi, quem limbum vocant ligamentum Poupertii, vel potius Fallopii; cum revera tendo sit musculus illius (r), qua in re mecum faciunt Solertissimi Viri, in his Heisterus (s), & si attente legas, etiam Platnerus (t). Sub eo igitur limbo intercipiebatur pars aliqua proximi Coli intestini sic tamen, ut per hoc via satis pervia restaret, paries tantum intercluderetur qui facculi orificium spectaverat. Is paries, cum facculo coherens, erat niger, & fracidus; proxima extra facculum intestini pars viridis. Virebant quoque, & grave olebant plerique in locis interiores ventris parietes. In hujus tamen visceribus nihil morbidi adnotavi, nisi in hepatis vesicula quæ

æquo

(b) c. cit. supra ad n. 12. (c) Obs. Anat. Chir. 6. (d) n. 30. (e) Epist. 35. n. 20. (f) n. 6. (g) Medic. Rat. T. 4. P. 2. S. 3. c. 4. Obs. 3. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. Obs. 79. (i) Monita Medica c. 7. S. 2. (j) Act. N. C. T. 4. Obs. 111. ante h. (k) Eorund. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 299. (l) n. 9. (m) n. 9. (n) Epidem. l. 3. S. 2. (o) c. cit. supra ad n. 12. (p) n. 11. (q) n. 9. (r) Advers. Anat. 3. Animad. 1. (s) Compend. Anat. not. 4. (t) Instit. Chir. §. 793.

æquo aliquanto major, cum bile non atri coloris, sexdecim calculos habebat vix dispari inter se magnitudine, parvos quidem omnes, nec tamen minimos, superficie autem flava, & ex pluribus faciebus planis confecta. Quorum unum ita, ut erat, humidum cum flammæ admovissem, comburi non sine scintillis, ac liquari, vidi, flammam vero alere, non vidi. Corpus reliquum cum diligenter eodem, & infrequentibus diebus perfecarem; erant enim cætera viscera idonea & ad observandum, & ad docendum, musculique omnes egregie rubebant; nihil usquam fe obtulit nobis quod ad hunc locum attineat, nisi forte in cerebri medullari substantia crebra puncta sanguinea, & quæ horum causa erat sanguinis multitudo, sicut eodistenta vena utraque Cava, & venæ influentes, præsertim Azygos, significabant; finitè autem pulmo totus hinc pleuræ, inde mediastino annexus, & denique Thyroidea glandula aliquanto crassior quam par esset: cum plura alioquin occurrerent non indigna quæ alibi memorarentur. Ex quibus illud unum hic minime præteribo, quod antea non modo non videram, sed neque audiveram, aut legeram a quoquam visum, ut neque postea ab exteris Viris Eruditissimis; humaniter me inventibus, audivi. Quæ videlicet causa fuit, cur meas quasdam observationes Cl. Morando (u) quam paucissimis, ut fit, verbis indicans, cæteras quippe alias a me, ab aliisve etiam habitas diserte præmittens, hanc unam exciperem. Scilicet in femina quæ nulli morbo ad circumcutionem sanguinis attinenti, obnoxia, ad eam quam supra dixi, ætatem pervenerat; & cujus cordis, adjectorumque vasorum particula quæque, a me accurate perspecta, nihil vitii, nihil præter consuetudinem habuerant, in ostio arteriæ Pulmonaris, trium valvularum loco, quatuor deprehendi, & frequentissimæ, quæ aderat, Doctorum Virorum, & Juvenum studiosorum coronæ demonstravi, cæterarum quæ ibi spectari solent, confimiles, nisi quod una secundum omnes dimensiones erat, nec paulo, major, quemadmodum huc veniens; nam etiamnum in apto humore affervo; aliquando conspicies: ea sedem inter cæteras anteriorem ac finitèriorem obtinebat. Verum, cum hæc recenserem, gavisus sum hanc Observationem rarissimam quidem, sed non unicam, a me supra dictam fuisse. Nam tandem inter tot illas, & tam varias, quas cum Præceptore Caffebomio habitas, edidit Cl. Jo. Zacharias Petzche (x) in quandam incidi alterius femine, cujus arteria pulmonalis quatuor valvulas habebat, nempe tres majores, quartam vero minorem. Ejus Aortam femina duos, haud amplius, ramos fursum misisse, legimus; sed quot annos, & num sanavixerit, & quo ex morbo decesserit, non est additum.

16. Nunc rem alibi quam in corde, ubi natura sibi adeo constare solet, non magnopere attendendam, relinquens, ad herniam redeo parvam quidem, sed lethalem. Et sane quanto ab ægris ob parvitatem magis herniæ negliguntur, tanto sæpe fiunt demum periculosiores, ut illa fuit cujus facculus *vix extremitatem digiti indicis recipiebat* (y). Cum facculo enim exiguo facilius conglutinetur, arctiusque in eo constringitur intestinum. Accedit ob neglectam parvitatem, ægrorum silentium tunc etiam cum ventris doloribus torqueri incipiunt; ut scite Cel. Werlhofius (z) medentes admoneat, ne prætermittant in colicis parvitatibus inquirere in hernias, quæ sæpe vel exigua sunt, & ab ægrotis insuper habentur, vel pudore occultantur; & sibi certe, quamvis iterum, iterumque inquirenti, accidisse non semel, refert, ut id ægrotantes ad extremum fere usque inficiarentur. Mihi vero in æque pio, ac nobili, doctoque Juvene, nunc autem Amplissimum Viro accidit, ut cum a cæteris Medicis, & a me pariter quo magis inquirebatur, eo minus ulla deprehendi posset causa recurrentium identidem ventris dolorum, accidit, inquam, ut ex hac ipsa cæterarum causarum absentia suspicaret, eam quæ de agimus, forte subesse. Quam suspicionem minime vanam esse, cognovi, interrogans, an forte juvaret supinus corporis situs. Affirmante enim ægro, & tumore quem ipse ob parvitatem ne animadvertat quidem, reperto, moxque intestino suam in sedem reposito, in eaque constanter servato, nulli amplius redierunt dolores. Sed hi molesti potius quam graves, fuerant. Colicos autem, ut dice-

re inceperamus, ab herniis sæpe dolores fieri, cum frequens experientia ostendit, tum femina confirmat a Præcl. Weissio (a) dissecta, iis doloribus sæpe vexata ob herniam in eadem sede in qua nostræ quoque mulieri fuisse, diximus, sed non Coli modo, verum etiam Ileii portionem, omentique concludentem, fellis pariter vesicula calculis, sed multo pluribus, onusta quam in muliere a nobis descripta. Cujus herniam raram, ut ait Littrius (b), vocare possumus, si cum frequentissimis quas Tenuia faciunt intestina, comparatur. Describit ipse in nobili femina huic nostræ similem, sive id spectes quod in mortuo secando invenit, sive deiciendi facultatem quam in vivente observaverat. Sedes dumtaxat altior fuit. Memoratur altera ejusdem generis apud Palaninum (c), qui istam Littrii, istam, inquam, anni 1714. non videtur legisse. Legerat autem Hildani (d) Observationem, quam auctor ipse cum attentius perpendisset, ad eundem ac Littrius, modum explicaverat (e); imo aliam, etiam Parisiis jam A. 1671. sic explicasse invenio Bienaisium, ut is qui aderat, infrequentè anno scriptis tradidit J. H. Lavaterus (f). Cur enim bubonocèle laborans ægra excrementa liquida toto compressionis tempore (ad diem usque septimum) per abrum decessisset, ejus rei, inquit, causam laudatus Operator intestinum ex parte constrictum, reperit. Sed & Ballonium (g) animadverti, cum scripsit, in inguen prolapsa cæci intestini apophysi, etsi hæc computrescat, non esse necesse ea sequi symptomata, quæ consequi solent in aliorum aut tenuiorum, aut crassiorum intestinorum affectu, cum hæc, inquam, scripsit, non obscure indicasse, five ex Crassis, five ex Tenuibus intestinis propendens pars quæpiam instar appendicis illius, in hernia aliqua intercipiatur, posse alvum respondere fecus ac cum totus intercipitur intestini cuspispiam tubus. Esse autem interdum præter naturalem illam alias aliquas appendices, quas & diverticula vocant, herniæque facculum subire, certum est, five illas sensim præter naturam producuntur, five a prima origine quibusdam corporibus sint data. Cave enim credas, esse omnes præter naturam, præsertim vero ex intestini latere in herniæ facculum prolapsos omnes fuisse efformatas; nam interdum, ut infra (h) dicetur, ad ea pertinent intestina quæ ab sedibus absunt in quibus herniæ contingunt. Itaque cum Littrio (i), & Meryo (k) censelis quidem, eas appendices quas ipsi viderunt, illo fuisse modo formatas, aut certe auctas: quin si tres illas quas Schrockius (l) vidit in adulescentulo, ventris doloribus, sed non ob hernias, quæ nusquam erant, sæpius cruciatus, eas quoque a morbo aliqua causa ortas, adauscasse esse, volueris; non multum fortasse adversabor. At si alias quasdam, ut puta quæ a Weitbrechte (m) in muliere describitur, fibris eodem modo ac in aliis intestinis, conspicuis prædita, non a prima origine fuisse, dicas; certe non potero aditipulari. Hujus autem generis illam fuisse, non dubito, quam in Vetula deprehendi, quippe eadem parietum substantia, & crassitudine ex Ileo qua proprius Colo erat quam Jejuno, ad perpendiculum pendente: quæ addas velim ad brevissimam ipsius in Adversariis (n) descriptionem, quando Hunauldii (o) aliam, a se visam, describens, id cupiit minime prætermitti. Neque alterius generis fortasse erat quam in Lanario (p) vidi, ab illa in his discrepantem, quod brevior erat, & hemisphærica, & contra mesenterii insertionem posita ubi Ileum se ita flectebat, ut angulum faceret, vel abscoisso mesenterio perstantem; in illa enim ipsa prominentia anguli extuberebat haud aliter, si posuim dumtaxat speciem, ac quæ ab Ruyschio est in Museo Anatomico (q) delineata. Quas præterea vidi, descriptas non habeo; perpaucas autem omnino vidi, cum tot cadaverum intestina examinaverim.

17. Hinc fit, ut quo magis considero, eo magis censeam, Ruyschii verba in Thesauro VII. (r): *ejusmodi diverticula, ut plurimum, si non semper, in Ileo occurrunt*, aliter esse ac a primo videtur, accipienda, nimium cum sunt, in eo ut plurimum esse intestino. Certe in eo viderunt qui a me aut nunc, aut alias (s) memorati sunt, & præter illos Henricus Meibomius (t) olim, deinde autem alii, & in his Experientissimi Viri Walthe-

Waltherus (u), & Schlichtingius (x), & Cl. Bonazoli (y) nuper; ut de me in parte fileam, qui tamen; ne hoc omitam ad ipsius attinens Observationes; in quibus vidi, si maniæ non fuerant, neque in maniæ quos incidi, vidisse memini. Conspexi etiam semel atque iterum in anseribus, in uno præsertim ea latitudine, ut pro reliquis ejus ductus haberi non posset qui olim ad vitellum attinuerat. In his quoque cum eo intestino communicabat quod Ileo responderet, imo cum illa hujus parte quæ Crasso intestino propior est, id quod in homine & mihi, & cæteris accidisse video qui locum quidem Ileii ad quem attineret, diserte significarunt. Unde confirmatio accedit causæ a Præcl. Fabricio (z) indicatæ, cur morbose Appendices in Ileo potissimum intestino contingant. Si enim quæ ad Ileum ex superioribus intestinis descendunt, ob maximam chyli partem in vasa Lactea jam dimissam, eam *spissorem consistentiam* nancisci incipiunt quæ tenues urgere tunicas possit, atque distendere; ea certe erit spissior, quo magis per Ileum progressa fuerint, sicque plus chyli, & reliquæ fluidioris partis dimiserint. Itaque diverticulum, quod & ipse vidi, ad duos, haud amplius, palmos a fine Ileii distabat. Quid ergo est, inquis, cur ita Ruyschium intelligamus quasi nonnunquam ad aliud quoque intestinum diverticula pertinerent? Scilicet cum meas relego Observationes, aliqui illi aliquando accidisse, credo non absimiliter ac mihi accidit qui in Recto femel, iterum in Duodeno ejusmodi quidpiam vidi. In Recto quidem, ut in Adversariis (a) propositum est; in Duodeno autem viri apoplectici duobus ferme digitis infra pylorum cellulam, non multum extuberantem, sed orificio digitorum admittente, nulla cinctam tunica præter extimam, sic tamen ut nullum omnino five præsentis, five præteritæ exulcerationis ibi, aut in ventriculo, totove intestinum tubo extaret indicium. Sed cum diverticula hæc, quando sunt, Ileo, ut diximus plerumque obtingant, longissimo omnium intestino, ibique locato ubi herniæ fieri sæpius solent: non mirum est, si ex Ileo potissimum, hernias subeant. Tunc autem contingere posse, ut nulla sequantur herniæ symptomata, Ruyschius censuit (b). Littrius autem antea (c) diserte docuerat, ejusmodi herniæ cuncta symptomata, lentius se procedere, & minus violenta esse, quam in herniis cæteris in quibus totus frangulatur intestini tubus, in primis autem hinc internoſci, quod nunquam deſectio impeditur. Addit alia, in quibus hoc etiam, abdomen neque tumere, neque tendi, neque flatibus oppleri, ut in herniis communibus. Quæ est rationi, ob liberam tunc intestinum viam, esse videntur consentanea, & approbatione sunt Palanini (d), aliorumque non immerito confirmata; tamen ut intelligas, nihil bene adeo esse in Re Medica constitutum, ut nonnunquam fallere non possit; Observationem huc addam meam, in Adversariis (e) indicatam quidem, sed non perſcriptam, ex qua apparebit, quanto aliter res in ægro se habuerit, cujus hernia sic intestini partem interciperet, ut per hoc tamen apertam relinqueret viam.

18. BAJULUS Bononiensis, assiduus laboribus fractus, ut cum quinquagesimum annum ageret, multo senior appareret, herniam habebat ad inguen dexterum, digiti pollicis magnitudine, quæ aliquando evanescere videbatur. Is circa medium Martium A. 1706. nulla pravia causa, nisi forte quod post mediocres tempestates repente ingruerat nivosa dies, ventris dolore prehensus est, vago quidem, sed acerbio, quasi a canibus; sic enim ajebat; morderetur. Qui dolor est, ventri nescio qua inunctione adhibita, remittere visus est; recruduit tamen, nec unquam postea est immittus. Ob hunc cum in Nosocomium illatus esset S. Mariæ de Mortefexto jam morbi die, non calentibus quidem carnibus, nec pulsus valde frequenti, sed parvo tamen, & qui prementibus digitis parum resisteret, eosque inæquali ictum vi percuteret, toto abdomine tympani instar distento, magis autem infra hypochondrium dexterum, ubi quædam quasi Coli intestini cellula manu percipi videbatur, hernia autem durior facta, quamvis negaret, præcipuum in ea esse doloris sedem. Cibum vomebat. A quatuor jam diebus deſicere nihil poterat. Flatus ipsos frustra egerere conabatur. Datum est oleum e dulcibus amygdalis recens expressum; e feminibus autem lini injectum clyſtere ad uncias decem. Hoc quale injectum est, reddidit; illud vero evomuit, conquestusque est, se ab eo

turbatum atque agitatam. Quarentibus quid os faperet; toxicum, inquit. Multum sitiebat. Vomitus perſebat. Diebus singulis infrequentibus septimo, & octavo singula enemata injecta sunt, alterum compositum cum benedicta laxativa, alterum ex lacte, & vitello ovi; sed nihilo plus præstiterunt, quam illud prius. Cum recrementorum nihil unquam deſiceretur, & cætera quæ sunt dicta, manerent, pulsus autem; quamvis post diem sextum non amplius inæqualis; debiliior, ac minor fieret sic, ut die nono mane percipere vix possemus; & jam cute corrugata, frigefcente corpore, æger neque palpebras attollere valeret, & vix amplius loqui, petiit tamen vinum, paulatimque deficiens, proxima tandem nocte placide obiit. CADAVER squalidum, & siccum, cute rigida, nec sine scabie aliqua, infrequenti nocte dissecuimus.

Ex aperto Ventre fœtor qualis ex gangræna solet. Omentum in herniam usque extensum, totum ex inflammatione rubebat, si latas quasdam quasi lineas exciperes in transversum ductas. Lien aliqua ex parte morboſo livore infectus erat, introrsum quoque, tametsi ad parvam altitudinem, propagato. Ventriculus dextrorsum multo magis quam solet, se porrigebat, distentus totus materia subflava, nihil magis quam stercoſus fluidum, referente, qualis intestina etiam Tenuia a ventriculo ad herniam usque impensè distendebat. Quidquid autem ex Ileo ad Crassam usque reſtabat; reſtabat autem multum; & Crassa ipsa omnia valde erant contracta, atque alba; ut manifestum eſſet, nihil per Ileii partem transiſſe quæ ad herniam pertinebat; quamvis non ipse intestini tubus herniæ orificium subiret, sed extra hoc præterveſtus, nihil aliud immitteret, nisi parietis sui portionem, in femioſalis cavitatis modum laxatam. Erat ejus cavitatis qua sensim ab intestino incipiebat, major axis trium circiter digitorum secundum intestini longitudinem; minor axis multo brevior, quippe per anteriorem intestini faciem digitali intervallo a mesenterii insertionem ad inferiorem faciem se extendens. Illis ex iniitiis paulatim cavitatis magis, magisque; ut femioſalis requirit figura, se contrahebat, donec ad pollicis profunditatem in medio descenderet. Hanc igitur five cavitatem malis, five diverticulum appellabat, hernia folam interciperet, non reliquum intestini tubum, simulque cum omenti extrema parte concludebat. Quorum neutrum poterat ex ipsa retrahi, quippe non modo interclusum orificio facculi quasi nervolo, verum etiam nexibus, minus quidem validis, sed cerebrerimis, facculo alligatum, intus, quæ erant ii nexūs, subaspero, cætera lævi. Hunc peritonæum faciebat, extrorsum laxarum prope externum latus Spermatocorum vasorum: affidebant autem hinc, & hinc glandulæ Inguinales tumentes duæ, quarum altera, facculo propior, albam in parte substantiam ostendit. Intestinum facculo proximum, & multo magis intestini diverticulum ex rubro nigricabant. Illinc intestinum superiora versus; nam ad inferiora, ut dixi, album erat; magnum ad tractum ex rubro ad lividum inclinabat: quidquid autem inde ad ventriculum usque pertinebat, ob conferta plerisque in locis evidentiā sanguifera vascula plane rubebat. Idemque color mesenterium obtinebat. Thoracem quoque recludere placuit. Pulmones undique; si dexteram anteriorem excipias faciem; pleuræ, præsertim ad latera, & dorsum, ubi hæc erat crassior, adhærebant, nusquam autem magis quam ad summam dexteram thoracis partem, ad quam pulmonis substantia, velut ex antiqua læſione, erat prædura, inferius autem, a dextris pariter, non paulo compactor, quam soleat. Cæterum pulmones multo, ubique ferme, humore imbuti erant.

In pericardio aquæ nihil, cor autem flaccidum, & in singulis orificiis polypofas habens concretiones, ut in ventriculo etiam dextero, & sinistra auricula, leviter compactas omnes, & pleraque mediocres; minima enim erat quæ in illa auricula; longissima quæ in arteriam Pulmonarem, ejusque ramos pertinebat.

19. Non dubito, quin ex me quæras, cur tametsi via per Ileum intestinum reſtabat aperta; nihil tamen illac transiſſet? Equidem plures suspicari causas possum; veram pro certo affirmare nullam possum. Erat ibi intestinum ab inflammatione maxime læsum, simulque ob sui portionem distractam, atque interceptam irritatum. An ibi igitur peristalticus cessabat motus, quo materia ulterius promoveretur? An convulsio erat aliqua per quam ea tubi pars in vivente magis, quam in mortuo, con-

(u) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1741. Obf. Anat. 7. (x) Dissert. qua Sylloge Anat. Obf. &c. §. 47. (y) Vid. Ad. Lips. Suppl. T. 1. S. 12. in Relat. libelli Launay. (z) Commerce. Littér. A. 1735. Hebd. 1. n. 3. (a) Commerce. Littér. A. 1745. Hebd. 24. n. 1. (b) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1714. (c) Anat. du corps hum. tr. 1. ch. 8. (d) Cent. 1. Obf. Chir. 55. (e) Cent. 6. in Obf. 71. (f) Diff. de Intestine. Comp. thes. 6. (g) L. 1. Consil. Medic. 103. (h) n. 17. (i) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1700. (k) Mem. A. 1701. Obf. 1. (l) Eph. N. C. Cent. 8. Obf. 50. (m) Comment. Acad. Imp. Petropol. T. 4. (n) Ill. Animad. 5. (o) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1733. Obf. Anat. 2. (p) de quo Epist. 36. n. 23. (q) Fig. 3. ad Thec. C. Repol. 3. n. 11. (r) n. XV. 3. (s) Advers. Ill. Animad. 5. (t) Epist. de Vaf. Palpebræ.

(u) Progr. de Aneur. (x) WA. N. C. T. 6. Obf. 20. (y) Comment. de Bonon. Sc. Acad. T. 2. P. 1. Inter Anatom. (z) Progr. Helmiſtæ editum Janu. 1750. (a) Animad. cit. 5. in fin. (b) n. 3. cit. (c) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1700. (d) c. cit. supra ad n. 17. (e) Animad. ibid. cit.

contracta esset? An denique hoc ipsum inflammatio præstabat, vasa, & parietes magis, dum vita maneret, turgida reddendo, quæ post mortem laxata sint? Certe aliquid ad causam hanc tertiam attinens indicat Littrius (f), ubi a nobili illa femina, cujus hernia Coli portionem intercludebat, conjicit, cur plura, & sæpius interdum, alias vero pauciora, & rarius deicerentur. Neque hoc obicias, in illa tamen, quamvis inflammatum esset intestinum, & hujus portio intercepta, plura semper, aut pauciora illac trahi potuisse, ut in ea quoque muliere cujus historiam proposui n. 15. Nam ut omitterem, alium in aliis esse posse læsionis gradum, aliamque intestinorum vim, alium sensum; certe in illis feminis de Colo sermo est, in hoc autem viro de Ileo, quod; ne quæram an acutior sit sensus; angustius profecto est multis partibus, quam Colon; ut si vel major hujus, quam illius, secundum latitudinem intercepti portio, amplior in Colo via restet, ampliusque parietum, in quibus promovendi vis est, extensio, & cum his ligamenta illa tria, id est fasciæ musculares, quas intra ejusmodi hernias intercepti, tanto minus veri simile est, quanto difficilius est, ibi laxari Coli parietem, ubi earum aliqua munitur exterius; quæ exterior sedes, & magis compacta fasciarum substantia illud quoque præstare possunt, ne ipsæ facile adeo vitium contrahant. Ex his intelliges non modo cur proposita a Littrio istiusmodi herniarum diagnosi facilius possit in Colo, quam in Ileo, respondere; verum etiam cur in ipso Ileo, ubi diverticuli orificium angustius sit, quale ab eodem Auctore (g) delineatur, non cum ita amplum est, uti mea in Bajulo proponit descriptio: facilius, inquam; neque enim præstare aulim, ubi angustius sit orificium, semper nihilominus respondurum. Atque hæc, ut nosti, ad te scripseram, cum a Cl. Benevolo missum accepi librum (h) quo herniam, secundo loco, describit factam, ut ipsa cadaveris confirmavit dissectio, ab Ilei Appendice in scrotum se extendente. Quæ tametsi cum eo intestino per orificium communicabat in mortuum quidem non majus, quam ut medio cruris avellana æquaret diametrum; æger tamen quindecim primis morbi, ejusque sævissimi, diebus nihil per alvum, omnia per vomitum, & cito quidem stercoris similia, eiecerat. Præterea intestinum Ileo quæ parte herniæ respondebat, erat ad ulnæ dimidium colore non prorsus naturali, valde autem corrugatum, & angustius; unde proclive erat conjicere, a distenta, inflammataque Appendice vehementer tractum, hinc inflammatione tentatum, & depressum, convulsumque fuisse. Historiam hanc conjungas velim cum proposita Bajuli historia, conjecturas autem, adnotatis in dissectione subnixas, ad ea adjungas quæ de causis suspicabar, cur Littriana ejusmodi herniarum diagnosi res aliquando non respondeat. Quod si non Appendix solum, sed ipsum quoque Ileo intra herniam interceptum, & inflammatione, gangrænaque vitietur, ut in Meryii Observatione (i); manifestum est, alvum tunc supprimi, & cætera fieri quæ in istiusmodi Ilei affectionibus acciderent solent; sunt tamen quibus nec alvus quidem prorsus adstringitur, nedum recrementorum, aut his similiarum vomitus non fiunt, ut puta iis quos Cl. Viri Wolfius (k), & Cohausenius (l) describere, ut minus oporteat mirari quod non aliter acciderit illis quorum morbus, & dissectio a Cl. Storchio (m), & Bajero (n) proposita sunt, cum in hernia esset pars Coli intercepta, non Ilei, quod tamen erat totum cum magno Jejuni tractu in altero ea inflammatione affectum, quæ Colon carebat.

20. Iis allatis, indicatife Observationibus in quibus intestinorum dolores a causa erant sub oculis cadente, ad eos transeo in quibus causa penitus intra corpus latebat. Ab iis autem incipiam quæ propter vomitum & inflammationem ad eas magis accedunt quæ hæcenus descriptæ sunt. Duæ primæ ad Valsalvam spectant.

21. Vir gracilis, annorum quinquaginta, ob plures in venationibus labores, de magno adguttur, & pectus calore queri cepit. Hic eas deferens partes, se ad lumbos prodidit, itemque in ventre, ubi pungente adjuncto dolore hominem adeo vexabat, ut ne tactum quidem ferret. Primis ægrum diebus frigidus rigor invadebat crebrius. Diebus autem quinque, aut sex ante mortem, Volvulus accessit cum fecum rejectione: qui

sensum ægri vires atterendo, ad interitum perduxit circa trigessimam ab decubitu diem. VENTER plenus sanie inventus est totus, quæ omentum, & intestina inter se colligaverat. Erant hæc valde inflammata, ut jecur quoque, & lien, quem altius sane quam jecur, inflammatio occupaverat. Ren sinistèr sub interna membrana, non omni tamen ex parte; effusum sanguinem continebat. In omento, & in limbo mesenterii, præsertim ubi cum intestino Colo neciebatur, multi parvi abscessus, & ulcuscula animadvertantur.

22. Cum primum abscessus fieri cepti sunt; incommoda non ventrem modo, sed & lumbos quo se mesenterium alligat, afficiebant. Ubi illis suppuratio accideret, crebri hanc indicabant frigidi rigores. Effusa autem sanies ulcuscula ibi reliquit; ventrem implevit. Cum, mora acrior facta, tunicas viscerum, & intestinorum præsertim irritavit; omnium inflammationem concivit, horumque præterea motum invertit. Hinc Volvulus.

Tu cum Virorum Clariss. Mauchartii (o), & Verdriessii (p) Observationibus, non propter Volvulum qui vix in una indicari videtur, sed propter ventris dolores hanc poteris comparare, præsertim cum in eam utraque mesenterii pariter abscessus fuerint, in altera aperti, ut sanie refertus esset ventres, in altera clausi, intestinis autem quæ hic illic spheculis infecerat, inter se, & cum omento arte cohererentibus.

23. VIR alter eadem quæ prioritate, eodemque habitu, colore autem pallido, cum ante biennium ardenti febre correptus, ab ea denique sine ullo sensibili crisis vestigio esset liberatus; magna postmodum siti, capitis, & ventriculi summa debilitate, & virium languore afficiebatur. His quotidie vexatum ingens interdictum cordis oppressio invadebat, quam noctu, dum somnum capere vellet, universi corporis tremor excipiebat. Phthisi alius Medicis, Valsalvæ autem aqua intra cranium redundante laborare censebatur, qui & ea præscripta remedia quæ hydropicis solent esse communia. Ille vero interea multum cum combibonibus meri ingurgitans, magno ventris dolore corripitur, vago tamen, cum flatibus, cum materia biliosa vomitu, & cum pulsus celeritate conjuncto. Postridie mane cum dolor non modo sævior, verum etiam certa in parte fixus esset, quæ tacta, vehementer dolebat, inflammationem Valsalvæ veritus, fecari venam, imperavit. Omnibus tamen præsidii irritis, die quarto ineunte æger moritur.

IN VENTRE sana reliqua inventa sunt; sed magna Ilei intestini pars inflammata. In Thorace permagna polyposa concretio in dextero cordis ventriculo, quæ inde in venam Cavam producebatur. Intra Cranium tandem feri multum, quo & ventriculi cerebri erant pleni. Prægrandes erant, multoque scatebant fero glandulæ plexus Choroidis; & compages cerebri laxa erat.

24. Quam periculose magna solvantur febres sine ulla crisi, prima hujus historia pars confirmat. Quam verum autem fuerit Valsalvæ utrumque judicium, quæ per dissectionem in capite, & ventre comperta sunt, monstrant. Quod vero in hoc ægro, non Volvulus, ut in priore, sed vomitus dumtaxat fuerit; ne quæres quidem, ubi hujus sectionem cum prioris, aut cum insequentis cadaveris sectione comparaveris. Quam, si recte memini, in Bononiensi Incurabili Nosocomio habuimus A. 1705.

25. SENEX annos natus quatuor & septuaginta, gracilis, vinosus, ante mensent incedere sic inceperat, ut sinistro potissimum cruri incurreret. Quod domesticius magis quam ipse, animadvertent; nihil certe ipse de hoc dicebat, aut usquam dolere se, ostendebat. Duodeviginti post diebus dolore ventris correptus est vago, nullaque cum febre conjuncto, quem ipse, nemine consulto, theriaca sumpta expulit. Sed duodecim interjectis diebus ortus circa meridiem dolor est ad summam regionem iliacam dexteram simul gravans, simul ei similibus, ut aiebat, quem mordentes afferrent canes. Tumebat is locus; sed nec colore mutaverat, & si tangeres, mollis erat: manu autem profundius appressa, durum percipiebas. Pulsus, cæteroquin laudabilis, celer, & frequens erat. Oculi intra orbitas subsidebant. Lingua sicca. Nox mala.

Die morbi altera pulsus major, ut vibratus. Dolor, & tumor se ad ventris medium extendebant, qui demum sinistrorsum quoque perexerunt. Sanguis e dextero brachio missus ad uncias septem, nihil feri; crassam autem & flavam habuit crultam. Nau-

Nausea erat quidem, non ea tamen, ut cibis respue-

retur. Alvus sine molestia exonerabatur. Nox pessima. Die tertia pulsus humilis: ructus crebri, amari, acidi: loquela quali a convulsione vitata: mens subinde non constans, ut inania, & nugæ, quas æger narrabat, ostendebat. Die quarta artus identidem convellebantur, totumque corpus rigidum ad quadrantem horæ permanebat, quæ dum fierent, nulli erant pulsus: & vicissim, soluta convulsione, hi quoque redibant, & sanorum quidem in cæteris similes; sed humiles, & prementibus digitis non resistentes. Postea difficili facta respiratio; et si lingua demum erat jam humida, neque homo amplius delirabat; feces vomuit, & paulo post ad vespæram diei ejusdem convulsus, mortuus est.

ABDOMINE diducto, sinister jecoris lobus inventus est laxus, & spheculis prorsus vitatus. Ventriculus, & intestina, Tenuia præsertim, hic rubra, illic livida, illic nigra. Coli autem initium quæ musculis continebat, cavam ossis illi faciem operientes, simul cum ipsis & gangræna omnino occupatum erat, & sic connexum, ut sine laceratione separari non potuerit. Illinc videbatur effusum esse quod in ventris cavo conspectum fuerat serum lividum, & puri admixtum, cui nempe simile intestina continebant.

26. Quod ad initium attinet historiae hujus; a veri similitudine non valde abhorret, natum sensum fuisse in iis qui modo memorati sunt, musculis vitium aliquid unde proximi Crurales nervi dexteri comprimerentur, inde autem fuisse, crurum sinistro magis cruri inter ambulandum incurreret. Quod ad vitium inflammatione, & corruptela postea accedentibus, pessimi fucii ita nervos illos vellicaverint, ut corpus universum convelleretur. Nec fortasse in puero quem Iliaca passio, artrosis putrido intestini tabo iisdem musculis, interfecit, aliunde magis repetenda erant convulsiones totius corporis, & crurum præsertim, quas in hac Sepulchreti XIV. Sectione (q) leges sic ut ipse quoque convulsus tandem moreretur.

Quem autem ad modum Senis inflammationis proreperit in contiguum intestinum, & cætera quæ descripsi, explicare non est opus. Itaque ad Observationem transeo, quam ista Coli pars inflammata ad memoriam revocat, biennio ante quam superiore habebam, mecum a Viro Doctissimo, humanissimoque M. Antonio Laurentio Archiatro, cum hæc scriberem, Pontificio communicavi.

27. MULIER quæ anno ante in dorsum ceciderat, ingenti nuper, clamofo, profundoque in ventre dolore, cum vomitionibus conjuncto, dies aliquot confictata, decesserat. VENTRICULUS repertus est mire contractus, Cæcum autem Veterum intestinum a semilividis flavis stercoribus ita dilatatum, ut ventriculum mentiretur. Id intestinum prehenderat inflammatio, quæ per vicina quoque viscera se se diffundere incipiebat.

28. Si casus ille ad causas attinuit quæ hunc mulieris morbum fecerunt; credibile est, ita in dorsum cecidisse, ut dexterum tamen ventris latera, & Coli partem in eo latentem affligerit. Quæ propterea vi sua quæ stercora sursum propellit, magis in dies magisque imminuta, ab iis denique omnino resistentibus in eum modum cum subiecto præsertim Cæco expansa fuerit, & ob tunicarum distractionem acerbissimo dolore affecta, ob viscerum autem compressionem inflammata. Quod si mulier aliquando diutius vitam traxisset, fortasse ipsa quoque, ut aliquot ex iis de quibus supra dictum est, sedum in modum, & miserandum stercora vomuisset, vel potius stercorum quam simillima. Hac enim similitudine decepti, plerique in Volvulo ea rejici, crediderunt quæ jam in Crassa intestina transissent, id quod rarius quam ipsi putant, accidere, interjecta ostendit Bauhini valvula, ostenduntque alia quæ sunt a nobis in Adversariis (r) commemorata. Similitudine autem decipi, non difficile est demonstrare pluribus in medium prolatis ejusmodi vomitus Observationibus vel in iis quibus a Crassis intestinis ad os via erat omnino interclusa. Vide enim; ut cæteras omittam ubi hanc archissima hernia viam, aut obstructio, aut coarctus interceptebat; vide, inquam, exempli causa, hic in Sepulchreto (s) Henrici ab Heers Observationem: Puero hernioso simul cum omento Ileo intestinum agyrtæ ferreo confinxerat filo, ut transire nihil posset. Puera autem per os ejectis stercoribus mor-

tuus est. Huc adde Cl. Haguenotii (t) complura in febribus, & canibus experimenta: qui vinculo injecto eidem intestino, stercora vomebant. Quis a primo e Crassis hæc rediisse, non existimasset qui Tenuia fuisse oclusa nesciret? Nempe quæ ex ventriculo detruduntur ad intestina, illius, & mox horum fucis, & pancreatico, & bile admixtis, pluribus autem in chyli ductus particulis amandatis, si quam in Crassis deberent, eam in Tenuibus, inflammationis præsertim, habere moram cogantur; eandem in his referent, quam in illis, odoris foeditatem, & stercora etiam, si quis velit, non injuria poterunt appellari, ut docuit Picothominus (u), negans propterea, necessarium esse, reliquias cibi in Crassa pervenire, ut stercoris acquirant naturam. Verum ut minime in hoc homines fallantur; ex hoc tamen ipso in errore rapiuntur, cum e Crassis ea redire, existimant, quæ redeunt e Tenuibus.

29. At enim e Crassis usque intestinis provenire posse, demonstrant suppositoria, & clysmata ab ileosis per os ejecta. Ego vero de suppositoriis factis in Adversariis (x) dixisse videor quid sentirem, ut de clysteribus quoque. Sed quoniam horum per vomitum rejectionem legi postea apud non ignobilem Auctorem, frequenter accidere, apud alium autem hanc eorum rejectionem sine inverso intestinorum motu nova quidam ratione explicatam; nonnulla tibi super utraque re hic addere contitui. Et quod ad primam attinet; Galenus quidem cum inverti in Iliaca passione, imo & extra ipsam, intestinorum motum, non uno in libro (y) docuit, tum insuper III. de Symptom. Causis (z) semel, iterumque affirmavit, clysteris aliquid nonnullis in ventrem (id est ventriculum) subijisse, ita ut vomerent: præterea stercus in lethaliibus aleis. Sed ab ejus tempore usque ad aetatem Jo. Matthæi de Grado (a), id est a secundo ad decimum quinquagesimum Aera Christiana sæculum qui id confirmarent, non memini legisse. Extitit deinde sæculo decimo sexto qui id vidisse se, scriberet Julius Alexandrinus (b), sed non tam sæpe, aliquando tamen, ut bis Jo. Franciscus Hildelius (c). Sæculo autem proximo, & hoc ipso non pauci utique. Legere enim potes Abelis Roscii (d) Observationes tres, Danielis Seinerii (e), ut videtur, & Joannis Henrici Lavateri (f), & Luca Schrockii patris (g), & Joannis Meryi (h) singularum singulas, plures autem Collectorum Bibliothecæ Anatomicae (i); & præterea sine Iliaca, aut Colica passione, unam Petri Borelli (k), alteram Friderici Lossii (l), tertiam Georgii Segeri (m), quartam Gabrielis Claudi (n), quintam denique Petri Rommelii (o); tot enim erant quarum in præsentia recordabar. Alias ipse facile invenies. Verum si vel totidem reperires; non rarissimam, opinor, clysterum per os rejectionem dices; frequentem non dices. Plerique enim Medici, etiam exercitatissimi, nunquam viderunt: quod eorum Scripta ostendunt, ubi de hisce Observationibus mentio incidit, aliorum quidem testimonium, non suum, proferentium.

30. Videamus nunc, quæ nova ratione clysmatum per os rejectio explicata sit. Positum est, intestina omnia in Volvulo plena esse, aut ferme plena humorum tum in ipsa jugiter influentium, tum ab ægris ingestorum: esse autem ad podicem obstaculum quodpiam, illorum quidem impediens exitum, ab immitentibus autem clysmata superabile. Tunc igitur sic injecta, plenitudinem intestinorum, & distentionem augmenta, accedente musculorum abdominis, & diaphragmatis alterna compressione, quo minor resistentia est, illuc urgeri, & commista cum iis humoribus per vomitum denique extrudi. Non resistere autem Bauhini valvulam, quippe quæ, posita intestinorum omnium plenitudine, aperta servetur. Nec inverso horum motu opus esse, præsertim cum in bestis, ob injectum Ileo vinculum jam vomitu correptis, non potuerit is motus animadverti; imo ne peristalticus quidem, si quæ ad finem sunt hujus Explicationis, attendas, satis in vivis, sanisque animantibus agnosci amplius videatur. Hæc omnia cum primum legi, et si quædam erant quæ non facile probari posse, intelligerem; tamen, quod nunquam in veri inquisitione omittendum est, id cepti facere, ut non modo quæ contra, verum etiam quæ pro ista Explicatione afferri possent,

(f) Vid. supra, n. 16. (g) Mem. de l'Acad. 1700. (h) Dæ Relaz. Chirurg. (i) cit. supra ad n. 16. (k) Act. N. C. Tom. 4. Obs. 68. (l) Commere. Litt. A. 1721. Hebd. 26. n. II. ad 3. (m) Act. cit. T. 7. Obs. 101. (n) Commere. cit. A. 1725. Hebd. 40. n. 2. (o) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 14. (p) Act. cit. Tom. 1. Obs. 87.

(q) Obs. 21. in Addit. (r) IH. Animad. 9. (s) Obs. 24. §. 3. (t) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1713. (u) J. 2. Anat. Prælect. 11. (v) Animad. cit. (y) De nat. Insult. l. 3. c. 13. & in Hipp. de Vict. in Acut. Comm. 3. n. 33. (z) c. 2. (a) apud Donat. de Hist. Mir. l. 4. c. 12. (b) apud Schenck. Obs. Med. l. 1. sub tit. Variar. rer. Vomitu. (c) Ibid. (d) apud Hildan. Cent. 6. Obs. 70. (e) in hac 14. Sepulchr. S. Schol. ad Obs. 20. §. 13. (f) theol. 6. cit. supra ad n. 16. (g) Eph. N. C. Dec. 2. A. 3. Schol. ad Obs. 195. (h) Obs. 1. cit. supra ad n. 16. (i) Tom. 1. P. 1. in adnot. ad Peyer. Exercit. 1. de Gland. Intest. (k) Cent. 1. Obs. 17. (l) Vid. Schol. modo cit. in Eph. N. C. (m) Earund. Dec. 1. A. 9. Obs. 94. (n) Earund. Dec. 2. Obs. cit. (o) Earund. Dec. 3. A. 7. Obs. 39.

sent, attenderem. Itaque nonnulla eorum quæ suis tum rationibus, tum experimentis confirmaverat ingeniosus Auctor, animadverti, meis quoque comprobari. Nam quod ad intestinum ab obstaculo ad ventriculum usque plenitudinem spectat, hæc meis quoque humanorum cadaverum, quibus ipse caruisse queritur, Observationibus in ejusmodi morbis comperta est, ut tibi propolita ostendunt Agricola (p), Bajuli (q), & magna ex parte Mulieris cujusdam (r) historiæ. Posita autem non Tenuium modo, sed & Crassorum intestinum plenitudine, ultro apparere impedimentum illud videbam, quod in Adversariis (s), generatim, quærendum esse, indicaveram, quo impedimento ad tempus interjecto Bauhini valvula rite claudi non posset; ad tempus, inquam; nam si perpetuum sit, non intelligitur, quæ ratione post tractos per illam clysteres, ad officium ipsa vel continuo redierit, ut in quibusdam ex iis casibus visum est, qui paulo ante (t) sunt indicati. In illis enim non satis faceret eorum explicatio qui in ileosis valvulam rumpi, aut paralyticam fieri, conjecerunt. Quam ego ultimam conjecturam ne tunc quidem habere locum, credo, cum initium Coli plurima congesta materia dilatatum ponitur præter modum. Nam etsi valvula ob resolutas duorum, ex quibus componitur, intestinum carneas fibras eam, qualiscunque esset, vim amitteret se confringendi; duo tamen, quæ nos addidimus, Fræna ita sunt hinc, & hinc in transversum per internam Coli faciem locata (u), ut admirabili usu quanto magis hoc dilatatur, tanto ipsa magis rimam valvulæ adstringant, quam utilitatem persæpe in vita præstare, censeo, cum multa forte in ea Coli parte materia est, musculi autem abdominis conatu magno contenduntur: quæ autem de hujus structura valvulæ, de ejusque Frænis in Adversariis scripsi & pinxi, ut accipi a te, non dubito; sic ea, & quædam alia quæ ad me attinent, vellem ab nonnullis paulo attentius fuissent spectata: sed de his alibi. Denique, ut alia omittam, quod abdominis musculus, & diaphragmati illa tribuatur actio quæ inverso motui intestinum tribui solet, non sine ratione hoc fieri, si possint casus comprobare, in quibus Leon contingere ob vim expultricem abolitam, sive ob atoniam intestinum, de Salii, & Ruyschii sententia superius (x) indicatum est. Quo loco, Boerhaavi (y) quoque auctoritas produci potest, asseverantis, se in Crassis intestinis nunquam, in numerosis virorum animalium sectionibus vidisse motum peristalticum, ideoque mirantis, rejici tamen per os ex Crassis clysmata; hoc enim aliquando accidere, testibus gravissimis viris, non dubitabat.

31. Verum cum hæc proposita Explicationi favere, animadvertissem; alia se objiciebant quæ evidentissime adversarentur. Ne longior sim; illud in primis, quod si plena, aut fere plena intestina omnia ponuntur; non potest intelligi, quomodo non committi, ut dicuntur, cum aliis humoribus, sed sinceri clysteres vomitu rejiciantur, iique non longo interposito tempore, neque præcedente, postquam injecti sunt, immani humorum qui a Recto ad ventriculum intestina impleant, aut quasi impleant, refectione. Lege enim Roscii, Schroekii patris, Collectorum Bibliothecæ Anatomica quæ supra (z) indicavimus, Observationes, in Volvulo habitas: lege etiam quæ ex Loffio, Segero, Claudero, Rommelio memoravimus (a), ubi nec Volvulus erat, ut validiores musculorum compressiones credi possent, nec præter levem in uno, aut altero alvi adstrictionem obex ullus qui humores in toto pene intestinum tubo coarctasset. Invenies passim clysteres totos, integros, eosque sinceros, ut fuerant applicati, nihil prorsus immutatos, per os ejectos postquam per horam fuerant in intestinis retenti, post horæ circiter spatium, post horæ quadrantem, horæ quadrante vix elapso, momento temporis, nulla usquam commemorata inter clysmatis injectionem, & refectionem, humoris vomitione, nedum tanta, quantam intelligis, si plena fuissent intestina omnia, esse debuisset. Cum igitur nec plena hæc, nec quasi plena essent; profecto apparet, aliam esse explicationem quærendam, ex qua eluceat tum quæ causa ab Recto ad ventriculum clysteres compelleret, tum quæ Bauhini valvulam apertam servaret. Videndum est autem nunc præsertim quando non desunt qui diaphragmatis, & mu-

sculorum abdominis ad vomitum ciendum vires in dubium vocant; videndum est, inquam, ne quod ad primam attinet causam, præpropere abjecta illa sit quæ in motu inverso intestinum ab antiquis usque temporibus reponebatur. Ut enim is motus ubi ligata, distenta, inflammata, resoluta sint intestina, non facile esset agnoscendus; cur ibi negandus sit ubi nihil istorum est? nihil autem esse poterat in iis Observationibus quæ, nullo præsertim Volvulo, habitæ sunt, neque erat, etiam hoc præsertim, aut certe necesse non erat semper, ut esset in magna intestinum parte, in eaque nominatim quam hic potissimum spectamus, id est in Crassis intestinis. Cur igitur omnino, & semper causam illam rejiciamus, nullasque illi partes tradamus? Num forte quod peristalticus motus vix amplius sit agnoscendus? Quid ergo? Adeone mutata est natura animalium, ut nostra ætate vix amplius id appareat quod vetustissimi illi Observatores perpexerunt, quos secutus Cicero (b) tum asserere se se intestina, tum relaxare sive ad terendum cibum, & conficiendum, sive ad ejus depellendas reliquias, diserte scripsit? Sed ne cuiuspiam forte ex iis quos in prope extrema ad II. Adversaria Præfatione designavi, hic quoque Ciceronis locus in acerbam satis explicationem a me allegari videatur; præstat multa quæ hic reponere liceret, negligere, & a Præfatis ad Recentiores venire. Num igitur tot obliviscemur Observationum, non aliorum modo, sed & nostrarum in canibus, ovibus, cuniculis vivis dissectis, cum sæpe in oculis ne quærentium quidem incurrit, is motus, atque adeo etiam, ut præsertim, in cuniculo accidit, alterne antiperistalticus. Sed in hominibus quoque fuisse alterum, aliquando utrumque perceptum, ostendere jam nihil attinet, quando exempla protulit Cel. Hallerus (c): quibus tamen illud addere, si volueris, potes Matronæ, immanem omphalocelen habentis, visæ a Collectoribus Bibliothecæ Anatomica (d). Idemque Hallerus (e) vel antequam tot ederet experimenta (f), præstatit, ne quia magno Præceptoris ipsius acciderat, ut nunquam, sicut dixi, in Crassis intestinis videret peristalticum motum, idcirco nemini visus existimaretur; siquidem Wepferum nominatim laudavit, qui in his quoque evidenter perspexit, nec peristalticum modo, verum etiam antiperistalticum, ut cognoscere ex Wepferi loco, hæc pariter in Sepulchreum (g) relato.

32. Ex his quæ in utramque partem expendimus, licebit tibi intelligere, ad ea quæ in Volvulo contingunt, ardua præsertim, nec satis adhuc perspicua, explicanda non facile ullam probabilem causam omnino esse abjiciendam. De causis autem quæ obstaculum faciunt materiæ per intestina descendenti, si forte ex me queris, utrum illam celebrem olim horum contortionem unquam invenerim, aut saltem intus, ut vocant, susceptionem, quæ vel sæpius est etiam ab Recentioribus confirmata; ingenuè respondebo, in neutram sic quidem, ut postea (*) explicabo, adhuc incidisse. Non tamen propterea; quod ad primam attinet; ullum ex descriptis ejus generibus suspectum mihi est, nisi quod salva mesenterii cum intestinis connexionem intelligi non potest. Altera autem, sive intestini intra intestinum susceptio non modo salva mesenterii connexionem intelligitur; verum etiam ob istam ipsam connexionem maxime noxia est. Cum enim intestini pars proximam subit, simul annexi mesenterii portio subeat, necesse est. Itaque si paulo ibi diutius inhæreat, & causa aliqua constringens accedat: retardato per ejus vasa motu sanguinis sic turgebit, ut ingressi intestini exitum, & per hujus cavum descensuræ materiæ transitum impediatur; ne quid dicam de sphacelo ob circumfessionem sanguinis prorsus interclusam demum superveniente, ut laudatus Hallerus (h) vidit, & hominem extinguente. Eo autem magis omnia ibi constipantur, quo major intestini complicata portio in proximam se conjecit; tanta enim aliquando fuit, ut ex intestini spatio semipollicem longo educata, duos fere palmos æquaverit (i): Tanto autem major subit, quo majores, aut diuturniores causæ sunt, quæ subeuntem impellant, & quæ excipientem dilatent. Inter hæc causas plerumque est flatus; inter illas autem nonnunquam est pondus, ut in Observatione eorundem quos semel, iterumque lau-

laudavimus, Bibliothecæ Anatomica Collectorum (k) rara non ab id tantum, sed etiam quia in colo susceptione acciderat, in quo qui viderint, perpaucos legisse memini præter Ruyschium (l), idque, ut fatetur, semel, cum in Tenuibus intestinis toties vidisset, ut sæpius nemo. Cæterum nulla frequentior causa creditur, quam convulsivi motus: quos ad posse, Peyerii monstrat experimentum lacescit non uno in loco viventis ranae intestinis: leges illud in Sepulchreum (m). Idem confirmare mihi videntur Observationes cum Peyerii ipsius (n), tum præsertim Ruyschii (o). Ille enim in puellæ Ileo in quo susceptiones tres, lumbricos alicubi vidit velut conglomeratos; Ruyschius autem ipsam susceptionem Ilei virilis portionem repletam vermibus circulariter positiss, iterumque susceptionem ejusdem intestini verminosam ostendit eversio. Intestina autem a vermibus posse vehementer lacescere, manifestum est. Quin eximium Medicum Heisterum (p) cum in Tenuibus duodecennis pueri intestinis duplicem susceptionem invenisset, eademque intestina lumbricis repletissima animadverteret, in præxi notatu dignum existimavit, præsertim si juniora tractamus subiecta, passionem Iliacæ a lumbricis quoque oriri posse. Et hinc fortasse fuit, quod susceptionum plerasque in pueris viderim adnotatas. Eorum quæ hæcenus commemoravi dum quadam paulo diligentius attendo, non possum facere quin Observationem huc addam meam, quam legens, si mirari forte incipias, me paulo ante negasse, intestini susceptionem mihi esse conspectam; at mirari defines ubi ea perpenderis quæ post Observationem ascribam.

33. VIRGO ad quinque & quadraginta annos nata, capite ob lapsum gravissime icta, non modo inter initia, sed semper vomuit; dies autem in hoc Nofocomio vixit plus XXI. sic quidem ut sæpe jam jam moritura videretur. VENTER; hujus enim dumtaxat viscera, neque hæc morbi causa, inspeksi; tepida etiam tum intestina habebat; tamen non paucis a morte horis tangebant, & una certe ex quo abdomen apertum, diducumque fuerat, cum altius interea expedirem, transacta, tempore anni frigido, quippe circa medium Decembrem A. 1724. tempestate autem frigidissima. Intestinum Tenuium pars flatu erat distenta, ea præsertim quæ Cæco suberat, itaque hoc cum Appendicula anteriorum vertebrat: pars reliqua non sine fœtore aliquo subrubra erat. In hac susceptionem vidimus, de qua loquimur, non minus evidentem, imo etiam longiorem aliquanto quam ab Ruyschio est delineata (q). Sed dum qua in sede intestinum esset, & quam arcta, aveo distinctius cognoscere, ideoque ut ab altero Tenuium capite incipiam, intestina leviter, ut sit, hinc illinc dimoveo, hoc quidem præclare intellexi, illud vero dignoscere amplius non potui. Nam Tenuibus cunctis ab uno capite ad alterum, & ab hoc rursus ad illud accurate percursis, nusquam susceptione illa apparuit, & ne vestigium quidem, indicio manifestissimo, minime arctam fuisse. Tunc; quod reliquum erat, Tenuia intestina aperiens, in Duodeno materiam conspexi liquidis facibus similem; in proximo autem Jejunii tractu lumbricorum teretem, in eodemque tractu, & vicina Duodeni parte sanguineas hic illic maculas quibus intus utrumque, quasi ab inflammatione quæ irritationem consequi inciperet, distinguebantur. In cæteris autem intestinis, ventrisque visceribus complura quidem animadverti, ostendit, sed non ad morbos attinentia; si nonnulla excipias adnotata in mulieribus, & in vesica, vel potius in urethra. Hac enim secundum longitudinem incisa, ex valis sanguiferis quæ parallela per interiorum ejus faciem apparebant, nigra quædam hic illic promineret videbantur quasi corpuscula, ut a primo pro exiguis varicibus acceperim. Sed cum mane in solis lumine inspectarem, varices non esse, intellexi; quin etiam nunc in his vasis essent, plane dubitavi. Nam duo majora, quæ in ipsis erant communibus vesicæ, & urethræ finibus, peculiariter esse vidi fusca, & subrotunda corpuscula, eaque cum tangerem, dura sensi; ut calculos sui generis esse, crediderim, sub intima illa tunica concretos, eamque attolentes; reliqua autem quæ infra erant, ut minora, ita minus dura, nec subrotunda, ex ejusdemmodi materia, ad eundemque modum fieri, sed necdum esse per-

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

fecta. Cum hoc, novum fortasse, morbi genus, urethram procedente tempore coarctaturum, & jam facile nonnihil lædentem, animadvertissem; uterum fecui, si forte manifestius scaturigines invenirem subalbi, & crassiusculi humoris quo nimis humectatam vaginam conspexeram. Sed præter consuetudinem nihil vidi, nisi prominentem vesicularum acervum parvulum, ut ejus area ambitum unguis non excederet digiti minimi. Erat in facie anteriore cavæ ipsius uteri dexterius, propiusque supremam partem ejusdem cavæ, quam cervicis; ut suspicatus sim primum, esse iachoamentum excrecentiæ, cujusmodi a me sæpe alias in cavo uteri descriptas legisti. Et prominentia quidem id confirmabat; sed non conveniebat natura vesicularum quæ prominentiæ faciem tangebant; erant enim ipsæ, & mucus, quem continabant, ejusdem omnino generis, & ad eundem naturalem modum se habentis, cujus erant infra in cervicæ alia plures, olim a me verbis, & pictura satis expressæ (r); non hydatides, quales hic quoque non deerant ad tubas, & prope ovaria, alba, dura, frigida. Sed vesiculas, mucum limpium, & in fila ductilem continentes, tam alta sede, quam in hac Virgine, collocatas, ibique in acervum collectas, non nisi raro vidisse meminimus. Quæ si semper ad hunc modum se habuissent; una ex magnis difficultatibus Nabothi sententiæ defuisset.

34. Verum hæc alias. Nunc ad institutum sermonem redeamus. In Virgine hac vides, intestini partem in proximam se conjecisse: ab hac parte fuisse statum, qui dilaretur; ab illa autem lumbricum, qui lacescendo contrahere, inflammationemque ciere posset: pertinacem vomitum non defuisse, ut neque in Duodeno jam materiam liquidam fecum similem. Hæc res omnes fecerunt, ne historiam hic prætermitterem. Gravissimus autem ictus capitis, qui per se concitare vomitum solet, in Tenui intestino levior, & quæ novissime inchoata videretur, inflammatio, neque aliter fortasse quam XIX. Epistola (s) indicata est, explicanda, præsertim vero laxa adeo susceptione, ut facillime, nulloque sui relicto vestigio, evanuerit, eo me impulserunt, ut hanc neque pro vomitionum causa habuerim, neque inter eas connumerem de quibus in præsentia verba facio. Neque enim hic spectro quas facile evolendas, neque ita raro, invenimus, quales fuisse puto tres illas quas sine ullis Volvuli signis in Jejunio puellæ intestino vidit Abrahamus Vaterus (t), qualesque fortasse erant, quando nulla de iis signis mentio injicitur, propositæ in eodem trium cadaverum intestino ex observatione Cl. Hommelii (u), & ne longior sim, quales erant certe quæ plures, & varia in sede, ut aliqua etiam ex infimo Colo in summo esset Recto intestino, a Cel. Hallero, non in Strena Anatomica, ex qua unam supra (x) laudavi, sed in Opusculis Anatomici (y) descriptæ sunt. Quin etiam nonnullæ occurrunt non æque facilis evolutionis, ut quæ a Cl. Jo. Phil. Burgravio (z) satis arcta reperta est, nullo tamen, quod memoret, conjuncto signo Iliacæ passionis, an quod nulla accesserat inflammatio? quamquam hæc neque ad alteram accesserat ab eodem (a) conspectam, & fuerant tamen saltem quadam tormina, & vomitus remedium, an, quod duplo altius in hac altera se se immiserat intestinum? Sed neque Hartmannus (b) parum alte intrusum, idque tribus locis, intestinum deprehendit, neque ex iis omnibus æque facile educendum, quin ibi exterius turgidulum & sanguinolentum, tumoris etiam in extracæ portione manente vestigio luculento, nec lumbricus deerat prælongus in iisdem Tenuibus intestinis: nulla tamen Volvuli memorat indicia; imo ab eum suum officium fecisse, adnotat, nimirum quia non prorsus omnem viam susceptiones obstruxerant. Multo quoque longiorem, quippe ultra pedem geometricum, Jejunii intestini portionem in proximam sui partem & illapam, & multum ibi coarctatam, & compressam, & livido colore tetram invenit Jo. Guil. Widmannus (c) post dolores quidem acerbissimos, & vomitus fere continuos, nec tamen facibus similium, neque cum alvi, quod ajat, suppressione, nempe quia illapfa ea portio, quamvis anguste, etiam tum pervia reperta est. Itaque multo magis pervias binas illas susceptiones, non modo bre-

(p) supra, n. 9. (q) n. 18. (r) n. 11. (s) III. Animad. 9. (t) n. 29. (u) Advers. 3. Fig. 1. (x) n. 11. (y) Prælect. ad Instit. §. 816. in fin. (z) n. 29. (a) Ibid. (b) l. 2. de Nat. Deor. (c) Ad Boerh. Prælect. §. 93. not. 6. (d) Tom. 1. p. 1. adnot. penult. ad Warthon. de Mesent. (e) Ad cit. Prælect. §. 107. not. 33. & §. 109. not. 30. (f) De Respir. p. 3. (g) Schol. ad §. 2. Obs. 1. hujus Sect. (h) n. 34. (i) Strena Anat. n. 9. (j) Vid. Sepulchr. §. 2. modo cit.

(k) Adnot. cit. supra ad n. 29. (l) Advers. Anat. Dec. 3. 5. (m) Schol. ad §. 8. Obs. 20. (n) §. modo cit. (o) Theat. Anat. 4. n. 14. & Theat. Nov. n. 27. (p) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obs. 198. n. 3. (q) Obs. Chir. Anat. Fig. 74. (r) Advers. Anat. 1. n. 32. & Tab. 3. (s) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obs. 198. n. 3. (t) Progr. edito A. 1727. M. April. (u) Commerce Litter. A. 1743. Heb. 42. in fin. (x) n. 32. (y) Obs. 27. (z) Aft. N. C. Tom. 7. Obs. 5. (a) Eorund. T. 5. Obs. 80. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 207. (c) Eorund. Cent. 6. Obs. 89.

breviores, minusque compressas, fuisse, crediderim, quas in ileo intestino cum incipiente gangræna offendit Vir Cl. Jo. Rod. Zuingerus (d), alioquin notas aliquas, si præcessissent, Iliacæ passionis non omisimus: contra autem minus pervias totidem fuisse quas ibidem reperit Valentinus (e), eadem quæ Widmannus, signa referens, nec dubitans, quin stercoreus vomitus, si diutius vixisset puellus, accessurus fuisset: quem accessisse in altero, intelliges, descripto ab Hoffmanno (f), susceptione quæ in eodem intestino erat, simul flatibus, superiora intestina distendentibus, simul putrido humori viam intercludente, qui eodem ac per vomitus ejiciebatur, colore, in ventriculo conspectus est. Ad has, Observationem præsertim addes Cl. Weissii (g), qui in mortua post atroces ventris dolores, cum perniciæ alvi obstructione, & tandem cum Volvulo conjunctos, invenit Ileum extremum in Colon illapsum, cum hujusque membranis concretum, ac contractum adeo ut transitum occluderet liquamini fetido & semistercoreo, quo intestina Tenuia mire distenta, & inflammata conspiciantur. Nec denique omittenda est, quamvis in cane habita, Observatio quam Cl. Wahrendorffius (h) proposuit. Cum aliquot jam hebdomadas nihil omnino deiecisset, sed assumpta quolibet, vehementer ejulans, vomuisset; tandem mortuus, nullam intestinum inflammationem, nullumque in his obicem ostendit, nisi quod circa intestini Recti principium mutus ingressus ad longitudinem duarum unciarum appareret, omni meatu hinc adeo arcte clauso, ut ne flatum quidem transmitteret. Ex his omnibus Observationibus, quas ego, sicut soleo, ut haberes quas Sepulchreto adderes, commemoravi, facile intelligis, plus ad Volvulum inducendum viæ occlusionem, aut magnam, persistentemque coarctationem, quam inflammationem, valere; itaque intestinum, quæ illam non faciat, qualis solet esse levis, & facillime solvenda, hic nobis attendi non oportere. Quod ad genus eas refero quas mihi hæcenus videre contigit, ex eoque genere, ultro fateor, quod Rei Anatomicae & Chirurgicae Auctor nostro sæculo haud ignobilis ponebat, occurrere in multis sine ullo dolore, naturali morte sublati. Sed dum hujusmodi Observationibus tantum tribuit, ut commentitiam omnino crederet aliorum doctrinam proponunt; cum ipso facere non possunt, ni tot contrariis aliorum Observationibus, atque adeo rationi ipsi velim adversari. Ut enim agnosco, minime necesse esse, gravius mali quiddam oriri ubi laxior susceptio sit, & quæ viam non valde coarctet; ita si laxa non sit, viamque diutius occludat, aut fere occludat; hinc vero Volvulum fieri, aut dolores, inflammationes, aliæque generis hujus, contendo, quemadmodum in historiis vides quæ in Sectione hæc Sepulchreti sub num. XX. in aliisque, & nominatim in Ruyschianis (i), & quibusdam præterea illarum quæ hic, aut supra (k) indicatæ sunt.

35. Caterum non a susceptione tantum, aut hernia, aut inflammatione intestinum, verum etiam a causis aliis, hæc aut occludentibus, aut stimulantibus Volvulum fieri, tum aliorum Observationibus, tum nostris quoque, tecum alias communicandis, manifestum est: & ab occludentibus quidem causis necessario, modo cum his paulo diutius vita durer; ab stimulantibus autem, aliquando. Et occludentes quidem causæ interdum ad ipsas intestini alicujus tunicas spectant, ut puta annulus ille scirrhusus, XXXII. Epistola (l) indicatus; nam eum denique vomitus stercoracei sunt consecuti. alias autem ad ea pertinent quæ intestinis continentur, nec scybala tantum, ut in exemplo quod refert Hoffmannus (m), cum ad pondus librarum circiter viginti congesta, Colon totum adeo distenderant, ut demum rumpere in Ileoso quodam Celsissimo Principe; sed & calculosa materia modo circum felleos lapillos, modo circum aureos deglutitos nummos, per diuturnam intra intestina moram sic adaucta, ut via interclusa eundem attulerit morbum, quarum rerum; ut aliarum præterea; exempla in Cæsareæ Academiæ libris (n) invenies. Porro & quæ ad causas stimulantibus referre possis, in iisdem (o) reperies, ut cum juvenis, in abdomen cadens sic ut intus rupta vesica effluoque lotio in ventris ca-

vum, insolita acrimonia laceffita intestina, quod eorum inflammatio, & hanc consecuta gangræna ostendit, tum peritæticum inverterunt motum, aut cum ex simili matris casu contritum foetus jam maturi abdomen in causa fuit, ut subitens, putrescensque in vasis intestinum sanguis pares in his effectus, irritando, induxerit, ipsamque meconium per os reddente, misereque intra octavum ab ortu diem obeunte. Quod si convulsiones stimulus ciat; quid ea possint, non solum susceptiones, ut supra (p) diximus, producendo, verum & sine his, intestinum motum invertendo, monstrantur experimenta Brunneri (q); nepotis dico, Avo digni; per quæ apparet, excitatis in biliarum intestinis convulsionibus, recrementa quæ jam per alvum exire non poterant, in ventriculum, & gulam ascendisse. Morbum autem, proxime ad Volvulum accedentem ob tormina vehementissima, & continuum vomitum, & intestina Crassa præter solitum coarctata, cum Tenuia valde essent turgida, & rubentia, & insigni copia sanguinis effusi, fluidique referta, non sine spasticis contractionibus explicavit Cl. Kalbelius (r). Quarum identidem recurrentium anæstidum effectum servarint eadem intestina, partes inæquales habentia, & per intervalla inæqualia præter naturam angustas in Anatomico Jo. Wilhelmo Albrechto, Ileohæmatiti, dum viveret, persæpe obnoxio (s) ipse existimabis.

36. Sed inter causas quæ stimulo, Iliacæ passionem interdum afferunt, vermes recentissimi sunt. Aliquando enim, ut supra (t) indicatum est, convulsiones movendo, intestinum, & Volvulum faciunt: quem & sine his excitare posse non est dubitandum. Alias intestinum dolores tantum creant. Interdum ne hos quidem. Imo nonnunquam accidit, ut plurimi in iis sint in quibus, dum viverent, vix ullum vermium indicium fuerit: quod relegendis nostram mulieris rusticæ historiæ, Epistola descriptam XVI. (u), aut quæ olim de cane illo venatico scripsimus, (x) in quo erant tæniæ ad sexaginta, satis confirmatum videbitur. Et contra, signa interdum sunt lumbricorum; neque ulli inveniuntur tamen, ut puellus docet quem tibi ex Valsalva descripsi Epistola XXXI. (y) & ne in re obvia longior sim; alter quoque, cujus hic in Sepulchreto (z) historia est. Sed de vermibus, ventris dolores cientibus, alias incidet fortasse scribendi occasio, quærendi que fufius, num ut viventium sæpe intestina laceffunt, ita in cunctis quæ proferuntur, historiis ad ostendendum, intestina perforasse, ante mortem, an post mortem perforasse credendi sint, & si illa ante mortem pervaserint, an qua abscissus, aut ulcus aliquod ipsis viam ex intestinis aperuerit. Multæ enim, & variæ producantur Observationes: quarum saltem aliquot hic tibi indicare satis fuerit ex iis quas addere Sepulchreto possis. Videbis in Actis Cæsareæ Academiæ (a) primum duas. Quarum altera quanto magis intestina ab summo ad imum copia lumbricorum incredibili referta proponit, tanto fortasse videatur credibilius reddere, ipsos, præsertim amarum elixirii copia instigatos, in vivo perforare intestina cepisse, e quibus parte jam dimidia extabant. Parem, imo majorem lumbricorum numerum Molinettus noster (b) deprehendit; nam præter eos quibus plena, & infarta erant intestina omnia, alii ex his, cribri instar perforatis, exierant, qui ventris spatium undique repleverant. Sed hæc in mortuis conspecta, ut quæ a me quoque (c) in gallina. Quid cum in vivis? Extat quidem antiquissima Hippocratis (d) Observatio in Dinii puerulo e cujus umbilico aliquando exibat lumbricus magnus. Sed cum ibi ex vulnere prægresso fistula relicta esset, per eundemque locum & lumbricus, & biliosa prodirent; perforatum utique Tenuie intestinum esse, constabat; a vulnere tamen; a lumbrico enim, ne suspicabatur quidem gravis Interpres Valfellius (e). Extat etiam; ne ab iis quæ cum dissectione cadaveris juncta sunt, præter propositum longius digrediamur; extat, inquam, in Actis paulo ante laudatis (f) exemplum quindecim lumbricorum, ex hypochondrio dextero, & respondente huic lumbo egredientium, per tumores tamen utrobique ortos, & suppuratos, quorum origo tumorum tribuitur quidem vermibus, Colon

Colon intestinum rodentibus, at simul congesta in eodem viciosa, corrupta, erodentique faburra. Cum leges igitur in Centuriis ejusdem Cæsareæ Academiæ I. (g), & VII. (h) alias istiusmodi Observationes; et in altera, ob breviter fortasse, nullus tumoris, aut abscissus mentio sit; quid suspicari aliquis possit, confiderabis. Mihi enim hic, ut dixi, propositum est exempla indicare, ad varias cruciatum intestinum causas spectantia; non quo modo, acratione ea contigerint, quærere. Hoc cum quæremus, illud quoque erit inquirendum quod Plateri, ad Volvulum etiam attinens, Observatio (i) perquirendi ansam præbet, nimirum an lumbrici sint vivipari. Conspectus ille convoluta, intorta, implexa, mireque distenta pueri, vel potius adolescentuli intestina, non modo recrementis, & flatibus, sed & vermibus viris, oblongis, quamplurimis repleta, qui rursus aliis minoribus repleti erant. Observationem hanc in Sepulchreto quoque leges tum Sectione circa quam versamur XIV. (k) tum etiam XXI. (l), eoque magis attendes, si in Dissectionem incidis qua Solers Medicus Zamponius describit Cl. Planco dejectum ab alio puero lumbricum, mox suis sub oculis parientem minutos vivos vermiculos ad duodeviginti. Sed hæc ad Teretes vermes attinent omnia.

37. Nam quod de Tæniis, & Ascaridibus legis meminimus, singularum intermedia multis ascaridibus fuisse repleta non secus ac si pro his ovariorum officio, vel potius uteri fungereantur; aut ego quidem plurimum fallor, aut ejusmodi est, ut de eo mihi non putem esse quærendum; ut neque num tæniæ ascarides sint, quæ se mutuo retineant, præsertim cum qui id docent, ascarides in solo effrecto intestino, fateantur, itemque num ascarides vermes sint corporis humani quasi proprii; alia vermium species rariores sint, aliæque de hoc genere, quæ aliter, ut puto, deceat interpretari, atque a primo significare videntur. Certe Valfellius (m) non ascarides, sed cucurbitinos quos cum aliis vocabat, vermes se se mutuo retinere, & sic tæniam facere, non dubitabat, usus inter

cætera similitudine, qua ad aliam rem vel Homerum (n) olim usum esse, video, vespertilionum qui in antri magni recessu pendentes a petra, mutuo tenentur. Sed eam quam Valfellius tuebatur, sententiam ego sæpenumero sum miratus in tot a me diligenter inspectis, examinatissimisque tum quadrupedum, tum piscium, tum avium quoque tæniis confirmari non potuisse: quod facile agnosces, si attente legeris observationes quas ipse Epistola Anatomica XIV. (o) vulgavi, imo illam etiam quam cum mea ad se scripta Epistola edidit olim Valfellius (p): quibus ex observationibus potius colligi tibi videbitur, eas singulas tæniæ singulos prælongos vermes, quam plurimum catenas fuisse. Jam vero mirari desii ex quo cognovi, Cel. Winslowii industria repertum denique esse ductum, & per fluidissimam materiam injectionem confirmatum, qui unus per omnem tæniæ longitudinem pertineret. Qui ductus si quo ego, aut quo Valfellius scribebat, tempore notus fuisset, vulgataque essent experimenta per quæ constat, aquatiles vermes, in partes plures divisos, tres circiter menses sine alimento vixisse, & nova observatione in altera quoque tæniarum specie credibiliter factum esset, in extremo illo tenuissimo quod cauda videbatur, esse tæniarum caput; cum ipse facilius quæ videbam, intellexissem, tum ille aut argumenta alia pro sua sententia quævisset, aut eam potius, ut Vir erat veri studiosissimus, abjecisset. Verum hæc quæ dixi, post illud tempus producta sunt, ut ex Dissectione cognosces Experimentissimi Bonneti super Tæniæ accurate, erudite, solerterque scripta, Regiæque Parisiensis Academiæ Scientiarum oblata (q). Ea dissectione quærendi alia nobis fortasse occasionem dabit, alio tempore proferenda. Nunc institui memores, ab his, in quæ obiter incidimus, illic revertentes, cum quædam restare videamus, eaque consideratione, & scitu digna, ex iis quæ ad Dolores attinent Intestinum, hæc autem Litteræ longiores sint; reliqua in proximas rejiciemus. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXXV.

Absolvitur sermo de Intestinum Dolo.

PLura quidem Intestinum Doloris, & hunc consequentium Inflammationis, & Gangræna exempla novissimis Litteris complexus sum. Tamen restant alia tanto digniora quæ a te, cæterisque junioribus Medicis attendantur, quanto aut brevior tempore, aut fallaciore remissionis simulatione abreptos ægros conspicias. A primo genere incipiamus, atque adeo ab juvenis, qui nobis, cum Bononiæ essemus notissimus fuerat, casu tam præcipite, ut pene prius mortuum audiverimus, quam ægrotantem. Res, ut diligenter a Valsalva non scripta quidem, sed tunc narrata nobis est, ad hunc modum se habuit.

2. LÆLIUS Lælii Forocorneliensis, Medicinæ studiosus, solitudinis amans, & natura facile irascens, cum optime, ut solebat, valeret, nulla omnino prævia causa, nisi quod patrem animam agere tunc sciebat, tristemque ejus mortis nuncium ægro animo expectabat, circa medium Novembrem A. 1705. hora noctis quarta, an quinta, repente acerbo corripitur dolore umbilicalis regionis, modo quidem hic, modo illic magis urgente, sed nunquam extra certum quoddam ejusdem regionis spatium egrediente. Ad ejus clamores excitus hospes, de consilio vicini cujusdam Medici philonium exhibet Romanum. Hoc vomitu rejicitur; jam enim vomitus coeperant bilis porraceæ, quæ deinde æruginosæ facta est, & demum prope mortem atra facta tamen, ut ad ferrugineum vergeret. Mane, hora ab doloris initio decima, advocatur Valsalva. Qui, facie quæ minime placeret, abdomine tenso, & ad tactum dolente, pulsu humili, & quasi ligato, & qui percipi satis non posset, urina ex rubro fulca, & maxime turbida, aliiisque hujus generis animadversis, cum tantum tam brevi tempore factum detrimentum videret, aliarumque, hujus non ita absumilium, Observationum suarum recordaretur; intra horas viginti quatuor moriturum pronunciat. Tamen ne id æger continuo intelligeret; oleum

dari jubet e dulcibus amygdalis recens expressum, oleo autem violarum, addita camphora, abdomen inungi, & seniores duos Medicos acceriri. Cum hi, quatuor post horis, ægro jam Sacris expiato, venissent; optimum, inquit, adolescentem, civem meum, ea vi morbi prægravatum videbitis, ut nisi quid in vobis auxilii sit, verear, ut ferre diutius possit; nam quod ad me attinet, ingenue fateor, quo juvare possim, non videre. Simul rem narrat, & ad ægrum introducit. Illi vero convulsione opprimi, censent, ideoque e pede sanguinem esse mittendum: magnam quoque abdomini cucurbitulam esse affigendam. Modeste repugnante Valsalva, vincit de missione sanguinis sententia duorum Senum. Bis vena pertunditur: primo ex vulnere nihil exit; ex secundo sanguis quidem profilit; sed continuo impetum amittit, languideque adeo exit, ut tamen vena mox clausa sit, pulsus amplius percipi non poterit. Accessit postea leve delirium: oculi aliquod convulsivi ostendebant: respiratio difficilis facta est: & mors denique ea quæ proxime secuta est, nocte ingruit secundum Valsalvæ prædictionem. CADAVERIS abdomen, cum attrectaret, sensit is, aliquid effusi humoris subesse. Sanguis erat fluidus, effusus, ad seculum libram: sed & in bronchia aliquid sanguinis effusum fuerat. Cæterum in ventre gravis odor; nec tamen gravissimus. Intestina magnam partem, præsertim quæ superiora tenent, hic illic rubebant; Ileum vero jam livere incipiebat. Peritonæum cum alibi, tum præcipue qua diaphragma convellit, nigris erat maculis distinctum. Sed qua ventriculum, hic intus secundum naturam se habentem, exterius amicit, nigris tuberculis potius, quam maculis, erat inæquale. Quæ tubercula etiam primo glandulas mentiebantur; re tamen vera; nam & ipse ostendente Valsalva, illorum aliquot mox vidi; nihil erant aliud nisi stagnans sanguis, aut, si mavis, gangrænae initium.

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

D 2

3. Ea

(d) Earund. Cent. 7. Obs. 83. (e) Earund. Cent. 3. Obs. 1. (f) Medic. Rat. T. 4. P. 2. S. 2. c. 4. Obs. 4. (g) Commerce. Litter. A. 1745. Hebd. 24. n. 1. ad II. (h) Ad. N. C. Tom. 3. Obs. 132. (i) Obs. Anat. Chir. 91. & Adv. Anat. Dec. 3. 5. & Theat. Anat. 10. n. 62. & alibi. (k) n. 32. (l) n. 5. (m) e. 4. paulo ante cit. §. 13. (n) Ad. T. 7. Obs. 131. (o) p. 32. (p) n. 32. (q) Experim. circa linat. nerv. 5. 51. (r) Cent. 7. Obs. 30. & Ad. T. 3. Obs. 131. (s) & A. 1736. Hebd. 12. n. 1. (t) n. 32. (u) n. 38. (v) Commerce. Litter. A. 1737. Hebd. 20. n. 2. (w) Obs. 1. §. 2. (x) Tom. 1. Obs. 172. & Tom. 5. Obs. 66. prope fin. (y) Epist. Anat. 14. n. 43. (z) n. 5. (aa) Tom. 1. Obs. 172. & Tom. 5. Obs. 66. prope fin. (ab) D. disert. Anat. Pathol. 1. 6. c. 4. (ac) Epist. Anat. 14. n. 43. (ad) Epid. 1. 7. haud ita procul a fine. (ae) Comment. in eum 1. n. 105. (af) Tom. 6. Obs. 93.

(g) Obs. 39. (h) Obs. 7. (i) l. 3. Obs. ubi de Extuberantia. (k) sub n. XXI. §. 1. (l) sub n. XXII. n. 4. (m) Considerat. int. alla generat. de verm. &c. (n) Olyt. l. 24. sub initium. (o) n. 47. u. g. ad 55. (p) in calce modo cit. libri. (q) Memoir. présentés à l'Acad. R. des Sc. Tom. 1.

quod ea culpa conteri possit, qua in illis
est confersenda. Hæc tu legens, quid ergo? ajes. Si
copia quis boni sanguinis propemodum laboret, si vi-
ribus vigeat, acerrimo autem prehendantur dolore in-
testinorum; huic sanguinem, auctore Valsalva, non mit-
temus? quid aliud hoc est, nisi inflammationem, quam
prohibere posses, permittere? Quid? si dolor is a con-
vulsione sit; non huic per sanguinis missionem occur-
remus; imo eo periculosius contrungi vasa sinemus,
quo erunt pleniora? Pedetentim, quæso; nam isti quem
describis, homini quis tibi ait, Valsalvam sanguinem
non continuo fuisse missum? Longe enim aliud est
antequam fiat inflammatio, aut etiam dum fieri inci-
pit in istiusmodi præsertim homine, venam secare;
aliud, cum facta est, & vires languent, & omnia in
præceps feruntur, subire; ut Celsi (a) verbis rem elo-
quar; *speciem ejus ut occisi, quem fors ipsius interemerit.*
Scilicet hujus morbi cursus sæpenumero opinione cele-
rior est, ut si horas species, incipere tum etiam cen-
seas, cum, summa jam illata noxa, ad finem proropat
exitiale; itaque siquo in alio, in hoc certe morbo
verum est illud Hippocraticum (b) *ocasio præcep.*
Fuerat hæc in Lælio iis primis horis cum perperam,
nedum frustra, philonium datum est. Præterierat, cum
Valsalva, nedum cum seniores Medici, accersit adve-
nerunt,

venæ lectionis exitus aut viciat. Magnas in hoc morbo Negari utique non potest, autem majores, quod sæpe convulsionis esse partes, & autem majores, quæ acrior est dolor, five hic convulsionem moveat, five a convulsione moveatur, & quo item citius ad lethalem terminum decurrit. Sic intelligo, cur Boerhaavius (c) cum exquisitum intestinorum sensum ab ingenti numero papillarum nerværum deduxit, tum hæc continuo subjiçit: *quare homines celerrime pereunt ab inflammatione, & excoitatione intestinorum.* & si summa doloris sit vehementia, intra unicam horam hominem validissimum interimit. Sed & sæpe in vehementi intestinorum dolore manifesta convulsionis indicia vel magis quam in Lælio (d), se produunt. Sic; ne horrendas convulsionis hic memorem, quæ in Observatione (e) proponuntur, five symptomatica, five diffusionem species, huc attinente; sic, inquam, memini in Patria mea grandem natu, sed viribus firmis Virginem, cuidam ventris dolori obnoxiam, quem senior ejus Medicus Colicum esse, non dubitabat, cum sub finem A. 1709. eodem, sed graviore, prehensa esset, nullis tamen, five pulsus, five urinas, five alia spectantes, comitantibus febris indicis, cumque per clysterem quam biliosa eduxerat, valde effe levata, morboque in dies magis, magisque remisso, a Medico amplius non inviseretur; memini igitur, cum domestica mulieres loco enematis quod alternis diebus ad vespæram inijciæbatur, suppositorum ex melle indidisset, statim ani dolore tam atroci correptam esse, ut mane inveniri pulsus non possent; fuisse autem eam cum dolore tantam contractionem ani conjunctam, ut clysmâ nulla ratione immittere liceret: mox vero cum ei contractioni, & dolori per emollientia anodyna mederi studeant, repente ejusdem partis relaxationem non secus ac sæpe solet in cadaveribus, supervenisse, & circa meridiem, sanguine emissio, Igitur fac, esse convulsionem. Num sanguine emissio, facile tolles? Quid, si ea causâ nervos convellat quæ perdifficile vinci possit, aut si forte ad tempus brevissimum vinci, mox, ut in convulsivis affectibus persæpe fit, vehementius infurgat? Accipe quid, me degente Bononia, acciderit. Monachus erat, senex quidem, sed quam robustissimus. Hunc nulla ex manifesta causâ, nisi forte ex frigore, & labore, ventris dolor de improvviso invadit tantus, ut hominem nec stare loco sinat, &

5. Quid vero, si cadaveris dissectio omnem Medico excusationem eripiat? Potest enim convulsio, ut non redeat; eam tamen, intercepto in contractis vasculis sanguine, intestinis noxam cito, & præter opinionem intulisse, qua præterea, sanguis mitti nequeat sine culpa. Vidisti in Lætie quam cito intestina non modo inflammationem, sed & livorem contraxissent. Pars nulla fortasse facilius, & citius quam intestina, nihil ejusmodi fuscipiente Medico, abijt in gangrænam, & nigra fit. Quod etji productis alibi historis, aut in hæ Epistola (f) producendis vel aptius monstrare possem, hic tamen placeat Observationibus duabus ostendere, quarum singulas ab singulis Præceptis accepi meis, eodem Valsalva, & Jacobo Sandrio. Hanc igitur a Valsalva.

7. Apoplexiæ causa, quippe huc non attinente, fœp-
sita, dolorum causam quotidie certa hora illa recurren-
tium vides: nimirum glandulas inileo amplificatas.
sive illæ, quod Valsalva, quarundam aliarum exem-
pductus, censebat, cibariæ materiæ per ileum devolu-
tæ pressione ferre sine dolore non poterant; sive ab
novo chylø earum in parte obstructarum angustias elu-
dari nequente distendebantur: quod & ipsarum natu-
ræ, quæ Valsalvæ non ita dissimilis visa est earum qua-
in mesenterio sunt, indicabat, & alba illa quæ pleræ-
que infarciebantur, materia quantenus confirmabat.
Cæterum hic præsertim attendas velim, quam facile
& quam cito ea spatia omnia in quibus erant illæ
nigredinem traxerint. Sed inertiam, inquis, fibrarum
intestini apoplexia auerit, quæ minus per vitiatas glan-
dulas ea spatia sanguinem possent promovere. Fateor,
sed non propterea vitiatas alias partes occupare gangræna
solet tam cito cum accedit apoplexia. Quæ nulla certe
præcefferat in Observatione altera, quam Sanderus habuit
ad hunc modum.

9. Ex hac Observatione tum quod propoſui, intelligis tum etiam quæ facile noxa in eodem intestino eſſe poſſer in Virgine quoque Foroliviensi de qua paulo ante (g) dictum eſt. Nec te moretur quod nulla prævia fuerint febris indicia; quandoquidem in his ipsis Litteris (b) viſuri ſumus, an ſine febre inflammatione eſſe poſſit, imò an ſine inflammatione ſphacelus. Verum alia antea expectanda ſunt quæ ad celeritatem ſpectant qua inteſtinaliſſimam inflammationem concipit.

10. SER-

11. Non adeo quidem breve spatium fuit quo intesti-
norum inflammatio mulierem, de qua proxime scriptu-
rus sum, interimit: breve tamen fuit, & fortasse brevius
quam videatur, si non tam agrotationis, quam inflam-
mationis constaret initium. Quod etsi minus certum est
tamen cetera quæ de hac femina nota habeo, non sunt
mihi prætermittenda, quippe pollicito, cum de Cordis
Palpitatione (k), & de Pulsibus (l), imo & de Oc-
ulorum Affectibus (m) scriberem. Hæc enim Anicula
illa est locus oculi dumtaxat, quemadmodum se habe-
rent, eo loco proposui; reliqua in alium diutius.

buiffe. In Thorace fani, & prorsus illiſſi pulmones. Sed pericardium undique annexum cordi perpetua quidem ſed non firmiſſima coſiſtione ſicut nullo negotio digitorum ope, ſine ulla ipſius, aut membrane cordis laceratione, diſjungi poterit. Ad magna vaſa non adhaerebat: facie autem qua cordi adhaerebat, albam quamdam oſtendit maculam, uno tantum in loco, eamque medio-cre ad ſpatium ſe extendentem. In cordis ventriculis niger, ut ubique, ſanguis; nullae autem polylophae concre- tiones. Sed haere res, albaeque, & nonnullae craſſae, & firmae, longae etiam, ut quae ab auricula dextera ad Internas Jugulares venas pertinebant, a cordis oriſicis in vaſa, arterioſa quoque, productae paſſim reperiebantur. In oculis denique quid deprehenſum ſit, in ea Epitola ſcriptum eſt, de qua noviffime indicavi.

Alors, dans le cas de la maladie, l'usage du vin de quinquina est le plus approprié.

14. ADOLESCENTULUS vino, & vini, quos vocant, spiritibus deditus, non ita pridem cum febre laboraret Intermittente, ventris dolore correptus fuerat, quem flatus, per inferiora emissi, fultulerunt. Verum post dies aliquot rediit dolor: quem cum domi tollere non posset; die tandem a reditu doloris sexta exceptus est in Nofocomium Bononiense S. Mariae de Vita. Erat dolor in hypogastrio affiduis, sed levis, nisi quod subinde increfcebat, & tunc sæpe venter ibi magis intumescibat, & si manum admoveres, plures ibi duros quasi globulos percipiebas. Sed cito hæc evanescebant omnia donec iterum per intervalla redirent. Stomachus quoque condolebat, & jam alimenta vomitu rejecta cuncta, non modo medicamenta, in his opium ipsum. Itaque cum alvus nisi per clysmata non responderet; institutum est simul id curare, simul medela aliquid, & nutrimenti per clysteres immittere ex jure, & mollientibus herbis paratos, nullo tamen doloris levamine, ut ne antea quidem cum per injectum non femel oleum & lini feminibus expressum recrementa educerentur. Inutiles quoque ex eodem oleo, aliisve, abdominis inunctiones fuerant. Levius æger in lectulo sedens, quam cubans, dolorem ferebat; quamobrem vel cum dormire, ferebat. Melius quoque habebat, & facilius capiebat fomentum inani stomacho, quam si quid forte retinisset: quæ res, & quarundam aliarum quæ sæpius significant vermes, notarum absentia, faciebat, ne a lubricis dolor esse existimaretur, tamenium terebrem longiorem nudius tertius ore eiecisset. Postremo quadam ex alimentis cœpit retinere, atque adeo prandium quoque. Genæ rubebant, quod ipse ex defluxione in faciem esse, ajebat, cui videlicet erant obnoxius. Stitabat. Abdomen universum distantum erat. Quinto jam die ex quo in Nofocomio esse cœperat, allocutus sum, ut solebam, circa horam XVI., bruma enim instabat A. 1703. Meliusculæ se habere, dixit: idque confirmabat vultus, & fermonis alacritas, & firmior, ut in fedente, corporis vigor; nam pulsus neque unquam habuerat, neque tunc habebat quod dupliciter: febris certe nulla tunc erat, neque unquam toto eo tempore quo in Nofocomio fuit, a quoquam, nisi forte femel, potuit animadverti. Cum hæc ita essent; quis tunc crederet quantum monituri aleret? Attamen duæ vix erant horæ ex quo sic ego, & cæteri qui invisabant, studiosi Juvenes, & Viri observaveramus, cum repente præ doloris acerbitate clamare cœpit, idque assidue ad nonam usque noctis horam. Vomuit interea, & ad vesperam jam pulsus sibi non amplius percipi, admoovit; nec revera ab iis qui aderant, percepti sunt. Ubi ea quam dixi, hora fuit, continere se non posse, ait, quin eleculo ad alvum exonerandum descendere. Dum exonerat, non amplius linquitur, sicque intra semihoram moritur.

ADDAVER postfritum dum lavant; magna vis exore effluit quasi sanguinis purridi, stercore fluido diluti, tabacis colore, & gravissime olentis. Itaque abdomen factum est non hypogastrium nonnihil flaccidum & quamquam in epigastrio, quod livebat, cateterique paribus durum efflet duci, arque distentum; minus tamen erat, quam in vivo. Ubi cultro ventum est ad ventris cavum, illico exiliens prorupit multus humor, ejus permissis illic ex ore effluerat; sic autem prorupit, ut illi ipsi qui secabat, non modo nobis qui aderamus, dubium fuerit, an ex ventris cavo exiterit in quod antea esset effusus, an ex aestetino distento, ideoque simul cum peritoneo facile convulserato. Mox certe cum abdomen ductum est, eo humore plenus apparuit ventri. Tenuia autem intestina omnia tam atra, quam carbo est. Eodemque phacelo lien quoque, saltem ex parte, vitiatum erat. Ventriculus tamen, quantum extrinsecus judicari possit, sanus fuit, & quidquid pariter de Crasis intestinalis ob extremo Ileo ad sinistrum usque hypochondrium pernet: cætera enim inquirere prohibuit incredibilis odoris feditas, eo etiam major quod per incuriam, & fermentationem perforato intestino aucta interea prolusio fuerat, quacum teres mediocriis lumbricus proderat.

D 3 15. Vi-

(2) n. 70. ad fin. (k) Epist. 23, n. 21. (l) Epist. 24, n. 12. (m) Epist. 13, n. 17.

15. Vidisti, cum Adolescentulus jam melius habere videretur, quantum vitii esset in Tenuibus intestinis omnibus. Sed putasse factum priusquam in Nofocomium veniret, an postquam venit? Si primum; quinque igitur dies tantum mali sine iis notis quæ comitari sphacelum solent, delituit. Si alterum; quomodo sine inflammationis signis, & sine assidua præsertim febre ortum est? Atque eadem fere te a me interrogari posse, credito, cum eas quæ insequuntur, Observationes producam, aut cum illam Segeri legeris, quæ in hac Sepulchreti XIV. Sectione (n) extat. Nimirum Senex postquam dies jam aliquot de ventris doloribus, quibus erat obnoxius, conquestus fuerat, non tamen adeo gravibus, ut decumberet; tandem circa vesperam ex horto suo domum rediens, tam acerbos passus est, ut nullis remediis proficientibus, obierit postmodum circa horam quartam matutinam: & inventa quidem sunt alia in pancreate, jecinore, liene antiquiora vitia; sed illud recens, quod *intestina, præsertim tenuia, cum colo nigerrima* fuere. Num ergo hoc intra paucas horas factum est ex quo Segerus iusto celeritatem deprehenderat arteriæ motum? Sed de his videbimus etiam infra (o). Nunc ut ad nostrum Adolescentulum redeamus; si constitisset, non ex temere vulnerato, sed ex antea disrumpo intestino putidissimam illam proliviam effusam esse in ventris cavum; tunc animi defectionem, & consecutum hanc obitum fortasse accidisse, conjiceremus cum in alvi exonerandæ conatibus frigidam aliquam distenti intestini partem ipse sibi perripisset. Sic enim Wepferus quoque, ut pariter in Sectione hac Sepulchreti (p) leges, in atrocissimis doloribus *intestina disrumpo* commemorat, ac *sordes omnes in cavum effusas cum repentina ægrorum interemptione*. Quam illico tamen non semper necessario sequi, duæ in Sectione eadem Observationes (q) Fernelli, & Riverii, commonstrant: nec discrepat una ex nostris Epistola superiore (r) descripta. Ad has, an ad illas attinere credas quæ in Commercio Litterario (s), & in Actis Cæsareæ Academicæ (t) leguntur, arbitrium tuum facio. At certe ad illas attinet quæ nuper a Cl. Galeatio (u) propoſita est; adeo subito virum necaverant tormina, cujus venter plenus pariter recrementorum inventus est quæ e rupto irruerant intestino. Jam vero funestam historiam, quamvis dolores non modo remiserant, sed omnino abierant, proferamus.

16. MULIER gracilis, statura brevi, bilioso, ut vocant, temperamento, annos nata ad quadraginta, atri-bus circiter vidua, ab octo sine menstruis, & propterea, ut credebatur, subinde sanguinem exspuere solita, sic tamen, ut mihi de pharynge potius, quam de pulmone, prodidiſſe videretur, novissime ex ira, & animi ægritudine in dolorem incidit, ob quem in Bononiensi S. Mariæ de Morte Nofocomio decumbere coacta est sub initium Martii A. 1706. Erat dolor quasi a cultris scindentibus, primum infra sinistram mammam, quam sedem non relinquens, se postea extendit etiam infra dexteram, sed levior, ut in hoc latus cubare sineret. Ad tactum enim creſcebat: difficililemque faciebat respirationem. Invaserat cum febrili rigore: qui diebus singulis recurrebat; nec febris tamen intermittebat. Rubebat facies: moleſta erat fitis; sed tussis magis, ut quæ exasperabat dolorem. Sputa sæpe cruenta; alias alba, crassa, spumosa. Sensus aliquando quasi rei ad jugulum ascendentis. Dolor denique circa umbilicum non secus ac si canes morderent. Alvus erat laxa. Missus est sanguis e pede: & alia quæ utilia fore credita sunt, administrata. Diebus post paucis; nulla prævia critica evacuatione, adeo remiserunt omnia, ut Medicus feminam jam bene habere, pronuncia-verit. Surgit ipsa: sed fatiscientibus viribus, mox ad lectulum redire cogitur, ubi in se contracta, ut a frigore solems, & sine pulsibus invenitur. Quærentibus, an thoracis, an ventris dolore conflictaretur, neutrum amplius sentire se, ait. Eodem die foetidum dejicere sanguinem cepit. Deliravit postea: & tendinum qui ad carpos sunt, convulsi subsultus se ostenderunt. Per hæc debilior facta, ut loqui amplius non posset, die abineunte morbo XVI. vivere desit. ABDOMINE, quod subsidebat, inciso, & diducto, foetor, qualis ex gangræna solet, cum odore illo mistus, qui ubi lumbrici sunt, quasi ex acida materia videtur emitti. Nec sane lumbrici reteres

deerat in Tenuibus intestinis, quæ fere omnia ex rubro colore ad lividum, nigrescentemque inclinabant. Idem morbosus livor simam lienis faciem inferius occupabat, in ejusque substantiam nonnihil pergebat. Pancreas crassius factum, ex induratis quasi globulis constabat. Duriusculum quoque erat jecur, cujus vesiculam calculi ad centrum viginti in bile pallidula distendebant. Horum qui maximi, viginti circiter, avellanae magnitudinem æquabant. Cætera quæ ad hos attinent, in Adversariis (x) primo loco descripsi. In quibus (y) de situ quoque uteri hujus Viduæ indicatum est, ob brevius Rotundum vinculum ita in dexterum pelvis latus retracti, ut medium pelvis sine utero esset. Porro qua sinistra Tuba ex utero emergebat, prominebat pustula albo pure turgida, lupinum æquans: substantia autem uteri quam pustula excavaverat, hac perustula, & educto pure, nigrescebat. Tuba non aliam, sed ex colore carneo flavescens continebat materiam. Testes contracti, cum paucis intus vesiculis: & alterius tunica quasi cartilaginea. Thoracem aperiendo, pulmones anteriore facie perpaucis in locis ad pleuram per membranas alligatos invenimus, cætera solutos: sanos quoque, si dexteri anteriorem excipias partem, cujus compacta, sed non maxime, erat substantia. Nihil in pericardio humoris: in flaccidi autem cordis ventriculo dextero, & ad omnia orificia polyporæ mediocres concretiones.

Quibus autem e pharyngis sedibus cruenta sputa provenissent, in Epistolis Anatomicis (z) scriptum est. Caput denique cum a cervicibus abscinderetur, per maximum occipitis foramen aquæ non exigua copia prodit: quæ, cranio reſerato, sub Tenui quoque meninge, a sinistris præsertim, inventa est. In Lateralibus cerebri ventriculis subrubrum ferum, & plexus Choroides multis hydatidibus inæquales, quæ tactu facile distumpebantur. E medullaris substantiæ sectionibus quæ puncta sanguifera se ostendebant, plus sanguinis quam sæpius solet, exprimebatur. Ex hoc cerebro, ut etiam ex lingua, pharynge, ipsique adeo, quos discuci, oculis idem ille de quo in Ventre dixi, vermium odor exiſtebat.

17. Si quæ ad delirium, ad convulsiones, ad cruentum sputum, ad pectoris dolores, ad alioſque affectus, quos hic non attendimus, seponas, & dolores tantum intestinum respicias; facile intelliges, cum hi, ut cætera, nulla præcedente critica evacuatione, se adeo remiserunt, ut valere mulier crederetur, nec ipsa amplius dolorem ullum sentiret; tunc intestina livere jam, & nigrescere cepisse, quod deſectio foetidi sanguinis illo ipſo die orta; ut de atphyxia nihil dicamus; commonstrabat. Omnino nihil suspiciosius est, quam repente, & præter rationem dolores evanescere. Recentem mihi suam narrare in hanc rem Observationem memini sagacissimum, & experientissimum Medicum, quem in Valsalvæ Vita laudavi, Petrum Molinellum. Melancholicum temperamento præditus adolescentulus febre acuta cum faucium inflammatione, & delirio corripitur. Circa XIV. diem cætera abeunt, febris assidua persistit; & quamvis sudet æger, & plurimum mingat; febris tamen, nisi quod uno tandem die abſuisse viſa est, ad diem pervenit XXXV. Cum ex tanta febris vel post sudores, & urinarum copiam diuturnitate non leve quoddam subesse vitium, suspicaretur Molinellus; ecce tibi, nullo prævio assidentium, aut ægri errore, improvisa æruginosa diarrhœa, quam dolor paulo supra velicæ regionem comitabatur. Quæ ut repente advenerant, sic repente quoque, & cito evanuerant. Tunc enim vero graviora Medicis, nec sine causa, timere. Universum enim abdomen incredibilem in modum induruit, cum interni caloris sensu, & ubi tangeres, etiam doloris: simul pulsus jam nulli, deliria, tandem difficilis respiratio, & sine convulsionis signis, mors intra tertium ex quo abdomen induruerat, diem. Quamquam autem mirabatur, ex effœto, ut post diuturniorem, nec levem, ægrotationem, sanguine oriri inflammationem potuisse; tamen quin orta esset, non dubitabat; ego vero, quin gangræna quoque. Sed quod ob negatam incidendi cadaveris facultatem, pro certo sciri in adolescentulo illo non potuit, potuit in femina Principe, cujus mecum ab uno ejus Medicorum communicata historia, quippe earum similis quæ superius descriptæ sunt, hic minime prætermittetur.

18. CELSISSIMA PRINCEPS annos nata quatuor & quinquaginta, artubus non pinguis, ventre pinguiſſima, cujus

cujus pulsus post duos quoſque laudabiles ictus continuo toridem humiles, & disparis celeritatis exhibebat, cum ex gravissimo intestinorum dolore, vesicam in consensum trahente, & lotii reddendi facultatem intercipientem, evaſiſſe videretur; paucis omnino postquam is dolor filuerat, diebus interjectis, nigra deſectione, & post hanc morte correpta est. VENTRE adaperto, intestina quædam, & ventriculus gangræna affecta deprehensa sunt; fellis autem vesicula exſucca, & in ea calculus parvi pyri magnitudine: in renibus arenulæ potius, quam calculi. In Thorace cor, & pericardium pinguedine prægravata.

19. Sive hæc prægravans pinguedinis copia, sive etiam hæreditarii aliquid, ut ea indicant quæ de Rege, ejus Parente, olim memini legiſſe, illas pulsus inæqualitates faciebat; gangrænam certe intestinorum prægreſſe potius, cum dolor urgeret, inflammationi, quam atræ bilis, ut vulgo dictum est, deſectioni tribuendam putaverim. Neque enim deſectio etiam ventriculi infectiſſet, & in Vidua de qua paulo supra (a) scriptum est, nigra quidem, sed putridi sanguinis, non atræ bilis, egestio obitum antecellit. At enim non verisimile est, inquis, plures, & exercitatos in primis Medicos, quales ad Principum curationem solent advocari, non cognoviſſe inflammationem, neque hujus in gangrænam degenerationem. Ego vero de aliis, præsertim in morbo quem ipse non viderim, non secus ac de me vellem, judicare solitus, consuetudinem hic quoque tuebor meam neminem temere infimulandi, & nisi tu dissentis, hanc, nulla prævia inflammatione, gangrænam ajam acceſſiſſe. Magno auctore id faciam, Fernelio (b), qui post dolorem immanissimum, extremum pedem aliquando repente sphacelatum vidit, sine rubore conspicuo, ut denique miser exstingueretur sine febre, sine symptomatis admodum gravibus. Etſi igitur sphacelum inſcruſſam magnæ inflammationis pedisequum esse, plurima Medicorum turba conſeſſet; tamen haud raris, Fernelianæ haud abſimilibus, Observationibus spectatis, diſerte ſcripſit Fridericus Hoffmannus (c), quare quin etiam interne in viſceribus idem sine prævia inflammatione, ... fieri poſſit, non eſt quod dubitemus. Quod si forte in ipſis intestinis requiris exempla; Segeri poteris Observationem relegere (d): vel potius, quando in illa quam acerbissimus erat dolor, & celerior arteriæ motus deprehensus est; si alteram Friderici Ortløbii (e), quæ pariter in ſepulchreto (f) etiam est, leges; intestina a dextris livida, nigricantia, sphacelata viſſe, invenies, idque, ut in Scholio ipſe miratur Ortløbius, sine præviis doloribus abdominis, & sine prævia febre, manifestæ.

20. Quoniam tamen in ipſo Ortløbii ægro obſcure ventris dolores præceſſerant, neque, ut in illo, de quo ex Fernelio paulo ante dictum est, pede, aliſque exterioribus partibus, ita in viſceribus quoque ruborem conspicuum non eſſe prægreſſum, quiquam eſt qui teſtificari poſſit; sphacelum quidem intestinorum accidere interdum poſſe nulla præcedente inflammatione, non negabis; sed quæres simul, poſſitne aliquando ejuſmodi inflammationi ſuccedere, cujus præcipua, & pervulgata ſigna non extent? Ut a ſepulchreto non recedamus; vide, quæſo, in hac ipſa XIV. Sectione (g) Observationem Riverii. Ileum intestinum circa finem, cum adjuncta meſenterii portione, gangræna, atque adeo sphacelo affectum reperies in eo qui cum laboraſſet ex intestinorum dolore primo die morbi, protracſi uſque ad XIII.; nullus autem dolor adeſſet, neque ulla febris ſecundo die, magnam die tertio, & ſequentibus dubitationem injecerat Medicis, cum inflammationem teſtari videretur febris, quæ tertio illo die ſuperoriet, ſitis, & lingue ariditas; ſed quomodo inflammatio intestinorum adeſſe poſſet citra dolorem, concipere non poterant. Num sphacelum primo jam die factum credes? Duodecim ergo dies sic homo vixerit? Deinde quomodo sphacelo facto, febris quæ antea non erat, acceſſit cum lingue ariditate? Certe ſuperiore Epistola videris, in Sene (h) pulsus ex febrilibus factos demum ſanorum ſimiles, linguam autem ex ſicca humidam, quo in Sene intestinorum partem adhuc rubram, partem vero lividam, nigram, gangræna occupatam deprehendimus, indicio non obſcuro, novissime hanc ex inflammatione in gangrænam tranſiſſe. Sed quod ad dolorem attinet, aliæ noſtræ Epistolæ ſine illo fuiſſe intestinorum inflammationem, commemorant. Namque Morgagni de Sed. & Cauſ. Morb. Tom. II.

ut ſileam, in XXIX. (i) nullo intestina dolore vexata legi, quæ omnia maxime eſſent inflammata; illud enim propter eorum paralyſim accidiſſe, conſeci; certe non erant in aliis ægrotantibus reſoluta, ut puta in duobus, Epistola XXI. (k) propoſitis; & tamen, eſſi inflammata reſoluta ſunt, nulla audita fuerat de eorum dolore querela. Atque ut ægram memorem, de qua recordari facilius poſſis; mulier ſuperioribus Litteris (l) deſcripta eſt, cujus Tenuia intestina maxima ex parte rubebant; eademque doloris ferme expertia viſa fuerant. Sed nec ſignum alterum inflammationis præcipuum febris, toto morbi tempore in ea muliere unquam fuerat: in Bajulo autem, paulo poſt illam propoſito (m), febris, ſive non valde frequentes pulſus, ſive non calentes carnes, attenderes, levis, erat; inflammatio tamen non levis; ut locus in eo non eſſet, multoque minus in muliere, laudanda alioquin Ballonii (n) ſententiæ. Qui poſtquam dixerat, videri æquum eſſe ut febris inſignis internas inflammationes conſequatur; tamen continuo Galenum ſecutus volentem magnas eſſe inflammationes in parvis internis, ut acuta febris ſequatur, ſic, inquit, ſi ſit phlogiſtis mediocris, ad manum mordax febris non inſequitur.

21. Quæ omnia cum ita ſint; quando cum aliis inflammationum intestinorum ſignis, vehementem dolorem, & acutam febrem in ægrotantibus deprehendes; jure quidem meritoque credes Rei Medicæ Auctoribus hæc duo inter præcipuas notas magnæ intestinorum inflammationis ponentibus. Nec tamen ſi quando alterum, vel utrumque horum aut abeſſe, aut vix eſſe, invenies; continuo putabis, aut nullam eſſe inflammationem, aut levem, neque gangrænam; & sphacelum in eorum eſſe intestinis non poſſe in quibus duo illa præceſſiſſe, non videris. Optandum ſane fuiſſet, ut Medici cum ſigna hujus inflammationis, & confequentis ipſam gangrænam propoſuerunt; hoc monitum non omitterent in morbo qui per fallaciam ejuſmodi, nec raro, præceps ac repentinum aſſert exitium. Nec raro, inquam. Nam memini, cum Adolescentuli tibi ſupra (o) deſcripti, caſum mirabundus narrarem Valsalvæ, atque Albertino, continuo utrumque confirmariſſe, non abſimilia occuſiſſe ſibi, nec ſemel. Quo tempore cum mihi inculcaret Albertinus, vigilandum, & cavendum eſſe in doloribus intestinorum: ſe enim poſt leves dolores, aut certe cum minime magnis, nulla manifeſta febre, nulla convulſione, nullo vomitu, animo, ac corpore ſatis vigentibus, de improviſo vididiſſe ægros in præceps ruere, & cito eripi ab latente inflammatione, & sphacelo nec opinato intestinorum; cum hæc, inquam, mihi inculcaret; quaſi ex peratento illo Medico, & diligentissimo Observatore, quibus igitur ex ſignis proximum intelligere periculum, & prænunciare ſaltem poſſemus. Ille vero ex pulſu, inquit, abdomine, facie. Pulſus enim humilis, & debilis potius, & qui, ſi bene attendas, ſibi ſubobſcure diſſimilis ſit: abdomen autem tenſum, & durum, & cum dolore quodam: facies denique inſoliti aliquid, ſed in aliis aliud, oftendens, ut interdum oculos quaſi exteſſectos, alias livorem quendam circum labra, animadverterim; hæc, inquit, fere; nam aliquando linguam etiam adnotavi haud bene ſe habentem, & quamdam ſitim; mihi accidit, ut in ejuſmodi caſibus ſe obſervanda præbuerint. Sic ille ingenuè, ut ſolebat, quæ requirebam, ſigna indicabat. Quorum mihi veritas cum in aliorum, tum præſertim in Thomæ Aleotti caſu perſpecta eſt, probi æque, ac nobilis Civis mei. Cum enim poſt dolores quosdam ventris, quibus erat obnoxius, cubaret, nec eadem qua ſolitus erat, celeritate convaleſceret, me autem pereos dies; autumnus erat, ſi recte memini, A. 1711. incommoda valetudo domi retineret, miſſusque ſub veſperam ejus Medicus qui me conſuleret, nonnulla ex iis ſignis narraſſet, quæ modo commemorata ſunt, ipſe autem, interrogando, quædam alia ex iſdem non deſiſſe, intelligerem; reſpondi nihil tale opinanti, ad ægrum rediret, quem ſi vel tantillo interea pejorem factum animadverteret, continuo admonendum curaret, poſſe magnum inſtare periculum; ut ſibi, & poſteris conſuetæ religione, prudentiaque proſpiceret. Quid quæris? Perpaucis poſt horis æger manifeſto in pejor ruere cum cepiſſet, atque ea de quibus tunc demum admonebatur, itatim perſiſſet, intra illam ipſam noctem Vir optimus præcipiti caſu ereptus eſt.

22. Verum cum ea ſit natura Medicinæ, ut eadem non

(a) Obſ. 6. (o) n. 19. & ſeqq. (p) in Additam. Obſ. 3. (q) 23. & 21. §. 4. (r) n. 9. (s) A. 1722. Hebd. 45. n. 2. (t) Tom. 8. Obſ. 47. (u) Comment. de Bonon. Sc. Acad. Tom. 3. inter Medicæ. (x) III. Animad. 28. (y) IV. Animad. 25. (z) IX. n. 14.

(a) n. 16. (b) De abdit. rer. cauſ. l. 2. c. 15. (c) Diſſert. de Morb. hep. ex anat. deduc. §. 19. (d) Vid. ſupra, n. 15. (e) Eph. N. C. Dec. 1. Obſ. 143. (f) l. 3. S. 1. Obſ. 11. (g) Obſ. 21. §. 4. (h) n. 25. (i) n. 10. 11. (k) n. 9. & 17. (l) n. 28. (m) l. 1. Conſil. Medic. 112. (n) n. 14.

semper ad eundem modum respondeant; hæc quæ diximus, ita accipe, ut si quando pleraque eorum indiciorum videas convenire; suspiceris saltem, cauteque deinceps, & perattente cætera observes. Interea autem haud prorsus inutile fortasse erit, si cum iis quæ superiore, & hac quoque Epistola scriptæ sunt, Observationibus hinc pleraque Albertini signa conferas, inde vero quæ a Medicis tradi solita sunt, ut intestina esse inflammata, cognoscamus. Pulsus ille humilis, ac debiles potius animadverterat, quales fere Epistola superiore agnosces num. 9. 11. 18. 25. hac vero n. 2; ne quid dicam de asphyxia ibidem, & num. 14. & 16. demum adnotata, Animadvertebat quoque abdomen tensum, & durum, faciem autem, oculove insoliti aliquid ostendentes: quibus de rebus, nisi quod num. 11. & 16. nihil scriptum est; sub cæteris omnibus qui modo memorati sunt, numeris quid observatum sit, reperies. Medici autem Scriptores in abdominis quidem tensione conveniunt. Sed plura addunt alia quæ intestinorum proculdubio inflammationem significant, illam tamen evidentem, & quam cuncti facile agnoscant; non hanc quæ de loquimur, obscuram, & de qua vix pauci suspicentur. Inter ea sunt in primis acuta febris, & dolor vehemens: sine quibus tamen hanc inflammationem fuisse, supra (p) est a nobis ostensum. Præterea quod ad febrem dumtaxat pertinet, leges Observationem a Cl. Rosa (q) perscriptam: *universum intestinum systema fuisse inflammatione corruptum ac seditatem reperiens; & tamen in toto morbi decursu ne minimam quidem pulsus intensiorem aut motus febriles observari potuisse.* Et hic quidem peculiarem casum describebat A. 1745. Sed ante ipsum, non ante meorum Præceptorum, meique ipsius Observationes; ea ediderat Cel. Simonius, quæ Illustri Archiatro Swietenio (r) iustam occasionem præbuerunt ejus laudandi, & confirmandi verbis illis, quæ etiam apud non unum ex nostris Italici hujusce postremis repetita videris; tamen hic quoque juvat excipere: *saluberrimum in Praxi Medica monitum posuit Simonius, ne decipiantur Medici, credentes, nullam inflammationem adesse, si febris absit. Cum sepe fixos dolores intestinorum & ventriculi inflammatio producat, licet nulla febris observetur, pulsus explorato. Viden, ut Vir Gravissimus hoc contingere sepe, dicat: ut saluberrimum in Praxi Medica id monitum esse, non dubitet. Nempe id erat quod anno ipse 1703. (s) omisum ab iis, quos hic intelligo, Medicis fuisse, mirabar, qui ut singulorum morborum, sic etiam inflammationis intestinorum signa docuissent. Sic igitur quod ad febrem. Quod vero ad dolorem attinet; hic addendum est, proponi ab iisdem Medicis cum pulsationis, & non modici caloris sensu conjunctum, qualem in nulla invenies nostrarum Observationum; imo aliquam (t) leges in qua cum de pulsationis, & caloris sensu nominatim quærerem, diserte utrumque negatum est. In pluribus (u) potius reperies sic ab aegris dolorem descriptum, quæ canes morderent. Ponuntur etiam ab iisdem Scri-*

ptoribus alvi adstrictio, & assidui vomitus, præsertim si inflammata sint Tenuia intestina, ut recrementaque per os reddantur. Sed nihil horum certe invenies relegens quæ supra (x) saltem de Servo, de Anu, de altera Muliere propolita sunt: quin huic ultimæ laxa erat alvus. Sitim quoque; non levem hanc dico quam aliquando animadverit Albertinus; sed molestant illam, quam ajunt, & acutæ febris convenientem, in pluribus frustra perquires. Mitto cætera, neque enim mihi propositum est Scriptores quos magni facio, redarguere; sed tantummodo quæ præcipua inflammationum intestinorum signa traduntur, ea non semper adesse, ostendere.

23. Cæterum laudare eosdem pro eo ac merentur, factis non possum, cum admonent, facile, ac sæpius eorum viscerum inflammationem in gangrenam ac sphacelum delinere, ejusque rei indicium esse, si omnis subito evanescat dolor. Nimirum ex eadem illa causa est, quod si hoc accidat in dysenteria, cito aegri pereant, cum minus id ipsi, & cæteri timent. Habes in Sepulchreti libro hoc III. Sect. XI. (p) ingenium, & Hippocrate dignam, Drelincurtii confessionem, qui dysenterici cruciatibus continuo silentibus cum triumphum cecinisset, tribus post diebus *detriumphavit*, ægro sine doloribus pereunte ob viscera mirum in modum *siderata*. Nosque alias (z), ad te scribentes, sphacelo intestinorum factum coniecimus, ut postremis dysentericæ, & vitæ diebus visa sit aliquando ipsa quoque febris abiisse; in his autem (a), & superioribus (b) Litteris unde esset, & quid portenderet in ventris doloribus, horum, aliorumque symptomatum non cessatio modo, sed & remissio quæ præter rationem accidisset, ostendimus. Cave tamen vicissim credas, in quibus sphacelus intestinorum sit, in iis semper dolores cessare, edoctus Adolescentuli historia (c), qui cum ultimis quindecim vitæ horas ob immane dolorum tormentum jugiter clamare coactus esset; tamen intestinorum partem multo maximam tam nigram habuit, quam qui nigerrimam. Scilicet reliquam integram hæcenus partem interea potest aut dira inflammatio, aut causa alia aliqua torquere, ut puta convulsio, aut, quod in eo Adolescentulo, in aliisque (d) ejusmodi morbo laborantibus haud raro observavimus, intestinorum lumbri. Num vero fortuito accidit; an quod bilis vitium præva irritantesque chyli reliquæ consequantur, ut in quorundam ex illis chyli fellea calculos alii (e), & nos (f) offenderimus, in medio relinquimus. Inter pessima autem signa, & proximam mortem indicantia jure meritoque reponimus nigras dejectiones cum dolorum cessatione conjunctas, quas supra (g) commemoravimus: ad quas illa quoque addenda est quam cum omnium intestinorum non dolore quidem, qui ob paralysem nunquam fuerat, sed magna inflammatione tibi in alia Epistola (h) descripsimus. Proximam de Hypochondriorum Tumore ac Dolo expectabis, & valebis.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXXVI.

Verba sunt de Tumore, & Dolo Hypochondriorum.

OB eas causas quæ XXXII. Epistola (a) sunt indicatæ, quam brevissimam, quæ sequitur in Sepulchreto, de Hæmorrhoidibus Sectionem transilientes, ad duas ei proximas XVI. & XVII. confestim venimus, utriusque argumenta, Hypochondriorum Tumorem, & Dolorem, his unis Litteris complexuri. Si enim duo affectus haud raro conjuncti sunt, velut ex illis unde incipiemus, Valsalvæ Observationibus proclive erit tibi intelligere.

2. MULIER quadraginta annorum, coloris flavescentis, duritiem in dextera ventris parte diu tulerat, ad os usque ilium, & infra descendente. Dolebat, eam partem si tangeres. Sitiēbat. Per mensem circiter ante obitum de ventriculi dolore post cibum assumptum querebatur, & difficile respirabat. Po-

stremis aliquot diebus, vomitus: duobus autem ultimis, acerbissimus dolor accesserat. **VENTER** aqua plenus inventus est flava, amara, & ad ignem concrefcente. Ventriculus in medio angustus, ut ibi pylori architudinem æquaret, sicque duos quodammodo repræsentaret ventriculos. Hepar in molem ingentem excreverat. Nam lobo dextero quasi ad ventris fundum perveniebat. Hujus lobi substantia tota indurata, multisque in locis distincta corporibus albicantibus, quorum nonnulla majora avellanam adæquabant; cum dissecaretur, alicubi erosionis ostendebat initium, succorumque imminente putrefactione. Sinister autem hepatis lobus itidem induratus, ibi ventriculum premebat, ubi hunc arctiorem fuisse, diximus. Vesiculæ fellis tunicæ crassæ erant factæ, cavum autem valde angustum, quod

quo atra, crassa, viscida bilis continebatur. Lymphæ ductus nullo modo se probebant in hoc ventre. In Thorace pulmones subalbi, maculis subnigris variegati: quorum sinister nonnihil ad dorsum alligabatur; dexter undique erat solutus. Ventriculi cordis fluidum sanguinem continebant; ut vix in dextero leve esset polyposæ concretionis initium.

3. In aliis etiam Epistolis (b), tribus productis Observationibus ventriculum quasi duplicatum descripsi, non tamen quanta hic constrictione divisum; quamvis vel hac majorem in viro, nisi quod famelicus erat, cætera sano, ex Blasio commemoravi (c). Nec dubium mihi fuit, quin hujusmodi structuræ ventriculi essent a primordiis (d): itaque in jecinore, quantumvis in duabus primis Observationibus sinistrorsum ultra æquum extenso, neque ibi tamen duro, earum constrictionum causam non quæsi, præsertim cum in tertia jecur esset intra naturales fines: neque in eadem tertia ab ea potissimum ventriculi constrictione vomitus, & ventriculi dolores deduxi, ut qui in prioribus nequaquam fuerant. Hic tamen eosdem a constrictionis illius angustis repetam, quippe magis postremo tempore, magisque, ut videtur, præter consuetudinem auctis a crescente in dies jecinoris duritie eam ipsam ventriculi partem peculiariter comprimētis. Nam & ratio, & multiplex Observatio confirmant quantum ventriculi munia perturbet ipius compressio, & depressio ab adaucla jecinoris mole: ut videbis ex Bartholini (e) in sexenni puella, Fantoni autem patris (f) in Sacerdote Observationibus, quorum hic hepatis molem habebat totum impletem epigastrium, illa vero universum fere occupantem abdomen. Jecur quidem vel minime morbosum tenuiorem sui partem nonnunquam ad lienem usque protendit, ut alibi (g) commemoravimus: morbosum autem aliquando nullos propemodum extensionis per ventrem suæ habet terminos. Quorum neutrum ignorare Medici, & Chirugi debent, ne ab eo quod plerumque est, nonnullis in casibus decipiantur. Sed ubi sanum jecur fuerit, suspitioni tantum est locus, ut puta si tunc forte inflictum sinistro hypochondrio vulnus cum aliis sit conjunctum symptomatibus quam quæ visceribus solent, quæ ibi omnes locari sciunt, vulneratis. Cum vero ægri jecinoris signa non desunt, ut in propolita muliere flavescent color, & durities ex hypochondrio incipiens dextero; minus difficile tunc est illuc quoque extensum jecur agnoscere quo se eadem continuata durities extendit. Num vero in muliere altera, cujus historia sequitur, doloris, si manu premeres, continuo eo usque ascenderet, ut idem doceret, cum Valsalva qui tunc junior observata in vivente pressus scripsit, id retineat; a nobis conjici magis potest, quam affirmari.

4. SEXAGENARIA Mulier diu queritur de dolore supra umbilicalem regionem: sicut, tussit, exspuit catarrhalem materiam. Postremo difficile respirat: paucisque ante mortem diebus, repente multum intumescit venter, oedemate pedes occupantur. Tandem, sensim illo deficiente dolore, fit vivendi finis. **IN VENTRE** magna limpida aquæ copia: nullum vasorum lymphaticorum vestigium. Lien naturali duplo major. Hepar durum: cui annexa fellis vesicula plena erat calculis lavigatis. Alia autem in parte vesicularum congeries hepati inhaerens cernebatur, quibus laceratis, serum effluebat. Intra substantiam autem ejusdem visceris eam partem, versus qua diaphragma spectabat, cavum abscessus inventum est, plus tertia jecinoris parte occupans. Eruperat, diaphragmate perforato, materia abscessus in dexteram Thoracis cavam, quæ tota fanioso pure plena erat. Pulmo tamen sanus fuit.

5. Nunc quando abscessus hepatis in quam partem eruperit, intellexisti; non dubito, quin mecum optes, potuisse a Valsalva diligentius perferri signa omnia, postrema præsertim, ejusmodi casus, qui fortasse ante ipsum occurrerit nemini, Stalpartius (h) enim cum de quodam scriberet, qui pus ex jecoris abscessu non affatim, neque in thoracis cavam sed modice, & in pulmonem per fistulam

diaphragma perforantem, utrique visceri connatum, transibat; nullum contra ac pro sua multiplici lectione solutus erat, exemplum addidit rerum ejusmodi quas alius per anatomen conspexisset. Post illud autem; si quidem fidei non incerta Observatores querimus, ut sane debemus; neminem legisse nunc memini, qui idem, nedum quod Valsalva, deprehenderit. Qui symptomata quidem quæ colligere potuit, scripta reliquit. Sed inter ea vides, quo tumor ventris, & pedum oedema sint referenda. Difficilis autem respiratio sic affecto hepate, integro autem diaphragmate esse potest, ut tussis etiam, cujus in ista muliere tanto magis ambigua erat significatio, quod materiæ catarrhalis excretionem conjunctam habebat. Extant hic in Sepulchreto (i) abscessuum hepatis historia ad viginti. Sed nulla fere est in qua non majorem curam desideres in signorum observatione, si illam (k) excipias Norbergensis viri, quæ a Coitero descripta est. Verum in illo vomica finam hepatis tenuerat partem, ut appareat, in ventris cavum se aperuisse. In eademque finia parte juveni fuerat quem fecit Paawius (l); sed hæc pus non effuderat; ut foramen duos pugnos admittens, quo diaphragma exesum erat qua parte in sinistro latere jecoris accumbit, non a puris eruptione factum intelligatur: præterea nihil indicatur eorum quæ obitum antecesserant, ut neque in altero (m) in quo idem Paawius duo in jecoris gibba parte invenit ulcera intertrorfum penetrantia. Nec peculiariora signa leges in Blasio Observatione (n) hepatis ita suppurati, ut sola ejus tunica pus a diaphragmate sejungeret arcte adnexo. Hæc commemoravi, ut magis intelligeres, quanto optabilis esset, id a Valsalva potuisse præitari quod cæteri non præstiterant; nimirum quod ad signa attinet jecoris abscessibus fere communia quæ defuerint, aut non ex iis saltem quæ adnotavit Coiterus, præter tussim & sitim, quas Valsalva quoque memoravit: ex signis autem rupti abscessus num ea fuerint quæ a Coitero sunt in hunc modum indicata: qui in dextero hypochondrio, subjectaque regione fuerat, tumor desit, durities evanuit; eodem die aliquot animi deliquis correptus animam dedit. Nam Valsalva nihil memorat, nisi dolorem qui supra umbilicalem regionem fuerat, sensim defecisse, materia videlicet abscessus magis magisque ex hoc in thoracem traducta. Cujus actioni quid tum detrimenti accesserit, ne indicat quidem; nihil videlicet attingens de difficiliore facta respirazione, ut nihil de animi deliquis.

6. Hæc ultima, si historias illas tot perleges quæ sunt in sepulchreto paulo ante designatæ, non magis quam citam mortem, adnotari, invenies in iis quibus se vomica hepatis in ventris cavum exoneraverat (o), si virum excipias, cujus casum a Coitero descriptum (p) commemoravi: & contra, pistorem leges (q) interdum leipthymia tentatum, cujus suppurati hepatis intacta ac integra membrana erat. Attamen utrumque eorum quæ in historiis illis minime scribuntur, sæpe adeo Medicis, & in his Præceptorum meo Albertino occurrit, ut sollicite moneret, ne cum signa essent abscessus in hepate jam perfecti, æger moveretur; non quod ignoraret, motum ab egregiis aliis quin Auctoribus tunc esse præceptum, quod & memoria nostra feliciter cessisse nonnunquam, legimus; sed quod hinc censeret, fortuna fieri, si pus sic disrupti abscessus, illæsa hepatis membrana, per bilarii ductus ramos ad intestina derivaretur; inde autem perspiceret, quam facile ea potius perrupta membrana, in ventris cavum effundi posset, ægrumque illa syncope confestim necare. Hoc enim, se adolescente, meminerat Bononiæ accidisse, cum præstans Medicus, idemque nobilis Chirurgus, illos secutus Auctores, motum imperasset virgini cui jecur erat inter mulierum quibus in ventrem pure agram mox inter mulierum quibus innitabatur, manus interisse. Postea autem vel sine motu, aut certe ad levem motum, ut fit, in lecto, aut dum e lecto surgitur, idem contigisse, animadvertebat cum in aliis, tum præsertim in Marchione generosissimo, cujus erat abscessus

(p) n. 32. (q) Aft. N. C. Tom. 8. Obs. 47. (r) Comment. in Boeth. Aph. 5. 371. (s) n. 14. & 21. (t) Epist. 34. n. 9. (u) Ibid. n. 18. & 25. & in hac Epist. n. 16. (v) in Addit. Obs. 4. (w) Epist. 31. n. 26. (x) n. 14. 16. 18. (y) n. 15. (z) supra, n. 14. (a) supra, n. 16. & Epist. 34. n. 9. & 33. (b) Vid. Obs. 47. Cit. supra, ad n. 22. (c) Epist. 34. n. 15. & supra n. 16. 18. (d) num. iisd. (e) 29. n. 10. (f) n. 10.

(b) Epist. 16. n. 38. Epist. 26. n. 31. Epist. 30. n. 7. (c) Ibid. n. 8. (d) Epist. 16. n. 32. (e) Sepulchr. I. hoc 3. Sect. 1. Obs. 4. (f) Obs. Anat. Med. 24. (g) Advers. 2. Animad. 2. (h) Obs. rar. 48. Cent. 1. (i) Sect. 17. Obs. 24. (k) §. 6. (l) Ibid. §. 7. 8. (m) §. 8. (n) §. 19. (o) §. 2. & 3. (p) §. 4. (q) §. 14.

in fima jecinoris parte. Quibus Observationibus adductus, suspicabatur, non ita abfimile mortis genus in nobili alio Viro, cujus morbi signa omnia alias (r) tibi diligenter perferibam, ab non adeo abfimili causa esse repetendum. Eo autem minus probabat motum, quod abscessus, tantum aliquando, aut ejus generis est, ut tamen casu per bilarios ductus exitum inveniat; fanari tamen agri non possint ea felicitate quae ipsi obtigerat in primaria Matrona, itemque in famula, quarum utramque diuturna quidem diligentia, sed non aliis medicamentis, quam resina terebinthina, & sero, deinde succis hederæ terrestris, & consolidæ mediæ, mihi asseverabat, se percussisse. Namque ubi jecinoris vomica ipsa exitum aperuit per abdominis musculos, cujus rei exempla duo Bononiæ proferebantur, vel tunc est non internis modo, sed & externis, ipsi apostematis cavo adhibitis, remediis data opera est, ut jecur sanaretur; tamen in altero dumtaxat id fuerat confectum: in altero autem, ex quo materia aliquando exibat aquæ similis in qua caro recens lota est, aliquando flavi aliquid, consequi idem non potuerunt; sed æger denique mortuus est: quanquam huic tumorem non tam naturæ vis, quam artis error aperuerat. Medicus enim, quamvis nominis haud obscuri, fociusque Chirurgus, minime attendentes, icterum antecessisse, itemque alia hepatis labem indicantia, tactu se decipi, ob eandem fortasse causam passi fuerant, quæ a Fantono parte (f) in extenuatione impostorum musculorum abdominis deprehensa est, ut in his esse tumorem qui in hepate erat, existimarent; itaque mollioribus adhibitis suppurationem importunissima fedulitate concitaverant. Intelligis quid improbem. Neque enim is sum qui ubi natura ipsa suppurationem jecoris tumorem ad abdominis urgeat musculos, pus ibi diutius sinendum censam quod in dies augeatur, & mora pejus factum, sanguinem inficiat, visceris partes alias, aliasque erodat, sibi que viam quo minus expedit, aperiat, ut puta in ventriculum; in hunc enim quoque per amplum foramen irrupisse, Cl. Vogelius (t) deprehendit, aut in thoracem, ut supra ostendimus, aut, quod minus raro accidit, in ventris cavum, unde misera, & lenta mors, si periculum effugiat citissimè, ut Albertinum vidisse, diximus (u), & illustris confirmat Swietenius (x). Periculum est, inquit, ne animi deliquimus, & subita mors sequatur illo tempore, dum abscessus jecinoris rumpitur: venæ portæ enim ramus antea a vomica pressus, nunc pure elapso liberi, a sanguine impetuosis irrumpente rumpi facile potuerunt, præcipue cum a pure acriori tam diu accumbente macerati fuerint, & quasi semi exsiti. Igitur hunc ipsum, alioque graves Auctores secutus, priusquam hæc acciderent, ægram, ejusque necessarios docerem, quanta, & quam varia pericula imminerent, si puri exitus quantocumque non daretur: eoque tamen caute, ut par est, dato, salutem non semper, sed interdum sperari posse, idque Hippocratis aphorismus (y) significari: imo, nec semel, eos quoque hepatis abscessus fuisse perlanatos, e quibus apertis longe alia fluxerint ac quæ optabat Hippocrates, cujusmodi exemplis etiam illud addes, quantumvis longa, & difficilis curatio fuerit, quod a Cl. Jo. Petro Albrecht (z) propositum est.

Sed jam illuc unde divertimus, redeunt, ab iis quæ in sexagenariæ Mulieris historia Valsalvæ non attigit, ad ea quæ adnotavit, veniamus.

7. Congeriem hepatis inhaerentem vesicularum, quas cum laceraret, serum effluebat, noli credere, aliud fuisse, quam hydatides, ut ipse diserte adscripsit seorsum, quæ morbofo hepatis non ita raro solent exterius inhaerere. Plurimum, & facile majorum, a feri copia diffilientium effectum ex aliqua saltem parte fuisse, puta, eam limpida aquæ copiam quæ in ventre effusa inventa est. Noli igitur hæc ejusdem naturæ censere, cujus erant peculiares illæ vesiculæ, flavoque humore plenæ quas ex Valsalvæ observatione in III. Epistola Anatomica (a) descriptas legeris. Eas autem historias, tametsi omnes ad hepatis morbos, quædam autem ad ipsius abscessus pertinent, non hic iterabimus, propositum servantes nostrum longe abhorrens ab ea incuria qua in his Sepulchreti XVI. & XVII. Sectionibus complura invenies repetita. Ut enim in illa

omittamus eandem esse Observationem XII. ac XVIII., in hac certe eadem sunt quæ in II. Observatione §. 10. & §. 20. indicantur, itemque IV. ac quæ in XI. §. 4. & quæ in proximo §. 8. ac quæ in II. §. 15., & in eadem illa XI. quæ §. 2. ac quæ §. 6., ne quid de iisdem dicamus quæ totidem iterantur verbis in Scholiis ad XVI. & ad XVIII. Observationem. Nos autem nihil ex iis quæ tunc scripsimus, hic repetentes, tria dumtaxat ad illas Valsalvæ historias adjiciemus.

8. Et primum ad eam quæ ibi num. 8. proposita est, illud quod eo loco necesse non erat, addere hic decet: serum quo venter redundabat, nidorofum halicum emississe ejus similem qui sæpe ex febricitantibus, nec raro etiam ex eorum urina percipitur: igni autem impositum, brevi ex limpidio ita factum esse turbidum, ut vaccinum serum non recte depuratum referret: tandem vi caloris totum in auras abiisse. Neque hoc omittendum est, circa lumbares glandulas leve se prodidisse indicium valorum lymphaticorum, quæ multum erant exinanita.

9. Ad eam autem quam proximam illi historiam subjecimus (b), nihil quidem ad ejus complementum ex Valsalvæ observatione addendum superest postquam hoc tibi in alia Epistola (c) satis descriptum. Illud potius a me fortasse expectas, ut quoniam vesiculæ, in ea historia descriptæ, intra unam maximam, quasi intra marsupium continebantur, Valsalvæ de iis judicium adversus complures tuear, quorum ab annis præsertim aliquot augeri numerum video, censentium, vesiculas cysticis tumoribus, qui in jecinore, aliisque visceribus interdum occurrunt, comprehensas, nullo modo ad amplificatos glandulosos folliculos attingere. Mihi vero neque placet, neque necesse est in eum relabi sermonem; quando Valsalvæ judicium non ea dumtaxat historia, nec quancumque vesicularum observatione nitetur. Videre etiam potes, ut Valsalvæ, qui pariter diu ante illos vesiculas, vesiculis aliis factas, conspexit, in eo ipso Scripto quod tunc indicavi, non vesiculas qualescunque pro glandulosos folliculos dilatatis accepit. Nec vero in cysticis dumtaxat jecoris tumoribus vesiculas Valsalvæ ostendit; namque in ea certe, quam tibi paulo antecomplevi, historia hepar totum ex vesiculis compactum deprehendit: quanquam ne in ipsis quidem cysticis ejusdem visceris tumoribus extra omnem dubitationem positum est, ad glandulosos folliculos nullo modo attingere posse conclusas vesiculas. Quid enim, si harum non dissimiles aliquando externi cystici tumores ostenderent? Num quia partes externæ sunt, idcirco glandulosi carent folliculis? Sed enim, ut dixi, his nolo iterum disputationibus immorari.

10. Præstat ut in ultima ex illis Valsalvæ historiis (d) id quoque attendamus quod in ea Malpighius diserte laudabat, bilarium videlicet ductum ingenti orificio cum abscessu hepatis communicantem, reliqua autem tota parte dilatatum, ut manifesto appareret quomodo vesiculas ex abscessu potuissent excipere, & in Duodenum intestinum traducere. Quo minus dubitandum est, quin sæpius per corrosos ramos sanguinem, & pus, ex hepatis vomice exceptum transvehat ad intestina, quemadmodum supra (e) commemoratum est, & bilarii ductus juxta ampliores, osculum vero per quod bilis in Duodenum influit, minimi digiti facile capax, evidenter confirmantur in quadam puella (f) quæ cum per alvum plures libras puris per vices excrevisset, pus in pluribus hepatis abscessibus, in iisque ductibus, & in illo intestino multum habuit. Quæ cum ita sint, reique consimilis manifestum, & crebrius in renibus habeatur exemplum, unde ureteres pus, & sanguinem transferunt ad vesicam; mirari subit, Doctissimos tamen Viros interdum usque adeo videri oblitos patentis illius ex hepate viæ, ut alii per venas mesentericas, quasi hæc non ab intestinis ad jecur, sed ab jecore ad intestina humores conveherent, purulentas diarrhæas sæpe fieri, atque ipsum corruptum hepate egeri, doceant; alii autem intelligere se posse, negent, quomodo illæso ventriculo sanguinem vomere, & deicere potuisset is in cuius singulis longe amplificati jecinoris lobis singula magna apostemata inventa fuisse, non ignorent. Verum ad eas quas necdum edidimus, Valsalvæ Observationes redeunt, duabus, quas supra descriptimus, ad

ad hepar attinentibus, totidem ad lienem spectantes addamus.

11. JUVENIS annorum circiter viginti, quod ex nativa corporis salubritate valetudinarius jam quasi alienio fieri cœpisset, causam rejiciebat cum in venationem, saltationem, aliaque ejusmodi quibus indulgeret plurimum, tum in proprium artificium; linumenim carminabat. Pallidus autem factus erat, & hypochondriacorum more, de levibus ventris, thoracisque affectionibus identidem querebatur. Tandem ætate A. 1688. magnus, durusque in sinistro hypochondrio se se prodidit tumor, cum ponderis sensu, difficilique inter ambulandum respiratione. His repente accessit largus sanguinis vomitus cum magna virium jactura, tumoris incremento, & febre. Remediorum ope primis diebus a vomitu, deinde etiam a febre liberatus, cum per 10. menses proximos chalybeatis usus esset, tumoris quoque durities sublata est: ejusdem tamen magnitudo persistit, cum pallido, & quasi citrino faciei colore. Januario autem mense bis terve redeunte sanguinis vomitu, in vehementem incidit febrem cum pulsu celeri, duro, ac parvo, utriusque hypochondrii dolore, pondere, tensione, sitique inextinguibili. Placidissimo tamen obitu sublatum est nono, an undecimo febris die.

CADAVERE dissecto, mirum fuit, quam medica in vas omnibus sanguinis portio superesset. Itaque Ventris viscera infuseto pallore, & quasi candore ad se oculos allaciebant, si splenem exciperes, qui naturalem servabat colorem; sed auctus adeo erat, ut hepar mole superaret, penderetque libras quatuor cum semisse. Nec erat æquo durior, nisi quod ad convexam faciem uno aut altero in loco solidiorem alte recondit substantiam majoris nuci magnitudine. In Splenica venæ trunco polyposæ concretiones latebant, quæ cum ejus venæ ramis perbelle se vel intra splenem dividebant. Hepar valde pallidum, rubris dumtaxat hic illic maculis distinguabatur. Felle vesicula hepate pallidior, atque adeo albicans, bilem continebat paucam coloris maxime diluti, cui similis in ventriculi fundo non deerat. Cætera in ventre sana.

In Thorace pulmones quæ anteriora spectabant, pallidi; quæ dorsum, ex atro purpurei, & inflammati apparuerunt: dissecti autem multum feri emiserunt spumosi. In dextero cordis ventriculo parva concretio polyposæ; in sinistro ejus tantummodo inchoamentum.

12. Permulta quidem ad historiam hanc possent adnotari. Sed brevitatis ratio habenda est, nec multa attingenda. Largus in hoc Juvene, nec semel iteratus, sanguinis vomitus faciles explicatus habuisset eo tempore quo per venam, vas breve dictam, ex liene aliquid mitti in ventriculum, non dubitabant. Sed posteaquam circumitio sanguinis, & experimenta aliter docuerunt, aliter quoque est res explicanda: ut puta, si dicamus, quanto minus sanguinis in obstructum splenem per coeliacam arteriam inferri potest, tanto plus per alios ejusdem arteriarum ramos ad ventriculum importari, aut sanguinis a ventriculo reditum per vas breve, impediri a tumido splene, vas illud inter se, & turgentem sæpe ventriculum valde premente; ut alterutra, aut utraque, aut alia aliqua, harum non abfimili ratione intelligi possit, sanguinem sibi ex vasculis nimis distentis exitum in ventriculi, ad id præsertim dispositi, cavum aperire. Nec tibi id forte oblatere videatur quod Juvenis hujus ventriculum sanum fuisse, indicetur; nam sanguinem per oscula plurima quidem, sed tenuissima, intra illum, laxioribus fortasse instructum fibris, fuisse effusum, putabis.

Quod si Veteres ipsos, aut qui illos sequebantur aliquandiu perrexerunt, dissectionesque inspicias ab ipsis habitas, & in Sepulchreto (g) collectas, eorum qui simul lienis vitio, & vomitu sanguinis laboraverant; nullam præter unam (h) invenies, quæ in ventriculo vas aliquod manifeste apertum ostendat. Scriptis illam Riolanus libro Anthropol. 2. ibi indicato, nec tamen cap. 15. sed 17. sub finem. Cui quidem rem, sed ut paulo ante explicabam, facile credam quod ad vas breve attinet ad minimi digiti crassitudinem dilatatum: credam etiam, si vis, deprehendisse in ventriculo idem vas adaperitum: quamquam ibi procliviorum esse video ad ea augenda quæ

suam istam confirmant sententiam. Mitto enim quod ex V. Epidemiorum libro ei quem sanguinis vomitus suffocaverat, cum refert ad splenem & dorsum multum sanguinem prodidisse, nihil addat de congrua horum verborum interpretatione, quasi mallet, de sanguinis intra ventrem exitu (quem perantiquus ejus libri Auctor, quippe tunc inusitata hominum anatome, vidisse non poterat) quasi hæc, inquam, sic mallet intelligi, quam de perrubris in cute maculis, ut Valsalvæ (i) explicat, ad lienis regionem, & infra apparentibus. Hoc igitur mitto. Sed mittere nequaquam possum quod in Cardinali Cibo, post eundem vomitum mortuo, notavisse, ait, Valerudam lib. sexto, capite quinto, videlicet compresso liene ventriculum repleri sanguine, qui per vas breve derivabatur. Neque enim Columbus, qui cadaver secuerat, quidquam de experimento illo attigit, ut qui non plura de ea sectione verba scripsit, quam quæ in Sepulchreto (k) leguntur: & Valerudus, qui attigit, iis verbis usus est, ut compresso liene, ventriculus interius, an exterius sanguine turgesceret, satis affequi non possis; quin Sanctorius, qui utrumque Auctorem inspexerat, sic intellexit, ut quod in Scholio videbis, ei Columbi Observationi subiecto, scripserit: dum comprimebatur splenis regio, ad orificium ventriculi sanguis resagnabatur. Sed & plures, cum post immanes, lethalesque cruenti humoris, aut sanguinis ipsius vomitus dissecti essent; nullum querentibus aperti, aut erosi vasis indicium in ventriculo ostenderunt; imo vas breve, etsi lien æquo esset longe major, nimis exile, & cujus radices ad ventriculi exteriores quidem, minus vero interiores tunicas pertinerent: cujusmodi Observationes poteris vel in Sepulchreto (l) invenire. Itaque sanguis aut ab intestinis, in quæ erupisset, deductus est, aut per vasa biliaria ex hepate, quod maluit Cel. Swietenius (m), cum in sic mortuo lustrans magna cum cura omnia ventris viscera, nec ullum vas ruptum, nec ullam insignem labem usquam potuit deprehendere. Et sane Præcl. quoque Budæi (n) extat Observatio, a me alias indicata, in femina, quæ materiam plurimam cum vomuisset instar sanguinis congrumati, & corrupti, quamvis ejusdemmodi materia vas breve plenum, & crassitudine digitum fere æquans haberet, ventriculi tamen substantiam sine ullis venis conspicuis exhibuit, vesiculam autem felle magnam, eademque materia turgidam; ut proclive sit intelligere, unde hæc in ventriculo, quæ multam etiam tum continebat, venisset. Quæ noli a me dicta credas, quasi nunquam e vase brevi, mutata ad tempus, præter naturam, sanguinis directione, posset hic in ventriculum irrumpere. Neque enim me fugit, post sanguinis vomitum quid in Matrona Georg. Wolffg. Wedelius (o), in Puella Jo. Dan. Dolæus (p), Stangio, & Hillero fociis, in Juvene autem Hofmannus (q) repertum scripserint: quarum ego Observationem ultimam alias tibi commemoravi, duas autem primas esse easdem censo quas apud Stahlum (r) meminisse legisse. In singulis iis cadaveribus lien aut æquo major, aut durior fuit: vas quoque breve aut crassius, aut sanguine ex parte turgidum, aut nigro saltem colore in ventriculi interioribus conspicuum, ibique ramis aut disruptis, aut eorum aliquo sic in ventriculum pervio, ut illuc stylum, aut statum, aut etiam sanguinem leviter compresso illo vase, admitteret. Etsi vero aliquis minime ignorans, quam non difficile per laxas in cadaveribus distentorum ramulorum tunicas aut stylus, aut impulsus status, humoresve viam quæ antea non pateret, sibi possint aperire, dubius forte hæreat in quapiam harum observationum, tamen per me eas tibi probare licet, dummodo memineris, paucas esse, si cum cæteris comparemus: nec facile cum Wedelio statgendum esse (s), frequentius vomitum cruentum oriri reſerato p. n. vase brevi. Nec quamvis responderet in omnibus quod in studioso Juvene animadvertit, tunc potissimum vomitum sanguinis redire, cum æger in dextrum cubat latus, ideoque decubitus, ut ipse jubebat, in sinistram esse necessarium, inde sequeretur, prorumpere sanguinem e vase brevi, quasi nulla alia præter ipsum vasa ad sinistram ventriculi attinerent partem. Verum siue istæ, siue aliæ tum manifeste in ventriculo pateant sanguinis viæ, siue quod plenum-

(r) Epist. 40. n. 28. (f) Obs. Anat. Med. 13. (s) Act. N. C. Tom. 5. Obs. 90. (u) n. 4.
(x) Comment. in Boerh. Aphor. §. 339. (y) 44. & 45. §. 7. (z) Eph. N. C. Dec. 3. A. 5. Obs. 23.
(b) n. 9. (c) XXI. n. 53. (d) n. 10. (e) n. 6. (f) Eph. N. C. Dec. 3. A. 4. Obs. 73.
(g) n. 8. 9. 10.

(g) l. 3. S. 8. Obs. 71. & seqq. (h) Obs. 73. (i) Comment. in eum loc. n. 37. (k) Obs. cit. 73. §. 2.
(l) in Addit. ad cit. Sect. 8. Obs. 11. & 13. (m) Comment. in Boerh. Aph. §. 950. (n) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obs. 105.
(o) Eandem. Dec. 1. A. 9. Obs. 20. (p) Eandem. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 257. (q) Medic. Rat. T. 4. P. 2. S. 1. c. 3. Obs. 2.
(r) Differt. de Vena Port. porta maior. S. 3. 222. (s) Obs. 10. cit.

rumque accidit, minime pateant; nam etiam in Petropolitanae Inlytae Academiae Commentariis (t) hominem leges repentina morte sublatum pleno omnino sanguinis concreti ventriculo, & hoc perfecta integritatis, cum in liene e contra putredinis nota deprehensa fuerint; five igitur manifesta sanguinis via in ventriculo pateant, five non pateant; tu semper ad aliquem ex iis qui a me, ab aliisve indicati sunt, modum, aut ad consimilem tum quas memoravi Observationes, tum illas quoque explicabis quae in Sectione hac Sepulchreti XVI. (u) occurrunt lienis non semel intumescens, sed post largissimum cruenti feri, aut sanguinis vomitu detumescens, quibus adjungere poteris quam ex paternis Scriptis edidit Jo. Mauric. Hoffmannus (x): quoniam ubi per diffusionem quod viscus aegrum, aut quod sanum sit, pro certo non constet, ea potest culpa immerito in lienem conferri, quae in proximam aliam partem, ipsumque ventriculum sit rejicienda.

13. Quære hic potes, cur igitur in proposito Juvene, ejus lien culpa procul dubio non carebat, non modo hoc viscus a largo sanguinis vomitu haud detumescit, sed & increverit? Nimirum ad laxi visceris jam nimis infirmatum robur cum accessisset a magna sanguinis profusione virum universi corporis summa jactura; ægrius potuit per illud traduci & promoveri sanguis, præsertim ab ea profusione interior factus; itaque magis resistere in eo viscere coactus est, ipsumque magis magisque laxare. Multo autem mirabilis videri potest, quomodo cum rediit novissime bis terve sanguinis vomitus, consequi poterit febris illa vehemens, iisque signis stipata quæ inflammationem aliquam in hypochondriis (cujus indicia fortasse rubrae maculae fuerunt, hepar hic illic distinguentes) significare videbantur. Sanguis enim reliquus in vasis omnibus, copia erat adeo modica, inertia autem ejusmodi, ut ex dissectione intelligi licuit. Nam paucitatem, præter rem ipsam, pallor quoque viscerum, & qualicandor indicabat, idemque inertiam simul, præsertim cum paucibile, & coloris maxime diluti conjunctus. In cachecticis quidem sæpe cerebri corticem valde pallidum, medullam autem solito candidiorem animadverti, quippe sanguiferis vasculis tum quæ plurima ad illum pertinent, tum quæ rariora per hanc trajiciuntur, aliis manibus, aliis semipellucidis; eoque nihil ferme officientibus etiam exterius inquirenti sedes unde ex medullæ trunco nervorum radiculæ egrediuntur, ut ad res hæc facilius spectandas, aut ostendendas, interdum ejusmodi cerebra præoptaverim. Attamen ipsa bilis paucitas, ipseque adeo dilutus color an aciores particulas in sanguine retineri, significarent, existimare tu poteris. Ego interim quæram, quid illud esset, vel potius quid non esset quod lien istius Juvenis ad convexam faciem uno aut altero in loco alie reconderebatur solidioris substantiæ, majoris nunc magnitudine.

14. Habes in altera de duabus quas initio nominavi, Sepulchreti Sectionibus, id est in XVII. Observationem (y) lienis *stomatæ* recondentis, *adiposa materia confans* nunc magnitudine. Habes in Sectione eadem Observationes complures lienis ex parte cartilaginei, aut ossi facti, aut etiam, ut Pechlinus (z) asseverat, lapidosi, ad quas adjungere alias poteris tum ex præcedente Sectione (a) tum ex I. superioris libri (b). Sed ego quod in hoc Juvene deprehendit Valsalva, neutrius generis fuisse, credo; per facile enim utrumque fuisse cognitu: nec certe ipse cum in Anu de qua ad te scripsi Epistola XX. (c) intra extimam lienis partem os invenit, affirmare dubitavit, se corpus quoddam osseum figura sphaerica reperisse. Igitur aut alterius cujusdam generis fuisse, putaverim, aut si illorum quæ diximus, alterutrius; secundi potius, id est ossi, lapidive inchoamentum, quam primi. Est enim illud multo in liene frequentius, ut non solum tot in Sepulchreto indicatæ Observationes ostendunt, sed & alia passim apud Anatomes Scriptores facile reperiendæ confirmant. Itaque ex nostris quoque non paucissimas in Epistolis, alias aut missis (d), aut mittendis, invenies. Non illud quidem negave-

rim, id sæpius in senibus, quam in juvenibus, animadverti, itemque in tunica potius, quam intra hanc. In tunica enim, aut certe exterius post primos illos, Andernacum (e), Valsalvum (f), Columbium (g) id plerique adnotare perrexerunt. Tamen & in juvenibus hoc aliquando conspectum est, ut a Cl. Fantono, (h), & a me ipso (i): neque Observationes desunt quæ ostendant intra tunicam quoque. Carolus enim Stephanus (k) olim admonuit, lienem ob id etiam esse alte incidendum, ut siqui sint in ejus substantia calculi (ut nonnunquam reperti sunt) videamus: & tu hic leges in Sepulchreto (l), inventum in splene formosæ foeminae, & hujus juvenis, lapidem castaneæ magnitudinis: Sectione autem XVIII. (m) lienem supra modum magnum lapidibus plenum albisimis; in alio (n) multos continentem calculos; ut ceteros, & in his binos satis grandes, pluribusque aliis sociatos, quos commemorat Lentilius (o), omittam: & ipse alias describam tibi in quo ab ossa lienis tunica osseum corpus introrsum pertinetis deprehenderim, quo & illud pertinuisset crediderim quod a Valsalva in anu visum paulo antea dicebam. Quid? quod non membranarum solum exteriorum, ut quidam scribunt, sed totum senis cujusdam lienem lapideum factum Regiæ Scientiarum Academia ostendit Litterius (p): nosque hic in Gymnasii Museo alterum habemus, ante hujus initium sæculi ex cadavere depromptum quod publice in eodem Gymnasio discubatur.

15. Quem lienem cum hæcenus descripsisset nemo; haud tibi ingratum fore spero, si id ipse præstet qui, annuente Musæi Præfecto Cl. Vallisnerio, filio, diligenter quo ad ejus fieri exterius licuit, examinavi. Longus est septem transversos digitos, latus, quæ est latissimus, quatuor, ad alterum autem extremum plus duobus; nam altero in angulum desinit: crassus uno in loco ut minimus digitus, alibi dimidio minus, pluribus autem in locis, ad oras præsertim, multo tenuior. Figura est abnormi; & curvus secundum longitudinem: superficie inæquali & tuberosa, magis tamen in cava facie, quam in convexa. Circum oras ferme undique exsiccatæ restant membranæ tunicae reliquæ: hæc illinc in faciem utramque pergunt, sed manifestus in cavam, quæ membrana adhuc evidenter convellita est, ideoque flavo colore apparet, sed valde fusco; at convexa ex flavo albicat, si quædam excipias loca in quibus non secus atque in cava, membrana superest. Veri autem simile est, cum ab diaphragmate ad quod archius adhæret, lienem avellerent, ita a convexa hujus facie membranam divulsisse, ut ad illud pene tota affixa restaret, nonnullisque ex locis etiam tota, simulque, cum ea ibi coherentes, lamellæ indurati lienis; unde hiatus quidam oblongi, & foramina orta sunt, quorum in cava facie vix ullum est, ut nullum profus eorum per quæ olim subibant vasa, locorum indicium. Per eos hiatus si introspicias; non solidum ubique esse hunc lienem, intelligis, imo cavernosum, & inanem multis in partibus esse, vides; ut mirum non sit, decem, haud amplius, drachmas pendere: quamvis lapis ille quem paulo ante (q) memorabam in splene inventum, castaneæ magnitudine, pondere esset unciarum duarum & semis & drachmæ unius. Is enim laminis, ovorum putaminibus involutus, similibus concretum erat, ut inania minime interjicerentur, spatia, sicut in liene hoc Patavino, & fortasse etiam in Parisiensi illo, cujus pondus uncia unius & semis fuisse, scimus, dimensionem autem ignoramus. Idem quo in homine repertus sit, nempe morbis qui ad lienem referrentur, non obnoxio, & quæ ex substantia constare videretur, lapidea videlicet, notum est. De nostro autem hoc dubium; illud vero, quantum accepi ab eo qui dissectioni interfuerat, Decefforis mei filio, longe aliter se habuit. Cadaver enim erat bajuli necdum senis, quem diri atque insanabiles in regione splenis dolore non solum debilitaverant, sed etiam in hoc, ubi mortuus est, Nosocomio cubare coegerant. Quod autem ad lienis hujus substantiam attinet, tamen Vallisnerius pater, cui novissime donatus fuerat, sua manu hæc inscripsit *Milæa ossifera d' uomo*, & quædam particulæ, in facie cava extantes, videntur ossæ; tamen ubi alteram faciem inspicies,

ties, facile males, ut quo verbo sæpe in bovīs cerebro lapideo credito (r) usus est, eodem hic quoque esset usus, & osseo-lapideum inscripsisset, facturus, ut opinor, si potuisset quantum in illo opere, & temporis, tantum in hoc quoque collocare. Expeditius autem esse potuit Lanzoni (s) iudicium, qui in Fabro ferrario annos nato quinquaginta quinque, natura melancholico, & pravæ quartana febre mortuo, cum inter alia durum adeo lienem offensus, ut cultro non cederet, sed malleolo percussus, in tres divisas partes, uti saxum, frangeretur; non dubitavit quin petrefactum pronunciarer.

16. Equidem sæpe antea inspectavi, & nunc maxime, hæc ad te scribens, membranarum inspecto quatuor transversos digitos longam, duos latam, a convexa humani lienis facie, me præsertim, jubenteque detractam. Conversa illa pene tota videtur in planas, & tenues bracteas, quas five ab externa, five ab interna facie contemplaris, osses omnino & sine ulla dubitatione, statim agnoscas. Sed inter illas, & in parte ex illis, tubercula excreverunt parvula exterius; interius autem majora incumbunt, superficie inæquali, & granosa, quæ intra lienis substantiam ad semidigiti altitudinem se immittebant: hæcque excreverant quædam videtur quasi ex effuso succo, medio inter ossæm & calculosam naturam, concreto. Cujus ambigui generis magna ex parte ea mihi videtur substantia, unde lien, ex Gymnasii Museo descriptus, induruit. Quem examinans, didici, aliquando fortasse, certe non semper, id esse verum, quod ex ea quam modo dicebam, membrana, ex aliisque conieceram, videlicet splenis conversionem in ossæm lapideamve naturam in tunica incipere, & in hujus quidem ut plurimum illa parte quæ convexam, ideoque alternæ diaphragmatis pressioni obnoxiam, investit. In ea enim parte, quotiescunque id mihi videre accidit, vidi, videnturque alii, quicunque fere certam quandam in qua id deprehenderint, tunica ejus partem designarunt; rarum enim est quod in opposita sede Pechlinus (t) invenerit: illucque referendum credebam Boschi monitum, in Sepulchreto quoque (u) productum, de superiore tunica lienis, versus abdominis musculos vergente, ita dura reddita, ut scirrhus intra lienis substantiam falso esse videatur: ut tu quoque eodem referendum facile credes quod in nobili Sene adnotavit Præstantiss. Plancus (x) videlicet in membrana Lienis qua ad peritonæum arte adhaerebat, ossificationem, aut quod alii (y) in femina trium & triginta annorum, dimidiam externæ superficiei ejusdem visceris portionem penitus in cartilagineam versam. Nam quod ejusdemmodi conversionis initium, nempe in dorso lienis, ejusque media superficiei, oblique transversim, albam, tendinosam, & durissimam substantiam Solertissimus deprehendit Weiffius (z), aut quod vetus Anonymus apud Cl. Taranturum duritiem lienis, ut ea pars ossæ, ad minus cartilaginea, sed durissima, videretur, illic quo dicebam, attinuisse, minus, ut puto, dubitabis. Ex illa igitur parte tunica quæ convexam lienis faciem operit, vitium deinde in reliquam tunicam propagari, conjiciebam, & sic denique splenem universum complexi, quemadmodum Bauhinus (b) reperit, & si recte intelligo, Columbus (c) pariter, ique præterea qui hic in Sepulchreto Observatione XVI. indicantur. Tum vero magis magisque excreverant undique introrsum ex tunica duram illam materiam, totam visceris substantiam comprimere, delere, ejusque locum occupare. Quod ut interdum, sicuti dicebam, fortasse accidat; profecto in descripto a me (d) splene non accidit, quando ejus tunica quidquid superest; magna autem pars superest: non modo osseum, aut lapideum non est; sed ejusmodi etiam nunc est, ut exterius humectatum; id quod non uno loco expertus sum; non secus ac resiccatae membranæ solent, ipsum quidem dumtaxat non ita multo post remollefecit. Sed hæcenus hæc, Nunc ad alteram Valsalvæ Observationem ex iis quæ ad lienem attinent, transeamus.

17. MULIER duodeviginti annos nata, gracilis, nupta quidem, sed infæcunda, chronica olim febre vexata, quæ splenis molem auctam adeo reliquerat, ut

tumor sub tactum manifesto caderet, subpallidum servabat colorem, & febre interdum, cum rigore invadente, ad dies aliquot tenebatur. Cum ante biennium sanguis menstruus fluere desiisset; mox cutaneo, sed contumaci, ulcere sinistri cruris laboravit: cujus ad ulceris latius intumescens postea crure, abscessus est factus. Hic etiam abunde expurgatus ad cicatricem accedere videretur; tamen cum tempus instabat quo sanguis ex utero effluere debuisset, exacerbabatur, augebatur, & feroci ichoris multo plus emittebat, ac vicissim quo longius ab eo tempore dies procedebant, eo minus. His igitur ipsis diebus cum pridie non modo paucus, sed & graveolens, ichor prodiret, neque ulla præterea nova imminens fati accessissent indicia; ecce diluculo in lecto fedecorogitur, de præcordiorum angustia, & de summa pectoris anxietate, se huc illuc versans, sic queritur, ut aliquando verbum proferre vix possit, multam spumofam, & sanguine tinctam materiam expuit: atque ita intra horam moritur. VENTRIS cavum a sinistris ferme totum lien implebat, mole, in longitudinem præsertim, auctus, ut libras octo cum semisse penderet. Interiora visceris ab naturali constitutione discrepare non videbantur: exterius amplificata vasa tum sanguifera, tum lymphatica apparebant, ut hæc passim per lienis tunicam pulchro spectaculo se proderent. Spermatice vasa violacei coloris sanguinem continebant; ut ibi diutius remoratum esse, intelligeres. Testes pene toti scirrholi erant; ne quis infœcundam fuisse juvenem mulierem, miraretur. Nulla inerat vesicula, si unam in sinistro excipias, quæ, dimidiatam avellanam æquabat. Hæc testis substantiæ tenaciter adhærens, & sanguiferis distincta vasculis, non limpidum, sed subfuscum continebat humorem: quo effuso, corpus in conspectum venit lutei coloris, lentis magnitudine, & quasi forma, sed vesiculæ intus adnatum, ut vix promineret: ipsum aggeris instar minimi quidam cingebant globuli. Erant etiam alia in eodem teste, eodemque colore quædam corpora, sed neque ea figura, neque eo aggere prædita. Quod ad Thoracem attinet, sana erant omnia, nisi quod pulmones rubore suffusi, multam, cum secarentur, materiam emittebant ejusdemmodi, qualem novissime expuisset mulierem, scripsimus.

18. De sterilitate a vitio ovariorum, & de suffocatione a pravis humoribus, repente in pulmones incumben-
tibus, non est hic scribendi locus: ut neque de nuptis, nec prolem edentibus feminis, magno tandem cuidam morbo sæpius obnoxio, neque de mulierum quibusdam abscessibus ad cicatricem spectantibus, & ad hanc tamen, nec raro, difficile perducendis propterea quod redeunte eo tempore quo illæ per uterum purgari solent, abscessus jam propemodum percurati, humorum turgentia, & motu in corpus universum, & præsertim in partes infirmiores nitentibus, importune recrudescunt, id quod in crure nobilissimæ in primis Matronæ pluribus continenter mensibus accidisse, meminimus. Ad alia igitur hujus loci magis propria transeuntibus febres occurrunt diuturnæ, quæ magnos lienes relinquunt, & crurum ulcera, quæ magnos lienes consequuntur. Et cum his sane ulcera illa conjuncta quædam etiam ex nostris ad te missis Litteris (e) ostenderunt. Sed ab antiquissimis usque temporibus idem fuisse adnotatum, locus docet libri II. Prorrheticorum (f): quem cave legas, ut hic (g) in Sepulchreto productus est in Scholio ad Observationem XVI. quibus splenes magnos habentibus sanguis prorumpit, nec os olet, horum vitiis præterea ulcera habent; in græco enim autographo scriptum est *ultra diaphragma ruptum*, id est neque sanguinis eruptiones contingunt, ut fidelius alii converterunt: itaque ad feminam istam cui sanguis per uterum non erumpebat, accommodari quadatenus sententia hæc poterit. In eandemque, ut gracilem, id quoque conveniret quod in eodem Scholio ex Spigelii observatione continuo subjicitur, *macilentos facilius, quam pingues, in tumidos lienes incidere*. Quod vero hi tumores diuturnas febres consequantur, non una ad te nostra ostendit Epistola (h), nec una in Sectione hac Sepulchreti Observatione (i) commonstrat. Quibus adde sis Christiani Väteri (k) Observationem in Studio quo febribus intermittentibus diutius confectus, lienem exhibuit auctum ad humani capitis magnitudinem, & quod adnotatum est ab

Egre-

(t) Tom. I. (u) in Schol. ad Obs. 13. & 14. (x) Eph. N. C. Cent. 9. & 10. in Append. n. 1. Obs. 6. (y) 17. (z) in Addit. Obs. 1. & Schol. (b) in Addit. Obs. 31. & Schol. (c) n. 41. (d) Eph. 7. n. 9. & 11. Eph. 10. n. 19. Eph. 24. n. 18. (e) apud Bauhin. Theatr. Anat. I. 1. c. 43. in addnot. (f) De Fabr. hum. corp. l. 3. c. 9. (g) De Re Anat. l. 15. (h) De Obs. Med. Anat. Epist. 8. n. 10. (i) De Dissect. part. corp. hum. l. 2. c. 40. ubi de Lienæ. (j) Sect. 16. Obs. 20. (m) Obs. 22. (n) Obs. 25. §. 9. (o) Eph. N. C. Dec. 2. A. 7. Obs. 33. (p) Hist. de l'Acad. R. des Sc. 1700. Observ. Anat. 7. (q) n. 14.

(r) Consideraz. int. al. creduto cervello di bus impietr. (s) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 7. (t) Obs. cit. supra ad n. 14. (u) Sect. hac 17. Obs. 25. (v) Eph. de Monstris. (w) in Commenc. litter. A. 1734. Hebd. 29. (x) & A. 1740. Hebd. 35. (y) Prima Raccolta di Osservaz. Med. (z) (b) locus supra indicatus ad n. 14. (d) n. 15. (e) Eph. 4. n. 30. Eph. 12. n. 2. (f) n. 42. (g) Sect. 16. (h) Eph. 16. n. 6. Eph. 20. n. 2. 30. 31. Eph. 31. n. 2. (i) u. 13. 17. (k) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 165.

Egregio Anatomæ Professore Weiffio (1), quotiescunque cadavera secando, in prægrandes lienes incidit, fere semper comperisse, eos homines laborasse aliquando febre graviore, eaque vel intermittente vel synocha continua: ut hic omittamus quæ de scirrhis, & quæ de infarctu lienis post intermittentes chronicas febres, & quartanam præsertim, ex Viris Cl. Hoyer, & Kramero alias (m) memoravimus, quorum observata utinam ne apud nos quoque crebris ejusmodi febrium, sed male curatarum, confirmarentur exemplis. Quæ a præcis etiam Medicis fuisse animadverta, Hippocratis, vel potius Polybi hæc verba testimonio sunt (n): *Morbus, id est splenis tumor, fit, cum ex febribus, & mala curatione, bilis, aut pituita, aut ambo in splenem incubuerint. Laxum enim per se viscus, & cellulofum, & ex quo lentus est sanguinis reductus, quippe hepar antea quam venam Cavam subeat, trajectur, maxime opportunum est tumoribus, præsertim si diuturno morbo exiguis ejus viribus infirmatis, sanguine autem inerti facto, quædam in hoc relicta sint quæ aut corrigi, aut extra corpus ejici debuissent. Sanguis enim motus sanguinis ob has causas adaucta, dum is, quasi limosa aqua extra alveum, in lienis cellulas divergit, in iis, si quid habet graviorum quam natura ferat, corpusculorum, deponit, sicque reductum sibi ex parte obstruendo, magis ipsas, magisque distendit. Quarum distensione quanto magis totus lien distenditur, tanto infirmior fit, magisque propterea obnoxius iis quæ deinceps influunt, magna ex parte retinendis. Itaque incredibile aliquando in modum excrevit, ut vel olim Ætius in inguina contingere in quibusdam, scripserit, sicut in Scholio leges paulo ante designato, nisi quod cum id scripserit dicatur lib. 7. ipse vero contractæ ex Veteribus Medicinæ libros confecerit omnino quatuor, singulos in quaternos Sermones divisos, illud tibi inquirendum est Tetrabibl. 3. Serm. 2. cap. 16. Hic autem, & gravior ille in Prorrheticorum sententia error, dum verba Diemerbroeckii deferuntur, nec laudati ab eo Auctores inspicuntur, in Sepulchreum traductus est. Interjecit is postea (o) ut opinor, exempla maximorum lienum, in eo subsistens qui pendebat libras viginti tres. Verum Bosius (p), si recte quidem ipsum intelligo, a parente suo inventum scripserat, qui pendebat libras viginti & tres. Inter recentiores autem quam illæ sunt Observationes etiam legisse non memini quæ lienis pondus proponerent ad illud accedens; tamen haud contemnenda sunt quæ ex Henrico Alb. Nicolai (q), anteaque ex Mauricio Hoffmanno (r) editæ fuerunt. Hic enim pondere librarum quindecim, ille vero selibra insuper graviores splenem invennerunt, uterque ita, ut diaphragma in sinistro latere ad costas superiores compelleret, Henricus autem ut simul ad regionem utque illicam propenderet. Sed in infante Preussius (s) a sinistro hypochondrio per univerrum illud latus ad pubem usque magnitudine sua extensum vidit; vel longius autem Vercellonus (t), ad imum nempe abdomen usque protensum, ut cum ulterius progredi non posset, sursum se reflectere, & pone uterum, in massam pugno æqualem terminaretur. Non eo quidem se extendebat quem reperit Jo. David Mauchartus (u) in coniformam mutatam; magnus erat tamen, ut qui basi diaphragmati annexa virile caput non mediocre æquabat: pondere quoque non superabat libras quatuor cum uncis totidem; sed id continebat quod Observationem hanc rarissimam facit, nimirum tantum aquæ intra tunica quamdam, hydatidis instar, opinor, quæ ejus visceris interiora omnia occupasset, ut Mauchartus lienis hydroperem vocare hunc affectum non dubitaverit; aquæ enim eruperunt libras quatuor. Sic empyematis latorem significationem spectans, poteris lienis empyema dicere ab Antonio de Haen (x) repertum, cum id viscus, quod inflammatione sua pleuritidem antea mentitum fuerat, pure albo, crasso, copioso plenum deprehendit.*

19. Nunc priusquam a Valsalva Observationibus ad alias transeam, nolo quandam ex ipso omittere, unde intelligas, quæ interdum viscera præter ea quæ in hypochondriis sunt, possint ibi summas, atque adeo lethiferas molestias creare, præsertim si ad illorum, quantumvis leves ad speciem, læsiones convulsio accedat, quam in Observatione hac non dubito accessisse.

20. VIRGO corripitur ingenti vomitu, & febre. Il-

le sedatur; hæc remanet. Vehemens sub nothiis sinistris costis accedit dolor, a quo intra biduum interficitur. IN VENTRE serum limpidissimum inventum est. Ventriculus, & intestina ab incluso aere valde turgibant. Ren uterque naturali triplo major: sinister vero inter propriam membranam, & huic subjunctam substantiam paululum saniosæ materiæ continebat, ab ea præsertim parte qua lienem spectabat. In Thoracis cavo aquæ paucillum. Pulmones sani, nisi quod nigris maculis, sed paucissimis, distinguebantur. Pericardium erat fero plenum, E cordis ventriculis fluidior sanguis effluxit: erat tamen in dextero polyposa concretionis inchoamentum.

21. Renis sinistri aucta moles, & vitium non semel in ejusdem lateris hypochondrio tumorem, doloreve excitavit. Docent id aliquot historię in Sepulchreti has duas Sectiones relata, ut in XVI. illa quæ §. 2. exhibetur Observationis XXII. & in XVII. Sectione duæ quæ §. 9. leguntur Observationis XXX. ubi hæc ait Ballonius: *non credebant, dolorem esse nephriticum; & tamen erat. At situs doloris, & partis decipiebat.* A dextris etiam id posse nonnunquam accidere, historia indicat quæ primo loco proponitur in eadem Observatione XXX. Sed quæ ultima in hac legitur, idem posse fieri, ostendit, non a subjectis modo, ut renes sunt, sed a superioribus etiam partibus, ut puta a septo transverso, puris copia prægravato, & deorsum compulso; sic enim potius quam per consensum quandam & cognitionem historiam illam explicandam esse, conjicio, quemadmodum ab eodem septo, vi aquæ, aut crassioris feri depresso, tibi alias (y) monstravi duritiem, aut dolorem in superioribus ventris regionibus creatum esse. Nunc autem ne ab renibus, aliisve quæ hypochondriis subjunctæ sunt, partibus recedamus; huc tibi addendam censemus Cl. Bonfiglii (z) Observationem, quam si attente legas; facile intelliges, inveteratum, qui olim in hypochondrio dextero percipiebatur, tumorem nil aliud fuisse quam renem qui magis magisque augetur, do, e sua demum sede in illicam regionem procedit, ubi quintuplo naturali major repertus est. Quod vero ad alias attinet Partes, Cl. Gækelius (a) ostendit, ab omento scirrhusa pinguedine aucto lienem totum sic involutum fuisse, ut propterea in viventis hypochondrio sinistro is tumor, eaque resistentia fuerit, ut lienis scirrhusa exacte mentiretur. Schroockius autem (b), Hurterus (c), Cerbezius (d) in altero hypochondrio adnotarunt tumorem, & dolorem ab scirrhuso qui intestinis Ileo, & Colo arctissime adhaerebat, aut a Colo ipso in eam molem elato, ut vi facta in jecinoris ligamenta, hoc a sua sede sinistram versus hypochondrium compulerit, vel dolorem dumtaxat, qui eidem jecinori falso imputabatur, cum a mesenterio esset, quod erat mox sub eo viscere exesum ferme ad palmæ latitudinem. Sed ad proprias viscera quæ in hypochondriis sunt, noxas revertamur.

22. Quoniam vero tibi multo sæpius Observationes descripsi tumens aut hepatis, aut lienis; idcirco ad eas quas hactenus ex Valsalva protuli, hic paucas ad scribere satis erit, tumoribus visceris utriusque communes.

23. LANARIUS, quadraginta circiter annorum, venerat in Nosocomium Patavinum propter hypochondrium, ut ipse dicebat, obstructions. Vera dicere, cum malus faciei color, & infirma totum jam annum valetudo, & febricula qua sæpe tentatus fuerat, nec eo ipso carebat tempore, indicabant, tum præsertim admota hypochondrio utrique manus, dextero potissimum, confirmabat. Cum ibi jam remedium ope aliquid proficisse videretur; ecce acutaprehenditur febre, signis stipata internæ thoracis inflammationis, eaque intra decem, an duodecim dies conficitur. CADAVER, unde Anatomem inchoarem A. 1746. in Gymnasium illatum est: quod inspiciens, candidum, neque omnino macilentum, neque tumidis pedibus esse, vidi.

Abdominis musculi cum vix biduo post mortem secarentur, idque Januario mense, laxi erant, imaque parte ad colorem subviridem inclinabant. Tamen quæ Ventre continebantur, secundum naturam se habebant; si hæc exciperes. Jecur amplum præter modum; ut ejus nimia magnitudo in omnium oculis

los statim incurreret, & quamvis non malo exterius colore; interius tamen ex subpallido fulcum, totumque præterea five intus, five extra, attentis oculis inspectares, fuscis quibusdam punctis distinctum, & durius, quam soleat, quod & digitis, & cultro, dum multifariam secundum omnes plagas inciderem, animadverti. Id dum facerem, illud quoque adnotavi, nusquam cum ullis venarum sectionibus punctum aliquid flavum apparuisse, quod nimirum indicio esse solet ramulorum, quos simul transversos incideris, hepatici ductus, five illi ob parciorem in hepate hoc bilis secretionem in se quandantenus conciderent, five potius quod hæc palidior, & minus apta ad tingendum esset: & sane in cysti, pro mole hepatis, parva, & exili, pauca erat bilis, & colore quasi ad cinereum vergente.

Lien duplo major fuit quam solet, secundum omnes dimensiones; cætera, quantum judicare potui, non improbandus. Splenica arteria ab origine ad finem, contra ac videre consuevimus, nihil usquam tortuosi habens, nihil, ut sic dicam, varicosi, uno haud amplius, excepto loco circa longitudinis medium in quo vix nonnihil inflectebatur. In mesaræo durum corpus increverat mediocriter cerasi magnitudine, & pene figura, sed inæquali, & granosa facie, natura inter osseam, & lapideam media: cujus alterum latus arteriosum, venosusque ramus arcte in transitu perstringebant; non subibat; inde ad intestina pergentes, quæ duobus circiter ab eo corpore distabant digitis. Ileum appendicem, seu mavis diverticulum illud habuit, quod cum Epistola XXXIV. (e) descripserim, hic satis fuerit memorasse. Præstat adnotare alia quæ in hujus hominis ventre conspexi. Vena Iliaca Exterior sinistra prope Interioris confluxum dura erat, nec tamen ossæ, quippe tunica ibi ad brevem tractum crassioribus dumtaxat factis: quibus apertis, extare vidi in venæ cavo ab uno latere qua nullis oculis erat pertusa, chordulas, & quassam minores quasi valvas. Sed longe magis attendendum est; quamvis fuit præter consuetudinem potius, quam præter naturam; quod in renibus vidi, & eorum arteriis. Longi illi erant ad novem circiter digitos; sed pro hac tanta longitudine angusti, nisi quod paulo erant in superiore extremo latiores. Insolita quoque erat Sinuum longitudo, vasa excipientium, & emittentium, eoque facilius animadvertenda, quod tota ea pars deerat substantiæ renum quæ anteriorem Sinuum parietem faceret: itaque majores ex iis ramis qui lotium in pelvim convehunt, toti patebant, patebantque sanguifera vasa omni ea parte quæ intra Sinus condi solet. Sed cum ad renes singulos binæ, id est superior, & inferior pertinerent arteriæ, & totidem venæ; hæc quidem e Sinibus ita exibant, ut in superiore transverfam venam oblique ascenderet inferior. Arteria vero neque jungebatur inter se, & tam inferior, quam superior, siue obliquitate in transversum ferebantur, itaque inferior non Sinum petebat, sed infra Sinum, infimum propemodum renis latus. Ex his intelligis, inferiorem utramque arteriam multo inferius quam renem arteriæ soleant, oriri debuisse: & sane ex Aorta vix pollicis intervallo supra divisionem in Iliacas, oriebantur. & quod fortasse multo rarius est, non ex Aorta lateribus, sed ex ipsa media anteriore ejus facie, ita propinqua inter se, ut earum officia vix septo tenuissimo separarentur. Inde protectæ, utrinque similes, & æquales, in nulloque ante inflectionem divites ramos, eo quo dixi, inferebantur; cum superiores arteriæ, aliquanto, sed non multo, his crassiores, neque origine, neque ramis ab iis discrepant quas ut plurimum videre soliti sumus. Cætera, melius cadaver interea nacti, pari diligentia persequi non potuimus. Itaque Caput non attigimus.

In Thorace demum pulmonem dexterum annexum pleuræ, durumque deprehendimus: in pericardio cruentam aquam ad aliquot cochlearia: in corde venas duas quæ per faciem ejus posteriolem secundum longitudinem decurrebant, sanguine turgidas, & quasi varicolas.

24. Sepositis quæ ad præsens institutum non attinent, si ea dumtaxat, quæ ad tumorem lienem spectant, & ad tumens, obstruendumque jecur, attendamus; lienis arteria, si forte a primordiis sine flexibus non fuit, videri alicui poterit hos amississe, dum impedito in durum jecur arteriosi sanguinis cursu, major hujus copia in Splenicam illam arteriam influere coacta est. Quantum au-

tem, obstructio jecinore, arteriosi intra ipsum ramuli comprimantur, minusque sanguinis admittant, cum ratio indicat, tum evidens observatio nonnunquam ostendit. Confirmavit enim mihi Cl. Vir Jo. Baptista Vulpius, bis sibi accidisse, ut hepate obstructo, arteriæ Hepaticæ truncum dilatatum adeo inveniret, ut in eum posset immittere digitum pollicem. Cæterum sic affecto jecinore, quam facile res ad cachexiam spectet; in proposito homine, præter alia, pauca illa, & decolor bilis non obscure commonstravit. Quod si gravius vitium hepar occupet; sæpius non ad cachexiam modo, verum etiam ad hydropem gradum fieri, frequentissimæ docent Observationes. Quas inter vel propter reperta in scirrhuso hepate, vel propter ejus pondus, dignæ sunt lectu, a Cl. Rostio (f), & Usenbenzio (g) propolita. His potes eam quoque addere quam continuo subijciam.

25. BAJULUS consilientis, ut videbatur, ætatis, nullo unquam tentatus morbo, dum gravius attollit onus, illico non levem ad lumbos molestiam sentit, quæ tunc biduum cubare cogit, in reliquum autem tempus ita debilitat, ut ne viginti quidem librarum pondas sine lumborum incommodo jam possit tollere. Mense interjecto, sibi visus est, dum in lectulo se converteret, aquæ in ventre agitationem audire, mox quoddam quasi corpus percipere quod ex hypogastrio in scrobiculum, ut appellant, cordis ascendens, ibique subsistens, initium faceret tumoris præduri, nec modici; quo simul & febricula afflicta, quinto jam mense ex quo grave illud onus sustulerat, in Nosocomium hoc venit, & ea quæ dixi, narravit omnia. Id erat certum, assiduum tunc esse febriculam, & noctu exacerbari, tumorem esse in scrobiculo illo, & infra imas costas quoque, præsertim dexteram, & in ventre esse aquam effusam. Crevit hæc interea; ut cum mihi forte occasio esset in Nosocomium ascendendi, uno exacto circiter mense ex quo ibi decumberebat, & rogatus, ventrem hominis contrectarem; vix alibi quam in scrobiculo, tumorem perciperem, abdomine videlicet aqua distento. Erat is tumor prædurus, nonnihil inæqualis, & si vel premeres, doloris expertus. Quævisi, num pondere molestus esset? num dolore aliquo, ad jugulum usque producto? num tussis aliquando vexaret. Dilecte negavit hæc omnia. Cum autem quererem, an tumorem increveret tumor? imo, ait, subsedit, minorque est factus; credo, quod cretens aqua obscuraret: & sane qui alias tetigerant, minorem esse factum, non agnoscebant. Subpallida erat hominis facies; non flava, non lurida: ne album quidem oculorum, a me peratente inspectum, ullo modo flavescerebat. Supinus plerumque cubabat: quanquam poterat in utrum liberet latus. Si tiebat quidem; sed non valde. Spiritumque ducebat incommode; nec tamen incommodissime. Quibus eo diligentius adnotatis, quod hominem haud longo post tempore interiturum, & rimandi viscera copiam nobis factum iri, prospiciebam, incerto ex parte suspensioque de universa tumoris sede judicio, discessi. Ille vero exilescentibus demum pulsibus, sana usque ad extremum mente, & loquens, placide obiit initio Aprilis A. 1745. decimo quarto postquam videram, die. CADAVER autem cum posttridie secaretur; graviore negotio impeditus, adesse non potui. Pro me tamen dissectioni præfuit Mediciavivæ noster: a quo hæc accepi eodem die. Corpus macilentum, & nusquam, nisi leviter ad scrotum, multo autem levius ad pedes, oedemate affectum. Venter multam effusam aquam habuit, non graveolentem, non crassam, non a quibusdam quasi membranulis innatantibus turbidam, sed pellucidam, vergentem tamen ad eum colorem quem in oleo amygdalino videmus. Omentum, retractum in hypochondrium sinistram, integrum quidem fuit, sed ex subviridi fuscum. Ventriculus parvus, & contractus. Lien duplo major, quam equum esset, subalbus exterius, intus alba quædam habens, nec tamen dura. Hepar autem longe maximum; ut eorum qui aderant, aliqui libras pendere ad quatuordecim, judicaverint. Certe, etsi non multum infra costas se extendebat, ventris universam regionem superiorem, & proximæ huic partem, antierius occupabat: sinistrorsum autem adeo excreverat, ut Suspensorio ligamento, quod crassius alioquin factum erat, plurimum in eam partem curvato, fissura umbilicalis ad finistram latus esset cartilaginis enliformis. Totum erat hepar durum, & extuberantibus maculis, digito pollice non angu-

(1) Comm. Litter. A. 1745. Hæd. 24. n. 1. ad 7. (m) Epist. 20. n. 52. (n) De Affection. n. 21. (o) Anat. 1. 1. c. 16. Edit. Patav. (p) De Facult. Anat. Lect. 2. (q) Comm. Litter. A. 1732. Hæd. 33. n. 11. ad 5. (r) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. in Append. n. 1. Obl. 5. (s) Earund. Cent. 7. Obl. 9. (t) Earund. Cent. 9. Obl. 41. (u) apud Swieten Comment. in Boerh. Aphor. §. 953. (y) Epist. 16. n. 26. & Epist. 30. n. 30. & 31. (z) N. C. Cent. 9. Obl. 41. (a) N. C. Cent. 6. Obl. 94. ad n. 7. (b) & Cent. 1. & 2. Obl. 186. (c) Ibid. Obl. 184. (d) & Dec. 3. A. 9. & 8. Obl. 186.

(e) n. 16. (f) Añ. N. C. Tom. 2. Obl. 178. (g) & Cent. 9. Obl. 27.

angustioribus, passim distinctum, iisque subflavis, catera pallidum. Hæc exterius. Interius autem; si paucas exciperes hic illic intermissas hepaticæ substantiæ portiones; totum viscum constabat ex substantia, quæ non facilius posset quam mammaria glandula, diffecari: ea ex albo flavescbat, & pressa, ichorem quasi purulentum emittere videbatur. Denique Cystis erat prorsus exigua.

26. A nisu in extollendis oneribus cum faber ferrarius, itemque mulier, de quibus loquitur Cl. Schmidius (b) quiddam sibi intus rumpi, non sine aut magno, aut urente dolore in regione hepatis sentire; neutrum esse deceptum, apparuit ex iis quæ in fabri cadavere inventa sunt, & ex iis quæ mulieri acciderunt. Sed quid nosster Bajulus sibi ab lumbos læserit, cum illud onus attollere conatus est, quidque ascendens instar corporis impulerit, etsi vera fortasse conjectura assequaris; demonstrare tamen haud facile poteris. Illud certum, crescentem jecinoris vitio, & tumore, in ventre aquam, sive ex parte antea fuisset, sive non fuisset, crevisse. Nempe tumor ipse hepatis, & pondus in perpetuo supino decubitu venarum Cavæ, & Portarum truncos, plurimosque simul lymphæ ductus premebat, ut ex horum quibusdam ruptis, aut, si integri hi erant, ob ipsam moram sanguinis, plus aquæ in ventrem effunderetur. Accedebat causa quæ lentum, & inertem sanguinem faceret, tantum videlicet scirrhus hepatis vitium; ut bilis neque idonea ad sua munera, & pauca certe; id quod cystis confirmabat parvitas; fecerneretur: quamobrem bonus neque chylus, neque sanguis conficiebatur. Huc lienem adde & mole, & constitutione peccantem: qui tametsi quid agat peculiariter, definire non possumus; in universum tamen quin utrumque tandem, aut alterum illorum humorum juvet, non dubitamus. Cur vero in hoc, & priore viro, & in tot aliis, in quibus numerare possem tum infantem illum Preulii (c), tum mulierem apud Portum (m), nisi idem sæpe adeo in dissectionibus conspiceretur; cur, inquam, lien simul, & hepar tumida reperta sint, te quaesitum non existimo, probe memorem unde sanguinem utrumque viscum accipiat. Cum enim arteriosum quidem ab eadem Cœliaca arteria habeant; utrolibet primum tumente, eoque minus accipiente, plus in alterum influet. Sanguinem autem venosum cum jecur recipiat in parte ex splene, eumque, ut censemus, secretioni bilis profuturum; utique si jecur tumeat; plus sanguinis in splene restitabit: si vero splen, ineptior ad transitum per jecoris angustias sanguis ab ejusmodi mitteretur splene, minusque idoneus ad optimam bilis secretionem, ut si crassior, ac viscidior fecernatur, ex parte in hepate remoretur, ejusque & ipsa adaugeat molem.

27. Caterum hæc, & quadam alia in hac Epistola ad non abissimilem modum proposita, sic accipias velim, ut si iustum tempus datum sit actioni causarum harum, nihilque si quod ipsam impediatur; effectus quos diximus, consequantur; sæpe enim, ut paulo ante indicatum est, consequuntur; non semper. Exemplis juvat rem illustrare. Latomum secuti Jacobus Sylvius (n), qui hepar habebat magnum, & cocti instar pallens, ac tenerum; lienem vero cinerei coloris, & cum scirrhis duobus parvis exterius, intus autem velut excoctum. Cur non magnum quoque? Ne forte credas ob teneritudinem dumtaxat, quæ aucto jecoris ponderi æquipollens, facile per hoc viscum transitum sanguini conservaret; scias, raro exemplo, fuisse in illo homine ramos tres insignes, qui ab sinistra vena Emulgente ad lienem ferebantur, id est, ut nunc circumscriptio sanguinis docet, per quos magna sanguinis pars, quæ per jecur difficile transitura, splenem restitendo distendisset, in Emulgentem venam diverteret. Num vero iidem tres rami sanguinem citius quam ferat lienis natura, ex ipso asportantes, jecur autem parte ejus auxilii quod illius munus ab liene requirit, orbantes, longo temporis decursu aliquid contulerint adea vitia quæ utroque in viscere sunt animadversa, ipse existimabis. Secundum ea quæ paulo ante dicta, aut nunc indicata sunt, proclive erit tibi exempla alia explicare, ut Riolani (o), ut Fantoni patris (p), quibus in exemplis indurato, auctoque jecinore, lien non modo non major quam solet, sed exiguus, ut vix unciam penderet, aut sola ferme ejus vestigia apparerent, inventus est. Pone enim, quæcumque ejus rei causa fuerit, imminutum splenem: jam intelligis, quanto plus arteriosi sanguinis, &

quanto minus auxilii ad fecernendam probam bilem in jecur pervenerit. Aut pone vicissim, ex qualibet causa, mole & pondere auctum jecur, ut totum occupet epigastrium, quemadmodum in exemplo Fantoni, & ventriculum in umbilicalem regionem detrudat: jam conjectura facile assequeris, quam comprimi una possit tum lien molle viscum, ac laxum, tum Splenica arteria unde sanguinem accipit quo nutritur, & quo iustum ad modum extensus explicatusque servatur: quæ arteria cum sub pancreate feratur, huic secundum longitudinem affixa; vides profecto, quantum premi in Riolani exemplo debuerit, in quo pancreas totum scirrhusum, amplitudine sua, & pondere jecur ipsum æquabat. Nam quod in alio cadavere lienis vestigium unguis latitudinem invenerit; fortasse ex majore, aut diuturniore Splenicæ arteriæ compressione fieri potuit; cum pancreas non solum ibi quoque scirrhusum deprehenderit, sed & cartilaginis instar durum.

28. Verum pancreate feposito, ut ad lienem, & jecur redeam; sane tanta est inter utrumque hoc viscum commercii vicissitudo, ut si altero vitiatum, in altero quoque vitium sit, id nullam habeat admirationem: habet vero, si vitium in alterutro dumtaxat occurrat, velut cum in Sepulchreto (q) legis: *hepar grande, & multis in locis durum;... reliquis visceribus ventris naturalis erat constitutio*: aut (r) *hepar fere exsuccum & pallidum;... Lien autem & Renes naturaliter habebant*. Attamen vel longo in morbo, ubi majus in aliis visceribus, quam in jecinore, vitium deprehenditur, minime necesse est, ut in hoc quoque a longo tempore vitium fuerit: id quod de altera præsertim ex modo indicatis Observationibus dictum volo. Cavendum præterea ne quædam interdum quæ a natura sunt, pro morbi effectibus, causisve accipiamus: cuiusmodi fuisse, crediderim, aliquot illas splenis incisuras quæ in hac Sepulchreti XVII. Sectione, Observ. XIX. videntur inter morbofa connumerari, non secus ac *rimas istas, sive fissuras jecoris*, quæ in præcedente Sectione Observ. XVII. tanquam causæ doloris nonnunquam *hypochondrii dextri* proferuntur. Satis ejusmodi hallucinationes convincit crebra, atque attempta fissurarum utriusque, aut alterutrius visceris observatio, sæpius in cadaveribus cuiusquevismodi, nec sine aliqua utilitate, occurrentium, ut alibi (s) a nobis scriptum est. Sed etsi non omnium reddi posset ratio quæ de alterius visceris integritate cum alterius vitio conjuncta legimus; non essent demum hæc sola quæ præter rationem interdum accidere viderentur. Namque; ut a proposita Bajuli historia haud difcedamus; certe non satis apparet, cur tanti illius ponderis quo jecur erat, molestiam non sentiret: neque cur inter signa quæ abfuisse, adnotavi, quædam præsertim, læso adeo jecinore, abesse possent. Nimirum hæc documento sunt, ne præpropere quibusdam in casibus negantes, aut affirmantes, quidquam pro certo pronunciemus. Et sane interdum in Medicina quædam occurrunt quanto iis quæ modo attigimus rariora, & mirabiliora, tanto magis cautum redditura Medici iudicium in dignoscendo, & quod consequitur, in agendo. Ex illis duo, ut ab aliis accepi, tecum hoc loco, non ab re futura, communicabo; ad tumorem enim, lesionemque attinent viscerum duorum, quæ in hypochondrio sinistro sunt, lienis, & ventriculi. De liene Mediavi noster in vivente primum, deinde & in mortuo sub finem A. 1735. hoc observavit.

29. VIR macilentus, inter alios quorum causa in Nosocomio hoc cubabat, morbos, tumorem etiam habebat in lumbis sinistro qua hic sub ipsa infima costa vergere incipit ad externum latus. Is tumor inspectantium oculis alias quidem magis, alias minus, nunquam tamen non sic satis patebat; contrectantium autem manibus ira cedebat, quasi humorem contineret. Homo tandem suis morbis succubuit. VENTER apertus quid faceret eum tumorem, ostendit. Scilicet tumidi splenis, & præmollis pars ima eo quo diximus, perveniens, a ventriculi autem, & intestinorum flatibus modo magis, alias minus illic compulsa, in macilentum, ut dictum est, corpore id efficiebat, quod inconsiderato alicui, & temerario Chirurgo, magno cum egri detrimento, imponere facile potuisset.

30. Libro Prædictionum II. (z) postquam alia de habitibus magnos lienes dicta sunt, tum hæc continuo subiiciuntur.

ciuntur: si vero etiam in pedibus tumores accesserint; aquam etiam habere videbuntur. Verum & ventrem, & lumbos inspicere oportet. Apud illos igitur qui sunt oracula Hippocratis interpretati, videas velim, num sit aliquis a quo lumborum inspectio ad magnos ipsos lienes, quorum alia proxime præcedunt signa, referatur. De ventriculo autem quod scribam, legit mihi A. 1730. laudatus alias Petrus de Marchettis ex litteris vicini Medici, utrique nostrum spectati, cui probe cognita erant ea omnia quæ nuperrime ibi unde scribebant, accidisse in hunc modum narrabat.

31. Mulieri ad ventriculi regionem tumor increverat quem contrectans Chirurgus cum ad suppurationem perducendum censuisset; quantumvis iis quæ ad id sunt idonea impositis, ad illam perducere tamen non potuerat. Denique eum tum res finem habuit, ut tumor evanesceret, cute ubi fuerat qui nihil quidquam humoris emiserat, quasi in cicatricis modum se contrahente. Post hæc mulier concipit, uterique gestatione, & partu, & puerperio feliciter exactis, cum recte valeret, lactantique optime lac proveniret, tertio jam præterito ex quo pepererat, mense, repente sibi ex ea cicatrix aliquid hu-

moris stillare sentit. Inspicit: vinumque esse, videt, quod modo biberat. Aliquid etiam ex sumpta pulce illac, si conaretur, extrudere poterat. Is rei tamen exitus fuit, ut mulier perfanaretur, integraque esse pergeret valetudine, sicut aliis quoque litteris, a Marchetto, ut mihi pro sua humanitate gratum faceret, interrogatus Medicus confirmavit.

32. Exempla quidem perforati ventriculi foramine sive intra ventris cavum latente, sive extrorsum aperto, non ita pauca legere poteris in Historia Virginis per viginti septem annos hoc morbo laborantis, edita a Cl. Christiano Wenckero (u), eademque Sepulchreto adjungere; ut enim eorum ægrotantium neminem sanare licuit, sic omnes licuit post obitum diffecare. Felicem tamen, nec ejus abissimilem quem modo tibi describam casum reperies in Programmate quod Ettmüllerus filius ad Dissertationem adjecit suam, de prægrandi pedis inflammatione inscriptam. Quo in Programmate cum easimul videre possis quæ ad perfectam attinent sic læsi ventriculi sanationem ita ut nihil ex eo in ventris cavum exciderit; huic ego Epistolæ jam satis longæ nihil addam, nisi ut me, quod facis, ames, & bene valeas.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXXVII.

De Ictero sermo est, & de Calculis Biliofis.

Sæpe adeo cum hepatis vitiiis, de quibus potissimum proximam ad te Epistolam scripsi, conjungitur Morbus Regius, ut recte in Sepulchreto duabus de illis vitiiis Sectionibus continuo subjecta sit XVIII. Sectio quæ de hoc Morbo inscripta est. Ad eum spectat hæc Valsalva nostri Observatio.

31. SACERDOS juvenis, paulo post quandam animi perturbationem, regio correptus morbo decubuit, cum dolore ad regionem stomachi, & vomitu, quo cibum sæpe, & medicamenta reject. Interim alvo dejecta albescebat. Uno aut altero exacto die, inquietus æger, & quodammodo hebes animadvertitur, ut narratorum obli-visceretur. Medici febrem, nisi tertio exeunte die, non adnotarunt: quo tempore se prodidit magno impetu cum delirio, & convulsionibus ejusmodi, ut æger dentibus omnia rodere cogeretur, & ingenti nisu propemodum superaret adstantium vires: cum his vomitus urgebat subobscura materia. Mane vena secatur, unde sanguis cum impetu exilit: cuius serum, ubi a concreta secessit parte, immersum lintecolum flavo inficiebat colore. Cessat convulsio: sed æger quasi soporosus jacet, vix se movet, admotisque cucurbitulas sentire, vix ostendit. Respiratione, nisi quod interdum suspiriosa, quasi naturali utebatur. Quarto transacto die, obiit.

VENTRE aperto, jecur inventum est flaccidum, & ad subpallidum vergens. in ejus vesicula, bilis subobscura. In ventriculo materia ejusdemmodi ac novissimis diebus, ut dictum est, evomuerat: in tunica ejus interiore circa orificium sinistrum disjecta quævis puncta rubentia. Multa autem hic illic per ventrem minimæ glandulæ a stagnante sanguine inflammata. Thorace recluso, pulmones aere tumentes, a pleura soluti, si quosdam per se junctas membranulas nexus excipias, quæ sinistrum ad pleuram alligabant. In pericardio parum aquæ. In cordis ventriculis sanguis concretus. Cranio circumsecto, incisæque Dura meningæ, feri nonnihil prodit: in vasorum sanguiferorum quæ per Tenuem meningem repunt, interstitiis, gelatinosa quædam, sed levis, concretio adnotata est: cerebrum autem valde laxum, neque omnino naturali colore, quem fortasse bilis tinctura vitaverat. Dum ad cerebrum eximendum, intra summum vertebrae tubum Spinalis medulla secabatur, ab externo hujus medullæ pariete, quasi ex dissecto lymphæ ductu, serosa materia, nec brevissimum ad tempus, emanavit.

3. Quid possint animi perturbationes in regio morbo inferendo, cum crebra in Medicina exercenda observationes ostendunt, tum proposita evidenter confirmat. Neque id mirum attendentibus, quantum cum animi perturbationibus nervi consentiant, & quantum iidem valeant nervi Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

vi in afficiendis sanguiferis, & excretoriis vasis, & in secretorio ipso intimo, quale id cunque sit, organo, & quod consequitur, in humorum secretionibus, & excretionibus vitandis & impediendis. Cogita, in quibusdam magis consentire nervos hepaticos, aut si alii etiam nervi consentiant, facilius tamen in certis corporibus hepatis vasa, & secretorium organum nervorum actioni cedere; & cur in iis oriatur icterus ab animi affectibus, continuo intelliges. Sic apud Hoffmannum (a) de fœmina leges, cui quoties ob prægressam animi commotionem... novi accedebant insulsi febres, protinus icterus cum omnibus revertebatur symptomatibus. Quod si addas certas sanguinis, aut materiæ bilis ab eo fecernendæ, aut viscerum cæterorum dispositiones; tanto magis & rem intelliges, & originem symptomatum gravissimorum, quæ interdum ad icterum accedunt, & mortem afferunt opinione celeriore. Hæc ferme omnia ut in proposita Sacerdotis Observatione agnoscimus, ita exemplis magna ex parte non abissimilibus illustremus. Quorum primum nobis Bononiæ degentibus; ibi enim, nec multis ante annis id contigerat; ab doctis, gravibusque Viris narratum est, & a Valsalva ipso qui sectioni affuerat, confirmatum.

4. JUVENI peringenioso, Sacris & litteris addito, truculentus & minax vir scolæ necopinanti ad pedes intentat. Magno ille terrore percussus, postmodum ictericus fit, mox delirus, ut notorum agnosceret neminem, sed identidem clamaret, oh facinus indignum! tum convulsis agitationibus tantis correptus, vix ut retineri posset multorum manibus, intra horas a delirii initio viginti quatuor extinctus est. CADAVERIS sectioni nihil ostendit quod videretur magnopere adnotatione dignum, si vasa excipias sanguifera per Tenuem meningem reperta, quæ nigro sanguine plurimum distenta reperta sunt.

5. Poterat a nobis hoc exemplum inter ea referri quæ ad Deliria attinent, aut etiam ad convulsiones. Sed quoniam a terrore primum omnium malorum apparuit icterus; hic malum recensere. Hunc contractio fecisse videtur hepaticorum nervorum: bilis autem materia, magna ex parte in sanguine retenta, acrior, ut in Juvene, & cerebrum, ut in Litterato, maxime afficiens, cætera attulisse.

6. Exempla apud Medicos Auctores alia, cum Valsalva exemplo (b) in multis comparanda, non quæremus, cum duo hic in Sepulchreto (c) habeamus, Bal-lonii unum in adolescentulo, Comitissæ Chaulnei filio, Guarinonii alterum in Cardinali Sfortia. Huic icterico cum febris esset primum latens, ut Medici, nisi postquam acrior est facta, non agnoscerent, levi desipientia correptus, E po-

(b) Commerce. Litter. A. 1734. Hebd. 34. (c) Obs. cit. supra ad n. 18. (m) Aët. Erud. Lip. A. 1704. M. Septembris. in Relat. ejus Opusculor. (n) Observ. adjet. Hærocl. Anat. (o) Anthropogr. l. 3. c. 16. (p) Obs. Med. Anat. 24. (q) l. 3. s. 14. Obs. 36. §. 4. (r) Ibid. Obs. 20. (s) Epist. Anat. l. 3. c. 35. (z) l. 3. c. 42.

(a) Argentorati A. 1740. (b) Medic. Rat. T. 4. P. 4. c. 12. Obs. 5. (c) supra, n. 2. (d) Obs. 6. & in Addit. Obs. 5.

postea febre acriori facta, jactatione summa corporis, dein subita epilepsia bis exagitatus, denique tribus ante mortem diebus convulsiones varias sustinens, tamen leniter consumptus est, jecinore, & reliquis prope omnibus corporis partibus luteo colore majorem in modum infectis, pulmonibus autem quales in iis offendi solent qui diu inter moriendum spiritus difficultate cruciati sunt. Adolescentulus vero ex facili & lepidulo morosus factus & subtristis, repente ictero occupatus, post dies quindecim, cum nil tale cogitaretur, stridebat dentibus, convellebatur nocte, velut ecstaticus erat, & post ejulatus magnos, & convulsiones mortuus est, cerebro ejusmodi ut in eo non fuisse mortis causa videretur, pulmone valde vitiat, sed hepate vitiosiore quod erat velut *υπερλυσος*; sic enim scribendum est, & scribitur a Ballonio, ut videbis, librum ejus inspiciens, qui citatur, Epidemiorum II. (d) pagina, non quæ indicatur, 244. sed 258. quæ vox eum significet subviride, aut subpallidum; sane perspicis, in hoc quoque hepatis colore Adolescentulum cum Valsalvæ Sacerdote convenisse. Convenerunt autem omnes in illa mentis hebetudine, quam Ballonius quasi ecstaticam, Guarinius levem desipientiam, Hippocrates autem, vel certe Prædictionum (e), & Coacarum Prænotionum (f) Auctores *μολογία* vocant *malamque esse ex morbo regio*, docuerunt; *fatuitatem* reddunt Interpretes, & hos secutus Zacchias in Observatione id confirmante, huc in Sepulchreto (g) relata. Quod si ut in cunctis illis convulsiones, ita non in cunctis furiosum delirium fuit; nempe alia in aliis ætas, temperatura, & dispositio sanguinis, bilis, & viscerum fuit. Sic in Cardinali sanguis liquidus, & nihil usquam habens concretum inventus est, qualem in ictericis esse, affirmat Boerhaavius (b), ut ex vena missus *minime cogatur*: in Valsalvæ autem Sacerdote & missus concreverat, & concretus in cordis ventriculis fuit, quamobrem circa stomachum rubentium punctulorum forma, & hic illic per ventrem stagnans, multarum exilium glandularum instar quæ inflammatae essent, apparuit: cujusmodi sanguinem aliquando in aliorum ictericorum corde esse ab Anatomicis deprehensum, indicata Zacchias Observatio, itemque altera Bartholini, hic quoque in Sepulchreto (i) producta, satis ostendunt; ne meam in Figulo, magna ex parte icterico, aliasque (k) tibi descripto, hic memorem, aut Valsalvæ in Puella illa icterica (l) alteram, hoc magis attentione dignam, quod, præter mucosam in corde concretionem, cum sanguis reliquus esset fluidus, aeri tamen expositus concreverat. Sed ad illam sanguinis ad concrendum dispositionem, alie tum in ipso, tum in cerebro accedant oportet, ut grave delirium fiat. Nec tamen refert, si cerebrum ne tum quidem, neque cum immanes convulsiones fuerint, magnopere læsum appareat. Fugere enim oculos potest id quod in illo erat delirii causa: irritatis autem vel extra cerebrum nervis, aut, quod in Sacerdote illo ex dissectione conjiendum est, Spinali medulla, horribiles possunt convulsiones existeret.

7. Non inventum est tamen in eo cerebrum omnino illæsum, five id quod in meningum sectione animadvertum est, five colorem ipsum cerebri attendas, qui non prorsus erat secundum naturam, & tinctura bilis facile inductus a Valsalva credebatur. Cerebri enim substantiæ, quamvis ipsa quoque aliquando in hoc morbo flava inventa est; non multas tamen sic inventas Observationes legisse memini, fortasse propter vasorum, intime cerebri pervadentium, exilitatem primam, deinde raritatem. Et certe non ita pridem cum ad tradendam cerebri anatomem plura, ut soleo, in Theatro capita haberem, cumque in uno faciei, & reliquæ cutis, & Conjunctivæ oculorum membrana flavedine animadverta, cujus esset hominis, quasivissem, & asthmatici, regio morbo affecti, & pridie mortui esse, audivissem, per exteriorem quidem Tenues meningis faciem cellulosa hic illic non modica spatia vidi ex subviridi flaventia, mox tamen cerebro dissecto, non alium ac natura fert, in hoc colorem deprehendi. Et rursus cum postea similis oblata esset occasio, etsi in Lateralibus ventriculis paucam, quæ inerat, aquam subflavam confexi, plexusque Choroides ad eum colorem nonnihil vergentes, & Pinealem ipsam glandulam, breviorum alioquin, minusque mollem, & cui ad basim antierius pauxillum adharebat, non arenosæ, nec

flavæ, sed albæ, substantiæ, versus summum autem quidpiam intus inerat quasi sanguinis, vasivæ sanguiferi, etsi, inquam, eam glandulam vidi ex suo cinereo colore inclinantem ad subflavum obsoletum; reliqua tamen, nam perscui; omnia nativum servabant, ut quidquid medullare esset, offenderim cardidissimum. Sic etiam hic in Sepulchreto (m) post diuturnum icterum, cerebri substantiam videbis satis albam fuisse, quamvis non meninges modo, Crassa præsertim, sed & cranium extra, & ex parte intus quoque esset flavum. Nam & ossa ipsa interdum hic morbus inficit, flavedine, ut quidam monent, nunquam esceletis eluenda. Ut flava essent ossa in fœtu icterico, Kerckringii ostendit Observatio, hic quoque in Sepulchreto (n) legenda: nec mirum, cum pro sanguine humorem, fellis instar, flavum invenerit, qualem a Vesalio pariter in Patricio Florentino Martello fuisse repertum, ex Sectione hac eadem Sepulchreti cognosceres, si ejus dissectio, ut bis (o) proponitur, ita semel tota, ut alibi (p), exhiberetur. Tu vero in iis omnibus locis, non Marcellum, sed Martellum legito: & Helmontium (q) ipsum credito in Observationes haud ab similes incidisse, cum in mesentericis duorum ictericorum venis id videret, unde *virus excrementosum*, seu *crucorem flavum* & *stercorem*, si *stercus liquidum flavum*, secundæ digestionis prolem, *sursum p. n. rapsum in venas*, & totum corpus dispersum, icteri auctorem esse, commentus est; cum bilis sit quæ non proportio, aut propter copiam, aut propter jecoris, ut in Martello, vitium a sanguine secreta; sic denique in hoc abundat aliquando, ut missus sanguis, & urina quæ tunc redditur, simillima appareant (r), idque non in morituris solum, sed & in iis interdum qui sunt evasuri (s). Quod & illis, aut certe illi icterica accidit, cui, ut Baglivus (t) refert, loco sanguinis, e naribus, & e cucurbitulis scarificatis aqua flavissima modo prodibat, non fecus atque, ut habemus apud Lowerum (u), is evasit adolescens, cui sanguine per magnum, & diuturnum profluvium e naribus emanante, & jusculis interim large resecto, humor jam effluebat, jusculis quam sanguini, similior.

8. Ex Partibus autem quæ a flavo sanguine sæpius, ac facilius infectæ animadvertuntur, membrana præsertim sunt adiposæ, & quæ in oculis conjunctivæ appellantur. Pinguedinem Valsalva aptissimam omnium credebat ad croceum colorem trahendum, ubi serum sanguinis paululum modo flavescat. Croceam enim in multis regio morbo non affectis deprehenderat, & præsertim in tribus quos eodem ferme dissecuit tempore, nimirum in hydrocephalo; in vulnerato, & in alio quem ardens febris consumperat.

In oculi autem albo flavedo in hoc morbo tam obvia est, ut inde Veteres permoti videantur ad credendum, arquis lutea omnia apparere. Quod vocatum esse in dubium a Mercuriali meo in prælect. Bononiensibus, scribit Hoffmannus (x), qui in Patavinis (y) fortasse, vel potius in Variis Lectionibus (z) voluit scribere. In his enim cum Varronis, Lucretii, Sexti Empirici, Cassii Medici, Galeni ipsius testimonia id affirmantium protulisset, cæterorum qui de Medicina scriperant, silentium, sui que ipsius in ictericis innumeris contrariam observationem opposuit. Poterat autem & aliorum frequentissimas observationes cum sua conjungere, nec dubitare quin etiam posteros habiturus esset multo maxima ex parte altipulatores. Certe vel nuper cum post Svidenhamium (a), Boerhaavius quoque (b) idem quod Veteres illi, scripserit; diserte falsus est Vir Eruditissimus Hallerus (c), se non evidentia ejus rei experientia invenire, nec legisse, Corneam in ictericis flavam fuisse inventam: in humoribus autem oculi non levem, sed magnam omnino coloris mutationem requiri, ut puta cum ab effuso in Aqueum sanguine, ex Vesali observatione, rubrum apparuit lumen. Et sane videtur mihi Boerhaavius cum illud iterum (d) scripserit, & Observationem alteram suam, Vesalianæ satis similem, produxit, existimasse, aliquid bilis se humori Aqueo admiscens, cum sanguine in hunc effuso comparari posse. Verum ob vasorum, oculi humoribus intervenientium, exilitatem fortasse, ut de cerebro quoque intimo dictum est (e), non sæpius accidit, ut bilis tinctura ad hos perveniat. Mihi saltem, icterica mulieris oculos diligenter olim dissecanti nihil prorsus flavedinis in ullo de tribus humoribus inventum est: nec vero magis in Cornea tunica; quam unam, ut in ictericis aliis, & nominatim

minatim in eo quoque Figulo de quo supra (f) commemoratum est, cum accuratius inspicerem in magna proximæ Adnatæ flavedine, nunquam flavam videre potui. Aliquando tamen, sed rarissime, fieri potest, ut flava in hoc morbo objecta appareant, nimirum si Cornea tunica bile tota saturata sit, neque tum solum, quod & Mercurialis concedit, verum etiam quando oculorum humores summa flavedine infecti sint: quorum alterutrum, aut sima-vis, utrumque in bis exemplis fuisse, credito, quæ pro Veterum sententia se vidisse, testatur Hoffmannus (g), itemque in tertio; neque enim plura legisse memini; quod a Cl. Scardona (h) additum est.

9. Esse autem potest in nonnullorum oculis major aut numerus, aut diameter vasculorum ad Corneam tunicam, & ad humores pertinentium, simulque in eorundem hominum sanguine materiæ bilis aptior adea vascula pervadenda, & ad tingendum, five hoc pendeat ab ejus materiæ natura, five a copia. Videmus enim, posteaquam secreta est, & in vesicula sua deposita, in aliis magis, in aliis minus facile per hujus membranas transire, itemque saturatiore in aliis flavedine, in aliis levissima, ut nulla contiguas partes inficere. Scilicet sanguis unde provenit, in aliis est, si cum Willisio loqui malis, cujus verba hic vides in Sepulchreto (i) producta, ad dyscrasiam sulphureo-salinam nimis evectus, in aliis autem sulphur habet nimis depressum: quam etiam obrem ut illi sunt ad icterum maxime proni, ita hi, inquit, morbi istius gaudet immunitate, ut vidit in pluribus cachecticis, & phlegmaticis, quantumvis hepatis, quoad plurimos ejus ductus, obstruktionem & indurationem laborantibus. Quæ tamen caute oportet accipere, aut tempora distinguere, & mutationes quas icterus ipse inducit, attendere; ne postea cum ibidem legeris Hildani (k), ut Graafii (l) Observationes, mireris. Ille enim pituitosum, & cacochymicum, scribit, interdum etiam icteritia annis aliquot laboravisse; Graafius autem icterici bilem fuisse plane serosam, & tam levi flavedine imbutam, ut immixta in eam linea vix ulla flavedine tingeretur. Quod vero ad ejus materiæ, cujus de natura dixi, copiam attinet; mirum quanta hæc esse in quibusdam potest, si ad eam quam nativa corporis constitutio, anni tempus, cibi potionesque, aliaque ejusdemmodi in unum forte conveniendo, accumulaverint, alia insuper accedat, ut si febris, si immoderatus sub sole motus, si venenum, etiam a mordente bestia immixtum, si denique ejusmodi aliud eas quoque sulphuris particulas quæ magis in sanguine constrictæ, & depressæ erant, solvatur repente, atque evehat, ut tot jam sint, quot secerendis jecur par esse non possit.

Est alius præterea vel notior modus quo bilis materia in sanguine augeatur, ut si ex ea quæ inest, parum vel nihil separetur live ob aliquod ipsius sanguinis, aut intimi fecerentis organi vitium, five ob complurium Hepatici ductus ramorum, aut ejus ipsius trunci, aut Communis impedimentum viam. Hac enim impedita, etiam si bilis, jam secreta, in sanguinem, ut plures existimare pergunt, non redeat; nova immitti in plenos distensoque ductus non poterit, ideoque cum quantum jugiter ab alimentis materia bilis in sanguine augeatur, tantum ex ea non dematur, crescat ipsa in dies, abundetque, necesse est.

10. Eæ autem quam diximus, via impediri potest a rarioribus, aut frequentioribus causis. Ex rarioribus sunt quæ hic in Sepulchreto leguntur, Communis ductus ad capillarem angustiam redactus (m), aut instar chordæ solidæ in se contractus (n), induratusque (o), aut plane ac solide offusus (p), aut acircumjectis aliquot glandulis compressus (q). Ad frequentiores autem causas primum convulsiones attinent, & hinc ortæ crispaturæ, ad initia usque ramusculorum ductus Hepatici propagatæ, eosque ut pote angustissimos, contrahentes, atque occludentes. Quarum hic effectus est propterea sub sensum cadere non potest; tamen rationi est adeo consonus, ut a nobis facile ad icteros illos explicandos ponatur qui aut a vehementibus animi affectibus, aut a doloribus originem habeant. Sunt quoque Doctissimi Viri qui sic eum explicant icterum quem viperæ venenum fecerit, non dissimulantes nobis, si modo tunc alvi recrementa albefcant, ut valida quam ex convulsione ponunt, officii Communis ductus contritio omnino requirit: quod si magis flava esse pergant, & nos ea ratione rem intelligere pergemus, quæ paulo Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

ante (r) priusquam ullum memoraretur viarum impedimentum, exposita est. Porro inter causas frequentiores, sunt obstrukciones recensendæ cum in aliis, tum in biliaris quæ præsertim hic attendere placet, variis accidentibus, five horum obstruktionem faciant secreta cum bile particula quadam æquo crassiores, & viscidiores, live geniti ex his, & bile calculi, unde Hepatici ductus rami, aut truncus ipse, aut ductus Communis infarcia itur. Cysticum non dixi propterea quod hujus obstructio per se non potest bilis iter ab hepate ad intestina impedire; quamvis multi superiori tempore, & nonnulli hoc nostro fuerint qui, frustra monente Wepfero (s), obturato collo vesiculæ biliaris non sequi icterum, nisi ductus Communis quoque obstruatur, ipsi quidem a calculo in cysti, non modo in Cystico ductu, hærente arquatos homines fieri, existimaverint. Quæ de opinione ut præclare intelligas quid censendum sit; quidquid ex hac Epistola restat; restant autem quam plurima: circa biliaris versabitur calculos, quando ea quæ hæcenus attigi, satis esse tibi possunt simul ad cæteras morbi regni pleraque causas persequendas simul ad aperiendum ad ea aditum quæ de biliaris five in hepate, five extra hepar calculis sunt proferenda.

11. Qui calculi in hepate gignuntur, *lepeni vero* in dissectionibus reperiri, auctor est in Sepulchreto (t) Platearus, Henenius autem (u), *sæpe tantos ut vix credatur*. Quorum utriusque sic accidisse, non negavero. Quod vero Matthiolus (x) rationibus quibusdam subnixus, credit, lapides in jecore, ut in renibus frequentissime gigni; sane si innumeras propemodum Valsalvæ, & meas humani jecinoris dissectiones attendam, non facile ejus opinioni possum assentiri. Cum enim calculos pluribus in renibus uterque invenimus; vix uno in jecinore mihi olim accidit ut invenirem, Valsalvæ autem in nullo, quod sciam.

Quæ cum dico, nihil aliud, nisi itam inter hepatis, & renum calculos comparisonem pectio, minime ignarus vel ex Sepulchreto ipso, a quot præclaris Viris sint in jecinore inventi, aut commemorati. Nam præter tres illos quos nominavi, Falloppium etiam nostrum (y), Scaligerum (z), Trincavellium (a), Dodonæum (b), Camenicenum (c), Peucerum (d), Blasium (e), Hererium (f), Dobrzenskyum (g); sic enim hujus nomen scribendum fuerat; produci video: quibus addere alios possum, in his Columbum (h), Foretum (i), Reverhorstium (k); quorum tamen nemo pro frequentibus istiusmodi Observationes proponit. Hos si inspicias singulos; fortasse miraberis, præter Dodonæum, Camenicenum, & Dobrzenskyum, neminem esse qui icteri in iis ægris mentionem faciat, eos autem qui faciunt, aut Communem insuper ductum calculo occlusum, aut jecur lapillis plenum describere. Sed mirari desines, ubi animadverteris, ad omnem bili viam intercludendam non satis esse, paucos, & parvos in hepate calculos increvisse, nec vero etiam magnos, nisi ibi hæreant ubi majores Hepatici ductus ramos obideant, & omnino aut comprimendo, aut obstruendo occludant, id quod parvi, sed innumeri, & totum jecur undequaque, ut loquitur Dodonæus, implentes, non sparsim, ut Forestus vidit, per illud dissecti, cum in minoribus quibusque ejus ductus ramis faciant, idem nempe efficiunt, ac si ipsum obturarent truncum.

12. Dixi autem comprimendo, aut obstruendo, bili viam a calculis intercludi. Neque enim si quis calculos aliquando ajat in ipsis glandulosis hepatis acinis concreveret, eoque facile attingit minores illos quos in externa hepatis superficie vidit Riedlinus (l); advertari velim: quam sæpius credo in ipsis gigni Hepatici ductus rami, ut qui diligentius persecuti sunt, invenire. Ruyfchius (m) certe ut nihil frequentius, in bobus quidem, & ovibus, acciderat, quam calculos in poris biliaris deprehendere, sic nihil varius contigit, quam eosdem in ipso hepatis parenchymate reperire; ut quamvis jecinora plus centum perquam attente excarnaverit, in uno dumtaxat calculum offenderit in parenchymate absconditum, poro biliaris nullo modo affixum. Nec alio quam ad eosdem biliaris ramos antiquas referre possum Plateri (n) Observationes calculorum hepaticorum, *tophum coralloidem ramorum*.... *carum inrinscus representantium*, præsertim cum Glissonium (o) lego per similes in bovinis jecinoribus Observationes *tubulorum tantæ longitudinis, ut si modo*

(d) Edition, quæ una tunc erat, & diu fuit, Parisien. (e) l. 2. n. 4. (f) n. 2. (g) Obs. 7. (h) Prælect. in Instit. §. 773. (i) Obs. 24. (k) Epist. 7. n. 11. (l) Epist. 10. n. 7. (m) Obs. 3. (n) Obs. 34. (o) Obs. 8. §. 4. & Obs. 20. (p) l. 2. n. 11. Obs. 36. §. 1. (q) Vid. in hac Sepulchre. 18. Sect. Obs. 26. (r) Vid. apud Hoffmann. supra ad n. 3. cit. cap. 12. §. 4. (s) Ibid. (t) De Experim. circa Bilem. (u) Tract. de Cord. c. 2. (v) §. 4. morbo cit. (y) l. 1. c. 32. (z) l. 6. c. 12. (a) Process. in Morb. curand. ubi de ictero. (b) Prælect. ad Instit. §. 344. (c) Adnot. ad eum locum. (d) Prælect. modo cit. §. 840. (e) n. 7.

(f) n. 6. (g) §. 4. cit. (h) Aphor. de cognosc. & cur. morb. l. 3. c. 10. Comm. ad n. 8. (i) Schol. ad Obs. 1. (k) Obs. 8. §. 13. (l) Obs. 10. (m) Obs. 14. (n) Obs. 17. (o) Obs. 25. §. 7. (p) Obs. 16. (q) Obs. 11. (r) n. 9. (s) in Additam. ad hanc 18. Sepulchr. Sect. Obs. 4. (t) Sect. 17. l. hujus 3. Schol. ad §. 1. Obs. 13. (u) Obs. cit. §. 2. (v) Sect. hac 18. Schol. ad §. 12. Obs. 8. (y) Obs. 13. cit. §. 6. (z) §. 4. (a) §. 7. (b) Sect. 18. cit. Obs. 4. (c) Ibid. Obs. 8. §. 11. (d) cit. Obs. 13. §. 2. & 8. (e) §. 9. (f) 10. (g) Sect. 16. Obs. 5. (h) De Re Anat. l. ult. (i) l. 19. Obs. Med. 14. (k) Dissert. de Mot. Bilis §. 51. (l) Eph. N. C. Cent. 3. Obs. 45. (m) Obs. edit. cum Dilucid. Valvular. in Lymphat. 24. (n) Schol. cit. ad Obs. 13. (o) Anat. Hep. c. 7.

modo integri eximi potuissent, plurimas pori bilariis ramificationes continuata lapidea serie, coralli instar, retulissent, diserte ab se habitas fuisse intra eundem porum, five ductum, docere. Cuius ramos Reverhorstius quoque (p) in hominis cadavere calculosam crusta intus obfessos deprehendit. Nec ipse alibi quam in iis ramis, calculos in jecinore humano (q) inveni. Sed neque alibi eos quoque fuisse lapides, opinor, qui a Columbo (r) & Cameneceno (s) in Portarum vena credebantur inventi: cuius opinionis meae rationes; quamvis non satis a gravibus quibusdam Auctoribus animadversas; cum alias (t) proferam, hic minime iterabo. Hi igitur calculi cum denique ex canaliculis, accrescente usque, & usque simili materia, ut contingit in aquaductibus, solidi facti, eas quas dixi, vias omnino occupaverint, nihil dubii est quin bili iter intercludant.

13. Illud etiam dixi, jecoris calculos, quamvis magnos, nisi ibi sint ubi eas vias possint occludere, mirum non fore, si morbum regium non inducant. Quem fuisse equidem credo; nam pro certo nunc scire non possum; in quodam homine cuius hepar in faciei cavæ centro lapidem habuit forma & magnitudine ovi columbini, quemadmodum ante multos annos Amicus ad me Anatomicus qui cadaver diffecerat, scripsit. Minime autem miror quod is morbus non fuerit in mulieribus tribus, quæ etiam multo majorem lapidem, aut plures, gravioreque intra hepatis membranam habebant, ibi tamen habebant, ut potius extra id viscus, quam in eo, esse viderentur, quæ causa fuit, cur supra non memoraverim. Ea enim membrana, incluso pondere distracta, & deorsum extensa, facculum in duabus effecerat palmi longitudine, nam in tertia non nisi pendulus deorsum folliculus descriptus est. Observatio hæc ultima est Benivenii (u) omnino alia, ut conferendo intelligas, ac secunda, quæ ex tertio capite ejus libri in Sepulchreto (x) proponitur. Ejus autem similis; nisi quod in facculo non plures, sed magnus unus calculus cum multo glutinoso humore conclusus erat, nec mulier unquam, nisi de calore hepatis conquesta est; Observatio subiicitur Georgii Greifii (y). Quorum ego exemplorum memor, cum animadverterem, pendere igitur infra jecur posse præter cystim ipsam fellei amplificatam, aliam interdum quasi cystim, humore etiam distentam, quæ etiam omnino præter naturam esset, illam mentiretur tamen; idcirco in iſterico Laurentio Bacchetto. Medico olim Patavino, cuius morbi, & diffecionis historiam post Cl. Dominicum Militiam (a) duo alii Docti Viri ediderunt, ita me gessi, ut opinionem quidem indicarem meam; sed nihil pro certo affirmarem. Pendebat illi infra jecur tumor, quem manu abdomini admodum statim perciperes, globosus, mobilis, ut manu qua comprehendebas, facile posses dextrorsum, aut sinistrorsum compellere. Cum aliis aliud, quemadmodum apud Militiam leges, singulorum opiniones indicantem, esse videretur; mihi semel, post alios invisen- ti, esse cystis fellea visus est, ab humore præter modum distendente amplificata, deorsumque producta, quod Medico, agri Amico, qui me domum humaniter reducebat, Dominico Stephanello folicite sciscitanti ita dixi, ut tamen pro certo non affirmarem. Quod sic designavem, evidenter adeo confirmavit diffecio, ut rei designatio prætermitti a quibusdam, res vero ipsa ab æmine re- ticeri potuerit. Videram id alias, & nominatim in Se- ne, ex quo in Epistola I. Anatomica (b) jam descripse- ram. Memineram autem multo sæpius legisse, nec modo apud Veteres, ut cum Vesalio (c) in Martello eandem cy- stim invenit duorum pugnorum magnitudine, aut cum Fer- nelio (d) a bile exuperante in ingentem nonnunquam distendi magnitudinem, scripsit; sed apud Recentiores quo- que, ut puta Zwingerum (e), qui sextuplo circiter ma- jorem vidit, præsertim vero juniorem Verneyum (f), & Vungium, cuius vel monstruosis amplitudinis Obser- vationem commemorat Abr. Vaterus (g); ut post illam non credam esse operæ pretium alias quæ deinceps pro- ductæ sunt, indicare, nec quærere amplius, quanta cy- stis reperta ab Lancisio fuerit, quam propter insignem longitudinem describere Pacchionus in animo habebat, sicuti est in hujus litteris A. 1710. ad me datis: quan- quam minime negligendæ sunt Observationes duæ quas

nuper apud Amplissimum Swietenium (h) legebam, II- lustr. Edimburgensem altera, qui cystim octo libras bili- continentem, idque in duodecenni puero, deprehende- runt, ipsius alteram, qui in muliere cystim eandem com- perit distentam adeo, ut ad os usque liliam dexteram perveniret, quod inter os, & costas imas vel antequam macilentissimum cadaver incidere, sua ipsa mole pro- tuberaverat. Sed & in Polono Senatore (i) mirum in modum extensam invenire, ut in vivo manibus palpari posset. Ve- rum ut ad illa redeam quæ ex tempore, id est A. 1732. jam edita fuerant, etiam eorum probe memineram; non oblitus tamen trium illarum quas primo loco indicavi, propendens ab jecinore facculi Observationum, neque moniti quod in extremo edito libro VI. de Morbis popu- laribus vel bonis Medicis, nedum aliis, similitudines pa- rere errores, imitari Baglivum nolui, quem, si viveret, ac quæ sunt apud Vallinierum nostrum (k), & Scheff- selium (l) legeret, pœniteret sane, dum quasdam, non omnes quas poterat, Observationes attendit, præpropere scripsisse (m), cum iſteros videris pertinaces, vel sana- tos, sed recidivantes: pro certo habebas, eos a calculo vesicæ felleæ progigni, ac proinde insanabiles prædicito.

14. Cujus de vesicæ calculis, quippe extra hepatis substantiam positus, ut, quemadmodum promissum, ver- ba faciamus, ipsorum quidem in hominibus tam crebræ Observationes habentur, nullo ut modo possit harum numerus cum illarum quæ ad calculos jecinoris spectant, comparari. Hujus si discriminis causam quæras; non unam invenies ubi causas attenderis quæ tam frequen- tis calculorum in cysti generationis redduntur. Veslin- gius noster (n) cysticæ bilis crassitiem, & diuturnio- rem in cysti moram, & hanc augentes Cystici meatus angustias, & valvulas indicavit. Quas causas ita pecu- liares cystis invenies ut peræque ad Hepaticos ductus transferre non possis, mirandumque sit, gravissimum in- ter Recentiores Medicum, has ipsas propositi discrimi- nis causas agnoscentem, minus animadvertisse, bovino quoque generi esse communes, in quo ut ibi fatetur he- paticos calculos esse frequentiores, ita causam aliquam indicare simul debebat hujus alterius inter humanum, & bovinum genus discriminis. Sed quæ Veslingius præ- monstraverat, ab aliis interea illustrata atque aucta fue- rant, five majorem crassitiem bilis in quibusdam homi- nibus, & dispositionem ad concrendum adnotando, five æquo diuturniore moram ob Cystici ductus spas- modicas crispaturas, & constrictiones, aut ob infirma- tam in laxatis vesiculæ tunicis se contrahendi vim agno- scendo. Quæ tunicarum infirmitas tanto deinceps major fit, quanto plus bilis retinetur, non secus atque in uri- naria vesica accidit, cum ab lotii retenta copia ejus re- solvantur vires: quæ similitudine & Galenus (o) olim, & Verneyus junior (p) hæc nostra ætate usus est: unde causam intelligis fere præcipuam cur immanes illæ fiant cystis amplificationes de quibus paulo ante dictum est. Huc alia insuper addidit in primis Abrahamus Vate- rus (q), cuius nomen haud erat ab iis qui eadem pos- tea scripserunt, reticendum. Is enim ob fundi cystis declivitatem cum difficilem bilis ascensum; ob ductus autem obliquitatem non expeditum transitum animad- vertisset; utraque hæc causa speculata, censuit, compressa a ventriculo cysti, non nisi tenuiorem, & maxime flu- xilem bilis partem extrudi, spissiore autem semper in fanis quidem relinqui, quæ facile concreveret, nisi mox novo hepaticæ bilis affluxu instaurata dilueretur. Hæc autem instauratio ubi æquo paucior, aut etiam viscidior bilis feceritur, cum rite fieri non possit, hinc tanto facilius spissiore illam in calculos abire. Vatero au- tem, quin etiam Veslingio quadantenus Fernelius (r) præluxerat, cum originem his calculis esse, scripsit, & flavæ bile, quæ proprio conceptaculo diutius coarctata, nec tempestive vacuata, nec nocte influxu renovata, mirum in modum obdurescit.

15. Cum igitur tot, & tam faciles in tanta humanæ vitæ infirmitate, & intemperantia præsto sint causæ ob- quas cystici calculi producantur; mirari non oportet, quod sæpe adeo a Veteribus, & Recentioribus inventi sint. Nam postquam Gentilis (s), & Nicolaus (t) lapidem hic in vesica fellea, ille autem in hujus meatu

se vidisse, testati sunt, Benivenius (u), Vesalio (x), Curtius (y), Falloppius (z), Fernelius (*), Stephanus (a), Columbus (b), Coiterus (c); ut minus clari no- minis Auctores præteream; Observationes protulerunt suas: ex quo autem humana cadavera multo sæpius in- cidi cœpta sunt ad hunc usque diem, nemo fere de Re Anatomica, aut Medica scribens, de ea vesicula paulo fufius loquendi occasionem habuit, quin calculos ibi ab se visos commemoraverit; ut jure ajat Cl. Professor Fa- bricius (d), fere sæpius felleæ, quam urinariæ vesicæ, calculos esse adnotatos: quibusdam autem in regionibus vel longe frequentius occurrere, ab Ill. Hallero (e) ostensum sit. Quamobrem noli mirari, si dixeris, cum hæc scriberem, ante oculos habuisse Observationes, mi- nimam, ducentas, ex quibus undeviginti meæ sunt: mi- reris potius, quod non legerim, aut non meminerim multo plures. Nec tamen quas dixi, tam paucæ sunt, ut secundum illas si quærenti tibi respondeam, quid frequen- tius aut rarius in cysticis calculis occurrat; temere vi- dear respondere. Potes autem illud in primis quære- re, in quibus crebrius reperiantur? Scripsit enim olim Carolus Stephanus (f), esse potissimum in mulieribus pro- vetioribus a se confectos, hoc autem sæculo Fridericus Hoffmannus (g), variis in hominibus ætatis florentis, frequentius vero in senibus, itemque in feminis crebrius, quam in viris, reperiri. Multo igitur verius est Hoffmanni pronuntium primum, quam ultimum. In memoratis enim Observationibus video, marium ferme parem, ac feminarum esse numerum. Senes autem, quantum ab Ob- servatoribus indicatum est, cum promiscue utriusque se- xus inveniam unum, & sexaginta; juniores amplius octo non invenio: ex his autem nullum infantem, unum pue- rum; minorque in his octo, ætas est annorum duode- cim, major undetriginta. Nimirum tenuiores, vividio- resque, florentes ætate, sunt fucci, quam inclinata, & ce- lerius quoque ingyrum acti, id quod vidit Hoffmannus, quam in minus operosa præsertim, seniorum, & mulierum vita. Quapropter a muscularum otio repetit laudatus Hal- lerus (h) frequentes calculos vesicæ felleæ, quos in vis diu carceri inclusit reperit. Eodemque refert quod in minime agitata bile contingere vidit Ill. Swietenius (i). Eam enim cum in vase vitreo puro reliquisset, ut putresceret; in fun- do visci grumos calculos invenit. Media tamen ætas, li- cet actualis sit, non habet succos cum florente comparan- dos, quo fit, ut non æque possit intemperantia, & animi affectionum injuriis resistere, quarum utriusque vel magis, quam senilis, obnoxia est. Hic si addas plebejarum mu- lierum magnam partem non ita desidem vitam agere, & si hæc omnia cum iis conferas quæ supra (k) de causis, cystis calculos gignentibus, scripta sunt; nempe Obser- vationes cum ratione convenire, facile intelliges.

16. Quod si jam quæras, verumne scripserit Reverhor- stius (l), cum adnotandum esse, monuit, hos calculos, quo sine e corpore juniore, eo quoque esse remissiores, id est, pallidioris coloris, & in media ætate esse coloris flavii, in præ- vetiore autem obscurioris coloris, imo nigricantis; multo facilius responso erit. Neque enim quid frequentius sit, hic quaeritur; sed quid perpetuum, ut vel meis dumtaxat inspectis Observationibus, affirmare possim, præpro- pere id scriptum fuisse. Nigerrimos enim calculos, non modo nigricantes, in pluribus etiam mediæ ætatis de- prehendi; in Juvene autem annorum viginti quinque, & in Anu septuaginta quinque (quorum ille junior, hæc senior fuit inter eos omnes, & quorum cysti hæcenus ex- secui calculos) fuerunt hi non ita dissimili inter se co- lore, ut neque nigricarent in Anu, nec valde pallerent in Juvene, præsertim si cum cineraceo conferam, quem reperi in muliere annos nata undexaginta. Sed ne mei unus stes Observationibus; juniorem certe non legi feminam, in qua cystici calculi inventi sint, quam Vir- ginem illam annorum undeviginti, quæ superiore libro a Boneto (m) descripta est. In ea tamen lapilli omnes flavii fuerunt, & bilem colore referentes. Contra, prove- tius ætatis erat mulier illa annorum trium & sexaginta cuius historiam accurate proposuit Cajetanus Tacco- nus (n), & nigro insuper iſtero affecta. Attramen cuncti Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

hujus calculi non modo ad albidum, five dilute croceum colorem accedebant; sed & corticibus, cum intus crocei es- sent, instructi erant albicantibus, lucidis, argenteam ma- tris perlarum interiore faciem simulantibus. Scilicet non tam ætas, quam materia spectanda est, ex qua fiant, aut facti fuerint; neque enim semper ejus in qua reperiun- tur, bilis colorem imitantur; hæc autem pro vario aut sanguinis, aut organorum vitio, in pari etiam ætate dispar interdum esse potest, vel fuisse, aut sub eodem etiam colore non ejusdem generis illas particulas ex quibus pos- tissimum calculus fieret, abscondisse. Sic Abr. Vaterus (o), sic Cl. Trewius (p); ut alias & nostras, & alio- rum Observationes prætereamus; in bile crassissima & nigricante calculum ille candicantem invenit, alter in bile vitellina calculum exteriori maxime ex parte albidum, reliqua brunnum, qui levissima frictione candidissimas redle- batur, intus autem, si rufescentem quandam maculam ex- ciperes, pallidum, & in viro quidem ille, hic in fene, non in aliquo adolescentulo.

17. Nec magis Reverhorstio favent qui ordinario hos calculos atros, subnigros, aut fucos deprehendi, generatim scripserunt: quanquam ut sæpe coloris ejusmodi calculos a Majoribus, ab aliisque inventos scio, & ipse fateor, sæpius annis posterioribus mearum Observationum, quam prioribus, invenisse; ita non paucæ aliæ meæ, & multo plures aliorum Observationes memoria excidant, necesse est, antequam ordinario occurrere illo colore, facile credam. Kentmannus, ut est apud Schenckium (q), cum de iisdem calculis univèrse scriberet, omnes sunt, ait, co- lore ad flavum accedente, qui cum ipsis augescitibus pau- latim in croceum mutatur, & sane exempla mox proferet quasi subluteorum, & lutei, a Falloppio nostro hic de- prehensi. At enim multo plura apud eundem Schen- ckium subjiciuntur alterius coloris. Utique: sed his alia opponenda sunt, ut Joannis Franci (r) qui lapillos cro- ceos coloris vidit, ut Cæsalpini (s) qui colore eodem con- spexit, ut Boschi (t) qui citrino, ut Panaroli (u), & Dobrzenskyi (x) qui flavo repererunt. Nec vero præ- termittendi sunt Hoeschletterus (y), Schelhammerus (z), Steinius (a), Bierlingius (b), a quibus lutei, fla- vescentes, crocei, neque Hortius (c), neque Helwigius (d), a quorum utroque cum inventi essent immuni nu- mero; ab illo ex parte, ab hoc omnes subflavi conspe- cti sunt. Hue addes Platnerum (e), & Bezoldum (f), quorum alter fulvos, alter ex luteo albicantes deprehen- dit, tum alios complures, & in his laudatos Edimbur- genses (g) qui in duodecenni illo puero flavoscentes, Cl. Trewium (h) qui vel post exactum annum quartum & septuagesimum extrinsecus leviter flaventes viderunt, mul- to autem magis Cel. Hallerum (i), ut qui vel in femina centum annos, ut aiebant, nata calculos fortæte omnes, quandam certe flavum esse conspicuit. Idem in altera Vetula (k) cum sexdecim invenisset; tredecim flavos fuisse, scribit: albo autem luteos in suspensio (l). Sed & Weitbrechtus (m) in fene flavos ostendit. Obser- vationes, præter has, alias aut paulo ante memoravi, aut memorabo postea: alias vero, nec ita paucas, sciens præ- teribo; neque enim in animo est omnes, sed tot dumtaxat indicare, quot satis sint ad ostendendum, non ordinario igitur atros, fuscove cystis lapillos inveniri. Imo Va- terus (n), Hoffmannus (o), Bezoldus (p) cum de horum calculorum coloribus generatim verba face- rent, inter eos qui communiter, aut frequentius ob- servantur, duo primi flavoscentes posuerunt, Bezoldus autem sæpiissime ad flavedinem inclinare, diserte scri- psit.

18. Quamquam autem ex iis qui lapillos cysticos me- morarunt, bene multi quoque essent colores, siluerunt; ta- men qui non siluerunt, tot sunt, ut satis appareat, ple- rumque aut flavos, aut nigros occurrere. Plerumque di- ximus, quia carulei quoque conspecti sunt, ut a Coite- ro (q), Neretio (r), & Goritzio (s), qui & pun- ctula rubra adnotavit, an ex adherentibus lacerata hic illic cystis particulis? ea enim calculus ardeadeo inclu- debatur, ut vi deberet extrahi. Rubri, ut a Camenice- no (t) & Bartholino (u): Cineracei, ut a Fabricio

E 3

nostro

(p) §. 52. cit. supra, ad n. 11. (q) Epist. Anat. I. n. 43. (r) (s) locis cit. ad n. 11. (t) Epist. I. cit. n. 49.
(u) De abdit. nonnull. &c. c. 94. (v) Sect. 17. Obs. 13. §. 1. (w) Ibid. §. 11. (x) De Morb. Extial. Nob. Virgin.
(y) Epist. de Rad. Chin. (z) Pathol. I. 6. c. 3. (a) Aet. N. G. Tam. 1. Obs. 78.
(b) Mém. de l'Acad. R. des Sc. 1701. (c) Differt. qua Calcul. in ves. fell. &c. thes. 5. (d) Comment. in Boerh. Aph. §. 970. & 995.
(e) Commer. Litter. A. 1733. Hebd. 11. n. 2. (f) Opere T. 3. P. 6. Lett. 37. Annot. 1. (g) Differt. de Lithiæ fell. §. 28.
(h) De Experim. circa Bilem. (i) Synt. Anat. c. 4. (j) De loc. aff. l. 5. c. 7. haud ita procul a fine. (k) cit. supra ad n. 13.
(l) Obs. rariss. calcul. 3. §. 1. (m) c. cit. ad n. 13. (n) (o) apud Donat. de Med. Hist. Mir. l. 4. c. 30.

(u) (v) cit. supra ad n. 13. (y) Comment. in Mundin. Anat. ubi de Hepate in fin. (z) Obs. Anat. (*) cit. ad n. 14.
(a) De differt. part. corp. hum. l. 3. c. 42. (b) De Re Anat. l. ult. (c) Obs. Anat. (d) Propempt. ad Differt. Jo. Barth. Hoffmann.
(e) Opusc. Pathol. Obs. 33. (f) c. 42. modo cit. (g) Medit. Rat. T. 4. P. 2. S. 2. c. 3. §. 12.
(h) Experim. Anat. de Sangu. mot. c. 6. (i) Comment. in Boerh. Aph. §. 970. (k) n. 14. (l) Differt. de motu bilis §. 57.
(m) Sepulchr. l. 2. S. 4. Obs. 35. (n) De rariss. quibuld. hepat. Affect. Observ. (o) Differt. qua calcul. &c. thes. 4. & 5.
(p) Commer. Litter. A. 1743. Hebd. 32. n. 3. & Hebd. 36. n. 4. (q) Obs. Med. l. 3. ubi de vesic. fell. lapid. Obs. 1.
(r) Ibid. (s) Quæst. Med. l. 2. in ipso fine. (t) De Facult. Anat. Lect. 2. (u) Jatrolog. Pent. 5. Obs. 22.
(v) Eph. N. C. A. 1. Obs. 129. (w) Obs. Med. Dec. 10. Caf. 9. (x) (y) apud Scheffel. Diff. de Lith. fell. §. 10.
(z) Sepulchr. l. 4. S. 1. in Additum. Obs. 12. (a) Ibid. l. 2. S. 7. Obs. 125. (b) Ibid. l. 3. S. 7. in Addit. Obs. 1.
(c) Progr. edit. 17. Mart. A. 1746. (d) Differt. de Cholæstho Caf. 1. (e) cit. supra, ad n. 13. (f) Ibid. Hist. 11.
(g) Commer. Litter. A. 1733. Hebd. 6. n. 5. in fine. (h) Opusc. Pathol. Obs. 33. Hist. 4. (i) Ibid. Hist. 11.
(j) Ibid. Hist. 13. (k) Commer. Litter. A. modo cit. Hebd. 9. n. 2. (l) Differt. supra ad n. 13. cit. thes. 3.
(m) c. 3. supra ad n. 13. cit. §. 2. (n) Differt. modo cit. §. 5. (o) Obs. Anat. (p) apud Schenck. Obs. cit. supra ad n. 19.
(q) Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 20. (r) Epist. ad Matthiol. (s) Cent. 3. Epist. Med. 88.

nostrum (x) & Bosco (y): Albicantes, ut ab Reverentissimo (z), Vatro (a), Hallero (b), Swietenio (c), atque adeo colore argenteo, ut a Platero (d): Colore aureo, ut ab eodem (e), ab aliisque in parte; neque enim omnes hic nominandos suscepimus: denique Colore viridi, aut subviridi, qui multo quam novissime dicti, aut alii brevitate causa omitti, frequentior est, ut eundem saepius, cinereum aliquando, aureum ex parte nonnullum; ceteros necdum viderimus. Vidimus tamen & variegatos ita uti Epistola ad Schrockium data (f) descripsimus, Gerbezio (g) autem ex fusco & albo, Baeumlinus (h) ex albo luteo alios viridescens, alios, eosque in eadem illa cysti plurimos, puniceis & luridis maculis distinctos confpexerunt. Et quibus quidem, & ex aliis coloribus modo commemoratis nullum proprie nigrum dixeris. Huc insuper calculos addito, qui omnibus, aut omnis propemodum coloris expertes sunt; qualis erat magnus ille, ut cystim non modo replet, sed etiam distenderet, a Sculteto (i) repertus, *instar crystalli pellucidus*, aut quos Regius olim Chirurgus, *Tamponettius (k)*, & Manichius (l) deprehenderunt, hic *pellucidum utrumque friabilem, avellane magnitudine*, ille autem *magnitudine ovi columbini, gummi instar concreti lucidum, & mollem* (ut ad memoriam reducat a Cel. Heistero (m) descriptum, qui sub rugosa superficie *substantiam & colem fere habebat gummi arabico paulo solidioris haud ab similem*) aut qui a Bezoldo (n) pingitur, *crystalliformis plane pellucidus* ab Henrico Alberto Nicolai inventus, & Observatione V. (o) indicatus. Sed & candicans ille atque albicans, quem semel, atque iterum memoravimus ex Vatro (p), *pellucidus & transparentis* fuit: cui, si colorem minus attendas, adjungere ex Sepulchreto (*) triginta illos poteris a Scharpio repertos, *carbunculi instar pellucidus*, & fortasse octoginta quoque ab Sanctiorio nostro (q) inventos, *similes lapidibus chrysolitis*, credo, ut Plinius (r) chrysolithos dixit *aureo colore translucentes*. Quod si nihil, nisi splendorem in cystis calculis spectare vellemus, commemorandi hic essent alii, ut ex Griselio (s) ille qui ovo gallinae paulo minor, *confractus resplendebat ac si nitro plenus fuisset*, aut ex Jo. Theodoro Schenkio (t), & Jo. Rhodio (u) multis partibus minores, qui effracti pariter, *instar crystallorum tartari*, aut talci modo splendebant, ut talci quoque instar quem primum ex Trevio memoravi (x): quin & mihi (y) quorundam nucleus splendentibus hic illic distinctus quasi punctis apparuit. *Cervuleas autem illos splendoris Neretti (z)*, aut Plateri (a) illos *nunc argenteo, nunc aureo colore splendoris*, exterius videlicet dumtaxat; diffusos enim non lego; minus ad eos attinuisse, existimo, de quibus modo dicebam. Ad quos attinere magis potuisse illos credo quos descripsit Baglivus (b) *scintillas veluti emittentes, quasi essent congeries nigri salis crystallizati*. Certe autem, & praecipue attinent duo quos proposuit non ita pridem Cl. Morandus (c), alterum ex Prael. Viri Geoffroyi, alterum ex sua observatione, illum intus ex parte, hunc vero exterius, intusque etiam maxima ex parte splendentem, & propemodum omnino pellucidum: attinentque alii ab aliis, & nominatim a Praetantissimo Hallero (d) descripti, quos non sine illo *crystallino*, si interea apud Hildanum usquam reperire potuero, infra cum de structura lapillosum cystis scribetur (e), opportunius memorabo.

19. Nunc enim pauca antea de varia eorum magnitudine, numero, figura, sede attingenda sunt. Fuit igitur aliquando cum unus cystim non implens modo, sed & distendens repertus est, ut paulo ante dicebamus, imo distendens etiam *admodum*, ut videbis in Sepulchreto (f). Fuit cum illam aequans, ejus ibidem (g) non unum habebis exemplum. Alias *semiovum gallinaceum*, sicut invenit Fallopius (h), alias ovum columbinum (interjectos enim ut primo, & secundo, ita secundo, & tertio magnitudinis modos transilio) aequasse, compertum est, quomodo post

Coiterum (i) viderunt plures, & in his Vallisnerius noster (k) in ultimo ex Gente Gonzaga Mantuanorum Duce, rarus, hunc etiam morbum hereditarium esse propterea quod Bartoletus (l) quoque calculum ad cystis orificium offenderat in Ferdinando Gonzaga, Mantuanorum item Domino, argumento non improbabili, si ab hoc Ferdinando qui nullos reliquit filios, Dux ille ultimus provenisset. Multo autem infra eam magnitudinem plerumque inveniuntur: quin sunt nonnulli adeo exigui, ut Vesalius (m) in Martello cum *miliis seminibus* comparaverit. Cujus cystis, duorum pugnorum magnitudinem, ut supra (n) etiam dixi, facile aequans, cum esset ejusmodi lapillis quodammodo plena; hinc quantus sit inter eorum numerus, potes aestimare. (Qui reapse numerat post Fallopium (o) qui centum viginti tres cum grandiore illo invenit, non modo trecentos, ut Bartoletus (p), aut sex & trecentos, ut Plateri (q) Frater, quibus vel ipse plures deprehendit, sed ultra septingentos, ut Mentzelius (r), imo ultra mille, ut Graecius (s) olim, repererunt, ut mirum sit, quodam de numero cysticorum calculorum in universum loquentes, in Joach. Camerarii (t) numero, id est 143, substituisse. Quid? quod exemplum jam prolatum ex Cl. Storchio (u) nobilis Senis in quo eorum ultra duo milia numerabantur, itemque alterum ex Fascio (x), qui in cysti ingenti cujusdam Gladiarii 3646, *granula bilis concretæ* reperit, *que curiosis etiam ostendere solebat*. Quanquam vero aliquando, ut paulo ante indicatum est, uno plures non sunt; multo saepius tamen uno plures inveniuntur.

Quod ad figuram porro attinet, typi quidem aliqui ad sphaericam, ad ovalem, ad aliamve minime angulosam accedentes, ut vel similitudines monstrant quibus tunc Observatores ad describendum utuntur, nucis alicujus, aut oleæ, aut ovi, aut aliis ejusmodi: sed plerumque sunt angulosi. Illos vesiculæ ipsius figura aut vitio contracta, magisque globata, aut naturalis, cum eam implent, ita conformant, si uno plures non sint, seu plures quidem sint, sed ita adhuc molles (nam vel majusculi interdum (y) casei recentis molliem servant) ut in ejusmodi formam compingi possint universi, quemadmodum in Sepulchreto (z) vides loco bilis orbicularem unum ex novem aliis figure triangularis, sibi invicem incumbentes, *facile manu separabilibus, lapillis constantem lapidem*, cui similis, nisi quod ob ponderis exacte aequalem, eoque propemodum incredibilem, partitionem multo admirabilior, Observatio extat (a) *globi calculosi uncias duas & semis ponderantis*, qui ex cysti, nihil aliud includente, detractus, in sexaginta minores calculos obscure flavos, friabiles, singulos pentaedros, & serupulum unum ponderis aequantes, abscissit. Sed & alia praestant cysticorum calculorum exempla, qui ovum columbinum referentes (b), ex minoribus concretis videbantur, aut etiam ex meris *granulis compactis* (c), siue *compactis* (d) erant. Num vero ejusmodi granula prima esse dicemus initia calculorum cystis omnium? Haud raro certe in vesicula reperta sunt; nam ad eas potes quas hic produximus, alias atque alias eorumdem Observationes adjungere, ut in Virgine de qua Verneyus junior (e), ut in Viro de quo Cl. Jo. Sebast. Albrechtus (f), cum in illa bilis esset in tot parvos grumulos concreta, in hoc autem *instar sacchari granulati, seu seminis milii excorticati formata*, & ne longior sim, ut in tot aliis (g) in quibus calculi cum essent *superficie granosa, siue mori forma undique tuberculosa*, videntur granula ad superficiem adhaesisse, cum eaque concrevisse. Qui igitur calculi ex concretæ bilis granulis constant, illorum hæc esse initia, non est dubitandum. Atqui in cysti simul cum calculis multa quoque *arenosa mucosaque materia* (h), & *larga quantitas sabuli* non semel reperta est, ut tanquam matricem calculorum procul dubio considerandam esse, censuerit idem qui reperit, Cl. Bergenius (i). Itaque si sabuli grano, tanquam nucleo, bilis accrescat; vides, aliud initium horum quidem calculorum esse dicendum. Huc adde alia, a me alias animadverta, & commodius infra (k) commemoranda: facile intelliges, non omnium

omnium esse initium posse granulum concretæ bilis. Sed quoniam calculos plerumque angulosos esse, diximus; unde angulorum originem repetemus? Si molles adhuc plurimi, sique rotundi, in unum sive ovalem, sive sphaericum, ut in duobus paulo ante productis exemplis, ita compingantur, ut ex cujusque ad alium appensione novas illas acquirant formas, dein vero ex causa aliqua fecedant; unde orti sint anguli, proclive est assequi. Verum quia perraro ejusmodi occurrunt exempla; plerumque angulos ab rotundorum inter se affricu repetemus. Affricum enim quis neget, ubi faciem levorem animadvertat, aut magnos duos illos cysticos calculos qui apud Hildanum (l) extant delineati, aspiciat? Eorum alter *tantum excavatus est, ut tertiam fere partem alterius excipere possit*, quod a continua frictione unius contra alterum factum esse, certum est, inquit ille, qui in vesicæ quoque urinariae calculis videre interdum a simili causa haud ab similia potuerat. Magnum quoque illum aspice, qui ex tribus constantibus partibus cystim extenderat, a Cl. Bechmanno (m) descriptum, & delineatum. Cum videris quantum media praefertim pars inferiori subire, exactamque superficiem infer se contiguarum polituram attenderis; affricui certe id deberi, confirmabis.

20. Quot autem angulis cystici calculi, & qualibus, & quemadmodum positis, seu qua figura ut plurimum praediti sint, haud facile est ex aliorum Observationibus constituere non solum ob magnam saepe in iis etiam qui una eademque vesicula concluduntur, varietatem, verum insuper ob neglectam saepius vel ab iis qui minus debebant, in designandis figuris propriam vocum significationem, aut eam quæ ad intelligendum satis esset, illarum descriptionem. Vesalium (n) quidem cum lego in Senensi J. C. duodeviginti calculos describentem *triangulum imagine æquis undique costis ac superficiebus formatum*; tetraedrum proprie dictum mihi videor intelligere. Sed cum plures alii *triangulos*, aut *triangulares*, aut *triangulares* dicunt, neque scio, praefatis, an pyramidis forma viderint, neque utraque viderint; æqualibus, an inæqualibus planis comprehensos. Contra ubi Griselius (o) repertos scribit lapillos quatuor majores cubicos, una cum innumerabilibus pene aliis minimis, etiam, quantum videre licuit, *cubum referentibus*; non dubito quid sibi velit; dubito autem, cum alii, nec pauci, *quadratos* ajunt, aut *quadrangulos*, aut *quadrangulares*; vides enim, quam varia paralleloipeda his possint vocibus significari. Attamen cum eos omnes calculos qui apud me sunt; sunt autem quamplurimi; diligenter inspicio; primum perdifficile esse, intelligo, ut regularis omnino figura in angulis calculis reperitur, & Vesalium ipsum, ac Griselium credo, formam illam quæ ad tetraedrum, hunc quæ ad cubum accederet, designare voluisse: deinde existimo, qui triangulares, aut quadrangulares dixerunt, figuram indicasse ad tetraedrum, aut ad cubum quomodolibet accedentem: denique arbitror, cum utraque hæc forma, quippe, si ita intelligas, imperfecta, facies quædam plerumque offerat, quæ a primo hujus, aut illius similiores videantur, multos ad illam, & multos quoque ad hanc retulisse; at si lapilli in omnem partem diligentius versentur, eam ut plurimum figuram agnosci quæ a me olim in Epistola I. Anatomica (p) indicata est. Esse autem per se plurimum quam utraque illa figura postulat, angulorum, satis illa quam ibi, ut dicebam, indicavi, demonstrat: multo autem plurimum, & eo plurimum, quo plures in una cysti sunt calculi, Kentmannus (q) quidem olim docuit; ego vero ut illud primum interdum sic esse, fateor, ita tum & alterum, haud satis scio; imo si Griselii, & meas quædam Observationes attendo, verum esse non semper, scio. Sed quæcumque anguli sint; ubi aliqui sunt valde acuti, aut superficies calculorum asperior, possunt hi, si majus simul pondus accedat, cystim non modo irritare, sed nonnullum etiam percurrere. Cujus ruptionis rarissimum quidem in Sepulchreto (r) exemplum habes. Irritatio autem phlogosæ potest, & ulcera, & excrementa, a me quoque visas (s), & si cum Weppero (t) urinæ, & fellis vesicam inter se conferamus, tunicarum saltem crassitudinem facere. Urinaria enim vesica a calculis ob continuum attritum saepe quadruplo crassior evadit, quod ait ille, & nos in loco (u) videbimus. Deprehendit ipse ab eadem, ut putat, causa *crassiores de-*

bito cystis tunicas, ut alii interdum, in his non solum Discipuli quidam nostri (x), sed & Doctissimus Trewius (y), qui non sine purulenta materia invenit, praefertim autem Cl. Bezoldus (z) qui tunicas illas *duriores, crassioresque, & quasi cartilagineas* describit, licet aliunde, quam ab iis quos in suo, & modo indicatis exemplis continebant, calculis causam quaerant, & certe alias aliunde esse potest (a). Ceterum saepe est eorum superficies lævis, ut Vesalius in Juris Consulto illo vidit, praefertim si ex flavescens sint, quos præterea vel ficcos cum tangimus, non secus ac si sapone oblitati essent, percipimus, cujusmodi quasi unguinosum lavorem in quibusdam etiam subviridibus vel magis adnotavimus (b).

21. Quod vero de irritatione diximus, tunc quoque cum inter cystis increfcent tunicas, modo asperi, aut majores sint, locum habere, non dubitamus. Sic autem explicari posse, credimus, Gendrotii (c) Observationem dynteræ ortæ ex jugi bilis in Duodenum intestinum eructatione, cum duo majusculi, & inæquales calculi in cysti essent, membrana singulari obvoluti. Genitos autem existimabis in cystis glandulis, in istisdemque auctos, sedem sibi inter eas tunicas, quas inter eas quoque glandulas sunt, extendisse. Memineris enim parvos bilarios calculos me (d) fuisse in glandulis manifestis orificio patentibus, eoque minus in dubium vocandis, repertos olim, & demonstratos. Quos etiam a Cl. Galeatio in meæ perlimis, nisi quod orificia illa non apparebant, Observatione solerter fuisse inventos, & agnitos, perlibenter postea cognovi, cum Volumen editum est primum Commentariorum de Bononiensi Scientiarum Academia (e). Sed & alium sic a me inter cystis tunicas animadvertum exiguum calculum infra (f) indicabo. Tum nunc erit dispicere, num in ea quam supra (g) memoravi, Griselii Observatione, illa cysti *in fundo adnata alia tunica, quæ alium aliis omnibus majorem talem cubicum lapidem continebat*, ad eundem sit modum intelligenda. Mihi certe minus dubium est, quin explicari sic possit Cl. Elleri Observatio, quam, si recte memini, legi ante aliquot annos in IV. Miscell. Berolinensium Volumine. Parvum enim calculum rotundum, & sublavum quem in cystis fundo concretum, & membrana, ex pelliculis vesicæ illius producta, circumdatum deprehendit, facile crediderim, in aliqua ex ejus glandulis concrevisse. Quin eo quoque inclinamus, ut fieri posse, existimem, ne alibi concreverit calculus, ut indicia omnia ostendunt, bilarius, cujus pars crassior in sacculo quodam latebat inter cystis tunicas comprehenso, pars altera cervicem cystis obturabat (h): tantum abest, ut Observatione illa pervinci, credam, nullas cysti glandulas obtigisse. Et sane ab duro ejusmodi crassoque corpore non potest cervix illa obturari, quin alia facile premanente cystis actionibus necessaria, aut universa ipsa ab irritatione se se contrahat, & crispet; ut mirari postea non oporteat, si ejus glandularum secretio aut prohibeatur, aut vitetur. Atque eadem ferme a nobis dici putato de illorum quoque experimentis, qui in vivente bestia cystis meatum injecto vinculo constrinxerunt. Hujus igitur glandulas non comminiscuntur Anatomi, sed ex certis agnoscunt observationibus, cujusmodi plures sunt a nobis in I. Epistola Anatomica (i) memoratæ. In qua tamen non tantum aliquas, *cervici proximæ glandulas commemoravimus*, nisi forte Vir Doctus quæ ibi de vesica urinaria diximus num. non 96. sed 63. ea, ut sit, memoria lapsus, ad fellis vesiculam attinere, inter scribendum existimavit.

22. Nunc quando de cysticorum calculorum magnitudine, numero, figura, sede plura attigimus quam in animo habebamus, etsi non pauca inter ea scripsimus quæ ad illos internoscendos, cum per alvum egerunt, esse possunt haud inutilia; jam de cæteris quæ ad id multo utiliora censentur, structura, levitate, & ad flammam concipiendam proclivitate verba faciamus. Quod ad structuram attinet, ex quo Kentmannus (k) docuit, hos calculos, si frangas, intus apparere *plenos angustis circulis se invicem ambientibus, ita ut videre sit cuius saltem obiter advertenti, quomodo lenta & viscosa bilis a centro ad usque superficiem sensim adhaerens accreverit*, nemo fere extitit qui de eorum structura, & crescenti modo sermonem habens, non Kentmanno attipularetur. Erant tamen aliqua, saepius, & in variis calculis repetitæ observationis ope partim corrigenda, partim addenda. Nam quod in sectionibus, circuli concentrici appareant,

E 4

ve-

(*) apud Schenck. Obs. cit. (y) De Facult. Anat. Lect. 2. (z) S. cit. supra ad n. 16. (a) Diff. ibid. cit. thes. 4. (b) Obs. cit. ad n. 17. Hist. 1. 2. 6. (c) Comment. cit. supra ad n. 15. S. 931. ad 2. (d) Obs. 1. 3. ubi de Terrest. Excret. (e) Ibid. (f) in Act. N. C. Tom. 2. Obs. 147. (g) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 57. (h) Commer. Litt. A. 1733. Hebd. 28. n. 2. (i) Armata, Chr. Obs. 61. (k) Zodiac. Med. Gall. A. 1. April. Obs. 7. (l) Ibid. Maj. Obs. 8. (m) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 181. (n) Diff. de Cholelitho S. 5. Fig. 4. (o) Dec. Obs. Illustr. (p) thes. 4. hic cit. & c. (q) I. 3. S. 17. in Addit. Append. ad Obs. 2. S. 1. (r) Comment. in I. Pen. 1. Can. Avic. Qu. 76. (s) Nat. Hist. 1. 37. c. 6. (t) Vid. in modo cit. Sect. 17. Obs. 3. 11. (u) Vid. ad Sachsi Gammarol. Epist. addit. 7. ad c. 14. (v) Cent. 3. Obs. Med. 45. (w) supra, n. 16. (x) Obs. cit. 147. (y) Locis paulo ante cit. (z) De Experim. circa Bilem. (a) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1749. (b) Opusc. Pathol. Obs. 33. (c) I. 3. S. 10. in Addit. Obs. 1. (d) Ibid. S. 13. Obs. 12. S. 7. & S. 18. Obs. 8. S. 14. (e) apud Schenck. Obs. 1. cit. supra ad n. 17. (f) Ibid. Anat. (g) Epist. supra cit. ad n. 13. Adnot. 2. (h) Vid. Rhod. Cent. 3. Obs. Med. 2. (i) Epist. de Rad. Chin. (j) n. 13. (k) Obs. 1. modo cit. apud Schenck. (l) Obs. 2. Rhod. modo cit. (m) I. 3. cit. supra ad n. 17. (n) Eph. N. C. Dec. 1. A. 9. Obs. 181. (o) apud Schenck. in fine Obs. 1. modo cit. (p) in ead. 1. Obs. (q) Commer. Litt. A. 1735. Hebd. 59. n. 4. (r) Vid. in Obs. 68. Tom. 3. Act. N. C. (s) Eorund. T. 3. Append. n. VIII. App. 1. ad Obs. 10. (t) I. 3. S. 17. Obs. 14. S. 5. (u) Ad. modo cit. T. 3. Obs. 129. (v) Commer. Litt. A. 1745. Hebd. 24. n. 1. (w) Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 20. (x) Halleri Opusc. Pathol. Obs. 33. Hist. 13. (y) I. 3. cit. supra ad n. 13. (z) Act. N. C. Tom. 4. Obs. 49. (a) Eorund. Ad. T. 1. Obs. 20. cum Tab. 3. Fig. 3. & 4. & Eph. Cent. 5. Tab. 1. Fig. 3. 4. 5. & 6. & Halleri Obs. cit. Hist. 13. (b) Commer. Litt. A. 1733. Hebd. 45. post n. 6. (c) & A. 1739. Hebd. 39. n. 1. (d) n. 24.

(i) Cent. 4. Obs. 44. (m) Commer. Litt. A. 1733. Hebd. 32. n. 1. cum Tab. 2. Fig. 10. (n) Epist. de Rad. Chin. (o) Eph. N. C. Dec. 1. A. 3. Obs. 45. (p) n. 45. in fin. (q) apud Schenck. Obs. 1. cit. supra ad n. 17. (r) I. 3. S. 14. Obs. 5. S. 4. (s) Epist. Anat. 1. n. 43. (t) in Auctor. ad Obs. de Apopl. hist. 13. in Schol. n. 5. (u) Epist. 42. (v) Epist. ad Schenck. de qua supra n. 18. (y) Act. N. C. Tom. 4. Obs. 140. (z) Diff. de Cholelitho S. 6. (a) Vid. Sepulchr. 1. 3. S. 21. Obs. 4. S. 11. (b) Epist. modo cit. ad Schenck. (c) Zodiac. Med. Gall. A. 1. Maj. Obs. 6. (d) Epist. Anat. 1. n. 56. (e) Vid. in Opusc. (f) n. 29. in fin. (g) n. 19. 20. (h) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1735. Obs. Anat. 1. (i) n. 20. 56. (k) apud Schenck. Obs. 1. saepius cit.

verum esse id potest in rotundis calculis, siue sint sphaerici, siue etiam aut cylindrici, aut ovals, modo in his utrisque sectione ad axis perpendicularum fiat, ut in partibus quoque calculi quae hemisphaerici, conici, aut cylindrici sint forma, quemadmodum, exempli gratia, in maiori illo vides de duobus quos pinxit Hildanus (1). Angulosos autem calculos si bifariam feces, strata ex quibus compinguntur exteriora a circulo forma longe abeant, necesse est, quae interiora pariter, quantum hactenus vidi, imitabuntur: nec tibi aliter icon ostendit, ab saepius laudato Treuio (m) proposita. Itaque rectius locutos existimo qui, figura omissa, strata stratis tantummodo imposita designarunt, ut Boscus (n), qui cortices concretos unicuique ex novem calculis, quemadmodum sunt caepe, fuisse, dixit, ut Hildanus (o), qui suos per laminas concretos, & ne longior sim, ut Malpighius (p), qui tot involucribus se se amplexantibus confari, scripsit: locutos, inquam, rectius, quam qui de angulosos verba facientes, circulos nobis memorarunt, quod fecisse Ottonem Heurnium, ex Sepulchreto (q) cognoscis, ubi calculum describens figura trigoneta in pyramidale fastigium extensa, in eo apparuisse, ait, circulos corticales, sibi insidentes.

Neque haec in Kentmanno corrigere satis est. Ex nigris enim calculis tum sphaericis, tum angulosis, qui apud me sunt, nunc plerique strata nulla prorsus ostendunt: vix aliqui, ex angulosis firmiores, habent extimum, idque subsecutum, reliqua substantia ejusmodi est, ut Veteribus quicunque in hos forte inciderunt, & nominatim Piccolomino (r) indulgendum sit, quod in cysti bilem exulam, carbonis instar, in calculo subuigros (imo nigerimos, si hos vidisset meos, vere dicere potuisset) converti, scripserit. Quam veniam in tanta saeculi huius luce perverlem dari iis posse Doctissimis aliquin Viris qui obliti, post tot morbos, immani cum calore conjunctos, nullos ut plurimum in cysti lapillos deprehendi, arbitrati sunt, quosdam horum, sine ulla bile forte inventos, magnae praegressae febri imputandos, quae omni bilis parte aquea absumpta, reliquum in lapides convertisset. Sed nec satis est excipere hos nigros calculos, ut cetera quae Kentmannus docuit, vera sint, videlicet saltem reliquos plenos esse aut circulis, aut aliusmodi stratis, a centro ad usque superficiem, seu, quod alii generatim dicunt de omnibus hactenus cognitis, ex stratis concentricis fieri, ad minimum nucleum applicitis. Tu enim quae in Adversariis (f), quae in Epistola I. Anatomica (t), & quae in Epistola ad Schroekium missa (u), a me de nucleis natura, mollietate, magnitudine praesertim, in tot, & tam variis calculis observata sunt, vide; nolo enim hic iterare. Intelleges certe, non parum pro horum mole meditullium, & eo majus, quo aucti erant magis, idque molli, humidique bile plenum, offendisse, & quod consequitur, non modicum interius singulorum partem ex stratis illis adeo non consistere, ut querendum sit, quomodo post illam firmam strata permeare bilis introscire queat. Alia quoque intelliges, quae hic consulo praetermittuntur, ut puta cuboidales quos nos quidem secimus, calculos non ex minimis aliis fieri ejusdem figurae, sed, ut ceteri de quibus loquimur, ex bile stratis circumvestita haec saepe videri esse inter se colore, & interdum alterne vario: nec raro denique facta conspici ex confertissimis lineolis, centrum versus contententibus.

23. Qui lineolarum ductus quandam horum calculorum structuram nunc mihi ad memoriam revocat, ab ea quam Kentmannus proposuit, discrepantem. Neque enim solum confertissimae istae quas modo dicebam, in singulis stratis lineolae, ab aliis quoque ante me, ut puta a Mauricio Hoffmanno (x) cum ex laminis stratis quasi concretos calculos descripsit, facile animadverti, verum etiam multo evidenter lineae, aut a centro ipso ad ambitum perpetuo ductu pertinentes, interdum conspectae sunt, ut a Baumolino (y), qui in calculis, quod ad colorum ordinem spectat, cum quibusdam a me descriptis maximam, ut ait, partem convenientibus, spiculas quasi salinas a centro ad peripheriam stratis decurrentes perspicit, ut minus ex lamellis, quam ex stratis fieri viderentur. Sic etiam Treuio (z) in alio calculo nullam deprehendi potuisse, testatur, structuram lamellatam, cum radiis potius a centro quasi ad peripheriam, sed confuse, excurrentes cernerentur, quod addita delineatio (a) confirmat. Sed Mauritius Reverhorstius (b); ne illos qui antea scripserunt, omit-

tam; ubi ex plurimis calculis quos e Senis vesicula extraxerat, sectiones unius, an duorum delineat, in altera quidem corticem ad circuli modum adumbrat, in utraque autem non tenues lineas a centro ad peripheriam radiatim contententes. Joannes autem Baptista Contulus (c) cum Icones, qualescunque ut cetera, exhibeat lapidum in eadem cysti repertorum, in iis quae unius, ab se inventi, in extremitatibus diaphani, sectionem quoque, ut videtur, alterius exhibet nescio unde sumptam, in qua plura quidem circularia strata, sed multo plures lineae conspiciuntur a centro ad ambitum pertinentes. Porro a Malpighio (d) descriptam memini peculiarem speciem calculorum, quos credebatur mucosa quadam concrevisse substantia, quae saporem amuletur, vel magis camphoram. Eos igitur mirari ait esse compage, lapidem namque judicium figura annulari, & interius elegantibus lamellis a peripheria ad centrum deductis compaginari, quae de facili ab invicem separantur. Quamquam autem arbitratur in hepate gigni, & in ejus poro, credo quia ejusmodi lapidem, quem Amicus Bonifolius servabat, repertum audiverat apud Germanos in jecore Viri Nobilis; tamen ejusmodi alterum, quem vidisse se, scribit, a Matrona sibi nota post ingentes dolores & longam icteritiam per alvum excretum, ibidem genitum fuisse, pro certo scire non poterat. Namque & ex fellis vesicula procul dubio fuisse quosdam calculos per sedem ejectos, infra (e) ostenditur, & in ipsa quoque concretae nonnumquam aliquos structura haud abimili, cum ex dictis non obscurum est, tum continuo aliis Observationibus comprobabitur. Ille enim Vateri pellucidus calculus qui supra (f) a nobis est memoratus, non modo in superficie stratis salinis tenuissimis micantibus habebat, sed & stratis concentricis erat: aut si quid in hoc forte dubii est; nihil certe erit in descriptione, & imaginibus illorum duorum quos ex Morando indicavimus (g). Eorum enim uterque splendidas, pellucidave lamellas habet, alter quidem cum stratis circumjectis, alter vero sine his, radiatim a centro ad ambitum contententes. Et nuper Ill. Hallerus (h) alios proposuit crystalli modo micantes & semipellucidos, quorum unius, sponte rupti, substantia interna selenitica quasi micans, ex centro flavo radiatim extorsum porrecta ad corticem, in crustas & laminulas facta erat. Reliqui minores similiter intus selenitica modo laminosi, splendidi.

24. Haec Observationes omnes cum aliis junctae, quas de splendidis, pellucidisque cystis lapillis antea (i) commemoravimus, te ad suspicandum facile inducent, calculos plures ex iis qui alvo dejecti sunt, non cystis, sed ventriculi, & intestinorum fuisse praepropere existimatos propterea quia a magis vulgata cysticorum natura, structuraque nimis abesse viderentur. Occurrit in primis quem ex Cornelio Gemma descripsit Donatus (k) intus substantiam ostendentem instar vitri purioris, aut crystalli pellucidam multis stratis atque radiis in unum centrum confluentibus. Illud suspitioni videtur ob stare quod esset praegravandus. Sed praeterquam quod infra (l) indicabitur, quantum possint bilarii ductus dilatari, imo quantum inventi sint dilatati; tum cum Gemma credit ex diuturni doloris & tensionis sede in dextero illo sub colitis spuris, in Caeco intestino, non concretum quidem, ut ipse arbitratur, sed mora auctum substantia illa alia exteriori partem fusca, partem atra, in eam molem excrevisse. Ita & magnum alterum quem describit, pingitque Bezoldus (m) stratis auctum in via putato, quae multo pauciora essent ubi concreverat nucleus quasi crystallinus, quem videntur Icones non sine quibusdam stratis, ad ejus ambitum a centro ductis sic satis adumbrare. Hujus autem calculi dejectionem multo longiores dexteri hypochondrii dolores praecesserant: nec Bezoldus (n) fieri posse non censet, quin a vesicula fellis proveniret. De duabus, quas subiicit, Observationibus dejectorum lapidum alterius magni, alterius minoris, ipse quod malueris, statues. Prima enim certam nullam antiqui in ventre doloris sedem, secunda nullum dolorem indicat. Cum tamen proponi in illa calculum legeris, cujus rutilans interna substantia meros ostendebat circulos stratis interfectos, & Observatoris, Schroekii patris, delineationes (o), ad descriptionem hac non abhorrentes, inspexeris; fortasse ne hunc quidem calculum a suspitione rejicias tua. Minorem autem de quo apud Auctorem Brechtfeldium (p) non plura quam apud Bezoldum invenies, quaerens forsitan, num quando

quando is, ut tres priores, & ille insuper a Malpighio (q) visus, a femina dejectus fuit, esset illa, ut de tribus istis novimus, vetula; hunc, inquam, minorem fatissime erit tibi fuisse interius instar crystalli albicantem, & rutilantem, arbitranti in nimis pressa descriptione, potuisse facile structuram omitti, quae ut in pellucidis etiam aliis, supra (r) a me commemoratis, si diffracti fuissent, apparuisset fortasse qualis in postremis descripta est. Verum ne forte suspitionibus liberius indulgeas, fac tibi vicissim Cl. Chomelii Observationis (s) veniat in mentem: qui in decrepita Matrona facculum deprehendit, in quem se tunica intestini Duodeni laxaverat, bene multos calculos continentem, quorum si exterius inspectorum descriptionem legas, simulque scias, interius ex circumjectis stratis compactos, & propius centrum ex stratis radiatim pergentibus, quas inter disiectae erant albae splendentesque particulae; facile pro bilariis habeas. Et tamen genitos in eodem intestino cum Chomelio agnoscas, necesse est, nisi forte de duobus quae dicam, alterutrum malis. Scilicet aut eum facculum cum bilis Communi meatu qua inter ejus intestini membranas oblique fertur, communicasse, ab illoque calculum primo unum, deinceps alios qui membranas aucto suo pondere laxaverint, accepisse; aut primum illum calculum statim atque e meatu intestinum lubierat, in hoc quacunquae de causa subituisse, & tunicas gravando, urgendoque extrorsum, deorsumque, sibi, & insequentibus aliis calculis facculum parasse. Sed et utramque explicationem confirmare fortasse posses, illam quidem exemplo facculi in quo ejusdemmodi lapilli erant ac in cysti, qui facculi Solertissimo Galeatio (t) ibi esse visus est ubi Communi bilis meatus jam prope finem pervenerat suum; alteram autem explicationem non alio auctore, quam Chomelio ipso, quippe facculi efformationem haud aliter repente a calculo in Duodeno intestino genito, quam tu a calculo in hoc illo: et si, inquam, haec posses fortasse dicere; nolim tamen, te nimis videri suspicacem.

25. Atque utinam ad cysticos ab intestinorum calculis internoscendos, ut sane utilia sunt, ita satis omnino essent quae censuit Reverhorstius (u). Proba horum calculorum, inquit, id est, an revera calculi ex vesica fellea sint, necne, est quod bilis calculi igni admoti, flammam non tantum concipiunt, sed & in aquam projecti minime funduntur, sed eadem supernatant propter bilis particulam oleasam, hos lapillos componentes. Verum ut de ceteris bilariis calculis hic non quaeram, an sic a cysticis distinguantur; certe Bidlous (x) cum paucis post annis scriberet, calculos ex bile oriundos aquis innatant, atque igne, cujusvisque sint coloris, figure, & magnitudinis, comburendos existere, continuo haec addidit, ut plurimum autem: quam additionem an quisquam de multis illa ejus verba producentibus, aut indicantibus animadvertit, haud satis scio; me quidem fateor, non ante hoc tempus animadvertisse. Praeterea; ut de levitate prius dicam, de inflammabilitate postea dicturus; Scheffelius (y) admonet, Reverhorstium a Valentino resutari tum calculo simili aquae non innatante, tum agagropilis aqua innatantibus, licet non in cystide generentur. Sed & plurimis ante hos omnes annis Ottonem Heurnium (z) tradentem lego, tres in cysti fellea inventos ab se calculos aquae injectos non natasse, ut multi scribunt, sed sublevisse. Scilicet alias (a) a me nominatos designabat Fernelium, Riolanum, alioque, in quibus etiam fuit Hollerius (b). Quos, & Reverhorstium nihilominus sequi homines vel Praestantissimi diu perreperunt, quos inter satis est Ruyschium (c), & Bergerum (d) nominasse; nec desunt adhuc qui sequantur, hos calculos fine ulla exceptione, innatant in aqua, scribentes. Et sane experimenta illis sic respondebant: quemadmodum & aliis vel tunc vel postea, ut Cumrado (e), Tremelio (f), Treuio (g), Edimburgensibus (h), aliis. Quibusdam vero minime responderunt, ut Jo. Conrado Fabricio (i), aut partim non responderunt, partim responderunt, ut Lancisio (k), qui decem aqua & vino subsidentes vidit, eisdemque aceto innatantes, ut Weitbrecht (l), qui totidem e cysti exentos, statimque aquae injectos, aqua specificae graviores, siccatos autem leviores deprehendit. Ego vero cum primum nonnullos (m), deinde plures in aqua descendere, animadvertissem; quaerere institui, num ad certa quaedam capita exceptio-

nes possent revocari. Sed cito intellexi (n), exceptio-nem a colore non posse reperi. Quasi igitur, num aliunde. Verum ex illis observationibus quas cum Schroeckio communicavi (o), proclive tibi erit percipere, quam difficile id sit in tanta non solum inter diversos, sed inter eosdem calculos, si modo tempus, aut aliud ali-quod mutes, varietate. Tamen cum ea quae semel, atque iterum hac de re scripsi, perlegeris; quaedam non inutilia cognosces ad praepropera de sede in qua obliti calculi concreverint, judicia coerenda; nonnulla quoque invenies quae postea ab illustri etiam Medico, siue is mea legerit, siue non legerit, ad eundem fere modum sunt adnota-ta. Quaerenti autem tibi, unde sit, ut alii ex his calculis innatent, alii subsident, num quia plus illis, his minus insit oleosarum particularum, quae siue ob certam figuram plura inter se spatia relinquentes, siue aliam quamlibet ob causam solent, ut olea passim, resinasque videmus, supernatare, an quia primi, quacunquae ex materia fiant, plura quam alteri, interspersa habeant ejusmodi intervalla, aere videlicet plena, cujus immanem sane copiam cysticis lapillis contineri, Cel. Hallerus (p) credit ex Halesii obser-vatione; id tibi igitur quaerenti non displicebunt fortasse quae de emissis, aut ad eos adherentibus in aqua bullulis observavi, si quid forte ad illorum praesertim re-ditum explicandum facerent qui primum delapsi, mox se in supremum locum restituerunt, aut restitueri nituntur. Observationes autem meas cum iis conferre juvabit quae de bullis ad immersa alia corpora adherentibus, earumque ad tollendum vi attingit olim Stancarius meus (q), multo autem copiosius Petitus Medicus (r) est persequutus. Quem dum leges, illud etiam discies, quid calor ad-ditus aquae possit ad efficiendum, ut quae alioquin super-natarent, descendant: quae res, ad felleos calculos trans-lata ostendit aliam insuper causam, unde experimenta va-riare possint, faceretque adeo, ut suspecta mihi essent il-la quae frigidis anni temporibus fere habui post editam Epistolam Anatomicam I. nisi in tepida habuissim, non in fervente.

26. Cur vero inflammabiles sint, manifestum est, quam ut inquiri nunc debeat. Qua de eorum proprietate men-tionem factam esse, non memini ante Cortesii (s) tem-pora, qui experientia, inquit, compertum est, lapillos in folliculo bilis enatos, pinguedinis instar cremari. Quis deinde id commune esse illis omnibus, affirmaverit, quod nonnulli etiamnum credere videntur; quis ut plurimum dum-taxat verum esse, admonuerit, indicatque esse paulo ante (t). Quae autem mihi varia sunt in variorum combus-tione observata, & quos concipere, alere, & fervere flammam; quos secus viderim, cum in Adversariis (u), & Epistola illa Anatomica (x), tum in extrema altera quam ad Schroeckium dedi (y), praescriptum est. Ex quibus cum alia, tum illud praesertim intelliges, quae circa omnes, certa etiam ad speciem naturae, a Celeberrimo quodam Medicinæ Scriptore tradita sunt, de omnibus in quibus is fecit periculum, non de omnibus in quibus ego, alique fecimus, esse accipienda. Scilicet sub eadem externa specie alia in aliis calculis particularum ex quibus constant, natura, & numerus latere potest: imo aliquando ne latet quidem, si diligentius inspicias. Viro Illustri Hallero (z), cui tot, & tam varios exmentos cysti calculos non in aquam conjicere, sed flammam placuit ad-movere, accidit, ut praeter eos quos calcarios vocat, reli-liqui omnes flammam conciperent, in his nigri quoque. Sed num etiam intus nigri? Certe nigros Historia II. X. XI. describens, in hac, itemque in X. non nisi ex-teriori crustam, non nisi corticem memorat quae nigra fuerint; in II. aut de cutis cortice extremo, tenui, nigro, suc-cessisse, ait, biliosam flavedinem. Aliam igitur ex accu-rata descriptione fuisse, intelligis, naturam eorum qui, experiente ipso, flammam conceperunt, aliam illorum quos non modo exterius, sed interius quoque, aut praesertim interius nigerrimos, flammam scripsi aut non con-cepisse, aut non servasse, per quae potissimum experi-menta vulgo notum factum est, esse cysticos quosdam calculos non inflammabiles. Hisque alios quamvis non nigros, postea adjeci, quos hic non est opus commemo-rare.

27. Post longum adeo sermonem de his calculis factum pra-

(1) Obs. 44. cit. supra ad n. 19. (m) Commenc. Litt. A. 1734. Tab. 4. Fig. 5. (n) De Facult. Anat. Lect. 2. (o) Obs. modo cit. (p) Op. Posth. (q) l. 2. S. 1. Obs. 74. (r) l. 2. Anat. Praelect. 30. (s) Ill. Animad. 28. (t) l. 47. (u) Vid. supra ad n. 20. (x) Eph. N. C. Cent. 9. & 10. Append. I. Obs. 35. (y) Commenc. Litt. A. 1734. Hobb. 28. n. 2. (z) Ibid. Hobb. 36. n. 2. (a) Tab. 1. Fig. 26. (b) Diff. de Mor. Bil. Tab. 2. Fig. 3. (c) De Lapidib. &c. c. 11. (d) Op. Posth. (e) l. 46. (f) l. 18. (g) Ibid. (h) Opusc. Pathol. Obs. 33. Hist. 7. (i) l. 18. (k) cap. 30. cit. supra ad n. 15. (l) l. 46. (m) Diff. de Cuoelicho Cati. 2. & 3. (n) Ibid. n. 7. (o) Eph. N. C. Dec. 1. A. 9. Obs. 90. Fig. 3. & 4. (p) in Act. Med. Hafn. Vol. 1. Obs. 190.

(q) Supra, n. 23. (r) n. 18. (s) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1710. Obs. Anat. 3. (t) Comment. de Bonon. Sc. Inst. T. 3. inter Medica. (u) Diff. de Mor. Bil. & 37. (x) Vindic. contra Ruysch. (y) Diff. de Lithi. Fell. 5. 14. (z) Obs. cit. supra ad n. 21. (a) Animad. ibid. indicata. (b) De Morb. Int. l. 1. Schol. ad c. 48. (c) Theaur. Anat. 5. n. 32. (d) Physiol. Med. l. 1. c. 14. (e) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 171. ad n. 7. (f) Act. N. C. Tom. 9. Obs. 10. ad n. 23. (g) l. 2. Anat. 1. n. 43. (h) Propemptic. cit. supra ad n. 15. (i) De Subit. Mort. l. 1. c. 20. n. 4. (l) cit. supra ad n. 17. (m) Epist. Anat. 1. n. 43. (n) Ibid. n. 45. 46. (o) Obs. indic. supra ad n. 20. (p) ad Boerh. Praelect. 5. 250. not. 1. (q) Vid. Vallisner. Oper. T. 1. P. 6. (r) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1731. (s) Miscell. Med. Dec. 2. c. 9. (t) n. 25. (u) Ill. Animad. 28. (x) n. 49. (y) Obs. indicata supra ad n. 20. (z) Opusc. Pathol. Obs. 33.

præfertur ut quando e corpore eieci sunt, dignoscantur, jam verba de iisdem habenda sunt cum intra suam latent veticulam, & fieri potest, cognoscendis; ne forte obitum me credas, unde nobis in hanc tractationem ingressus fuerit. Scilicet fuit ab ejus reprehensione qui pertinacem icterum, aut recidivum, certum esse illorum signum, pronuntiaverat. Quanto cautius Fernelius (a), qui nihil aliud ait, nisi tunc *suspectos esse debere*, & ponebat tamen illud in primis, si ductus uterque cystis, id est Hepaticus, & Communis (b) fuisset obstructus. Quod si ne ejusmodi quidem icterus certum lapillorum cysticorum est signum; dici non potest, quantum decepti sint ii qui sine ictero esse illos non posse, existimant. Quam opinionem, in quorundam Medicorum animis adhuc supersit, ut penitus convellamus, confirmare pro certo possumus, cum omnes quorum in cystis calculi ipsi deprehendimus, undeviginti fuerint, quatuor autem in quibus Valsalva, ne unum quidem ex his omnibus regio morbo fuisse infectum. Quoniam autem tres Valsalvæ, & totidem nostræ Observationes ad Epistolas postea scribendas (c) attinent; interea poteris quatuordecim illas quarum alias aliis in Litteris (d) ad te antea misimus, rursus videre, & cum iis tribus conjungere quas continuo subiiciemus.

28. ANUS pauperula cadendo graviter percussa caput. De quo uno ejus omnes querelæ erant quoad vixit; vixit autem non paucos dies donec sensim deficeret. Nulla huic pulsuum inaequalitas, nullum icteri vestigium fuit. Quæ duo cur adnotem, indicabunt illa quæ in corde, & felle veticula, cum aliud agerem, animadverti. Neque enim ut de trimentis ab ictero cognoscerem, cadaver incidere.

CORPUS erat pingue, & cutis tamen prædura. In Thorace nihil mihi quidem occurrit animadvertione dignum; nam eorum qui forte aderant, nonnullis secus visum est de concretione polyposa quam in cordis auricula dextera offendimus albidam, & si dissolvere manu tentares, non leviter resistentem, quasi non ejusmodi crustam sapienter specularetur insidentem misso concretioque sanguini, aut huic femina inaequales, quos ex polypis repetere illi consueverant, fuissent pulsus. In Ventre geminus propemodum apparebat ventriculus; adeo priusquam ad pylori antrum perveniret, se ventriculus repente contrahebat. Cystis fellea femiplena bile, non secus ac auripigmentum, vivide flava; hoc colore tincta erat vicina quæque. In ea bile decem erant calculi dispari quidem magnitudine, sed nullus parva. Cætera quæ ad eos attinent, leges in Epistola ad Schroecium (e); hæc enim ea mulier est de qua ibi tertio loco verba fecimus, ubi, & quando eam fecerimus indicantes.

Indidem cognoscere similiter poteris de femina altera, cujus protinus huc adscribemus historiam reliquam: est enim illa de qua primo loco iisdem in Litteris scriptum est.

29. MULIER superiore paulo minor, annos tamen nata ferme sexaginta, colore non modo non icterico, sed optimo prædita, bibosa, & septies nupta, non alio de morbo, nisi de eo quo confecta est, thoracis inflammatione quæta, cum a nobis non ob morbum, sed ut ventris rimaremur viscera, confeceretur, nonnulla in genitalibus, sed magis in bilis veticula offendit non indigna quæ huc transcribantur. UTERUS exterius in summo fundo tuberculum habuit figura, & magnitudine minoris avelanæ, ex parte prominens, ex parte intra uteri substantiam latens, scirrhusa duritie, colore intus extraque albo, ex particulis confans multiplicibus quæ contractas in se cellulas quodammodo referebant. Intra uteri autem cavum ex media fundi anteriore parte quadam extabat mollis, & pene gelatinosa excrescentia. Etsi vero testes, sicut ætas ferebat, frigidi erant, & perangusti; cervix tamen uteri, & vagina aliter apparere, quam in septem virorum uxore expectasses. Nam multæ in hac erant rugæ & extantes vel ad ipsius longitudinis medium; in cervicæ autem figura ad virginem accedens, & valvulæ in altero latere conservatæ, ut per paucorum liberorum parentem fuisset, crediderim, quod exiles ad imum abdomen rugæ confirmabant. Quod vero ad felleas veticulam attinet, etsi multo hæc erat brevior quam pro jecinoris, fani alioquin, magnitudine; neque enim ad hujus limbum illius fundus perveniebat, imo duos ferme distabat digitos; tamen cum bile pauca, & flava continebat calculos saltem trecentos triginta, quos multo maxima ex parte fuisse exiguos, proposita cystis brevitas satis per se ipsa indi-

cat. Reliqua de his calculis observata qua in Epistola scripserim, paulo supra (f) dictum est: quanquam cum plura, nec levia in ea describenda peccaverint operæ typographorum, tum in ea potissimum parte plus versu integro omiserunt. Præter tot quot diximus calculos, cystis cavum occupantes, unum inter tunicas latentem scalpellulo retexi, nigro colore, & parvitate eorum simillimum quos in cystis glandulis alias a me inventos supra (g) commemoravi; hic tamen glandulæ osculum non ita evidenter patebat.

30. SUTORIS perennis, eoque jam propemodum omnino edentuli, ætate, & catarrho intra biduum, an triduum, sine febre, ut aiebant, confecti, sine ictero certe, ut ex cute candida manifestum erat, cadaver illatum est in Gymnasium sub Januarii finem, me Anatomendo cente A. 1744. Cum igitur ibi totum fuerit diligenter confectum, quidquid præter naturam vidi, hic referam, ab iis oris quæ novissime observata sunt. CRANII fornice difficulter avulso ob Crassæ meningis adhaesionem sic ut lamina hujus exterior affixa ad os frontis remaneret, cerebrum inventum est, ut cerebellum quoque, mollius, & in substantia medullari subfufum: ejus tres ventriculi aqua pleni pellucida & pura: Choroides plexus pallidi: Pinealis glandula in mediocri usque acini formam, & magnitudinem ab aequo, ut videbatur, humore, a quo mollissima erat, distenta: Pituitaria autem, si desuper inspiceres, contractam & subsidentem videres. Arteriarum quæ per cerebri basim feruntur, & trunci, & rami, quanquam non ut sanguiferæ intra ventriculos vasa, distenti sanguine, imo inanes erant; tamen æquo latiores conspicebantur. In Thoracis cavo aquæ turbidæ, & fuscæ copia modica. Pulmones ad dorsum concidentes, quippe omnino fere a pleura sejuncti. Ut cor æquo amplius, sic & truncus Aortæ latior. Huic autem præfixæ valvulæ ad aggeres, ut Valsalva appellabat, offerebatur; quin unius ipsius alterum latum ex ossa constabat squama. Cum vero interius per universum Aortæ truncum, ramosque ipsius Iliacos albedo multo sæpius hic illic quam ossæ brachæ, propagaretur, harum unam vidi in curvatura, alteram prope Lumbarem par tertiam, utramque non parvulam, & membrana hinc arteriæ intima, inde carneis annularibus fibris interceptam: quin verum os etiam fuit ad Iliacæ alterius in Externam, Internamque divisionem. Præterea cum ipse Aortæ truncus insita Emulgentes inciperet finistrorsum se flectere, prius autem quam Iliacas promeret, dextrorsum iterum redire; idem vitium in Iliacas adeo pergebat, ut cerebri flexionibus Splenicam propemodum arteriam referrent. Sed & Carotides, & Vertebræ eodem hoc vitio non omnino erant immunes. Quæ ramorum quoque flexiones fecerunt, ne descriptam modo trunci incurvationem prorsus imputarem contiguis lumbærum vertebraarum exostosis, quæ ex hoc modo habebant. Crassa illa ligamenta quæ inter earum vertebraarum corpora se interponunt, omnia, si infimum excipias, anteriore facie, ad utrumque præsertim latum, æræ instar bulla ita prominebant, ut transversum minimum digitorum ex dextera, sinistræque prominentiæ ferme æquarent. Sinistræ omnes prominentiæ (an quod prius quam dextera, cressissent?) erant ossæ. Dexterarum autem ea tantum quæ intervallo respondebat inter vertebra tertiam, & quartam, ossæ esse videbatur; nec erat tamen; sed lamina ossæ quæ superficiem faciebat corporis vertebra quartæ, extabat, seque ita extans, sursum producebat, eamque prominentiam crusta ossæ operiebat: sub qua crusta servabatur prominentis ligamenti natura. Sinistrarum prominentiarum cum unam scalpro, continuatam autem ligamentum cultro in transversum diffecissem; lineæ quidem illæ concentricæ ubi solent; sed luro, & quasi cinereo colore infecta omnia apparuerunt. Ad Ventrem tandem quæ pertinent reliqua, nobis hæc observanda præbuerunt. Omentum annexum erat a dextris tum ei parti intestini Coli quæ proxima hujus initio est, tum vicinis ei parti intestinis Tenuibus, & peritoneo. Ventriculus non solum angustior; sed minus bona figura præditus. Pylori autem annulus duobus in locis nonnullum tumebat. Prope alterum orificium intus in ventriculo subrotunda quædam, & parva quasi glandula extabat, quæ dissecta pro tumore cystico agnita est; ut pote qui ex substantia fiebat quidem alba, firma, & in unum corpus ejusdem figure compacta; sed id corpus a continente membrana facile se jungi potuit. Proximum autem tumori illi orificium ventriculi, id est stomachus, erat amplissimum, ut

con-

continuata quoque gula ad quatuor saltem supra ventriculorum digitorum altitudinem, quo toto spatio intus erat, quam reliquo, rubicundior. Quin etiam foramen, in septo transverso ad eam transmittendam apertum, multo quam soleat, in latitudinem præsertim, amplius vidi, & superiore extremo recta in transversum linea, non angulo, terminatum. Cum eam omenti partem quæ ventriculo adnata est, diligenter inspecerem; animadverti a sinistris haud procul ab hujus fundo, glandulæ instar, exiguum quandam lienem, ab omento, in quo erat, sanguifera vascula accipientem, colore, tunica, substantiæ modo, nisi quod hæc erat paulo humidior, lienis simillimum, ea autem figura, & magnitudine, ut cum mediocri gallinæ plene posset comparari. Præter hunc quasi ab adherentibus minimis aliis superficie. Si tenuissima quædam puncta excipias subflavi coloris per hanc disjecta; omnes intus, extraque pernigri, nec colore modo, sed ipsa quoque substantia carbonem referentes. Hi postquam siccati sunt, per se plerique in fragmina abierunt. Antea autem etsi leves esse videbantur, qui in aquam coniecti sunt, fundum continuo petierunt: qui vero ad flammam admoti, neque hanc ullo modo conceperunt, neque ulla ex parte liquari poterunt. Minorum unus illic fuerat ubi se veticula in ductum jam contrahit; neque tamen ubi segressus obliterat, ut veticula, prorsusquam inciderimus, compressa, animadvertimus. Denique cum in renibus nil esset adnotatione dignum; aperta vesica urinaria, in posteriore ejus facie supra orificium alba quædam apparuit, exigui instar inversi pyri, protuberantia aliquanto major quam erat caruncula feminalis, ad quam usque se producebat, in exilem tamen humilemque lineam contracta, ima illius protuberantia pars, quæ intra urethræ initium prominens, cum Prostata glandula continuabatur; ut cum ex eadem, ex qua hæc esset, substantia, quin Prostata excrescentia esset, nemini ex illis qui in earum partium dissectionibus magis exercitati aderant, esse dubitandum videtur.

31. Utinam sciti quæ in toto erant hujus Senis corpore præter naturam ob id saltem ne quædam te fugerent quæ nonnunquam occultæ esse possunt non levium fortasse morborum causæ; sciti, inquam, illa adnotavimus, ita quinam in vivo plerorumque eorum effectus precessissent, nos minime lateret. Sed illud in præsentia scire satis est, cum eos calculos in cysti haberet; ictericum tamen non secus ac descriptæ mulieres, & tot alii supra (b) indicati, non fuisse. Quod si uni mihi sic observare contigisset; facile sinerem, qui contrariam adhuc sovent opinionem, illud negligere, aut dissimulare. At præter similes quas alias (i) produxi, Hominum Gravidarum Observationes, & Valsalvæ illas quas indicavi (k), tot supersunt alia, ut omnes me enumerare posse distidam. Quasdam igitur satis fit ad priores illas addidisse. Lælius a Fonte (l) senis Episcopi vesicam felleam repertam fuisse levibus lapidibus repletam, scribit, & tamen nunquam icteritia fuisse detentum. Eadem prorsus de Vetula quadam testatur Pechlinus (m), & de muliere quæ Lipsiæ capite mulcata est, Ettmüllerus (n), cum in folliculo fellei copiosos gereret lapides majores, & minores, Vallisnerius autem noster (o) se nunc plurimos felleos calculos, nunc unum magnum in plurim cadaveribus deprehendisse qui nunquam fuerant arquati. Bæumlinus (p) quot cystis calculos in ea repererit in qua icterici quid non apparuerat; quot Fabricius (q) in ea quæ ad sensum erat sana; quot denique Hallerus (r) in alia quæ sanissima videbatur, itemque in vetula in qua icteri nulla signa, videre per te poteris: nec vero suspicaberis, in tot aliis ipsius historiis in quibus nulla icteri mentio est, hunc fortasse non defuisse, quando animadvertis, ubi illarum summam colligit (s), scribere, hos calculos plerumque absque ictero esse, per experimenta sua constare. Cæteros, & in his Vaterum (t) scias omit-

to, cum ad eos quos nominavi, non illos tantum addere oporteat quos infra (u) adducam testantes, secum iis calculis nullam prorsus noxam conjunctam vidisse, sed illos etiam qui cum incommoda reliqua describant, aut memorent eorum in quibus cystici fuerunt lapilli, icterum, quod vitium in oculis ultro incurrisset, omnino prætermiserunt, in quibus noli credere, tantummodo esse Reverhoritum (x), Contulura (y), Riedlinum (z), Hofmannum (a), Bassium (b), aliosque ex magis recentibus. Sepulchretum dumtaxat versa. Invenies Bonerum (c), Mortonum (d), Greisium (e), Kentmannum (f), Huldebrechtium (g), Cnoffium (h), alios; neque enim tempus mihi est ad omnes singillatim indicandos, quos cum legerem, non potui existimare, morbum regium, si suos infecisset ægros, fuisse facile præterituros.

32. Quid ergo est, inquis, quod plurimi vicissim testes vel in Sepulchreto ipso producantur, qui cum cysticis lapillis hunc conjunctum morbum viderunt? Non ideo certe quod his positus, hic quoque necessariò poni debeat. Sic enim vidissent omnes. Igitur ob causam aliam aliquam. Exempli enim gratia; ne a Sepulchreto recedamus; habes in Helwigii Observatione (i) icterum cum iis calculis; sed etiam cum hepate marcido, & putrescente: habes illos quoque in Vesalii (k), & Verzaschæ (l) Observationibus; at simul jecur magnum, durum, & viride, aut scirrhusum, flavum, exsangue. Est alia pro hoc vitiorum genere aliud vitium, ut cum Beckerus (m) calculos non modo in vesica fellea, sed pariter in poris choledochis repertos proponit. Alias vero utrumque est. Sic Deodatus (n), & Dobrzenficus (o) tum durum jecur, tum calculos simul in cysti, simul in iis ductibus fuisse, referunt. Mirum autem non potest, materiam bilis ad regium morbum faciendum in sanguine remanere, cum illam jecur aut fecerere, aut secretam, ne reliquæ secretionem prohibeat, extra se mittere non potest. Huc autem referendam esse illam quoque veterem Observationem (p) in matre habitam Professoris Bononiensis, facile intelligeres, si integra proferretur. Tu vero hanc, ut illam Vesalii quam paulo ante indicabamus, bis in una eademque Sectione legas oportet; est enim (quis a primo crederet?) ista ipsa quæ infra (q) etiam ponitur: quod facile cognosces, utramque inter se, & cum ea conferendo quæ in Sectione alia (r) proposita fuerat, vel potius cum illo a quo habita est Coitero (s); etsi enim toties repetita est in Sepulchreto; semper tamen neglecta fuit Auctoris dubitatio, minime alioquin prætermittenda; neque enim scripsit *regio morbo laboravit*, sed *regio, ni fallor, morbo laboravit*. Vides igitur, producta testimonia infirmari, si quis recte attendat, eorumque simul numerum minui, cum quæ erant singula, bis, quasi gemina essent, in medium allata esse, ostenditur. Sic & Timæi iteratam Observationem (t) deprehendimus: non secus ac Guarinonii (u), & aliorum fortasse: verum in nulla magis mireris, quam in ea Fontani (x), quæ cum modo esset prolata sub numero XXII; continuo una eademque, vix aliquot mutatis verbis, sub XXIII. proponitur. Sed tamen ultima duæ Observationes alio, non ad lapillos cysticos, spectant cum ictero quidem, sed cum gravi simul aut jecoris vitio, aut biliariorum canalium obstructione conjunctos, quo attinent priores illæ, atque alia quædam multo recentius vulgatæ. Quorum aliqua si proferatur, facile alia etiam ratione infirmari possit, ut cum Vaterius (y) Matronam scribit, cujus in cysti triginta calculos invenit, ictero laborasse. Hoc enim fatemur; sed illud quod continuo subicit, simul attendimus, ab ictero liberatam annos tres circiter & viginti integra usam esse valetudine, & tandem apoplexia interentam. Nam si ob id tantum quod calculi jam tum in cysti laterent, ictero illo prehensa esset, tam longum postea trium & viginti annorum spatium, quo non modo latebant illi, verum etiam augebantur, sine ictero non exegisset. Ejusmodi & illis responsum dabis qui objicerent Weitbrechtii (z), & Galeati (a) Observationes. Uterque enim post regium morbum, olim prægressum, calculos in cysti deprehenderunt: quanquam illud quoque respondere potes, a primo simul jecur sub-

(a) Patholog. l. 6. c. 5. (b) Vid. ejusd. Physiol. l. 1. c. 7. Vid. etiam infra n. 33. (c) Vid. Epist. 38. n. 35. Epist. 49. n. 3. Ep. 56. n. 7. 9. 31. Ep. 57. 10. (d) Vid. Epist. 3. n. 4. Ep. 4. n. 13. Ep. 5. n. 6. & 19. Ep. 21. n. 2. 39. & 36. Ep. 24. n. 16. Ep. 26. n. 21. Ep. 27. n. 2. Ep. 30. n. 14. Ep. 34. n. 25. Ep. 35. n. 16. Ep. 36. n. 4. (e) Vid. in Afr. N. C. Tom. 2. Obf. 167. (f) n. 28. (g) n. 21.

(h) n. 27. (i) Epist. Anat. l. n. 50. 51. (k) supra, n. 27. (l) Consult. Med. 139. in fin. (m) Apud Scheffel. Diff. supra ad n. 13. cit. §. 16. (n) Præz. l. 1. S. 17. c. 3. art. 4. (o) Adnot. cit. supra ad n. 13. (p) Diff. supra ad n. 16. cit. thes. 9. (q) n. 38. & seq. (r) Opusc. Pathol. Obf. 33. Hist. 7. & 11. (s) Ibid. Hist. 10. (t) Diff. supra ad n. 16. cit. thes. 9. (u) n. 38. & seq. (v) Diff. supra cit. ad n. 16. (g) loc. supra ad n. 23. cit. c. 25. (x) Eph. N. C. Cent. 3. Obf. 45. (a) cap. supra ad n. 15. cit. Obf. 1. (b) Dec. 4. Obf. Anat. 9. (c) l. 2. S. 4. Obf. 35. (d) S. 7. Obf. 43. (e) S. 11. Obf. 46. (f) l. 3. S. 7. Obf. 33. (g) S. 14. Obf. 36. (h) S. 17. Obf. 14. §. 5. (i) Ibid. S. 7. in Additum. Obf. 1. (k) S. 18. Obf. 8. §. 4. cum Obf. 20. (l) Ibid. in Addit. Obf. 6. (m) Sect. ead. Obf. 8. §. 1. (n) Ibid. §. 10. (o) S. 16. Obf. 5. (p) S. 18. Obf. 8. §. 5. (q) Ibid. Obf. 25. §. 6. (r) S. 8. Obf. 36. (s) Obf. Anat. (t) S. 18. Obf. 8. §. 11. & Obf. 35. §. 4. (u) Ibid. Obf. 33. & in Additum. Obf. 5. (v) Sect. ead. (w) thes. 9. cit. supra ad n. 23. (x) cit. supra ad n. 17. (y) cit. supra ad n. 31.

subdum esse deprehensum; ab altero durius, multisque tuberculis refertum; ut ea fileam quæ supra (b) attigi, unde intelligas, alios lapillos alio olim fuisse loco, ut bilem tunc subire intestinum facile prohiberent.

Ad illa autem exempla in quibus non modo prægressus, verum etiam præfens icterus cum cysticis calculis erat conjunctus, ut Lanzoni (c), Verneyi (d), Swietenii (e), Halleri (f), aliorumque Cel. Viro- rum, siquis forte opponat; satis ex iis quæ paulo ante dicta sunt, habes quod referas. Primus enim simul multis hydatidibus oblitum confexit jecur; alter dimidia ex parte adeo exsiccatum, ut pollicis crassitudinem non æquaret; tertius luridum, durum, exsuccum, ... scirrhalis tuberculis asperum; quartus denique cum in tot historiis duas tantum exhibeat ictericorum, secundam, & nonam, in illa idem viscum proponit morbidum & ulcerosum, in hac magna ex parte putridum cum vesicula fellea tota consumpta, ut in media purilagine calculus repertus sit. Suspicio autem, si quorundam aliarum, quæ proferuntur, Observationes non obiter scriptæ, sed pari diligentia & habita, & tradita essent; futurum fuisse, ut præter cystis calculos, sæpe alias simul in vicinia, & præsertim in hepate, intra quædam, nisi perquiras, latere etiam possint, læsiones compertas legeremus. Producentur etiam aliquando Observationes minus recentes, sed vel minus, ut verum fatear, ad rem facientes, ut puta Dominici nostri de Marchettis (g), quasi icterum a cystis calculis vidisse se, diceret. Ille vero cum ait, obstructa vesicula ab aliqua materia aut lapide (aliquando enim inveni in ipsa vesicula tres, aut quatuor lapides magnitudine cicoris) ictericia flava excitatur; lapides quidem ab se ibi inventos dicit; sic autem ut tunc vesiculam obstrueret, & icterum propterea faceret, profecto non dicit.

33. Verum sepositis ob animadversiones illas quas hætenus indicavi, his omnibus Observationibus, aliisque earum similibus, cum quædam resistent, ad quas nihil fortasse possit istorum dici; quæres ex me, quæ ratione aliquando calculi vesicæ arquatos facere homines queant, & num illa qua Marchettus, aliique existimant, si vesicam, aut potius ejus proprium, id est Cysticum ductum obstruant. Nam sine ictero obstructam ipsam fuisse, constat vel ex iis Observationibus quas supra (b) commemoravimus, cum videlicet plena erat lapillorum. Quamquam autem cum plena his esset, nihil bilis possit emittere, & quod consequitur, res eodem redeat ad ejus meatus effectum oclusum; tamen ut tibi satisfaciatur, oculi illius meatus Observationes sine ictero infra (i) profertur; hic autem illud duntaxat quod supra (k) indicatum est, ad memoriam revocabo, non Cysticum, sed Hepaticum, & Communem ductum illas esse vias per quas bilis ab ipso jecinore ad intestina amandatur, ut nisi hæc viæ aut excrecentia, aut constrictione aliqua, aut viscidæ crassæque materia, aut calculis sive in ipsis viis, sive in hepate, sive etiam in cysti genitis, sed in eas vias extrusis, impediatur, non possit biliariorum quidem meatuum causa bilis in hepate, ideoque ejus materia in valis sanguiferis ad regium morbum efficiendum retineri. Cavendum autem est, nequando in veterum Observationum vocibus quibus ad Hepaticum, aut Communem ductum significandum utebantur, erremus, non hunc, sed Cysticum intelligentes. Ipsi enim utrumlibet illorum ductuum pro cystis meatu, ut antea (l) quoque indicavimus, Fernelii locum explicantes, quemadmodum ferebant dogmata eorum temporum, accipiebant, Cysticum autem ductum, quantum apud Mundinum (m) videre est, colli vesiculæ, non porum, aut meatus, aut ductus vocabulo designabant. Itaque cum apud Donatum (n) leges, Albucasim docuisse, & confirmasse Nicolium, in meatu vesicæ felleis oriri carnem excrecentiam, quæ illam obturando insanabilis ictericia est causa, tamen a me quoque olim fuisse, dixi (o) in ipsa vesicula deprehensam; noli tamen facile credere, in hac, aut in Cystico ductu ortam ab illis eam intelligi de qua loquuntur, quippe quæ aliud quam vesiculam, si reapse erat icteri causa, obturabat. Sic cum Gentilis, quemadmodum supra (p) indicatum est, se lapidem, scriptis, in poro vesicæ felleis, seu meatu adinvenisse; quid hoc nomine accipias, vide. Te cautum reddet Sepulchreti ipsius lectio, ubi (q) Camenicensis sic ad Matthiolum scribit, meatus ille qui ex folliculo felleis in he-

par est, liberrimus erat, id est Hepaticus ductus. Dixit autem paulo ante, ille meatus qui ex folliculo felleis in intestinum desinebat, lapide obstructus erat: quem non Cysticum fuisse, sed Communem, præter ea quæ dicta sunt, illud quoque tibi indicabit, quod folliculus felleis in illo icterico plenissimus erat bile. Neque aliter accipies in Coiteri Observatione (r) verba illa, in meatu a vesicæ bilis ad duodenum ictericæ magnus calculus, qui eum meatus undequaque obstruxerat, præsertim cum ab ipso (s) folliculum felleum alibi ita descriptum animadverteris, ut nulla Cystici mentione facta, duos dicat obstruisse poros, alterum per quem ex hepate bilem trahit, alterum, per quem ex se bilem in duodenum intestinum transmittit. Scilicet præceptoris Falloppii (t) dogmata in eo quidem secutus est, ut Cysticum ductum non fecus ac Veteres illi, pro vesiculæ cervicæ haberet; non in eo tamen ut ab hepate ad intestinum uno, eoque recto, meatu deferri, bilem, agnosceret, cui meatus medio in ductu natura vesicæ cervicæ implantaverit.

34. Non Cysticum igitur, sed Hepaticum ductum, quem unum agnoscentes, clarioris dumtaxat doctrinæ, & consuetudinis gratia in Hepaticum, & Communem dividimus, sive excrecentia, sive calculo, a Falloppio (u) quoque ibi sæpius observato, sive crassa viscidæque materia, sive alia ratione impeditum requiramus, ut viarum bilis majorum vitio ortum icterum fateamur. Nam & crassa obstrui materia, & bile ipsa posse, non dubitamus qui olim in cane male affecto non Pancreatici solum, sed & Communis ductus finem concreta materia quasi gypsea & subflava oculumque inveniimus, Ettmillerum (x) autem legimus in Lipsiense icterico describentem infimum porum viscidæ pituita penitus obstructum adeo ut post abscissionem hujus meatus bilarii ne gutta quidem bilis profunderet, quia bilis ibi contenta crassissima atque renacissima erat. Sed me hoc loco ate interpellari posse, scio, quærentem, cur igitur Nobilis Gallus, quem Scultetus (y) dissecuit, cum porum bilarium ea parte qua duodeno inseritur, lapillo, pisum magnum adæquante adeo obstructum haberet, ut ne tantillum bilis per eum expurgari potuerit, regio tamen morbo infectus non esset? Ego vero in singulari adeo casu, nisi ad eas confugere velim sanguinis constitutiones (z) in quibus materia bilis, atque adeo bilis ipsa vix illa flavedine potest inficere; singularem quandam bilariam viarum dispositionem subfuisse, dicam, necesse est: qualem videlicet Falloppius (a) bis terve a se videri testatur, Communi videlicet ductu paulo supra intestinum Duodenum in geminum canalem diviso: quam divisionem, sed inter ejusdem intestini tunicas, in duos ramos insignes, separatis oculis intra intestinum biantes semel quoque vidit Abrahamus Vaterus (b). Sic enim osculo altero obstructo, via bilis aperta restat per alterum ad intestina. Esse etiam potuit alius aliquis præter consuetudinem ductu, ut quem in muliere bene habita & pingui, & sic satis valida, cum cystis infarta esset calculus, & oclusa, Bartholino (c) inspectante, offendit Veslingius ab hepate prodeuntem, poro bilario, a calculis quoque confisato, vicinum, qui in jejunum intestinum terminabatur, aut quem Bezoldus (d) ab se visum describit, & pingit Veslingiano similem, modo non ad Communem, sed ad intestina perveniret, aut quos semel atque iterum a Diemerbroeckio ostensos idem commemorat (e) seorsum a Communi inter vesiculam & intestina porrectos; ut magna pars bilis vel recta, vel per illum ferri ad hæc posset. Quas vero continuo subjicit Andreae a Lacuna Observationes, ad eas ex parte attinentes quæ supra (f) a nobis indicatæ sunt, lapidum sine ictero in cysti concretorum, eoque nomine productas in Epistola I. Anatomica (g), si apud Auctorem ipsum potius, quam apud Riolanum legere potuisset; illius maluisse verbis, quam hujus, uti, qui memoria lapsus, tribus in verbis tria retulit cum iis quæ Andreas tradiderat, non congruentia. Sed his missis, ad alia pergamus.

35. Cum supra (h) genera quatuor proposuerim causarum, Communem, aut Hepaticum bilis canales impediunt, trium autem solummodo exempla protulerim; miraris fortasse cur quarti, id est constrictionis illorum nullam produxerim Observationem, Sed mirari defines ubi has Litteras adeo prolixas relegendo, id, quantum li-

cuit, antea (i) factum per exempla quidem ex Sepulchreto indicata, animadverteris. Quod si alia forte aliunde quæris; minime defunt. Illustre est ob ægri personam quod de Andrea Mauroceno, Senatore, & Historico Veneto nobilissimo doctus ejus Medicus tradidit Aurelius Palazzolus (k), Icteri enim quo Maurocenus confectus est, insuperabilis causa fuit viarum constriction; quippe occalluerat ductus qua bilis in primis ad intestina fertur. Meadus autem (l) post icterum pertinacem, eundem meatus vidit qua cum Cystico in unum coit, quasi injecto vinculo ita contractum, ut stylum non caperet, neque ulla bilis portio qua cystis, & jecur distendebantur, posset ad intestina pervenire: ea autem contractio ab scirrholo, atque adeo cancroso proximi pancreatis tumore inducitur esse videbatur. In Actis quoque (m) Cæsareæ Academiæ Ictericæ extat Observatio, cui propter scirrhalum pancreas, erat Communis ejusdem Canalis exitus non sine firma concretionem præclusus. Rariorum igitur causarum, quæ five ex tubo solidum corpus efficiendo, sive extrinsecus premendo Communem bilis ductum confringunt, exempla neque supra, neque hoc loco reticui, idem facturus in constrictionis causis frequentioribus, si harum effectus ut rationi sunt maxime consoni, sic post mortem facile caderent sub sensum. Crispaturas dico spasmodicas, ob quas orificium saltem ductus Communis, aut tenuiorum Hepatici ramulorum pars maxima confringantur: nisi forte huc credimus Cl. Jo. Georgii Maureri (n) Observationem spectare. Vir Illustris post vulnus, minime penetrans, in regione hepatis acceptum, biliosa tertiana febre, & regio morbo, aliisque deinceps correptus, cum evadendi spem præbuisset, & quod ad icterum attinet, ferme jam bene se haberet, mox vehementi, iterata, & longa animi commotione accedente, quam cito repentina faucium, & pulmonum inflammatione excepit, non sine metu, & anxietatibus ob mortem imminente, hanc intra triduum obiit. Habuit autem; ut cætera omittam; intra cystim quidem calculos tres, eosque non parvos, sed & orificium ductus choledochi, totumque hunc canalem ita obliteratum, vel constrictum ut ne minimo cuidam stylo, multo minus bilis guttule amplius concederet transitum. Fuit sane ejus ductus cavum ita constrictum quando cutis flavebat, alvi autem recrementis albicabant, & tandem ac difficile detrudebantur. At certe non erat amplius eo tempore quo cuti erat profusus naturalis florisque color restitutus, faciesque in magna copia, & naturaliter tinctæ prodibant. Veri igitur simile videri potest, spasmodicam constrictionem, quam animi quies, & curatio nuper laxassent, per novas animi ejusmodi commotiones, & lethalia symptomata intra illud triduum rediisse. Utinamque id fuerit, si tu interea quæ de crispaturis dixi quas spasmus faciat aut certos animi affectus consequens, aut (o) ab irritamentis & doloribus cum aliarum, tum proximorum præsertim jeciori Partium excitatus; si hæc, inquam, cum veri similitudine congruere agnoveris, & quod ad irritamenta potissimum spectat, paulisper attenderis; facile rationem illam invenies quam ex me quærebas (p), cur positis in vesicula calculis, regius morbus aliquando nascatur, etiam si nulla alia simul causa sit de tot illis quas supra indicavimus, a qua repeti is morbus queat. Agnitum id olim est a nobis cum scripsimus (q), sive calculi, a me reperi, nondum ea fuerint magnitudine, aut pondere, aut figura qua satis lædi cystis possit, sive eo nunquam compulsi fuerant, ut bilis exitum prohiberent, fieri ob has rationes potuisse, ut in quibus illos inveneram, nullam peculiaritatem, quæ quidem manifesta esset, noxam, sed ne ictericum quidem colorem inducerent. Irritata videlicet cysti aut magnitudine, aut pondere, aut figura præsertim calculorum tunc maxime cum in cervicis angustias coacti, a bile quam sic in cysti retineant, dum hæc a ventriculo, aut intestinis comprimitur, usque & usque magis urgentur, spasmus inde oriri, & contractiones, ac crispaturas, quæ per continuos bilis majores ductus hinc ad intestinum Duodenum, inde vero ad jecur propagentur, visque sic contractis icterum posse fieri, non dubitabamus, ut diserte postea ab Hoffmanno (r) expositum est. Itaque icterus cum tunc solum possit consequi lapillos cysticos, & quod hi tunc irritando faciunt, id facere aliarum, alibi que possit causæ, ipsique animi affectus queant; non erit igitur illæ perpetuum, neque proprium horum lapillorum indicium.

36. Verum si icterus non est; num est eorum aliud aliquod peculiare, & perpetuum signum? Perquam vereor, ne quod Fernelii (s) tempore, id nostro, & posterorum futurum sit, id est, ne manifeste inveniatur nota quibus illi certo ac facile detegi possint; sed, ut de ictero vidimus, in suspicionibus hæreamus. Non me quidem fugit, Cl. Viros fuisse & veteres, & recentes qui has notas laudabili industria animadvertere, cunctisque approbare conati sint. Coiterum (t) namque in primis video suas aliquot horum calculorum Observationes edidisse, ut ex iis addicerentur symptomata, hoc malum sequentia. Verum hæc ad diuturnum icterum, & in una in qua Communis etiam canalis obstructus erat, ad continuum ciborum vomitum reducuntur. Quorum de primo satis superque dictum est. De altero autem, ab aliis quoque commemorato, quam sæpe abis, & a quot prætere causis, & quam variis effici possit, est certe omnibus manifestum. Alii alia addiderunt postea, quæ non sum singula persequutus, quando id quod de vomitu dixi, de colico dolore, aliisque ejusmodi facile apparet esse dicendum. Quid? quod opposita signa proferri, video, ut puta alvi, & adstrictæ, & fusæ. Nec me quidem id movet quod in Sepulchreto (u) hoc alterum vix concipi tunc posse dicitur: bilem enim, lapide totam vesicam implente, omnem ab hepate jugiter ad intestina defluere, intelligo, eaque, si acrior forte sit, vehementius stimulare. Sed illud dumtaxat noto, si modo unum, modo alterum; id quod non diffiteor; verum est; neutrum igitur perpetuum, & peculiare horum calculorum signum esse posse.

37. Sed communibus his missis, si quæ per se calculus facere possit, quæramus; ad ea ferme redibimus quæ scripta esse a nobis in I. Epistola Anatomica, paulo ante (x) memoravimus. Calculus ex se ipso, ut ait Boerhaavius quoque (y), dum quiescit, nihil mali facit, nisi ponderis sensum, sed irritat mole, pondere, asperitate. Hæc quæ ipse de urinario dicit, si ad felleum transferamus; credisne, ponderis sensu se proditurum qui levior urinario sit, & sensum augeatur? Diu igitur expectandum erit, dum majus denique pondus acquirat. At signum quo tandiu, & plerisque in casibus semper carebimus; eritne tandem tunc saltem sensibile, & extra dubitationem positum? Sensibile profecto erat in Comite de quo Hildanus (z), quippe a multis annis, quotiescunque in lecto se se ex una in alteram partem circumvolveret, pondus magnum, molestum, & ex una in alteram partem delabens, e regione hepatis percipere poterat. At calculi ejus ingentes pendebant duodeviginti drachmas cum semisse, idque exsiccati; nam recentes multo erant graviores. Num tamen graviores fuisse, putas, quam tot illos simul inventos a Greffelio, (a), qui universi drachmas pendebant triginta? Virum autem illum, in quo invenit, id pondus unquam percepisse, non adnotavit. At enim eum sensum obfcurabat fortasse immanis in illius ventre pinguedinis copia. Num ergo omnes fuerunt pinguiissimi in quibus grave calculorum pondus repertum est? Præpunguis sane haud videtur mulier (b) in qua calculorum pondus æquabat drachmas viginti quatuor, ut neque Sacerdos (c) in quo viginti, nec Vir Illustris (d) in quo pendebant ferme tantundem. De horum tamen nemine legitur; imo de nemine eorum quibus vesicula calculis prægavata esset, quod de illo Comite, legisse memini, dum se in lecto circumvolveret. Ad quem respexisse, temporum spectata ratione Stiebertum (e) crediderim, cum ejusmodi Observationi alteram objicit lapillorum plusquam ducentorum in viri ejus cysti qui de dolore gravatissimo dextri lateris nihil unquam conquestus fuerat. Sed fac, plures de eodem illo sensu de quo Hildani Comes, fuisse conquestos. At fac simul illorum tibi faculorum veniat in mentem, qui calculis graves a jecinore pendebant (f), aut ipsius etiam felleæ vesiculæ quæ ingenti copia bilis crassissimæ non semel reperta est mirum in modum distenta. Intelliges sane, ad eundem locum eundem sensum non a calculis solum, & si a calculis non ab iis tantum quos fellea vesicula includat, aliquando esse posse. Iisdem autem, aliisque exemplis etiam distentionem, quam non æger modo, sed & Medicus, admota ad eum locum manu, percipiat, & quod consequitur, molis calculorum effectum, horum notam ambiguum præbere, manifestum est. Asperitas restat. Quam primum dico, ut de pondere jam dixi,

(b) Ibid. (c) Eph. N. C. Dec. 3. A. 3. Obs. 36. (d) cit. supra ad n. 13. (e) ad § 950. cit. supra ad n. 13. (f) Opusc. Pathol. Obs. 33. (g) Anat. c. 4. (h) n. 31. (i) n. 39. (k) n. 10. (l) n. 17. (m) Anat. ubi de Kythell. (n) De Med. Hist. Mirab. l. 5. c. 3. (o) supra n. 20. (p) n. 15. (q) l. 3. S. 18. Obs. 8. §. 12. (r) Ibid. S. 8. Obs. 36. (s) Tab. Intern. hum. corp. Part. (t) Obs. Anat. (u) Ibid. (x) aut. supra cit. ad n. 31. (y) Obs. cit. supra ad n. 18. (z) Vid. supra n. 9. (a) Obs. cit. (b) Differt, qua nonnulli bilis diverticulum &c. lib. 7. (c) Cent. 2. Hist. Anat. 54. (d) Diff. de Cholera §. 6. & Fig. 1. litt. f. (e) §. cit. (f) n. 31. (g) n. 50. (h) n. 33.

(i) n. 10. (k) Vide in Adnot. a Cathar. Zeno additis ad Vitam hujus Mauroceni ab Nic. Crafft scriptam. (l) Monit. Med. c. 9. §. 1. (m) Tom. 8. Obs. 30. (n) Ibid. Obs. 70. (o) supra n. 10. (p) n. 33. (q) Epist. Anat. l. n. 50. (r) c. 3. supra ad n. 19. cit. §. 19. & P. 4. S. 12. c. 12. §. 10. (s) c. 5. supra ad n. 13. & 27. cit. (t) Obs. Anat. (u) l. 3. S. 10. Additum in Schol. ad Obs. 1. (x) n. 35. (y) Prælect. ad Instit. §. 700. (z) Obs. supra cit. ad n. 22. (a) Obs. supra cit. ad n. 19. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 7. & 8. Obs. 133. (c) Act. N. C. Tom. 5. Obs. 129. (d) Commer. Litter. A. 1742. Hebd. 28. n. 1. (e) Sepulch. l. 3. S. 17. Obs. 14. §. 3. cum Schol. (f) Vid. supra n. 13.

dixi, & dicere poteram de mole, non eam semper esse quae irritare possit, & irritando, se prodere. Deinde dico, vel cum ejusmodi est, alias copia, alias crassitie interjecta bilis, vesiculam ab irritatione defendi; multo enim rarius hic accidit quod semper fere in urinaria vesica, ut omni humore ejecto, nihil nisi calculus restet a quo vesicula compungatur, praesertim cum hac non ad eundem modum atque illa, se possit contrahere, & circa lapidem constringere: quod etiam si posset, non videretur tamen vesicae utriusque sensus pariter exquisitus; ne forte ad turgentiam, quae tamen non semper est, ventriculi, aut intestinorum confugas qua cystitis ad calculum apprimatur. Denique dico, in istis ipsis visceribus qua parte contiguum premere vesiculam queunt, esse ab alia causa eundem punctum sensum posse, qui a calculo esset in vesicula; imo esse in hac posse aut ab retentae bilis acerrima vi, aut a spasmo aliquo: ut irritamenta aut credi in vesicula possint quae in ea non sint, aut si forte sint, aliunde sint quam a calculis.

38. Quae haecenus disputavi, eo redeunt, ut intelligas, nullum signum horum calculorum esse perpetuum, nullum peculiare. Sed ne forte suspiceris, errorem aliquem, ut saepe fit, subesse rationibus; experientia stemus. Sepono meas omnes & Valsalvae Observationes (g), in quarum nulla signum ullum fuit eorum calculorum, quos tamen in vesicula invenimus. Sepono quae alias (b) ex Gerbesio, & Lofpichlero producti, affererantibus, cum cystitis calculis homines citra querelem diu sanos vixisse, & incolomes vultisse. At si alii praeterea idem testantur; æquum est, ut eorum quoque omnium recorderis quae nunc seponimus. Rolsincius (i) igitur, Medicus sua tempestate gravissimus, ubi quales in cysti calculos invenit ipse, describit, generatim ait, lapides in vesicula felleis saepe per aliquot annos sine noxa latere, nonnunquam sine dolore, nonnunquam dolorem inferentes. Lemerius pater (k) notum esse, confirmat, eos lapides non solum non mortem, imo, saepe vel nullum incommodum, dum asserit, . Vatem in ea quae triginta illorum gerebat, diuturnam & integram usque ad finem valetudinem observasse, jam supra (l) dictum est. Galeatius (m) pariter affirmat, dissecta a se mulieri nihil accidisse aut in eo, ex quo mortua est, morbo (hydrope) aut antea, quantum quidem novit, quod felleis vesiculam affectam esse, indicaret, cui tamen quatuor inerant calculi, quorum major, & angulosis cystici canalis orificium obstruxerat. Themelius (n) quoque cum quodam felleo notatu dignos lapillos, in meretrice ab se repertos, commemorat, gestatos absque ulla sanitatis lesione fuisse indicat. Roncallus (o) denique; nolo enim alios, quam qui scribenti occurrunt, hic nominare; septem refert parvae nucis juglandis magnitudine in ejus cysti quae octavo jam mense uterum ferens, & toto eo temporis spatio, & jam pridem bonum habitum, bonamque nutritionem, & colorem praestulerat; ut manifestum esset, nisi puncto temporis; id quod credibile non est; illi concrescissent, sanitatem vel iis praestantibus perdurare posse. Satis igitur; nisi quid me fallit; ostensum est, nullum cysticorum lapidum perpetuum esse signum, & quod consequitur, nullum plane proprium, & peculiare.

39. Quid ergo est, inquis, quod Medicus Experientissimus Wepferus (p) hac ad Verzascham scripsit: nec collum vesiculae biliariae obturatum, existimo, quia de cardialgia, seu dolore tensivo, qui asse tegetur, iuxta cartilaginem ensiformem, alium est silentium? nonne saltem hoc signum, ubi calculus obturasset collum vesiculae, inseparabile existimabat? Tu vero attendas hic velim, neque de calculo nominatim verba fecisse, & praeter calculum esse alia (q), quae ut ceteros, ita etiam Cysticum bilis ductum possint obstruere. Deinde, etiam si calculus hunc obstruxerit, non modo non ictus, quem unum tunc abfuisse, videre potuit Bezoldus (r), exemplisque evicerat Pechlinus (s); sed nihil quod affectum cysticum ostenderet, esse consecutum, adnotavit, ut paulo ante dictum est, Geleatius: neque aliter fere observavit Reverhorstius (t): nec in duobus Phil. Jac. Hartmannus (u): nec in tribus quidquam contra ac diximus, habet Hallerus (x): nec denique is qui accurate symptomata aegri omnia recensere potuit, Trevisius (y). Et

quantum Tacconus (z) adjunctos quartanae febris immensissimos dolores in hypogastrica regione fuisse, scribit; tamen non modo non simul regum morbum, sed ne dolores quidem illos fuisse, ad ensiformem cartilaginem pertinentes, ut paulo ante in alia muliere, calculus in Communi ductu positus, discrete significaverat. Vides igitur, ne tum quidem cum meatus Cysticus, ut erat in cunctis cadaveribus indicatis, a calculo obstructus est, constans, & perpetuum ejus signum esse illum dolorem qui a Wepfero descriptus fuit.

40. Etsi vero hic a nobis indicia querebantur calculi, non in eum dumtaxat meum intravi, sed in universum in fellea vesicula existentis; non tamen inquirere pigebit, an Wepferi signum calculi proprium sit in Communi ductum illapsum, quando ipsius, in vesicula subsistentis, esse non potest, ut supra (a) cum de distentionis sensu aliquid attingeremus, satis indicatum est. Nam quod in Sepulchreto (b) Observatio occurrit cui hic praefigitur titulus, Dolor circa cartilaginem xiphoidem, a calculis in ventriculo, & vesica fellea; cave credas titulo Observationem respondere: quam si perlegas; ventriculi quidem fundo, ac substantiae pertinacissime adherentes plurimos calculos invenies; non tamen inquirere pigebit, alibi ullum fuisse, non invenies. Ex hac potius Observatione disces, non esse igitur proprium calculorum in Communi ductu existentium indicium illud quod calculos ventriculo infixos significabat. Quin etiam si praeter hos, alii in Communi extitissent ductu; esset tamen dubitationi locus, utrum eum adscribere dolorem oporteret, non fecus ac cum in aliqua doloris ejusdem historia, simul in eo ductu calculi, simul in jecinore pene toto prava materia, & vitia gravissima proponuntur, in altera autem multi per hepar tumores, & abhorum uno meatu ille valde compressus: quantum si compressio, aut obstructio Communis Canalis ipsa asserere credatur causam ejus de quo loquimur, doloris; non erit hic igitur peculiaris nota lapillorum in illo haerentium, cum sine calculis posse & comprimi, & obstrui, supra (c) satis ostensum sit, nihilque prohibeat existimare, interclusam in eo bilem adeo & multam, & acrem interdum esse, aut mora fieri, ut æque ac calculi, & distendere canalem possit, & lacerare. Noli credere, industria, solertiamque verum quaerentium, & Rem Medicam juvare nitentium minoris a me duci quam a Cl. Viro, qui propositi doloris explicationem probat per Suspensorii hepatis ligamenti firmam ad peritonaeum qua ensiformem cartilaginem obducit, alligacionem: sed mox eodem quo & ego, veri studio, & amore pernotus, hac subjicit: „non in calculosis jecinoris affectibus tantum, verum & in phlegmonibus, aliisve ejusdem visceris tumoribus, qui non procul ab hujusce ligamenti radicibus consistunt, opportuna hac sunt ad varia hujusmodi inde suborta symptomata explicanda, & praecipue dictum cartilaginis mucronatæ dolorem, qui in similibus circumstantiis hepatis inflammationes non raro comitari consuevit. „

41. Non modo autem hoc signum commune est morbis aliis five extra jecur, five in jecinore, five in Communi ipso ductu commoventis; sed ne tum quidem occurrit semper cum in eo ductu lapilli sunt. Quicunque enim bilarii calculi per alvum egerint, per illum meatu angustias ad intestina pervenerint, necesse est: & tamen cum dejectorum ejusmodi lapidum tot extent Observationes; in quot tandem harum praecessisse dolorem legimus ad cartilaginem ensiformem? Non me praeterit, haud omnes dejectos lapides a jecore esse repetendos. Quin ultro fateor, ex quo ante Galenum (d) cepti sunt adnotari, cum prope innumera ad hoc usque tempus collecta sint a Donato (e), a Schenckio (f), a Rhodio (g), a Schroccio patre (h), ab aliisque eorum Observationes, magna ex parte videri mihi in ipsis intestinis, aut in ventriculo genitos. Nam in ventriculo quoque gigni, antiqua indicant exempla, quorum primum recenset Donatus (i) cum civis meus, „Magerius Jo. Juliani de Furlivio misit Gentili lapidem in quantitate unius nucis vomitu expulsum post dolorem stomachi, cujus lapidis durities erat supra

supra duritiem gypsi, figuraeque ejus erat sicuti figura „ovi? „cui similem nisi quod juba magnitudinem non superabat, colore autem sub albo, nec stratis evidentibus praeditum, in Patria olim vidi, quem femina, pariter post diuturnos ventriculi dolores vomuerat. In ipsis autem intestinis concretos cum alii nuper, nec satis fortasse idoneis exemplis, se probasse, crediderint; mihi illud praeter ceteris huc aptum videtur quod ex Ballonio (k) petes, lapidis in Peronii intestinis perforati, ut liquidiori materia via pateret; ex terreis enim viscidisque particulis intestino circum adherentibus videtur paulatim crevisse, ceteris per medium transeuntibus, viamque apertam servantibus. Sed & lapides omnium maximos, & totos ex ejusmodi una eademque materia factos, ut certe in intestinis augmentum, sic & initium cepisse, quis neget? Quin etiam si quosdam fuisse, legam, aut magnitudinem, aut colore, aut figura ejusmodi, ut ad cysticos facile aliquis referre posset, ut puta (l) qui alias majores, alias minores pifis erant, aut avellanis, qui coloris fulvi, aut majori ex parte flavi, qui triangulares, aut aliter angulosi, qui denique, ut uno exemplo plura complectar, & colore, & magnitudine, & forma mespilorum seminebus assimilabantur; hos tamen omnes libenter omittam, praesertim cum quae praecesserint, aut non satis diligenter, aut nullo modo adscripta sint. Ad illos veniam, quos qui describunt, aut Viri alii graves pro cysticis, aut certe pro bilariis, nec sine causa, habuerunt. Sed Fernellius quem ipse alias (m) nominavi, haud plura habet, quam post diuturnum ictum, oborto alvi profusio, hujus naturae innumeros calculos instar pifis, aut hordei in plerisque exturbari, se deprehendisse. Coiterus (n) pariter sibi notam feminam scribit molestissima ac admodum diuturna icteria per calculi cum alvi recentis excretionem liberatam. Salomonem Alberti saepe ab ictu diuturniori calculos per alvum egerisse, observasse, ex Prael. Hallero (o) scio; an plura autem dixerit, nescio, quippe ejus Oratione, quam hiccitat II. careo, non illa quidem quae in tribus est editis A. 1585, sed quae est in quatuor vulgaris A. 1599; hanc enim designari, non dubito, quam inscriptam esse video apud Lindenium (p) de felle ad intestina restagnante &c. Malpighium, lapidem a Matrona dejectum post ingentes dolores, & longam icteriam scriptisse, dictum est supra (*). Ruyschium (q) asseruisse calculum & vesica fellea per anum ejectionem, legi; non quae dejectionem antecessissent. Alios autem sciens omitto, qui aut non plura quam Ruyschius, aut ne tot quidem quot Malpighius, de praegressis indicant.

42. Praestat igitur ad eos transire qui doloris sedem tunc praecedentis memorant. Hoffmannus pater, ut filius (r) refert, acutissimos fuisse, scripti, dextri hypochondrii dolores. Dillenius (s) post dolores idem hypochondrium bene diu occupantes, successisse colico-nephriticis. Bartholinus (t) ex Tinctorii Observatione multas quereles de dextri lateris dolore protulisse ad intestina. Lentilius (u) circa regionem hepatis dolorem summum, cum tumore de quo tamen dolore jam per decennium conqueustus æger fuerat. Wolffrigelius (x), qui fufius quam ceteri, descripsit, praegressos saepe dolores, colico-nephriticis emulantes, saevissime demum recurrerunt: recidivo, ut saepe solet, hoc morbo dolorem lumborum, & lancinationem circa hypochondrium dextrum, ubi locus insertionis obliquo ductus in duodenum est: iterum recidivo dolorem, qui quidem colicum potius emulabatur, cum non circa lumbos & hypochondrium dextrum, sed potissimum versus umbilicum perventiretur. Vallinierius tandem noster (y), qui omnia ipse quoque diligenter est persecutus, cum in Patria sua primum, deinde hic etiam Patavii confimiles casus observasset; quod ad dolores attinet, nihil aliud scripsit, nisi „saevissimos in regione hepatis fuisse, & se „umbilicum versus extendisse. „A Vatero (z), & tanto magis a Bezoldo (a) propositi casus a me consulto sunt praeteriti ob calculorum magnitudinem, qui ut facile in vesica fellea initium habuerint, cum incrementum tamen accepisse in intestinis videri possint, ab his potius quam a Communi bilis Canali tunc provenisse diceretur. Et Vaterus quidem vehementissima ventris tormina fuisse scribit, quae primum regionem umbilici occupant, cum

tandemque in regione lumborum subsisterent. Bezoldus autem postquam per sex & ultra annos doloribus hypochondrii dextri ægra mirum quantum fuerat defatigata, lapidem tandem fuisse dejectum non absque torminibus. Nul- lum igitur in his cunctis Observationibus indicari dolorem vides qui ad cartilaginem ensiformem pertineat.

Sed neque indicatus a duobus Hoffmannis Jo. Mauricio, & Friderico. Ille enim (b) anteriora quidem memorat; sed ita memorat, ut diuturnum dolorem tenstrum & vellicantem fuisse, dicat, sub hypochondrio dextro anteriora versus molefium. Hic vero (c) praeter intolerabilem in dextro latere & sub costis spuris dolorem etiam haec addit; circa scrobiculum cordis persistebat dolor vebemens pressorius, qui etiam ad umbilicalem usque se extendebat pressuram; tamen neque scrobiculum cordis cartilaginem ensiformem comprehendit, aut si hic velis comprehendere; meminisse oportet, in ea Observatione non de lapide verba fieri, sed de amurca biliosa, ductum choleodochum obturante; ut sic potius confirmari possent illa quae supra (d) disputavimus de ambiguitate hoc signum concludentia, quae certe alia quoque consequitur signa in proxima Hoffmanni Observatione (e). Ceterum in ultima (f) ubi de calculis ipsis agitur, ductum illum obstruentibus, acutus proponitur, & vix tolerabilis hepatis regioni firmius insistentis dolor, intercurrentibus intestinorum doloribus, qui per intervalla remittebant. Denique scripta a peritissimo Archiatro Swietenio (g) inspicere, ubi quae tunc accidant, a se observata proponit; de dolore ad ensiformem cartilaginem reperies nihil. Cum autem, omnibus quas protulimus, Observationibus pensatis, extensum dolorem ad cartilaginem illam numquam, ad umbilicalem autem, five ad umbilicalem regionem haud semel animadverteris; si forte velis explicationem petere non ab Jejunio intestino, in quod Duodenum se producit, sed ab Suspensorii hepatis ligamenti illa parte quae Eustachio (h) melius quam Reverhorstio (i) nota, comitatur Umbilicale vinculum, aut etiam ab hoc vinculo, per me non minus licebit, quam ab Suspensorii parte reliqua, cum se nonnunquam, ut ab aliis observatum est, ad ensiformem cartilaginem extendit dolor.

43. Si ergo bilarii calculi, ut haecenus ostensum est, & mox (k) confirmabitur, ne tum quidem cum molientes exitum, usque adeo molesti sunt, peculiari, constanti, perpetuo quopiam signo se indicant; quanto minus id poterunt in sua vesicula quiescentes? At enim calculorum quoque in renibus, & urinaria vesica inhaerentium signa, inquis, per se ambigua sunt, nec tamen a Medicis in tanta rei obscuritate contentum. Ego vero neque illa quae de cysticis profertur, contemno; sed ad suspicandum potius, quam ad eos pro certo cognoscendos apta esse, conqueror (l). Quod si in suspitionibus subsistendum est; non solum commendando qui his pondus aliquod addere nituntur augentes numerum indiciorum: sed inter illos nomen ipse quoque proficitor meum. Itaque etsi cystis lapillos non semper cum bile conjungi, scio, quae amurcam imitetur, nec semper cum urinariis calculis; tamen neque Sylvii suspicionem, quam in Sepulchreto (m) etiam habes, omnino spernendam esse, credo, verentis, ne qui ejusmodi bilem vomunt, in eorum cysti lapilli concrecant, neque meam alteram tibi suspicionem reticendam. Ipse enim cum praeter illos quos simul felleis, simul urinariis calculis obnoxios alias (n) a me vifos memoravi, alios quoque viderim, alios legerim, inter versandum autem eas quarum parte in his Litteris subinde usus sum, Observationes quamplurimas pariter invenerim; non fortuito hac accidere, facile intellexi. Ex iis quos sic affectos legi; unum haud omittam, dignum praeter ceteris qui ob sua in Medicam Facultatem merita commemoretur, Michaelen Mercatum (o). Hic nephriticis cruciatibus confectus, cum lapides duos, nec parvulos, in ureteribus, in renibus autem sexaginta tres aut minores omnes, aut quosdam saltem, ut Praeceptor ejus scripsit Caesalpinus, ingentes haberet; in cysti etiam fellea, quamvis ictu, quod memorent, nunquam tentatus habuit sex & triginta, obscuri coloris, & angulares, ciceric magnitudine. Quis autem cum

(a) Vid. supra n. 27. (b) Epist. Anat. 1. n. 51. (c) Differ. de Gutta Ser. Corollar. 4. (d) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1703. Obs. Anat. J. (e) n. 22. (f) cit. supra ad n. 21. (g) A. N. C. Tom. 5. Obs. 10. proprius fin. (h) in Epist. addit. ad Hist. Morbor. (i) Sepulchr. 1. 3. S. 17. in Schol. ad Obs. 4. in Additum. (j) Vide supra n. 33. & 34. (k) Diff. de Chololitho Caf. 1. n. 6. (l) Eph. N. C. Dec. 2. A. 5. Obs. 76. & 77. (m) Opusc. pathol. Obs. 33. Hist. 4. 13. 14. (n) Eph. N. C. Dec. 2. A. 5. Obs. 76. & 77. (o) Opusc. pathol. Obs. 33. Hist. 4. 13. 14. (p) Commerce. Litter. A. 1743. Hebd. 32. n. 3. (q) cit. supra ad n. 16. (r) n. 37. (s) l. 3. S. 7. Obs. 32. (t) Diff. de Mot. Bil. Fig. 1. (u) l. 3. S. 7. Obs. 32. (v) l. 3. S. 7. Obs. 32. (w) l. 3. S. 7. Obs. 32. (x) l. 3. S. 7. Obs. 32. (y) l. 3. S. 7. Obs. 32. (z) l. 3. S. 7. Obs. 32. (aa) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ab) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ac) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ad) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ae) l. 3. S. 7. Obs. 32. (af) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ag) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ah) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ai) l. 3. S. 7. Obs. 32. (aj) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ak) l. 3. S. 7. Obs. 32. (al) l. 3. S. 7. Obs. 32. (am) l. 3. S. 7. Obs. 32. (an) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ao) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ap) l. 3. S. 7. Obs. 32. (aq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ar) l. 3. S. 7. Obs. 32. (as) l. 3. S. 7. Obs. 32. (at) l. 3. S. 7. Obs. 32. (au) l. 3. S. 7. Obs. 32. (av) l. 3. S. 7. Obs. 32. (aw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ax) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ay) l. 3. S. 7. Obs. 32. (az) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ba) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bb) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bc) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bd) l. 3. S. 7. Obs. 32. (be) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bf) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bh) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bi) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bj) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bk) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bl) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bm) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bn) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bo) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bp) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (br) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bs) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bt) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bu) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bv) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bx) l. 3. S. 7. Obs. 32. (by) l. 3. S. 7. Obs. 32. (bz) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ca) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cb) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cc) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cd) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ce) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cf) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ch) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ci) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cj) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ck) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cl) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cm) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cn) l. 3. S. 7. Obs. 32. (co) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cp) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cr) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cs) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ct) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cu) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cv) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cx) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cy) l. 3. S. 7. Obs. 32. (cz) l. 3. S. 7. Obs. 32. (da) l. 3. S. 7. Obs. 32. (db) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dc) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dd) l. 3. S. 7. Obs. 32. (de) l. 3. S. 7. Obs. 32. (df) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dh) l. 3. S. 7. Obs. 32. (di) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dj) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dk) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dl) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dm) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dn) l. 3. S. 7. Obs. 32. (do) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dp) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dr) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ds) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dt) l. 3. S. 7. Obs. 32. (du) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dv) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dx) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dy) l. 3. S. 7. Obs. 32. (dz) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ea) l. 3. S. 7. Obs. 32. (eb) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ec) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ed) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ee) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ef) l. 3. S. 7. Obs. 32. (eg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (eh) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ei) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ej) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ek) l. 3. S. 7. Obs. 32. (el) l. 3. S. 7. Obs. 32. (em) l. 3. S. 7. Obs. 32. (en) l. 3. S. 7. Obs. 32. (eo) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ep) l. 3. S. 7. Obs. 32. (eq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (er) l. 3. S. 7. Obs. 32. (es) l. 3. S. 7. Obs. 32. (et) l. 3. S. 7. Obs. 32. (eu) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ev) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ew) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ex) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ey) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ez) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fa) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fb) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fc) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fd) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fe) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ff) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fh) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fi) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fj) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fk) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fl) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fm) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fn) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fo) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fp) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fr) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fs) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ft) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fu) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fv) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fx) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fy) l. 3. S. 7. Obs. 32. (fz) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ga) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gb) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gc) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gd) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ge) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gf) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gh) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gi) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gj) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gk) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gl) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gm) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gn) l. 3. S. 7. Obs. 32. (go) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gp) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gr) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gs) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gt) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gu) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gv) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gx) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gy) l. 3. S. 7. Obs. 32. (gz) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ha) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hb) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hc) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hd) l. 3. S. 7. Obs. 32. (he) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hf) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hi) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hj) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hk) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hl) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hm) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hn) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ho) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hp) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hr) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hs) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ht) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hu) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hv) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hx) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hy) l. 3. S. 7. Obs. 32. (hz) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ia) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ib) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ic) l. 3. S. 7. Obs. 32. (id) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ie) l. 3. S. 7. Obs. 32. (if) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ig) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ih) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ii) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ij) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ik) l. 3. S. 7. Obs. 32. (il) l. 3. S. 7. Obs. 32. (im) l. 3. S. 7. Obs. 32. (in) l. 3. S. 7. Obs. 32. (io) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ip) l. 3. S. 7. Obs. 32. (iq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ir) l. 3. S. 7. Obs. 32. (is) l. 3. S. 7. Obs. 32. (it) l. 3. S. 7. Obs. 32. (iu) l. 3. S. 7. Obs. 32. (iv) l. 3. S. 7. Obs. 32. (iw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ix) l. 3. S. 7. Obs. 32. (iy) l. 3. S. 7. Obs. 32. (iz) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ja) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jb) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jc) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jd) l. 3. S. 7. Obs. 32. (je) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jf) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jh) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ji) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jk) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jl) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jm) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jn) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jo) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jp) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jr) l. 3. S. 7. Obs. 32. (js) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jt) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ju) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jv) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jx) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jy) l. 3. S. 7. Obs. 32. (jz) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ka) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kb) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kc) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kd) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ke) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kf) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kh) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ki) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kj) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kk) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kl) l. 3. S. 7. Obs. 32. (km) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kn) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ko) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kp) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kr) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ks) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kt) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ku) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kv) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kx) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ky) l. 3. S. 7. Obs. 32. (kz) l. 3. S. 7. Obs. 32. (la) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lb) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lc) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ld) l. 3. S. 7. Obs. 32. (le) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lf) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lh) l. 3. S. 7. Obs. 32. (li) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lj) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lk) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ll) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lm) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ln) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lo) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lp) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lq) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lr) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ls) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lt) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lu) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lv) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lw) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lx) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ly) l. 3. S. 7. Obs. 32. (lz) l. 3. S. 7. Obs. 32. (ma) l. 3. S. 7. Obs. 32. (mb) l. 3. S. 7. Obs. 32. (mc) l. 3. S. 7. Obs. 32. (md) l. 3. S. 7. Obs. 32. (me) l. 3. S. 7. Obs. 32. (mf) l. 3. S. 7. Obs. 32. (mg) l. 3. S. 7. Obs. 32. (mh) l. 3. S. 7. Obs. 32. (mi) l. 3. S. 7. Obs. 32. (mj) l. 3. S.

cum hæc de Mercato, tum in illis insuper tot Observa-
tionibus legens, Episcopum illum Lælii a Fonte (p) ex-
renum quoque lithiasi laborare consuevisse, Hoechstetteri
(q) Comitum arenulas, & lapillum in renibus habuisse,
Wepferi (r) Vietorem in papillari caruncula alterius
renis lapilli frustulum, Borrichii (s) feminam ex ve-
fica utraque calculos effudisse, Mortoni (t) aliam re-
nem alterum iisdem refertum gessisse, Reverhorstii (u)
femem eisdem in renibus, & vesica urinaria, & ne forte
hæc non nisi in fenibus animadversa fuisse, credas; Bo-
neti (x) Virgini duodeviginti annos nata a lithotomo
extentum esse lapidem ovi asserini magnitudine: ad hæc
Bergerum (y) in Juris Consultu utraque vesica invenisse,
Lancium (z) in rene quoque Viri Exc. Horatii
Albani & magnum lapidem, & pusillos, Hoffmannum
(a) denique in Viri generosi rene non parvum, in ve-
fica urinaria multo majorem; omittam enim sciens alios
quamplurimos, & in his Jo. Bapt. Contulum (b), Chri-
stoph. Cunradum (c), Vitum Riedlinum (d), Tob.
Ferd. Pauli (e), Jo. Casparum Grimmium (f), Jo. Se-
bast. Albrechtum (g), Jo. Jacobum Treylingium (h),
Christoph. Jac. Trewium (i), qui in duobus adnotavit,
Jo. Storchium (k), & Ifr. Cregutem (l); hos, inquam,
alioque (m) omittam, quando præter Baglivum (n),
hoc adeo inter confecta ponentem, ut rationem quaeri-
verit, cur existentibus calculis in vesica fellea, germinet
quoque in urinaria, & contra, unus pro multis esse po-
test Abrahamus Vaterus (o) diserte confirmans, *sepissi-
me certe in vesica fellea calculos observatos esse in iis qui
calculo simul utriusque urinariarum laborant*; Quis igitur
alia legens, & tot confimiles attendens casus, non con-
tinuo intelligat id quod Vaterus, manifestum esse, cau-
sas utrorumque calculorum magna ex parte esse commu-
nes? Quod cum posueris; necum facile arbitrari inci-
pies, ubi ad cæteras felleorum calculorum notas hæc
quoque accesserit, ut homo urinariis calculis obnoxius
sit, aliquid ponderis esse ad reliquas suspiciones accessu-
rum, præsertim si iuxta ea quæ supra (p) adnotata sunt,
is homo neque infans, neque puer sit, imo ætate sit
jam media, aut senili: quæ animadversio ab ætate de-
sumpta, si cum aliis jungatur, juvare etiam poterit ad
dejectos intestinales calculos ab iis qui in cysti geniti el-
sent, distinguendos. Sic Cl. Carolus (q) cum quendam
calculum qui inter cysticos referebatur, ab adolescente
dejectum annorum XVIII. ob id præsertim ad hos perti-
nere, non credidisset, quod illa ætas non ferat istiusmo-
di morbosam dispositionem (nec certe nisi quam rarissi-
me; in eoque minime inter se conveniunt fellei calculi,
& urinarii) cognovit postea, ejusdem juvenis ex dy-
senteria mortui secur inventum esse tam sanum, quam
vituli sanissimi esse potest: calculus autem, ut ille fue-
rat, duarum unciarum & dimidia si vel multum incre-
menti cepisset in intestinis, aliquid suæ pristinae moræ,
transiitque saltem vestigium in affixis jecori vesicula,
& ductibus reliquisset.

44. Etsi vero, quascunque commemoravi, felleorum
calculorum notæ sunt, ut ex iis apparet quæ hactenus
dixi, & Hoffmannus (r) admonet, *collective sumende
& considerande*, & quoniam omnes in omnibus esse non
possunt, pleræque saltem, & in his præcipue, attenden-
de (p) præcipuas autem voco quæ crebrius solent animad-
verti, ut puta cum lapides in Communem ductum de-
scendunt certa a dextris doloris sedes, icterus, vomitus,
anxietas, recidiva; sic enim fere animadverti in pluri-
bus earum Observationum quæ supra (s) sunt indicatae;
etsi, inquam, ita ut dicimus, faciendum est; tamen obli-
visci numquam decet, quam facile fuisse possit deceptio.
Confer enim cum plerisque ex his vel præcipuis notis Ob-
servaciones illas duas quæ etiam antea (t) indicavi, ejus-
dem Hoffmanni; vera intelligas a medicis. Idemque in-
telliges, cum postquam scripsit (u), *esse quædam signa haud
fallacia, quæ calculorum in ductibus biliariis indicant præ-
sentiam*, & præcipua ex illis enumeravit, paulo post (x)
signa profert maximi calculi in cysti fellea in hærentis,
præsertim autem cum symptomata describit (y) icteri

non ab ullo calculo, sed a spasmodica dumtaxat stric-
tura illati. Accidit tamen haud raro, ut quemadmodum
in urinariis calculis, sic in biliariis quoque habeamus fi-
gnum longe omnibus antefendum, videlicet cum eorum
aliquis, aut fragmentum saltem quoddam ejicitur. Quod
quidem signum, ab naturali ipso rationis lumine præmon-
stratum, cum alii antea, & in his Vaterus (z), præcipue
autem, & filius Vallisnerius (a) memorassent: mirari
quis possit, cur inter signa ista haud fallacia sit ab Hoffmanno
prætermisum, præsertim cum ante quinquennium hæc ipse
quoque (b) docuisset: „inter hæc vero omnia, quæ jam
„monuimus, signa, nihil datur certius vehementes a cal-
„culo felleo prognatas dijudicandi passiones, ac si ipsi
„cum excrementis per alvum secedant; & tum non fe-
„cus ac in calculis renalibus, quando hi ex ureteribus in
„vesicam fuerunt delati, omnes simul & semel dolores
„cum reliquis gravibus afflictionibus cessant atque ex-
„spirant, ictero saltem excepto, qui non simul, sed sen-
„sim tandem evanescit. „Præcedentibus igitur indi-
„ciis calculorum qui in biliarios ductus intrusi, exitum fi-
bi in Duodenum intestinum moliantur, si inter alvi re-
crementa, quæ tum diligenter sunt a ministris eluenda,
& per cribrum aliquod, sicuti Vallisnerius monebat, tra-
jicienda, biliarius aliquis calculus inveniatur; non est du-
bium, quin hoc signum eam lucem afferat, quæ non
nisi incerta, & subobscura a tot aliis notis sperari po-
terat.

45. Sed cautione opus est, nequando intestinalem for-
te calculum pro biliario, sive ut vocabuli ambiguitas o-
mnis hic declinetur, pro hepatico, id est in hepatis ca-
nalibus, aut cysti ejus genito, accipiamus. Est quæ-
dam Hoffmanni Observatio (c) viginti lapidum vomitu
ejectorum, quos etsi non plane incredibile existimabat ex
biliariis ductibus provenisse; conjiciebat tamen, in ipsius
potius duodeni flexura a bile crassiori, & terrestriore suc-
cessive concrevere, & progigni potuisse; erant enim angu-
li quidem, & colore ex flavo viridi; sed eam magnitu-
dine ut sine ventris in dextera parte torminibus, quæ nulla
præcesserant, Communem ductum permeare potuissent non
viderentur. Icterus tamen horum antecesserat ejectionem,
& statim ab hac, quod permirum videri debuit atten-
dentibus Hoffmanni exceptionem, paulo ante (d) memo-
ratam, sublatum est. Si ergo ut bili exitum, in Duode-
no obstantes, præcludebant, ita bili aut per se, aut mo-
ra acrior facta esset, aut ipsi acutioribus fuissent angu-
lis; facile vides, non modo icterum, sed & dolores a
dextris, & quæ hos alia consequuntur, prævia habere,
& sua ejectione etiam tollere potuisse. Verum illa simul
conjugi possibile magis, quam frequens est: & nulli in
proposita Observatione prægressi a dextris doloris satis cau-
tum Medicum facere potuissent. Quorum, aut icteri, &
magis utrorumque absentia cautum pariter facere debet,
ubi calculi qui cystici alioquin videri possent, ex alvo
dejiuntur velut in iis quæ protinus indicantur, exem-
plis. Et primum calculi tres (e) (f) (g) dejecti occurrunt,
quorum five globosam, aut ovalem figuram, five colorem
exteriorem, aut interiorem, & alia quædam attendas; non
facile perneges cysticos esse potuisse, præsertim si non-
nullos in vesicula aliquando repertos esse non ita diffi-
ciles, recorderis; sed termina quidem, & ventris dolo-
res fuisse, legens, nec tamen in dextero hypochondrio,
imo iliacam regionem in uno exemplo gravantes, lapides
intestinales fuisse, credes, idque eo facilius quod non icte-
rum, sed volvulum in his singulis tribus casibus videbis
commemorari. Succedunt exempla alia tria. Quorum
primum (h) si ullam de regio morbo mentionem habe-
ret, neque dejectos absque ulla doloribus lapillos propo-
neret; horum descriptio tanto magis faceret, ut pro cy-
sticis agnosceremus, quod magnitudine cum iis minime
comparandi erant qui tribus superioribus, & totidem
insequentibus exemplis memorantur. Horum alteram
(i) dolores quidem colicos, sed non ad dexterum hy-
pochondrium, neque cum ictero conjunctos exhibet.
Quamobrem calculum, quamvis concentricis, ut Icon
ostendit, corticibus præditum, & intus, extraque flavum,
li-

libentius cum ejus Observatore crediderim in aliquo
intestino genitum bilis ingressui propiore. Sic in tertio
exemplo (k) assentior Cl. Albrecht, in Colo intesti-
no ortos existimanti calculos, quos alioquin describit fi-
gura triquetra, in aqua natantes, flammamque concipi-
entes, assentior, inquam, non tam quia sub obscura
exteriore flavedine albissimam, quæ tamen instar durio-
ris saponis solida erat, materiam continebant, quam quia
in dextero quidem hypochondrio vehemens dolor non de-
fuerat; sed, ut *sevi impurioris* ex combustis odorem, alia-
que præteream, nihil usquam ad icterum pertinens video
adnotatum. De quatuor denique exemplis quæ juvat ad-
dicere, si calculum quem Cl. God. Guil. Mullerus (l)
sic in transitu, memorat, ut *felleum* vocat, & extratis
aliis alia complectentibus conformatum pingit, sic ple-
nius potuisset describere, & quibus præviis, aut comi-
tantibus symptomatibus ejectus fuisset, adjungere; for-
tasse absque ulla dubitatione acciperem: ut certe accipio
quos Præcl. Jo. Phil. Burgegravius (m) post atroces,
eoque recidivos, dexteri hypochondrii dolores, nec si-
ne icterico tum in facie, tum in lotio colore proponit
dejectos. Sed & quosdam a Cl. Brunnero (n) vifos,
quantumvis sine ictero fuerint, accipiamus necesse est
propterea quia jam in jecinore inchoatos per anatonem
deprehendit. Nempe vir, annos ferme decem perpetuo
dextreque potissimum hypochondrii, dolore vex-
atus, premente primum, tendente, & obtuso, postea
vero interdum lancinante, dein acerbissimo, neque dex-
teri hypochondrii sedem mutante, novissime intolerabili,
calculos dejecti leves, flavos, lamellata compage, angu-
losos. Is post triduum mortuus, habuit in cysti, quæ
magna erat, massam ex fulvo obscuro caruleam, & vi-
ridescentem, eamque mollem, in medio autem ductus
Cystici, & in Comuni ubi oblique hiat in Duodenum
intestinum, hærentem materiam paulo quidem minus mol-
lem, sic tamen ut ab iis ductibus in globulos conforma-
ta esset duos oblongo-rotundos, in Colo denique calculos
quiddecim in unum globum compactos, sed facile sepa-
randos, nondum adeo duros, ut qui fuerant dejecti. Ita-
que negari non poterat, hos fuisse in biliariis ductibus in-
choatos, & per gradus minus molles factos, mora debum
in intestinis duratos. Quod si per totum morbum nullum si-
gnum icteri se manifestavit; ad credito, materiam in
vivente facile molliorem, quam altero post mortem die
cum in ductibus reperta est, non omnino bilis exitui
obstitisse, & dolores sua ductibus acrimonia magis, quam
obstaculo, creasse; aut reminiscere eorumque in singulari
aliquo ejusmodi casu indicavimus supra (o) ut vel ob-
structo Comuni ductu, posse nonnunquam abesse icte-
rum, intelligeres. Quod cum spectarem, paulo ante dixi,
icteri quidem, sed magis & icteri & dolorum a dex-
tris absentia cautum Medicum fieri oportere; ut magis
reliqua simul omnia prius quam pronunciet quiddam,
attendat. Quamobrem; ut exemplum quartum subji-
ciam; non ita facile ab hepaticorum numero eos calculos
excludam quos olim Fr. Slare (p) ab nobili femina
valde cruciata doloribus hepaticis vix aliquot post hos ho-
ris bis vidit excretos; etsi enim preste, ut sit, rescri-
bens, forte omisit quæ ad arquatum morbum attinebant,
lapillorum tamen odorem, combustorum videlicet, co-
lorem, saporem felleis convenientem, præterea in aqua le-
vitatem, & combustibilitatem non omisit. Quæ utinam duæ
ultimæ notæ aut nunquam prorsus in intestinalibus, aut
saltem semper in hepaticis calculis adnotarentur; certe ef-
fet Medicis multo proclivius cavere, ne his temere, ut
olim verebatur Matthiolus (q), pro illis acciperent. Ve-
rum duo illa signa, quibus cum Reverhorstio (r), ple-
rique utebantur, haud raro fallere, ostensum est. Quod
si Vallisnerius (s) cavendum admonuit, ne calculi qui-
dam propterea quia neque arderent, neque innarent,
præpropere ex hepaticorum numero rejicerentur eo tem-
pore quo per paucos dumtaxat experimentis illa coeperamus
signa infirmare; quanto id nunc magis cavendum est, cum
ea nobis adeo creverint experimenta, ut exceptiones ad
certa capita reduci posse non videantur (t). Sed &
quantum cystici calculi variare possint non colore tan-
tum, & forma, verum & structura ipsa externa, interna-
que, & substantiæ etiam modo, ut vel pellucidi nonnun-
quam sint, ideo supra (u) diligenter est adnotatum, ne
Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

si forte aliqui interdum occurrant ab iis qui plerumque
solent, vel plurimum discrepantes, continuo hepaticos
non esse, pronuncies; sed proprietates antea cæteras
singillatim, & quæ præcesserint, quæ sint comitata, quæ
subsecuta signa, perpendas.

46. Nec vero ipsa; ne de immani numero quiddam
dicam; lapidum magnitudo abstergere te semper debet,
ne propterea hepaticos esse, censeas. Insignis certe illum
fuisse magnitudinis quem femina quadam per sedem ex-
creverat, testatur Vaterus (x); & tamen femina, pau-
lo post ejus excretionem mortua, in vesica fellea quin-
que alii minores inventi sunt ita figurati, ut videri pos-
set, quomodo majori illi, corculum referenti, adhaesissent.
Cum iis igitur ipsum quoque in cysti fuisse, intelligis,
neque magnitudine prohibito sua quo minus inde exi-
ret, atque in cavum intestinorum perveniret. Magnus
quoque erat is, quippe pollicis articulum æquans, quem
Cel. Swietenii (y) Socrus, periodicis icteri paroxysmis
obnoxia, post acerbiores in ipsa Duodeni intestinali sede
cruciatum, biduo interfecto deiecit, foveis duabus in su-
perficie excavatum, binos restare significantibus, qui
ipsi quoque postea prodire non multo priori illo mino-
res. Cui tamen sua non obstitit moles, ne ductum
eluctaretur angustias. Nec mirum; nam etsi angustius sit
Choledochos ductus, etsi angustior, & valvulis impeditus
Cysticus; membranei sunt tamen, eoque ferre possunt
prope incredibilem dilatationem. Itaque Cysticum ordi-
nario octuplo majorem, ut pollicis crassitatem æquaret, in-
venit Bezoldus (z) in ejusque tractu medio calculum no-
tabilis magnitudinis. Et ipse, ut alibi (a) scriptum est,
Communem, Cysticum, & Hepaticum intra bepar usque,
dilatatos adeo conplexi ut perimetrum duobus transversis
digitis æqualem haberent in fene, cujus in cysti, præser-
tim vero in Hepatici ductus ramis calculos deprehendi.
In muliere autem, cujus fellea vesicula magnum calcu-
lum, quamvis necdum induratum illum quidem, conti-
nebat, Communis canalis qua in Duodenum influit,
perangustum alias, orificium dilatatum adeo conplexit
Heisterus (b), ut parvum digitum facile inmittere in
illud poterit. Et Henr. Albertus Nicolai (c) cum insi-
guiter ad vesiculam usque expansus esset idem canalis,
ejus orificium non minus quam Heisterus, patens invenit.
Sed vel amplius viderat junior Verneuvus (d). Laxius
autem Trewius (e) cum biliariis ductibus pariter dilata-
tis. Quorum diametrum triplo quam solet, majorem
deprehendit Kniphotius (f). Aliis hujus generis, quæ in
promptu essent, Observationibus supersedeo; nam & hæc
fatis sunt, & mox (g) quædam, in quibus una erit
multo maximæ dilatationis, sum producturus. Cum igitur
adeo canales isti & dilatari possint, & dilatari inveni-
antur; non est cur lapides vel grandiusculos per eos
transire potuisse, dubitemus, nisi cum in hypochondrio
dextero non ita præcesserint dolores qui dilatationem il-
lam significarent. Itaque ut Hoffmannum laudo quod de
viginti illis magnitudinis insignis lapidibus (h) verba fa-
ciens, non plane incredibile censuerit, in ductibus de qui-
bus loquimur, minimos felleos calculos primum posse ha-
bere, sensim a præterlabente bile augmentum capere, & suc-
cessive horum ductuum ingenti dilatatione facta ibi diutius
subsistere; sic eundem iterum vel magis laudo quod du-
bium se, imo in alteram sententiam proniorum ostenderit
propterea quia sine præcedentibus lateris dextri torminibus
lapides illi ejeti fuerint. Bezoldus (i) quoque id in laude
pono, quod vel præviis per sexennium, & eo amplius
hypochondrii dextri doloribus cum denique lapis dejectus
esset, licet ipse, nec sine rationibus, & biliariis ductibus
extitisse, arbitraretur, professus est tamen, se nolle mordicus
isti in hærentem sententiam, credo quia pro tanta lapidis mo-
le non ibi tunc demum fuisset insolita quadam, & ma-
xima omnium doloris atrocitas cum pervictis tandem ori-
ficii Communis ductus angustias, se repente lapis in Duo-
denum intestinum effudit: quibus in angustias si diutius
subsistisset; non poterat certe, nisi rara quadam ponatur
biliarium ductuum dispositio, non regium morbum, de
quo altum silentium, intulisse. Perverlem æque commen-
dare posse Abrahamum Vaterum (k), doctum alioquin,
& sagacem Medicum, qui dejectos duos insignis magni-
tudinis calculos & cysti usque fellea venisse, non dubitat,
quamvis nec dolor, nec aliud incommodum ab ipsis antea

(p) Conf. cit. supra ad n. 31. (q) Conf. cit. supra ad n. 17. (r) Hist. cit. supra ad n. 20. (s) Diff. supra ad n. 42. cit. §. 56.
(t) Vid. Bartholin. Act. Hist. Vol. 5. Obs. 65. (u) Phthisiolog. l. 3. c. 14. hist. 5. (v) Diff. supra ad n. 42. cit. Obs. 2.
(w) Sepulchr. l. 2. §. 4. Obs. 35. (x) Physiolog. l. 1. c. 14. (y) Oper. Tom. 2. Diff. 10. (z) cap. 3. supra ad n. 42. cit. Obs. 2.
(a) De Lapid. b. c. 25. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. in Obs. 171. (c) Eorund. T. 4. Obs. 49. (d) Eorund. T. 5. Obs. 129.
(e) Eorund. Cent. 9. Obs. 76. (f) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 20. (g) Eorund. T. 4. Obs. 49. (h) Eorund. T. 5. Obs. 129.
(i) Commere. Litt. A. 1734. Hebd. 6. n. 5. & A. 1743. Hebd. 32. n. 3. (k) Commere. Litt. A. 1735. Hebd. 52. n. 4.
(l) Diff. de Calc. in corp. hum. generat. Rec. §. 31. in fin. (m) Vid. Epist. 57. n. 12. (n) De Experim. circa bilem.
(o) Diff. supra ad n. 16. cit. thes. 8. (p) n. 15. (q) Commere. Litt. A. 1731. Specim. 51. n. 1.
(r) cap. 3. supra ad n. 43. cit. §. 15. (s) n. 42. (t) n. cod. id est Obs. 4. & 5. (u) Ensid. Tom. 4. P. 4. c. 12. §. XI.
(v) §. 17. (w) Obs. 1. (x) Diff. supra ad n. 16. cit. thes. 12. (y) Ensid. supra ad n. 13. cit. Adnot. 1.
(z) Tom. 4. paulo ante cit. P. 2. c. 3. §. 18. (a) Ibid. Obs. 1. (b) Ibid. Obs. 2. (c) Ibid. Obs. 3. (d) Ibid. Obs. 4.
(e) Eph. N. C. Dec. 3. A. 3. Obs. 21. (f) Act. N. C. Tom. 7. Obs. 200. (g) Commere. Litt. A. 1740. Hebd. 19. n. 2.
(h) Eorund. T. 3. Obs. 82. (i) Eorund. T. 8. Obs. 121.

(k) Eorund. T. 3. Obs. 37. (l) Eorund. T. 4. Obs. 69. circa medium. (m) Eorund. T. 5. Obs. 78.
(n) Commere. Litt. A. 1738. Hebd. 18. n. 1. (o) n. 34. (p) Vid. Commere. Litt. A. 1735. Hebd. 5. in adnot. ad n. 2.
(q) l. 5. Epist. Medic. 3. (r) Vid. supra n. 25. 26. (s) Adnot. 1. cit. supra ad n. 44.
(t) Diff. supra ad n. 16. cit. thes. 3. (u) Commere. supra ad n. 15. cit. §. 950. (v) Diff. de Choledoch. Cap. 1. n. 5.
(w) Epist. Anat. l. n. 43. (x) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 181. (y) Commere. Litt. A. 1732. Hebd. 33. n. 11. sub 4.
(z) loco indicato supra ad n. 12. (a) Act. N. C. Tom. 4. Obs. 140. (b) Eorund. T. 8. Obs. 30. (c) n. 47. (d) Obs. supra ad n. 46. cit.
(e) Diff. modo cit. Caf. 2. & §. 7. (f) Obs. 3. supra ad n. 42. cit. §. 1. & seqq.

perceptum esset, & vel tunc ventris cruciatus non dexteriorum hypochondrium, sed primum regionem umbilici occupasset, tandemque in regione lumborum substitisset. Nec tamen suis ipse caret rationum momentis. Sed dum inter has exempla profert maximæ osculi uteri arctissimi in partu dilatationis, tantæque exitum ureterum distentionis in calculosis, mirum est, non illi occurrisset, neque illud tamen, neque hos acerbis carere doloribus, cum dilatantur.

47. Verumtamen quid pro Vatro dici possit, videamus. Extat apud Schenckium (1) Tractatmanni Observatio in qua Viri Principis meatum bilis Duodeno inferum nobis, ut ipse invenerat, latum, & ventriculi instar inflatum, ac calculis undequaque repleto, majoribus minoribusque describit. Si forte quævis proximam mortis causam, vigiloma fuit in lethargum degenerans, Si quæ antea molesta fuerint, præter incredibilem sitim, qua perpetuo, dum viveret, ille torquebatur; nihil quidquam invenies. Num Medicum, ut apparet, diligentem, qui hoc adnotaverit, si forte icterus, si quis ad dexteriorum hypochondrium dolor, si aliud quod ad meatum calculis adeo distentum attineret, Principem proprium male habuisset, aut ignoraturum, aut in non brevissima Observatione præteritum fuisse, credis? At si non credis, præter ductum alterum qui bilem ad intestina deferendo, icterum prohiberet, agnoscas necesse est, posse aliquando Choleodochum meatum incrementibus intra eum sensim & numero, & magnitudine perpaucis antea calculis, & permixtis, præter modum quidem, sed paulatim adeo, lenteque distendi, nihil ut de ipso homo conqueratur. Verum ut ut credas, illud semper mecum existimabis, perrara hæc esse, simulque animadvertes, aliud de quiescentibus calculis, aliud de Cystici totius, & de Communis ductus ad finem angustias vi superantibus ferendum esse iudicium. Equidem id non requiro, ut quemadmodum in Tinctorii (m) Observatione post dextri lateris dolorem protensum ad intestina, cum calculis excerneretur materia cruenta & purulenta; satis mihi est ut Bartholinio (n), sola ductus choleodochi, ab ipso alias visa, dilatatio; quæ sicuti nonnullam calculis ad extremas angustias hærentibus, easque, ubi dimoveri incipiunt, suis angulis lædentibus non sine sic inducti abscessus disrumpione demum fit, & puris ac sanguinis deiectione, ita plerumque cum multo minori violentia fit; sed fere nunquam sine dolore. Descripta est a me alibi (o), & superioribus etiam Litteris (p) commemorata Valsalvæ Observatio, in qua cum ingenti hepatici abscessus cavo superior pars ductus ejusdem communis, pars autem reliqua ita erat amplificata, ut digitum admitteret, sique ostenderet, quomodo, vivente homine, veliculas plures quam ducentas, quibus etiam tum ille scatebat abscessus, ad intestinum transmitteret. De multis qui olim per eum meatum eieci fuerant, sanguinis grumulis nonnullis ad angustias subitissimè, easque urgente desuper coercita bile, ipsoque sanguine, dilatasse, verisimile est. Illud certum, & morbum regium, & vomitiones, & dolores præsertim, antecessisse, qui hypochondrium dexteriorum adeo laqueabant, ut sevisimas excitarent sepe numero nervorum distentiones. Quæ, atque alia, ibidem proposita, ut magna ex parte in tantum hepatis morbum rejiciamus; aliquam tamen partem si quis referat ad Choleodochi meatus dilatationem, facile pernegare non possis. Quam si in ductu non ab angustiosis, asperis magnis lapidibus læcessito, imo a perfluentibus sæpius sanguine, & ichoribus laxato, sine doloribus factam esse, non negas; vide, num sine doloribus tunc fieri, dicturus sis; ubi infimæ illæ angustie non ante laxatæ essent, imo a calculorum irritamentis contractæ?

48. Noli expectare, ut has nimis jam longas Litteras, multa de Curatione hujus morbi addendo, longiores faciam. De qua satis erit perpaucis attingere. Diximus (q), id mali sæpius esse recidivum, nec certius cognosci, nisi cum aliquis deiectionis fuerit calculus, quem ex hepate provenisse, dolores ad hujus regionem prævii commonstraverint. Igitur Curationis pars una erit dare operam, cum ejusmodi acerbissimi dolores redierint, ut calculus ex angustis illis se expediat. Altera postquam se inde expedierit, ut si quis alius restat calculus, si fieri possit, dissolvatur. Tertia, ne procreetur novus. Sunt autem hæ singulæ Curationis partes ita, uti posuimus, distinguendæ, nec tempora cuique debita, ut quidam facere videntur qui remedia promiscue congerunt, temere confundenda, sed rei natura, & analogia urinarii calculi

similiter distincta Curationi, præ oculis habenda est.

49. Cum igitur sævissimi urgent dolores, fatigendum est, ut hi consopiantur, non solum ne æger torqueatur, & in periculum inflammationis, aut nervorum distentionis conjiciatur, verum etiam ut calculus angustias superet. Quo enim hic magis ductus irritat, eo magis ad calculum se contrahunt ductus, itaque & suos augent cruciatus, & illi transitum intercludunt. Ergo etiam atque etiam laxandum est: & ad ea quæ per se laxant atque emolliunt, sunt eundem ad finem adjuvanda diluentia, demulcentia, anodyna, & temperatissima antispasmodica, & si intolerabilis dolor cogat, etiam opiata. Nec solum interius datis, sed etiam exterius adhibitis, quantum per hæc licet, laxandum est, clysteribus dico, inunctionibus, fomentibus, balneis. Quibus omnia, ubi plenitudo sanguinis sit, non video cur non hujus missio proponatur, non modo ne forte inflammatio fiat, verum etiam ne vasculorum turgentia angustias viarum augeantur. Porro ut quæ laxant, commendo omnia, ita quæ irritant, vehementer suspecta habeo. Detrimentum enim quod inferunt, ductus ad coarctationem adigendo, certum est; utilitas autem quam ab impulsione, & extrusione calculi plures expectant, incerta. At enim exempla, inquis, calculorum circumferuntur, quos valida pellementia, aut fortiora emetica, & purgantia eduxerunt. Fateor. Sed felicem casum temeritatem quis consulto imitari audeat, qui non sciat (quis autem pro certo sciat?) vias satis jam esse laxatas, ut nihil nisi ultima impulsio, & agitatio desideretur; non vero adhuc rem contra se habere, & in eas angustias coniectum præperere iri calculum, unde nil possit expedire, quo magis & cruciatus crescant, & pericula augeantur. Et sane video Hoffmannum (r) docentem, emetica sæpe deprehendi summe perniciosa, ... si ductus cystico inheerens calculus graviores circa præcordia efficiat anxietates; Reverchonium (s) autem, quemcumque ductum calculus obstruat, vomitoria anceps esse remedium, libenter fatentem; Scheffellium (t) denique, ut alios brevitatibus studio sciens omitam; quod ad purgantia remedia attinet, diserte scribentem: nollem id facile imitari, metuens, ne simul calculi se constituti, ut expelli non possint, moveantur, sique dolores exasperentur, quos vel ira dumtaxat, sicuti continuo ostendit, in ejusmodi ægris, non modo purgantium stimulis, facile concitat.

50. Intelligis, ipsum de purgantibus medicamentis etiam tum loqui, cum dolores, eiectione calculo, conquieverint; quæ pars altera est Curationis. Vel tunc igitur ob eas quæ modo indicatæ sunt, causas, a purgantibus abstinere, & lenioribus potius remediis intestina abstergere, ne forte eiectionis in ipsa calculis aliqua in eorum sede subsistens, ea incrementa caperet quæ ægro essent aliquando nocitura. Cave autem ne me propterea timidiorem voces, aut si forte vis, etiam voca; id enim minus vereor, quam si audaciorem vocares in eo videlicet morbi genere in quo supra (u) ostensum est, quiescentibus calculis nihil sæpenumero molestie percipi. Quapropter in hac quoque altera Curationis parte noli mirari, quod missis pellementibus, id solum faciendum proposuerim, ut si quis forte restet calculus, dissolvatur, dummodo hoc possit fieri. Neque enim me fugit quam parum spei, & promissionibus respondere soleant quæ ad id laudantur, si innoxia sint; quæ libenter acciperem, seu nimis acia, aut quocumque modo irritantia; quæ vitarem. Nec illud mirum; quando vel extra ipsum corpus diu servatos in iis humoribus calculos, quibus dissolvi intra corpus creduntur, minime solutos conspicimus nisi ex mollioribus forte sint, quales Borrichius (x) vidit in aqua calida penitus colligescere, & post illum Hoffmannus (y), nosque etiam in non calida, ductis fissuris, ut ad Schroeckium scripsimus (z), in fragmenta abire. Quin & per se interdum in frustula abeunt quidem, ut in nigris nonnullis animadvertimus; aut etiam in humorem: ut quem Lanzonus (a) in viridem liquorem sponte esse dissolutum, adnotavit. Nam etsi ut istum calculum designet, totum succum felleum saxæum reperisse se, dicit; aut saxæ vocabulo, ut conversum in calculum diceret, abusus est, aut crusta magna ex parte saxæ visa est, cum substantia interior mollior esset. Contra potest junctura esse mollior; substantia autem valde compacta. Sic Platnerus (b) calculi qui parum pressus, mox dilapsus est, fragmenta vidit nec calida, nec vini spiritu, quavis loco calido per plures dies ea contegerent, solvi potuisse. Sic etiam Bezoldus (c) cum frustula, tum in illa, tum in vini spiritu etiam

restit-

restituta per tempus reliquisset, plane dissoluta fuisse, non vidit. Nec vidit Hoffmannus (d) eos quidem lapides cysticos, qui solidiores fuerant texture, & saturatoris coloris. Vallisnerius (e) contra nullo humore melius dissolvi, expertus est, quam calefactis spiritibus vini rectificato, & resina terebinthinæ. Et de vini quidem spiritu consentientem habuit Auctorem quem laudat Hallerus (f); de spiritu autem altero dissentientes alios, & in his Tacconum (g) qui de utroque spiritu plane discrepat. Idem; ne nimis sim, cum possis apud eos quos nominavi, & alios quoque, hæc, in aliisque humoribus facta pericula per te videre; idem, inquam, cum ex iis de quibus primum locutus est, calculis unum quem in spiritum nitri iniecerat, tenerrimum viderit evasisse; eos de quibus novissime verba facit, ab eo spiritu nihil mutato esse, affirmat, quod & Vallisnerius (h), & Bezoldus (i) pariter animadvertunt. Ex his varietatibus illud insuper addices, ignorari a nobis quo potissimum lithontripcticum in hoc, aut illo casu uti deberemus, si constaret, hos calculos, ut plerumque minus duri sunt, magisque friabiles, quam urinarii, ita per sua lithontripctica facilius dissolvi; quanquam in utrorumque comparatione non substantia solum, & junctura spectanda sunt, verum etiam quanto citius, & quanto plus dissolvendis humoris ad urinarias vias, quam ad bilarias, feratur. Quam ob animadversionem factum est, ut in prima hujus Curationis parte cum largissimus calida potus a pluribus proponatur, siluerim, non pariter taciturus, si hærente in renibus, aut ureteribus calculo idem proponeretur. Si tamen quæras, ex tot, & tam variis quæ in hac altera Curationis parte a pluribus promiscue laudantur, remediis quenam præcipue fefellerim; non alia magis respondebo, quam quæ magis mihi videntur innoxia, ut puta aut taraxaci succum, quando hoc Boerhaavius ab discipulo Scheffelio (k) dicitur sæpe calculum hepatis feliciter curavisse, aut recentis graminis, nemini post Glissonium (l), & Sylvium (m) ad huc usum non celebrari. Certe autem hæc una herba quid ad id possit, ostendit in quodam paupere Ill. Swietenius (n). Qui cum morbum hunc in aliis quoque per graminis, & taraxaci decoctiones, perque alia, diuturno, & constanti usu ingesta, averruncavit, semper in fecibus tunc invenisse se, scribit, calculos, vel grumos saltem calculosos magna copia. Quamvis autem non propterea se certum habere, fateatur, fuisse illos calculorum comminutorum partes potius quam exigua novorum calculorum inchoamenta, qualia in cysti, nec femel, reperta esse, jam supra (o) demonstratum est; tamen Glissonii observata, quæ & ipse agnoscit, satis ostendunt calculos illos tubulos (p) in bilariis boum meatibus hyeme innatos, recentis graminis pasta dissolvi; neque enim tempore citius quadragesima, aut Paschatis, imo antea eos sæpe tubulos, sed & postea reperisse.

51. Denique Curationis pars tertia novos gigni calculos prohibebit, primum si quæ vitia sint in jecinore, itemque in sanguine emendare poterit, unde calculorum productio pendeat: deinde si ea removeat a quibus vitia illa induci consueverunt. Sunt ea vitia in jecinore quidem infirmum robur, obstructio, alia hujus generis, in sanguine autem viscidum, terrearumque particularum copia, & æquo lentior, per jecur præsertim, motus. Porro inducuntur hæc vitia ciborum, potionumque insalubrium crebriori usu, prava eorumdem digestionem, non respondente ciborum copiarum in diluentibus, parsimonia, nimio somno, vita sedentaria inclinato præsertim antro-

rum corpore, graves animi affectiones, & quæ alia per te vides a Medico esse removenda. Sed nimirum hæc pars Curationis satis est a pluribus pertractata. Quoniam tamen aut ægri non diuturna obedientia, aut jecinoris in integrum restituendi difficultate, per sæpe accidit, non secus atque in urinariis videmus calculis, ut novi nihilominus progignantur; utile saltem erit dare operam, ut quoad ejus fieri possit, molles, & laxi bilis canales conserventur, ne novis transitibus calculis valde resistant, sed facilius obsequantur, id quod per assiduum, moderatam tamen diluentium consuetudinem erit curandum.

52. De lithotomia quæ in vesica quoque fellis nuper excogitata est, noli mirari quod supra non fecerim mentionem. Nam primum dolores qui ab lapillis exitum molientibus excitantur, non ab iis dumtaxat moventur qui a cysti, sed etiam ab iis qui ab Hepatico proveniunt ductu. Deinde qui maximi in cysti lapides sunt, quorum præcipue causa lithotomia hæc quibusdam videtur optanda, illi nec exitum moliantur, nec magnopere, sæpius saltem, molestiam creant. Huc illud accedit, quod nisi vesiculam causa aliqua arcte cum peritonæo connectat, ejus est sectio perniciofa; ea autem connectio ut vi morbi in nonnullis fuerit, in quibus casus, velut sæpe alia, sic & novam hanc lithotomiam excogitandi occasionem præbuit; tamen quam raro vel in morbida harum partium constitutione occurrat, norunt Anatomici; & cum est, quam non facile sit pro certo internosceri, sciunt Chirurgi. Novissime est in fecando nihil esset periculi; num in persequendo nihil erit difficultatis? Sunt ante oculos exempla fœminarum trium, Bononiensis (q), Francofurtensis (r), Gortinensis (s), quibus tumore in epigastrio oborto, eoque arte, aut sponte aperto, illac cystici calculi prodierunt. Primam perfanatam lego: alteri fistulam relictam, per quam tenuis, & chymosus quidem, sed flavus humor destillat: tertiæ ulcus, quod cum sanie calculos subinde felleos emittit. Quæ ultima historia Chirurgos potest in dubitationem adducere, claudendumne postea vulnus sit, an propter novorum lapidum metum non omnino claudendum. Non me quidem fugit, antequam tumor omnes antepositos occupet musculos, & suppurationem late moveat, & cuniculos sibi pus faciat, tanta diligentia indutriaque, ut in Francofurtensi muliere, curandos; non me, inquam, fugit, rem tunc cedere felicius debere vesiculam ferro aperientibus quæ jam arcte cum peritonæo concreverit: hujusque concretione signa ab solerti Chirurgi fuisse indicata. Verumtamen ut in re nova, licet magnam interdum possit utilitatem habere, mihi expectandum potius dum tempus pluribus iteratis exemplis dubitationes, pericula, difficultates tollendo, confirmet, quam festinandum in ea perinde ac si jam undique perfecta esset, proponenda, existimavi.

53. Habes de bilariis calculis non eam tractationem quam cupiebat Vallisnerius (t); sed quantum mihi cursum licuit ad illa addere de quibus minus fuisse antea felle, iterum, ac tertium scripseram. Quod si Soligenes, ut est apud Plinium (u), trinis commentationibus, quam diligentior esset ceteris, non cessavit tamen addubitare, ipse semet corrigendo; noli mirari, me hominem quidem non negligentem, sed tamen cum plerisque eorum qui hæcenus de iisdem calculis scripserunt, minime comparandum, tribus illis prioribus quartam hanc commentationem adjecisse. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XXXVIII.

Agitur de Hydropse Ascite, Tympanite, Peritonæi, & de aliis quos Saccatos vocitant.

Longissimis quæ ad te nuper a me datæ sunt, Litteris vereor ne multo longiores succedant, cum proximam adeo in Sepulchro esse video Sectionem XXI, cujus nunc sequi argumentum debeo, de Ventris Tumore, Hydropse. Nam in XIX. quæ de Scorbutu, aut in XX. quæ de Cachexia, Anastasia, Leucophlegmatia inscripta est, non est cur morer; quando iis in Civitatibus ubi vitam duxi, perraro, si unquam, a Scorbutu aliquis confectus est, alibi autem confectorum diffinitiones passim reperies, & singulares quasdam apud Poupertianum (a), & Meadium (b), tres autem isti alii morbi ejusmodi sunt, ut longe melius, aut certe commodius alio referantur. Itaque ista quæ ipsis tribuitur, Sectio, ubi Scholia detrahas, & Observationes, quæ ut diserte admonet Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

mur, ad febres, phthisim, ventris dolores, tumoresve, melancholiam, paralyfim, dyspnoeam, syncopem aliove attinent, & quarum aliqua interdum repetitur (c); ad non ita multas reducit, quarum plures alio pariter, & nominatim ad ventrium hydropes spectant. Quorum qui nobis tractandi sunt, Ascites, & Tympanites si soli materia essent XXI. Sectionis; fortasse non longior superiore hæc esset Epistola. Verum cum præter illos, plerique insuper ex reliquis tumoris ventris in ea Sectione proponantur; hos constitui in Litteras proximas rejicere; has autem non de aliis ferme quam de utroque illo hydropse, & Peritonæi, & aliis quos Saccatos vocitant, exarare. Nec tamen Observationes illas, hæc quoque attinentes, quæ alibi, & præsertim cum

(K) Obs. 3. supra ad n. 43. cit. §. 2. & seqq. (L) Obs. Med. I. 3. ubi de Colidochæ Meatu Obs. 3. (M) Vid. supra n. 42. (N) in ead. Obs. (O) Epist. 3. Anat. n. 10. (P) n. 10. (Q) n. 42. & 43. (R) c. 12. supra ad n. 44. cit. in Catell. §. 1. (S) Differt. supra ad n. 16. cit. §. 66. (T) Diff. supra ad n. 13. cit. §. 30. (U) apud Bartholin. Cent. 3. Epist. Med. 85. (V) cap. 3. supra ad n. 44. cit. §. 6. (Z) Obs. supra indic. ad n. 20. (A) Eph. N.C. Cent. 3. Obs. 62. (B) Progr. supra ad n. 17. cit. (C) D. diff. de Cholelitho §. 5.

(D) §. 6. paulo ante cit. (E) Epist. supra ad n. 13. cit. (F) nota r supra ad n. 25. cit. (G) supra ad n. 16. cit. (H) Epist. cit. (I) Diff. cit. §. 6. (J) Differt. supra n. 13. cit. §. 31. (K) Anat. Hepat. c. 7. (L) Prax. Med. I. 1. c. 45. n. 13. (M) §. cit. supra ad n. 46. (N) n. 19. (O) J. Vid. supra n. 12. (P) Vid. Taccon. supra ad n. 16. cit. (Q) A.R. N.C. Tom. 6. Obs. 69. (R) Haller. Opus. Pathol. Obs. 33. hist. 8. (S) Epist. supra ad n. 13. cit. Adnot. 2. (T) Nat. Hist. I. 18. c. 25. (U) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1699. (V) Monit. Med. c. 16. (W) Vid. Obs. II. §. 6. & g.

de Thoracis hydropse scriberemus, tradita sunt, hic iterum expectabis; sed alias five ex Valsalva, five ex nobis. Ejus sunt igitur quæ continuo consequuntur.

2. VIR annorum sexaginta, herniosus, difficultate spirandi, sitique corripitur. Venter, pedesque intumescunt. Siti tandem remissa, moritur. ABDOMINIS adiposa membrana, & muscoli cum secarentur, serosa in interstitiis materia apparuit: quæ in ventris etiam cavo occurrit. Cum hujus ima sinistra parte sacculus ex peritonæo factus, communicabat, intestinorum portionem continens. In Thorace pericardium sero scatibat. Fluidus in ventriculis cordis sanguis fuit.

3. Quæcumque hydropsis in hoc viro causa fuerit; nam est irruentibus in distractio mesenterio lymphæ ductum posse, non est negandum; tamen id quam rarissime accidere, & cum accidit, simul cum lymphæ chylum effluere, non ignoramus; quæcumque igitur causa fuerit; ad ascitum duos alios hydropes accessisse, vides, anasarcam, & pericardii. Rarum enim est, ut simplex sit: quod & infrequentes fere omnes comprobantur historia.

4. JULIA Bonetti annos nata quinquaginta quinque, gracilis, & utrinque gibba, cum paucis antea mensibus de minus facili respiracione queri cepisset; denique III. Kal. Decembris A. 1688. in Bononiense S. Mariæ de Morte Nosocomium ægra illata est. Laboriose respirabat, idque magis in sinistram latus cubans, quam in dexteram. Quod si in lecto federet; tum vero spirandi difficultas adeo ingravescerebat ut quasi suffocaret. Omnibus irritis auxiliis, augefcente in dies spirandi labore, debili & languido pulsu, leviusculis, sed crebris animi defectionibus tentata, facie tumida, & quodammodo livescente, obiit Idibus Decembris. VENTRIS cavæam aqua limpida opplebat. Omentum sine pinguedine quibusdam vesiculis repletum erat. Thoracis cavum dexterum quatuor circiter aquæ uncias; sinistram autem quantum poterat, continebat, ut in sterni exsectione efflueret. In hoc cavo pulmo nonnihil tumefactus, & purpureus, ut si inflammatione correptus esset; in altero parum, aut nihil ab naturali constitutione recedebat. Cordis ventriculus dexter cum multo concreto sanguine concretionem quoque habuit polyposam digiti crassitudine quæ tum in venam Cavam, tum in arteriam Pulmonarem producebatur. In sinistro ejusmodi concretionis tantummodo inchoamentum apparuit.

5. Uter præcesserit hydrops, thoracis, an ventris, non est facile in ejusmodi historiis pronunciare. In hac tamen si propter illius depravatam adeo structuram, ipsum quoque velis primum aquam collegisse; non repugnabo. Cæterum ob eandem structuram illa accidisse, crediderim, quæ contra ac fieri, solet, in hac femina observata sunt, ut difficilior spiraret in id latus cubans in quo pulmo tumens, & plurima aqua erat, utque in lecto confidens, propemodum suffocaretur.

6. VETULÆ cæpit autumno intumescere corpus universum, respiratio fieri difficilis, & sitis molesta. Ad hæc, nisi quod sitis sub finem debuit, accessit tussis cum sputis catarrhalis materia, & difficilis in sinistram latus decubitus, ut propterea in dextera fere semper cubaret; in quo decubitu & mortua est, cum pulsus jam se se adeo contraxissent, vix ut amplius perciperentur. CADAVERIS cutis, & muscoli dum inciderebantur, serum manabat multum. Serum etiam Ventrem implebat, qui ingenti, sed tamen molli tumore protuberaverat. Hoc serum, vitreo vase exceptum loci referebat colorem, unoque, aut altero circiter interjectione die, concrementum innatans ostendit adeo firmum, ut ne agitato quidem vase, in partes divelleretur. Reliquus humor, igni impositus, paulo post turbidus, & crassior factus, mox levem concretionem in lateribus vasis exhibere cepit: progrediente autem evaporatione, pelliculam in summo efformavit: sed postquam sic infra dimidium decreverat, similis omnino evasit cremoris hordeacei. Hepar maculis subalbis hic illic distinctum majoribus exterius, minoribus intus, pallescit. Lien prædurus. Lymphæ vasa circa lumbos, infraque per interiora ventris, satis manifesta per se occurrebant.

In Thoracis sinistra cavea undique solutus erat pulmo; at in dextera toto ambitu ad pleuram multis, sique implicitis, membranarum nexibus alligabatur: quas si membranas contrahentes; multum feri, in earum interstitiis conclusi, prodibat. Cordis sinibus magna copia sanguinis continebatur, fluidi, diluteque rubentis, ut in vasis omnibus: eratque cor intra serum, quo pericardium non oppletum modo, sed & valde fuerat dilatatum. Hoc pericardii serum, est colore, & firmo per se producto concremento feri simile visum est quod ventre continebatur; ad ignem tamen non concrevit, sed perpetuo liquidum, sensim avolans, levem dumtaxat in fundo vasis crustam reliquit. Utriusque feri lina particula inspecta, nec certæ figuræ inventa sunt: particularum tamen illius feri figuræ ab hujus figuris nonnihil discrepabant. Concrementum autem illud quod in pericardii sero innatavit, forma erat propemodum spherica, & ex parvis quasi vesiculis in unum congestis effici videbatur.

7. Solebat Valsalva cum aquam in corporis caveas effusam inveniebat, qualis ipsa esset, non modo attendere, sed & per varii generis experimenta quærere, sæpe igne utens, nonnunquam certarum rerum admistione. Solebat quoque lymphæ ductum sedes inspicere, & si turgent, si nullo modo se proderent, adnotare. Utramque hanc ejus consuetudinem cum in pleurisque aliis quas reliquit, hujus generis Observationibus, tum in ea præsertim animadvertitis quam modo proposuimus. Quærebat, ut credo, ratione utraque, unde aqua existeret, an a disruptis iis vasisculis, an aliunde; si forte post longam Observationum seriem eo perveniret, ut ex aquæ portione e vivente hydropico educat hanc ex iis vasisculis effluxisse, dignoscens, morbum insanabilem pronunciaret. Posita enim illa diagnosi, ut puta in exemplo alias (d) tibi commemorato, hæc prognosis consequitur, priscis aque incognita, ac vasa illa: quorum inventionem non mutam esse in hoc morbo prognosim, inconsulto quidam contendeant diligentioris Anatomæ reprehensores; illa autem sic mutata, medendi quoque rationem mutari, quod iidem negabant, manifestum est; cur enim Medicus fortioribus eos vexet remediis, quos debet dumtaxat qua ratione diutius in vivis fervere, non qua sanet, cogitare? Sed Valsalvæ longa opus fuisse ejusmodi Observationum serie, idcirco dicebam, quia lymphæ ipsa in variis, & vario tempore varia est. Quin Reverentissimi (e) addebat infusus loci unde provenit, varietatem, a læsis hepatis vasis lymphaticis cum ascite esse, scribens, in quo aqua extrahitur flava, & amara. Quem ut sequi auctorem minime necesse est; ita haud satis tutum arbitror iis adimplari qui cum Boneto (f), docent, a lymphæ ductibus esse eam aquam hydropicorum, quæ limpida sit, coloris experti, aut levissime tincta; a venis autem, quæ feri instar sit modo sinceri, modo aliis humoribus commisti urina colorem referentis. Et si enim in egro de quo ipse loquitur, cujus urinæ lixivium nigrum potius, quam nigricans, esse videbatur, non nisi ex lymphæ ductibus effluere in ventrem potuisset aqua limpida illam quam describit; at in aliis quorum aliter urinæ se habeant, aliunde potest provenisse.

8. Deinde quæ prius lymphæ erat limpida, si mora, & viscerum quæ vel ipsa denique corrumpat, putrilagine admista mutetur, num propterea a lymphæ ductibus non exiisse credenda est? Huc fallacias adde quæ sæpe, nisi quis diligenter attentione caveat, imponere possunt in cadaverum dissectione. Nam quæ aqua primum effluit, erit aliquando limpida, non quod in egro sic esset, sed quod in mortuo subsidentibus crassioribus particulis, quæ in summo est aqua purior est facta. Contra aliquando pura cum esset, ab ipsa sit dissectione impura. Sic olim animadverti, cum in hydropica quadam a sterno costas dividere cœpissim; limpidam prorupisse: cum omnes divissem, sterno sublato vidisse subrubentem: denique cum viscera contraxissem, & incidere vix inciperem, quidquid restabat aquæ colorem rubrum contraxisse. Quæ tanto magis attendenda sunt, quanto minus aquæ inest, aut superest, ut vel paucos sensim, & quasi clam admisto sanguine possit insci. Sunt & quæ ab læso viscere aliquo, vel ante sectionem, ut indicabam, admiscuntur, minus deceptura ubi & visceris læsio magna est, & major eorum copia. Sic apud Schacherum (g) cum esset conjunctum asciti ovarium plurimum auctum, & vitiatum, mirum non fuit, aquam satis alioquin, ut videbatur, limpidam, per evaporationem mox in substantiam pinguem coaluisse ita, ut partem unam aquæ evaporatione ablata, tres vero partes residua portio sebacea efficeret. Sic etiam Albertinum meminisse audivisse cum diceret, quorundam hydropicorum aquas, evaporatione adhibita, ex minima parte avolasse, ex maxima (credo ob aliquam ejusmodi causam) concrevisse, cum

cum aliorum, eodem adhibito ignis gradu, ex maxima avolassent, ex minima concrevisissent. Tunc vero maxime cavendum est, cum visceris læsio est adeo parva, ut facile possit oculos secantis effugere; ne si quidpiam vi ignis concreverit, non veram ab originem id referatur. Ex his, atque aliis quæ consulto prætereo, intelligas velim, cur istiusmodi Observationum, quas non contemno, sed cautissima diligentia habitas requiro, magno numero Valsalvæ opus fuisse, dixerim, ut, in quibus fallacia aliqua fuisse posset, iis neglectis, cæteras comparatas cum similibus in lymphæ, & in sero sanguinis experimentis, ad eos fines, quicumque illi essent, quos sibi proposuerat, utiliter adhiberet. Ad ejusmodi comparationem hortatur Cl. Phil. Frid. Gmelinus (h), ubi sua in tenaci Ascitica cujusdam aqua proponit experimenta. Alia leges, in humore quem saccati hydropis vesicula continebant, habita a Cl. Jo. Christoph. Pohllo (i). Minus multiplicia, quippe evaporatione dumtaxat adhibita, habet Ill. Senacius (k). Peculiariter reperies quidam, nimirum ad lactem hydropem attinentia, ortum quidem, ut videtur, non ex chylo tantum, sed disruptis chyloferis vasisculis effuso, quemadmodum in Littrii (l) Observatione, sed ex illo cum multa communi ascitica aqua misto, reperies, inquam, in Historia Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis (m). Quales autem plerumque sint ductæ ex hydropicis aquæ, & quam variæ, alias in ejusdem Academiæ Commentariis (n) docuit junior Verneyus simpliciter certe, quippe nulla addita externa ope, sensibus dumtaxat fretus, sed multo commodius, & ad prognosim utilitate latius patente.

9. Verum ne Vetulæ cujus proposita historia est (o), obliiti esse videamur; si hanc cum illa quæ proxime præcedit, gibbera historia (p), & cum prima viri (q) comparaveris, intelliges, vetulæ decubitus haud alium fuisse ac quem thoracis latus magis laborans requirebat. De siti autem ante mortem remissa in viro, sublata in vetulæ sic fortasse poteris existimare, quod aut sentiendi vis prope obitum jam hebesceret, aut distento jam ventre quod humoris in sanguine supererat, ejus pars ad fauces madefaciendas tunc iret, catarrhali materia quam vetulæ expuebat, id indicante. Neque enim necesse est, ut in hydropicis omnibus serum sanguinis ad sitim tollendum ineptum sit, id est muræ sit, ut interdum ab nonnullis gustando perceptum est, multo similis, quam aquæ.

10. VIRI quinquaginta annos nati, qui universali hydropse laboraverat, VENTER, est nulla exterius apparebat tensio, aqua erat plenus. Hepar coloris atri, lien aliquantulum auctus, reliqua ventris viscera sana erant. Lymphæ ductus valde turgabant: & cum multæ essent glandulæ infra Emulgentia vasa juxta venam Cavam, & arteriam Magnam circumjectæ, ii ductus ex mesenterio ad has glandulas, ex his in Thoracicum ductum ferebantur. In Thorace aqueus humor: pulmonesque nigris maculis variegati. Pericardium hydropse proprio usque adeo erat expansum, ut aere distentam urinariam bovis vesicam magnitudine æmuleretur. Ut omnia hujus corporis vasa proportionem magna erant, sic & cor magnum; sinistra autem ejus auricula ita erat dilatata, ut dimidiatum cor quasi æquaret. Cor vero exterio remembranam a sinistris erofam, vasa intorionibus varicosis spectanda habebat: in ventriculis autem sanguinem continebat fluidum sine ullo concretionis indicio.

11. Creditu difficile est, Valsalvam, cum pericardium usque adeo aqua distentum, auriculam autem sinistram ita amplificatam invenisset, ut hinc fortasse, quemadmodum retardatus ubique sanguinis motus, sic universalis hydrops magna ex parte sit consecutus; creditu, inquam, difficile est, non quævisse diligenter omnia de quibus æger conquestus esset, aut si peculiare quid audivisset, non adnotasse. Quod tamen ad pericardii hydropem attinet, cum Vetulæ quoque de qua supra (r) diximus, pericardium aqua haberet valde dilatatum, videre potuisti, inter signa quæ in ea historia sunt recensita, num ullum esset pericardii potius hydropis, quam cæterorum quæ præter naturam simul inventa sunt, peculiare. Decubitus certe neque antea difficillimus, nec extremo tempore necessarius, nec humilis capite fuisse dicetur: quæ cum iis conferes quorum a nobis ibi mentio facta est ubi illius hydropis alia ab aliis proposita signa pro veri studio examinavimus (s). Ne vero ex pro-

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

xima, quam subijciam, Observatione suspicari incipias, ejus peculiare signum esse supini decubitus necessitatem, cum tot alia faciunt in quibus aliter sine altero fuit, tum illa præsertim faciet quæ proximam continuo sequetur.

12. ANUS septuaginta annorum difficile respirabat, multum sitiebat, sicca tussi vexabatur, non nisi in dorsum cubare poterat. Cum hæc diu perdurassent, tumentque pedes œdemate; mortem obiit. VENTER aqua plenus erat. Lymphæ ductus circa arteriam Magnam qua Emulgentes promit, turgabant; in mesenterio, atque alibi vix apparebant. Renes parvi, nec sine hydatidibus. In Thorace pulmones sani: & medicis feri copia. Hoc autem plenum erat pericardium: in quo cor duplo majus quam secundum naturam, flaccidam concretionem polyposam continebat; auriculæ autem sanguinem, a quo valde turgabant. Cæterum naturalem sanguis fluorem, coloremque in hoc cadavere servabat.

13. SENEX annorum totidem, pedum œdemate, magna siti, & tussi corripitur adeo inter dum dolorifica, & vehemēti, ut suffocari videatur. Catarrhalem materiam expuit: difficile respirat: decumbere, nisi supinus, non potest: humili, & debili est pulsu. Moritur. IN VENTRE aqua stagnabat: & lymphæ ductus ad Emulgentium vasorum divisionem adeo turgabant, ut tres quatuorve eorum, singuli anferinæ pennæ crassitudinem æquarent. Lien prægrandis, exterius nonnulla corpuscula ostendebat granorum milii instar. In Thorace pulmo uterque ad dorsum, ad latera, ad sternum adhærebat, interstitiis inter se, pleuramque relicti, aquam continentibus. Contra in pericardio nihil humoris: & ipsum per fibras multas membranaceas cordi se annexere jam incipiebat. In cordis ventriculis concretus sanguis, & in auricula quoque dextera, in qua primo aspectu placenta uterinæ portionem referebat. In sinistro ventriculo polyposa concretio, ab omni parte separata.

14. Vides igitur utraque hac collata Observatione, cum supinus decubitus utrobique esset necessarius, non utrobique pericardium sero plenum fuisse, imo in Sene humoris nihil habuisse. Quod si viscerum inter se compares vitia; gravia quidem reperies in utroque; sed non eadem. Nec sanguinis utrique eadem constitutio; imo, quod in superioribus etiam hydropicis animadvertere potuisti, alii prorsus alia. Anui enim fluidus fuit; Seni concretus: & quod polyposi habuit, in illa flaccidum laxumque, in hoc compactius, & quod raro a Valsalva adnotatum est, in sinistro ventriculo, non in dextero. Ejusdem igitur decubitus variæ sunt causæ, nec raro difficiles habent explicatus, ut alias (t) ostensum est, & duabus quæ sequuntur, Observationibus inter se, & cum proxima superiore collatis, ostenduntur.

15. FEMINA gracilis, annum agens circiter duodeviginti, quæ jam ante menses quatuor vulnus acceperat ad umbilicum, difficile spirabat, valde sitiebat, nonnihil expuebat, de dolore querebatur in sinistra thoracis parte, in quam, ut neque in dorsum, cubare non poterat. His omnibus ingravescitibus, moritur. IN VENTRE sana erant viscera omnia; ut vel in ipsis intestinis, qua umbilico respondebat, nihil vitii animadvertere licuerit præter colorem quasi nigricantem. Ventris tamen cavea subflava aquæ libras tres, quatuorve continebat. Thoracis quoque sinistram cavum aqua erat plenum omnino simili, nisi quod in hac concretionem quædam innatabant, pellicularum instar. Hac in aqua pulmo erat sanissimus, & ab omni adhæensione liber. Pulmo autem dexter cavum suum exacte implebat, quippe ad pleuram undique adhærens: adeo, ut separari vix posset: eratque aliquantulum induratus, ut phlegmone quodammodo tentari videretur. Uterque cordis ventriculus laxam concretionem polyposam continebat; dexter tamen majorem, quam sinister. Cæterum lymphæ ductus in hoc cadavere nullo modo turgabant.

16. ADOLESCENS annorum circiter septendecim, corripitur difficili respiracione, sicca tussi, maxima siti. Parum mingit. Latere dextero nonnihil dolet, in hoc assidue cubat. Tandem interit. VENTER aqua plenus: intestina, & ventriculus albidus: totum hepar durum: lien, nisi quod paulo major erat, cætera sanus. Lymphæ ductus non turgabant, ut aliquoties in quibusdam hydropicis, sanis visceribus, est observatum. Thoracis cavum dexterum aqua redundabat. In eodem pulmo induruerat: & tota ea facie qua diaphragma,

F 3

(b) Commenc. Litt. A. 1745. Hebd. 52. n. 3. (c) Ad. N. C. Tom. 8. Obs. III. (d) Traité du Cœur l. 4. ch. 3. n. 4. & ch. 9. n. 2. (e) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1710. Obs. Anat. 7. (f) A. 1700. (g) A. 1703. (h) n. 6. (i) n. 4. (j) n. 2. (k) n. 6. (l) Epist. 16. n. 45. (m) Epist. 20. n. 25. & alibi.

(d) Epist. 16. n. 5. (e) Diff. de Mor. Bilis S. 276. (f) Sect. hæc 21. Schol. ad Obs. 18. (g) Hist. de Virgine Ascit.

phragma, & qua mediastinum spectabat, his adhærebat. In pericardio parum, aut nihil feri. In omnibus vasis, etiam quæ sunt in visceribus, sanguis fluidus.

17. Cur in latus dexterum hic assidue decumberet, statim intelligis simul ac cogitas, aquæ copiam quæ in eodem erat latere, nisi in hoc cubaret, fuisse alterum, quod sanum erat, prægravaturam. Sed Mulier (u) cum a finitris aquæ copiam haberet, cur in finitrum decumbere latus non poterat? Nempe etiam pulmonum rationem habes, necesse est, quorum finitrum erat Mulieri; dexter non sanus Adolescenti. Veruntamen cur Mulier cubare in dorsum non poterat? Sic enim neutrum latus alteri aut aquæ pondere, aut mole pulmonis, phlegmone tentati, officisset. Senex (x) certe cum utrumque pulmonem sic undique simul alligatum, simul aqua in circumiectis interstitiis collecta circumpressum haberet; in dorsum non modo cubare poterat, sed debebat. Vides igitur, cur decubitus dixerim non facile interdum posse explicari. Præstat autem hac de re non plura iterum hic verba facere; sed Valsalvæ reliquis Observationes subiicere, in quibus cum hydropice conjunctam lymphæ ductuum turgentiam non vidit, id quod in duabus quoque descriptis modo historiis animadvertere potuisti: etsi facile neque tu, ut puto, neque ego certe satis perceperim, cur in prostrata dixerit, turgentiam illam aliquoties in quibusdam hydropicis, sanis visceribus esse observatam: quod profecto haud potuit ad Vetulam (y), ad Virum (z), ad Anum (a), ad Senem (b) referre, in quibus ut illa turgentia fuerit, sana tamen viscera non fuerunt. Alias igitur suas Observationes respexerit, necesse est, exempli gratia illam, tibi alias (c) a me descriptam, in qua cum hydropice cuncta ventris viscera bene se haberent, simul turgebat vasa lymphatica; nec fortasse aliud hic voluit, nisi in illis etiam hydropicis quorum sana sint ventris viscera, turgentia interdum ea vascula reperiri.

18. JUVENIS annos natus circiter duodetriginta magnopere edax, & potulentus, cum aliquot jam annos aliqua respiratoris difficultate laborasset, tandem in hydropem incidit universalem. Huic septem ferme ante mortem diebus accessit major spirandi difficultas, cum tussis, spūto, & dolore in thorace. INCADAVERE Venter, & Thorax subfuso sero pleni inveniuntur, eodemque colore infecta viscera omnia, si intestina excipias, & ventriculum. Hic naturalis magnitudinis modum valde superabat. Lien quoque triplo quam par esset, major. Bilis erat pallida. Lymphæ ductus nulli in conspectum venerunt. Similiter pulmo erat multum inflammatus, ex quo accelerata mors jure credita est, & ad pleuram per membranas annexus, quarum interstitiis descriptum serum concludatur.

19. Hypothesis vi potius, quam Hippocratis auctoritate, aut hydropicorum dissectione, adductos olim pleurotque fuisse Medicos, ut jecur primum, deinde & splenem hydropis auctores facerent, vel ex Sepulchreto cognosces five ubi (d) in Hippocraticis libris non unum, aut alterum, sed plura hic culpari viscera, ostenditur, five ubi (e) bene multi productis hydropicorum extispiciis, infons fuisse utrumque illud viscus, demonstratur. Et certe quæcumque Pars, imo quæcumque causa diutius potest sanguinis, aut lymphæ cursum morari, aut humoris quo cavæ corporis madent, præter modum aut secretionem augere, aut exitum deinde imminuere, morbo huic potest originem præbere. Venter autem præter hæc, peculiare habet Partes e quibus humor in ejus cavum effunditur aliquando. Fuit, inquit Piccolhomini (f), qui plurimum bibens, & nihil, vel cathetere immisso, urina reddens, ventre sensim mirum in modum intumescere, denique mortuus, calculis penitus dilaceratos renes ostendit, ut manifestum esset, ex his lorum in ventrem defluxisse, eumque distendisse. In Sepulchreto, ubi hanc Piccolhomini Observationem frustra quæsi, habes alias Plateri (g), & Dodonæi (h) ascitis, salvo hepate, & liene, ab urina facti effluente ex rene, aut ex vesica, quæ exulceratio perforaverat. Quod autem præterea indicat Dodonæus (i), minime dubium est, idem eventurum, si forte ureteres perrumpantur, aut erodan-

tur, præmonstrante Gaseno (k), & confirmante inter alios Eustachio (l), præstis illis in viva bestia, & abdomine confuso, inventum iri ventris cavam totam lotio plenam, veluti si aqua intercutē laboraret animal: idque ruptis iis canalibus in viris duobus accidisse, Abr. Vateri (m), & Winharti (n) docent historiæ. Quod ad genus Observationum referenda illa est Cl. Berneri (o) in sexenni puero cujus urina cum e renibus egredi non posset, hos ita distenderat, ut per ipsorum superficiem via sibi aperta, in ventris cavum destillaret, intestinaque circumfunderet. Quin etiam huc pertinent ulcera, ventriculum eo loco perforantia, ut potionibus magis, quam cibis, exitum præbendo, ascitem vel facere possint, vel augere. Sic accidit in Observationibus Doctorum Virorum Samuelis Gratii (p), Ad. Christ. Thebesii (q), Rud. Jac. Camerarii (r), & Jo. Georg. Hoyerii (s).

Porro ad illa quæ ex Sepulchreto indicata sunt, hepati, & lienis in hydropicis infantum exempla, nova minime defunt quæ addantur. Vides, ut alia, in iis illud quod paulo ante memorabam, Vateri; nam huc quoque, imo præcipue, attinet; ea, inquam, vide quæ a Cæsarea suppeditantur Academia (t), inter quæ est quoddam (u) ubi jecur pessime affectum eo facilius omnes credidissent, quod ægra nulla de re magis, quam de ejus visceris dolore conquesta erat. In eo tamen, ejusque cysti lates nulla; sed in proxima mesenterii parte deprehensa est erosio tanta, ut palmæ latitudinem ferme æquaret. Quæ omnia ut vera sint, non erat tamen a quibusquam in contraria adeo decurrendum, ut jecur, aut splenem contenderent perraro, si unquam, esse culpandum. Leges, exempli gratia, in aliqua ex superioribus proximis Sepulchreti Sectionibus (x). Medicorum vulgo quidem nil solennius esse, quam lienem contumeliosis afficere, quasi omnium prope malorum esset pancreas. Certe illos in hoc errasse, fatendum est. Verum cum id continuo subiicitur, Extæ autem a fatæ consulentibus variis nihil, quam vitii quicquam in eo crevisse; si hoc ab aliquo generatim, aut ut in ascite præsertim, accipitur, quantum a vero ablit, cum ingens in Sepulchreto ipso (y), Observationum ostendit numerus; tum de novem quæ ex Valsalva produxi, quinque (z) confirmant, in quibus aut prædurus inventus est, aut æquo major, imo, ut in novissima, unde hæc scribendi data nobis occasio est, triplo major. Quod si de jecinore fermo sit; videbis in illarum quatuor aut pallens, & maculosum, aut atrum, aut omnino durum, aut cum bile pallida fuisse. Nec mirum, si morbus quem in primis a retardato motu sanguinis oriri diximus, a vitio haud raro proveniat viscerum per quæ tarde lenteque ex instituto naturæ sanguis traducitur, ut si qua nova accedat remorans causa, non nisi tardissime moveri queat. Itaque ad Valsalvæ Observationes, & ad eas quæ in Sepulchreto extant, passim occurrunt quas adjungas, ut cum haud paucas ubi quæras, indicavero, nullus dubitem, plures alibi superesse. Vide, exempli causa, quæ in asciticis duabus Virginibus per dissectionem conspexerit junior Verneyus (a), itemque in plurimis eodem morbo affectis Naturæ Curiosus (b): nec omite quæ in Viro illustri Cl. Bechmannus (c). Ex his omnibus asciticorum dissectionibus ne unam quidem perleges, quin jecur male se habuisse, cognoscas. Simul autem in earum aliquot diserte adnotatum animadvertes, ut male se quoque lien habuerit. Nec aliæ defunt ex quibus intelligas, cum in eodem morbo hepar non admodum a naturali statu discessisset, lienem magnum fuisse, & duriusculum, aut cum hepar prorsus naturaliter esset constitutum, lienem solito majorem, & totum quantum scirrhusum, tamque durum fuisse, ut non sine difficultate scindi & dividi novacula potuerit. Quorum exemplorum alterum est Lentilii (d), alterum Cl. Cohausenii (e). Non tamen diffiteor, quæ vitia hic visceribus, aut pancreati, mesenterio, aliisque Partibus ventre conclusis, initio non essent, ea posse, hydropice diutius protrahere, aliquando induci. Sed indicia sæpe sunt, ea vitia antecessisse, five omnia spectentur quæ ægrum ante hydropem male habuerint, five quædam attendantur quæ occurrunt in mortui dissectione, velut proxima indicabit historia.

20. MU-

20. MULIER hydropice ascite laboraverat.

CA-DAVER incidendo, nulla, nisi Ventris, cavea inventa est quæ esset aquæ plena. Intestina aere non erant distenta. Hepar autem erat durum, ejusque velicula lapidem, omne ejus cavum occupantem, continebat. Lymphæ ductus nullo modo apparebant.

21. Hæc una est ex reliquis illis Valsalvæ Observationibus quas tibi Epistola superiore (f) pollicitus sum, ut plene intelligeres, non magis ab illo, quam a me, regium morbum simul cum cystis felleæ calculis fuisse adnotatum. Porro minus veri simile est, tantum lapidem non a longissimo antea tempore fuisse inchoatum, ut demum ad totam cystim opplendam perveniret: nec, quod consequitur, sine antiquo vitio fuisse id jecur, in quo tandiu bilis secreta esset idonea ad ejusmodi lapidem perficiendum. Quod vero diserte interieci quæ est, intestina aere non fuisse distenta, eo attinet, ut intelligatur, etsi possint Ascites, & Tympanites conjungi, non semper tamen, ut videntur quidam credere, id fieri. Quin ut rarius accidit, ascitem, quem admodum in proposita femina, nullum alibi hydropem conjunctum habere, sic minus sæpe fit, ut in asciticis conclusa ventriculo, & intestinis magna vis flatuum, in tympaniticis autem aqua multa præsertim, & necdum inveterato morbo effusa in ventrem occurrat. Et sane pauca sunt in muliere de qua protinus dicebat.

22. FEMINA annum agens circiter trigessimam, post diuturnos artuum dolores, multa scabies, eaque humida, correpta est. Quam ut abigeret, de consilio Empirici unguento quodam est usa. Sic brevi quidem scabie est scabies; sed acuta febris oborta est, ingenti calore, & siti, ac favissimis capitis doloribus stipata. His postmodum accesserunt delirium, spirandi non modica difficultas, totius corporis levis tumor, ventris tamen non levis, magna inquietudo, mors denique sexto ex quo febris lecto affixerat, die. IN CADA-

VERE R. I. S. dissectione animadversum est, scapello cuti, & carni impresso, nihil aquosi humoris prodire, ut manifestum esset, universalem illum de quo dictum est, tumorem non oedematis instar, five anasarcae fuisse: quod & digito pressi pedes ostendebant, nullum pressione vestigium servantem. Venter quoque tumidus, & valde tensus, cum aperiretur; non aqua, sed intestina, & ventriculus erupere, nihil nisi aerem continentia, quo usque adeo distendebantur, ut ventriculus plus quam dimidium cavæ ventris impleveret. In hanc tamen cavam effusa inventa est libra una, & altera limpidi feri: quod ignis vi primum quidem leviter concreverat vitum est; sed postea, ferme instar aquæ pericardii, totum in auras abiit, nisi quod in fundo valis flavam quasi pelliculam reliquit. In Thorace pulmones reperti sunt ad pleuram annexi per quoddam quali membranas, gelatinosum corpus referentes, quæ tot erant, ut appareret, minus libere sedulatare potuisse pulmones. Eas si secares; pellucidus humor prodibat. Cor ad dexteram cum pericardio connectebatur per fibras nonnullas membranas: ejus ventriculi sanguis inerat fluidus; sed tamen in dextero tenuis polyposa concretionis inchoamentum est animadversum. Caput secare non licuit.

23. Multa, atque humida scabies quæ mulierem a diuturnis artuum doloribus liberaverat, importune retro pulsata, mortem attulit. Scilicet acres particule quæ artuum membranas antea compungere solebant, jam perulcusculis in cute productæ, salubriter ejiciebantur. His autem ulcusculis siccatas, in sanguine resistentes, internasque partes irritantes, & acutam febrem, & mala cætera, quæ hanc comitabantur, gravissima invexere, in iisque tympanitem. Quæ hydropis, sic enim Majores vocant; species etsi diuturnis morbis, ut ait Littrius (g), ordinario succedit; nonnunquam tamen fit in acutis, velut hic; imo etiam in multo acutioribus, ut ipse vidi, & alias perscribam. Et post diuturnos quidem, magnosque morbos proclive est cum ipso intelligere, ex effuso sanguine totalesque spiritus non posse existeret, quot, qualesque intestinum, & ventriculi requirunt fibra, ut aeri qui in utrorumque cavo est, fati renitatur, si præsertim ille multus sit, multumque rarefactus; ne viscerum eorum parietes incredibilem in modum distendant. Sed in acuto hoc morbo erat aer utique ad rarefactionem pronus; ut vel in vasculis quæ sub cute sunt, & per quæ fortasse minus meabat libere, se quadatenus expandere videretur, & leve quasi emphysema inducere. Effectum Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

tamen sanguinem, & hic debiles eorum viscerum tunicas num credemus fieri potuisse, si non ab longitudine, a vehementia saltem morbi? quanquam ut erat hic acerbissimis capitis doloribus, & inquietudine, ac delirio stipatus, non tam spirituum inopiam, & languorem, quam copiam, abnormesque motus indicabat. Nec tamen propterea in Willisii sententiam transibimus, fuisse etiam in Sepulchreto (h) relata, qui contra ac postea Littrio placuit, a copioso, inordinatoque spirituum influxu in fibras viscerum illorum, tympaniticam ipsorum distentionem repetebat; quasi vero fibræ circa membranosos tubos dispositæ, cum ipsæ inflantur, non horum cavum potius contringerent, distentionique resisterent. Equidem præstare, credidero, ut hic ex utraque sententia tertiam quandam conflata sequamur, existimantes, abnormi spirituum influxu contractas hic illic, & convulsione adstrictas fibras, naturales horum tuborum motus, & quod consequitur, multi, & multum rarefacti aeris expulsionem interceptisse, qui propterea fibras cæteras in iis in quibus concludatur, tractibus tanto magis urgens, quanto magis, & copia, & vi augebatur, harum quidem primum, deinde & illarum quarum prægressa convulsio robur infractum reliquerat, pervicisse renixum, sicque infirmatis denique, laxatis omnibus, universos hosce tubos dilataste. Adeo autem convelli posse carneas intestinorum fibras, ut omniem intercepto aeri exitum intercludant, repertæ haud raro in dissectionibus archissimæ hic illic intestinorum constrictiones ostendunt. Observatores non pauci enarrant, inquit Cl. Corn. Henr. Velle (i), & ipsi in cadaveribus sæpius vidimus: quum intestinum hic laxum, molle, distensile, flaccidum, illic durum, contractum, rugosum, non ulterius digitis coarctandum, nec liquidis esset patulum, sed massam fere referret solidam. Hæc autem postquam dixit per totam intestinorum longitudinem interdum alternari, ut in cadavere infantis vidit: quid interclusus elasticus aer ob calorem loci magis magisque expansus, efficiat, ac sua comprobatur Observatione (k). In puella bienni vidi, inquit, portionem intestini Coli adeo violenter ab incluso aere amplificatam, ut referret vesicam constantem tunicis ob summam elongationem quam pellucentissimis, reliquo ejusdem intestini tractu & supra, & infra hunc tumorem, per summam contractionem extrinsecus sulcato, & prorsus impervio. Huc addas velim pariter imperviam contractionem quam inter superiorem & inferiorem virilis Coli partes, aere maxime distentas, vidit Pracl. Bassius (l). Laxatis autem; ut in iis qui videnti sunt, necesse est; istiusmodi constrictionibus, jam infirmissimas sub tanta pressione factas esse fibras, a me tibi non opus est inculcare, ut neque tractus illos certos in quibus aut pressio, aut aer fuerant, totis hujus viribus expansum iri, idque eo magis, quo fuerint hæc, aut esse perrexerint validiores. Itaque non miraberis in Laubii (m) Observatione, si ventriculus esset corrugatus. Colon vero adeo distentum, ut vir robustissimus facile totum brachium intrudere potuisset, aut quod Littrius (n) sæpe viderit Cæcum, & Colon femoris virilis crassitudine, imo quod Platerus (o) vel in puero intestina conspexerit quæ eandem crassitudinem certis in locis adæquare videbantur. Vicissim est alias (p) immanis adeo præcæteris ventriculi distentio, ut contiguam jecinoris partem, & diaphragma non modo altius compulsi, sed & descendere prohibuisse, ægrumque in id periculum propterea conjecisse interdum credita sit, ut præsentaneum, intentatum adhuc, auxilium exposceret quo aeri confestim exitus pararetur ope acus oblongæ per finitrum hypochondrium in ventriculum demittendæ. Sed de hoc infra (q). Cæterum quam distentus esset ventriculus in proposita (r) quoque Valsalvæ femina, animadvertere potuisti. Unde nacti occasionem fumus tympanitis certis in casibus non sine prævis convulsivis adstrictionibus explicandi. Quod si in omnibus forte malueris Littrii explicatione uti; eo minus pertinaciter repugnabo, quod in omnium progressu ad ipsam nihilominus, si vera sunt quæ paulo ante dicebam, est redeundum.

24. Et sic quidem tympanitis causæ tum post diuturnum morbum, tum in acuto intelligitur, cum rarefacti aeris copia, & vis intestina, & ventriculus, & quod consequitur, his appositum abdomen distendit. Sed est alia tympanitis species, cum idem aer, extra eorum viscerum cavum rarefactus, ipsum dumtaxat extendit abdomen. Hujus musculi, ob id etiam creati, ne rebus secundum naturam se habentibus, ea

F 4

vi-

(u) n. 15. (x) n. 13. (y) n. 6. (z) n. 10. (a) n. 12. (b) n. 13. (c) Epist. 16. n. 4.
(d) Sect. hæc 21. Schol. ad S. 4. Obs. 7. (e) Sect. hæc 21. Schol. ad S. 4. Obs. 7. (f) Sect. cit. Obs. 8. S. 2.
(g) Ibid. Obs. 25. S. 13. (h) Ibid. (i) Ibid. (j) De natural. Facul. l. 1. c. 13. (k) Tract. de Ren. c. ult.
(l) in Procr. edito Wilmersb. Janu. A. 1710. (m) in Append. Tom. 2. Act. N. C. fol. n. III. (n) Eorund. Act. T. 1. Obs. 219.
(o) Eph. N. C. Dec. 3. A. 3. Obs. 40. (p) & Cent. 3. R. 4. Obs. 120. (q) & Cent. 5. Obs. 43. (r) & Ador. T. 4. Obs. 124.
(s) Dec. 3. A. 7. & 6. Obs. 13. & 168. & A. 6. & 8. Obs. 186. (t) Obs. hæc 186. (u) Sect. 18. Obs. 3.
(v) Vid. quot sub Obs. 6. & 7. & alibi congerantur. (z) n. 6. 10. 13. 16. 18. (a) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1701. & 1703.
(b) Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 278. & A. 7. & 8. Obs. 153. & A. 9. & 10. Obs. 239. 241. 248. & Cent. 1. Obs. 3. in Coroll. 3. & Cent. 3. Obs.
(c) & Cent. 8. Obs. 27. & Cent. 9. Obs. 54. & Cent. 10. Obs. 86. & Act. Tom. 6. Obs. 15. (d) Commerce. Litter. A. 1742. Hebd. 32. n. 1.
(e) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obs. 168. (f) Commerce. Litter. A. 1743. Hebd. 25. n. 2. Cal. 3.

(f) n. 25. (g) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1713. (h) Sect. hæc 21. in Schol. ad Obs. 22. (i) Disps. de mutuo intell. inereff. P. 1. S. 14.
(k) Ibid. S. 15. (l) Dec. 3. Obs. Anat. 9. (m) A. N. C. Tom. 2. Obs. 20. (n) Mem. cit. (o) Sect. hæc Sepulchr. 21. Obs. 22. S. 4.
(p) Act. cit. Tom. 1. Obs. 49. cum Schol. (q) n. 25. (r) n. 22.

non fecus ac Medici faciem solent, contemplabantur, idque eo utilius, quo plura ibi, & conspectiora vasa luculentius sanguinis naturam ostendunt. Non hæc ego narrem tibi, nisi Boerhaavium (i) nuper vidissem, idem, ut opinor, signum indicantem, & diserte a veterinaria Medicina ad humanam traducem sic ut tunica adnatæ, & caruncula oculi pallido colore significari, doceat, aquas cacochymias, & cum sanguinem rubrum deficere, ex illo signo cognoscimus; adesse vitia omnia quæ hunc defectum sequuntur. Certe plura horum adesse possunt, aut non multo post consequi. Sic inter eas oves quas a me eo tempore inspectas dixi, una fuit, quæ etsi non meliori jecinore, quam cæteræ, nec minus hydropica; præpinguis erat tamen, alboque, & solido adipe, omento pulcherrimo. Scilicet recentior huic erat morbus: quod si cum illo tandiu vixisset, quam cæteræ; minus pulchro omento, atque adipe fuisset prædita. Ad prima enim vitia subinde alia atque alia accedunt; ut in hominum, ad quos redeo, cadaveribus videre est, quæ viscera tanto vitiorum plerumque ostendunt, quanto illos diutius aut hydropes, aut morbi hydropem præcedentes maceraverint. Utriusque casus exemplum afferam: & primum secundi.

30. CASPARUS LOMBRIA Patricius Venetus, bilioso, ut vocant, temperamento, amplo corpore, atque robusto, eoque magis, in omni vivendi genere, præceptionum medicarum securus, postquam annum excessit quadragesimum, longo, & vario morbo correptus, in eoque refrigerantibus potionibus præter modum usus, e morbo quidem evasit, sed ventre aliquanto tumidiore. Qui cum remedium ope detumesceret, nihil magnopere habuit animadvertendum, donec alvi quidam fluxus recurrere per intervalla, nec sine violentia aliquando, coeperunt. Ab his fitis, quæ alioquin ipsi quasi innata erat, augebatur, urinae autem, quæ magna copia reddi solebant, tunc saturatissima facta, minuebantur. Vires tamen nihil detrimenti capiebant donec circa extremam hyemem anni 1722, qui erat ætatis ejus quadragesimus septimus, diarrhoea, quæ antea multa flava, & fluida egerere octo, aut decem diebus consueverat, mensiem pene totum detinuit, prodeunte variorum colorum materia, plerumque autem cruda, & serosa, nec sine spuma. Quæ diarrhoea cum aptæ curationis ope deflisset; mox, neglecta vivendi norma, vel gravior reverfa est. Conquieverat iterum, cum tremor jam ab ineunte usque ætate levissimus, deinde post primam illam agrotationem toto corpore manifestior, subinde autem ab alvi fluxibus gravior factus, focias sibi novas quasdam capitis affectiones adiecit. Cum propter illum tremorem jam olim Medici, quibus diligentius parendum fuerat, generosis vinis interdixissent, ob has autem novas affectiones parcam sanguinis missionem permitissent; in summo hujus concremento crustam, & hanc ex dimidia parte colore viridi conspexerunt. Curatione tamen opportuna adhibita, jam vires, color, cibi appetitus, urinarum copia sic satis restitui videbantur, cum pertædere ægrum cepit, neque ultra diem trigelimum uti non inutilibus remediis voluit. Ad horum omissionem mox accesserunt violenti corporis, & animi motus. Quos, intra quindecim ab omissione remedium dies, initium repente excepit funesti morbi. Abdomen, quod sæpe antea a multis flatibus tumescere, sed mox detumescere consueverat, assiduo molestissimoque tumore tendi cepit, & manu percussum, tympani instar resonare: tumere etiam nonnihil pedes: urinæ flammeo colore fieri, multumque imminui: sitis urgere. Cum hæc animadversa essent extremo jam Majo, & Michelotto, qui adversus hunc tympanitem incausum pugnare coeperat, ante medium Junium in Galliam cum Viris Amplissimis Venetis Legatis esset profecturus, mihi ægrum, eodem tempore Patavium transeuntem, maximopere commendasset, ut nisi assidue cum ejus Medico inv. fere possem, at sæpius saltem, cum per alias liceret occupationes, consilio juvarem meo; quæ, necdum ægro viso, ex attenta dumtaxat eorum, quæ summam nunc ad te perscripsi, lectione aliorum viscerum labem, aliorum infirmitatem conjiciens, de ægro sanando desperavi: neque id Affinibus reticui probe consiliis, toto illo septennio nunquam propemodum morbo aliquo vacasse, & interroganti mihi illud confirmantibus quod in calce est librorum de Morbis, ex alio morbo corpus liquefactum ad hunc devenisse. Igitur quæ ibi continuo subiiciuntur, diserte iisdem enunciavi: si quidem igitur subito occupaverit hic morbus hominem, moritur nempè alio morbo diutissime jam affligente. Neque alia mihi postquam ægrum vidi, sententia fuit: in quam deinceps venerunt ad unum omnes quotquot ea tempestate

Patavii magis florebant Medici. Nam etsi flatibus supra, infraque interdum prodeuntibus, abdomen amplius, si manu percuteres, non resonabat; tamen hujus tumor, & cætera quæ dicta sunt, non modo non decreverant, sed quamcunque iniret aliquis medendi viam, in dies augebantur, ut non jam tympanitem æger huc attulisset, sed præcipitem ascitem videretur; cui mox thoracis, & denique cerebri hydrops se adjunxit, quemadmodum ex iis quæ adscribam, signis cognosces.

Principio, si abdominis latus sinistra complectens, latus alterum repetitis dexterae modicis ictibus impelleres; alia ad sinistram aquæ fluctuationem percipiebas. Sed haud multis interjectis diebus, venter non modo aqua plenus, sed præter modum tumidus, ac distensus, impellenti manui resistebat: & simul cedemate non pedes solum, aut crura, sed femora quoque valde turgebant, facie, & artubus superioribus macescentibus. Inter initia tussis quadam, deinde nulla; sed cum primum æger posset in utrum liberet latus cubare, non potuit postea, nisi in dexterum: & licet toto morbi tempore decubere potuerit; bis tamen ante postremas hebdomadas e lecto exilire ab imminenti suffocationis sensu coactus est, qui sensus ut repente venerat, sic illico abibat. Tandem ultimis ferme decem diebus quodam quasi sopore tenebatur, & sæpe aliquo, sed levissimo, delirio. Tunc etiam cordis vires, quæ fuerant diu validæ, subinde infirmiores fiebant: cæterorum autem musculorum vires prope usque ad ultimum non defece- runt. Si febres excipias duas, quæ multis ante mortem diebus ingruerant, altera non sine longis horribus, & tremoribus, intra biduum tamen finita, altera autem & levior, & brevior; si harum, inquam, tempus excipias; pulsus nihil vitii habuerant, nisi quod sæpe, sub vesperam præsertim, frequentiores ipsi, & carnes calidiores deprehendebantur. In initio molestior ad epigastrium sensus, imo dolor inter ensiformem cartilaginem, & umbilicum: qui postea non ibi, sed hic, illicque per ventrem percipiebatur; punctiois autem sensus ad hepatis regionem manebat. Somnus, & cibi appetitus, qui principio mediocres fuerant, sæpius, procedente morbo, deficiebant: sitis autem magis magisque torquebat. Alvus per se multa, liquida plerumque, & flava: alia nonnunquam, & hæc viscida, deiciebat. Contra, urina semper quam paucissima fuit, eaque flammea, & saturata. Cum æger, Affines, Medici nihil magis optarent, quam ut uberius hæc proveniret; dicere non possum, quot, & quæ ad eam promovendam sumperit. Nullum esse credo levius, validius, simplex, compositum medicamentum, quod ullo ex regno, ut loquuntur, ad id pertinere existimetur, quod a tot Medicis propositum, aut ab ægro captum non fuerit. Verum, ut solet relucante natura, incausum omnia; nunquam urinæ vel minima ex parte aut increvit, aut mutata est, nisi quod diebus ante mortem circiter quindecim, & novissimis iterum diebus paucillum quid tabacci colore in imo deposuit, quod cum diligentius examinarem, sanguinem esse cum ichore mistum, deprehendi, & iis quorum intererat, ut diureticorum finem tandem aliquem facerent, ostendi. Eorum aliqua, sed minus importuno tempore, minusque suspecta, non sanandi spe, sed ne æger intelligeret, me desperasse, ipse quoque laudaveram, in his levia quadam ex refina terebinthina. Sed cum animadvertissem, ne odorem quidem illum, quem solent, violarum martiarum ab his urinas traxisse, iisdem, atque adeo renum viæ vel magis quam antea, diffusus, ad intestinorum potius viam esse redeundum, censui, præsertim cum tartarus, ut vocant, purificatus, quo per intervalla utebamur, nullo cum incommodo multa, & sæpe aquosa per alvum deturbaret, & aliquot horarum levamen semper. afferret adversus molestim quendam sensum qui ad ventriculi regionem percipiebatur. Verum nec via hæc proficua fuit. Audiverat æger ex Michelotto, juvenem urinam sibi feliciter; nec semel, adversus anasarcam cessasse. Itaque experiendi cupidus, etsi neque anni tempus, neque aliqua ejusmodi erant ac malebat Lemeryus (k); indulsit tamen in remedio ejusdem generis ac urinæ ovium, aut urinæ asinorum, quas apud Avicennam (l) legeram a quibusdam olim adversus hunc morbum fuisse laudatas, & quod denique non per renes tantum, sed & per alvum movere asciticorum aquas, ut Lemeryi observationes docent; sed ea lege indulsit, ut ne plus uncis septem primo die biberet, singulis deinceps diebus binas addideret. Et primo quidem die quidpiam passus est, quod Lemeryus, cum alia recenseat, non adnotavit. Nam paulo postquam biberat, caput quasi ebrietate quadam tentatum est, sed quæ non multo post evanuit, nec die-

diebus infrequentibus rediit, quamvis plus biberetur. Cum esset quinto die perventum ad uncias tredecim, neque æger plus mingeret, sed plus deiceret sic ut eo die aquam ad quatuor, aut quinque libras alvo redderet nullo virium detrimento; non aliud tamen hinc levaminis, quam quod a tartaro, observatum est, ventre nihil prorsus detumescere, imo artubus inferioribus magis tumentibus. Quamobrem tunc id remedii intermissum est. Aliquo post tempore ad idem voluit redire æger. Bibit quinque continenter diebus octonas singulis uncias. Nihil plus profecit. Quin altera de qua supra indicatum est, ingruente febre, prorsus omittit eam coactus. Frustra quoque, utinam innoxie in morbo quem augere facilius esset, quam minuire; frustra, inquam, remediis aliis est usus de eodem genere five deglutitis, five inalvum injectis, five etiam abdomini impositis. Nam cum senior quidam Medicus ebullit, & abinthii succos imponere jussisset; nihil inde nisi inanis egerendi cupiditas accidit, & pruritus cutis ad hepatis regionem, ubi livida venula apparuerunt. Itaque succos illos abiecit: neque aliud abdomini, siquidem mulcendi essent ventris dolores, cum utilitate adhibuit, nisi vervecis omentum oleis delibutum violarum, abinthii, & amygdalarum dulcium. Verum hæc antea, Nunc ad morbi finem, & ad diffinitionem venimus. Suffocati instar mortuus est prælivida facie, & humeris, aqua autem & sanguine ex mortui ore, & naribus prodeunte.

CADAVER postredie, qui dies fuit III. Nonas Sextiles anni quem supra memoravi, ut condiderat, diffectum est. Artus superiores quibusdam nigris quasi peticulis distincti erant. In inferioribus autem edema per dorsum ad scapulas usque se producebat. Venter aquæ fetide ex viridi flavæ copiam habuit quantam maximam præter omnem modum distensus habere potuit. In ea frusta quadam, omenti opinor, natabant quasi ex mucilagine purulenta. Ventriculus, & intestina, nil fere turgida, nigricabant, ut mesenterium quoque. Jecur durum, intus, extraque totum constans ex tuberculis, id est glandulosis lobulis evidentissimis, & evidentissimi ne distinctis: nec tamen naturali majus. At lien magnus, substantia compacta, ex qua incisa nihil sanguinis effluebat. Renum alter ichorem in pelvi habuit.

In Thorace, a dextris præsertim, aquæ plurimum ejusdemmodi atque in ventre. Sic etiam in pericardio, in quo tamen non multa. Pulmones turgidi, & nigricantes. Cor sine sanguine, nedum sine concretionibus polyposis. Caput; quoniam cadaver condiebat, ut non longius quam Venetia in paternam sepulchrum inferretur, nobis attingere nec necesse fuit, nec licuit.

31. Ex quo Joannes Posthius, ut hic habes in Sepulchreto (m), substantiam hepatis in ascite interius totam granulosa offendit, gravis nimirum quantitate piscium ubique apparentibus, plures alia similes. Observationes in eodem morbo habitæ sunt. Extant ibidem alia quatuor, Wesperi una (n), cui hepar seu corpus ex plurimis glandulis conglomeratum apparuit, Ruysschii altera (o), Brownii tertia (p), Hartmanni quarta (q), quibus idem viscus totum e meris glandulis magnis, aut e glandulis, aut ex lobulis constare visum est. Non possunt autem minime jecinoris partes adeo amplificari, quin aut interjectas alias, aut vasa saltem sanguifera comprimendo, hepatis muneris, & sanguinis per ventrem motui plurimum officiant. Itaque Posthius, & Brownius frustra aquam eduxerunt, quæ vitiatæ jecinore subinde renata esset, ut Erasistratus apud Celsum (r) monebat. Nam quod hic respondet, emissio humorum medicinis locum fieri ad jecur sanandum; profecto ejusmodi nec hoc hepatis vitium, ut medicinam admittat, Quod etsi non nisi per dissectionem apparet; tot tamen alii sunt illius, & aliorum viscerum morbi qui curationem non recipiunt, ut cum læsorum viscerum indicia sunt, non sit temere ad aquarum emissionem decurrendum. Quamobrem hanc Nobili, de quo dictum est, ægro nemo tot Medicorum proposuit. Cæterum quod plures cum Ballonio (s), & Sanchetio nostro (t) verentur, ne peritonæ, & intestinorum inflammatio, ac gangæna aquæ educationem consequantur, non injuria facere videri possunt perlegentibus exempla eorum quibus educta aqua fuerat, quorum multa sunt in Sepulchreto (u) relata. Quibus celebre illud in primis addes quod Cl. Scherbius (x) descripsit viri, cui calculus in Receptaculo chyli concretus, hujus, & lymphæ expedito in Thoracicum ductum ascensui se opponens, ejusmodi asciti-

tem attulerat, ut septies aquæ a Chirurgo fuerint eductæ, quippe novis semper succrescentibus donec sexdecim post ultimam educti onem horis vivere desit. Etsi vero non a viscerum labe, ut præclare vides, hydrops hic originem habuit; tamen omentum totum fere consumptum inventum fuit, reliquæque viscera gangæna obfusa; nec mirum, inquit Scherbius dum tractu temporis id in omnibus hydropicis sit conspicuum. Sed me veri studium non fuit reticere quæ pro paracentesi dici possunt, verbis istis ultimis ne ipsis quidem omnino repugnantibus, imo ex parte aliqua, si recte attenderis, adjuvantibus. Igitur; ne queram, num semper id aquæ emissionis, quocunque hæc instrumeto, modoque, aut quotquot vicibus peragatur, & intrudentis se aeris effectus sit, quod haud raro morbi ipsius esse, cadavera ostendunt hydropicorum quibus, licet aqua emissæ non sit; tamen intestina, ut in nostro, nigricant; certe non pauca feliciter ratione hac absolutæ curationes eandem tuentur, tuenturque ipsæ dissectiones, quæ, ægris ob aliam causam intereuntibus, patefecerunt bene satis constituta intestina, nullum autem in abdomine, nedum in peritonæo qua pertusum fuerat, vestigium inflammationis, nedum sphacelose corruptionis, ut verbis utar Polycarpi Scacheri (y), Virginis jam diu ascitice sectionem, mortuæ octavo post operationem die, multaque per vices educta aqua, proponentis.

32. Sed rara adeo apud nos sunt, aut certe erant felices hujus curationis exempla, ut Bononiæ diu moratus neminem unum audiverim Medicum qui ea se vidisse, affirmaret, cum infelicia, externis Chirurgis, nec vulgaribus, eam instituentibus, & ipse ibi viderim, & ab omnibus acceperim. Quin memini, Albertinum phthisim, & ascitem inter se comparantem, illam ter ab se, quantumvis confirmata esset, perlanatam fuisse, dicere; ventris autem hydropem, qui confirmatus esset, etiam tum nulum. Aqua enim, aiebat, si a Chirurgo emittatur; ægros mori, video: si a Medico ad renum, aut intestinorum vias validius urgeatur; quæ remedia ad has compellunt, non tam illam quæ in ventrem effusa est, quam quod feri in sanguine adhuc restat, non magis in illas vias, quam in ventrem quæ jam data porta est, ejiciunt. Sicut nuper accidisse, narrabat, generoso in primis Viro, cui data ab Empirico ejusmodi remedia urinarum quidem copiam, sed ventris simul tumorem auxissent ita, ut in mortui sanguiferis vasis nihil ferme potuerit inveniri. Neque tamen quas audiverat, aut legerat admirabiles asciticorum curationes dissimulabat, quarum Bononiæ vel quinque per scroti punctationem perfectæ esse ferebantur. Sed cum alios crederet anasarca potius laborasse, quam ascite, alios ascite, sed nondum confirmato, alios hydropem peritonæi; non multos sane relinquebat, quorum sanatio naturæ potius, ut putabat, quam arti deberetur. Et magne sunt certe cum in aliis sæpe, tum in hoc morbo nonnunquam sanando naturæ vires. Accidit in mea Patria, ut cum puer nobilis se mel, atque iterum ardenti febre correptus, aquæ plurimum tum in prima, tum in secunda agrotatione bibisset, utramque exciperet ascites ingens, uterque autem ascites solveretur, magna vi aquæ sponte dejecta, sponte, inquam; nam & vulgo id notum erat, & ejus mihi confirmavit Medicus, non sibi facile earum curationum honorem detracturus. Easdem nimirum vias satis sibi referaverat natura per quas humorem in ventre stagnantem resorberet, alioque amandaret, quibus in Mercatore illo Meadii (z) usa est, cum aquas omnes, postredie per abdominis perforationem educendas, nocte ipsa una in vasa iterum recepit, in iisque retinuit. Verum cum eadem natura neque per se, neque blandis invitamentis, neque paulo acrioribus stimulis excitata quidquam molitur, num, ipsa adversante, acerrime, & periculose agendum est? an potius, ubi omnia permittant, aquæ emissionem utendum est, auxilio primum, ut existimare licet, ab eadem natura indicato?

33. Quod enim umbilico immani aqua vi aperto, egrediens hæc ascitem solverit, non id primo, opinor, Benivenius, & alii quos Donatus (a), & Gabelchovrus (b) laudant, viderunt; sed præci olim homines, iisdemque adnotarunt, quibus simul omnis prorumperet; eos mori; quibus vero paulatim, partitave exiret, eorum aliquos convalescere. Itaque narum recte operantem Medici, ut solent, imitari potuerunt, & Hippocrates (c) deinde, ac Celsus (d) monere, ne omnis simul aqua emittatur; mortiferam eam id esse: cujus rei causas

Viri

(i) Prælect. ad Instit. §. 863. (k) Mem de l'Acad. R. des Sc. A. 1707. (l) Canon, l. 3. Cap. 14. tr. 4. c. 13.

(m) S. 21. Obs. 4. §. 21. (n) Obs. 32. (o) in Additam. Obs. 24. (p) Obs. 49. (q) Obs. 50. (r) De Medica l. 3. c. 21. (s) in Schol. ad §. 1. Obs. 1. hujus Sect. Sepulchr. (t) Ibid. (u) Obs. 51. & 2. & 3. §. 1. & 6. §. 1. & 11. §. 1. & in Additam. Obs. 49. & 54. & 76. & 84. (x) De Calculo Recentæ chyli, hydr. causa. (y) Diff. supra ad n. 8. cit. (z) Monit. Med. c. 8. in fin. (a) De Med. Hist. Mirab. l. 4. c. 22. (b) Sect. hæc Sepulchr. in Schol. ad §. 1. Obs. 6. (c) Sect. 6. Aph. 27. (d) De Medica l. 2. c. 8.

Viri Docti nostra hac ætate complures exposuerunt, & in iis Verneyus junior (e), Werthofius (f), Meadius (g), copiosius autem Ill. Senacius (h). Quorum explanationes ea quoque confirmare videtur Observatio (i) omnis, sine animi defectu educatæ materiæ, sed ob huius tenacitatem lente adeo, ut tres ferme hora sint impensæ: quod minus tibi mirum accidet, ubi ex Cl. Targionio (k) noveris, fuisse hydropicum, cui tam densa gelatina ventrem implebat, nulla ut arte ab experientissimo Chirurgo educi potuerit. Sed nulla res magis illas confirmavit explanationes, quam secundum ipsas feliciter excogitata ratio omnis simul aquæ innoxie emittendæ, nimirum, abdomen non modo postquam emissæ est, quod & laudatus Verneyus (l) post uberiorem educationem jubebat, fasciis adstringendo, verum etiam, idque præsertim, magis magisque dum educitur. Quæ ratione is qui primus & excogitavit, & adhibuit Medicus eximius Meadius (m) cum aliis, tum præcipue mulierem a se perfunctam memorat, cui simul & semel aqua omnis emissæ est pondo librarum sexaginta, alteram autem annos sex, & septem menses servatam, ex qua toto illo temporis spatio, incredibili, nisi res inter omnes Londini constaret, copia educatæ est, librarum mille nongentæ & viginti. Sed quam caute hæc sint & fuscipiendæ, & faciendæ, nobiles, quos nominat, inter Anglos Chirurgi proposuerunt: quamquam & ipsi nota esset hydropica quæ, disrupto per se abdomine, & plurima aqua effusa, superles fuit, cui similem alteram leges a Nebelio (n) descriptam. Utrique nimis distentum abdomen prope umbilicum crepuerat. Porro extant alia per ipsum umbilicum sponte erumpentium aquarum, sed fere nunquam simul omnium, felices Observationes, non ab illis modo quos supra diximus, sed & ab aliis (o) productæ. Nec tamen Medici, ut asciitem solverent, aperire umbilicum perrexerunt, contrariis alii Observationibus permoti, experientia autem plerique edociti, quanto ibi facilius abdomen, distendente aqua, extenuatur, tanto difficilius & vulnus postea, nec raro, confanscere, & minus commode in præsentia obtuari, ne plus aquæ prodiret, quam ferre ægri vires valerent, neque eam demum totam, nisi perincommode ægro in ventrem cubante, posse detrahi. Nam quod e mitti per umbilicum præstaret, quia sic reclusa vena Umbilicali aquosus ex hepate humor per illam non in ventrem effunderetur, sed e corpore eiceretur, opinio fuit quæ serius nata ex hypothesibus, & ex sententia quorundam, cuius meminit Avicenna (p), nonnullis deum Observationibus confirmari visa est. Extiterunt enim, ut in Sepulchreto (q) hic vides, qui venam illam, jam olim in ligamento contraxerat, assidua dixerunt aquarum alluvione emolliam, recludi iterum, & tum ferum ab hepate exuperans per umbilicum excernere, seque dilatata adeo tunc invenisse, ut catheterem, & pennam anseris admitteret, essetque aqua satis copiosa plena. Ego vero ut in nonnullis apertam, ut est a primordiis, feruari potius, quam rursus facile referari, concederem, neque post ortum in omnibus, quemadmodum Schultzius (r) tradidit, ab umbilico sursum retrahi ad jecur, ut ad illum amplius non perveniat, non viderem tamen, quomodo ex Sinu venæ portarum serum dumtaxat acciperet; sanguinem relinqueret. Quæ non tam propter Platerum, & Hildanum dico, quam propter Rolincium, utroque recentiorum. Nec tamen Observationes eorum nego: sed tantum suspicor, non venam ipsos Umbilicalem, sed thecam solum reperisse patentem, & aqua plenam, qua theca a duplicato peritonæo illa vena augetur. Laxantur enim facile in hydropicis membranæ, earumque intercapedo redundante aqua impletur. Adjuvat hanc meam suspicionem Observatio, quæ non Riolani est, ut Rolincius putabat; sed tamen apud Riolanum (s) extat. In quadam muliere hydropica vena Umbilicalis, inquit, inventa fuit fistulosa, & per eam aqua inter peritonæum & abdominis musculos effundebatur. Sed diuturnioris hydropis casum, ut fumus polliciti (t), subiciamus.

34. VIRGINI annos viginti natæ cum sanguis per uterum respondere desiisset ante annos duos, dolores ad hypochondria primum orti sunt, tum deinde venter intumuit. Hunc tumorem, variis incassum remediis usa,

annum circiter jam tulerat, cum in Nofocomium hoc Patavinum excepta est. Ingens ventris erat moles: ægra tamen hæc quoque, totum mentem quo ibi fuit, cubare potuit usque ad extremum; cubabat autem plerumque in sinistram latus. Sitiebat, sed non multum, nisi cum febricula qua tenebatur assidue, interdum augebatur. Paucas quidem reddebat urinas, nec tamen valde rubentes. Subinde querebatur de iis de quibus indicatum est, ad hypochondria doloribus, qui convulsi, non tamen accerrimi, esse videbantur. Non unis adhibitis auxiliis, nihil profectum est: lotium autem est nunquam. In illis quædam erant quæ molestiam crearent, ut gummi ammoniacum cum resina terebinthina: quamobrem & omiffa sunt. Novissime cum alvus ex dura facta esset laxior, foetida liquamina coeperunt effluere, sed non purulenta. Horum persistente fluxu cum venter non decreveret, vires in dies frangerentur; nimirum id accidit quod in extremo libro IV. de Morbis prænuñciatum de hydropico est: *at ubi etiam alvus valde fluida fuerit, citissime moritur & sentiens, & loquens*. Itaque constante usque ad ultimum mente, vivendi finis est factus circa medium Decembrem A. 1744. Postridie, cum hæc accepissem, & frequentissimis Auditoribus exposuissem, nonnulla ex iis prædicens, quæ mox sub eorum oculis inventa sunt; dissectio ibi statim incepta est. CADAVER macilentum erat, superioribus præsertim artubus, nec tamen plurimum. Inferiores artus levi adeo affecti erant cedemate, ut vix, nisi digito appresso, dignosceres, idque ne ad summa quidem femora perveniebat. Venter amplissimus, sed non tensus, ut neque umbilicus, quamvis prominere. Pertuso ad alterum latus Abdomine, paulatim vis aquæ ingens emissæ est, in manibus relinquentis eundem sensum quem lixivium in quod eas immisisses. Quæ prima effluxit, sublava fuit, & tenuis; reliqua minus tenuis, & quasi albida. Utramque in maximo quodam vase relictam cum post horas viginti quatuor inspicere, visa universa est albida; sed cum paulatim de vase in vas effunderetur, sublava potius apparuit: neque multum pro aquæ copia in fundo subsederat humoris subalbi, crassiorisque ad admittis etiam omenti frustulis, ab aliisque de quibus postea indicabitur. Cæterum neque aqua, neque cadaver foetebat, etsi Tenuia intestina tribus in locis nigricare inceperant, non ultra latitudinem tamen transversi digiti. Eorum intestinorum pleraque tumebant aere, sed non ita multum. Crassa, ut ventriculus, prorsus inania connivebant. Si omenti partem exciperes modicam quæ ventriculo adhaerens, reliqua erat, partes ejus cæteræ quasi in frustra disceptæ erant, ab illa, & inter se omnino sejuncta, quorum unum se conformaverat in teres, rubicundum, & molle corpus ulnæ propemodum longitudine. Jecur tota convexa facie, ipsoque imo anteriore limbo cum diaphragmate cohærebatur: a quo ubi divisum fuit, magis extuberantem illam faciem habere conspectum est; quam ipsi, & Virginis staturæ, ad parvam vergenti, conveniret. Perfectum, paulo ubique, præterquam in Spigelii lobulo, & pallidius, & durius inveni: bilem autem in ejus vesicula paucam, ex flavo subfuscum, turbidam, viscidam. Lien, nisi quod æquo major, intus sanus fuit: ut sanus erat lien alter, multis partibus minor, quippe diametro digiti transversi, qui subrotundus inter vasa hærebat, membranæque ad majorem alligatas, huius vicinus, sed omnino sejunctus, interna structura eadem prorsus, eodemque colore. Sed in majoris lienis tunica, præter aliquot hydatides, corpuscula passim prominebant subrotunda, alba, & dura, magnitudine varia, pleraque tamen milii granis aliquanto majora. Extabant eadem hic illic in facie interiore peritonæi, & in exteriori intestinorum, Tenuium præsertim, in qua erant pariter hydatides. Harum maxima parvum pomum rotundum æquabat, diametro digitorum duorum, vasis ex intestino sanguiferis per illius membranam se producentibus, & in ramos dividendis. Aquam continebat nullo ferme colore præditam, ex parte autem mucosam. Pancreas subdum fuit, Glandulæ autem quibus ultra naturalem modum auctis quasi plenum erat mesarum, duritie, & albedine fuerunt omnino scirrhusa. Præcipuum tamen, & peculiare vitium in testibus, tubis, ipsoque utero deprehendi: quod in utero non nisi per sectionem se prodidit;

dit; in testibus autem, & tubis ultro in conspectum venit. Hæ enim partes utroque pariter in latere una cum alis vesperilionum inter se ita coaluerant, & crassæ factæ in unam quandam tuberosam, informem, non modicam massam concreverant, ut nullo prorsus modo alteram ab altera internoscere liceret, nedum seungere. Utriusque massæ superficies non parvo spatio lacera, ac per se aperta inventa est non fecus ac si magnum quoddam leatoma se disrupisset. Quocum propterea comparavi, quia ex materia fiebat nihil magis, quam semiliccatum sebum referente; ita erat alba, & si contrectares, unguinosa, & specillo immisso facile cedens. Eam si discerperes, quasi ex tot frustulis constare, perspiciebas. Erat autem omnino inodora. Ut partes quas nominavi, in sebum conversæ videbantur; sic ubi uteri fundum, qui fanus exterioris, & parietum quoque majori portione fuit, alius incidissem, reliquam totam anteriorem eorundem perietum substantiam in materiam conversam vidi ejus similem quæ modo descripta est, nisi quod colore nonnihil ad cinereum inclinabat. Eademque materia fundi cavum referunt erat, ex eaque quod minus solidum esset, per cervicem, quæ a materia ipsius reliquis, facile abstergendis, albicabat, excidere in vaginam consuevisse videbatur. Cæterum cervix intus, extraque integerrima erat, ejusque, ut fundi etiam, magnitudo haud amplior, quam ejus ætatis Virginem deceat, nisi quod osculum internum uteri paulo amplius visum est. Ventrīs partes reliquæ, & renes in primis, erant sanæ. Magnæ tamen arteriæ truncus minori quam par esset, latitudine apparuit. Diaphragma autem altius in thoracem ascendens, multo id magis a dextris qua a protuberantia, ut diximus, hepatis urgebatur. Quod cum venam Cavam incidendo, a diaphragmate detraheremus, non plurimum ex ea sanguis, & is niger, nec concretus, effluxit. Thoracis parietibus omnibus, id est inferioribus quoque, pulmones ubique erant artissime annexi. Sinistri pars superior quodam loco erat aliquanto durior, nec tamen evidenter vitata. In pericardio aqua multa ejusdemmodi ac in ventriculo. Cor laxum, in eoque & vasis Magnis non multum sanguinis, nigri quidem, sed minus fluidi quam in Cava Inferiore vena, quamvis sine ulla polyposa concretionem.

Caput dum a cervicibus abscederet, aliquantum aqua tum e vertebrarum, tum e cranii cavo defluxit. Sed & Laterales cerebri ventriculi aquam non omnino paucam habuerunt subfuscum, & turbidam, plexus autem Choroides pallidos maxime ex parte. Cerebrum tamen fuit sic satis firmum: cerebellum permolle.

35. Multa sunt in proposita Observatione, quæ si persequerem singula, Epistola hæc longe quam superior, prolixior esset. Intelles id ex iis quæ de hydatidibus tantum scribam. Nam etsi rarum illud uteri vitium perquam dignum est de quo scribatur; erit tamen in aliis, & fortasse proximis Litteris (u) id faciendi opportunior locus; hydropis enim de quo in his fermo est, proxima certe causa non illud fuit, ut fuerunt, quantum existimo, disruptæ hydatides. Nempæ ut in exteriori intestinorum, & lienis facie aliquot extabant quæ necdum dissiliant, sic prope innumeras tum in illis, tum in aliis Partibus fuisse, arbitror, quæ diu antea perruptæ, suum in ventris cavum humorem effudissent. Et ne multis te derineam; meæ me in Albuginea, & Vaginali testiculorum tunicis per se habere Observationes (x) illuc adducunt, ut credam hydatidum, sive tunicarum in quibus increment ipsæ, membranæque earum humorem complectentes, postquam disruptæ hunc effuderunt, se suæque vasculæ in caruncula formam primum contrahere, & nisi novus illic humor effluere pergat, indurari, & exsiccare denique sic, ut alba illa, & dura subrotunda tubercula repræsentent alia aliis, ut hydatides fuerant, majora, aut minora, qualibus in descripta Virgine intima peritonæi facies, ejusque productio per extimam lienis, & intestinorum exasperabatur. Leges in Sepulchreto (y) Observationem Jacobi Wolffii, ubi asciticæ intestinis adhaesisse sparsim, ait, carunculas quæ aperte fundebant ichorem. Lege quæ de altera ascitica ex Bilgero (z) producantur, universa intestina quæque verum, & ambo latera circa diaphragma multis millibus granulis, instar suum grandiosarum, referta. Cum his junge editas postea in aliis hydropicis Observationes, ut puta Cl. Anhornii (a), qui peritonæum vidit in adolecente nodulis glandulosis, limpidam, si pressi essent, plorantibus confutum, in muliere autem hinc inde habens plura tubercula glandulosa, sabæ adinstar

majora & minora, extuberantia, quæ pressa limpidam lympham plorabant, itemque Clarissimorum Stegmanni (b) & Goetzii (c), quorum ille in viro pancreas animadvertit veluti semine milii conspersum, hic vero in Virgine, sacco qui humorem continuerat, sparsim adnata intus varia tubercula diversæ magnitudinis, a pisi majoris ad minoris seminis cannabis magnitudinem accedentia, nunc scilicet, nunc racemosa, scirrhusa, dura, discissa nihil liquoris aut gelatinæ plorantia. Relege demum quæ de duris granulis, aut tuberculis in peritonæi, aut pleuræ interiori facie extantibus, alias (d) ad te a nobis scripta sunt, cum effusa aqua in magnis caveis quas illæ comprehendunt membranæ, etiam tum esset; facile propositam succedentium mutationum seriem agnosces. Annis superioribus accidit, ut in femina quam ascites sustulerat, tunica exterior intestinorum omnium inveniretur creberrimis tuberculis subrotundis distincta. Pars ad me Tenuium allata est, ut quid illa essent tubercula, judicarem. Lenticulares turgidas glandulas, cum primum aspicerem, referebant; at sine osculo erant, & solida, neque ex glandulosa, neque ex carne substantia factæ, sed inter utramque mediæ quadantenus videbantur. Censui, nihil veri similis a me posse statui, quam si disrutarum hydatidum reliquias esse, conicerem, in se contractas, sed necdum satis, ut sicca esse possent, & duræ. Nec me deterruit tantus, quantum fuisse oportebat, hydatidum numerus, probe memorem innumerarum quas in Professore Bononiensi Peregrino olim Coiterus (e) deprehendit. Ubique, inquit, mesenterio, peritonæo, intestinis, lien, hepate, denique omnibus visceribus vesiculæ inæquali magnitudine, eaque aqua limpidâ plena, adhaerebant. Et ne ab aliorum Veterum Observationibus, imo ne ab Sepulchreto, in quo & ista Coiteri non prorsus omittitur (f), te longius abducam; vide, ut Philippus Persius (g) in femina, quæ, ut nostra Virgo, ex suppressis mensibus inciderat in hydropem, ejusmodi vesicis pendulis (numerus excessisset nongentas) scateant invenerit renes, uterum, ventriculum, intestina, cor, pericardium, hepar, & lienem: itemque ut in altera Mauritius Cordæus (h) istas omnes, aliasque Partes, mitto intus, tactas bisce oppressasque foris cystibus pendulis variæ magnitudinis, & formæ, aqua citrina oppletis, quæ obtingentur numerum facile superassent; ne tertiam memorem, quippe necdum effuso in ventrem humore, quæ cum uterum ferre putaretur, totum corpus internum habuit, Epiploum, Mesenterium, Hepar, Lienem, Pulmones, Cor quoque ipsum, & Peritonæum obstita vesiculis aqua purissima plenis, ex Ballonii (i) Observatione.

36. Vides igitur quæ passim in nostra Virgine tuberculis asperæ erant Partes, in aliis, hydropicis, hydatidibus confertissimis fuisse oblitæ, intestina, lienem, peritonæum. Quin hoc aliquando tot obducitur, ut ipsum vix in conspectum veniat, sicuti reperit, pinxitque Ruyschius (k), aut in filamenta, & vesiculas resolvatur aquæ plenas, quemadmodum in ventris cavo resolutum agnovit Paawius (l) simul cum omento, cum utrumque suis in sedibus desideraretur. Sed omentum, quamvis peritonæi productio sit haud fecus ac lienis, & intestinorum tunica extrema, & hydatides in ipso quoque, nec raro, innascantur, ut plures ostendunt Observationes, & in his Boschii (m), Malpighii (n), Vassalvæ (o), & Goekelii (p); tamen adea tenui structura est, ut illas sæpius coercere inter suas laminas diu non possit: quamobrem crescendo citius plerumque dissiliunt, ipsumque simul disrumpunt, & vitiant; hancque ego unam ex præcipuis causis existimo, cur asciticis plerumque; id quod nostra quoque acciderat Virgini; minime integrum omentum maneat. Indequ Hippocrati (q) occasione datam puto scribendi: quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, iis ventrem aqua impleri. Qui enim in brutis animantibus hydatides, ut ad te alias scribentes commemoravimus (r), pulmonum vidit, idem in iis illa animadvertit quæ modo dicebamur, videlicet omenti nonnullam hydatides, sæpius vero illam quam Galenus (s) requirebat, exsensionem; aquam autem a vicino hepate in omentum deduxerit, ut a viscere apertissimo ad hydatides, sicuti Galenus ait, in ea quæ ipsum ambit exterior, membrana generandas, quippe cum videatur, & in jugularis animalibus hepar bis aliquando plenum. Præcorum autem Præceptorum in bestiis habitas Observationes, postquam humana incidendi cadavera facta copia est, Medici ut horum

(e) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1703. (f) Commenc. Litter. A. 1735. Hebd. 37. n. 2. (g) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (i) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (k) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (l) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (m) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (n) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (o) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (p) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (q) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (r) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (s) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (t) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (u) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (v) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (w) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (x) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (y) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (z) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (a) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (c) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (e) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (f) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (g) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (i) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (k) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (l) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (m) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (n) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (o) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (p) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (q) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (r) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (s) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (t) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (u) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (v) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (w) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (x) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (y) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (z) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (a) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (c) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (e) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (f) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (g) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (i) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (k) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (l) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (m) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (n) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (o) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (p) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (q) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (r) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (s) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (t) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (u) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (v) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (w) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (x) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (y) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (z) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (a) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (c) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (e) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (f) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (g) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (i) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (k) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (l) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (m) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (n) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (o) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (p) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (q) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (r) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (s) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (t) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (u) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (v) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (w) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (x) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (y) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (z) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (a) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (c) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (e) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (f) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (g) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (i) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (k) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (l) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (m) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (n) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (o) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (p) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (q) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (r) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (s) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (t) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (u) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (v) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (w) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (x) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (y) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (z) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (a) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (c) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (e) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (f) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (g) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (i) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (k) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (l) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (m) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (n) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (o) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (p) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (q) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (r) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (s) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (t) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (u) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (v) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (w) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (x) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (y) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (z) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (a) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (c) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (e) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (f) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (g) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (i) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (k) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (l) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (m) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (n) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (o) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (p) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (q) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (r) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (s) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (t) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (u) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (v) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (w) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (x) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (y) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (z) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (a) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (c) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (e) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (f) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (g) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (i) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (k) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (l) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (m) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (n) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (o) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (p) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 122. (q) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 2. & 7. (r) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10

horum inspectione confirmantur, sic illorum cogitata retinuerunt de hydropis causa saepius ex aqua effusa eductis vesiculis, in quocumque tamen hæc sint viscere, deducenda; quanquam vel postea identidem ad brutas animantes redierint, si forte nonnulla quæ ad hydatidum examina attinent, luculentius conspicerent: quod nec me, quo ad licuit, prætermisisse, ex his quæ subijciam, intelliges.

37. Ex maximis certe hydatidibus illa fuit quam in bubulo jecinore vidit Caldesius (t); novem enim libras pendebat tota; tunica autem solæ uncias sexdecim. Quæ tunica cum esset tres; singulæ ferme & ex aliis pluribus constabant laminis, & robustæ erant, atque carnosæ, exterior præsertim magis quam cæteræ, firma, & musculosa, ex fibris constans inter se maxime implicitis; cum interius esset infimissima, & tenuis; media autem colore aureo, & rugosa, affixa habebat frusta quædam ex gypsea, vel potius ossæ materia. Aqua, his tunicis comprehensa, limpida, & subfalsa, variis admixtis liquoribus nihil profusus mutata est, ut neque bulliendo magis concreverat, quam cæterarum, in quibus frustra id tentavit, hydatidum. Si cum structura descripta eam conferas quam in suis illis tot velicis animadvertit Cordæus (u) (nam Persius (x) nil habet de structura, ut neque Ballonius (y) nisi quod triplicem singularum tunicam adnotavit) intelliges facile, quantum Caldesio profuerit suæ hydatidis magnitudo. Cordæus enim hæc tantum vidit, ut binae illas membranas conficerent, valde candidas interius, altera tunica ventriculi similissima, tenuior aliquanto tamen, sed ei quidem concolor. Mihi vero; quamquam dubium esse non potest, quin eorum quæ conspexit Caldesius, quædam fuerint illius hydatidis peculiaris; necdum contigit, ut in tam magnas incidere, quam voluissim, & cum incidi, ut liceret aliter quam exterius spectare. Vel sic tamen nonnulla adnotavi non indigna fortasse quæ in aliis ejusmodi sedulo inquirantur. Unam enim vidi olim in vitulo dierum quindecim, rotundam, diametro sex septemve digitorum, pendentem a sima supremaque jecinoris parte, inquam se aliquantum inferebat, arte affixa ad duorum, aut trium digitorum tractum: ab eaque parte sanguifera accipiebat vasa, sed pleraque ea ratione, quam ut firmiter memoria teneo, sic tibi significabo: Namque ut perejus velicæ membranam, alioquin ut inter digitos arripiendo percipiebam, non tenuissimam, licebat transpicere, non aquam modo quam continebat, ex subviridi levissime flavescens; sed etiam, quoniam aqua illa erat pellucida, quidquid in ipsa innatabat; ita ex hepate per medium velicæ cavum ferri videbantur quidam vasorum trunculi, qui oppositam affecuti velicæ partem, se in hujus exteriorem faciem reflecterent, per eamque in ramos, ramulosque divisi, rete quasi quoddam efficerent. Verum ut hoc rete, eoque sanguiferos ramos certe quidem conspicebam, & tenuissimas quasi pinguedinis strias, eisdem stipantes; ita inclusos illos natantesque trunculos, quos striæ ejusdemmodi comitari videbantur, cum tantummodo transpicerem; frustra ab illis periti qui eam mihi vesicam ostenderant, ut incidere liceret, cum aliis potro ostendere se velle, dicerent, quibus paulo ante polliciti essent. Ab iis vero, aut inclusos trunculos non satis attendentibus, aut quid ex illa eorum per velicæ cavum translatione consequeretur, non bene animadvertentibus, nihil rescire aliud potui, nisi aquam subfalsam fuisse, & minime ad ignem concrevisse. Non multo post vitulinam, hydatidem alteram vidi, ea quidem minorem; neque enim ovum gallinaceum superabat; sed pro animalculo in quo deprehendi, multo maximam. Erat id columba vetula, ova tamen etiam tum edens, quæ cum sanissima videretur, de improvviso in nido mortua inventa fuerat. Repentinæ mortis causam, cum exterius nulla appareret, interius quærens, cerebrum, pulmones, cor sana ostenderam, nisi quod hujusce ventriculi omnino erant vacui, & ipsam exangue; cum denique ad jecur pervenirens, & hujus rei, & mortis causam perspexi. Jecur enim erat lividulum, & in fummo nigricans, & æquo mollius, ruptoque ibi magno vase sanguifero, plurimum sanguinem profuderat, circa illud ipsum viscus, interque intestina concretum. Acceleratam eam vasis disruptionem credidi a pressione ingentis hydatidis de qua dicere jam cœperam. Extremum alterum hæc intimæ ovarii substantiæ infixum habebat, ut minores aliæ de quibus mox dicetur, per superficiem autem discurrerent.

tia sanguifera vasa, intus vero subflavam aquam, non una, quantum exterius judicari poterat, cavea comprehensam, sed in multas, quæ transpicebantur, cellulas divisam. Membrana ipsi, hydaridem efficienti, ad illud de quo dixi, extremum vitelli aliquot minuti inhærebant, cæterorum quibus ovarium scatebat, persimiles. his tamen duriores aliquanto erant, magisque ad albedinem inclinabant. Ex ovario præter vitellum unum majorem, & jam jam casurum, nonnullæ aliæ pendebant hydatides, omnino consimiles descriptæ, nisi quod triplo circiter minores erant, nec per se ovario, sed per longum petiolum annecebantur. Erant denique nonnullæ aliæ, minima faba non majores, inter ipsos vitellos confixæ, sed hæc cæteris multo magis albæ, & aqua limpida plenæ. Coctione tamen neque hæc, neque subflava cæterarum aqua concrevit: vitelli autem, qui maximæ illius extremo inhærebant, ut minus molles antea fuerant, sic magis quam reliqui, induruerunt. Cum cellulas quas intra majores hydatides transpexeram, mox recognoscere intus vellem; paulisper forte avocatus sum: famuli autem intemptiva sedulitas, qui me satis omnia perspexisse, credebant, interea, ægre me ferente, illuc abjecerant, unde recipi non poterant.

38. Noli mirari, ægre me tulisse quod ea quæ in vitulo, & columba transpexeram, perspicendi copiam non habuerim. Quæ enim hydatides aut sanguifera vasa per medium cavum traducta, aut hoc in cellulas multipliciter distinctum ostendunt, earum originem haud ita facile repetes aut a simplici glandulosa vesicula, cujus sit osculum obturatum, aut ab uno aliquo vasis lymphatici utrinque demum oculo interstitio quod inter binas & binas valvas intercedit. Ex quo Warthonus his lymphæductuum interstitiis ad hydatidum efformationem explicandam usus est ea ratione quæ in Sectionem hanc (z) Sepulchreti fuit non semel tantum, sed bis relata, non pauciores fortasse, quam qui simplici glandula usi sunt, affeclas habuit, & nonnullos etiam qui ad eam explicationem quædam addendo, probabiliorum ut redderent, elaborarunt. Quorum ego omnium industriam laudo: imo pro Warthoni sententia tot illas facere velicas, credidero, quas Persius (a) viderat duplicatas, velut in carponibus eximuntur, quippe bina, necdum sejuncta, interstitia representantes, ut funiculos quoque illos pellucidos, ex tenuibus vesiculis quasi concatenatis constantes, quorum multos in aquis asciticorum interdum conspexit Meadius (b). Verum ut hydatides alias ex simplici glandula, alias ex ejusmodi interstitiis certa quadam ratione posse repeti, non diffiteor; at omnes quomodo repeti possint, non video. Diu enim est ex quo Ruychius (c) admonuit, plurimas interdum hydatides in uteri placenta, ut nos quoque conspeximus, deprehendi, aliisque item in Partibus in quibus lymphæductus nulli inveniuntur. Itaque censuit, hydatides esse extremitates vasorum sanguiferorum, quæ priorem suam mutaverint naturam, atque in vitiosam degeneraverint fabricam. Sunt & qui, si quoque humor non modo ex lymphæductuum parietibus non nihil laxis, verum undecunque effluat intra circumjectas membranulas, attollere has, & in hydatides conformare, existiment. Quorum sententiam si quis paulo studiosius illustret, aptam reddet fortasse ad plerasque hydatides explicandas, nec difficile intelliget ob intersectam membranis cellulosa fabricam, & vasa sanguifera per hanc traducta, unde sit cur hydatides aliquæ (d) appareant in cellulas divisæ, & cur (e) per medium aliarum cavum vasa trahantur: ad quæ exiles illas duas fibras si forte referat, quas in tot hydatibus animadvertit Tysonius (f) ab altero harum extremo procedentes ac fluctuantes intra ipsarum liquorum; veri paulo similiora dicere videri poterit, quam cum ille ejusmodi hydatides infecta esse, conjiciebat, quæ alimentum sibi exsurgens per duos illos quasi tubulos in ventrem demitterent. Quod si pendentes extenui longoque petiolo hydatides incidant explicandæ, quales Ruychius (g), qui etiam pinxit (h), aliique, & nos sæpe vidimus ab ovarii potissimum, proximifve mulierum partibus, non modo ex columbæ illius ovario pendulas; suspicari eidem licebit, abruptis a sanguifero trunculo cæteris hydatidibus cuiuspiam cellulis, aut effuso quem continebant, humore concidentibus, extremam aliquam annexam restare, quæ humorem adhuc retineat suum. Et sane cum filamentum per quod aliqua ejusmodi pendebat, manifestum interdum sanguiferum simul vasculum ferri vidimus (i).

39. At

39. At sunt aliæ, & majoris quidem momenti cum ob viscerum quibus innascuntur, læsionem, tum ob faciliorem ejus quo de hic agitur, morbi productionem attendendæ. Hactenus de iis fere diximus quæ in superficie extant viscerum, aut ab ea propendent. Latent autem sub ipsa aliæ, aut plerumque non multum prominent, veluti præsertim in renibus. Grandiorum cellularum nomine descripti olim in Adversariis (k), & sæpe ad te scribens (l), ut in variis cadaveribus non ego modo, sed & Valsalva conspexerit, significavi. Sed & alias vidi, nec tantum in sue unam, quæ nucis ferme capax fuisset, verum in corporibus item humanis satis magnas. Harum tamen nulla, si quam ex Stabulario quodam (m) indicavi, unam excipias, ultra renis superficiem se attollebat, ut ne illa quidem in Sene (n) a Valsalva conspiciat, quæ renis dimidium occupabat. Et alias tamen prominentes vidi, præsertim in Vetus duabus, quarum alterius ob hanc unam dantatam causam, brevem hic tibi Observationem adscribam.

40. ANUS gibbera, & clauda obierat in Nofocomio Patavino post medium Martium A. 1747. illuc nuper illata ob affectum de genere apoplectico, nihil manifeste lædente, nisi linguam. Quamobrem cum cætera mulieris mala sciri non potuissent, ipse vero aliis Partium secundum naturam se habentium observationibus tuæ diffunderet, quæ ad eas spectabant, in ejusdem quoque cadavere cum inquirerem; vix hæc quæ præter naturam essent, animadverti. IN VENTRE arteriæ Magnæ truncus ab Emulgentibus ferme incipiebat paulatim quo magis descenderet, eo magis se dilatare, donec paulo supra divisionem se totum expanderet in aneurysma diametro quoqueverus digitorum duorum. Inde sensim rursus contrahebatur sic tamen, ut Iliacæ ipsæ ad magnum tractum multo quam par sit, apparerent latiores. Inæqualis harum, sed magis aneurysmatis erat interior facies, ubi concrectiones haud deerant non modo polyposæ, sed & intunicarum parte aliqua ossæ. Horum Aortæ vitiis magna ex parte causam fuisse, crediderim in distorta Spinæ figura, quæ convexitate cum in thorace haberet ad partem dexteram, in lumbis habebat ad sinistram, eoque secum rapiebat Aortam. Quo minus miratus sum, in sinistro fuisse rene vitia illa quorum gratia hinc tibi Observationem describo. Nam ex ejus renis inferiore extremo hydatidis protuberabat, mediocris potius magnitudine. Aquæ erat plena rubellæ, et si pertunicas transpecta nigricare videbatur. Ex tunica exterior erant duæ, quarum extrema nihil erat aliud, nisi renis membrana adiposa, hic ob summam maciem carens omni pinguedine, altera erat membrana renis propria, quam non copia tantum, sed & pondus distraherat aquæ incluse, quippe in ea sede, & situ illam desuper urgentis. Itaque cum essent alibi in eodem rene minores hydatides aliæ duæ; membranam illam ultra superficiem renis non exulterant, sub ea videlicet conclusæ, ut cæteræ frequentiores cellulae, & suam sibi sedem in renis substantia excavantes. In qua major quoque hydatidis superiori suæ parti sedem in hemisphaerii pene modum excavaverat; ut non ulterius ac illa generis esse, intelligeres: ejus hemisphaerii diameter unius erat digiti pollicis.

41. Alterius Vetus dissectionem alias (o) habebis, in qua ren itidem sinister, extremo tamen superiore, in hydatidem, sibi innatam, valde extendebatur, ut quæquam, leviter subflavam, continebat ad uncias quatuor. Ad majores hujusmodi hydatides magnum illum facile referes æquem, ut Harveius (p) vocabat, abscessum, instar ovi gallinacei, flavescens aqua repletum, quæ orbicularem cavitatem in rene altero imprefferat, cum minores alii essent pariter in facie anteriore utriusque renis hominis maxime grandævi, non sine urinae suppressione demortui. At certe referes vesicam instar nucis juglandis grandioris, aqua limpidissima distentam, & dimidia parte renis substantiæ inherentem, quam Doringius (q) in Bucetio invenit, cujus idem ren multum sabuli, alter autem calculum habebat. Vesica illi æquales duas, humore quodam aqueo oppletas colorem lotii referente, memini olim reperisse in virili cadavere quod Bononiæ, absentis Valsalvæ loco, in Theatro Anatomico dissecti, ejusdemque renis in quo ipsæ, & calculi erant tres albi granorum vicæ magnitu-

dine, dilatata pelvim: hominem autem mortuum cum urina quidem in sua vesica suppressione; sed non ex hac tamen, cum aliæ essent multo graviores causæ, quas hic memorare necesse non est (r). Verum hæc duæ hydatides sub propria renis membrana, ut pleraque, coercerantur. Nec aliter se habuisse videntur quas in hydropicis sepe numero a se compertas scribit Willifius (s) ubi in Viro Illustri fuisse, ait, in medio dextri renis cavitate ingentem a pelvi distinctam, eaque multo ampliorem, aqua limpida impletam, renem autem sinistram plures hydatidas, & cavitates aqua limpida repletas continuisse. A sero autem in substantia renum alicubi remorato conjicit exiguas primum cavitates fuisse efformatas, quas deinde paulatim auctum, magis magisque dilataverit: & vides profecto, aquam limpidam, limpidissimam, rubellam in illis caveis esse inventam. Nec vero mihi (t), quamvis ex colore, atque odore sæpius urina esse visa sit; dubium tamen sæpius quoque defuit, quin potius humor esset urinae simillimus, non ignoranti, serum sanguinis persæpe aut esse per se subflavam, aut mora in visceribus fieri; certe haud raro humorem, undecunque is sit, in hydatidibus sic inveniri (u); ex renibus autem, ubi diutius retineatur, posse trahere lotii odorem, simulque animadvertenti, hujus quidem generis caveas sua intima, undique uniformi, tunica esse conclusas, ut nullam unquam aut mihi, aut aliis, quod sciam, cum renis pelvi, aut tubulis manifestam communicationem reperire licuerit. Igitur quod longe aliter se res haberet in Observatione Plateri (x), ubi dissectis quæ renum corpori adnatæ erant, velicis aqua plenis, aqua profusæ, foraminæque patebant, ut non iis velicis hoc est tribuendum, sed ulceribus multis, quæ ut renes ad interioribus ad exteriora usque perforasse, dicit; sic nihil vetat quin ad vesicarum usque cavum quædam sibi foramina aperuissent. Quæ ex Observatione modus quidem alius & ratio apparet, quæ possint hæc renum hydatides multo citius, ac certius ascitem facere, ubi sint ulcera cum pelvi communicantia; citius enim hæc ad magnas illarum caveas, quam ad renum superficiem perveniant, illasque inæcto acri ichore, multoque lotio perumpent, & hoc jugiter in ventrem effundunt, non secus ac per se effundere debuerunt in alia Plateri Observatione (y), effuderantque in ea quam ex Piccolhomino cum priore illa Plateri supra (z) indicavimus. Cæterum vel absentiibus ulceribus, si hæc hydatides eo sint numero, aut magnitudine, ut renis utriusque substantiam multam deleverint, aut conspaverint; minime dubium est, quin valde imminuta lotii secretionem, hydrops facile contingat. Quod si insuper dissiliant, effusque humore, excernere assidue alium pergant, hinc ascitem fore, manifestum est.

42. At si id facere non pergant, sed nova circum exinanitas succrescente renis substantia coalescant; hydrops quidem non oritur, paucos quem effuderant, humore haud secus atque is quo interiora ventris madent, per absorbentium vasorum oscula absumpto; in rene tamen cicatrix restat varia magnitudine, & profunditate, ut disrupa hydatidis plus minuse de renis substantia excavaverat. Relegis quam Epistola XXIX. (a) in muliebri descriptimus rene longam, & subflavam quasi extendente lineam, non per superficiem modo, sed etiam alte intra corpus ipsum renis perductam, antiqui vulneris cicatrici adeo similem ut veltigia indisti vulneris, sed frustra, in proximo ventris pariete quæverimus. In aliis autem Epistolis describimus tibi alias renum cicatrices minus profundas, sed depressas tamen, easque circuli ambitu comprehensas, qualis ea fuisset quæ coallitum majoris illius hydatidis secuta esset, quam in Vetus, paulo supra (b) proposita, observavimus. Ex his intelligis, quomodo ex hydatidum observatione cicatrices, in renum superficie haud raro obvias explicemus. Ad idem autem exemplum, aliorum quoque viscerum cicatrices explicari posse, credito, cum exteriores sunt, neque eas vulnera, aut ulcerum signa præcesserunt, velut erat quæ in uteri latere ascitica Anus his ipsis Litteris (c) memorata est. Habet enim etiam uterus hydatides suas eo interdum numero quem satis indicant Observationes Adolphi Oconis (d), & Cl. Adami Christiani Thebesii (e), ea autem magnitudine, ut unam, sicut alias (f) ti-

(t) Offeruaz. int. alle Tartarughe. (u) (x) (y) supra ad n. 35. (z) Schol. ad §. 8. Obs. 10. & ad §. 2. Obs. 21. (a) Ibid. §. 6. (b) Monit. Med. c. 8. (c) Advers. Dec. 1. c. 2. Vid. & Thef. 6. Tab. 5. F. 3. & seqq. (d) (e) n. 37. (f) In Additum. ad hanc Sepulchr. Scilicet. Append. ad Obs. 49. (g) c. 2. cit. (h) Obs. Anat. Chir. Fig. 68. (i) Vid. Epist. 43. n. 19.

(k) III. Animad. 33. (l) Epist. 4. n. 19. Ep. 10. n. 19. Ep. 17. n. 14. Ep. 21. n. 15. Ep. 24. n. 6. & Ep. 25. n. 4. (m) Epist. 4. n. cit. (n) Epist. 17. n. cit. (o) Epist. 60. n. 6. (p) Sepulchr. l. 2. S. 1. Obs. 17. (q) Ibid. l. 3. S. 14. Obs. 48. (r) Vid. Epist. 41. n. 10. (s) Sepulchr. l. 1. S. 13. Obs. 11. (t) Vid. Animadv. supra ad n. 39. indicat. (u) Vid. supra n. 37. (v) Sepulchr. S. hac 21. Obs. 8. §. 2. (w) Ibid. Obs. 11. §. 4. (x) n. 19. (y) n. 18. (z) Sepulchr. S. hac 21. Obs. 55. §. 9. (a) Eph. N. C. Cent. 3. & 4. Obs. 117. (b) Epist. 16. n. 33.

tibi indicavi, videbit Coiterus (g), ex matricis colli dextero latere prognatam, naturali vesica duplo quasi majora, lotio, five ut verius infra loquitur, aqua tenui lucidaque plenissima, & duabus tunicis, ut naturalis vesica, praeditam, sed nullo meatu aquam vel immittente, vel emittente. Sed & jecinoris, & lienis hujusmodi cicatrices, ut puta quam in Nob. Virgine descripsit Hoechstetterus (b) (cavendum enim est, ne fissurae quaedam nos decipiant, quae saepe a primordiis extant) tales, inquam, cicatrices consimili modo explicari poterunt. Nam utriusque visceris hydatides vel frequentiores occurrunt, five omnino exterius adhaere, qualem in suspensio Coiterus (i) sub liene deprehendit duorum pugnorum magnitudine aqua plenissimam, & a vicinis partibus absque lesione separavit, five prorsus in profundo abditi, quae in hepate a Glasero (k), Diemerbroeckio (l), aliisque memorantur. Quo facile referes Lyleri (m) Observationem aquae citrinae, quae ad tres & plures libras prorsus ex alte perusto Hebraeae videntur jecinore, & Maucharti alias (n) tibi descriptum, ut ipse vocabat, lienis hydropem, sicque animadvertes, ubi forte viscerum ab intus collecta humoris copia demum perumpantur, quantum augere eum possint, qui antea faciebant hydropem, & quantum videri possint ab eo corrupta qui circum stagnant, cum ab illo fuerint quem continebant. Sive igitur hujus secundum generis, five primi hydatides fuerint, five denique inter utraque has mediae, quales hic potissimum attendimus, id est ita in viscere innatae, ut in ejus tamen superficie quoque ex parte se ostendant, sunt, ut dicebamus, in jecinore, aut liene vel frequentiores. Sic ultimi hujus generis duas nuper vidi in cuiusdam Vetulae jecinore, alioquin sano, quod oram anteriorem, figura nunquam antea a me conspecta, circa medium falcata habebat, lobumque sinistram non minus propemodum, quam dexterum, se se deorsum producentem. Sub membrana, faciem convexam operiente, ambae hydatides ex parte aliqua apparebant, reliqua intra hepar condita, parva una, haud modica altera (o). Sic plures in suis liene animadverti, insipidae, aut leviter subdulcis aquae plenas. Sic in alterius jecinore haud procul a crepidine unam cerasti magnitudine. Sed in alio magnitudine varia, numero ingenti, nec tantum, ut in prioribus, semisepultas, sed & plures omnino intus conditas: omnium aqua crassior, alboque folliculo comprehendebatur. Valde amplificatum erat id jecur, crassiusque habebat, eoque multo quam solet, magis in oculos vel minus attentos incurrens albidum rete quolobuli interceptiuntur, five extra, five intus speciales. Hi sani; ut caetera viscera; esse videbantur: sed cystis, contracta plurimum, pro selle non multas continebat guttas muci cuiusdam nullo fere colore praediti, ut illum bilis albicantem propemodum colorem in memoriam redigeret quem Vesalius (p) se vidisse, testatus est antequam Diemerbroeckius & post ipsum alii qui pariter in Sepulchreto laudantur, alique deinceps candidum, lactescens, luteum pro bile humorem conspicerent. Verum ne ab iis de quibus loquimur, lienis, & hepatis hydatidibus recedamus; ad ipsarum genus spectare fortasse credes, quas in hominibus Hunerwolfius (q) describit praeter adnatas, hepatis & lienis etiam innatas, aut quae Horstio (r) in puelli hepate, & liene foecae aqua plene apparebant. Quod si quae in vivo praecesserant, scire cupis; in altera Sepulchreti Observatione (s) leges, in qua dissectio eadem repetita est: quod in longa adeo Sectione hac XXI. minus, quam in plerisque aliis, mirandum est, nec semel (t), accidisse: eandemque ob causam, & simul ob fucosas Blancardi descriptiones venia danda esset, quod in Additamentis, tanquam novae hujus Observationes (u), ex reponantur, quas Bonetus antea in Sectione hac ipsa (x) produxerat, verisque Auctoribus Jodono, & Pareo attribuerat (y); nisi, quod ne Blancardus (z) quidem fecerat, una Jodoni Observatio discrepta esset in duas XXIX. & XXX. vel potius ex Blancardi Scholio in primam, altera facta esset Observatio. Sed & Eggerdesi Observationi (a) quae ad Thoracem attinet tota, nullus hic esse debebat

locus, ubi agitur dumtaxat de Ventre; aut certe quod in duabus (b) huc pariter haud spectantibus factum est, minime omittendum, ut esse extra proprium locum significaretur.

43. Mihi vero longe alia ratio est, cur hic tibi de Thoracis visceribus perpaucis verba interjiciam. Neque enim sola Ventris viscera illiusmodi hydatidibus, & quod consequi mihi videtur, cicatricibus obnoxia sunt: Pulmonibus, atque adeo cordi hydatides illas increfcere, ex Veterum, Recentiorum, & meis quoque Observationibus tibi alias (c) ostensum est. Si ergo aliquando aliqua earum quae a nobis definitae sunt, cicatricum in aliteratoc occurrit viscere, ut certe mihi in exteriore cordis facie cuiusdam leporis occurrit, quod animantium genus quam crebro hydatidibus tenetur, vel ex unius Redii (d) lectione fati constat; quid vetat, ne qua in parte semicondita hydatidem viderim, in eadem ex hydatidis inanitione, & coactu cicatricem deducam? Igitur ut in Ventris, sic etiam in Thoracis visceribus earum quas dixi, cicatricum originem ab hydatidibus deduces. Quorum secundum quoque genus (e) esse in pulmonibus fortasse agnoscendum, conicies ex aqua intra ipsos in quibusdam quasi faccis collecta, ut bis quoque conspexit Amplissimus Senacius (f).

44. Sed aliam hic a me facile expectas originis, non cicatricum, sed hydatidum quarundam explicationem, quales videlicet in leporibus conspexit Redius (g) non modo intra jecur acervatim conditas, & inter se colligatas, sed & sub ejus, & totius alimentorum canalisextima tunica, interque mesenterii membranas sine ulla cum his cohaesione, imo & liberas plures, ac omnino solutas in ventris cavo animalculorum instar quae se huc illucque conferre possent, degentes; ut in mentem ipsi venerit, quod & Tyfonio postea, ut supra (b) dixi, perquirere, an insecta quaedam, vel potius embryones eorum essent: quarum conjecturarum hanc jure a Tyfonio rejectam video; primam autem; ut caetera omittam; haud satis cum experimentis congruere, quae limpidissimam qua plene erant, aquam ignis vi nunquam concrevisse, ostenderunt. Tyfonius vero, quamvis prima isti conjecturae additum cum propter illa, tum quia suarum hydatidum, quae ex aliis sumptae erant bestiis, intima tunica nullam cum extrema qua undique cingebatur, cohaesione habebat; factus est tamen, hanc extremam vasis sanguineis instructam esse, neque hydatides cunctas esse hujus generis, speciatim quae in ovarii hydropicarum mulierum saepe inveniuntur, factae videlicet ex amplificatis vesiculis; five ut ipse credebatur ovulis; quae secundum naturam in iis sunt, itemque eas quas ex aperto latere dextero paulo infra costas spurias foeminae tunc egrotantis, postea autem persanatae, erumpere vidit cum multa aqua limpidi ad quingentas, ejusmodi pariter aqua turgidas. Reperta deinde sunt ab Hunerwolfio (i), & Hartmanno (k), ab illo in muliere hydatides quae praeter liquorem gummosum album, in se continebant alias tenuiores vestias, lymphae plenas, ab hoc autem in cane intra unam, eandemque membranam, quae omenti erat, plurimae simul comprehensae, ut illa membrana divulsa, ad levem pressuram hydatides profluerent, quarum liquor coctione non concrefcebat, coagulum tamen quoddam secum habebat, tunica autem singularum propria ex pluribus aliis membranis compacta, densa erat adeo, ut dissecia non collaberetur, eademque laevem pinguedinem tangenti offerebat, cujus multum hydatides coctae exudarant. Minime quoque connexae erant inter se quas Vir Cl. Alexander Camerarius (l) bene multas deprehendit, aquam continentes limpidam, comprehensas autem membraneo sacco, quo simul steatoma virilis jecinoris concludebatur. Cum mihi necdum contigerit, ut in ejusmodi inciderim hydatides: aliorum tibi Observationes quas facile conferre posses, indicare hic malui, quam eorum quae percuratari ipse non potui, explicationem asserre. Tentavit id Hartmannus in suis, eo adscripto Scholio (m) quod ut tibi placeat, plurimum vereor. Quares potius, an sint quae magis probes apud Viros alios Doctissimos, praesertim vero apud illos qui de inorganica

ganica tumorum cysticorum efformatione scripserunt, aut qui natantes vesiculas in tumorum eorundem humore saepe his temporibus memorantur. Ego vero et in quibusdam hydatidibus ea transpexi quae supra (n) indicavi, imo in foemina, tibi alias (o) descripta, tenuem intimam hydatidum tunicam instructam vidi abicantibus vasculis, in fue autem in quodam quasi cellulari conformatae; vesiculas tamen, quae Anatomicis occurrunt, aquae plenas, haud omnes unius generis esse, existimo, ideoque aliarum originem esse alia ratione, aliquarum vero non una, sed pluribus in unum junctis rationibus fortasse explicandam. Speciatim autem de iis vesiculis, quae plures sub una tunica aut inter se colligatae, aut solutae, & in humores ejus quem continent, similes natantes, aut in ventris cavum effusa inveniuntur, quae viderit, & quae conjecerit Cl. Morandus (p) perlege.

45. Et hujus praesertim generis eas vesiculas fuisse, crede, ex quibus singularem quendam hydropem fieri, scripsit Aretaeus (q). Scilicet vesiculas quasdam pusillas, crebras, humoris plenas, ex loco ubi ascites fieri solet, prodeuntes vel in homine videre potuit, cum ventris parietes ad aquam educendam pertuli essent, non secus ac Tyfonium aliunde prodeuntes ingenti numero vidisse, diximus (r), & Morando (s) ex parte aliqua accidisse, leges. Nam quod Aretaeus addit, fuisse qui affirmarent, hujusmodi ampullas per intestina in ventris cavum transisse; nimirum hoc illud est, nisi quid me fallit, quod negat, se unquam vidisse, non hunc, cujus signum propter, hydropem, quemadmodum cum aliis credidit Petrus Petrus (t), qui ut ipse non conspexerat, sic neque Aretaeum conspexisse, putavit. Qui vero ex intestinis in ventris cavum eas vesiculas transisse, dicebant, ea fortasse quae Redium vidisse, retuli (u), in bruto aliquo animante offenderant: quorum narratione paulo aliter, ut sit, ab iis qui audierant accepta, quasi ex intestinorum cavo ea vesiculae provenissent, impelli potuit Aretaeus ad ea continuo subiungenda, quibus narrationem illam, si acceptam, improbabilem esse, ostenderet. Caeterum signum quod protulit hydropis hujus, sic videlicet scribens, si abdomen perforaveris, parum admodum humoris effundes; ab interiori namque parte vesica occlusa: at si in vesicam instrumentum impuleris; iterum succus emanabit; insuperabilem monstrat tollendi ejusmodi morbi difficultatem, nisi si forte uno in loco posita, atque ita disposita essent vesiculae, ut in illa Tyfonii foemina (x), itemque in Rustico hydropico apud Riverium (y); quamquam in universum ubi ex hydatidibus, aut cum hydatidibus hydrops est, cujusque modi haec generis sint, modo multae sint, aut magnae; frustra abdomen perforatur. Nam praeterquam quod quae jam dissiluerunt, pergere possunt humorem effundere; aperta una vesica, ut Tulpio (z) praesente, recte admonuit Thomas Bartholinus (a), reliquias non evacuat, quamquam cohercant racionem vix in morem; non modo sialae ab aliis disjunctae sint. Itaque ad alias causas cur ea chirurgica vel tunc etiam cum caetera omnia viderentur favere, saepe numero non responderit, hanc quoque addito, quod, ut Ruyschii (b) utamur verbis, cum hydatides sepius esse contingant in hydropicis, raro, si unquam, evadunt, paracentesi in abdomine insituta. Hoc autem dixit occasione praebente hydropica, cujus tum peritonaeum, tum mesenterium hydatidibus referta erant. Quod asciticorum mesenterio per se accidere, cum tot aliae veteres, tum recentiores quoque in Voluminibus Caesareae Academiae Observationes (c) ostendunt. De caeterarum autem Partium quae in ventre sunt, hydatidibus cum facis superque exemplorum haecenus produxerim; unum de ventriculo addam ex Jacobo Vongio (d) in ea muliere, cujus mirabilem casum explicare nequeas, nisi ad eam causam ad quam in diabete solent, forte respicias. Cum enim per totum morbi decursum tantum fere urinae redederet, quantum potulenti ingerebat; non facile apparet unde aqua existeret, cujus ducentos & quatuordecim sextantes, undetrigies intra octo menses instituta paracentesi, emisit. Huic igitur mulieri hydatides plurimae in ventriculo erant, ac intestinis.

46. Quae mihi Observationes sunt ad Tympanitem spectantes, cum propter complicatos morbos alibi locum Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

vel commodiorem sint habiturae; pro iis duas praestabit subnectere, ad Peritonaei Hydropem attinentes, morbum; ut de eo quaedam praesentur; a vetustissimis quidem non descriptum, nec tamen primum a Tulpio (e), aut Bogdano (f), ut credere ipsi videbantur, & plerique crediderunt, propositum. Id non eo dico quod Stratenus simillimum, a se conspectum, Tulpio, ultro hoc fatenti, narraverat, nec quod Stalpartius (g) aliquid ejusmodi a Marcello Donato scriptum affirmat. Marcellus (h) enim ut adversus Fernelium ostendat, hydropicorum aquas per invisibiles meatus in ventris cavum traduci, ethi, inquit, hoc cavum proprius est earum aquarum locus; nihilominus & intra peritonaeum, ac reliquias partes inferiorem ventrem constituentes, aquae portiones pluries reperiri ex sectione comprobatur est. Ne dubites, quae sint ex partes reliquae; illud continuo addit quod male a Stalpartio omisum est: ita ut nonnulli Arabum sectatores locum aquae proprium in Ascite inter siphac, & mirach (id est inter peritonaeum, & quae huic exterius apponuntur) esse contendunt; nec non etiam videmus in hoc morbo detentis aquam ad coxas tibiasque pervenire & cetera. Ex hoc igitur exemplo vides quam portiones aquae ipse intelligat illis etiam in partibus fuisse inventam, qualis videlicet ubi anasarca conjungitur cum ascite. Nam quod ad eam attinet opinionationem nonnullorum longe ab suis Haly (i), & Avicenna (k) discrepantium, neque ad eam comprobendam illa idonea est Observatio; neque alia ulla a Donato proferitur, quamvis Stalpartius ajar, Donatum postquam scripsit, hydropem nonnullum fieri a copioso frigida potu, si humidum in peritonaeum delatum sit, Donatum, inquam, ita pergere: Jacobus Camenicensis, epistola ad Andr. Matthiolum lib. 5. epistolae scripta, refert de quodam, cui aqua inter tunicas peritonaei, nec non intestinorum adinventae fuerit. Donatus (l) enim postquam ex Aretaeo (m) discrete laudato ea descripsit verba de humore tunc in peritonaeum deducto non ut ibi colligatur, sed ut inde in illa guttae effluant ascitem facturae, quae prius in aere per transpirationem digerebantur; postquam igitur haec quoque descripsit, & alia, atque alia addidit minime ad peritonaeum attinentia, sed ad viscerum in asciticis imbecillitatem, & ad venarum hepatis obstructionem; ut haec probet, tum denique illa Camenicensi Observatione utitur lapillorum eas venas impediendum in hydropico, cui aqua inter peritonaeum, & intestina adinventae fuit. Sic enim ipse scribit Donatus, recte, ut Matthiolus quoque in responsione ad Camenicensem, illa hujus interpretans verba, cum transivisset musculos abdominis, invenimus aquam illam citrinam vocatam, intra peritonaeum, & intestina: de quo ab aliquibus dubitatum tamen fuisse video; id est ab iis de quibus paulo ante dictum est, Arabum sectatoribus, non inter peritonaeum, & intestina, sed inter peritonaeum, & exteriores partes aquam asciticorum esse, opinantium. Quae eo fusius persequutus sum, quo plures vidi, Camenicensi, & Donato minime inspectis Observationem hydropis peritonaei cum Stalpartio, quem innominatum secuti sunt, tribuisse, in quibus Nuckius (n) fuit, & is qui cum Donati observatione quae nulla est, se suam hujus morbi comparasse, scripsit.

47. Quis igitur, inquit, hunc ante Nicolaum Tulpium deprehendit? Joannes Acholzius, Medicus, & Professor Viennensis Primarius. Hic enim A. 1581. coram Caesareis Medicis, ac Chirurgis cum dissectioni praesesset mulieris hydropicae; aquae instar lixivii obscura ingentem copiam non in ventris cavo reperit, sed inter peritonaeum, & ventris integumenta, quippe musculus usque adeo a subtrus distendente aqua extenuatus, ut quod non raro solent, quasi nulli conspicerentur, aut ex parte etiam mutatis in corpus quoddam continuum ex vesiculis, aqua, mucore, glandulosa materia refertis, quod amplissimi illius facci anteriorem parietem faciebat, cum anteriorem membrana faceret, qua viscera omnia sic operiebantur, ut antequam haec incideretur, nulla esse viderentur. Lege, quaeso, Observationem, fusius in Sepulchreti hac Sectione (o) descriptam, quamvis cum alio attinentibus confusam; & praeclear intelliges fuisse illum peritonaei hydropem ex aqua de glandulosis illis tumoribus effluente.

(g) Obs. Anat. (h) Sepulch. S. cit. Obs. 12. §. 2. (i) Obs. Anat. cit. (k) Sep. S. cit. Obs. 4. §. II. (l) Ibid. Obs. 19. (m) apud Barthol. Cent. 2. Epist. Med. 72. (n) Epist. 36. n. 18. (o) Vid. Epist. 65. n. 8. in fin. (p) Exam. Obs. Fallop. (q) Sepulch. Obs. 4. cit. §. 1a. (r) in Addit. ad eand. 21. Sep. Sect. Obs. 82. (s) Sect. ead. Obs. 3. §. 12. (t) Ibid. Obs. 6. §. 7. (u) Confer Obs. 4. §. 2. cum Obs. 6. §. 12. Obs. 20. §. 12. cum §. 17. Obs. 21. §. 2. cum §. 7. Obs. 55. 2. cum §. 17. & §. 13. cum §. 16. & ead. (v) Obs. 29. 32. & fortasse aliam. (y) Obs. 48. & 39. (z) Ibid. Obs. 76. & 79. (a) Epist. 16. n. 33. & 44. (b) Anat. praec. Rat. Obs. 84. (c) in Addit. ad hanc Sect. 21. Obs. 61. (d) Ibid. Obs. 1. ch. 3. n. 4. (e) G. G. Observaz. cit. (f) n. 38. (g) in Addit. ad hanc Sepulch. Sect. Obs. 82. (h) Ibid. Obs. 83. (i) Act. N. C. Tom. 3. Obs. 120. (m) ad cit. Obs. 83.

(n) n. 37. (o) Epist. 21. n. 47. (p) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1722. & Hist. A. 1723. (q) De Caus. & sign. morb. diut. l. 2. c. 1. in fin. (r) n. 43. (s) Ibid. (t) Obs. hinc ind. decept. 15. (u) l. 2. Obs. Med. c. 34. (v) A. H. Vol. 1. Obs. 8. (w) Theat. Anat. 7. n. 37. (x) Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 239. & Cent. 3. & 4. Obs. 117. & Act. Tom. 2. Obs. 34. & cetera. (y) Part. 1. Cent. 2. Obs. rar. 28. in Schol. (z) l. 4. Obs. Med. c. 43. (a) Obs. Anat. Chir. 21. (b) Theor. Med. l. 9. c. 31. (c) c. 5. supra ad n. 33. cit. (d) c. 21. cit. (e) l. ad n. 45. supra cit. (f) Ade. Cur. c. 9. (g) Sect. 21. & Obs. 21. §. 16.

effluente, quorum & ejus vitio miserandi illi dolores facile sunt adscribendi, qui aucto jam morbo, feminam assidue torserant. Nec verò hæc historia primum in Sepulchreto edita est; sed jam ab A. 1598. exiit inter *Confilia Medic.* (p) a Scholzio vulgata, in libro videlicet non semel typis impresso, & omnium manibus, superiore præsertim sæculo, subinde versato. Sed & alias in Sepulchreto Observationes animadverti ante illam Tulpii habitas, quæ ad hunc morbum referri aut possint, aut debeant: quanquam nemo adhuc, quod sciam, cum cæteras commemoraret, harum fecerit mentionem. Potest fortasse illa Spighii nostri, qui cum in Moravia esset, *hydropem spiritum* in femina adnotavit, *inter abdomen propriè dictum & musculos qui introsum quasi incurvantur* (an incurvantur? an res se habuit, ut in Aholzii Observatione?) Inde (quod in Sepulchreto (q) deest) *humoris nigri libris decem promanarunt*. Id factum A. 1614. tamen ab Rhodio (r) tertio & quadragesimo post anno editum est. Sed, nisi prorsus fallor, huc spectat quod Hoechstetterus (s) in Nob. Virgine observaverat A. 1628, quamvis paulo pluribus interjectis annis ab Nepote vulgatum, & quamvis Auctor, facci in quo ingens vis crassi foetidi que humoris inclusa fuerat, anteriorem partem peritonæo, alteram autem in quatuor glandulosos, & in his majores quatuor, invenit tumores purulentos, omentum credidit. Cum autem partem hanc facci anteriorem atque membranæ corpus fuisse expansum, quo omnia viscera, & intestina tegebantur; omentum quidem habere potuit agglutinatum, ipsum vero, ut credo, peritonæum fuit. Sed hoc tu melius dispicies; habes enim & Observationem, & Scholium, in quo aliquæ ipsius historiæ partes sunt, in Sepulchreto (t).

48. In eodem velim insuper attente perlegas Observationes Paavii duas (u), Dodonæi unam (x), & cum perlegeris, animadvertas, ullane tibi febriori incipiat suspicio, earum aliquam ex aliqua parte ad hæc attinere de quibus loquimur. Scilicet Paavius in duabus hydropicis, altera anno 1601. altera insequente dissectis, lienis, renum, jecoris ipsius *in vestigia quidem invenit*, nisi quod hujus ultimi visceris in altera venosorum modo ductus, *tique perpauci, erant superflui*. Quanto minus mirum, si peritonæum suspicemur magna aquarum copia distentum, introsum quibus locis forte erat magis attenuatum, minusque visceribus quibuscumque adnatum, crepuisse; quibus contra erat, subitisse, itaque nonnulla viscera ex parte aliqua se ostendisse, alia autem delituisse, paucasque illas venas pertinuisse ad ipsum peritonæum (y): nec verò Paavium in appropinquata, quippe in pessima notæ cadaveribus, *ventris*, ut ait, *apertione* diligentius rem quaerivisse. Dodonæus autem in ea quæ duos jam annos ventrem prætumidum gesserat, cum habet aqua ex hoc aperto, sed intestinales fordes nigres, quales in cloacis sunt, effluxissent ad libras amplius sexaginta, ultro faretur, in tantis foridibus non licuisse inquirere ex quoniam læso intestino provenissent; viscera tamen omnia, si omentum excipias, quod in putrida abierat frustra, prorsus integra fuisse; at peritonæum aliquot locis a superioribus partibus ad inferiores usque fissum. Hic, fateor, ex læso demum intestino fæces profufluxisse, & hydropicæ jam diu collectas aquas coinquinasse, nihil habet admirationis. Sed plurimum habent hæc, ventris tumorem tantum cum facie optime colorata, & nullis morbi notis in urina apparentibus, & nullo pedum tumore, tandi mulierem tulisse. Indicia hæc sunt, ut infra (z) videbimus, hydropis peritonæi, quocum illud quoque multo facilius congruit, quod viscera tam longo tempore integritatem servarint suam. Porro introsum compulsum peritonæum posse ad aliquod intestinum adherere, & læsionem ita communicare, ut fæces in humorem demum quo peritonæum distenditur, transeant, indicat Cl. Chomelii (a) Observatio, pariter in muliere habita, cui non secus ac illi de qua sermo est, a partu venter tumere coeperat. Facile igitur suspicari posse, crediderim, diffiso tandem, ut viderunt, peritonæo, ex diuturno hujus hydropis ascitem repente esse factum (b), auctaque dum illud diffiliret, annexi intestini læsione, fæces plurimas diebus illis ultimis in ventris cavum profufluxisse. Hæc autem Dodonæi Observatio edita cum aliis ab ipso est anno eodem quo suam ha-

buit Aholzius, 1581., Evidens enim erratum est operarum, ubi in *Lindeno Renovato* prodiisse illius Observationes scribantur A. 1518. cum Auctor natus agnoscat A. 1517. quod minime hic adnotassem, nisi eundem animadvertissem errorem in *Bibliothecæ* quoque *Scriptorum Medicorum* transiisse. Observatio etiam apud Riolanum (c) extabat, neque in ultimis dumtaxat Anthroponographiæ Editionibus, *aqua inter peritonæum, & abdominis musculos effusa*. Verum ne forte diceret sic explicandam, ut verba illa Donati explicavi (d); hoc loco malui prætermittere.

49. Anno denique 1651. a Tulpio morbus de quo loquimur, conspectus est, & mox sub novo *Hydropis Peritonæi* nomine promulgatus (e), diserteque affirmatum est, & omnem aquarum congeriem delituisse inter duas peritonæi tunicas, quæ induerant crassitiem digiti annularis. Eandem historiam; ne forte aliam, ut quidam, credas; edidit postea is qui cadaver incidit, Jobus Meekrenius (f), sed fusius edidit, nec reticuit, unum ex tot Medicis Walzum veram illius hydropis sedem, vivente adhuc agra, coniecisse. Habet tamen & Tulpus aliquod, in fusiore ea descriptione non reperiendum: quamobrem hujus quoque poterat descriptio in Sepulchreto referri, & seorsum quidem potius, quam ut ex utraque una fieret, quod apud Stalpartium (g) factum videbis sic, ut sæpe ignores, quæ Tulpus scripserit, & quæ Meekrenius. Bogdanus (h) quoque in muliere, ab se dissecta, peritonæum adnotavit pollicaris digiti crassitie, rugosum, & rigens; id quod, & quæ de visceribus continuo subduntur, perperam in Sepulchreto (i) sunt prætermissa. Sed humorem, amurcæ similem, non inter tunicas peritonæi, sed intra abdominis musculorum tunicam, & peritonæum contentum fuisse, scripsit. Nimirum quod Tulpus, & plerique deinceps alii pro exteriori peritonæi lamina acceperunt, ipse pro musculorum tunica accepit cum Berengario (k) sic olim docente: *veritas est, quod ad sensum apparet, una pellicula subtilis valde inter verum siphac (peritonæum) & musculos latos (Transversos) ventris, maxime in parte carnosa musculorum, quæ pellicula est panniculus circumvolvens musculos & cet.* Ex hac etiam pellicula a multis constari ex parte nunc, video contextum cellulorum peritonæi, quibus cellulis ab distendente aqua distruptis, cavum fiat inter peritonæum, & tendines musculorum transversorum, sive, ut melius alii, & musculis transversis. Sed nunc peritonæum præter ipsum contextum, exteriori lamina habeat nullam, nuncve contextus ipse lamina vocari non possit, haud opportunus hic est ad quaerendum locus. Satis est indicasse, ante hæc ultima tempora non defuisse qui hujus hydropis sedem inter peritonæum, & musculos collocaverit. Equidem Bogdanus quo anno illa scripserit, nescio; at certe A. 1665. ipsa edidit Bartholinus (l). Sed & duodecim ante annis Olaus Rudbeckius (m) non dubitaverat, quin inter musculos abdominis & peritonæum posset tumor hydropicus procurari. Anno autem 1677. in Virgine aquam deprehendit Gerardus Blasius (n) intra musculos abdominis & peritonæum. Hic tamen inter duas quoque peritonæi laminas idem contingere posse, censuit. Quod & contigisse dicendum esset in plerisque Observationibus, nisi qui contextum cellulorum diffumpi, ajunt, respondere possent, exteriori hujus partem, ad musculos adhaerentem, tunc sæpe crassam adeo ad densam fieri, ut pro altera peritonæi lamina imponat, imo nonnunquam pro toto peritonæo: quod Hoechstettero (o) aliisque videtur accidisse, in his Paulo Mothio, cujus in Matræna Observatio sic posita est a Bartholino (p), quasi aqua plurima congesta fuisset inter peritonæum, & membranam densiorem, viscera omnia operientem, venis copiosis, & amplis referant, cui ad hepatis regionem magnus abscessus erat adnatus, cum tres minores inferiores membrana partem prope inguina occuparent. Quæ Observatio edita est A. 1657. Annum autem indicavi quo est quæque memoratarum Observationum vulgata, ut plerisque intelligeres in omnium fuisse manibus ante A. 1668. quo Drelincurtii Publicus Professor ibi est creatus ubi aliquis ejus Discipulorum cum illam fuisse historiam scriberet hydropis peritonæi, a Drelincurtio acceptam, quæ in Additamentis ad hanc Sepulchreti Sectionem adjecta est (q); illud sane haud dignum eruditissimo Præceptore interjecit, *parilis eventus nec volam, nec velli-*

vestigium exflare vel apud Veteres, vel apud Neotericos, uno excepto Cl. Tulpio.

50. Jam vero cæteras indicare fatis erit Observationes ejusdem hydropis, quæ post annum illum 1668. ad annum usque sunt editæ 1692. quo Drelincurtii successor Nuckius (r) suam ipse vulgavit, communicatam antea cum Stalpartio, & ab hoc editam (s). Fuerunt autem præter eas Hoechstetteri, & Blasii, de quibus supra (t) dictum est, tres illas quas, ut plerisque alias, videbis in Sepulchreto (u) relatas ex Sculteto, Helwigio, & Sponio: quibus addes Knifellii (x) unam, quam in Sepulchreto deesse, non miraberis, cum animadverteris, deesse Nuckianam! Ex quo autem Nuckius (y) solertia ac industria sua hunc morbum illustravit, extiterunt primum Observationes tres, in Sepulchreto descriptæ, Gahliepii una (z), Drelincurtii altera, quam paulo ante (a) commemoravi, & Simonis Zyllii tertia, quæ cum eadem conjuncta est. Non potuerunt autem in Sepulchreto locum habere, quippe post secundam ejus editionem vulgatæ, Observationes reliquæ omnes, quas anguli singulas proposuere Littrius (b) primum, qui morbi explicationem, signa, prognosim, curationem diligentius quam alii ad id tempus, adjecit, deinceps vero Hieronymus Laubius (c), Lucas Schæckius (d), Joannes Palfinius (e) ex Favellerii communicatione, tum Cl. alii Viri, Jo. Georg. Hoyerus (f), Jo. Hermannus, Furstianus (g), Jo. Christoph. Pohlius (h), denique Jo. Henr. Respingerus (i). Horum igitur, & eorum omnium qui supra nominati sunt, mihi erant in manibus Observationes, ad te scribenti, nec dubitanti, quin alia præterea extare possent cum Veterum, tum præsertim Recentiorum. Quas inter noli credere, oblitum me esse recensere hic quam non sine solertia, & dexteritatis laude Chomelii (k) proposuit, addens & alteram, sed utramque in vivitibus dumtaxat habitam. Ego vero in hac quidem secundum temporum ordinem recensione cum aliis adnumerare consulo omni non secus ac duas quarum alteram ex Bartholino, quasi hujus, non Brechtfeldii, esset, alteram ex amico Medico prodiderat Nuckius (l), non quod de hoc morbo ageribus non peritiles censeam; nam & ipse earum aliqua tum supra quo ad licuit, usus sum, tum infra fortasse utar; sed quia nulla ipsarum est anatomica inspectione comprobata. Cæterum & hæc quatuor, & ejusdem modi alia infra proferenda, in feminis habitæ sunt, ut reliquæ etiam non modo quæ indicatæ sunt ab Rudolpho Jacobo Camerario (m), qui id ipsum animadvertat, sed & omnes insuper alia quæ a me hæcenus memoratæ fuerunt, aut post memorabuntur; ut necdum, ubi vix unum exceperis (n), nisi in sequiore sexu, peritonæi hydrops sit observatus. Qua de re, ac de aliis quas, tot historiis inter se conferens, peculiariter adnotavi, mox aliquid scribam posteaquam primum, quod sciam, Italorum, duas quas pollicitus sum, adjecero; ne forte credas, cum de tot illis mulieribus nulla fuerit ex Italia, nostras feminas huic morbo obnoxias non esse, rariori quidem, ut nec Valsalva, nec ipse adhuc in eum dissecando incidit, non sic tamen raro, ut Mediavi noster in Nosocomio hoc bis non viderit, qui mecum utramque Observationem suam in hunc modum communicavit.

51. MULIERI necdum inclinata ætate, colore laudabili, venter universus tumebat. Narrabat, priusquam id sibi accideret, tumorem quandam percipi potuisse ad finem umbilici latus, inaequalem, eaque magnitudine, ut impositam manum ferme æquaret. Cum alii vel ob id asciticam crederent, alii ob naturalem faciei colorem assensum sustinerent, mortua est. ABDOMINIS musculis Transversis incisis, aqua erupit plurima putidissima, quam a ventris cavo peritonæum separabat. Ea exhausta, tumor de quo mulier dixerat, in conspectum venit, innatus peritonæo, factusque ex magnis duabus, tribusve quasi vesicis quarum parietes crassi erant adeo, ut aquaeducta quam continebant, minime ipsi subfederint.

52. MULIER altera duodecim circiter post priorem annis, id est, A. 1725. in Nosocomium venit, ipsa quoque morbo non minus, imo vel magis inveterato. Aiebat enim, sibi quadragessimum annum agenti; tunc autem agebat quinquagesimum; tumores quosdam in superiore ventris parte obortos, dispersitos, nec dolore, si quis tangeret, carentes: hos, multis, & variis cum interius, tum exterius Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

incaustum adhibitis, increvisse, & se pejus semper habuisse. Etiam tum, quamvis totum esset abdomen distentum, licebat oculis, non modo manu, tumorem intus aspicere; in unum enim, disjuncti antea, tumores coaluerant inaequalem, dolorem, cum tangeres, afferentem, positum inter cartilaginem ensiformem, & umbilicum sic tamen ut neutrum attingeret. Non alius quam alibi, erat ibi cutis color: eamque si digitis arripere, & attollere velles, non poteras; ut propterea in ipsis abdominis musculis quidam tumorem esse, crederent. Alii vero faciei colore spectato, qui ad flavum inclinabat, & maximo, de quo mulier præcipue quebatur, respirationis incommodo, ad viscerum aliquod attingere tumorem, censebant. Nullum tamen erat lævi ventriculi, aut intestinorum indicium. Interea cum ad levem qua tenebatur, febrem nigra vomitiones accessissent; mors vitæ miseræ finem imposuit. VENTRIS, qui minus quam in vivente fuisset, tumidus animadvertebatur, integumentis, & musculis diligenter separatis, & cum his tendine ipso Transversorum, subjecta apparuit horum musculorum & tendini, & carni membrana tenuis, quam inter, & alteram, cujus crassitudo unam æquabat lineam uncia Bononiensis, cavum comprehendebatur non modo tumorem continens lunatum membrana exteriori, verum etiam dorsum, & ad latus utrumque se extendens, ut plurimum concluderet aquam, colore ei similem in qua caro recens lota est, odore terribili, crassitie autem qua parte subfederat, purulenta; cujus aqua copia æstimari potuit ad libras triginta non tam ex ea quæ in illo cavo reperta est quam ex illa quæ, erosa ferme e regione ventriculi, inferiore cavi membrana, in ventrem se effuderat, idque circa extremum, opinor, tempus, indeque minus tumidum abdomen apparuisse. Cæterum peculiaris ille epigastrici tumore firma compactus erat, duraque substantia, ex albo flava, in qua paucæ alicubi cellulae adnotatæ sunt. Membrana autem cavum complectentes, non uno loco erodi jam coeperant, & nigrescere ea quidem facie qua inter se respiciebant, eademque erant inæquales. Sed qua facie membrana inferior spectabat ventrem, lævis erat, nisi qua pars aliqua omenti, & Crassi intestini ad illam, nec firmius tamen, se annexebant. Erat quoque hinc cum eadem membrana, inde cum infima lumborum vertebra connexus quidam quasi funiculus: qui dissectus, sanguinem fudit. Porro intestina quasi inflammata; omentum vero, & ventris cætera erant sana, si jecur excipias pallens, & aliqua ex parte sub cuncto stridens, ut si arenosæ particulae inter ejus substantiam admittæ essent.

53. Nunc quando hydropis peritonæi Observationes; ut seponantur quæ dubitatione aliqua non careant, satis multas habemus quas inter se conferamus; aliquanto minus difficile est de illius causis, natura, lignis, curatione quædam subicere. Quod igitur ad causas attinet; ubi Nuckius (a) lymphæ ductum ramos inter musculos abdominis, & peritonæum reperit, quod & Rudbeckius (p) dixerat; imo inter duplicem peritonæi laminam, luculentius demonstravit, illiusque cogitatum secutus est, quod iis ramis obstaculo aliquo interceptis, hydatides, his autem ruptis, hydrops peritonæi oboritur; continuo illud quoque adjecit, esse illius interclusionis periculo belluones speciatim obnoxios, & mulieres uterum ferentes. Utrique enim hinc musculos abdominis præter modum extensos, reniti, inde vero aut ventriculum, & intestina, aut uterum sua plenitudine extorrum urgere, ut interceptis inter hanc pressionem, & illum renixum lymphaticis vasculis, proclive sit nobis intelligere, proximos aliquos ipsorum furculos retardata lymphæ, distendi aliquando adeo posse, ut diffiliant. Et sane in pluribus ex laudatis Observationibus legimus, accidisse cum hydropem complurium liberorum matribus, imo nonnullis paulo post abortum, vel partum difficilem, ut in Observatione Knifellii (q), quæ etiam statim, aut fere statim a partu, ut in Observationibus, si plane attinere huc credas, Dodonæi (r), & Chomelii (*). Verum ut gestationem uteri inter hujus hydropis causas facile admittimus; sic tamen intelligere haud possumus, cur hic morbus vix semel in aliis quam in feminis, sit observatus. Neque enim ea oranes gravidæ fuerant, & sterilis certe illa erat de qua Furstianus (j), imo non paucæ Virgines, ut historiæ monstrant

(p) Conf. 339. (q) Sect. cit. Obs. 12. §. 6. (r) Cent. 3. Obs. Med. d. (s) Obs. Med. Dec. 10. Caf. 7. cum Schol. (t) Obs. cit. 12. §. 2. (u) Sect. cit. Obs. 70. & 71. (x) Ibid. Obs. 20. §. 10. (y) Vid. infra n. 56. in fin. (z) n. 58. (a) Obs. cit. 12. §. 2. (b) Sect. cit. Obs. 70. & 71. (c) Ibid. Obs. 20. §. 10. (d) Ibid. Obs. 20. §. 10. (e) Ibid. Obs. 20. §. 10. (f) Ibid. Obs. 20. §. 10. (g) Ibid. Obs. 20. §. 10. (h) Ibid. Obs. 20. §. 10. (i) Ibid. Obs. 20. §. 10. (j) Ibid. Obs. 20. §. 10. (k) Ibid. Obs. 20. §. 10. (l) Ibid. Obs. 20. §. 10. (m) Ibid. Obs. 20. §. 10. (n) Ibid. Obs. 20. §. 10. (o) Ibid. Obs. 20. §. 10. (p) Ibid. Obs. 20. §. 10. (q) Ibid. Obs. 20. §. 10. (r) Ibid. Obs. 20. §. 10. (*) Ibid. Obs. 20. §. 10.

(r) (s) cit. supra ad n. 46. (t) n. 47. & 49. (u) Sect. hac. 21. Obs. 12. §. 1. & in Addit. Obs. 25. & 48. (x) apud Zeller. Diss. de vaf. lymph. admin. c. 1. n. 13. (y) c. supra ad n. 46. cit. (z) in cit. Addit. Obs. 81. (a) n. 49. in fin. (b) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1707. (c) Euh. N. C. Cent. 4. Obs. 162. (d) Euh. N. C. Cent. 4. Obs. 162. (e) Anat. du corp. hum. P. 1. r. 1. ch. 4. (f) A. N. C. Tom. 4. Obs. 32. & Tom. 5. in Obs. 68. (g) Euh. N. C. Cent. 4. Obs. 162. (h) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1728. (i) c. cit. (j) Euh. N. C. Cent. 4. Obs. 162. (k) Euh. N. C. Cent. 4. Obs. 162. (l) Ibid. Obs. 162. (m) Ibid. Obs. 162. (n) Ibid. Obs. 162. (o) Ibid. Obs. 162. (p) Ibid. Obs. 162. (q) Ibid. Obs. 162. (r) Ibid. Obs. 162. (*) Ibid. Obs. 162.

ex illo reliquum erat, inter duplicaturam peritonæi deprehendit, ubi & illius fontes, plures videlicet tubulos lymphaticos, cum nodulis glandulosos, qui limpidam pressi plo-
rabant, ostendit. Quæ fufius retuli propterea quia hoc illud unum hydropis peritonæi exemplum est quod hæcenus mihi quidem licuit in virili sexu reperire. Nam quod tibi in mentem venire fortasse posset casum legenti eximii Viri (a) cui post febrem cum Colica gravi, his declinantibus, intumuerat venter, detumuit autem cum sponte ruptus, jam antea prominens, umbilicus triginta & multo amplius libras puris veri, & foetidissimi, & deinceps quoque non paucum effudit, superstiti fistula umbilici cum duobus ad huius latus scirrhis quasi glandulosis; quod igitur suspicari fortasse posses, referendum esse casum hunc ad hydropem peritonæi; primum consideres velim, quam a tua suspitione discrepans opinio fuerit Medici longe peritissimi, quamquam problematis loco rem proposuit; tum deinde etiam in eandem sedem in qua ille hydrops sit, morbosa materia translata esset, aut, si mavis, ibi collecta: non hanc ferum ulla ex parte, sed pus omnino verum fuisse. Ego vero ne Gabriellii quidem (p) singularem in muliere Observationem ausus sum inter peritonæi hydropes supra connumerare; quamvis aquæ copiam prope incredibilem non in ventris cavo, sed inter peritonæum, & musculos fuisse, deprehenderit. Neque enim mihi ibi secreta videbatur, quæ nonnullis adhibitis medicamentis hydragogis tanta copia tri-
dui spatii deici potuerit, ut ventris tumor immanis prorsus subfunderet; quod in hac quidem hydropis specie non accideret, supra (q) dictum est. Et sane ei muliere cum hydrops ortus esset post levis inflammationem, id viscus unum ex omnibus male affectum inventum est, sinibus in eo nonnullis ulcerosis per interjectas membranas canaliculorum quandam constituentibus, per quem a liene serositas transmittitur inter peritonæum & musculos abdominis. Verum; ut ad signum redeamus subfidente umbilico, circumiectave proxime parte deductum; malum cum laudato Respingero (r), cuius quoque Observatio ei signo adversatur, malim, inquam, credere, cum propositum est, casus quosdam fuisse spectatos in quibus aut necdum progressus esset morbus, aut certe aqua pauca esset. Unde intelligas licet, tamen si huic signo ea quæ paulo ante objecta sunt, obijci non possent, inutile tamen ipsum fore, cum hydrops peritonæi ad umbilicalem regionem non se extenderet, itemque eo tempore ad illos alios conclusos hydropes, quippe inter musculos, & peritonæum minime sitos, ab hoc de quo loquimur, internoscendos. Quod & de aliis ejusdem signis veretur, quæ a Viris, cæteroque Doctissimis proponuntur. Sunt hæc. Si venter eandem fere conservat figuram, tamen si corporis situs mutetur. Si tumor peculiarem habet circumscriptionem. Si ventris est locus aliquis in quo, si altero latere percipiatur, nullus in opposito ictus, nulla fluctuatio percipiatur. Verum, ut ab hoc ultimo incipiam, & omittam, Nuckium (s) inter signa, aut certe inter bona signa morbi huius id posuisse, si fluctuatione fere nullam persentiat agrotans; Hoechstetterus (t) de agra sua in extremo Scholio adnotavit, magnam ventris molem sonitum quidem dedisse pulsam, tympani instar; fluctuationem autem aquæ nunquam fuisse perceptam, & Camerarius pater (u) ne in mortua quidem, cum ventrem nimirum & liberius licet contrahere, & validius percutere, visum esse quid potius humidi, quam solidi, continere, scripsit, nulla videlicet percipienda fluctuatione. Non proderit igitur hoc tertium signum, nisi ubi liceat fluctuationem animadvertere. Alterum autem, a peculiari tumoris circumscriptione petitur, juvare non poterit, cum hic hydrops abdomen totum distendat sic, ut venter satis equaliter tumidus sit, ut idem Camerarius loquitur, sive, ut Drelincurtius (x) vidit, equalis sit, non acuminatus, nullisque hinc inde monticulis extuberans. Cum vero certa regione tumorem circumscriptionem ostenderit; neque an ex hydrope is sit, & flex hydrope, an peritonæi, an earum de quibus Nuckius agebat, Partium, satis propterea apparebit, ubi tumor inferiora teneat: quamquam vel tubæ unius hydrops quam alte nonnunquam possit, lateque se extendere, plus satis ostendit illa Munnickii Observatio quæ in Bibliotheca Anatomica (y) edita est. Postremo quod ad primum illud signum attinet; utile erit fortasse cum aquæ peritonæo coercitæ minor adhuc erit copia. Sed cum hæc adeo increverit, ut venter, quemadmodum in Meekre-

nii (z) pictura vides, ad media femora, aut ad genua fere, sicut Helwigius (a) describit, propendeat, imo hinc crura, inde totum pectus, ut Palsinius (b) refert, operiat; tunc certe non est credibile, si mutetur corporis situs, ventris figuram non mutari. Cætera autem quæ adduntur, signa postquam aquaeducta a Chirurgo est, per specillum, per contractionem, per injectionem querenda, præterquam fera sunt, ejusmodi etiam sunt, ut morbum hunc ab ascite quidem, sed non ab aliis illis hydropis generibus fecernant.

60. Cave putes, quæ hæcenus examinata sunt, a me signa improbari. Casus enim dumtaxat excepi in quibus pleraque inutilia esse possint. Difficile autem accidet, ut plerisque in casibus inutilia sint omnia, præsertim si prima morbi tempora diligentius attendamus, & quæ tum rerum facies fuerit, accurate spectemus, ut puta si ab epigastrio tumor inceperit, aut si ab hypogastrio, immobilis tamen fuerit, dum cubans femina in alterum se converteret latus, neque stanti interni ad pubem ponderis sensum, aut mingendi difficultatem attulerit; quamquam progrediente etiam morbo, indicia esse possint unde certas Partes, exempli gratia uterum, infantes existimemus, ut si rite pergant menstrua respondere, aut ipsum, & tubas, & ovaria hydropico, aliove tumore non gravari, conjiciamus, ut si mulier nihil eorum sentiat quæ modo diximus. In summa laudandum eorum propositum, & ingenium est qui primi nobis tradiderunt morborum signa. Nostrarum tamen partium est, ut collatis pluribus quam ipsi potuerint, & morborum, & dissectionum historis, dispiciamus, quo signo tutius, & quando, quo autem fecus, nec sine erroris periculo uti possimus.

61. Sic etiam in huius hydropis, id est peritonæi, curatione; ut de hac quoque, uti promissimus, aliquid attingamus; quid melius a Tulpio (c), & Meekrenio (d) fieri potuit, quam ut paracentesim, a Walæo, & Costero, vivente muliere, commendatam, huius inspecta per anatomen morbi natura, & sede, adversus peritonæi hydropem unice laudarent? Scilicet hinc inutilia remedia cætera, inde autem illam videbant & expeditius, & tutius institui posse, quippe visceribus ab aqua penitus clausis, eoque integris, unde in hoc hydrope diutius servatus, ut diximus (e), corporis vigor cum actionum incommoditate, procul dubio est repetendus. Iisdem rationibus permoti cæteri & Medici, & Chirurgi in eandem sententiam iverunt, Nuckio (f) præsertim non dubitante, quin lymphæ ductus disrupti, iterum claudantur postquameducta aqua, inter se contrahentes abdominis musculos, & peritonæi laminas comprimuntur, quod in ascite, si ab ruptis valis lymphaticis ortus sit, minime habet locum, & absolutas hac ratione duas hydropis peritonæi curationes producente, Amici unam, alteram, quam attinere huc censuit, ex Thoma Bartholino; ad quas alias porro addidisset, si tunc extitissent, ut quam Cl. Degnerus (g) in dextera inferiore abdominis parte, & vel magis quam in abdomine universo, laudato Brehmio (h) referente, ipsa per se natura perficit, clara in illo casu aqua, in hoc autem fero limpidio, & inodoro profuso. Sed posteaquam animadversum est, non ita semper habere se peritonæi saccum, ut fuit a Tulpio, & Meekrenio conspectus, sed tumoribus, abscessibus, ulceribus ita affici aliquando, ut detrahi quidem aqua possit, at non propterea ejus, & puris scaturigines flectari, & hanc ob causam Matronam de qua Littrius (i), & mulierculam de qua scribit Laubius (k), servari non potuisse, licet illi intra biennium tredecies, huic intra decem menses sexdecies aquaeducta sit, ut summa in hac fuerit librarum ultra septingentas viginti, tum vero non ita expedita semper, & secuta, ut a primo, hæc curandi ratio jure meritoque visa est. Quod tanto magis tibi visum iri, non dubito, quanto plures, ex superioribus etiam temporibus, a ræ Observationes productæ sunt, in quibus illa peritonæi vitia non defuere. Itaque præter eas feminas, quas dumtaxat exceperat Tulpus, quarum vires jam fractæ sint, & quas poltea, ob causas varias quidem excluserat Nuckius, sed fere omnes ad idem caput referendas, bene sapienterque alias insuper addidit Littrius, admonens, quanto cum metu infelicis exitus curandas suscipiamus eas in quibus non modo inveteratus valde sit morbus, & valde extensus, verum etiam in quibus detracta aqua crassa, & graveolens sit, & pravi coloris, & in quibus tumor aliquis, aut durities, emissæ videlicet aqua

aqua, in parte aliqua percipiatur sacci peritonæi. Quod signum poltea in Laubii femina manifestum fuit, nec non aliud, huc adjuvandum, scilicet puncto dextro latere, nihil nisi pus effluxisse, dum ex altero, compuncto eodem tempore, aqua profusebat. Verum signa hæc ultima ad præcognoscendum exitum spectant, non suscipiendæ, sed susceptæ jam curationis.

62. At priusquam a te suscipiatur, exquiras diligenter, velim, num durities, aut tumor aliquis antea fuerit, quem nunc magna diffentio abdominis occultet; præterea num dolor, non eum dico quem illa ipsa diffentio parit, sed ulcerosus, testis erosionis, agram torqueat, aut certe aliqua in parte arctius a te contrahatur abdominis excitetur. Non me fugit, quam feliciter in magna etiam suppuratione, & certa erosione, utraque tamen recent, Chomelio (l) res successerit, nec quid Littrius (m) adversus hæc ulcera primum injiciendo, deinde scite comprimendo, vinciendoque, imo etiam adversus tumores, de super incidendo, & curando proponat. Scio quoque, levandi, non sanandi causa, ubi tumores, & pus essent, a Laubio (n) aquam fuisseeductam. Verum hic mihi tecum fermo est non de inchoatis ab natura, aut ab arte curationibus persequendis, sed de libere, nec sine iusta persanandi spe suscipiendis, igitur hæc etiam quas modo addebam, aggas, cum poteris, vitabis. At sunt præterea in quibus tumores a diffentio abdomine haud proflus occultantur, sive quod minor adhuc aquæ copia sit, ut in altera ex iis quas ipse produxi (o), Observationibus, sive etiam quod humor, aut materia quævis alia, crassior non perpetuo quodam sacco, sed in plures cavas dispersita, contineatur sic ut alia illa magis turgente, alia minus, quales in mortuæ Obstericis dissectione ostendit Camerarius Filius (p), qui prudenter paracentesim, ab alio commendatam, instituire noluerat propterea quia inaequalem abdominis molem, & diversum diversarum regionum venisum animadverterat. Quid enim in hoc casu aut in illo etiam quem Gahrlepius (q) descriperat, paracentesis facere potuisset? Materia enim sive glutinis, sive spermatis ranarum similis per amplius infictum vulnus, non modo per consuetum foramen, haud effluit; & si tenuis, imo tenuissima etiam sit; ubi multis, ut in utraque illa Observatione, interseptis discluditur, tamen ex una quam perforaveris, cavea exeat, non propterea ex reliquis prodit, ideoque hic accidat necesse est, quod in ascite contingere diximus (r) quando is ex hydatidibus sit, etiam connexis inter se. Quem casum cum inter varia ascitis genera videam referri; nolui saccatum hunc, ut Observatores appellaverint, hydropem hoc loco prætermittere. Nam et si materia, & interseptis discrepat ab hydrope frequentiori peritonæi; huic tamen innascitur, nec quod rarior sit, idcirco a nobis omitti, imo vel propterea commemorari debuit, ne si quando forte occurrat, temere iterum cum ascite, aut cum altero magis noto peritonæi hydrope confundatur.

63. Quin juvat alios quoque, saccatos pariter distos, hydropes, antequam finem scribendi faciam, commemorare. Quidam sunt ab iis qui proponunt, sic vocati, qui tamen ad frequentiore attinent hydropem peritonæi, velut is de quo Dissertationem edidit Cl. Schefflerus (s), idem quod ego, censens (t), quippe ingenti illa feri copia intra duplicaturam peritonæi collecta, saccumque sic efformante, cui magnum adnatum erat steatoma. Alii vero differunt, ut quem describit Cl. Anhornius (u) incredibili propemodum humoris vi inter peritonæum, & crassius durumque factum omentum conclusa in ea cui facies pro corpore emaciatisimo colorator & pedes tumoris expertes: cujusmodi signa, ut alia quoque, subinde non omittam, ut possis cum meis superioribus dubitationibus (x) conferre. Sic quoque junior Verneyus (y) feminam annos ad triginta natam, cui venter ante septem jam annos tumere ceperat, bono colore, appetitu, somno, & satis adhuc ad agendum expedita fuisse, refert, cujus, post feri alias alias naturæ educationem mortuæ aperto ventre, magnum saccum vidit, plures cellulas continentem, inter se minime communicantes, quarum singulæ materiam peculiarem, ab aliisque diversam concludebant. Idemque afficitam secuit, cujus in ventre ingentem præterea cystam deprehendit, fero subrubro Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

plenam. Sunt & hydropes saccati qui ad hos alteros, an ad primos illos attineant, ex anatomica descriptione haud satis liquet, ut perfectis quæ de sacco scribuntur, in Virgine quadam (z) inspecto citissima post emissam aquam morte abrepta, facile existimabis.

64. Et quamvis Epistola proxima quæpiam de Ovariorum Hydrope scripturus sim; tamen quoniam & ipse inter saccatos hydropes refertur; hic potius; ne ibi forte sim aut rursus æquo longior, aut minus perspicuus; attingam illa quæ facile cum iis conjungas quæ antea (a) de eodem morbo interjicere opus fuit. Sunt & huius alia Observationes certæ, alia dubiæ. Proferamus utriusque generis exempla, quæ addere possis ad Sepulchretum. Inter certas igitur incipientis, aut parum progressi hujusce hydropis Observationes extant habitæ a Camerario filio (b), a Goetzio (c), & a Maggio, ac Dodio (d). Primus humorem inesse ovario comperit ad uncias quatuor, alter ad libras tres, ultimi ad libras tres & semis, iidemque; nam duo primi nihil signorum huc pertinentium quod adnotarent, acceperant; sciscitandocompererunt, sæpe feminam de pondere quæstam esse quod in imo ventre sic percipiebatur, ut quod in latus cubaret, ei lateri pondus incumbere; si in alterum se converteret, in hoc pondus transferretur. Sed & illæ de quibus Riedlinus (e), Vacherius (f), Schacherus (g) scripserunt, postquam singulis ovarium, & venter jam mirum in modum excreverant, narrabant tamen prima quidem abdomen sinistro latere tumere cepisse, quo tempore nihilominus & conceperat, & feliciter pepererat, alacris vel extremo in morbo, & robusta, quippe quæ præter ventris tumorem, quod sibi molestem esset, haberet omnino nihil: secunda, sibi primum omnium ante sex septemve annos hypogastrium a sinistro doluisse: tertia ante annos aliquot initium sibi malorum dolorem ventris fuisse quem verbis explicare nesciret, deinde paulatim crescente tumore, huius pondus in id latus in quod corporis situs requirebat, labi consuevisse. Hæc duæ, sicut & prima, nihil levaminis fenerant a cujusquodamodi medicamentis: sed non, ut prima, parum tulerant molestiarum, postremo præsertim tempore, cum requiem capere in lecto nequirent, nisi genibus flexis innixæ, & corpore antrorsum inclinato, caput substratæ culcitæ imponerent: cujusmodi quadantenus positum in sua quoque femina ad requiem capiendam necessarium adnotavit Schefflerus (h): ea autem peritonæi, tres vero de quibus loquimur, sinistri ovarii hydrope laborabant, quod in tertia hic illic dehiscens, ascitem insuper sibi adjunxerat non secus ac in Vidua illa accidit, quæ a Cl. Baffio (i), & in femina alia quæ a Cl. Gutermanno (k) descripta est. Feliciores in hoc ovarii tumore, quamvis ad summum aucto, fuerunt alia, ut Virgo quam Cl. Gullmannus (l) refert quindecim nihilominus annos garisam esse sanitate integra; nam menstrua erant regularia; appetitus, somnus &c. vigeant; nisi quod ultimis duobus annis sapius lithotymus corripiebatur: itemque ut femina duæ quas dissecuit Jo. David Mauchartus (m). Hæc quomodo se habuerint ultra septennium quo, si postremas fere excipias hebdomadas, nunquam decumbere coactæ sunt, ex verbis, quæ præmittit Observationi licet conicere: Quæ hydropicæ, nec pallent, sed roseum potius genarum servant decorem, nec pedes habent tumidos, ut potius, aucto licet in dies abdomine, gracilescant cum reliquis artubus, & corpore; hæc, si diu absque notabili actionum læsione, facinam hanc circumferant, appetitum habeant bonum, non admodum sitiant, nec tussiant, alvus autem faciat officium, urina naturalis sit, & moles abdominis nec purgantibus, nec diureticis obediat, & præcipue malum a partu difficili, puerperio infelici, molæ gestatione, aut abortu ducat originem, nec signa cachexiæ concurrent, hydropes ovarii seu saccato vel cystico dicto, semper tenentur. Sed his verbis Præstantissimi Viri; si ita accipiantur, quasi de nullo alio, nisi ovarii, hydrope scripta existimemus, adversari, intelligis quæ de nonnullis aliis tum supra (n) ostensa sunt, tum infra ostenduntur. Porro quod ad signa attinet illius hydropis, Præcl. Treuius (o) ubi suam ejus Observationem proponit, fuisse, ait, inter illos qui viventis femina abdomen examinarunt, alios qui hydropem saccatum subesse, pronuntiarent, alios

(a) Commenc. Litter. A. 1733. Hebd. 37. n. 2. (p) Eph. N. C. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 279. (q) n. 58. in fin.
(r) (f) cit. ad n. 50. (s) ad n. 47. (u) (x) ad n. 50. (y) Tom. I. in Adnot. ad Graef. de Mulier. Org. ubi de Ovidio.
(z) cit. ad n. 47. (a) (b) ad n. 50. (c) (d) cit. ad n. 49. (e) n. 58. (f) cit. ad n. 50.
(g) Act. N. C. Tom. 3. Obs. 2. (h) Vid. 1872, n. 59. (i) (k) cit. ad n. 50.

(l) (m) ad n. 50. (n) n. 52. (p) Act. N. C. Tom. I. Obs. 160. (q) cit. ad n. 50. (r) n. 45.
(s) Hist. Hydr. Saccat. (t) §. 4. (u) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 100. n. 7. (x) n. 37.
(y) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1703. (z) Eph. N. C. Cent. 7. Obs. 17. (a) n. 58. n. 59.
(b) in Obs. 160. cit. supra ad n. 61. (c) Act. N. C. Tom. 3. Obs. 207. (d) apud Vallinier. Hist. della Generazione P. 3. c. 5. & Tab. 12.
(e) Eph. N. C. Cent. 7. Obs. 56. (f) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1739. Obs. Anat. 3.
(g) Dissert. de Virgine Affecta §. 10. 12. & 13. (h) cit. n. 63. (i) Dec. 4. Obs. Anat. 8. (k) Act. N. C. Tom. 3. Obs. 103.
(l) Eorund. T. 2. Obs. 80. (m) Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 14. (n) n. 58. 59. (o) Commenc. Litter. A. 1734. Hebd. 44.

teriz pondere aut comprimente, aut deorsum trahente; ne de acri ejusdem exhalatione quidquam dicamus, fuisse dolorem excitatum.

8. Nobis vero est minime necesse est omnia quæ Marcellum sensisse, diximus, probare; illud tamen negari posse non videtur, *alvi torminibus*; hac enim voce usus est Benivenius; intestinorum potius dolores, quam mesenterii, designari, aut scilicet forte id dubium sit quia mox verba hæc adduntur, *omnia viscera sana videbantur, jecur, lien & intestina omnia nullam doloris notam ostendebant*: at certe aliis, quas memoravimus, historiis diserte scribi *dolores Colicis similes*, aut *Colicam*. Et ne forte putes, hæc tantum contingere, cum abscessus est; Platerum (a) lege, & Whartonum (b), qui *Colicis dolores* in iis adnotant, in quorum mesenterio ille tumores glandulosos, & duos invenit, non uno in loco intestinis adeo connatis, ut hæc coarctando, impedirent excrementorum descensum, hic vero tumorem unum, sed tantum, ut in alterum latus intestina detruderet, eumque glandulosum & carneum magis quam humoralem. Quod si in Valsalva (c), & aliorum quas supra (d) attuli, Observationibus, a tumoribus hujus generis ii dolores induti non memorantur; in aliis credibile est, intestina æque compressa non fuisse; in aliis autem non æque aut acres, aut multas faeces habuisse: quod ultimum de muliere præsertim credes, cujus mesenterium, aut apud Coiterum (e) videbis, erat quidem *multis, iisque satis magnis scirrhosis conflatum*, ipsa autem vix aliquid poterat velliquidum deglutire. Sic alias aliquas, si non easdem, subfuisse causas etiam in quibusdam mesenterii abscessibus, dices; neque enim omnes legimus cum doloribus conjunctos, Cruciatus quidem apud eundem Auctorem (f) memorantur in magni abscessus descriptione; sed qui ad reddendæ urinæ difficultatem, & ad alia quæ proponuntur, incommoda referri possunt, cum de ventris, & intestinorum doloribus nulla mentio injiciatur. Quin Donatus (g) Observationem profert suam non mediocri abscessu, ut multat ostendebat sanguinolenta & purulenta dejecta materia, & ulcus fordidum ad spithamæ longitudinem in mesenterio relictum, cum tamen in longa ægrotatione nulla unquam, nisi extrema die, audita esset de dolore querela. Sed multo quam cæteræ, mirabilior est Hearnii historia, quam in Sectione hæc XXI. Sepulchreti (h) habes. In ea cum reliqua describantur, ne unum quidem verbum est de ventris dolore. Quæ res non tam mira est propter duodecim, aut eo amplius libras materia fluida quæ in triplici tumore erat, quam propter universi tumoris pondus, libras æquans Suecicas quinquaginta quinque, & sedem quæ totum fere mesenterii spatium erat. Huc illud accedit quod tumor intestinis arcte annexebatur, ut a Duodeno ad Ileum medium, quasi cum his in unum coivisset, sine ruptione separari non posset, & quod ægri desiderio, quippe assiduo, & ferme canino appetitu affecti, vix sufficiebat assumptorum copia: ut neque pauca hic recrementa, neque intestina non compressa liceat ponere, sed omnino alia quæpiam causa sit ab eo excogitanda qui rationem velit reddere absentium dolorum, id quod infra (i) facere conabimur. Nunc enim alia in quibus non aberant, Observationes sunt indicandæ, quas Sepulchreti (m) est, qui post ventris tormina mesenterium totum *sciatomatosum*, nec sine ingenti abscessu; at simul intestina arcte invicem coherentia proponit. Tertia Laubii (n) est in eo qui ventris doloribus valde molestis confectus, tubercula in mesenterio quidem habuit; sed & intestina similibus plurimis abscessibus *sciatomatosi* scatebant. Contra in nobilissimo Comite mesenterium totum pinguedine multa scirrhosa sebacea oblitum, & *tormina* tamen *desuissæ*, adnotavit Goekelius (o). Itaque, ut concludam; in productis non Veterum modo, sed & Recentiorum Observationibus aut dolor non legitur cum tumore mesenterii conjunctus; aut si legitur, non in mesenterio potius ipso, quam in intestinis fuisse, constat. Minusque constat in Jo. Sculteri historia, quæ in Sepulchreto (p) etiam extat; neque enim satis apparet, ventris crucia-

tus extra intestina fuisse: & si appareret, cum acerrima, quæ in sex mesenterii tumoribus fuit, materia omnes lumborum vertebrae multum dicatur corrodere; non desset Observationes cæteras attendentibus altera extra mesenterium aut dolorum, aut originis dolorum sedes: ut certe non deset in eo quod sequitur, exemplo.

9. MULIEREM annorum duodeviginti dolores in ventre, cum levi interdum febricula conjuncti, per quadriennium vexaverant: tandem sæviores facti, e vivis sustulerunt. CADAVERIS Abdomen nullam exterius tensionem, quæ in vivente circa umbilicalem regionem fuerat, jam ostendebat. Ad mesenterii tamen centrum duo erant tumores. Quorum alter ovi anserini magnitudine, renem versus dexterum vergebat, intus exulceratus, nihil tamen continens purulentum: alter vero multo erat major. Nam & ad sinistram pergebat renem, sic inter hujus exteriorem, interiorumque tunica in sinuans, ut renem totum contegeret, nec nisi summo cum labore ab eodem posset evelli: & ad os usque pubis ejusdem lateris se extendebat, crassitudine quibusdam in locis duos, in aliis tres digitos æquans. Hic primo aspectu concretum sanguinem referebat. Sed totus firmis, datus a peritonæo, membranis veliebatur: ex substantia autem constabat, multis in locis fibrarum carnearum simillima, nisi quod hic erant infectæ colore atro, & alibi laxæ adeo erant, ut concretus sanguis videretur.

10. Si, ut suspicor, ita pro certo haberem, a Valsalva etiam tumorem adolescentem habitum esse diffinitionem; facile in tumore hoc altero aneurysma aliquod descripi crederem. Sed ut nihil aliud fuerit, quam quod tunc ipsi visum est, unus videlicet ex iis de quibus hic agitur, mesenterii tumor; certe ad pubem usque, & ad dexterum operiendum renem extendere se non potuit, quin urgeret, comprimeretque intestina, nec inter renis illius tunicas se insinuare, & ad harum propriam, renemque ipsum arcte adeo se affigere quin longas gravesque crearet molestias, quæ tamen ad eam sedem attineant; tamen quam sæpe ad intestina se extendant, utque horum potius, quam renis, dolores haud raro esse videantur, minime ignoras. Interea nolim credas, eam mihi sententiam esse, ut nullus esse possit mesenterii tumor qui sedes ipse doloris sit: tantum velim, non aliter accipias omnia quæ a me hæcenus producta sunt, atque animadvertas, quam ut scias, nullam esse ex tot Observationibus unde liquido appareat, in tumore ipso dolorem fuisse.

11. Quod sane mirum est five nervorum mesenterii copiam species, five ejus glandularum officium. In mammis enim longe minor proportionem inest nervorum numerus: quarum glandulæ tumores si cruciatum ideo acerbissimum afferrent, quod chylus crudus, ad accorem concipiens aptus, in alias partes glandulosas ita crude & copiose, ut in mammis, concurrere non potest; sane multo magis in mesenterii tumoribus dolor faveret (cujus glandulas, cum illa scripsit, non videtur attendisse Vir Doctus) quippe in quod chylus confluit & omnis, & multo crudior. Dilui in mesenterio lympham, dices, eoque progredi ulterius, non, ut in mammis, immorari; nisi tumor ipse incipiens & lymphæ, & chylus remoram faceret, mox illam, nimirum tenuiorem, præterlabi sineret, chylum retineret. An igitur dolor, cum ad mesenterium attineat, in intestinis videtur, nervis qui ad hæc tendunt, compunctis, non secus atque in amputato jam pede? An humor qui possit compungere, non omnibus inest mesenterii tumoribus? An quibusdam horum inest humor qui nervorum sensum, laxando, haberet? An interdum tumorum duritie intercepti nervi haud aliter atque ab injecto vinculo, sentiendi muneri impares sunt? Sed hoc posito, illud postea non intelliges, quomodo Laubius (g) circa umbilicum tormina adnotavit, cum abscessus *sciatomatosus pugnæ virilis magnitudinem superans, durus, compactus in parte postica mesenterii, ubi vertebrae lumbæ annectitur, situs, vasa majora illius loci circumdaret*. Sic enim videtur impositos iis vasis nervos, mesenterium, & intestina adituros, interceptare, & premere debuisse. Fac igitur aliud aliquod ad id excogites, cætera autem quæ modo attigi, dispicias, aliudque ad alias Observationes accommodes. Quarum nullam, earum quidem quas nos attendimus, sic explicare te posse, credas, ut Bierlingius (r) indicavit, qui per tot secula tot Auctores decipios, si non semper, at multoties, censebat, dum magna illius in centro mesenterii glandulæ verum usum, & chyli

chyli receptaculum ignorantes, ex hoc post mortem chylis etiam tum repleto, & dissecto *plerumque abscessum mesenterii fecissent*; quasi aut abscessus quos plerique proposuere, non longe alio ac chylus est, humore pleni describerentur, aut magna illa glandula ut in quadrupedum genere, sic etiam esset in humano. Mitto aliam haud raro quorundam abscessuum & tumorum sedem, & plerorumque aut numerum, aut magnitudinem vel in vivis animadvertam. Nec quod Cl. Hallerus (s) existimat, *aliquando magnas quidem, sed ex recepta in junioribus lege glandularum conglobatarum, mesenterii glandulas promorbosis habitas esse, cum essent sanissimæ, inficias ibo*. Sed cum aut multo majores sunt quam ea lex requirit, aut duriores; non est certe huic suspicioni locus, ut puta in illa pueri, quam ex Benivenio produximus (t) diffinitione. Hic enim *callum* non appellasset, neque eo dixisset *venas meseraicas obstructas omnes fuisse*, nisi tumorem inter illas venas reperisset tum durum, tum satis amplum. Cæterum quod ad duritiem attinet, varia in his tumoribus spectanda est tum natura, tum ætas. Quam hæc illa ad steatoma accedit, ex productis plerique Observationibus animadvertere potuisti. Et alias tamen est longe alia. Vide, exempli causa, Themata illa Medica egregii Anatomici Salomonis Alberti, quæ cum tribus ejus Orationibus edita sunt, ad Morbos Mesenterii, & Pancreatis spectantia. Cum alia in-enies, quibus nonnulla confirmantur quæ supra (u) scripsimus, tum hæc præsertim: *Humores in mesenterio putrentes, nonnunquam ipsum in tumorem attollere, laxum primum mollemque illum, processu temporis vero humoribus sensim siccescentibus, adeo durum tactuique venientem, ut in partibus ad umbilicum & immo ventrem attinentibus, vel os, vel calculum concrescisse putes*. Alias vero contra accidit, ut quæ erant dura, putrescendo remollescant. Quo, inter cæteras, Observatio etiam pertinet Andrea Velsphali (x), qui cum in ægræ ventre, maxime autem circa umbilicum deprehendisset tumores duos multos, qui demum transitu temporis emollescebant; in mortua glandulas mesenterii pleræque exulceratas offendit, alias vero adhuc induratas. Sed jam de iis qui ad infimam Ventris partem attinent, tumoribus videamus.

12. FEMINA quadraginta annos nata, olim ex abortione sævus ferme quinquemestris, duritiem quandam circa uterum cepit animadvertere, ibidemque pungente dolore, levi quidem, sed assiduo, tentari. Aliquoties febricitavit. Tumor interea excrevit, sic tamen, ut esset mobilis; nam modo in medio, modo ad latera percipiebatur. Multum capite dolebat: cum labore alvum exonerabat: vomitus interdum molestus erat: dolor autem in tumore adeo aliquando exercebatur, præsertim cum ab animi ægritudinibus augebatur, ut ardentem febrem accenderet, ferique vix posset. Hæc quæ dicta sunt, intra decennium contigere: quo tempore nunquam concepit. Denique immobilis factus tumor, & dolore: ac febre acutiore sævientibus, e vivis excessit. VENTRE adaptato, tumoris ingens moles a Valsalva comperta est, ut prae grande hominis æquaret caput. Erat in posteriore uteri pariete, Rectum intestinum vehementer premens, & circumjectis partibus arcte alligata. Carnosa exterius colore quidem videbatur; sed substantia firmior erat; intraque hanc sinuosas caveas continebat duas, quarum parietes carnem putridam referebant. Altera inanis erat; in altera serosa materia concludebatur. Ovariorum quoque sedem hic tumor occupabat. Itaque nullum eorum vestigium inventum est, nisi quod ad tumoris latera vesiculæ sero turgidæ conspiciuntur, quarum nonnullæ ovo columbino erant pares. Collecta ex iis feri pars igni imposita est, pars affusis acidis fuccis admista. Neutra ullo modo concrevit.

13. Nulla eget hic casus expositione: adeo quæ in mortua reperta sunt, iis evidenter respondent, quæ in vivente fuerant animadverta. Scilicet abortionem consecuta durities, & dolor, & manifestus demum tumor, & horum sedes, & nulla intra decennium, quamvis florenter ætate, conceptio, satis uteri tumorem significabant: nec dolor capitis, vomitus, & cruciatuum in tumente parte ab animi præsertim tristibus affectibus incrementum alio pertinebant: cruciatuum autem acerbitas, & febres pravam tumoris naturam indicabant, ut exonerandæ alvi potius, quam vesicæ, difficultas cui potissimum inside-

ret uteri parti. Unum erat, si Arantium (y) audires, quod non satis conveniens videri posset. Is enim cum proferret notas per quas a mesenterii tumoribus uteri tumores discernamus, hi *dolent*, inquit, *æquales, ovaliforma præditi sunt, neque loco prorsus moventur*. Noster diu mobilis fuit, multo diutius, & semper fortasse futurus, nisi arcte se demum ad proximas partes alligasset. An igitur in ejusmodi dumtaxat prægrandes jam factos, & alligatos uteri tumores Arantius inciderat? an verbis usus est, quæ magis fortasse quam in animo haberet, immobiles tumores hocce significare videantur? Utunque id est; longe facilius erat in proposita historia, quam in ea quæ proxime sequitur, ante dissectionem intelligere, quæ pars in imo ventris tumorem faceret: nam hoc tamen sagacitatem Valsalvæ fugit, quemadmodum protinus cognoscas.

14. MULIER gracilis, annorum circiter quadraginta, cum hysterica affectioni multum esset obnoxia, ejusque præsertim gravioribus paroxysmis, qui convulsivis motibus universum corpus, præcipue autem ventris viscera concutiebant, cumque nonnullis tandem cæterorum gravissimos passa esset; animadvertere cepit manifestam quandam cum in epigastrica regione depressionem, tum in hypogastrica exuberationem. Illa nunquam mutabatur; hæc sæpe intra unum diem. Nam majorem, & prædurum tumorem cum ostenderet; sæpenumero hic repente concidebat. Item cum alimenta sumebatur; hæc eodem usque præcipitari mulier sentiebat, eaque pars inde magis attollebatur, graviorque fiebat ponderis sensus, qui semper ibidem erat: interjectis autem quatuor, aut quinque horis, dolores acerbissimi, & tormina, & animi defectiones excitabantur. Egra sæpe querebatur, sibi omnia viscera; sic enim ajebat; e suis sedibus esse prolapsa. Cognitiones manifeste vitiatas habebat: febricitabat: erat valde emaciata. Cum tres menses sic, ut diximus, affecta vixisset; decessit. IN CADAVERE id inventum est quod Valsalva in consilio prædixerat, ventriculus ad hypogastrium prolapsus, vix ut quatuor transversii digiti inter ipsum, pubemque intercederet. Hic autem alium habebat positum ac Editores *Bibliothecæ Anatomicae* (z) ex quadam Virgine repræsentantur. Pars enim illa ventriculi quæ gulæ respondet, hic usque adeo in longum producta erat, ut fundus totus esset in hypogastrio.

15. Rara quidem hæc diagnosi Valsalvæ fuit; sed non minus rara Observatio. Ut ab hac incipiam; animadvertas, velim, multifariam esse posse ventriculum in hypogastrio. Aliquando enim ea est amplitudine, ut in muliere quam in Nosocomio hoc secui circa medium Decembrem A. 1717. ventriculi fundum non magis ab osse pubis distare, quam in femina modo proposita, viderim, & iis qui aderam, ostenderim tanto id magis admirantibus, quia ventriculus erat inanis. Cum enim aut flatibus, aut humoribus inclusis præter omnem modum distenditur, posse eo pervenire, ut feminae aut pro jam diu prægnantibus, aut pro acitibus habeantur, notum est ex Observationibus Moinehenii (a) in primis, & Jodonii (b), quorum hic ventriculum per medium dissectum invenit *ulnam Parisiensem superare*, ille vero in Theatro hoc nostro vidit *totam abdominis regionem occupare, ipsaque intestina cooperire*. Quam extensum quoque in eo Cl. Widmannus (c) deprehenderit, qui vix credibili panis, nec minori cerevitæ copia se quotidie implere consueverat, illius ostendit descriptio. Interdum vero non propter auctam magnitudinem, ut regiones alias ventris, sic hypogastrium quoque, sui aliqua parte occupat; sed iustum servans magnitudinis modum, aut altero extremo, ut puta dextero, quemadmodum in memorato (d) exemplo *Bibliothecæ Anatomicae*, quo & Meryi (e) alterum addas licet; aut totus deorsum ruit. Ruere autem potest aut ad inferiora tractus, aut eo compulsum. Trahebatur in Valsalvi (f) ægro a gravissimi omenti pondere ita deorsum ex sua sede, ut ipsum ventriculi munus deficeret, ortisque singultibus mors ingrueret. Trahebatur quoque a Tenuibus intestinis pene omnibus, ut in illa Meryi Observatione, in scrotum devolutis, aut in prælongum alterum saccum, ut in alia Chr. Henrici Papen (g). Deorsum autem compellebatur in aliis corporibus a Valsalva (h), aut a me (i) dissectis, urgente aut depresso diaphragmate, aut prægrandi jecinore: cujus ultimi generis præsertim sunt duæ Observationes Fantoni patris (k): quæ

(a) Sepulchr. Obs. 30. cit. §. 11. (b) Adenog. c. 11. (c) n. 2. & 3. (d) n. 7. (e) Obs. Anat. (f) Ibid. (g) c. 7. paulo ante cit. (h) Obs. 36. §. 1. (i) n. 11. (k) Eph. N. C. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 158. (l) n. 2. (m) Aft. N. C. Tom. 1. Obs. 87. (n) Eorund. Tom. 2. Obs. 108. part. 2. (o) Eph. N. C. Cent. 6. Obs. 94. (p) l. 3. §. 14. Obs. 30. §. 12. (q) Aft. N. C. Tom. 2. Obs. 108. (r) Eph. N. C. Dec. 1. A. 2. Obs. 134.

(s) not. 2. ad §. 128. Prælect. Boeth. in Instit. (t) n. 7. (u) n. 4. & 7. (v) Dissert. de part. intest. Jejunii & cæc. c. 3. §. 60. (g) c. 44. supra ad n. 7. cit. (e) Part. 1. ad Giffon. Tract. de Ventr. & Intest. c. 2. (a) (b) Sepulchr. Sect. hac 21. Obs. 42. & 48. (c) Aft. N. C. Tom. 2. Obs. 169. (d) n. 14. in fin. (e) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1701. Obs. 5. (f) De corp. hum. fabr. l. 5. c. 4. (g) Epist. de Hern. Dorial. (h) Epist. 17. n. 25. (i) Epist. 24. n. 24. (k) Obs. Med. Anat. 5. & 24.

quæ omnia exempla hic commemoro, ut generatim indicem depressionis causas; non quod revera in hypogastrium usque detrusus esset ventriculus. In hypogastrio quidem ab Ruyfchio (1) conspectus est, cum mulieris ab asthma mortuæ cadaver incidere. Sed neque causa indicatur, cur ipse cum intestinis, loco suo naturali relicto, hypogastrium occupasset, nec quæ inusitata huic sedi incommoda in vivente responderent: quas ob causas sciens omitto alias, minoris præsertim, descensus Observationes. Quæ autem nuper adnotavit Cl. Vir Molinellius (m), ad conjunctum potius morbum alterum, ut opinor, attingebant, videlicet ad ingentem, durumque tumorem, initium prorsus occultentem Duodeni intestini, unde non solum difficillimus, ac diuturnus omnium vomitus, & macies summa, & ictericus color, verum etiam ventriculi repeti potest magnitudo illa tanta, ut ad regionem usque pubis descenderet & hypogastrium occuparet fere totum, ut & œsophagi iusto major longitudo, & quod consequitur, ventriculi prolapsus. Namque ut obilius tumoris pondus annexus pylorus depressior erat, sic ob viæ ab hoc ad intestina occlusionem, cibi, potionesque tum diutius immorandæ, ventriculum amplificaverant, tum denique sæpius irritando, & in violentas contractiones, quod difficillima vomitu indicabat, adigendo, connexum cum altero orificio œsophagum distraherant, & longiorem fecerant; ut in hoc casu ad ventriculi magnitudinem prolapsus accesserit, isque a causis deorsum non compellentibus, sed trahentibus. Nunc Valsalvæ Observatio, si cum his omnibus Observationibus conferatur, quam rara fuerit apparebit.

16. Valsalva igitur non partem ventriculi aut ob ætiam magnitudinem, aut ob mutatum alterius extremi situm, sed totum fundum in hypogastrio, non in regione umbilicali, deprehendit. Convulsiones viscerum quæ ventre continentur, gravissime huc illum detraxerant, eam partem extenuando, eoque longiorem efficiendo, quæ gulæ continuatur. Nam etsi Molinellius (n) gulam ipsam factam longiorem vidit, Fantonus autem pater in prima (o) de duabus quas commemoravi, Observationibus crebras adnotavit aggrantis querelas de lingua quæ sibi basim versus retrahi videbatur, indicio haud obscuro, ut Filius Doctissimus interpretatus est (p), deorsum trahi productique œsophagi, nec facile tantæ longitudinis quam Valsalva conspexit, pars aliqua raptò ad inferiora œsophagi neganda est; tamen quando illam ipse agnovit ad ventriculi attinere, inficiari non decet, huic multo maxima ex parte fuisse tribuendam. Quod nisi ob hæc quæ modo animadverta sunt a nobis, discrimina singularis esset inter cæteras Valsalvæ Observatio; certe ob illud esset, quod cum in cæteris simul aliæ quæ pessime affeclæ erant ventris Partes, ut omentum, jecur, ren alter, pancreas, Duodenum, aliudve intestinum, & ne ventriculi ipsius noxas alias omitteremus, aut pylorus pene obstructus, aut parietes omnes maxime laxati; in Valsalvæ Observatione nihil horum, sed, dempta illa supræ ventriculi partis productione, quidquid erat vitii, in hujus prolapsu visceris consistebat; ut ad peculiaris hujus morbi addiscenda signa facta esse videatur. Quæ sane ita in ea expressa, & perspicua sunt, ut difficultas quæ major a nobis in hoc fuisse, quam in dignoscendo tumore uteri, dicta est (q), non ex indiciorum obscura significatione, sed ex indicati morbi raritate sit æstimanda. Verum nec raritas ipsa potest sagacitati eorum obtare qui solet signa inquirere sciant, atque perpendere, quippe in sectionibus, ut Valsalva erat, ac in operationum atque utilitatum internarum Partium inventionibus exercitati: quæ duo Galenus (r), postquam docuerat, quemadmodum ipse cuiusdam ventriculum parvum, & rotundum, alterius autem vesicam parvam, & prominentem, aliæque his obscuriora cognovisset, in Medicis qui facultatem dignoscendi talia consequi cuperent, omnino requirebat.

17. Idem tamen paulo ante (s) docuerat, quæ intra corpus sunt, non omnia posse cognosci, & (t) quæ sub sensum non cadunt, ea tentare oportere quam maxime fieri potest, si non certissima scientia, artificiosa saltem conjectura comprehendere: cumque hæc quæ retulimus, omnia de iis internis constitutionibus dixisset quæ sunt a natura, mox (u) eas quæ sunt a morbo, dignoscendas esse, indicavit, ex operationum lesionibus, aut his quæ exornantur aut doloribus, aut tumoribus præter naturam, aut horum quibusdam, vel omnibus. Et doctè quidem, ut tantum decebat Magistrum, monstrati sic nobis sunt loci, &

quasi fontes signorum. Sed ea sæpe implicatio morborum est, is Partium consensus, atque vicinitas, ut raro certissima illa scientia speranda sit; crebrius artificiosa conjectura tentanda, & modeste vercundeque proponenda. Quod cum alias facere consuevi, tum in quibusdam non ita pervulgatis casibus mihi faciendum existimavi, qui inter illos erunt quos jam tibi eo ordine subjiciam, ut iis qui ex Valsalva propositi sunt, si non tumorum natura, & sede, at regione saltem media, aut ima quam in ventre occupabant tumores ipsi, respondeant: quanquam is unde initium fumam, paulo altiore ex parte obtinebat locum, neque ab uno (x) eorum qui supra descripti sunt, natura discrepabat, si modo aneurysma in illo, & in hoc nostro agnoscendum esset, in quorum altero ob historiarum signorum breviter, in altero ob nullam consecutam sectionem rem pro certa affirmare non licet.

18. Honestæ, & pia Virgo annos nata quatuor & quadraginta, cui sanguis hæctenus singulis mensibus ubertim per uterum responderat, cum fluere uno jam, atque altero mense omnino intermisisset, queri cœpit de palpebrarum, & oculorum pruritu, & de brevibus quidem, sed recurrentibus, cordis ut ipsa quidem aiebat, palpitacionibus. Cum hæc repente graviores factæ essent, & affidua; advocamur. Tum ægra ut earum nobis sedem indicet, non pectus sibi, sed epigastrium tangit. Manum huic imponimus, & durum quoddam, ac grande corpus magno impetu vibrari, & manum ferire, percipimus. Ingentem dixisses aneurysmatis fuisse tumorem, identidem pulsationes ingeminantem, occupantem autem non modicam in medio partem & supræ, & proximæ ventris regionum. Nec aliter aliis visum est. Mihi vero cum iis conveniebat quidem, nihil ad cor eas pulsationes attingere, quippe cum in pectore nulla esset vibratio, nihilque pulsus, utroque in carpo tentati, ostenderent quod a naturali modo abesset, nisi quod paulo essent frequentiores. Sed de aneurysmate assentiri non poteram cum propter alia, tum præsertim quia pulsationum illarum tempora minime cum pulsuum temporibus congruebant. Erant enim valde inæqualia earum intervalla, ut vis quoque; nam sæpius validissimo impetu, interdum & minus valido feriebat manus, cum interim nihil in pulsibus ad carpos mutaretur. Longe tamen facilius erat dicere quid non esse, quam quid esse videretur: tumor ingens, & durus, ut antea indicatum est, & quasi circuli ambitu comprehensus, qui a lumborum vertebra subinde se attollebat ad feriendam manum, continuo autem se ita subducebat, ut vel in gracili Virgine haud proclive esset deprehendere quo se retraxisset, donec iterum se extolleret, manumque percuteret. Quanquam autem illud erat obvium, in hysteriarum mulierum ventre quosdam haud raro quasi globos percipi, qui ab inferioribus ascendentes, eas male habeant; ex adverso non minus erat obvium, cum ejusmodi pulsationibus illos non conjungi, ut aneurysmata repræsentent. Attamen & hoc, & cæteris quæ contra dici possent, animo percussis, & iis simul animadvertis quæ rarisepenumero, & præter opinionem illis in mulieribus occurrunt, eo inclinari me fessi, ut conjicerem, quidquid illic esset, ad affectum hysterico-convulsivum facile posse revocari. Sed mea vix indicata conjectura, omnique, ut ad aggratantium lectulos consuevi facere, cum de remedio aliquo convenit, omnia controversia; sanguinem ut mitterent, sicuti evidens prægressa causa requirebat, continuo assensus sum. Quo facto, ita ægra melius se habere cœpit, ut postmodum nulla amplius superesset palpitatio. De quanquam certe ad menses quatuor, aut quinque quibus ego in Patria postea mansi donec A. 1711. huc ad tradendam Medicinam venirem, illa amplius quæsta est. Quo autem morbo aliquot post annis sublata sit, cum hic essem, neque ejus cadaver dissecuerint, pro certo scire non potui.

19. Arteriæ quæ, si in aneurysma dilatentur, pulsationem possint nimiam edere in ea ventris sede quæ in proposita historia indicata est, Cœliaca sunt cum crassioribus ejus ramis, Mesenterica Superior, Emulgens dextera, & Arteria Magna: sed hæc multo omnium sæpissime, rarissime autem reliquæ, si excipias Cœliacam. Nam ad causas cæteris communes, ut putrefactionem, constrictionem, aliasque ejusmodi, peculiarem insuper Cœliacæ mecum addes, ubi animadvertitis crebros illos tortuosos flexus per quos in Splenico ejus ramo ut sanguinis cursus ad lienem retardatur, sic in ortos ante illa obfacula ramos, in ipsumque Splenicum initium, & perbreve Cœliacæ

liacæ truncum tum magna pars sanguinis, tum hujus impetus reflectitur, ut si aliqua ex aliis accedat causis, quæ gravius, & diutius agat, facilius aneurysma nascatur. Sed etsi tot ibi sint arteriæ, nec una causa ob quam dilatentur; plura quoque sunt quæ cautos reddere nos debeat, ne pulsationem aliquando pro aneurysmatis jam orti indicio perperam accipiamus. Primum est grandis macies, ut ex iis etiam colligimus quæ olim Berengarius (y) admonuit, ut aliam redargueret quorundam Medicorum in emaciata muliere deceptionem. Mediante magna arteria, inquit, maxime in corporibus extenuatis, percipitur magna pulsatio in regione stomachi, & intestinorum. Nec dubitavit Prosper Martianus (z) vel maximam illam pulsationem sic explicare quæ in eadem prorsus sede in qua nostræ Virgini, Eratolai filio fuisse scribitur libro VII. Epidemiorum (a) his verbis: in medio umbilici, & ossis pectoris, circa hanc regionem appositam manu, talis erat palpitatio, qualis neque a cursu, neque a parore circa cor generari posset. Hæc autem de Martiani sententia, nihil aliud erat, quam motus arteriæ magnæ, qui in aliis a carne intersecta obscuratur, conspiciaturque; sed in agro illo quippe macie extrema confecto, ita erat eorum imminuta crassitudo quæ inter manum, & arteriam interjiciuntur, ut hæc & facilius elevaretur, & perciperetur magis: & quamvis id omnibus arteriis corporis sit commune, observatur nihilominus frequentius, inquit, in medio umbilici, ac ossis pectoris, nimirum quia nusquam major arteria truncus manui nullo osse intersecto subjiciatur: eodemque loco alia, paulo ante memoratæ pulsatione arteriæ. Alterum unde falli Medici ex pulsatione possent, multiplex quidem est: sed ab eodem Martiano (b) ad plenitudinem contrahitur five ea sit in arteriis, five in venis, five in carne, quæ arteriis appositæ ipsasque comprimentes, efficiant, ut majori impetu eleventur, cuius rei exempla affert in magnis inflammationibus, & in iis tumoribus qui ad suppurationem tendunt. Præverat autem Valsalvus (c) in historia enarratione ægri illius de quo modo dictum est. Fuit multo aggratantior, inquit, per spinam descendit, ob affectum phlegmonosum ejus loci, qui quidem pulsus aliquando fit in acutis morbis, aliquando etiam manet post acutos morbos fitque affectio eo loco cancerosa. Sed etiam ubi durum corpus aliquod arterias premit, pulsationem harum percipi, supra (d) docuerat, explicans cur uxoris Gorgiæ, cui multo diutius quam nostræ Virgini, suppressi erant menses, quoguervus illa converteretur, pulsus in ventre perciperetur, & pondus. Nam duratus uterus, inquit, velut alienum pondus, fertur quocumque convertitur corpus, & arteriæ quæ comprimuntur, nitentes se se efforere, sentiuntur pulsare. Quam doctrinam deinceps secuti Medici animadvertentes, ut in Sepulchreto (e) etiam vides, compressa ab insigni pancreatis, aut glandularum mesenterii obstructione atque turgente arteria Cœliaca, aut Magna, violentam percipi, ut sæpe in hypochondriacis, aliisve pulsationem. 20. Quæ, & alia his analoga si ad Virginem transferas de qua dictum est; primum cognosces, descriptam in ea pulsationem non ob maciem; erat enim gracilis, non extenuata; perceptam esse. Deinde etsi plenitudo erat aliqua ob mensuram sanguinem haud fluentem: non ab illa tamen dumtaxat fuisse; neque enim in eo uno fuisse loco; nec vero ab inflammatione, aut tumore qui ad suppurationem vergeret, neque demum ab insigni pancreatis, aut mesaraicarum glandularum obstructione, quorum omnium morborum nulla erant indicia. Reliquum est igitur, cum hæc, aliæque his similes comprimentes causæ abessent, ut pulsatio esset aut ab alia causa aliqua, aut ab aneurysmate. Ut hoc credi posset, faciebat a primo ampla moles corporis manum impositam percutientis, Quod si, ut Albertinus (f) scripsit, pluries ipse judicavit ex eo quod vasis dianetrum non auctam perciperet, validas, assiduasque arteriæ cœliacæ, vel aortæ in abdomine pulsationes fuisse sine dilatatione, nec ipsius judicium eventus sefellit; videbatur hic e contrario, dilatatio non deesse, quando pulsantis corporis tanta diameter sentiebatur. Veruntamen fatendum est, non æque facile esse in hoc altero judicio interdum non falli, cum videlicet latum corpus quo manus pulsatur, & dilatata arteria esse possit, & tumor, arteria impositus minime dilatata. Nam si arteria grandior sit, & a comprimente tumore ad vehementius pulsandum coacta, hunc ipsum, quem non æquo

graviores ponimus, attollet secum, & contra Medici urgebit manum. Hoc quod omnes ita vident, ut negare possit nemo, aliquando in ipsis exterioribus contingens partibus suspensos Chirurgos tenet, velut hic in puellâ cuiusdam collo tenebat mediocris tumor, adeo contiguus finitæ arteriæ Carotidi, ut hujus, quam comprimebat, & validiores pulsationes efficeret, & cum ipsa pulsaret. Erat tamen, ut diligentior perquisitio, & integra sanatio demonstrarunt, totus in tumida quadam, & pure intus jam plena, glandula Jugulari. Sic etiam ob pulsationem quæ sub bronchocele perferiebatur, complures eum tumorem aneurysma esse, existimaverant, quem Severinus (g) sicuti ob compressas arterias Carotides pulsare, crediderat, ita post mortem dissecando, ait, veram se opinionem suam ostendisse. Quod si vel exterius non deest errandi periculum; quanto erit magis in iis Partibus quæ alte inter viscera conditæ sunt? Vide, ut ingenuitate nunquam satis commendanda Cl. Viri Jo. Phil. Burggravius (h), & Petrus Tabarranus (i) memoriæ tradiderint quæ ipsis contigere. Ille pulsationem ab umbilico ad cordis usque scrobiculum pertinentem, & tantam, ut sæpe ab adstantibus audire posset, triginta autem & quatuor ipsos annos perduraverant cum non ab legitimo arteriæ, in mesenterio insignis, aneurysmate, quippe ejus diametro vix paulo amplificata, sed ab spurio, ut Lancisius vocabat, fieri posse, suspicaretur, idque ob nimiam diuturnitatem insanabile existimaret; datus post tor aliorum, incassum adhibita, remedia nonnullis quæ interea humorum cruditatem saltem corrigerent, præter omnem spem vidit pulsationem intra non longum tempus felicissime sublata. Tabarranus vero sub regione epigastrica non pulsationem modo, sed & tumorem pugni magnitudine cum deprehendisset, eaque cum cæteris aneurysmatis legitimi notis conjuncta; miratus est postquam hujus loco Pirrhofum dumtaxat ad mesenterii centrum tumorem conspexit, vasis Magnis tam arcte adhaerentem, ut Aortam non comprimere, ejusque pulsationibus non attolli non posset. Hæc te Observationes juvare poterunt; me cum de Virgine illa quam descripsi, ageretur, non poterant, non solum quia tot lustris post edita, sed & quia pulsationes in utraque Observatione eodem prorsus tempore quo in arteriis cæteris, fiebant. Aliis igitur quas paulo ante attigi, dubitationibus adductus ad cætera inquirenda, nec tantum aneurysma, quantum esse illud debuisset, fieri potuisse, intellexi, tam brevi tempore, ac sine ullis gravioribus, quæ præcessissent, aut subsequerentur, incommodis, & pulsationes minime arteriarum motui respondentes, in aneurysmate esse non posse. Itaque ad aliam potius causam rem censui attinere. Scilicet, ut pressius suprainnui, ad hystericas internas convulsiones, quæ hic illic intestina quadam, & mesentericos Aortæ ramos per inæqualia temporis intervalla majori vi constringentes, simul ex intestinis illis quasi globum quendam efficerent, coercito, rarefactoque aere dilatant, simul Aortam, ut pote impedito ex ea sanguinis in mesentericos ramos effluxu, vehementius pulsare subinde cogere, & impositum globum impellere. Sed quoniam per dissectionem, ut dixi, dilatationem demonstrare; ad alium tumorem veniam, eadem in sede positum, sed permanentem hunc quidem, & per anatomen exploratum. Qui cum ex rarioribus fuerit, & in ea Persona, & iis discrepantium opinionum controversiis agitatus, ut paucis ejus historia nec comprehendi possit, nec debeat; non miraberis, si hanc fuisse, quam soleo, partite, ac diligenter proponam.

21. FORTUNATUS MAUROCENUS, quem ab illustribus in Veneta Republica Muneribus, Amplissimaque Domo (erat enim Francisci Ducis qui ex subacta Peloponeso cognomen invenit, Fratrifilius) Religionis amor in Venerabilem Casinensium Monachorum Familiam traduxerat, Merita autem ex hac ad Tarvisinum, & deinde ad Brixianum Episcopatum evexerat; jam inde ex quo propter novum vitæ genus, rarius in publicum prodire, ut plurimum autem, cum totus esset in Sacrorum librorum lectione, federe assueverat, paulatim hypochondriacæ affectioni, & sanguinis per hæmorrhoides fluxui obnoxius factus, tamen, hoc intra modum recurrente, vel magis quam vellet, sanus vixit, pinguiori videlicet corpore, præsertim autem abdomine, donec ætate increfcente, is fluxus primum minui, deinde jam nullus esse

(1) Obs. Anat. Chir. 56. (m) Comment. de Bonon. Sc. Acad. Tom. 2. P. 1. in Medic. (n) n. 15. in fin. (o) Obs. 5. (p) Schol. ad eand. Obs. (q) n. 13. in fin. (r) Art. Med. c. 74. (s) c. 73. (t) c. 72. (u) c. 75. (x) n. 9.

(y) Comment. 9. super Anat. Mundini. (z) Annot. ad vers. 55. Sect. 2. Coacar. Prænot. (a) n. 3. (b) Annot. modo cit. (c) Comment. in l. 7. Epidem. n. 4. (d) in l. 5. n. 11. (e) l. 1. S. 9. in Schol. ad Obs. 38. (f) Comment. de Bonon. Sc. Acad. Tom. 1. in Opul. (g) De recond. Abscess. nat. l. 4. c. 6. (h) Art. N. C. Tom. 6. Obs. 131. (i) Obs. Anat. Edit. 2. n. 1X.

esse incepit. Namque eo immunito, dolores quidem ventris quos a flatibus esse credebat, molestiam interdum creabant, sæpe repentini, & momentarii, nonnunquam paulo longiores. Ubi vero anno jam sexagesimo emenso, nihil amplius fluebat sanguinis, molestiores fieri coeperunt, autumno præsertim, quem ultimum vidit, anni 1726. quo tempore etiam ex febribus laboravit. Sed has cortex Peruvianus compefcuit; illos opportune effluens rursus ex hæmorrhoidibus sanguis levavit. Insecuta hyeme, cum iterum, ac tertio & febres, & dolores rediissent: eodem superveniente fluxu levatus est semper, nunquam persanatus: quin ea tempestate primum animadverti coepit, quod durities in ventre quædam, & tumor. Ob has causas proximo vere Brixia Patavium se contulit. Erat cum cæteris incommodis alvi adstrictio conjuncta. Quem ut primum, & leviter solveret, cum senior Medicus rhabarbarum mandandum, *passulis* admistum, interdum daret, indeque æger sibi paulo melius habere videretur; additis ab senior altero Medico remediis validioribus, pejor habuit, quemadmodum & ab aliis quæ data sunt ad alvum movendam, ægro clysmata averfante. Sed & quidquid auxiliorum, alio spectantium, exhiberetur, cum vix semel, aut iterum sumpsisset, respuebat, videlicet eogente ventriculo, qui jam crebro interea vomitionibus subversus contumacissimis, & nulli cedentibus remediis generi, cibos, potionesque rejiciebat aut cito, aut siquid diutius retineret, ut coctum pomum quod retinuit horas octo & quadraginta, sæpius tamen evomebat nihil mutatum. Præter cibum, aquam etiam ejiciebat multam, ut humoris qui sumptus fuerat, mensuram superaret, eamque nullo sapore, aut colore præditam: neque in tam crebris vomitionibus quidquam unquam aut amari perceptum, aut colorari, si cibos excipias, animadvertum est. Cum hæc, atque alia, & tumor potissimum, de quo mox dicetur, Medicos terrenter; venit huc Venetiis Vir Summus Michael Maurocenus, Præfultis Frater, Eques, & Senator Præstantissimus, tresque alios Medicos in quibus & ego fui, advocari jussit, ut ægro inspecto, consilia cum hujus Medicis conferrent. Invenimus ab aliquot jam diebus læso alixum, facie, & artubus extenuatum, carnibus, ut sanorum, tepidis, pulvis autem paulo frequentioribus: quæ duo ita semper esse, nobis ejus Medici confirmarunt, nisi quod pulsum crebritas paululum ad vesperam, nocturne augeretur. Præcipue a nobis petitum est, ut tumorem accurate examinarem. Erat is non tactus modo, sed & visus; nam sub hunc quoque cadebat; judicio, circuli fere ambitu, cujus diametrum transversos octo æquabat digitos, medius inter Enflorment cartilagineum, & umbilicum locatus sic, ut aliquanto spatio; ea erat pinguis ventris prominentia; ab utroque distaret, modice ab ambitu medium versus affurgens, cute autem ejusdem ac alibi, coloris obductus. Si contractares; tuberosum inæqualiter tota superficie, ambituque ipso tumorem sentiebas non secus, ac si ex glandulis corporibus esset compactus, quod & renixus, si premeres, confirmare videbatur. Cum premeres, itemque cum flatibus æger vexaretur, doloris sensus, non tamen vehementis, in tumore oriebatur; præter quos casus nulla erat de eo querela, nisi tanquam de impedimento quodam, fixaque, sed levi, molestia. Utraque manu tumorem latera comprehendens, facile ipsum huc illucque ducebam. Neque erat difficile cognoscere non esse in ventris parietibus; sed his tamen esse quam proximum. Cum quæ erant supra, infra, ad latera tumorem, manu diligenter explorarem; nisi quod infra umbilicum, Medicis, ægroque negantibus, quidquam ibi esse præter naturam, explorare non perrexi; nihil, quantum per interjectam abdominis pinguedinem licebat, nihil, inquam, renitens, nihil durum, nihil inæquale, nihil quod pressum molestiam crearet, perceptum est. His, & lotio, in quo non erat quod culparet, & aqua de qua dictum est, vomitu rejecta, & siquid videbatur præterea inspiciendum, aut interrogandum, satis cognitis, cæteris autem quæ supra tibi exposita sunt, a Medicis, & Præfule ipso auditis, ad conferenda inter nos consilia coram Senatore illo Amplissimo, ac permultis aliis sive dignitate, & doctrina præstantibus Viris, sive Rei Medicæ studiosis, secessimus.

22. Ibi ex Medicis qui curationi præerant, alter de tumore natura, & sede multa differuit, quorum hæc summa fuit; Tumorem a se credi scirrhum, sed illegitimum, quod compressus doleat: sedem autem habere aut in omento, quia & mobilis, & extimus esset; aut si quis mallet, in mesenterio; nam & hoc mobile, & magna illa

præditum glandula, quam Aesculii pancreas vocat, cujus tumor excrefcere posset adeo, ut ad ventris anteriore perveniat, quemadmodum se vidisse in quodam cadavere, aiebat (quasi vero aut id pancreas in homine esset, aut glandula tumorem ad immobile mesenterii centrum, ut pancreas illud, politæ, sic totum ducere in alterutrum latus manu liceret.) Quod ad pertinaces vomitiones spectaret, videri esse in pylori annulo excrefcientiam quandam, obstantem alimentis illac transitis; hæc autem retenta ventriculum irritare; certe causam vomitus ultra eum annulum non esse, quod nullum unquam appareret in rejectis indicium bilis. Itaque ob vomitiones maciem demum summam, & lentam mortem vitari non posse; ob tumorem autem etiam citam, purulentam ex eo materia una cum sanguine in ventrem effusa. Attamen si quid a Medico præstari adhuc posset, non auxiliis exterius adhibitis, sed internis esse tentandum. Nam de mittendo ex hæmorrhoidibus sanguine antequam vires fatiscerent, se cogitante, ægrum abuisse: nunc viribus jam fatiscen- tibus, locum amplius non esse. Tumori autem quæ antea fuissent imposita, non modo ut inutilia, verum etiam ut gravia, & molesta, ægrotantem rejicisse: quam obrem vitatis omnibus quæ pus movendi vim haberent, ceratum Noribergense ab se quidem commodius existimari; sed omnino internis remediis esse nitendum, iis videlicet quæ validius & incidere, & dissolverent, & quæ alvum magis quam rhabarbarum, & multo magis quæ urinam moverent. Ad hæc præstanda cum plura, & valentiora, ut solebat, laudaret, mercurialia quoque, & chalybeata, si ferri posset, neque a nobis, quibus consideranda proponeret, improbarentur, sibi quidem convenientia videri, dixit. Post quem ejus Socius, cætera transmittens, nisi quod jecur insuper, & lienem obstricta credidit, pauca quidem verba fecit; sed de remediis multum dissensit, negans, aliud quam rhabarbarum sibi proponere licere, quo uno usus esset antea sine incommodo, cum alia quæ essent addita, omnia magna cum molestia, nec sine detrimento vidisset adhibita. Tum eorum qui mecum venerant, alter aliquanto plura locutus, de tumore natura, & sede in omento, & de excrefcencia in pylori annulo quæ prior dixerat, minutiusque fuerat, diserte probavit: de remediis ab utroque dissedit. Rejecit enim purgantia quæ vocant, omnia, ipsumque rhabarbarum lignorum, ut loquuntur, decoctum cum modica viperæ portione, nisi forte ob febrem hæc calidior videretur, proposuit.

23. Ego vero est quatuor potissimum esse, dixi, quæ attendi a nobis oporteret, tumorem, vomitum, maciem, febrem: eos tamen qui ante me locuti essent, laudavi, quod tumorem spectasset præcipue, qui ut reliqua antecessisset, ita eorum causa videri posset. Tumoris autem ipsius causam me quidem credi in sanguinis perveniam Portarum minus expedito motu esse facile agnoscendam, quem diuturna sessio, affectio hypochondriaca, sanguinis per hæmorrhoides fluxus, utilis, cum fuit, aut rediit, noxius cum decrevit, aut desit, non obscure significarent. Ab retardato igitur eo motu irritationes ortas, & crispaturas, & dolores, & tumorem initium denique in aliqua earum Partium, a quibus rediens sanguis in eam venam est excipiendus. Esse autem illas, præter omentum, & mesenterium, alias quoque, præcipue autem intestina, magis sane quam mælaræum, vicina tangentium manibus, nec minus, quam iis annexæ mælaræ partes, imo vel magis quam ex præsertim quæ centro ipsius sunt propiores, huc illucque mobilia. Huc illud accedere quod sic facilius tum diuturnæ alvi adstrictionis, tum fortasse etiam tam crebri qui ad hanc accesserat, vomitus, possem rationem proferre. Contractis enim iis quæ in ista ventris regione sunt intestinis Tenuibus, non viæ diæmetrum duntaxat, & peristaltici motus vim minui; sed & irritamenti aliquid ad proximum, continuatumque ventriculum non difficile propagari. Quin dolorem etiam qui manum premendo, aut saltem qui vexantibus flatibus, ibi fiebat, dilucidius intelligi, si tumorem ad ipsa intestina attinere, conjiceremus. Veruntamen non hæc me dici, quasi aliorum sententia conjecturam præferrem meam, quam omnium judicio subicerem, nihil ipse, ut in re ardua, & perobscura, definiens, ideoque nec quod aliis visum esset, contemnens. Nam est magnos in omento tumores sine doloris commemoratione legere (k) consuevissem, imo in Medici uxore, aliis consentientibus, agnovissem optime nutrita, & colorata, omnispes incommodi, nedum, si premeres, doloris experte; posse tamen aliquando esse ejusmodi in omento tumorem naturam, duritiem, & formam,

ut

ut premendo, aut in ipso, aut in contiguis Partibus dolor excitetur: quæ de re non dubitasse scire Viros Doctos (l). De grandibus autem mesenterii tumoribus, quod detrufis ad latera intestinis, & omento, subsint ipsi anterioribus ventris parietibus, hosque contingant, non una posse Medicorum, & Anatomicorum Observatione (m) confirmari. Porro augeri difficultatem veræ sedis tumorum internoscende in hujusmodi pinguibus, amplis, & intestinorum cruciati obnoxiis ventribus. Nam præterquam quod multa inter manum, & viscera interjecta pinguedo obstat explorationi, esse in his ventribus haud raro viscera, & intestina præsertim aliqua, extra suas sedes retracta, aut compulsa. Sed ut non una esse posset doloris sedes; sic & contumacissimi vomitus varias esse posset causas. Nec me quidem fugere, ex ipso pylori annulo interdum excrefcientiam quandam se attollere, qualem & ipse nonnunquam vidissem, quæ si satis magna sit, ut in Medico, Amicis noto steatoma quoddam fuit, alimentis transitu intercludat: sed tamen non ignorare, tot in eo loco, aut prope eum locum tum intus, tum extra esse posse causas idem efficientes, ut si vel multas enumeremus, veram fortasse non assequamur. Exempli enim gratia, duris undique circa eum locum, & crassius factis ventriculi tunicis, viam angustiores fieri, alimenta non propelli, quale genus viti fuisset Patavii in pio Sacerdote deprehensum, non modo in aliis de quibus cum alibi (n), tum in Sepulchreto (o) legissem. Atque, ut scirem, eundem prorsus effectum fore, si ex commemoratis vitiis aliquod propiore ventriculo obideret Duodeni intestini partem (p), certe in eodem Sepulchreto extare Observationem quandam (q), non valde, si probe meminisset, dissimilem ejus de quo loqueremur, casus, ut sermo de tumore omenti habitus eam mihi ad memoriam revocasset, quippe cum omentum grandem ex durissima pinguedine tumorem in epigastrio haberet, simili circumjecta materia pylorus adeo constringebatur, ut hinc insanabilis vomitus, pertinax alvi adstrictio, & macies contigissent. De qua non esse opus multa dicere in eo qui non modo alimenta, sed plus etiam rejiceret humoris quam fumeret, five ea aqua ex saliva esset quæ multa in ventriculum sæpe inanem descenderet, five etiam ex hujus tunicis per crebros vomendi conatus exprimeretur: quanquam insuper chyli, ex perpaucis confecti quæ intestina subirent, partem aliquam interciperet posset tumor qui aut ad illa, aut ad mesenterium attineret. Quo ex tumore, aut certe quem ob tumorem quædam in ventre moram trahentia, eoque vitata, ubi in sanguinem rediissent, ita cor irritare, atque arterias posse, ut hac denique, aut simili ratione aliqua conjicere liceret ferri originem. Ex his quæ hæcenus dixeram de quatuor initio propositis, est apparet, in quibus a cæteris discreparem, tamen erat facile intelligere, non posse me in eo dissentire quod morbum statuerant insanabilem. Idque ultro fassus sum: hoc tantum diserte addidi, timere me, ne alia potius ratione quam per effusionem puris, cujus tunc procul essent indicia, tumor interitum afferret. In morbo igitur insanabili dandam operam, ut quæ accelerare mortem possent, iis quo ad fieri liceret, obstando vita diutius produceretur. In illis non una ratione esse vomitum, maciem afferendo, vires minuendo, tumorem concutiendo. Vomitus autem si causa præcipua tolli non posset; at posse alteram minui, quæ ex parte aliqua fortasse, ut solet, ipsum foveret, alvi adstrictionem. Exorandum omnino esse Præfulem, ut clysteres admitteret, id præstituros, aut, si inutiliter præstarent, nutrituros. Quod si perstaret in reculandi proposito, & si rhabarbarum sine ullo re vera incommodo sic satis alvum antea solvisset; me non quod probarem, sed quod cætera partim non convenirent, partim manifeste nocerent, necessitate ipsa adductum, atque coactum non abnuere. Cæterum irritantia, & injuncta omnia esse fugienda, eaque etiam de causa modicam me viperæ portionem haud improbare, quod, incipio ægro, inchoi in iusculis posset quibus nutritur; nisi mallet aliquid de illius *gelatina* in his dissolvere: neque enim donec levis adeo esset febris, viperæ calorem, vel si tantus esset quantum plerique credere videntur, in parva adeo alterutris parte nocere posse. Atque eadem fere a me dici de tantillo radice aut farsæ parillæ, aut potius chinæ. Quod de mercurio injecta esset mentio; primum non eas esse ægri vires, ut de eo cogitarem: quæ si essent; multo libentius secundum ea quæ de tumore causa dixeram, modicam sanguinis missionem probaturum me esse ex hæmorrhoidibus: deinde si tumore natura ea foret quam ipsi censerent, & quam inficari non possem, tactus judicio indicatam

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

videri quasi ex scirrhis, strumosisve glandulis; minus certe mercurium, quam millepedes convenire, eoque hos magis quod movere simul lotium posset, si id quidem e re esset, sicuti propositum fuerat. Sed nihil magis e re esse, ut dixissem, quam vitam protrahere: idque factum iri, si ingrata omitterentur, gratiora, eademque nutrientia darentur. Ex his quæ diutius stomachus retineret, aut non tota rejiceret, diligenter attendendum, iisque potissimum utendum.

24. Et si ita brevis, ut plerumque in Medicis Colloquiis solitus sum, esse non potueram; longiori tamen oratione usus est qui novissime verba fecit senior Vir, clarusque Professor. Sermo ejus omnis huc rediit, ut tumoris naturam eandem quam cæteri, agnosceret; sedem haud aliam, quam mesenterium statueret, omento; nam de intestinis nullam prorsus mentionem fecit; ob id maxime rejecto, quod sensu caret, ac sine dolore incidere. Cæterum insanabilem morbum esse, confirmavit: medicamentosa probavit alimenta, in his viperam diserte: purgantia damnavit, & validiora remedia omnia: non sic millepedes, ut quibus pauperis puellæ strumas se persanasse, meminisset. Habes eorum summam quæ in eo Colloquio dicta sunt. Noli autem mirari, quod cum pressè indicaverim sententiam quatuor Medicorum qui præ cæteris eo tempore hic forebant; fuerim in mea exponenda fusior; sic enim feci, ut in iis explicandis quæ post Præfultis mortem deprehensa sunt, possem esse brevior. Ea contigit duodevigesimo circiter a Colloquio nostro die.

Sed inchoatam morbi historiam pertexamus.

25. Quid postea egerint Medici duo quibus ab initio fuerat commissa curatio, non quaesivi; neque enim post dictam sententiam id soleo. Audivi tamen quod Patavii omnes, post ridie rhabarbarum, sed non intra pristinum illum modum, ideoque non sine ægri molestia, dedisse. Ab hoc denique impetrasse, ut clysmata interdum adhiberentur: sic aliquo cum levamine recrementa eduxisse. Postremo cum accidisset, ut biduum sine ulla vomitione transigeretur, spem ægri servandi, nescio ex quo fonte, in vulgus emanasse: quæ utinam rata esse potuisset. Verum mox rediisse vomitum, & vel pejora quam prius, omnia. Interea externus huc venit Medicus, populi opinione præstantissimus: quem hic quidem rem desperatam dixisse, aiebat; alibi autem addidisse, morbum mercurii ope potuisse ab se vinci, si antea venisset. Nec desuit qui, illo abeunte, se fuso quodam remedio sine ulla dubitatione victurum, speraret. Hoc erat insulso, ut vocant, ligni nephritici, quæ Venetiis quædam fortasse durities ventris discusserat. Aliquoties Præfule dedit; sed in cassum. Jamque in dies aucta macie, viribus autem decrefcenibus, morbus ad finem properabat. Certa hora æger lodices poscebat, quasi frigeret; alia, non nisi levissima ferre poterat operimenta, ob æstum videlicet, sed interiore; exterius enim tepidum semper, nunquam frigidum, nunquam calens corpus quicquam perceperat. Respiratio semper bona. Pulsus neque duri, neque intermittentes, neque ullo modo inæquales fuerant unquam: sed frequentissimi facili erant diebus ultimis, & humiles adeo, ut a Medicorum altero nulli jam amplius esse crederentur. Accesserunt convulsivi tendinum subultus, & levissimum interdum quasi delirium. Diebus iisdem ultimis vomitiones perdurabant; sed amari, & gravissime olentis humoris, & sic nigrescentis, ut sanguinem aliqui esse putarent; sed inmissa charta postquam resicata esset, colore ex subviridi dilute flavo bilem fuisse ostendit. Per hæc ventum est ad VIII. Kal. Quinctiles, quo die pomeridianis horis tam gravi correptus est paroxysmo, ut tunc moriturum crederent. Evafit tamen. Sed postero die simili paroxysmo horis iisdem redeunte, mente sibi constans, humili autem voce pia quædam verba identidem proferens, cum, se in alterum latus, quod superioribus diebus facere sine auxilio non poterat, per se convertisset, mox placide optimus Antistes ex hac vita migravit.

26. CADAVER cum esset condiendum prima nocte, ut triduo proximo iusta fierent, omnes qui consilia contuleramus, advocati sumus. Ibi cum ab Antistite Medicis, & familiaribus Sacerdotibus ea accepissem quæ tibi de postremo morbi tempore pro certo retuli, mox inspectantibus Sociis, & studiosis bene multis, ipse præfui dissectioni. Abdomen, est macies artus multo magis, & faciem, quam ipsum extenuaverat, hæcenus tamen subsederat, ut vel ab hac causa credi posset, tumorem magis quam antea videramus, extrorsum assurgere, & protuberare. Nihilominus sub tota abdominis cute pinguedo erat alta digitos duos. Patfacto ventris cavo, in quod serum fuerat sanguinolentum vix ad tres libras effusum, duo simul omnium oculos in se converterunt. Hinc enim tumor, de quo adeo disputatum fuerat, magni instar globi, vel potius hemisphærii ap-

H

pa-

(k) Wharton. Adenogr. c. 12. Vid. etiam suis locis plerique Obfer. indicatas in hæc Sepulchr. Sect. 21. sub Obs. 33: itaque in Additam. Obs. 73. Sc. 83. 88.

(l) Vid. Sect. modo cit. Schol. ad Obs. 54. & in Addit. Obs. 80. vers. fin.

(m) Vid. Riv. Prax. Med. l. 13. c. 5; Wharton. l. cit. c. 11; Scultet. Armam. Chir. Obs. 62. & cæter.

(n) l. 3. S. 8. Obs. 17. & seq. (p) Vid. confirmatum Epist. 30. n. 12.

(q) l. cit. S. 21. Obs. 80.

paruit, si colorem, foetorem, superficiei inaequalitatem attenderes, specie foetissimi carcinomatis. Inde autem novo, & inusitato spectaculo quiddam spatii intra ventrem est ab umbilico deorsum, id omne, si Coli intestini finistram inferiorem partem, Rectumque, & quod ex mesocolo ad hanc spectat, & urinariam vesicam exciperes, vacuum prorsus, & visceribus, & inane conspiciebas. Quae me res continuo admonuit, quid tumor esset: idque & mea primum, deinde & omnium inspectio confirmavit. Scilicet ileum totum intestinum, & Jejuni proximi pars aliqua, suis relictis quae infra umbilicum sunt, sedibus, sursum retracta, & coacta, & inter se archissime juncta magnum illum, & prominentem tumorem per se fecerant, nulla omnino addita scrophulosa, aut scirrhosa, aut canerosa substantia. Nam superficiei inaequalitas ab ipsis erat crebris intestinorum flexibus, & inaequali positu ac confusione, ut hic magis, illic minus protuberarent: color autem nigricans ferme ubique, nonnullis videlicet interjectis minoribus spatiis, quae adhuc rubebant, intestinorum inflammationi, magna jam ex parte in gangraenam degeneranti, manifestissime debebat eo nimirum intercepto demum in Portarum venam sanguinis reditu, de cuius retardatione supra (r) a nobis dictum est: gangraenam denique sequebatur, ut solet, odoris foetidas. Erant intestina quae tumorem faciebant, plena propemodum materiae, qualis in Crassis est stercus non valde molle, quantum uno illorum postea dissecto, cognovimus: ut evidens esset, remorante materia quae in Crassa cito solet descendere, & flatibus additis, potuisse tumorem sic ad actum reniti, ut in vivente perceperamus. Et si vero ob actum, quam dixi, intestinorum inter se connexionem, opus fuisset longissimo tempore, ut scapello alterum ab altero sejungeretur; manibus enim hinc, & hinc trahendo nihil proficiebatur; tamen circa medium & summum ferme tumorem cum minus difficilis esset se junctio, haec ibi saltem peracta est, & tumoris interiora in conspectum sunt data, quae pariter a subtus coactis intestinis fiebant, & ex parte aliqua a mesario, quod neque durum, neque crassum factum, neque nigrum omnes perspicere poterunt, sed omnino sanum, & pinguedine refertum, ut secundum naturam solet, ex albo flavescens. Cum omentum haecenus nulla ex parte se ostendisset, oculos converti ad supremam ventris regionem, ubi inter tumorem descriptum & diaphragma ventriculus subsidebat: cumque ne sic quidem apparet, sed alba quaedam quasi fascia, dura, gravis, & crassa ab uno ad alterum hypochondrium in transversum ducta, ventriculi fundo, & huic subiecto intestino Colo firmissime se annecteret, quorum utrumque suo pondere, & crassitudine deprimebat; vix tandem illam esse omentum, agnovi: quod mox & ceteri, bene perpenis omnibus, confirmarunt: Scilicet Tenuia intestina in tumorem assurgentia, illic omentum olim repulerant, quod in se complicatum in unum illud coalescerat corpus, fasciae instar, aequali superficiei, sed non crassitudine. Alibi enim haec fuit unius duorum alibi, alibi trium digitorum, ut ex sectionibus perspectum est: maxima autem crassitudo animadversa est potissimum prope lienem, ut rigida durities quoque, sic ut sub cultro inter dissecandum strideret: ceterum uniformis erat ubique ad aspectum substantia; sed durities alibi quasi ligamenti, alibi propemodum cartilaginis. Sic igitur se habuit omentum, sub tactum in vivente non cadens, quippe inter multam abdominis pinguedinem, & cedentia viscera ventriculorum, & Colon, ob depressam autem sedem, & firmissimas connexiones neque inter manus comprehendendum, ut prominens ille intestinorum tumor, neque in utrum liberet latus movendum. Tum ventriculus inspectus est. Exhausto plurimo quem continebat, humore nigricante & tetterimi odoris, qualis in novissimis vomitionibus rejiciebatur, interior facies apparuit ex subrubro fusca, an ab illo humore sic infecta? an etiam ab inflammatione? In pylori autem Antro quibusdam quasi concreti sanguinis grumulis hic illic feoda videbatur, qui diligentius inspecti, nihil erant aliud, nisi parva, & depressa tubercula, intus quidem alba, & firma, superficiei autem gangraena affecta, nonnulla ovali, alia aliis figuris, & positionibus, pleraque autem ita ex pluribus efformabantur, ut alteris quasi ramosos, sive flexuosos, & bifurcos radiis instructos, repraesentarent. Sed quo magis ab Antri initio ad pylorum accedebant, eo fiebant minora, rariora, & demum solitaria. Quod maximum ex omnibus fuit, vix ad parvam fabam magnitudinem perveniebat. In ipso pyloro non

sunt haec, nedum excrecentia ulla, observata: quin via inventa est illac non sic contracta, ut immitti, sicut iussus, digitum prohiberet. Sed erant tamen ibi, & in toto propemodum Antro pylori, itemque in prima, huic proxima, Duodeni intestini parte dura adeo, & crassa tunica, ut cum minimi digiti apicem crassitudine aequarent, rigida duritie non multum cederent descripto omento, cui alba quoque compactaque substantia erant similes, & ex hac ipsa nonnullis quibusdam in locis prominente, illa tubercula efformabantur, de quibus paulo ante dictum est. Jecur intus, extraque pallidum, & durissimum, sed naturali figura, & magnitudine. Ejus vesicula bitem nigrescentis amurcae similem continebat. Sana lien, sana reliqua viscera, Thoracis quoque, ubi pericardium, & cor pinguedine operata conspecta sunt. Unum tamen in ventre est pancreas excipendum: quod qua ratione se haberet, cum inquirere vellemus; Sociis quia nox jam longius procedebat, & odoris foetidas gravis erat, & firmissima illa omenti connexiones citissime utique, ad relegendum pancreas dissolvi non poterant, visum est satis esse quaesitum.

27. Et sane si praegressa attenderes, & tumorem praesertim, ejus de natura, & sede, praecipua dum Antistes viveret, quaestio fuerat, satis quaesitum videbatur. Atque ego quidem cum a sectione una cum Sociis rediens, a Viro gravissimo interrogarer, quid tandem repertum esset, continuo pro omnibus respondi, nihil quod in Colloquio jam aliquo modo indicatum non esset, ac jure insanabile pronunciatum. Neque aliter narrationem conclusi, ad supra (f) laudatum scribens Eximium Senatorem, Praefulus Fratrem, cum pro eo ac debebam, observatorum summam postredie misi: quam ut gratam habuit, sic apud se retinuit. Nec vero est postmodum in omnium manibus esse, audivi, unam, atque alteram eorum summam, emittere propterea volui meam, tum quia multo illa magis inter se, quam a mea, discrepabant, tum quia nunquam volui minime necessarias controversias suscipere. Quae autem minus necessariae, quam quae posset ipsum qui dissecuerant, Chirurgorum testimonio dirimi? Quod recentissima in re quaesivi, non ut tunc proferrem, sed tantummodo ut in promptu haberem sicut habeo, siquando tota a me Observatione producta, existeret forte aliquis cum dubitationis quidpiam injiceret particula aliqua earum summam. In quibus ne nunc quidem quid deesset, dicam, aut quid superesset, aut quid denique a vero aberraret: quin nec mentionem ullam de iis fecissem, nisi a te forte aliquando visas miraturum, credidissim, a me dissimulari. Hoc tantum dicam quod tunc ceteri omnes qui sectioni interfuerant, ultro dicebant: recte alterum fateri, tumorem de quo controversia fuerat, ex Tenuibus fuisse intestinis in magnum globum conjunctis, & coactis; sed illud non recte, fuisse etiam ex mesenterio durissimo, eodemque colore (nigro videlicet ac gangraenoso) quo infecta erat ea intestina, & denique tumido. Sic etiam recte alterum contra affirmare, album fuisse mesenterium, sine ullo tumore, & duritie; illa vero non recte ubi oblitus, se quoque in Colloquio (r) scirrhum mesenterii aequae omenti, concessisse, non sine acerbitate aliqua eum carpit qui scirrhum in mesenterio coniecerat, itemque ubi de intestinorum coalitu, & de omenti scirrhi verba facit eo artificio, ut qui rem ignoret, ne suspicetur quidem, intestina in unum globum coacta, atque assurgentia fuisse, eoque tumorem de quo erat quaestio, effecisse, imo cogitet, nihil aliud fuisse, nisi illum omenti scirrhum, qui certe non in superiore umbilici parte, sed multo superius incipiebat, neque ullo modo extabat, sed planus, depressusque jacebat. Quanto magis seniores duos illos Medicos decussit, omni praetermissa, quae nulla amplius esse jam poterat, de sede tumoris controversia, Hippocratis (u), & Galeni (x) illustre exemplum imitari; & candide fateri, se in ejus conjicienda natura fuisse deceptos, quando mihi non tam gratum erat, tacite, quod de vera sede mentionem unus injecissem, quam molestum palam, de natura communem ceteris deceptionem haud proflus vitare potuisse.

28. Magni enim interest eorum qui rei Medicæ studio sunt dediti, cuique ipsius, cujus praesertim causa tam longum hunc sermonem institui, non ignorare, aliquando in ventre tumorem extitisse qui est ex intestinis ipsis esset, inaequali tamen ac tuberosa superficiei, & renixu quingue Medicis, iisque, si me excipias unum, sagacissimis, & exercitatissimis, pro scirrhi impossibilitate. Hoc, nisi fatentibus ingenue nobis, innotescat; quis ad internoscendum, signa perquirat? Neque enim apud

apud nostros facile reperirentur Auctores, cum plane similem nusquam meminim historiam legisse. Legi quidem in Actis Caesaræ Academiae (y), inventa esse omnia intestina arte invicem coherentia, aut praecipue tenuia tam inter se, quam cum mesenterio ubique tam tenaciter concreta, ut cum ipso seu unam massam, aut unum glomum efficerent: quin etiam legi, in adolescentula, ventris doloribus saepe obnoxia, reperta a Cl. Fantono (z) cuncta fere intestina in unum veluti corpus conglomerata, & inter se archissime conglutinata: & tu legere poteris in hac Sepulchreti XXI. Sectione (a) intestina omnia conglomerata, & veluti in globum acta; itemque (b) intestina ita ad superiora retracta, ut vix mediam abdominis capacitatem implerent. Sed in nulla harum Observationum invenies, ita retracta, & conglomerata fuisse, ut extrorsum in circumscripti, & peculiaris tumoris formam prominerent: imo in duabus ultimis ne fieri quidem id poterat, quippe interiecta, ut in hydro-picis, aqua plurima qua universum abdomen distendebatur, ut neque poterat in alia ascitica, cujus intestina omentum vidit Th. Bartholinus (c) ad dextrum hypochondrium detrusa, ut initio intestinis caruisse, apparuerit, aut in milite, eodem quo ea, morbo laborante, cujus intestina deprehendit Laubius (d) mire contorta, & in unum quasi globum umbilicum versus coacta. Poterat autem fortasse id fieri; sed factum diserte non adnotatur; in Cardinali Campegio, cujus intestina omnia (excipienda taceant Coli pars, & Rectum) ad hypochondria retracta erant; propterea cavitatis inferior abdominis intestinis destituta erat, & spina detrusa, ut vidit Columbus (e) cujus rei novitates, a nobis pariter in Praefule nostro conspectam, non poterat, inquit, satis mirari excellens Augustinus Riccus Lucensis. Postea in foemine foetu vel mirabilior nobis apparuit ejusmodi novitas. Aperto enim ventre, & sanguine qui in eo effusus erat, detergo, nullum praeter ea quae modo exceperimus, usquam conspicietur intestinum; reliqua enim omnia cum toto propemodum mesenterio latebant sub hepatis cavafacie, erantque ea ratione conclusa, quam tibi opportuniori loco (f) fortasse exponemus. Hoc autem ante dissectionem suspicari potuisset nemo propterea quia obessu illius sanguinis copiam, abdomen infra umbilicum non subsidebat: & quamvis subsidebat; quis tandem non hepatis potius, ut in foetibus semper amplo, hic fortasse ampliori, impetandum existimasset, quod intestinis sursum pone ipsum retractis? Nam Philippus quoque Jacobus Hartmannus (g) in trienni puella ingentem quidem tumorem viderat a costis finistris spuris ad pubis confinia protentum; nec divinare poterat factum ex intestinis in unum corpus coalitis cum majori parte omnis mesenterii ita ut dorsum solum liberum conspectui pateret: nec addidit quidquam, unde si rursus accideret, illius natura cognosceretur. Columbus tamen (h) quaedam interjecerat, unde notas colligere possemus nonnullas ad ipsam internoscendam. Quamobrem, inquit, Medico licebat abdomen Cardinalis atrethantis magnae arteriae motum persentire, & una cum illa durities persentiebatur. Illa vero durities nihil aliud erat, quam vertebrarum corpora. Quibus ego indicis uti non potui in Antistite, cum abdomen ob eam causam quae supra (i) indicata est, infra umbilicum non atrethaverim: & si atrethassem; multa pinguedine impediens, neutrum, opinor, percepissem; minusque arteriae Magnae, aut primarum Iliacarum motum, cum pulsus nec validi, nec magni essent: quas ob causas neque Medici, neque aeger videntur animadvertisse non negatur alioquin, infra umbilicum quidquam percipi praeter naturae consuetudinem. Verum in quibus minus pinguedinis abdomen habeat, non inutiles erunt haec notae, dummodo nec pinguedinis nihil sit, & fuscicilio absit dilatata, aut alias ob causas praeter modum ibi pulsantis arteriae Magnae; fere enim vel interiectis intestinis, non hujus tantum pulsatio ut in hac Epistola (k) ostensum est, sed & vertebrarum durities, ut in alia (l) diximus, persentiri possit. Igitur in corpore neque obesto, neque maxime extenuato, neque iis suspitionibus obnoxio, si pulsatio, & multo magis si durities simul illa percipiatur; sursum retracta esse intestina conjiciemus: addetque conjectura non leve pondus, si abdomen simul aequo depressus infra umbilicum, supra autem turgidus animadvertatur. Quod si cum his signis in superiore eadem regione peculiaris, & mobilis tumor, qualis in vivente Praefule descriptus est (m), se se attollat; non modo cavendum est, ne propter renixum, & superficiem Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

inaequalem, ac tuberosam, ad scirrhorum, aut strumarum genus facile referamus; verum insuper quaerendum est, quibus indicis illuc magis adduci possimus, ut ex intestinis fieri, conjiciamus. Erant ea indicia, si aegrum saepenumero Tenuium intestinorum doloribus, & sanguinis ex haemorrhoidibus fluxui, licet postea imminutus fuerit, aut suppressus, obnoxium fuisse, intellexerimus; si tumor, vexantibus flatibus, dolore afficiatur; si alvus magis magisque ex quo tumor incepit, adstrictior sit, aliaque de eodem genere quae aut in proposito a nobis historia leguntur, aut ex ea in mentem venire possunt. Essent autem haec peculiariora magis indicia, si tumor gravius interdum, aut levior ab aegro, durior autem, majorve, aut mollior, minorque a Medicis quoque animadverteretur, quemadmodum in herniis accidit intestinorum. Et quamvis id rarius in tumore hoc nostro contingere posse videatur ob creberrimos flexus, non levem constrictionem, & archissimum praesertim intestini cum intestino coalitum, peristaltico eorum motui officientem, quae videlicet causae materiam unde renituntur, in ipsis, ut vidimus, remorantur, ac retinent; tamen credibile est, si diligenter, saepius, ac variis temporibus illa perquisitio repetatur, iisque potissimum quibus jam diu nihil, & quibus plus nuper recrementorum dejectum sit, aut quibus major, quibusque minor flatuum copia vexet; credibile est, inquam, aliquod ejusmodi signorum aliqua ex parte posse deprehendi. Haec mihi fere in mentem venerunt de tumore hoc cogitanti. Alii alia, & tu quoque pro tuo mihi spectato ingenio potiora adjungas. Quo facilius id facias, alteram, quamvis aliis cum morbis implicitam, neque a me qui aegrum non vidi, satis fortasse exacte descriptam, Observationem subnectam, quae ad ejusmodi tumores quadantenus, certe autem ad hanc Epistolam attinet, ad imamque regionem Ventris, quae, ut propositus ordo postulat, jam a nobis spectanda est.

29. MONACHO ex S. Francisci Cœnobio quod in Patria mea est, cum afeitis mediocrius indicia essent, repente copiosae vomitiones visae sunt ventrem deplevisse; nisi quod in hypogastrio tumor apparuit ea duritie, ut scirrhoros crederetur. Hoc manibus compresso tumore, flatus per inferiora excludebantur. Peristabat vomitus, ad quem cum assidua, & incredibilis nausea, alvi autem adstrictio insuperabilis accessissent; hujus denique recrementata, aut certe simillima iis materia evomi coepit. Itaque est nullus in ventre dolor, nulla inflammationis signa advenissent, aeger morbo confectus est. Quo animam agente, cum ejus ad me Medicus, Vir spectatus, venisset petitum, ut postredie, si commodum esset, dissectioni praesentem, mihi quae ex febricula in lecto cubanti, quae modo dicta sunt, retulisset; tu vero, inquam, praesto; egregis enim potes; & sicuti quae praesentant, narrasti, ita quae reperies, fac sciam; nam quae de afeite, de tumore, de flatibus, dum hic premeretur, exeuntibus, & de ileo demum ex te audivi, cohesionem, implicationemque aliquam intestinorum mihi videntur significare. Postero autem die, qui fuit postredie Idus Novembrii A. 1709. cum ad me humaniter rediisset, nos vero inquit, sic invenimus. VENTRE aperto, intestina lividissima, nec tamen marida. Tenuia certa sui parte mire inter se implicita, & per nexus ex firma dentaque substantia tendinae instar, & propemodum cartilagineae inter se juncta, illum tumorem efficiebant durum adeo non modo ob hanc interjectam, connectentemque substantiam, verum etiam ob faeces, quibus illa referta erant, in parvos quasi globulos conformatas. Ejusdemmodi globuli non ibi dumtaxat, sed & in proximo erant Colo intestino donec haud multo ante quam in Rectum desinere, impervium fieret ad aliquem tractum, quo tractu cum incideremus, non ex albidis, sed ex carneis omnino fibris compactum deprehendimus. Ventriculorum autem intus sublividum, & concoloris humoris plenum.

30. Vides alium quoque non ignobilem Medicum ad eundem modum, ob eandemque causam fuisse deceptum. Cujus mihi Observatio, ut tunc adnotata est, ita si duodevigesimo post anno in memoria fuisset; prodesse poterat procul dubio ad ejus quem fufius tibi descripsi (n) tumoris non sedem modo aliquanto fidentius, sed & naturam multo verius conjiciendam: quanquam in Monacho & multo minor, neque ita prominens, nec mobilis fuit, quod sciam aut ullo cum dolore, & ejus pressionem flatuum exitus per inferiora erat initio confectus, sive quod Colon intestinum necdum penitus co-

H a

luif.

(r) n. 23. (f) n. 21. (z) supra, n. 23. (u) Epidem. l. 5. n. 14. (x) De loc. aff. l. 2. c. 5.

(y) Tom. I. Obs. 87. & Tom. 6. Obs. 134. (z) De Obs. Med. & Anat. Edit. 4. (a) Obs. 3. §. 8. (b) Obs. 20. §. 6. (c) Cent. 1. Hist. Anat. 2. (d) Ephem. N. C. Cent. 9. Obs. 64. (e) De Re Anat. l. 15. (f) Vid. Epist. 67. n. 17. (g) Ephem. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 105. (h) loc. cit. (i) n. 21. (k) n. 19. (l) Epist. 10. n. 12. (m) supra, n. 19. (n) supra, n. 19.

luisse, five ejus quæ patula servata est, flexuosa extrema pars tumori ita subesset ut hoc pressio, comprimeretur. Huc alia accedebant discrimina, cartilaginea in primis interjecta durities, & prægressus hydrops ascites; ex quo etiam ad cætera indicia adjuncto cur aliquam, ut dixi (o), suspicatus sim intestinorum cohesionem, hæc fuerunt causæ. Nam primum videram A. 1699, cum Valsalva in Bononiensi Incurabili Nosocomio ventrem aperiret mulieris ex ascite mortuæ, intestina quasi undique cum peritonæo, præsertim vero inter se, prorsus cohererentia, & quasi connata, pleraque conucente cartilaginea quadam substantia, quæ alicubi, & ad Colon præcipue, transversæ digiti crassitudinem æquabat. Deinde Ruyschium (p) legeram in altera, eodem confecta morbo, intestina memorantem non solum undequaque peritonæo, verum etiam sibi invicem connata. Et ex Valsalva audiveram in eo qui, ut hic Monachus, prægresso hydropre laborasset, fuisse inter se nexa intestina, ut in ejus, tibi alias (q) descripta, habes historiam. Et in alia, pariter ad te missa (r) invenies, ut vidissem ipsæ in viro cuius venter multam habebat aquam, intestina jam nonnullis in locis per quasdam flaccidas quasi membranas inter se juncta: eaque fortasse erant primordia cohesionum quæ, abeunte aqua, firmiores fiunt, persistuntque deinde, ipsa etiam, ut non raro fit, redeunte: materiam autem ex qua ejusdemmodi membranz oriantur, tibi satis alibi (s) indicasse memini. De qua, etiam intestina connectente, etiam idem atque ego, opinari videram Cl. Viros; tamen non per eam semper colligari intestina, censio: sed & aliis modis quos cum de pulmonum ad pleuram, aut de cordis ad pericardium adhesionem ad te scriberem (t), commemoravi. Et sane ubi coalescit fit vel ex sola inflammatione, a qua, ut Ruyschii (u) verbis utar, videmus sæpenumero viscera ad se invicem contrahi, & uniri; multiplex est explicande unionis modus, nimirum five eos cum plerisque sequaris; a quibus siccitas contingentium inter se superficierum spectatur, five eos a quibus earundem visciditas, ab aucta humorum perspiratione, quos retardatus (id quod addere poterant) sanguinis motus reddit viscidiores. A quorum primis, & si bene attendas, etiam ab alteris cum recesserit, nec sine propostis causis, is quem ante diem amissimus, Crelius (x), rem aliter explicare posset necesse est. Verum ne ab hydropre longius abeamus; proclive etiam est velut idem agnovit (y), coalescentia viscerum in eo morbo intelligere, si paulo acrior illa sit in qua macerantur, aqua ut vel leviter ipsorum superficiem erodat. Quid? ubi purulenta est, ut erat in altera de duabus quas supra (z) ex Sepulchreto commemoravi, Observationibus, in qua intestina comperta sunt ad superiora retracta. Sed nec signa deerant erosionis in unum conglomerata, & veluti in globum acta. Vides igitur, quot Observationibus adductis fuerim, ut ubi cum cæteris illis indicis ascitem fuisse, audirem, intestinorum aliquam cohesionem esse posse, suspicarer.

31. Sed quoniam intestina coherere quidem possunt inter se, neque tamen suis relicti sedibus, ita conglomerari, ut alia aliis imposita, ex se tumorem, & quasi globum efficiant; si forte quæris conglomerationis causas: haud scio, an aptiores excogitare possim quam dolores: quorum vi tum sedes intestinorum mutantur, tum cohesiones fiant. Et mutari quidem primas haud raro in iis qui intestinorum doloribus sunt obnoxii, aliis Literis (a) ex ejusmodi corporum Observationibus ostensum est, ut cum interclusi flatus distentum Colon alio tunc urgent, aut deturbant; quam causam ad Tenuia intestina si transferas, intelliges facile, quomodo dilatata quædam eorum partes se possint illuc attollere ubi non erant, & eas quæ ibi erant, detrudere, & sibi subijcere. Huc adde earum quæ convulsivis obdolosæ contractionibus torquentur, motus: ad ejusmodi in mesaræo contractiones, quibus crispatum annexa Tenuia intestina adducat five aliquot, five pleraque, five omnia; & multo clarius apparebit, cur in maiores, majoresve globos cogantur. Quod si diutius in novo eo posito ab iis quæ dicta sunt, causis retineantur, & alterum ad alterum apprimantur, apparebit simul, cur ob dolores coherere ibi incipiant inter se, præsertim si adjungas ex-

pressas ab iisdem contractionibus & plures, & viscidiores ex eorum superficibus remorantium tunc humorum particulas, per quas denique in corporibus præcipue in quibus dominetur viscidum, quasi per quoddam vitrum eadem superficies inter se conjungantur. Nec vero novum est connecti ob dolores, & conglutinari intestina. Sic enim; ne ab Sepulchreto longius te abducam; in ea quæ diuturnis eorum cruciatibus confecta fuerat (b), deprehensa illa sunt multis in locis mutuo connexa; in altera autem quæ post ingentes, & incredibiles ventris dolores obierat (c), conspecta sunt intestina Tenuia protuberantia omnia arctissime inter se connexa. Quod verbum protuberantia si ita accipias, quasi in unum prominentem globum coarctata significet, ad eundemque modum quæ ex Fantoni Observatione retulimus supra (d) in unum veluti corpus conglomerata; simul ex dolore & connexa, & conglomerata inventa fuisse, intelliges, non fecus atque a nobis in Episcopo reperta sunt (e); quanquam in his aliis Observationibus peculiaris & circumscriptus extoritur tumor non memoretur, neque in una earum poterat, in qua ingens copia effusi cruenti feri totum abdomen distendebat. Et si vero non, ut Episcopus, sic etiam Monachus (f) doloribus cruciatur; tamen his antea caruisse, pro certo non scio.

32. Quod autem non haberet hic, ut Episcopus, intestina dumtaxat conglutinata, sed per substantiam quasi cartilagineam inter se nexa; id neque mihi mirum est qui pariter post ascitem id viderim, ut dixi (g), cum Valsalva, neque ignorem, peritonæum ipsum, cujusdemmodi productio est extrema intestinorum tunica, in hydropicis valde crassescere, imo temporis successu cartilagineam duritiem acquirere ex observatione Pauli Barbette (h), qui id, ut in paracentesi abdominis scitu necessarium, admonuit. Sed & sine acite per dura ejusmodi vincula intestina aliquando connecti, Saporiti Observatio docet apud Vallisnerium (i). Invenimus intestina Crassa, inquit, præcipue ubi in vicinia Duodeni flectuntur, mediis protuberantibus callosis invicem, & cum adjacentibus consolidata, ut obscurum esset unum ab altero distinguere, & quod pejus erat, eorum substantiam ad instar durissimæ cartilagineis concretam, & crassam, ut nulla fere caritas amplius superesset. Qualem substantiam & angustiam in Recto intestino deprehendit Ruyschius (k), cum illud cuneo ferro, malleoque ligneo ab Sacro osse dividere coactus est. Sed olim Benivenius (l) intestinorum idem, ut videtur, vitium, quod in vivente præfenserat cum alvum prementi nescio quid durum reniteretur, post obitum invenit. Aliamque ex Hollerio Observationem profert Donatus (m), aliaque ex aliis Stalpartius (n). Apud quem (o) cum exempla indicantur ejusmodi etiam coilius, qui referri ad eum possit quem ad extremam Coli partem in Monacho nostro inventum dixi, aliaque insuper extent in Sepulchreto (p); non aliud addam, nisi hoc tamen peculiare in Monacho habuisse, quod ibi Colon ex fibris omnino carneis consistere videbatur: an quod ex prægresso ulcere sic ruberet? Quod si fuit; intestinorum doloribus antea, ut conjiciebamus, carere non potuit. Sed jam ad viscerum alterius generis, tumores veniamus.

33. MULIER annis, ut videbatur, quadraginta non multo minor, jam ante anam profluvio sanguinis ex genitalibus, laboraverat. Hoc uterinus fluor exceperat, quo colore, aut odore, incertum; illud certum, cum acerbissimis hypogastrii, & huic subjeclarum partium, nocturnis præsertim, doloribus fuisse conjunctum, & cum tumore, in quem unum coaluisse, dicebat, tubercula quædam, disiecta olim in medio hypogastrio percipienda. Erat nunc is tumor in ea ipsa fede, eo tamen utque ascendens, ut ab umbilico vix duobus distaret transversis digitis proportionem larus, adeo prominens extorsum, ut vel eminus in oculos incurreret, subrotundus, æqualis, sitangeres, & renitens. Assiduam acceperat urinæ stillicidium, dolor spasmodicus ad guttur, nausea, & vomitus aliquando, macies, febris. Quibus malis omnibus sic debilitata, & fracta sub initium A. 1741, venit in Nosocomium Patavinum, ut intra sex, septemve dies defeceret, nemine dubitante, quin ex cancroso uteri tumore decessisset. Et cancer quidem uterum ex parte eroderat; sed tumor ad ipsum non attingebat, ut per dissectionem inveni-

& ma-

& magnæ Doctorem, ac Studioforum Juvenum coronæ ostendi. VENTRE enim patefacto, continuo apparuit, vesicam urinæ distentam; id quod nemo, jugiter lotio, ut dictum est, destillante, inducere in anum potuisset; magnum illum tumorem fuisse. Coaluerat illa anteriore facie alte supra pubem cum ventris parietibus: & si anterioris ejusdem faciei, ac summi fundi non modicum spatium exciperes, suos reliquos parietes omnes ex dura albaque substantia digiti crassitudine habebat, ut, urina educla, perspeximus, cujus magnam vim continebat non lixiviosa, non crassa, non grave olentis, sed ferme aquosa. Intima vesicæ facies sana erat, tenuibus dumtaxat, & raris sanguiferis vasculis distincta nonnullis locis; ut vesicæ orificium, ad quod sæpe conferta esse solent, iis vasculis omnino careret. Ab ejus orificii lateribus singulis singula intra vesicam prominebant alba corpora, abnormis figuræ, pollicis apicem æquantia, producta ex substantia urethram ambiente, quæ substantia hic erat tota facta crassior, & dura, & alba, quo colore ipsa quoque intus erat urethra. Porro tota illa urethrum pars quæ inter vesicæ membranas traducitur, magis quam solet, intra vesicam prominebat donec in oscula defineret consuetis ampliora: valdeque dilatati erant toti ureteres, quorum erat alter lotio, alter aere quasi plenus. Sed & renum, sanorum alioquin, & pelvis, & pelvium tubuli erant dilatati. Urinarius Partibus inspicis, genitales perlustravimus. Et primum testes arctius ad parietes Pelvis annexos albo utrumque colore, quorum sinister magnam castaneam, dexter minorem nucem æquabat. Et hic quidem aquæ paucillum, intra aliquam foras vesiculam continebat, cætera albus, ut exterius, & durus: at si intus sub tunica nihil, nisi mollem, & albamque sebi instar materiam habebat. Uterus vero, si fundum spectares, albus exterius, & lavis; intus, & in parietibus sanus, nisi quod hi erant æquo molliores. Sed cervicis exterior facies inæqualiter a tergo turgibat: ex parietibus autem & cervix ipsa, & vagina ab summo ad imum ferme, fiebat crassioribus, albisque, & duris, quorum interior facies, ipsumque uteri osculum erosa erant, atque exesa profundis ulceribus, & discoloribus. Erant enim alba quibusdam in locis, ex atro cruenta in aliis, cinerea in nonnullis. Ex omnibus autem putrida materia, iis coloribus infecta, cultri manubrio facile abradebatur donec ad duram albamque substantiam, ex qua parietes constare dixi, perveniebatur, qualem in substantiam conversum quoque erat quidquid a vagina lateribus esse pingue, & membraneum solet. Sed quamquam a cervicis & vaginæ anteriore facie sic mutata fuerant, ut dixi, & vesica, & urethram ambiens substantia; intestinum tamen Rectum a vagina, quæ multo alioquin magis erat exulcerata quam cervix, illudum potuit separari. In tota autem hac dissectione gravis odor perceptus est nullus. Cætera inspicere nec necesse fuit, nec vacavit. In ventre tamen nihil oculis præterea occurrit quod morbidum videretur, cum ventriculorum maxime contractum, & intestina quoque omnia æquo contractiora adnotaverim; quorum neutrum in ea mirum est, quæ vix aliquid, ob nauseam, cibi admitteret, admiffumque, aliquando, ut dixi, rejiceret.

34. Multiplicem ad cautos reddendos Medicos utilitatem habet hæc Observatio. Quis enim qui ex disiectis olim tuberculis unum factum esse tumorem, & hunc, si ve prægressa, five præsentia attenderet, cum uterini canceri indicis conjunctum audisset; quis, inquam, non uteri ipsius tumorem esse, existimasset? Hic tamen non in uterum, sed ad distentam attingebat vesicam, quæ dum se altius efferre inciperet, proxima intestina sursum urgendo, & partes eorum aliquas inferiores comprimens, illam fortasse divisorum tuberculorum speciem ex iis efficiebat. Quis item qui lotium a vesica non retineri, sed jugi stillicidio effluere intellexisset, suspicatus id quod erat, fuisset, magnam tamen lotii partem in vesica retinere, quod dextere immisso cathetere educi saltem ex parte posset non sine magno misere mulieris levamine? Nam quod Ruyschius (g) eam denique vesicæ plenitudinem in puerpera deprehendit, quæ pariter nihil urinæ in vesica, quamvis magna ejus copia distenta, se credebat habere, haud ab simili, ut videtur, stillicidio decepta; scilicet nullum omnino signum in ea erat puerperæ læsi uteri, ad quem tumor ventris posset referri. Et sane in altera muliere (r), cui sætus indicia erant uterum gravantis, nemo alio quam ad uterum, retulit ventris tumorem, quem tamen magnus faciebat abscessus qui in-

ter anteriores increverat vesicæ tunicas. Ubi igitur formis hypogastrium tumeat, etsi læsi uteri non desint notæ; de vesica tamen quæ ante uterum sita est, non est omnis præmittenda suspicio: nec quia jugiter sibi destillare urinam, ajant, non propterea habendum pro certo est, nihil de ipsa restitare: neque demum tametsi constet, exulceratam cum utero esse vaginam; idcirco lotii adjunctum quandoque stillicidium semper est abanæxæ urethræ, vesicæque exulceratione repetendum. Neutra enim hic erat exulcerata. Sed raro & causæ, & effectus exemplo, scirrhus utriusque durities simul urinæ incontinentiam, simul retentionem faciebat. Duri enim urethræ parietes ita contringi non poterant, ut vesicæ orificium satis occluderetur. Et duri item maxima ex parte vesicæ parietes contrahi nequibant, ut urinæ requirit extrusio: neque hanc adjuvare satis poterat eorum pars reliqua non dura, quippe quæ cum anteriore ventris pariete, tota propemodum, coaluerat: impediabant autem aliquid duo illa crassa corpora quæ a lateribus orificii extabant. Quas ob causas omnes mirum non est, si tantum retineretur lotii, quantum non modo amplificatam vesicam impleteret, sed & ureteres, & renum pelvis, ac tubulos dilataret.

35. Quæ ferme cum super urinariis Partibus, iis qui aderant, exposuissim; tum de genitalibus quædam eorum quæ hic habebis, continuo adjunxi: Scirrhis esse uterum suis cum appendicibus maxime obnoxium, morbo perdifficili, nisi cito cognoscas; insanabili, si in cancrum degeneraverit. Ex Magistris meis alterum, nempe Albertinum, auditum a me esse cum diceret, scitorem uteri, qui tangenti videbatur scirrhus, solo chamæpitys usu, nullo exterius adhibito auxilio, nullaque excretionem consecuta, feliciter discussisse: alterum vero, id est Valsalvam, in scriptis Consiliis five pro uteri, five pro mammarum canceris tumoribus, affirmare solitum fuisse, inter magis efficacia ad tardandum uterumque incrementum prædicia usui sibi compertam esse venæ sectionem quotannis quater, bis videlicet vere, & bis autumnis institutam. Esse autem manifestum, in his vires; rationi conveniens, in illis scirrhi causas esse attendendas. Nam ut chamæpitys incidendo, abtergendoque ex Majorum Observationibus viscerum obstructions, & mammarum durities tollat; me tamen ut non illis facile quæ uteri profluvii, quemadmodum in nostra historia, obnoxia essent, sic libentius iis daturum quæ ex articularum doloribus translata ad uterum materia, in levem nuper hujus obstructionem incidissent; mensura enim ciet, sed arthritidis causæ, ut nostri, adversatur. Porro multum discrepare inter se extensiones, species, sedes, origines scirrhorum Uteri. Extensum late hunc fuisse ad vaginam quoque, & annexas huic partes, non modo a lateribus, sed ab anterioribus etiam, urethram videlicet, ac vesicam qua facie uterum hæc spectabat. Fuisse totum ex uniformi alba, duraque substantia, eaque istiusmodi, ut vel in cancrum exulceratum conversa, cujus odor solet esse fœdissimus, nihil grave oleret. Sedem huic, quod ad ipsum uterum attinet, fuisse cervicem totam, cum sint quibus cervicis, aut fundi pars, aut fundus totus praebeant sedem. Origines denique aliis esse interius, aliis exterius. Quæ cum pressio, & sic etiam quæ ad sebum attingebant in teste altero deprehensum, attingissem; finem dicendi feci.

36. Tibi vero eorum quæ tunc pressius dixi, ultima nunc paulo fufius explicabo. Scirrhorum uteri origines, five primordia non semel tum interius, tum exterius vidisse me, credo. Et de interioribus quidem alius erit opportunior scribendi locus (s); hic exteriora memorabo. In externa igitur uteri facie prominere vidi tubercula, in ejus proxima substantia defixa, alias ex rubro liventia, alba alias, & scirrhusa duritie, ut meas relegens Epistolas (t), aut eas quas sum scripturus (u), inspiciens, cognosces. Ea amplificari, & excrescere in scirrhosos tumores, existimo. Nam pustulam quam alias (x) tibi descripsi, in eadem fede a me visam, & corpusculum quæ Valsalva disiecta vidit (y), & tuberculum quod Santorinus (z) quippe hoc de genere cysticorum tumorum, cætera vero aut ibi pus jam habentia, aut, quod similia alibi ostendebant, idem postea, aut materiam pustaceam habitura, longe alio pertinere, non dubito. Ulcera enim uteris exterius quoque nonnunquam habet, nec ea dumtaxat, sed & excrescentias, ex quibus ingentes duas in Sepulchreto (a) leges descriptas, quarum altera constabat tunica veluti lardea, aut sebacea,

H 3

al-

(c) n. 29. (p) Obs. Anat. Chir. 45. (q) Epist. 17. n. 17. (r) Epist. 10. n. 13. (s) Epist. 20. n. 37.
(t) Epist. 16. n. 15; Ep. 18. n. 15; Ep. 23. n. 17. (u) Obs. cit. 83. (x) Differt. de Viscer. nexib. infort. n. 14.
(y) Ibid. n. 12. (z) n. 28. (a) Epist. 34. n. 4. (b) l. 3. Sect. 14. Obs. 16. §. 4. (c) Sect. 21. Obs. 41.
(d) n. 28. (e) supra, n. 26. (f) n. 29. (g) n. 30. (h) Anat. Pract. l. 4. c. 2. (i) Opere Tom. 3. P. 3.
(k) Obs. Anat. Chir. 95. (l) De abdit. morbor. & causis c. 34. (m) De Medic. Hist. l. 4. c. 10.
(n) Genet. 1. Obs. 56. & in Schol. (o) in cod. Schol. (p) l. 3. Sect. 13.

(g) Advers. Anat. Dec. 2. c. 9. (v) Vid. Sepulchreti. Sect. hac 21. Obs. 23. in Additam. (f) Epist. 47. n. 26. & seqq.
(t) Ep. 38. n. 28. & Ep. 37. n. 29. (u) Ep. 56. n. 20. (x) Ep. 25. n. 16. (y) Ep. 21. n. 18. (z) Ep. 19. n. 14.
(a) Sect. hac 21. Obs. 54. §. 1. & 18.

venarum ad lienem attinentium valde erant dilatati: quæ autem vas breve dicitur, facile digitum indicem admittebat.

43. Et Blafius (f) cum eandem, quam Ruyschius (r) postea, prolapsi lienis Observationem vulgavit, aliquanto plura quam alter, scripsit de iis quæ in vivente, & post mortem sunt animadversa, & in his *vasa splenica mirum in modum & longitudine, & capacitate aucta*; neminem tamen legisse memini, qui in ejusmodi casibus diligentius quam Manfredius, tumem describeret Splenicorum vasorum. Cæterum quod ad causas attinet morbi hujus, agnosco quidem nimis auctum lienis pondus, quo membranea vincula, ad septum transversum annectentia, laxentur, aut dirumpantur, & sane plerique cum prolapsu id pondus aut memorarunt, aut indicant. Attamen cum ingentium lienum, qui minime prociderant, venit in mentem, quales non semel tibi descripsi (u), aut quales in Sepulchreto (x) legeris; facile intelligo, ad pondus addendas esse causas alias, ut puta illorum vinculorum majorem laxitatem infirmitatemve, aut casum ab alto, aut alia ejusmodi, quæ inter videto, an transferre placeat quod de rene censuit Riolanus (y). *Causa, inquit, luxationis renis potest esse violenta, & diuturna tussis, quæ perenniter agitant diaphragma, renem, huic incumbendum, alterum potest sua sede dimovere.*

44. Quibus autem signis hic dignosci morbus, & internosci ab aliis queat, ex ejus historiis querendum est: quamquam non omnes qui in mortuis invenerunt, ea potuerunt indicare, quæ peculiariter afficerent viventes. Nam certe peculiaris non sunt prolapsi lienis quæ in antiquo præ cæteris exemplo habemus apud Ballonium (z). Neque ex Cabrolii Observatione (a), quæ non diu fortasse post illam priorem habita est, colligere aliud possumus, nisi lienem, ut in mortuo poterat, sic facile etiam in vivo percipi potuisse *natantem per totam ventris cavitatem*. Quod signum non inutile credo, sed primis temporibus, ut de aliis haud semel dixi, magis attendendum. Tempore enim progrediente, potest facile deesse, quippe liene immobili facto, ut in proposita Manfredii Observatione vidisti, & apud Ballonium videbis; nam lien, vesica incumbens, satis contumaciter adhaerebat. Confirmat hoc Riolanus, ubi hunc sibi morbum quater visum in Encheiridio (b) dicit: & certe in Anthropographia (c) duo producit exempla in quorum utroque se lien utero, vicinissime partibus tam firmiter alligaverat, ut in altero, vivente femina, reponi, quemadmodum antea, in suam sedem amplius non potuerit; in altero diu Medicis pro mola imposuerit. Ipse autem has profert (d) notas, ut a prolapsu rene internoscamus, *tumorem oblongum, & vacuitatem hypochondrii sinistri*; quorum hanc nos in jejuno ægrotante queremus, & si percipiamus (quod in eo facile in quolien ante prolapsum tumidus perceptus sit) multo potius notam ad internoscendum a quovis alio duro hypogastrii tumore delapsum in hoc lienem habebimus, quam figuram, quæ in morbidis Partibus, & in hac præsertim, ut vel ipse Riolanus (e) docet, quantum mutari sæpe numero solet, non ignoramus. Ex Blasii (f) autem exemplo colligere duo possumus, alterum, ut si forte quod ipsi accidit propterea, sicut opinor, quia sensum laxatis ligamentis, non cito ruptis, procubuerat lien, contingat nobis gravem tumorem, hypochondrium sinistrum cum aliqua parte epigastrii occupantem, primum percipere, interposito autem spatio temporis hypogastrium magis, quam illa, tenentem, in conjectura confirmemus; nam aliquo loco dumtaxat in quodenum sentimus, attendere, etsi adjuvare aliquando potest, quod sinistrum sentimus; potest tamen nonnunquam decipere, sicuti ostendit Manfredii (g) Observatio, qui ad inguen dexterum invenit. Alterum est, ut si cætera signa lienem indicent, non propterea quia tumor ultra semestrem spatium, quod definitur Riolanus (b), mobilitatem aliquando retineat sic, ut mutato corporis situ, sedem mutet; non, inquam, propterea lienem esse, inficiemur. Ut enim facile alias, quemadmodum diximus, adherere solet, in Blasii tamen casu ultra annos tres & dimidium etiam tum pendulus, pro varia

corporis agitatione, varie ipse quoque moveri potuit. Ex eodem, ut ab Ruyschio (i) narratur, casu discimus, accidere interdum hunc morbum post difficile partum, nec sine dolore vehementissimo: quorum illud ea confirmat quæ de morbi causis addidimus (k), hoc vero admonemur, ne quia dolorem cæteræ historiæ non memorant, idcirco in omnibus, omnino morbi tempore deesse credamus. Antonii de Pozzis (l) historia docet, quamvis magnus lien, sede præ pondere mutata, hypogastrium occupasset annos quatuor & viginti, vixisse tamen mulierem, terque uterum interea gessisse, & vitalem prolem edidisse; ut minus oporteat mirari quod altera illa apud Ballonium (m), semel ad legitimum uterum parienti tempus fœtum retinuerit, in partu demum extincta. Nihil, nisi facile Medicorum errorem in hoc morbo pro uteri gestatione habendo, confirmat Drelincurtii Observatio apud Schorkopffium (n). Exemplum denique Boneti (o) facere potest ad ea comprobanda quæ de ventris doloribus aliquando torquentibus paulo ante dicebamus, nisi alius præterea in ejus Virginis ventre fuisset morbus. Nec plures lienis prolapsi, quam has decem Observationes, accepisse, aut legisse, in præsentia memini, ut jure meritoque Ruyschius (p) potuerit inter ea quæ rariora adnotaverat, *lienem in pelvim prolapsum* recensere. Sex illarum ad feminas attinent, duæ ad viros: ad alterutros autem reliquæ spectare potuerunt, quas indicavit, non narravit, Riolanus (q), cum ajat, imperitos incautosque sic falli *specie mola, vel scirrhus uteri in mulieribus, & in viris specie tumoris glandulosi in star steatomatis in mesenterio latentis*. Mihi necdum contigit, ut per anatomen deprehenderem, cupienti aliquin cum alia, tum præcipue quid annexis pancreati, ventriculo, totisque Splenicorum vasorum truncis tunc acciderat, diligenter inquirere. Et sunt quidem in productis Observationibus, Ballonii præsertim, & Cabrolii, aliqua ad ventriculum attentissima. Sed quoniam aliunde esse poterant, nec Pozzi, & Boneti historiæ satis illis hac in parte respondent, consulto sunt a me prætermissa.

45. Consulto pariter reticui quod ab Hildano (r) in muliere deprehensum est, cum immanem lienem ad hypogastrium quidem extensum legam, non illic prolapsum, ut Viris aliquin Doctissimis visum est, in Observatione ejusdem, ab Hildano facta, commemoratio- ne (s), quam ipsi alteram esse Observationem crediderunt. Sic quoque pro commemoratione habui editæ olim Observationis (t) quod Ruyschius posuit in Adversariis (u): neque enim mirum, si perhenex quadam in hac commemoratione scripserit, quæ cum scriptis triginta annis ante non proflus congruant, quando nec illa quæ tum scripserat, viginti nimirum annis postquam observaverat, satis cum iis conveniunt quæ septem, haud amplius, annis post habitam illam Observationem tradidit Blafius (x), qui & a muliere consultus fuerat, & affuit dissectioni, quam ab Ruyschio peractam dicit A. 1670. die 24. Januarii. Hic vero cum annum eundem ponat, tempus quoque anni satis indicat, cum eandem hanc suam, ait, recenseri historiam Decad. III. Obs. 4. Justi Schraderi, qui ibi ab Ruyschio Ann. 1670. die 31. Mart. sibi narratum scribit, nuper ab se eam esse habitam dissectionem. Quod si hujusmodi Observatio ex iis esset quæ bis intra duos menses uni Anatomico facile posset occurrere; quomodo inter rariores ab Ruyschio (y) fuisset posita? At enim quater id vidit Riolanus (z); bis autem, ut hæc recensens lego, Ill. Swietenius (a) in cadaveribus conspexit *lienem scirrhusum ingentem ad pelvim usque prolapsum*, qui utinam ad cætera addenda otium habuisset. Tu vero memineris, non videri nobis minus veri simile, quod aliquis non semel offenderit lienem prolapsum; sed quod intra bi-mestrem spatium bis offenderit, hoc sane videri. Attamen si verbum illud nuper a me forte nimis restrictè acceptum putas; etsi mihi non ob id unum haud satis convenire cum aliorum antea editis descriptionibus prima illa Ruyschii Observatio visa est; non repugno, quin secundam pro alia habeas, & cæteris annumeres quæ supra (b) sunt recensitæ.

46. De curatione tandem quid primo tempore censeat,

fuerit, & quid præstiterit Riolanus (c), quæ item, liene hypogastrii partibus jam affixo, proposuerit, quæ vetuerit, ex ipso cognosces. Nolo enim jam longam Epistolam longiorem facere, cujus tu prolixitudinem, non tamen cum superioris Epistolæ prolixitudine com-

parandam, feres æquiore animo, cum animadverberis, hac nos, repetitionum oïores, non modo quæ ad Sectionem spectant de Ventris Tumore, sed & quæ ad alteram de Hypogastrii Dolore attinent, propemodum absolvisse. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XL.

Verba fiunt de Lumborum Dolore.

Ventum est ad morbos, quorum peculiaris fedes, & causa sæpe admodum sunt obscuræ, ad eos videlicet qui ad urinas spectant. Ostendit hoc vel ipse, a quo incipimus, *Lumborum Dolore*. Hic enim haud raro ad renes attinet quos arenæ aut calculi male habent: quamquam non minus sæpe aut alio attinere, aut ad renes quidem, sed ab aliis causis affectos, & ipse nosti, & planius intelliges ex iis quas modo tibi describam, Observationibus tum Valsalvæ, tum meis. Nam ex utrisque primæ ad renes, calculosque, posteriores ad alia aut renem, aut aliarum partium vitia pertinebunt. Initium, ut par est, & soliti fumus, ab illius primis capiemus.

2. SACERDOS annorum quinquaginta, ab annis jam bene multis, arthriticis, digitorum præsertim, obnoxius doloribus, tandem & nephritico el correptus. Vomitus non solum biliosæ materiæ crebro, sed & semel sanguinis fuit, qui per nares quoque jam sæpe profluxerat. Posteaquam urina ex pauca, & aquosa, majori copia reddebatur cum mucilaginosa, atque opaca materia, repente convulsi vi totius corporis motus accessere: qui iterum, sed vehementius, redeuntes, necarunt. VENTRE aperto, omnia intestina reperta sunt colore ad lividum inclinate. Ventriculus autem sanus, nullo apparente loci vestigio unde sanguis prodiret. In renibus minimi latebant calculi, nonnulli nigri, alii albicantes, sinuosæ præterea cavæ, in sinistro præsertim, urina plenæ: quæ sua copia pelvim, & huic continuatum ureterem multum dilataverat. In Capite interna cerebri substantia quadantenus, hujus autem præcipue ventriculi fero scatebant. Denique ad digitorum articulos, cute sublata, illico in membrana, tendines obvolvete, tartarea materia deprehensa est, quæ ex albo in flavum colorem vergebat.

3. Cum plura possint, quod in hac, aliisque sæpenu-mero fieri Epistolis; ex proposita Observatione deduci; tum illud præcipue confirmare licet quod in medicina exercenda sæpius occurrit, ad articulorum dolores accedere renem dolores, ad hos denique gravissimos cerebri morbos. Nempe qui arthritidis obnoxii sunt, quanto minus uti possunt corporis motu, tanto minus agitant eos musculos quorum motibus renes quoque attigui coagitantur, ne facile in his urina subsistat, & arenulas, quibus fosta est, deponat. Videbis Boerhaavium (a), & Magistri sentia rectè interpretantem, & illustrantem Hallerum (b). Vide etiam Littrii (c). Observationem in puero, cui ob phimosis cum vix guttatim destillaret urina, eoque inter glandem, & præputium restitaret, incredibilem ibi creaverat lapillorum numerum, quorum, sublata phimosis, nullus amplius productus est.

Concreto autem jam in renibus calculo, sicuti haud raro inde obitaculum fit lotio, minusque propterea se- rum inutile e sanguine eliminatur, ita hoc redundare in cerebrum potest; aut etiam asperitas calculi renes inter- duque vehementius irritando, convulsiones toto corpore ciete, atque ideo intra cranium quoque. Ultra malueris ratione convulsivos motus in proposito Sacerdote, mortemque ipsam explicare, arbitrium tuum facio: quamquam secundum comprobare videtur mihi mucus mucilaginosa materiæ, cui mictui illa successerunt. Scilicet is mucilaginofus humor, quo ut vesica, & ureteres, sic etiam, quippe ex eadem continuata tunica facti, pelvis, & ad hanc pertinentes tubuli qui excipiunt renum papillas, intus obliuuntur adversus urinæ acrimoniam, is igitur humor auctus, & crassior factus a calculi irritatione, hujus vim minuit donec calculo adhæret, in-terque ejus asperas facies, & illam tunicam se interpo-

nit. At quando sive a perperam datis medicamentis quæ urinam importune moveant, sive a causa alia aliqua illinc detrusus, tunicam inermem relinquit; tunc vero acriora fiunt irritamenta, necesse est. Prima vero de duabus explanationibus uti malueris, ut opinor, in ea quam protinus attexam, historia.

4. VIRO sexaginta annos nato, obefiori, qui, dum juvenis erat, difficulter mingebat, ut elevatis pedibus aliquando mingere cogeretur, ex toto urina supprimitur cum dolore vehementissimo ad lumbos, tamen sine ullo vomitu. Magna quotidie febris, rigore, & frigore ad duas horas durantibus. Cathetere immisso, sanguinolentam mingit materiam, unaque calculum parvæ amygdalæ magnitudine. Hunc excipit mictus purulentus. Sed postmodum clarescit urina, sitque sanorum similis, non sine aliquo tamen fœtore: semperque perstat ad lumbos dolor. Morbo, sicut diximus, in speciem remisso, ea nocte quæ ad quintum diem attinebat, quadam ingruente quasi epileptica totius corporis concussione, cum sanguinolenta ad os spuma æger excedit e vita.

VENTRE dissecto, vesica apparuit urina plena, nisi quod male olebat, secundum naturam, ut videbatur, se habentis. Crassæ factæ erant carneæ vesicæ fibræ, ut cordis lacertulos representarent. Circa ejus cervicem nonnulla arenulæ grana reperta sunt. Cæterum in vesica nullus inventus est obex quo mictus prohiberetur. Ureteres, & renes omnino sani. In Thorace pulmones turgabant, atroque erant colore infecti: sinister autem diaphragmati arcu adhærebat. Cordis ventriculus dexter polyposam concretionem habebat; sinister fluido sanguine erat plenus.

5. Quæcumque olim fuisset causa mictus difficilis, a quo veri simile est, ut alias (d) indicabitur, fibrarum vesicæ crassitudinem fuisse relictam; novissimus; quod ad urinarias Partes attinet; morbus a calculo videtur repetendus. Is enim in renem alterutro tanto facilis gigni potuit, quod obefiori homini pinguedinis pondus minus facilem reddebat corporis exercitationem (e). Rationi huic qua Boerhaavius (f) lapidem credidit itidem in rene altero (neque enim semper uterque pariter est ad hanc rem dispositus) præpinguis hominis concrevisse, aliam quoque addas licet, quam cum Austore eodem (g) repetes a pinguedinis copia, renem, & ureterem premente, eoque non secus ac rarior corporis motus, lotium morante. Quin etiam in iis qui se multis ac sæpius ingurgitantes, ventriculum, & intestina plerumque habent nimis distenta, ad cæteras causas quibus renem calculis obnoxii fiunt, hanc mecum adice quod renes, & præsertim sinistram, ambosque ureteres, quippe inter posteriorem ventris parietem & viscera illa positos, plus justo compriment. Quæ causa cum ad cæteras illas accessisset in generoso Viro quem describit Scroecius (h), tanto minus mirum est, in uretere altero non exiguum calculum, in rene autem opposito magnum cum tot aliis minoribus fuisset deprehensos. Compresso autem a copia sive pinguedinis, sive ingestorum, eo magis in obefioribus noxia est, quod supini facile cubant: qui corporis situs tum renes, & ureteres magis ponderi imposito subicit, tum quanto frequentior, & diuturnior est, tanto magis descensui urinæ officit. Sed & quandam Cl. Fantoni (i) Observationem legens in viro, nephriticis doloribus, a sinistris præsertim, obnoxio, rene autem sinistro, qui duplo crassior erat, & geminum fovebat calculum, obdecto concreta quadam materia lardo persimili, hic transversum minorem digitum, illic pollicem & amplius crassa, renem autem alterum non tegente; facile de pin-

(f) P. 1. Obs. Med. 14. (g) Obs. Anat. Chir. 62. (h) Vid. præsertim Epist. 36. n. 11. & 37.
(i) l. 3. Sect. 16. Obs. 9. & seqq. plurib. & Sect. 23. Obs. 34. §. 1. 2. 3. (j) Anthropol. l. 2. c. 26.
(k) Epidem. l. 2. Vere A. 1578. (l) 6. in Obs. Var. (m) l. 2. c. 26. (n) l. 2. c. 27. (o) Encheir. c. cit.
(p) Ibid. (q) Obs. supra ad n. 43. cit. (r) supra, eod. (s) Encheir. c. cit. (t) Obs. 62. cit. ad n. 43.
(u) eod. n. (v) Eph. N. C. Dec. 1. A. 4. Obs. 30. (w) loc. cit. (x) Diff. supra n. 40. cit. thes. 22.
(y) Sepulchr. l. 3. Sect. 14. Obs. 37. (z) Resp. ad Bidl. Vindic. (a) Encheir. c. cit. (b) Cent. 2. Obs. 45.
(c) Epist. 35. (d) cit. supra ad n. 43. (e) Dec. 2. n. 9. (f) cit. supra ad n. 43. (g) Vid. supra, n. 43.
(h) supra, n. 44. (i) Comment. in Boerh. Aphor. §. 535. (j) n. 44.

(c) Encheir. & Anthropol. capitib. ad n. 44. supra cit. (d) Prælect. ad §. 352. Infit. & ad §. 365.
(e) not. p. ad primum, & d. ad alterum cit. Boerh. locum. (f) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1706. Obs. Anat. 6.
(g) Epist. 42. n. 33. (h) Vid. supra n. 3. (i) ad §. 365. ibid. cit. (j) ad §. 387.
(k) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 147. (l) De Obs. Med. & Aust. Epist. 9. n. 14.

gui materia ibi quoque noxia cogitabis. In nostro igitur, ad quem redeo, Viro genitus calculus, five renis alterius ureterem summum, five urethrae initium claudendo, & lumborum dolorem afferre potuit, & lotii suppressionem. Nam etsi non semper, haud rarissime tamen contingit, ut uno affecto rene, alter quoque in consensum trahatur. Deturbato autem urinae incumbens vi calculo, & in imum vesicae orificium protruso, lumborum tamen dolor peritare potuit eadem ratione qua renum dolor aliquando solet vesicam versus extendi, per ureteres videlicet hinc renibus, inde vesicam continuatos, & cum plus urinae jam capere vesica nequit, ipsos quoque urina distentos. Quae etsi per immixtam fistulam deduceretur, tamen quam cito rursus vesicam impleveret, haec post aegri mortem inspecta ostendit. Quod si, quia sani vili sunt ureteres, non putas, calculum, nisi cum minor esset, eos pervasisse, neque lotium distendisse; quamquam & parvus erat calculus, & brevis distentio fuit; at tu distractos saltem concipe a calculo, summam, in quam se intruserat, urethram figura sua usque adeo lacescente, ut sanguis primum, deinde pus, foror demum quo lotium infectum erat, inde petenda videantur, quando aliunde non licet, uti ex urethra, quam perfectam fuisse, non legimus. Ut neque legimus inspectum cerebrum, in quod credibile est, suppressa urina, impurum serum ex sanguine se effudisse, & brevi mora acrius facium epilepticam illam convulsionem, mortemque attulisse non secus atque, ut opinor, duobus attulit quorum historias in XXII. quam nos sequi hic vides, Sepulchreti Sectione (k) habes, a renum lapidibus pariter, & urinae suppressione non sine convulsionibus decedentium; ut exempla alia plurima inducā ipsius ab urinae suppressione, apoplexiae praetermittam, & nominatim illud Koenigii (l) in Senatore cuius ureteres calculis erant obstructi, renes autem, & dexter praeteritum, aequo majores, dilatatis tunica multo sero tumidis, per multis obhaerentibus scatebant lapillis.

6. Cum modo indicatum sit, posse a vesica dolorem ad lumbos propagari; atque huc essent aliae Valsalvae Observationes, idem aliunde profectum commonstrantes, nisi priusquam a renibus discudamus, praestaret ostendere, horum, & quod consequitur, lumborum dolorem causae quidem quae in renibus sit, nec tamen calculus sit, nonnunquam esse imputandum. Rarior, sed non incredibilis causa sunt vermes, quos qui in renibus non caninis modo, sed & humanis deprehenderint, multos nominat Dominicus de Marinis (m), ad quos magna ex parte in Sepulchreto quoque (n) memoratos, addas alios quosdam qui in eodem (o) indicantur, & qui praeterea a Vallisnerio (p), aut ab Alghisio (q) ad Vallisnerium scribuntur, praeteritum vero post Redium, Vallisnerium ipsum, & Carolum Drelincurtium (r). Ex his tamen omnibus perpaucos invenies, neque eos fere in observando cautiore, qui intra ipsos hominum renes vidisse se, scribant; ut nisi in canibus, martibusque pro certo sciremus esse deprehenso, fortasse illorum Observationes partim in dubium vocaremus, partim aliter explicaremus, minchi post nephriticos dolores oblongi, teretis polypi, qui Sponio (s) pro lumbrico a primo imposuerat, non obliiti. Quanto igitur certarum in canibus Observationum magis augetur numerus, tanto etiam magis credibile sit, posse idem in hominibus quoque contingere. Hac mente quod Valsalva conspexit non multo secus ac Illustri quoque Swietenio (t) accidit, describam.

7. CANEM ille masculum, Anatomae studio incensus, perfecit, cum, loco renis dexteri, corpus invenit quod exterius quidem renem propemodum aemulabatur, at sub externa membrana teneum corticem glandulosum habebat, ad quem pertinebant sanguifera vasa, sub cortice autem caveam, quam membrana admodum laevigata convelliebat, pluribus perforata foraminibus ad eum corticem pertinentibus, ut ex hoc per illa defluere in caveam lotium videretur. In cavea vermislata tres circiter ulnas longus, crassitudine autem calami majoris ex iis quibus utimur ad scribendum.

8. Redius (u) quidem hoc verme in rene crassio-

res, sed non aequo longos invenit. Ulna ipse, & Kerckringius (x), Vallisnerius (y) quatuor palmis, Drelincurtius duobus pedibus longiores offenderunt; ut animalis non crassissimi longitudo ulnarum circiter trium mira nimium videri possit, nisi cum mortui aucta multum est, ut ego (a) in alio vermium genere, in hoc autem ipse Redius facile accidere, adnotavit, aut sicuti apud Drelincurtium (b) duo fuerunt quorum alterius rostrum circa alterius caudam arcissime esset defixum. Nam & bini aliquando sunt uno in rene, dispari quidem longitudine (c), ut Redius quoque (d) observavit, at pari a Blasio (e) picti sunt, hique ex homine emaciato, qualis alter fuisse legitur apud Zacutum (f) in cuius renibus vermes, at multis partibus breviores fuisse dicuntur colore albo, cum rubicundo essent in Blasio Observatione, quo colore semper in canibus & Redius, & Drelincurtius, hic interdum vivos, ille mortuos confexere; hic non nisi in maribus, & a dextris, ille etiam in femina, & a sinistris. Dolores fuisse renum acerbissimos, Zacutus scripsit: quos etiam in canibus perpetuo significatos esse clamore, Kerckringius, & Boirelius (g) testantur, cum ceteri quos nominavi, id omittant. Quod reliquum est, de horum vermium origine, ut puta an in canibus ex rubellis iis sint quos in tuberculis quibusdam haud procul interdum a renibus alias (h) descripsi, ab illis erosis in hos nonnunquam transeuntibus, in tanta longitudinis imparitate, non facile affirmaverim, nisi prius de utrorumque structura certiora nobis innoscant. Blasio quidem renales suos quasi ex annulis plurimis affabre junctis constantes descripsit, pinxitque; sed ei picture Sculptorem & geminum caput, & oculos de suo crediderim addidisse. Vallisnerius animadvertit, quem ipse vidit, ex Latorum genere non fuisse, qui potius esset teres, sed neque ex ullo alio genere quod alii, quantum ipse sciret, intestinis unquam inclusum comperissent. Haec Vallisnerii animadversio dubiam mihi reddit propositam ab Redio structuram, quippe cum Teretibus intestinorum vermibus, aut ab Redio ipso describuntur, ferme communem; ut illa praeterea quae ab descriptione hac dissentientia adnotavit Vallisnerius (i). Verum ut omnia de renalibus vermibus satis certa, & constantia essent; tamen illorum parvitas qui in iis tuberculis canum sunt, necessariam intimae fabricae comparationem perdifficilem redderet. Quem laborem aliis, minus quam nos occupatis, relinquentes, interea ad alias, ut promissimus, Valsalvae historias transeamus, in quibus lumborum dolorem a causis extra renes positae observaverit.

9. VIRGO annorum circiter viginquaginta, ab alto cadens, gravante ad lumbos dolore, & febre afficitur. Horum utrumque aliquantum mitefcit. Verum aliquot post diebus recrudescens, accedente sensu ponderis in ventris cavo, vomitu, & dejectione modo viridis, modo nigricantis materiae, tandem ad interitum perducit.

DUM VENTER fecatur, illico sanies effluit, quae, spongiosa collecta, octo circiter libras pendit tota. Intestina erant inter se per tunicam anteriorem connexa, sic tamen, ut in eorum interstitiis crassior lateret sanies. Ceterum intestina ipsa, & ventriculus nihil in se vitii ostenderunt. Hepar albicabat, exteriorque adhaerentem habebat crassissimam saniosam materiam. Sed omentum a sinistris, iliacam regionem versus, annexum peritonaeo ex ea parte ulcus patefecit.

10. Quaecunque ea ratio fuerit cur a casu illo sit laesus intimus ventris paries iliacam regionem versus; ibi certe abscessus genitus est tantus, unde copia illa potuerit saniei effluere. Pure confecto, id accidit quod Hippocratis aphorismus (k) docet, ut dolores, ac febres aliquanto mitiores fierent. Abscessus autem disruptionem recrudescens significavit, ut puris in ventrem effusio, in ventris cavo ponderis sensus. Doloris vero lumborum causam non quaeres, cum abscessus sedem in ea abdominis parte fuisse, memineris quae in iliacam vergebat regionem; fibrae enim Transversorum musculorum quae in illa ipsa parte sunt, ab lumborum vertebrae, ut nosti, exoriuntur: ad extrema autem musculorum, firmius praeteritum ad os alligata, distractis, erosive muscularis acrius dolores percipi, non est cur miremur.

11. Ad-

11. Additur huc alias Valsalvae Observationes dolorum ibidem sevientium a causa vel extra ventrem & abdomen posita, in memoriam redeo, a me tibi aliis jam Litteris (l) fuisse descriptas, & ex affixione appendicis diaphragmatis, actionem ad has causas, in thorace latentis, esse explicatam: quo fortasse Jacotii quoque Observatio attinet, in una ex proximis Sepulchreti Sectionibus (m) legenda. Quod si causa locata extra ventris cavum efficere id potest; quanto magis ea poterunt quae aut in lumbis ipsis, aut in ventris parte aliqua sunt, lumbis addita, aut ad eos alligata? Videbis eas causas fuisse, & singillatim recensitas in Riolani Encheiridio eo capite ex quo relatae sunt in hanc XXII. Sepulchreti Sectionem in Scholiis ad Obs. 38. primam; idem enim per incuriam repetitus est numerus: pleraque autem in eadem Sectione exemplis comprobata, ut ex rheumatismo lumborum Obs. 29. ex ferro in lumborum vertebrarum tubo Obs. 33: ex harum erosione Obs. 35. & 40: ex lapillis, aut, si mavis, ossiculis in arteriis lumbis Obs. 31: ex mesenterii vitio Obs. 38. secunda, 39. & 41. §. 1. 2. 3. 6. 9. & Obs. 1. in Additamentis: ex uteri malis Obs. 41. §. 4: ex scirrho intestini Ilei exulcerato Obs. 32. atque; ut alia nunc omittam; ex pancreatis morbis Obs. 25. 38. secunda, & 41. §. 3. adderem etiam ex §. 7. nisi eadem esset, sicuti quae §. 6. & 8. eadem sunt ac quae modo sunt indicatae 38. & 25. hic per oblivionem repetita. Afficit autem pancreas cum per se vertebrae proximas, tum saepius quam Medici plures opinantur, ut recte est a Franc. Sylvio (n) animadversum, per fucum, quem, sicuti & jecur, tunc praeter naturam se habentem immittit in Duodenum intestinum, attingit, annexumque iisdem vertebrae, & reni dextero, unde sensus in pluribus variis, praeteritum vero ardentis doloris, renibus haud raro innoxii attribuit. Sed jam ad renes ipsos, & primum quidem ut calculi affectos, redeundum est, si nostras volumus eodem ac Valsalvae Observationes ordine tecum, ut sumus polliciti, communicare: quamquam cum ea quae illustriores sunt, ad alias Epistolas certis de causis, ut tum videbis, sint differenda; hic unam dumtaxat, & quamvis peculiariter quae praecesserant, signorum historia carentem, tamen haud inutilem, subiiciemus.

12. MULIER decesserat in Nofocomio Patavino cum septem jam menses uterum ferret, A. 1708. mense Martio. VENTER propterea, & uterus statim a morte incisi fuerant, scilicet detractus tum vivus, mox autem mortuus; cum ego qui tunc forte Patavii eram, uteri cervicem quae etiam tum erat integra, & renes, quaedam accuratius observaturus, acciperi. Muci copiam intra eam cervicem, & vesiculas eodem foetas, numero, & magnitudine valde conspicuas, & superficiem uterini osculi obducentes, hic fuisse memorare nihil attinet. Renes vero sunt digni qui describantur. Cum enim sinister major esset, quam corporis magnitudinem requireret, suosque ostenderet canaliculos magis quam soleant, crassos, eoque omnibus qui forte aderant, maxime patentes; contra dexter tanto erat minor, ut renis Succenturiati magnitudinem, crassitudinemque non superaret, ejusque parvitate ureter, & vasa Emulgentia respondebant. Et ne sic fuisse a primordiis, crederes, colore erat qui morbidum significaret, & tubulos quidem adhuc habebat qui papillas excipere solent, sed contractos, substantiam autem reliquam pene ad nihilum redactam; ut si calculum, minime rubentem, minimeque croceum, reni in situ, & calculosam hinc inde materiam demeres, vix aliud superesset.

13. Quod dixi hanc Observationem haud inutilem fore, sic accipias velim, quod occasionem det nobis plura examinandi, quae de renum calculis, & vitii agentes Medici tradidere, velut ex ista ipsa apparet Sepulchreti Sectione XXII. Et primum licet Coitero (o) acciderit, ut dextrum renem magis atque sinistrum exulcerationi obnoxium inveniret, sicque etiam fuerit in nostra muliere; tamen, si totam hanc percurras Sectionem, ex renibus quorum substantia exulcerata, aut absumpta

fuera, longe plures fuisse comperies sinistros, quam dexteros: & sane si frequentior renum exulcerationis causa in calculis quaerenda est; hi sunt, confirmante Boerhaavio (p), rariores in dextero, nec ratio deest ab doctis Viris excogitata (q), quod sanguis videlicet multo facilius ob breviorum, ac liberiorum Emulgentem venam revehatur ex rene dextero. Et cum alias alii rationes attulerint; in re tamen ipsa conveniunt, ut Frider. Hoffmannus (r) magisque is quem laudat, Carolus Pifo (s), discrete scribens, ex centum nephritide (calculosa) laborantibus octoginta & amplius renem sinistram dolere, experientia teste, sive in omnibus nephriticis fere, quae est, inquit (t), observatio Dodonaei, & nostra quoque. Igitur etsi veritas ex Caesarea Academiae Voluminibus illa e quibus potissimum soleo in his Epistolis exempla petere, in Observationes nonnullas incides, quae aut (u) renes ambos pariter a calculis intus absumptos, aut (x) dextrum solum iis gravatum, aut (y) si utrumque, multo magis dextrum; tot illas tamen habebis quas hisce opponas, quin ex iisdem Voluminibus alias insuper quas illis adjungas, ut ubi (z) calculos in sinistro dumtaxat rene describit, vel si in utroque, aut (a) plures aut (b) majores, gravioresque labem sinistro afferentes, quam dextero, in quarum Observationum altera illud obiter adnotabis, fuisse eorum calculorum partes quasdam crystallinae duritiae, & splendoris nitidi, sive pellucidas. Habebis inde exempla (c) aucti, quamvis intus exeli, vel alio vitio affecti aut sinistri tantum, aut multo magis sinistri, quam dexteri: haecque duae purulentorum renum Observationes a Cl. Coschwitzio (d) propositae amba pariter confirmabunt. Verum jam satis exemplorum: itaque sciens mitto cetera, in quibus & illud est ex Cl. Fantono supra (e) indicatum, uno excepto quod ex Verneii Observatione idem (f) memoravit, quippe non praetereundo, ut rara causa intelligatur purulentae dejectionis. Scilicet pus e Colo intestino proveniebat quod certo loco ulcus viciniae Partis eroderat. Ea autem Pars ren erat sinister.

Ex his quae dicta sunt, aliquid utilitatis existere posse, vides, cum renalis affectionis dabilia, ut saepe, signa se produnt. Si enim ad illa hoc accedit, ut sint a sinistris, paulo minus dubia fient, quam si essent a dextris.

14. Porro Eustachius (g) cum in Bonifacio Corneo renem alterum offendisset magnitudine parvam castaneam vix aequantem, alterum autem magnum; sed illum tantum, hunc putrem calculisque, ac saniosa materia turgidum, censuit, illius parvitate sanguinis penuria debere, quippe copia ejus maxima in alterum conflante quo vis morbi ac stimulus concitabat. Si revera parvus sanus erat, neque ejus exiguitas veterum lesionum vestigia occultabat; non est mirandum, quod Virsumsum ad eam confugere explicationem coactus sit. Aliis vero ubi ren minor morbidus est, contraria placet explicatio, uti & nobis in proposita muliere. Rene contracto, ejus quoque vasa, ut vidimus in illa, contrahuntur. Quod igitur sanguinis in eum jam ferri non potest, in alterum per oppositam arteriam divertit, ipsumque distendit. Credo autem, & contractionem alterius, ejusque vasorum, alterius vero distentionem interdum posse adeo augeri, ut hic immanem in molem excrescat, ille vero nunquam fuisse videri possit. Scilicet sanus, si firmus sit, non magis augetur quam influxus sanguinis requirit, uno in rene id quod antea in duobus, deposituri. At si laxior natura sit, ad eamque laxitatem morbus accedat; credi vix potest quantum incrementum nonnunquam capiat. Ostendit ren ille quem Cl. Valcarengus (h) invenit decuplo majorem, magisque is qui in Regia Scientiarum Academiae Parisiensis Historia (i) memoratur librarum pondo triginta quinque; ut nihil hic dicam de altero, duplo, eoque amplius quam iste ultimus, graviore, quem ex Monginotii Observatione Prael. Fantonus (k) commemoravit. Contracti vicissim ex morbo, adeoque attenuati atque absumpti, ut a primordiis defuisse Viri doctissimi existimaverint, in illis mihi suspicio est qui renum doloribus a calculis, vitiosis aliis laborant, ut

(l) Epist. 16. n. 40. & 41. (m) 25. Obs. 14. (n) Vid. extrema Scholia ad cit. Obs. 38. primam. (o) Obs. 23. §. 3. (p) Prescript. ad Litter. §. 332. (q) Vid. Haller. not. g. ad eund. locum. (r) Medic. Rat. T. 4. P. 2. S. 2. c. 6. in Theat. Pathol. 2. & 4. (s) Obs. de Morbis a Ser. colluv. §. 4. c. 1. post Obs. 100. (t) 10. Prael. paulo ante Theor. 4. (u) Dec. 3. A. 5. Obs. 33. (x) Ad. T. 1. Obs. 20. & 217. (y) Cent. 1. Obs. 29. & Cent. 3. Obs. 45. (z) Ibid. in Append. n. 1. (a) Dec. 3. A. 3. Obs. 122. (b) Ibid. A. 7. & 8. Obs. 121. cum Figuris. (c) Cent. 8. Obs. 100. & Cent. 9. Obs. 64. & 84. (d) P. 6. Obs. Med. 12. Tab. 9. Fig. 6. & 7. (e) Sepulchr. Sect. hac 33. §. 5. (f) Ibid. n. 11. (g) Observ. cit. (h) P. 6. Obs. Med. 12. Tab. 9. Fig. 6. & 7. (i) Sepulchr. Sect. hac 33. §. 5. (j) in Addit. ad eand. Sect. Obs. 2. (k) Epist. Anat. 9. n. 44. & seqq. (l) Miglioramenti d'alcune Osservaz. del Redi n. 13. (m) 47. Sect. 11.

(1) Epist. 16. n. 40. & 41. (2) 25. Obs. 14. (3) Vid. extrema Scholia ad cit. Obs. 38. primam. (4) Obs. 23. §. 3. (5) Prescript. ad Litter. §. 332. (6) Vid. Haller. not. g. ad eund. locum. (7) Medic. Rat. T. 4. P. 2. S. 2. c. 6. in Theat. Pathol. 2. & 4. (8) Obs. de Morbis a Ser. colluv. §. 4. c. 1. post Obs. 100. (9) 10. Prael. paulo ante Theor. 4. (10) Dec. 3. A. 5. Obs. 33. (11) Ad. T. 1. Obs. 20. & 217. (12) Cent. 1. Obs. 29. & Cent. 3. Obs. 45. (13) Ibid. in Append. n. 1. (14) Dec. 3. A. 3. Obs. 122. (15) Ibid. A. 7. & 8. Obs. 121. cum Figuris. (16) Cent. 8. Obs. 100. & Cent. 9. Obs. 64. & 84. (17) P. 6. Obs. Med. 12. Tab. 9. Fig. 6. & 7. (18) Sepulchr. Sect. hac 33. §. 5. (19) Ibid. n. 11. (20) Observ. cit. (21) P. 6. Obs. Med. 12. Tab. 9. Fig. 6. & 7. (22) in Addit. ad eand. Sect. Obs. 2. (23) Epist. Anat. 9. n. 44. & seqq. (24) Miglioramenti d'alcune Osservaz. del Redi n. 13. (25) 47. Sect. 11.

ut puta in muliere, viro, & puella, quorum videlicet historias in Sepulchreto (1). Namque; ut omitam virum, illum videlicet Mercatorem, cujus Observatio in hac quoque Sectione (m) semel atque iterum per incuriam est indicata; in puella ut renis dextri locum ne filamenta quidem, aut membrana tenerent; tenebat tamen ureter qui ex vena Cava trunco, ad quem, rene absumpto, se videtur agglutinasse, in vesicam adhuc descendebat: in muliere autem pro eodem rene species quadam involucri conspecta est, membrana, credo, quae marsupii instar, absumpta jam renis substantia, superstes a tot Observatoribus (n) commemoratur. In iis vero crediderim a primordiis utque, ut vel olim Aristoteles (o) observavit, renem defuisse, in quibus nulla renum vitia praecesserint, neque ullum alterius renis, aut Emulgentium ejus vasorum, aut ureteris extet vestigium, ut non extabat in puellula a Poupartio (p), neque in Sacerdote, & Muliere, a Valsalva dissectis, quorum utriusque historiam tibi alias (q) proposui, aut liquid forte extabat, certa quaedam alia non deerant quae nunquam renem fuisse, indicarent, ut in ea Muliere alterius lateris ren non modo, ut in puellula illa, aequo major, sed duplo major, & praeterea pelvi duplici, duplicique uretere praeditus; ut initio factus videretur, ut sui quoque absentis comparis vices gereret. Ego vero in catella quam Bononiae percuti Februario mense A. 1702. aliud quidpiam animadverti, unde, etsi neque ureter, neque Emulgentia vasa deessent, renem tamen a primordiis defuisse, conicerem. Cum enim loco renis dexteri nihil nisi pinguedinem deprehendissem quae mole ipsam, & figura etiam quadantenus referret, ureterem autem cum vesica quidem commissum, at solidum & paulo ante quam a deam pinguedinem perveniret; repente in tenuis dispersitum pinguedinis ftrias, quae sanguifera vascula comitabantur, arteriamque pariter Emulgentem vidissem in eo latere non deesse, at tenuiorem aequo, & cum ramum quidem non parvulum renem versus Succenturiatum dimitteret, parte reliqua in ramulosos abeuntem qui per descriptae pinguedinis superficiem dumtaxat reptabant; cum hac igitur ita conspicerem; animadverti, venam ejusdem lateris Emulgentem, etsi crassitudine oppositam aliquantum superabat, nullo tamen qui sub sensum caderent, ramulosos a pinguedine illa, quam totam cum cura persequi, venientes accipere; accipere autem ramum a proximo hepatis lobo crassum adeo, ut ipsa Emulgens sinistra illo tenuior videretur. Quae ex re proclive erat conicere, venam Emulgentem dexteram non renis in ea quidem catella, sed jecinoris causa fuisse creatam, praesertim cum in fanissima catella secundum naturae consuetudinem se haberent reliqua omnia, nisi quod ren sinister major erat, quam pro corporis magnitudine, ut pote qui fecerere unus omnem debebat urinam, quamobrem canaliculi quoque ejus erant, ut in muliere descripti, crassiores, & evidentes.

15. Ut igitur ab ea constitutione quae a primordiis, ad eam quae a morbo est, & ad institutum sermonem redeam; augeri ob renis comparis absumptionem, alterius qui sanus sit, magnitudinem non alia ratione, crediderim, quam quae paulo ante exposita est; neque enim in Kerckringii, exempli causa, aut Drelincurtii memoratis (r) Observationibus cum ren alter esset a verme corruptus, alter autem aequo major, esse potest Eustachianae explicationi locus. Cum vero saepe adeo fieri videamus, ut rene altero ob corruptionem, aut propter obstruentes calculos lotum non fecerent, aut non emittente, alter suppleat, idque ipso huius incremento confirmari; manifestum est, jure scripsisse, ut in Sepulchreto (s) leges, Guidonem Patinum, non semper esse verum, uno rene obstrueto, alterum statim cessare ab officio: quod & suis ipse quoque comprobavit Observationibus, & facile est ex alienis pariter intelligere, in hisque; ut tot alias omitam; Gregorii Hortii (t), & Thomae Bartholini (u). Quas Patini, & Bartholini historias perlegens, si forte miraris, cum magnus, & angulosus calculus esset in rene, nullum ibi percipi confuevisse dolorem; miraberis magis, si alias inspicias Observationes, ex quibus constat, neque illum, neque ex tot aliis renalium calculorum signis ullum toto vitae cur-

su in quibusdam eos habentibus fuisse, quarum Observationum aliqua in eodem sunt Sepulchreti loco (x) ubi illa quam ex Bartholino indicavi; sed alia praeterea addi poterunt, ut quae in Historia prostat Reg. Sc. Academiae Parisiensis (y); quamquam in eo tamen viromissiones haud deerant, per intervalla ingruentes; & illa item, quam miror non fuisse jam additam, quippe in Posthumo Malpighii Opere (z) vulgatam. Causa autem, cur signum aliquod, & interdum ullum non appareat, esse profecto multiplex potest, ut puta cum lapides, quantumvis insignis magnitudinis, natura, aut casus quasi coronarum orbis medios forat (sic enim legenda sunt Eustachii verba, male in Sepulchreto (a) relata; ubi praeterea ejusdem Observatione comprobantur) urinam suppressio non contingit, ut neque contingit, si via lotio quasi per canaliculos, in ipsis calculorum lateribus, substantiaque excavatos, relinquatur aperta, ut in proxima Salmuthi historia (b), & clarius, quippe adjuvante pictura, in illa patet, quam Lanciscus cum Alghisio (c) communicavit. Nec molestus sensus erit ad lumbos, ne gravitatis quidem, si calculi sensum, & lentissime incrementum, retulsiq; angulus sint, aut firmiter renem substantiae impacti haereant, ut commoveri non possint, praesertim si a substantia dura sit, & callosa, quemadmodum in Cornelio Cardinali fuisse, alibi (d) scribemus, fueratque in illo cujus ex Historia R. Sc. Acad. paulo ante mentionem fecimus, in quo cartilaginea inventa est. Sed & dura fuit in altero cujus descriptionem apud Malpighium extare, diximus. In hisque nec alia fere sunt ejus morbi notae. Cujus rei quae causa fuerit in eo cujus Observationem tradidit Guarinius (e) satis ex dissectione non liquet, ut neque in duabus aliis (f) in primaeque potissimum, quarum tamen utraque calculis infarctos renes ambos exhibet, praesertim vero sinistram. Quae autem, qualesque ut plurimum soleant esse notae illae ex quarum praesentia proprie renum calculi dignoscuntur, etsi jam satis per te notis; proderit tamen, si apud Cl. Scaerchmidium (g) recognoscas; exempla enim subijcit quibus confirmet, illarum plerasque, & cum omnes etiam abesse interdum posse, ut alium morbum spectent Medici, calculos autem qui in renibus sunt, minime suspicentur. Porro supervacuum est admonere, supervenire posse causas ob quas dolor cesset qui antea in rene vel acerbissimus fuerit, nervis videlicet fuculis livebetibus factis, five consumptis, ut ex VI. intelligitur huius Sectionis Observatione. Quae omnia cum ita sint; patet, quanti referat in agrotantibus quae praecesserint, inquirere, & si quando nullum praecipuum signum extet renalis calculi, non propterea contemnere leviora, aut aliis quoque morbis communia. Sed nostrae id melius docebat huius morbi, in cadaveribus deprehensi Observationes, quae ideo in alias differuntur Epistolas, quod in hanc ubi de lumborum dolore agitur, ea non videntur convenire in quibus is dolor non se prodiderat.

16. Quod vero diximus in descripto a nobis femineo rene calculum nec crocum fuisse, nec rubentem, & quod in rene virili tres albos a nobis inventos aliis ad te Litteris (h) commemoravimus; nempe discrimini illi adversatur, fere ab omnibus olim recepto, per alterutrum de duobus illis coloribus genitos in renibus lapides internoscendos esse, credentibus, a genitis in vesica. Quibus Eustachium suam opposuisse Observationem, in Sepulchreto (i) vides: ex quo alias addes, ut ex iis quae in promptu sunt, aliam, Eustachiana proximam (k), in qua colore marmoris candidi, aliamque (l) in quantive candoris inventi in renibus calculi proponuntur: ubi & conspectos a Valsalva calculos, alios (non secus atque a Schroeckio (m)) albicantes, alios nigros in hac ipsa Epistola (n) memoravimus. Apparet igitur, illud discrimen aut ex aequo paucioribus Observationibus, aut a praepjudicata quadam opinione fuisse deductum. Certe autem lapidis materia id quod rubro, flavo, nigro, aliove colore inficiatur, tum in renibus, tum in vesica admisceri potest. A qua etiam admistorum varietate fieri, credibile est, aliam in aliis calculis facilitatem, aut difficultatem solutionis, spemque propterea iis praecidi qui remedium quaerunt quo uno aequo omnes dissolvantur. Quo magis danda opera est, ne calculus gignatur, iis vitatis quae

quae diximus (o) in renibus lotium remorari, & contrariis in usum tractis, praesertim si qua inchoati calculi suspicio sit. Ad quem, donec licet, inde deturbandum, mitioribus potius, & anodynis aliquid habentibus, quam acrioribus diureticis uteremur, qui hinc meminerim, antequam Boerhaavi (p) monita prodirent, generosum quandam Civism meum, cui lapis e vesica exfectus fuerat, nephriticis obnoxium doloribus, his rarius tentari ceptum esse ex quo tertio, aut quarto quoque die mane haurire instituit calidae uncias aliquot, cochleari addito syrapi ex succo violarum; inde vero sciam, diuretica proprie dicta nonnullos quidem liberasse; aliis autem vehementer nocuisse: neque hoc mirum si ea attendentibus quae supra (q) attigimus de mucilaginoso humore quo tubulorum, & pelvis parietes obliniuntur, non temere amovendo, five contractiones eorumdem parietum, quae ut acrium medicamentorum irritamentum sequuntur, sic quantum & vias importune adstringant, & dolores augeant, manifestum est. Ucinam radices scillae vis anodyna, & convulsionem sopiens, ab Hofmanno indicata, & in nephritide ipsa, etiam a minoribus calculis proveniente, a Cl. Jo. Gerardo Wagnero (r) exposita, tot felicitas aliis experimentis confirmatur, ut non minus apud Medicos nota esset, quam vis diuretica perspecta est; sane Itali quoque nostri, etsi plerumque ab emeticis, quale pulvis scilliticus est, remediis abhorrent, hoc opportune uti non dubitent, ne ibi calculus incrementum caperet, unde postea deijci non posset. Augetur enim subitens, non modo ut expediri, & egredi amplius nequeat, sed interdum ut renem aequet, imo nonnunquam, sicut in femina Principe fuisse scribitur (s), pondo sit librarum quinque. Sed cum in aliis morbis non semper eidem remedio idem exitus respondet, tum in hoc speciatim. Valsalvam certe ipsam memini de hoc non semel querentem, confirmantemque, se in Nobili Virgine quae per biennium renum doloribus vexata fuerat, remedia mutare in singulis paroxysmis esse coactum, cum quae alias prompte liberaverant, frustra in usum revocarentur.

17. Inter cetera autem detrimenta quae mulieribus afferunt cruciatus nephritici, non dubito, quin abortus, aut non infrequens & foetus, & matris incertus sit referendus. Cum enim uterus crescens ureteres premendo, minus per hos facilem reddat urinam defluxum, & quod consequitur, nonnihil in renibus eam moretur; si qua forte vitium aliquod in his foveat ob quod eorum doloribus obnoxia sit; nempe inde magis irritari ipsorum intimas membranas, & cruciatus excitari, proclive est intelligere, ut illud pariter quod toto corpore, utque praesertim Partibus quae in ventre sunt, eo tormento per nervos in consensum tractis, facile ante iustum tempus ex contrahente se utero fetus exigatur, aut certe ita ipse, aut mater, tunc gravibus morbis per sepe impar, male multetur, ut non raro utrique moriendum sit. Quod ad abortum attinet, habes in Sepulchreto (t) Matronam, a Platero descriptam. Ea quatuordecies uterum gestans, toties 8. vel. 9. semper mense abortiebat. Eadem multos annos gravissimis renum doloribus obnoxia fuerat. Dolorum autem, & abortus causam Platerus deprehendit in renibus, quorum alter in marsupii modum, absumpta substantia, redactus, alter a magno calculo erat praeformidus. Mulier vero a cuius historia, ut pleraque alia, ita hoc quoque animadvertendi occasio mihi data est, ut septimo graviditatis mense ipsa primum, mox & proles extincta sit, & quemadmodum ren ejus dexter se haberet, jam docui (u); ut quando mortis illius genus, tunc aliud agens, non quaevisi, nunc suspicer, inter mortis praegressas vel proximas etiam causas, renis dolorem fuisse, Quod & de alia suspicor cujus dissectae Observationem, necum, & cum Amicis ceteris ab Santorino communicatam, huc eo libentius adscribam, quod & alia aliqua continet tibi, renum fabricam rimanti, minime fortasse displicitura.

18. FEMINA quae ex renum affectionibus diu laboraverat, denique cum uterum gereret, quinto gestationis mense obiit. RENUM alter strigosus fuit, quippe cavea quidem pelyis aucta, substantia autem crassitudine extenuata. Alterius quoque, etsi longitudo, & latitudo increverant, exigua erat quibuscumque locis substantiae crassitudo, pelvis autem amplitudo permagna. Haec vero in ureterem definebat arcum adeo, ut adactus

aer vix transiret. Quae autem pelvis cum intimo rene cohaerebat, latis pertusis erat orificiis, quae cum magnis cellulis communicabant. Harum quoque cellularum aliqua parietes habebat aliis orificiis perforatis; in quae impulsus aer multos canaliculos, simulque Emulgentem distendebat arteriam. Erant autem ii canaliculi arteriosis ramis in transversum impositi. Ceterum eas cellulas urinam implebat: renis autem superficies ex vasis fiebat sanguiferis, in crassiusculum quali stratum compactis.

19. Qui ad cognoscendam intimam, ut ceterorum viscerum, sic etiam renum structuram, morbosas constitutiones omnino aspernantur, non hanc fortasse contemnent, ex qua videlicet renum canaliculos probari, credent, cum arteria, nulla re interiecta, communicantes; recte, an secus, non est mihi hic disquirendi locus, neque confirmandi excogitati a me olim (x) ad patefaciendam renum fabricam experimenti. Ex hac potius, alii quoque historis supra memoratis in memoriam redeo alterius, quam ex Willisio reperies in Sepulchreto (y) translatam. In ea nobis Matrona describitur a multis jam annis, potissimum vero quotiescunque conceperat, iis spasmodicis affectibus vexari solita, ob quos sub finem tertii mensis abortum semper faciebat, quod novissime quoque contigerat, acutis videlicet lumborum praesertim doloribus non semel redeuntibus, & postea quoque acriter, fere usque ad extremum vitae diem, qui trigessimis quintus fuit ab abortu, cum vomitu divexantibus. Cadaverem inciso, Willisius non dubitavit, quin dolorum causa statuenda esset in aqua intra cranium deprehensa, quae inde per nervos in mesenterii centrum delapsa, membranas distraxisset, quas ibi interiecto aere non secus divulsas invenit, ac si lanus infussisset. Equidem non is sum qui aquam, cerebrum inundantem, spasmodicos facere posse dolores, negem. Sed tamen in cadavere quod citissime, ait, computruisset, facilis est aerem illum qui membranis erat interpositus, a putredine ipsa recens evolutum concipere, quam in vivente jam fuisse. Quid ergo est? A renibus fortasse petenda altera causa fuerat, quae ad aquam illam adjiceretur. Nam renes satis quidem sanos fuisse, refert; alterum tamen eorum inusitate fuisse figurae; ut pote qui in plures lobos instar renis vitulini dividebatur. Fac enim eorum tibi veniat in mentem, quae Ruyfchius (z) semel atque iterum ab se comperta memoriae prodidit. Post intolerabiles lumborum dolores, non calculos, ut ipse, omnesque expectabant, sed inaequalem dumtaxat, ut in humanis foetibus, & in vitulis, bobusque, renum superficiem esse deprehensam. Facetur autem ut rem sibi inauditam, sic quoque incomptum, quomodo ex ejusmodi structura tam atrox dolor, & sanguinis saepe mihi existeret. Qui tamen a Willisio non memoratur, potuit tamen illud renis intimum vitium, quod inaequalitatem superficiei aut sequeretur, aut faceret, necdum ad eum pervenisse gradum, ut sanguinem eliceret qui cum urina excerneretur. Quod vitium quale sit, cum Ruyfchius cohortetur ceteros ad inquirendum; non ante quis facile coniciat, quam sciat, num adultos omnes quibus ea renum inaequalitas sit, horum cruciatus infestet.

20. Igitur si quae ab antiquioribus scripta sunt, attendantur; non esse id verum, a primo aliquis existimabit. Etenim cum Aristoteles (a) hominum renes bubulis similes esse, tradiderit, quippe qui tanquam compositi ex multis renibus exiguis consent, neque aequabiles sint; in plerisque saltem ita inventos esse, videri potest: plerisque autem homines renum doloribus tunc esse vexatos, cui nam, quapro, credibile sit? At si a foetuum, & puellorum inspectione ad id scribendum inducitur esse, suspicabimur, quae suspicio in Adnotationibus indicata est ad Eustachii librum de Renibus (b); Aristotelem seposito, quod alii, & in quot, quibusque idem conspexerint, quaeramus: Eustachius (c), qui multos, siquis alius, inspicit humanos renes, in uno, aut altero dumtaxat id se vidisse, memoriae tradidit: qui etsi reticet, an ex renibus laborassent; subindicare tamen videtur, cum alterius renes magnitudine quoque, ait, fuisse valde insigni & alios longe superante, & cum alibi (d) negat, id inventum iri, nisi aut cadaver nati sinu, cujus renes tuberculis sca-teant, aut natura in eis conformandis a lege sua discesserit. Quod cum perquam raro contingere, Anatomicis adeo exercitatus affirmer; mirum esset, scriptum postea fuisse a Vestlingio (e), saepius tamen renes a compactis veluti glanbulis inaequalem superficiem, quam in foetu ex-

(1) Sect. cit. Obs. 23. §. 4. Sect. 27. Obs. 1. Sect. 28. in Additam. Obs. 1. (m) Obs. 23. §. 12. & Obs. 17. §. 6.
(n) Vid. ex. gr. Sect. hac 22. omnes §. Obs. 5. (o) De Generat. Animal. l. 4. c. 4. art. 2.
(p) Hist. de l. Acad. R. des Sc. A. 1700. Obs. Anat. 3. (q) Epist. 25. n. 4. & Epist. 31. n. 25.
(r) Supra n. 8. (s) Sect. hac 22. in Schol. ad Obs. 14. (t) Ibid. Obs. 19. (u) Ibid. Obs. 24. §. 2. (x) Obs. cit. §. 1. 3. 4.
(y) A. 1730. Obs. Anat. 3. (z) Ubi de Renib. (a) Sect. cit. Obs. 12. §. 1. (b) Ibid. §. 2.
(c) Litotom. c. 4. & Tab. 4. (d) Epist. 37. n. 10. (e) Sepulchret. l. 2. §. 1. in Additam. Obs. 10.
(f) Ad. N. C. Tom. 2. in Append. n. 3. & Commerc. Litter. A. 1745. Hebd. 11. n. 1. (g) Ibid. A. 1739. Hebd. 31. n. 7.
(h) Epist. 38. n. 41. (i) Sect. hac 22. in Schol. ad §. 1. & §. 2. (k) Ibid. §. 6. (l) l. 1. Sect. 10. in Additam. Obs. 8. ad fin.
(m) Ad. N. C. Tom. 1. Obs. 247. (n) n. 2.

(o) Supra, n. 3. & 5. (p) Praefect. ad Instit. §. 365. & 387. (q) n. modo indicato 3. (r) Observ. Clin. Sect. 2. n. 2. 9. & 10.
(s) Vid. apud Pohl. de Prostat. calculi §. 7. (t) Sect. hac 22. Obs. 4. (u) n. 12. (x) Advers. Anat. 3. Anned. 33. Vid. & Epist. Anat. 3. n. 15. (y) l. 1. Sect. 13. Obs. 7. (z) Adv. Anat. Dec. 1. n. 9. (a) De Partib. Animal. l. 3. c. 9. (b) ad c. 3. in fin.
(c) c. cit. (d) c. 42. (e) Syntagma Anat. c. 5.

libent, in adultis quoque retinere, nisi equius foret interpretari, sapius dixisse comparantem cum eo quod modo dixerat, & certe multo rarius est, unum aliquando pro duobus renibus inveniri, quam cum Riolo (f) reprehendere. Adversus quem id se unquam vidisse, negantem, sic quidem Veslugium tuetur Dominicus de Marchettis (g), ut confirmet, se vero id bis, tertio in hoc Theatro ostendisse. Sed neuter verbum ullum iniecit unde intelligamus, sani, an acrii si fuerint in quibus invenire. Nec vero iniecit qui semel id vidit Diemerbroeckius (h), neque alii quos sciens omitto, ipso praesertim recentiores, si duos excipias quorum alterius Observationem habes in Sepulchreto (i), alterius in Bibliotheca Anatomica (k). Hic illam renem ex lobulis coagmentationem semel in juvene novem annos nato, manifestam atque evidentem, nullo interim hoc viscus infestante morbo sibi intueri licuisse, affirmat. Ille vero in puella decem annos nata, ventrisque doloribus atrocissimis, & deinde convulsionibus, ac vomitu denique confecta, etsi alias alibi morborum causas animadvertit; tamen renes quoque duos, eorumque alterum inusitata figura invenit, in pluribus scilicet lobos fissum. At si hanc propter varias illas causas, utramque autem propter aetatem minus adultam seponas, neque enim adeo mirum esset, si paulo tardius in nonnullis renes ambo, aut eorum alter puellam illam inaequalitatem amitterent; ex ceteris quas nunc quidem meminerim a me claudere, Observationibus quatuor, haud amplius, sunt, Ruyschii una, Petruccii altera, Mauchartii tertia, Trewii ultima. Et ex duobus quidem primis, si adjuncta quaedam attendamus, urinæ vitii laborasse illos, conjiciemus, in quibus ejusmodi renes inventi sunt. Nam Ruyschius olim priusquam casus illos duos proponeret qui nobis hæc perpendendi occasionem dederunt, cum eandem in adulto renis structuram ostendisset, quamquam nihil de ejus morbis attigit, tamen in renis illius delineatione (l) supremum ureteris tractum latius nobis delineavit, quam per se esse in iis solet qui earum partium morbis affecti fuerunt nunquam. Petruccius autem cum Spicillegii sui (m) Tabula II. renes pingat monstrosos, id est ex plurimis glandulis conglomeratas constantes ad instar conceptaculi ovarum, pelvim dexteri æquo magis latum atque extantem, ureterem autem sinistri crassitie, & amplitudine, ut ipse loquitur, monstruosum representat. In Mauchartii autem Observatione (n) conjectura opus non est, ut assequamur, Senem, cui renes maximi, bubuli, & inaequales erant, pluribus, nec levibus, urinæ & partium ejus causa conditarum vitii, laborasse. Nephriticum enim annos aliquot fuisse, constat, deinde ischuriam fere perpetuam, tum per intervalla urinæ incontinentiam successisse, illamque similem lacu ebullato repertam esse intra ureteres, intestini ilei instar distentos, cum pelvis undem proveniebant, ovi capacitatem æquarent, intra vesicam denique contractam, crassam, & quali callosam lapides duos, quorum alter magnus, præter multos quos olim eiecerat, substituisse. Sic etiam Senex alter, in quo ren uterque a Pracl. Trewio (o) conspectus fuit manifestis in lobulis divisionibus, uti alias in pueris tantum solet, notatus, renum calculi diu obnoxius vixerat, quos, miclu interdum cruento comitante, exernebat, donec secunda urinæ in vesica suppressione confecta esset. Nunc si forte quæras, quid ego observaverim; etsi quotiescunque in renes incidi qui ad istam superficiem inaequalitatem accederent, id in pauperibus fuit plerumque ignotis, qui dum viverent, quibus essent obnoxii morbis, scire propterea, aut satis scire non potui; hoc tamen dicam, ex indicibus quibusdam, non secus ac in Ruyschii, & Petruccii Observationibus, conjecturam facere licuisse, eorum neminem caruisse morbis ad urinæ organa attinentibus. Quod & ipse, ut spero, facile intelliges, si has quas subijcio, eorum historias consideraveris, sed universas; ita enim disponam, ut indicia illa magis, magisque augeri videas, & ex levioribus ordinatim fieri graviora.

21. MULIERIS, in Nosocomio hoc mortuæ, viscera quædam, & caput in Gymnasium illata sunt, cum Anatomen haberem A. 1726. CEREBRI fusca erat medullaris substantia, & crebris sanguineis punctis distincta: laterales ventriculi non sine aqua intro effusa: cerebellum præmolle. Urinæ Thoracis cavo, sic etiam in Ventre aqua non defuerat, eaque fœda. Uteri Tubæ ma-

jus orificium habebant oclusum, quippe extremo illo ad ovarium firmiter agglutinato. Ren uterque inaequaliter superficie, & maculis albis hic illic qua subsidebat, variegata; ut inaequalitatem illam a natura non esse, facile intelligeres. Urinaria autem vesica intus rubebat.

22. SENIS cujusdam Partes, præsertim Ventris, in eodem Nosocomio studiosis nostris Adolescentibus ostendebamus sub finem A. 1742. cum inter illas a consueta naturæ normas aberrare, adnotavimus. TESTIS alterius Vaginalis tunica aquam continebat non paucam, eamque turbidam: ex Albuginea autem qua prope globum epididymis superiorem, testiculum convolvebat, corpusculum subrotundum exibat, Albuginea concolor. Arteria Magna ubi in Iliacas se dividebat, officula inter tunicas continebat suas. Sed hoc nihil erat præ arteria Splenica, quæ ab initio ad ingressum usque in lienem tota propemodum constabat ex offibus: eratque præterea multo quam soleat, latior. Splen tamen, quantum sensus judicare poterant, sanus erat. Felle vesicula æquo minor fuit. Renes pro statura parvi: & quamquam interius sani videbantur; exteriore tamen facie inaequali. Urinaria autem vesica magna, & parietibus valde crassiss, quales in iis esse consueverunt qui ex calculo, aliave causa urinæ difficultate laborant.

23. SENEX alter, annos natus, quantum æstimari poterat, sexaginta, mendicis adeo, ut sibi victum quaereret vel ex melonum corticibus, & si quæ alia ejusmodi in vias projiciuntur, non semel antea in Nosocomium hoc venerat ob febrem, & oppressionis sensum in thorace, quem difficilis respiratio, debilis pulsus, & tussicula comitabatur assidue, sputa educens quæ vocant catarrhalia. Ubi paululum sibi videbatur levatus; in vias iterum exibat, nec multo post tempore Nosocomium repetebat. Novissime autem circa medium Januarii A. 1747. ita emaciat, & morbo, frigore, inedia confectus rediit, ut paulo postquam venerat, mortem obiret.

CADAVERE in publica Anatome usus sum, donec melioris copia fieret. Itaque & Ventris, & Thoracis viscera perultravi. Ut de hisce primum hic dicam, ex quibus præcipuorum hominis morborum causas agnoscat; Thorax, ut pericardium quoque, effusam quidem habuit aquam, sed paucam. At pulmones ad latera, & dorsum valenter annexi erant: quin dexter, cum abstraheretur, quandam quasi tunicam opacam, crassam, firmam, & æqualem reliquit, thoracis parietibus adherentem, ab imo ultra medium ejus longitudinis, & a Spina ferme ad sternum usque extensam, quæ ab uno extremo, & ab eo deinceps avulsa, integra secuta est: ea neque ad pleuram, neque ad membranam attinebat pulmonis, quippe cum utraque harum sua in sede restitisset; itaque de eogene fuisse censui quod tibi alias (p) declaravi. Pulmones ipsi non optime se habebant: imo intra summam alterius partem durialiquid perceptum est. Sed plus in corde maiorum fuit. Erat duplo grandius quam par fuisset: nec sanguinem tamen continebat, sed concreciones polyposas dumtaxat, easque mediocres, & paucas. Verum cum uterque esset ventriculus dilatatus; dexteri, ut auriculæ ejus pariter, quæ & ipsa dilatata erat, parietes erant pertenuis; sinistri contra crassiores omnes, & duriores quam æquum esset. Mitralis valvula ipsa quoque amplificata, & valde crassa, imis erant oris tuberosæ. Et Sigmoides quidem minus fuerant molles quam æquum sit; sed iis minus flexiles Semilunares; quin harum aliqua ad inferioris ambitus partem jam ossæ. Arteria Magna ante curvaturam æquo latior; interiore autem facie univarsa, imo in Iliacis quoque, albis maculis passim distincta. Earum macularum aliqua intus prominabant, quæ duriores erant, & ossæ, præsertim ubi una ex inferioribus Intercoastalibus oriebatur, cujus orificium ut forte erat in macula centro, circulari ambitu prominentis, sic propterea coarctatum fuerat, ut simul cum macula a primo referret majorem quandam glandulam lentilcularem. Et quoniam de Iliacis mentionem injeci; priusquam cætera de Ventre attexam, non reticebo, fuisse Iliacas arterias omnes, non secus ac Splenicam videmus, flexuosas: Iliacas autem venas, primas tantummodo, id est adearum usque partitionem, corrugatione quasi quadam affectas, ut difficile posses extendere. Ventris viscera has labe ostenderunt. Ventriculus amplus; quamvis pauca continebat; & sine rugis, fuscus intus erat hic

hic illic ad magno tractus a medio sinistrorsum, multo autem magis ad stomachum ipsum, ibique aliquanto profundius. Jecinoris tota convexa superficies, parvo a dextris spatio ad imum excepto, firmiter cum septo transverso coharebat: in summa autem ea superficie erat hepatica substantia hydatide excavata, cujus diametrum transversum æquabat digitum. Lienis autem convexa facies membranam habuit suam quodam loco albicantem, in ejusque albedinis medio ossæam factam parvulo spatio. Lien ipse laxior, & potius crassitudine, quam longitudine, aut latitudine, æquo major, cum tamen arteria Splenica, ista etiam spectata crassitudine, paulo quam conveniret, latior videretur. Mesaræi glandula in homine id ætatis passim occurrebant, multæque ad fabæ magnitudinem: quamquam siue tangeres, siue, dissectas etiam, inspiceres, morbo carere, non dubitares. Sed renum magnitudo quæ, corporis proportionem, minor erat, magisque eorum superficies evidenter ab eo quod videre consuevimus, discrepabat. Posteriore enim facie æque erant convexi, atque anteriore, utraque autem inaequali, sinister præsertim, & quadantenus tuberosa. Accedebant in sinistro depressiones quædam quasi a cicatricibus. Ureterum autem orificia intra vesicam spectabantur aliquanto ampliora, & ipsa vesica intus subultra, & sanguiferis vasculis passim discurrentibus ita distincta, ut si in ea coloratam ceram immisisses; exteriorem autem rubicundioribus quam soleat, fibris intrusa.

24. ANICULA rustica, parva, & præter modum frigida, intra biduum ex senectute ipsa, ut aiebant, mortua, spirandi tamen difficultate, quamvis sine tussi, & sputorum expectoratione, laboraverat: quod adnoto, ut scias, non plura de ejus morbis sciiscitando cognosci potuisse; non quod alia ferme quam ventris viscera examinaverim. Etsi enim hujus quoque cadaver, cum Anatomen docerem A. 1740. in Theatrum ex Urbe importatum est; tamen ubi ad thoracem perveni, melioris, aut certe majoris corporis facta copia fuerat, in quo discicando occupari præstitit.

ABDOMINE igitur aniculae ducto, sana reliqua; hæc autem dumtaxat inventa sunt præter naturam se habentia. Magna arteria a diaphragmate ad Iliacas usque omnes tota erat intus a flavis ossis lamellis inaequalis, & fœda præterea ab humore crassiusculo, fusco, & sanguinolento, qui hic illic intimæ tunice adherabat, ex qua per lamellas illas ipsi circumjectas perupta, & exulcerata distillaverat. Ejusmodi vitium in perbreve quoque Colicæ truncum se propagans, cæteris hujus ramis illatis, hæcenus se extendit ad arteriam Splenicam, ut cum tota juxta esset latior, & crassioribus tunis, & flexibus præsertim tor, ac tantis, ut plures, majoresque in ea vidisset non meminerim, ideoque primo aspectu ea esse quæ erat, non videretur, esset præterea ad flexus majores dura, nec sine ossæ. Lien autem quem adibat, sanus & parvus quidem, sed jecinori, ac visceribus cæteris, atque adeo toti corpori respondens proportionem. At ductus Hepatici truncus amplius quam soleat. Contra uterum, quem in latius sinistrum invenimus valde inclinatam, cavo erat adeo angusto, ut non facile in adulta viderim angustiorum; & tamen vagina erat non exigua, & supra pubem rugosa cutis mulierem peperisse, indicaverat.

Renum uterque superficie inaequali prope ut in fetu, pelvi autem non modo, & duobus in hanc confluentibus majoribus rubis, sed & pluribus ex minoribus, qui horum alterutrum audent, extra renes exstantibus. Quæ omnia, ut ureteres quoque, aliquanto erant juxta latiora, a dextris præsertim. Ren autem dexter multo minor sinistro, & quamvis intime quoad visum, tactusque judicare poterant, non morbosus; tamen dissectus male olebat. Sed & ureteris dexteri orificium multo amplius quam solet, & quam esset sinistrum, in vesica hiabat; ut ab dextera magis parte ex urinæ vitii laborasse mulier videretur. Tunc etiam intellectum est, cur vesica bene distendi immisso per urethram aere non potuisset, quippe hujus parte per amplius illud orificium in ureterem, pelvimque ipsam renis, ut perpe-ximus, divertere, & qua pelvis incisa fuerat, exeunte.

Cæterum vesicæ intima facies pene tota vasculis sanguiferis, eorumque ramulis tumidis, & nigricantibus distinguebatur; quin tota ipsa vesicæ infima pars intus nigricabat.

25. Huc addas velim quam tibi alias (q) descripsi in

Stabulario Observationem. Hinc enim videbis quæ vesica, & ureterum vitia fuerint, inde vero ut renum inaequalis esset superficies. Nec refert, imo fortassis juvat potius propositum hoc nostrum, quod certa quædam præterea vitia iis in renibus animadvertem. Neque enim hic quærendum credo, num solum ejusmodi superficies vitium gravia illa attulerit mala de quibus ab Ruyschio (r) traditum est. Crederem fortasse, si quod autumabat Riolo (s), liceret accipere, ex inaequali illa quæ infantibus est, renum faciem post septennium, vel ocyus æqualem fieri quia ex asperione sanguinis carnosus cortex circumjiciatur, sublividus, minimum digitum crassus, complectens ea tubera quæ sola in puello renis substantiam faciunt. Nam in fetu quoque se proportionem cortex est, renumque facit superficiem, omnesque præterea adultorum renes quorum esset facies tuberosa, parvi forent, quod neque ego semper vidi, & Ruyschii illa rescript delineatio quæ supra (t) indicata est. Nec vicissim tamen hic renes a nobis ponendi sunt male adeo affecti, ut in quibusdam Eustachii (u), & Littrii (x) Observationibus, in quibus non modo ren erat tuberculis exterioris plenus, sed & substantia maxime imminuta, aut prorsus consumpta, loco ejus a fabulosa materia occupato, pelvi autem innumeris lapillis, aut materia illa referto, & ureteris denique initio per calculum non exigua magnitudinis prorsus obstructo. Nam si in horum alterutro casum jam ea præcessissent quæ Ruyschius scripsit; in neutro enim erat, quod permirum fuit, postremo ante obitum tempore illorum quidquam; nemini certe obscura fuisset causa cur accidisset, ut contra est in Ruyschii Observationibus. Nunc si præter exteriora tubera aliquid aut ibi, aut intus ponas, quod attentius inspectando observandoque liceat animadvertere, ut in nostris fere omnibus historiis, unde quæ præcesserit inaequalitatis causa conjici possit, & hæc ejus generis, ut dolores quoque & sanguinis miclum asserere valuerit, indicatum fortasse videbitur quidpiam quod a veri similitudine non abhorreat. Fac igitur, plures extitisse antea in renis superficie ex illis caveis sero plenis quas alii Litteris (y) fufius memoravi, & quarum una etiam tum supererat in Stabulario. Pro feri illius acrioris aliquando natura & laceffi ren potuit, & vas aliquod sanguiferum erodi, unde sanguineus miclus, & dolor, quem a feri quoque copia tum distendente, tum etiam gravante augeri contingeret. Sero autem illo dissipato, cicatriciferas maculas, & depressiones relinqui ostendimus, easque in aliqua etiam ex modo productis historiis (z) non omnino obscuras: quas inter crebras depressiones hic illic prominens illa renis substantia inaequalem faciem superficiem, & tuborum speciem representabit. Itaque habes quid mihi venerit in mentem re in obscura & perdifficili. Quod exempli dumtaxat causa, & te ad meliora excitandi, propositum credito; neque enim mihi satis placet cum ob alia, tum præsertim quod vereor, ne alia inaequalitas illa fuerit quam Ruyschius vidit, ac quæ a me visa, & ut potui, explicata est.

Nunc quando lumborum doloris causam in renibus, primum in calculo, deinde ut aliter affectis, consideravimus, age in aliis quoque Partibus, una aut altera proposita Observatione, spectemus.

26. CISTARIUS Patavinus, paucos supra triginta annos natus, sanus antea, & robustus, nisi quod lue vene-rea laboraverat, cum forte cecidisset, & supra jacentis ventrem rota in transversum acta esset; acerbis adeo lumborum, dorisque doloribus prehensus est, ut octo ipsos menses cubare cogeretur, nihil quidquam opis adversus eos dolores Medicis, quos bene multos advocaverat, afferentibus. Denique cum Cel. Vallisnerius accessisset, ægrumque de cruciatibus sinistri potissimum lumbi querentem animadvertisset; manu admota pulsationem, ut ab aneurysmate, percepit ad ipsum ejus lumbi latus, illaque propterea quibus diutius forte servari posset homo, non fanari, præscripsit. Intumuit deinde is locus, tumore latius se extendente, & costas ipsas quæ proximæ erant, attollente. Edema interea subiectum crus, & femur totum occupaverat. Cum æger tamen, vigente appetitu, temere multum ederet, tumoreque increveret; Chirurgus imperitissimus ausus est longe aliud ac Vallisnerius, opinari, & non modo quæ pus moverent, imponere, verum etiam cum ab horum usu vesicæ, & rimæ in lumbi cute apparuissent, hanc incidere. Quam incisionem proxima nocte confecta est tumoris disruptio, hanc autem larga sanguinis profusio, & hanc virium, vocisque defectio; ut intra

(f) Animadv. in cit. Veslingii locum. (g) Anat. c. 5. (h) Anat. l. 1. c. 18. (i) l. 1. Sect. 13. Obs. 3. in Additament. (k) Tom. 1. p. 1. in Adnot. ad c. 1. Malpighi de Renib. (l) Obs. Anat. Chir. 80. Fig. 64. (m) De Struct. Capular. Renal. (n) Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 26. (o) Commerc. Litter. A. 1743. Hebd. 33. n. 3. (p) Epist. 20. n. 37.

(q) Epist. 4. n. 39. (r) supra, n. 19. (s) Animadv. cit. supra ad n. 20. & Anthropogr. l. 2. c. 26. (t) n. 20. (u) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1701. Obs. Anat. 5. (v) Epist. 38. n. 39. & seqq. (x) n. 21. & 23.

intra horæ quadrantem a disruptione, vita desierit. Postridie, qui dies fuit Nonis Novembribus A. 1720. hæc mihi narravit Vallisnerius, petiitque, ut secum dissectioni præesse vellem, quæ a Vulpio nostro est administrata. ABDOMINE diducto, in conspectum venit aneurysma, quo majus nunquam vidi. Nam ventris cavæ dimidium ferme occupabat secundum longitudinem situm. Ab diaphragmate enim ad pelvim se extendens, obtinebat quantum spatii est ab latere usque dextero vertebrarum ad sinistram distanti abdominis latus, liene, ventriculo, intestinis, mesenterio, vena Cava, rene sinistro dextrorsum adeo compulsis, ut is ren ad regionem esset umbilicalem. Figura aneurysma tunc erat ovali, cum sanguine oppletum, facile fuisset sphaeroidæa; plurimo tamen etiamtum sanguine erat factum, circumcirca in cortices polyposos concreto, ad medium hæcenus grumoso, ut pulsem referret. Qui postquam omnis detractus est, tum vero hæc animadvertimus. Aorta arteria qua in ventrem primum perveniebat, cum ibi statim inciperet dilatari antrorsum quidem non ita multum, dextrorsum autem haud amplius quam ut exiguum manum caperet in pugnum contractam, sinistrorsum se adeo expandebat, ut anteriorem & laterales parietes facere videretur descripti aneurysmatis, quod ibi inter diaphragmatis appendices cum Aortæ cavo ampliter communicabat. Laterales parietes ubi ad posteriora pervenerant, finem ibi statim habebant, artifice undique ad partes quas inde aneurysma non removerat, agglutinatum, itaque posterior aneurysmatis paries peculiaris nullus erat; sed ex ipsæ partes pro pariete erant. Quarum illæ quæ ob ossam naturam minus cedere ictibus poterant sanguinis irruentis exesio periclitio, ipsæ quoque carie affectæ erant, costa videlicet infirma, & cava facies ossis ilium: vertebræ autem vel pejus se habebant. Lumbarium enim transversus processus in eodem sinistro latere a carie aut rupti jam erant, aut solo digitorum appressu facile rumpebantur: corpora autem ipsa infimæ thoracis vertebræ, & duarum quæ ei proximæ ad lumbos sunt, altissime erant excavata, & maxima ex parte absumpta, quæ res eo magis in oculis incurrerebat, quod interjecta corporibus crassa illa cartilaginea ligamenta suis quodque sedibus etiamtum exstant intacta, & pulchre albicantia, fuoque servato amplitudinis modo inter depressiones exesorum corporum prominentia, quantum ex his consumptum esset, aspicientibus ostendebant. His igitur omnibus, quæ ab lato dumtaxat sanguine, continuo in conspectum se dediderunt, satis inspectis, cum ad ventris viscera oculos convertissemus, sana cuncta in tanta locorum mutatione mirati sumus. In Thorace quoque, nisi quod pericardium plus aquæ habuit, quam par sit, nihil quod peccaret, animadvertimus. Nam quod pulmones albidissimos haud secus ac si aqua usque, & usque injecta sanguis ex eorum valis fuisset elutus, conspiceremus; nempe id debere intelligebamus sanguini qua nulla resistentia fuerat, in ruptum aneurysma vitæ extremo tempore confluenti.

27. Quæ super maximo hoc aneurysmate animadvertere multa possem, sciens omitto, illa præsertim quæ alibi attigi, cum de aneurysmatibus aliis scriberem. Hic duo potius adnotare juvat, quorum alterum in extrema hac Epistola (a) habebis; alterum autem ad suspiciones attinet aneurysmatum post diros pariter, ac diuturnos dorsi, lumborumque dolores alias in viventibus, alias in ipsis, quod mirabilis videtur, fectis cadaveribus non agnitorum. Ut de his ultimis primum dicam; relege, quæso, peratante quasdam in Sepulchreti non unam Sectionem, & in hanc quoque XXII. relatas historias, nempe Obs. XXXV. & XL. Videbis post ejusmodi dolores quos repentina tandem mors excepit, in altera duas lumborum vertebras corrolas fuisse repertas, una cum aortæ & venæ cavæ, cui suppositæ erant, rupturæ, unde magna ex utroque vase facta fuerat sanguinis in ventrem effusio: in altera autem carnem quandam putridam, nigricantem, & corruptam, quæ in ventre ad duas spinas longa, & duarum manuum transversarum latitudine, spinam ita erodit, ut ulcus cancro simile pugnum capere, & levi ictu tota spina dorsi frangi facile potuerit, ultimo denique ipsam etiam venam cavam, qua spinam decurrit, corrolerat a qua sanguis per diaphragma ab eadem carne perforatum, pulmonum motum impediendo, mortem intulit. Prima illa affectio Tabes spinea fuisse creditur, ab Hippocrate descripta: Hæc altera, pancreatis immanis, & putridus tumor. Quem

ut ipse non negem; non minimam tamen tumoris partem ex dilatatione Magnorum vasorum fuisse, suspicor. Nec sine ejusmodi suspitione omnino sum, cum mox lego Obs. XLII. secunda; iteratus enim per incuriam est numerus, cum, inquam, lego, post assiduum, ac diuturnum dolorem circa regionem ossis sacri, inventum esse circa eandem regionem, ea in parte ubi vena cava bifurcatur, abscessum magnum, in quo materia fetida & sanguis coagulatus continebatur, tum etiam os sacrum ea in parte ita corrolatum atque exesum, ut facillime digitis extrahi atque conteri potuerit. Sed minus me mea falli suspitione, crediderim in Observatione, quæ I. est in Additamentis ad Sectionem XII. libri quarti. Vir proponitur magnis universæ dorsi spinæ cruciatibus diu confectus, quem a prandio, cum familiaribus sumpto, elapsa quarta horæ parte hi, qui secesserant, revertentes humi stratum, mortuumque invenerunt spina dorsi disrupta, id quod ei verisimiliter contigisse crediderunt, dum ad arripendam matulam se inclinasset. Ex aperto ventre ingens statim profudit sanguinis copia, quo & totum repletum erat sinistrum thoracis cavum. Permagnum autem erat tumor a sexta dorsi vertebra ad primam usque lumborum pertinens, qui repleti apparuit ingenti carnis copia, carcinomate affecta, imbuta & obducta paucis pure, ac sanguine in grumos concreto. Tumorem complectebatur membrana validissima, coronati argentei crassitiei odorem, sed lacera juxta primam lumborum vertebra, ex parte periclitio delituit, adeo ut postrema due costæ nocte spine amplius non cohererent. Porro sex inferiores vertebrae dorsi, & lumborum prima, carie omnino erant corruptæ, quasi teredine erose, adeo ut ibi loci spine, propterea facile disrupta, omni carere soliditate & stabilitate. Ipsum diaphragma peritum, ut ab utroque digito conjunctis introitum concederet. Renis sinistri vena Emulgens præterea descripta. Utinam sicuti venæ hujus, ita Magnæ arteriæ, adhærentis omnibus illis corruptis vertebra, mentio aliqua esset injecta; unde meam confirmare possem suspitionem, aut abicere. Vidisti in hac Observatione (b) altissime excavatas fuisse vertebra, in altera autem ex indicatis Observationibus adeo corrolas, ut levi ictu frangi potuerit spina, in hac autem ultima post erosionem, reipsa fractam. Intelligis quid ex mea suspicer. At illud extra suspitionem, a magno aneurysmate, spinæ adhærente, hoc etiam, præter cetera detrimenda, & pericula, afferri posse, ut spina frangatur; non multum enim in Cisiario nostro deerat, ut posset. Verum ne forte credas, suspiciones omnes meas in Observationes dumtaxat cadere quæ in Sepulchreto extent, inspicere eam saltem quæ inter alias a Viro Clarissimo multis post illud iterum editum annis vulgata, vel potius, quantum ex Actis Helveticis (c) in quibus eadem historia est, intelligere videor, recusa, tumorem in latere lumborum, & hypochondrio sinistro eminentem fuisse docet a corpore immani, ingenti, globoso, tenso, totum fere sinistrum abdominis latus occupante, quod exsectum, & ruptum effundebat magnam, qua opplebatur cruoris fusi copiam, substantie flavescens, spongiosæ, lamellatim sibi incumbens. Quoniam autem ren sinister huic corpori, quod & ipsum pone sinistrum Coli intestini tractum locabatur intra duplicaturam peritonæi, externe adhærebat, imo sui parte in ipsum bulbosum hocce corpus penetrabat; visum est hoc idem corpus pars esse renis illius, videlicet incredibilem in modum amplificatam. Ego tamen, quod veri ex aliis quærendi, non dissentiendi studio dixisse liceat, tum ex se de quam obtinebat, tum ex sanguinis, qui tanta copia inerat, in lamellas, alias aliis incumbentes, concretionem, tum denique ex eo quod in illius hominis ventre virum adesse animal credebatur, id quod pulsationis sensum aliquem significat, aneurysma fuisse, suspicor, quod credendo partem proximi renis vitiaffer. Non ab simile huic meæ suspitioni Cl. Nebelii (d) judicium fuit in tumore subrotundo, qui annexus reni sinistro, intus ex pluribus tunis constare, & crure materiaque tartarea repleti esse dictus fuerat, pro Emulgentis arteriæ aneurysmate agnoscendo. Quin casum adjectis celeberrimi Medici, magna ex parte cum eo qui modo a nobis perpendebatur, conferendum. Cum enim idem sinistrum latus affectum dolore, primum nephritico, mox & rheumatico credito, intumuisse, dolore autem repente vehementiori facto, mors subita Medicum abrupisset; sanguinem qui multus in ventrem effluerat, e rupto aneurysmate exiisse, compertum est, quod in eodem ventris latere sub

anne-

annexo Colo intestino protuberabat, magnitudine æquans caput triennis pueri. In dissectione autem hoc tumore corrolato, & internis membranis distincto, coagulatoque sanguine repleto, habebat ven sinistram flaccidam & putridam.

Quæ cum memoro, nolim propterea putes, ignotos mihi esse abscessus internos, quibus non modo lumborum dolor, aut Sacri ossis, aut Spinæ dorsi, sed & caries ipsa vertebrarum sit imputanda. Novi enim; ut quos legi in recentioribus libris hic indicem; abscessus in ea parte mesocoli quam, indocile composito vocabulo, mesorectum plures appellant, in illis fuisse deprehensos quorum symptomata, & in his dolores intra os sacrum accurate in Commercio Litterario describuntur. Novi pariter ex Actis Cæsareæ Academiæ (e) lumborum, dorsi quoque dolores in iis fuisse in quibus magni interni abscessus latebant cum vertebrarum aut lumborum infimarum nigredine, & carie quæ dimidium Sacri ossis in parva frustula comminuerat, aut lumbaris primæ, & thoracis ultimæ non dissimili vitio. Nec tamen oblivisci possum aut Mercatoris qui cum annum integrum dolore summo ad Spinam dorsi laborasset, aneurysma, ut Ballonius (f) tradidit, in Aorta habuit, ubi lumborum incumbens vertebra, in illas dividitur, aut Patricii illius Viri, vehementissimum dorsi dolore confecti, in cuius pariter Aorta aneurysma reperit, ubi juxta laudatam alias (g) Vesalii diagnosis eo tempore admirabilem, nunc facile imitabilem, illudque non sine proximarum vertebrarum carie, & costarum vitio. Donec autem horum, & his similiarum, quæ non raro aliis, & mihi quoque se obtulerunt, exemplorum recordabor, fieri non poterit, quin ubi descriptiones abscessuum, iis in locis reperiuntur, ejusmodi occurrant, ut suspensum animum relinquant, verear, ne forte sub abscessus nomine aneurysma deliruerit. Hæcenus de suspitionibus in dissectionis mortuorum corporibus.

28. Quod vero ad eas attinet quæ mihi in viventibus inciderunt; ut cæteros mittam; duos ex iis memorabo, quibus ipse quoque, cum in Patria effem mea, consilium dederam adversus graves pertinacesque lumborum, dorsi quoque dolores. Alter fuit ærius faber, Peregrini nomine. Quem, cum ego postea huc ad profectum venissem, accepi, suis semper conflictatum doloribus, tandem qua minus expectabant Medici, repentina morte sublatum esse; ut mihi suspicio confirmaretur, ab arteriæ Aortæ, secundum Spinam descendens, aneurysmate cruciatus illos fuisse, & ex aneurysmatis disruptione subitanum interitum. Alter vero Patricius Vir fuit Joannes Antonius Corbiceus, qui cum simili obitu ereptus est, multo mallem non abuisse, ut discendi cadaveris facultatem obtinerem. Sic enim in eo aneurysma ejusmodi suspicabar, ut simul vereretur, ne vomica lateret in jecinore, qua rupta, mors propria sequeretur. Et sane multa, nec obscura, affecti hepatis erant indicia; sed cum his tamen aderant, atque adeo magnam certe ipsorum partem præceperant, & fortasse omnia, ii lumborum dolores, qui cum jecinoris vomica non solent conjungi. Operæ pretium fortassis est totam historiam, præsertim alias (h) tibi promissam, hic diligenter perferbere. Erat is annos natus ad sexaginta, provero, amplo, lacteoso corpore, facie rubente a venulis subcutaneis, passim, sed præcipue ad nasi inferiora, conspicuis. Sanguinis per hæmorrhoides fluxus, qui innoxius, & moderatus redire per intervalla consueverat, cum ab anno jam valde se imminuisset, molestæque animi affectiones accessissent; nonnihil emaciari corpus coeperat ante initium veris A. 1710. Mox dum rheda, ut tum solitus erat, veheretur, se dolor prodidit in utroque lumbis, Spinæque interjecta: quibus in partibus jam a longo tempore, sed obscurus, fuerat, neque assidue, sed aliquando. Nunc vero non solum perstitit, sed circa Aprilis initium auctus, ante Majum autem multo acerbior factus agrum, præsertim sedentem, aut jacentem, male habebat, eoque magis ubi se vel leviter convertere vellet, aut flectere, aut rursus erigere conaretur, aut surgere. Visum est ob ea quæ de hæmorrhoidum fluxu diximus, itemque ob sanguinem qui superioribus mensibus non semel e naribus sponte se ostenderat, laxata, quæ tum adstricta erat, alvo, sanguinem de brachio primum, tum ex hæmorrhoidibus esse mittendum. Cum alvi laxatio multum, tum prima sanguinis missio plurimum profuit; ut jam sublatum omnino diuturnus dolor videretur. Sed cum Chirurgus Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

ad hæmorrhoides, quas turgidissimas offenderat, nihilominus, Medico inconluto, hirudines admovisset; tanta vis sanguinis repente profluxit, ut non multo post indicia apparuerint habitus in pravum vergentis. Itaque cum rursus consilii causa accerteret post Junii medium, tum hæc quæ modo dixi, tum alia accepi: dies jam esse plus viginti ex quo regii morbi signa, cum pedum oedemate, se se ostenderant: & primum quidem vigilias, appetitus ciborum defectionem, & sensum quandam fuisse stomachi a prandio languidi, atque, ut æger loquebatur, diluti, nunc vero hunc sensum profusus sublatum, somnumque, & appetitum quoque, sed hunc ex parte tantummodo, rediisse ex quo ea quæ adversus icterum faciunt, adhuc cœpta fuerant: ex his autem animadvertum esse, rhabarbarum, quamvis perparce cum passulis datum, lassitudinem auxisse non tam quia multa per alvum educebat, quam quia dolorem exacerbabat ad ultimam lumborum vertebra, & proximam Sacri ossis basim. De hoc enim æger dolore, se desolante, plurimum querebatur, huncque molestiorem fieri, quando per cubiculum ambularet, asserbat. Dispicuit dolorem quem omnino sublatum esse, crediderant, iterum paulo postquam visus erat quiescere, & rediisse, & graviores in dies factum esse. At cetera vel multo magis displicuerunt. Nam frequentem pulsus, & subdum, respirationem subinde altam, & quasi difficilem, pedes, & vicina crura, in dextero præsertim artu, subrumida, & depressum admoti digiti vestigium servantia, cutem, & oculos subflavos, urinas denique interdiu, ut oculos quoque, magis flaventes animadvertentem, & quod omnium gravissimum fuit, cum ventri manum admovissem, a dextris sub ipso infimarum costarum flexu tumens jecur ad hædini capitis magnitudinem, durum præterea, at sine dolore. Quod dum contrectarem, æger jam a triennio, inquit, tumorem hunc, quamvis non tantum, ut & oculorum flavedinem aliquam animadverti, tamen, ut nostis omnes, semper bona ad hunc usque annum usus sum valetudine. Cautum cum ejus Medico iis quæ eo tempore aptiora visa sunt, constitutis, agrum tertio invisi ante medium Junium, cum eodem Medico, & cum Albertino, qui Bononiæ accersitus fuerat, consilia inire. Tunc vero oedema inferiorum artuum, credo quod æger plerumque cubaret, omnino evanuerat, ciborum appetitus vigeat, stomachus recte fungi videbatur officio suo. At vigilie noctu vexabant: pulsus magis quidem vespertino tempore, sed tamen & matutino frequentes, majori quam antea magnitudine, nec sine aliquo impetu: sitis: lingua aridissima, & colore ex rubro nigricante infecta: cutis necdum sine flavedine, quamvis alvi recrementa essent, nec antea fuissent albidia: urina saturo etiamtum colore, sed tenues: jecinoris tumor, in quo dolor fuerat aliquando ex quo agrum non videram, facile tamen sedatus, eo tempore contrectari poterat sine dolore, nisi forte diu, & subaspere quis contrectaret; tunc enim aliquis oriebatur dolor adimum jecinoris limbum. In contrectando visus est sibi Albertinus inaequalitatem quandam animadvertere non secus ac si visceris ejus superficies quibusdam quasi granis crassioribus asperaretur; unde tumoris naturam ad scirrhum spectare, conjiciebat, acinis videlicet hepaticis a concreta bile distentis; ob dolorem tamen, ne alibi alia esset tumoris natura, verebatur. Cum ea quæ in gravi, & ancipiti ejusmodi casu cautissimum decebat Medicum, nobiscum probasset, Bononiamque rediisset, ego vero Lucum ad Cicognini patris curationem profectus essem; de improvviso accidit, ut æger qui per eos dies non modo non pejor, sed quarto ex quo consilia inita fuerant, die vel melius cum cæteris, tum sibi in primis habere videbatur, cum ad cœnulam prima hora noctis surrexisset, molesto quodam sensu stomachi, & affectu partitis corripere, simulque sudore frigido facies, frigore artus inferiores perfunderentur, venter autem valde intumescebat. In lectum repositus jam fuerat, cum prope accersitus Medicus præter hæc, totius epigastrii dolorem, vomendi conatus, humiles, & languidos pulsus, ut & vocem, & mentem, faciem autem qualis cadaveri est, deprehendi. Itaque octava ex qua hæc inceperant, hora mors est consecuta. An ex rupto, ut signa quidem indicant pleraque, nec tamen omnia, jecinoris abscessu? an ex valis sanguiferi disruptione? Albertinus ipse qui diligentissime, ut solebat, nuper omnia partim observaverat, partim inquisiverat, nec alia præter ea quæ modo ad te scripsi, fuisse, sciebat, cum ex meis litteris hunc homi-

(a) n. 30. (b) n. 26. (c) Tom. 1. (d) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 39.

(e) A. 1742. Hebd. 20. n. 3. (f) Paradigm. 13. (g) Epist. 17. n. 3. (h) Epist. 36. n. 6.

hominis exitum acceperit; ut facile conijciebat, aliquid dum æger surgeret, illo eodem motu esse disruptum, multumque in ventris cavum humorem effusum; ita quid disruptum esset, pariter conijcere se posse, negabat. Quod si quadam suppurati tumoris indicia, & in his quæ potissimum requirebat; certe autem nulla unquam fuerant; nempe horripilationes præcessissent; tum vero fætebatur, se facile ex rupta hepatis vomica rem fuisse explicaturum. Igitur siqua in particula hepatis lente aliquid, ac lateenter ad suppurationem forte venisset, suspicari se, non tam ex ejus particula, quam ex attigui valis alijus sanguiferi, quod pus læsisset, disruptione ejusmodi mortem esse repetendam. Neque tamen suspicione hac vetus, & pertinax ille ad vertebrae dolor explicabatur, cuius in tot hepatis abscessibus quorum historias perpendimus, mentionem factam non recordamur, & is præterea quem tetigeramus, tumor longe a vertebra distabat, longiusque imus hepatis limbus, ad quem præteritum novissime dolorem fuisse, scripsimus. Nec vero est cur dolorem ad vertebrae infimas præcipue & ad Sacri ossis basim extensum, forte ab hæmorrhoidalis venæ trunculo repetas, cujus radices adeo diximus fuisse turgentes; nam post effusam tantam illam sanguinis vim haud certe amplius turgerebant, & cum maxime turgerebant, vel tum, quamvis breve ad tempus, acciderat, ut dolor videretur esse sublatus. Quod si Aortæ arteriæ per vertebrae descendentes, aneurysma, cujus, præter jecinoris tumorem, nonnulla adhuc mihi suspicio est, non is tibi morbus videatur, cujus effectus vel breve ad tempus usque adeo obscurari possit, nec qui sine aliis pluribus, gravibusque signis concipi queat; a te peto ne quidquam statuas priusquam hanc legeris quæ subjicitur, Observationem.

20. SENEX qui olim credebatur ex lue venerea laborasse, multos jam dies in hoc cubabat Nosocomio, de aliis omnibus conquestus, quam quæ aut ad eam lue, aut ad magnum internum aneurysma spectare posset; certe autem; nam diligenter quævisi; neque de dolore, neque de ponderis sensu, neque de spirandi difficultate. Paulo post prandium repente est mortuus circa medium Decembrem A. 1618. VENTRE aperto, & urinaria vesica cum pene detracta; totus enim eram eo tempore in quibusdam quæ ad eas Partes attinent, observandis; urethra luis illius antiquæ opinionem confirmavit. Erat enim passim cicatricosa, & Seminalis ipsa caruncula non secundum naturalem conformationem se habebat, ut neque perminuta duo oscula quibus ad latera pertunditur, neque his interjecti Sinus orificium facile esset demonstrare. Huc accedebant fibræ, inter se distinctæ, atque exstantes, ex quibus instar parvi trianguli conspicebatur, cujus basis erat vesicæ proxima, vertex carunculam attingebat. Amotis deinde visceribus, ingens Magnæ arteriæ aneurysma in conspectum venit, crescentem lunam representans, cujus erat dorsum sub annexo diaphragmate in transversum locatum, cornua autem dorsum spectabant, sequi singula pone singulos condebant musculos quos Ploas vocant, finitimum quidem eo usque ut ad ter-

tiam musculi partem infimam perveniret, dexterum autem non adeo inferius descenderet. Hujus quoque aneurysmatis posterior paries jam nullus erat; itaque detracta sanguine quo replebatur, maxima ex parte in polyposas laminas alias aliis impositas, conformato, statim apparuerunt corpora duarum, aut trium vertebrae, ad imum thoracem, fummosque lumbos attinentium, nuda quidem, sed alte erosa, extante hic pariter inter corpus & corpus albo suo, intactoque, ut videbatur, ligamento cartilagineo. Ruptum autem fuerat hoc aneurysma suprema sua sinistra parte ita ut sanguis qua concesserat annexum diaphragma, proruperit ab eodem latere in thoracis cavum, quod pene totum repleverat.

30. Vides igitur, quam obscurata hic signa essent tanti aneurysmatis, quæ olim, & lumborum præsertim dolores quin antecessissent, non est dubitandum. Sed hanc, & quæ in Cisiario (i) habita est, Observationem si cum aliis conferas Aortæ aneurysmatum a quibus proximæ vertebrae erant corollæ, illud fortasse miraberis, ligamenta iis vertebrae interjecta, intacta nobis se obtulisse: quod alii, quantum meminisse nunc possumus, ejusmodi Observationum Scriptores non memorarunt. Quin eorum aliqui diserte non minus ea ligamenta, quam vertebrae corpora, excavata, atque absumpta se invenisse scripserunt, ut, exempli gratia, Cl. Vernojus (k), & Auctor penultimæ Figuræ, id præclare ostendentes, in Commentariis Regiæ Scientiarum Academiae Parisiensis ad A. 1724. Et sine cartilagineis obnoxias tunc esse absumptioni, sive hæc fiat ab diutius iteratis ictibus sanguinis, in aneurysma irruentis, sive ab erodentibus particulis, utalibi (l) a nobis expositum est, Observatio ostendit Cl. Maloetii in ipsidem Commentariis proposita ad A. 1733. in qua cartilaginea Asperæ arteriæ segmenta aliquot, loco posterioris parietis aneurysmati intervenientia, reperta sunt infirmiora jam facta, & minus convexa, duo autem ipsorum ex aliqua sui parte absumpta. Quam Observationem cum tibi alias (m) memoravi, ibi quidem simul dixi, molliores partes, quippe ictibus minus renitentes, minus atteri, quam firmiores; hic vero illiusmodi explanationi video non esse locum. Nam si quia minus quam vertebrae, ligamenta renituntur his interjecta, eo quoque minus atteri, dixerō; quare continuo, cur igitur, sicut in illis quos descripsi, hominibus duobus, ita in reliquis pariter non sint reperta; sed in his consumpta, in illis intacta? Quod si illi juvenes fuissent ambo, reliqui autem senes; fortasse responderi posset, in illis enim minus, in his magis renitebantur. Atqui non modo ex cæteris, ut is certe qui a Vernojō proponitur, sed etiam ex duobus nostris primus erat juvenis; ut minime appareat, cur si non huic, illi atteri debuerint, neque cur non atteri nostro Seni. Obscura igitur istius discriminis causa ab alia fortasse in aliis erodentis humoris natura, an aliunde sit repetenda, tibi indagandum relinquo, quando hæc jam factis longa Epistola est. Proximis diebus alteram mitteamus, interea autem salutem plurimam.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XLI.

Sermo est de Urinæ Suppressione.

ET si nihil urinæ emitti aut vitio accidit renum, & ureterum, aut vesicæ ipsius, & urethræ: tamen nec Valsalvæ, nec mihi contigit, ut mortuorum ob priorem illam dumtaxat causam corpora incideremus. Nec mirum, cum renes, & ureteres gemini sint, ut si forte uno in latere deficiat eorum officium, in altero suppleatur. Neque enim quod multi credunt, semper verum est, otiante rene alterutro, alterum quoque simul otiari: quæ opinio rejecta est Litteris superioribus (a): imo ad Observationes quas ibi indicavimus, tot invenies quæ addi possint ex Sepulchreti Sectione huc attinente XXIV. (b) ut si cum iis compares quæ in eadem Sectione sunt urinæ suppressæ ex unius dumtaxat lateris morbo, longe rariores primis has alteras esse, planissime cognoscas. Nam primi generis passim occurrunt, nedum ubi Gerardus Blasius (c), Isbrandus Diemerbroeckius (d),

Ludovicus Mercatus (e) id genus ut frequentissimum inculcant, & si velles addere quæ postea in Casareæ Academiae Voluminibus (f) prodire; nullam facile invenies quæ ad idem genus non spectaret, renibus videlicet ambobus aut sphacelo correptis, aut, quod etiam Rudolphus Jacobus Camerarius (g) vidit, insolita flacciditate, & atonia affectis, aut calculo infestis, aut si alter non eodem laboraret vitio, ad consumptus, inofficiosus, aut suo uretere fabulo, & calculis impedito. Alterius autem generis, id est lotii obunius dumtaxat lateris vitium suppressi, Observationes in citata Sepulchreti Sectione ad paucas redeunt, & eo pauciores, quod aliqua, ut quæ sub Observatione I. legitur §. 19. non, ut a primo videtur, spectat ad hoc genus: quod præclare docebit eadem historia non modo Sectione XXII. Obs. XIII. §. 1. sed etiam in hac ipsa Obs. I. §. 4. plenius pro-

(i) supra, n. 26. (k) Comment. Acad. Sc. Imp. Petropolit. Tom. 6. (l) Epist. 18. n. 27. (m) Epist. 21. n. 48.
(a) n. 15. (b) l. 3. (c) Obs. l. §. 9. (d) Ibid. §. 10. (e) Obs. 2. §. 1. (f) Dec. 3. A. 4. Obs. 60; A. 7. & 8. Obs. 127; & A. 9. & 10. Obs. 95; & Cent. 5. Obs. 22; Cent. 6. Obs. 55; & 56. & A. 6. Tom. 2. Append. n. 3; & Tom. 3. in Obs. 6.
(g) Specim. Experim. circa Generat. Part. Therapeut. in Relolui. H. 8. 3.

Posta; ut non fuisset opus, præsertim mutilata iterare, ne dicam tertium, & quantum repetere; nam quæ Observatione eadem I. exhibentur §. 20. & 22. quantumvis, per incuriam nomine, & dierum numero mutato, aliæ videantur, ipsam tamen esse apparet inspecta libri I. Sectione III. Obs. XV. §. 1. & §. item 1. Obs. XIII. Sect. modo citata XXII. libri III. Atque utinam hæc una historia in ea de qua loqui coepimus, Sectione XXIV. essent repetita. Sed tu conferens Observationis II. §. 11. cum IV. §. 9. itemque Observationum VIII. cum X. (b) §. 4. & hujus §. 7. cum Obs. XI. atque ut ad I. & II. Observationem redeam; illius §. 2. cum §. 21. aut §. 3. qui perperam r. inscribitur, cum §. 27. itemque cum §. 2. Obs. II. statim intelliges quot satius fuisset semel ponere, aut siquas historias sui non semel Auctores, ideoque non iidem semper verbis scripserint, alteram inscriptionem, si tanti videretur, alteri continuo subjicere. Sant tamen in Sectione hac quædam secundi etiam generis historia, ut sub Observatione I. §. 14. & sub III. §. 1. 2. & 3. & si vis, insuper sub IV. §. 2. Sed quid hæc ad longe majorem cæterarum numerum? quem augent aliæ quæ in Additamentis legendæ ad Sectionem XXV; in ea enim exhibita Observationes multo majori ex parte fuissent ad superiorem Sectionem addenda, & præter eas, ommissæ aliæ vel maxime obviæ, ut quæ in Ruyschii Centuria (i) proposita fuerat. Constat igitur, multo rarius accidere, ut renum, & ureterum, quippe geminorum, vitio urina supprimatur, quam vesicæ, & urethræ, quæ unæ sunt, eoque minus mirari oportere, quod eorum qui, primis illis obstructis, perierint, corpora necum incidere potuerimus.

2. Quorum dissectionis ob id etiam cupidior fueram, ut examinare in iis possem eas partes undæ, & per quas, & quæ aliis aliis comminiscuntur peculiares urinæ vias. Etsi enim adversus has argumentum in Adversariis (k) proposui ab iis petum quæ satis constat in locis suppreffionibus adnotata esse ex renum vitio contingentibus, quod argumentum tunc gravius mihi visum est ex quo animadverti, cum aliis postea, tum Boerhaavio ipsi (l) perplacuisse, tamen Cl. cuidam Viro plenius avebam satisfacere, existimanti, vias illas peculiares in renum pelvis, ut plures vel antea crederant, eamque viciniam desinere; ut tamen renes dumtaxat, calculis, aliove ejusmodi impedimento obstructi conspiciantur, possint tamen ob id ipsum earum viarum ostia simul comprimere, nihil tunc tum in pelvis, aut proximis ureteres transmittere. Tu igitur cum ejusmodi cadaverum incidendorum occasio dabitur, fac quod ipse eram facturus, ut diligentissime membranas omnes quæ his Partibus vicinæ, annexæque sunt, perferretur; fieri enim haud potest, si earum viarum ostia sint compressa, quin reliquis earum tractus tanto magis sit remorante humore distensus, quanto magis occlusa sunt ostia quæ emittunt, & officia quæ iis adscibunt, requirant, & ipsi ultro fateantur: quanquam frustra hunc te laborem sumpturum illud indicat, quod nunquam in istiusmodi casibus fuissent illas apparuisse legimus, cum plurima alioquin fuissent illas apparuisse legimus, aut alias quas alii conjiciunt ad vesicam tendentes, maxime distendere debuissent, Profectores autem diligentes, & valde exercitati mortuorum corpora scrutantur. Franciscus enim Plazzonus; ut exemplo utar ejus historie quam in Sectione hac Sepulchreti ter repetitam fuisse, ostendi (m); aut secuit, ad dissectionem præfuit ejus Monachi cui inter cætera diuretica ipsa quoque cathartides datae fuerant, quæ vesicam, quamvis inanem, exulceraverant, ut illuc pervenisse earum vim per sanguiferam vascula, non per ignotos peculiares trames intelligamus, qui cum ea vi simul diureticas potiones transmississent sive in renum pelvis, aut ureteres, sive recta a ventriculo in vesicam. Hæc enim altera opinio placuit pluribus, an propter illa Hippocraticis (n), aut certe vetustissimi Auctoris verba, si habuerit puer venas de ventriculo ad vesicam tendentes amplas ac attrahentes, an potius ob ea quæ accidere audivissent in diabete legitimo, cujus rarissima exempla poteris legere apud Marcellum Donatum (o), nempe ut potius nihil omnino mutatus mingeretur, servans eundem colorem, consistentiam, saporemque, & odorem. Sed si propterea comminisci oportet ductas a ventriculo ad vesicam tendentes; alios comminisci oportere ad cutem, Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

quando exemplis illis hoc quoque subjicere non dubitavit Donatus de paella formosissima jam diu febris confictata, cui remotis nondum ab ore poculis, haustus liquidiore potiones a præcordiis... eadem copia quæ erant absorpta, absque alteratione ulla resudabant ita ut ex rubeo lyeo colore rubeo; ab albo jussulo, albo itidem tunc inficerentur subucula, idque duarum hebdomadarum spatium fuisse adnotatum. Verum de ignotis hisce duabus quacunque demum e ventriculo ferri in urinarias partes coniciant, scite ad me quondam scripsisse Cl. Paltam, memini, si revera forent, debuisset illis qui eo tempore in nostris quoque regionibus sic argento vivo abutebantur, ut pene quotidie mane ad unciam fumerent, aliquam saltem ejus partem cum lotio exire, quod in illorum nemine Medici nostrates animadverterant. Quod si forte dicat, vix patere eos ductus; sed in febris de quibus illa sunt Donati præcipua exempla, dilatari; neque Paltæ objectioni, neque aliis ob quæ sunt excogitata, phenomenon satisfacies, & certe in primo ex Trincavellio Donati exemplo adstringere eorum ductum oscula potiones debebant, quas, nisi gelidae forent, eger recusat. Sed quid, inquis, ad recentiorum Observationem (p) dicemus, nempe Virginis illius ætice, in qua ren fuisse æque ac dexter... totus scirrhusus & induratus erat, ac ita coaluerant, ut nec pelvis detegi potuerit, cum eadem novissimo etiam tempore parvissemus quidem, & instar aque fontanae limpida, non, ut initio, rubram, & crassam urinam reddidisset, sed tamen reddidisset? An paucillum id humoris ex sero quod ventrem distendebat, per vesicæ poros foras introspicientes transiisse? an potius ex alterutro renis, & pelvis particula aliqui necum, cum postremo minxit, penitus indurata, & contracta, sicuti post mortem apparuit, per angustias, ut insolita ostendit limpiditas, provenisse? certe non per ductus in ureteres, velicamve influentes, ut pote qui ex ventriculo multo plus humoris importarent.

3. Utinam id est; quæ in mortuis urina suppressa vesicæ etiam, aut urethræ vitio Valsalva, & egoviderimus, hic accipies; nec tamen omnia. Habuisti enim proxima Epistola (q), itemque XXXIV. (r) quædam eorum quæ ille, eorum autem quæ ipse conspexi, nonnulla Epistola IV. (s) & X. (t) in aliisque alia habebis. Quæ igitur huc potissimum spectare, credidi, ex illo quidem hæc sunt.

4. JUVENIS agricola, cujus duo fratres & ipsi juvenes annis superioribus ex acutis morbis circa verum æquinoctium interierant, eodem anni tempore ad hanc modum decessit. Scabiem sibi, nescio quæ adhibito unguento, abegerat: paulo post urina suppressa est, non sine vomitu, & dolore interdum ad lumbum finitimum. Urinam tamen aliquoties postea excrevit, sed paucam, & saturati lixivii similem, & cum dolore: cujus exitum cathetere expedire, nequicquam tentatum est. Tandem corpus universum intumuit: & accedente laboriosa, ac magna respiratione, postridie, circa vigesimum primum a suppressione diem, mors ingruit. VESICA, & renes sani erant; nisi quod hi aliquanto majores, illa autem libras continebat circiter duas urinæ ejusmodi qualem diximus. Sed & in ventris cavo humor stagnabat, urinam olens, cæterum limpida aque similis. Qui in vitreo vase asservatus, multa divulsa quasi urinarum contenta exhibuit. Igni autem impositus, primum turbidus est factus, & vaccini feri contumilis, mox factis ipsius, denique sic concrevit, ut ovi albumen prorsus referret: cujusmodi concretionem in nullo morbo humore qui in corpore stagnaret, unquam antea Valsalva viderat. In Thorace pulmones quidem multum aere distenti, pleuraque, ad dorsum, annexi; sani tamen fuerunt. Cordis ventriculus dexter polyposam concretionem mediocri magnitudine, sinister minorem continebat.

5. Acres scabiei particula, in sanguinem repulsa, quam graves noxas attulerint, alias (u) a nobis in duabus feminis ostensum est. Sed in illis alio; in hoc Juvene, lotio admixta, in renes, vesicamque irruerunt. Quorum viscerum membranas intimas compungendo, utrobique attulerunt dolorem, illas crispantes, eoque urinæ effluxui jugiter propemodum obstantem, unde renes ab hac, intus cohibita, majores facti, vesica autem vel quod sæpe vix ullam haberet, vel quod contrahere se rite non posset, vel potius quod cathetere non admitteret, hoc

I 2 in

(b) primam de duabus intellige eodem m. X. designatis. (i) Obs. 15. (k) III. Animad. 36. (l) Praelech. ad Instit. §. 385.
(m) supra, n. 1. (n) De Morbis l. 4. n. 28. (o) De Med. Hist. Mirab. l. 4. c. 27.
(p) Comment. Litter. A. 1743. Heb. 25. n. 2. ad 3. (q) n. 4. (r) n. 7. (s) l. n. 19. (t) n. 13.
(u) Epist. 16. n. 34. & Ep. 38. n. 22.

in urethram immisso nihil reddebat; educto nihil, nisi raro, & cum dolore, emittebat. Cohibita igitur maxima ex parte in sanguiferis vas lotii materia obitus denique causa fuit; quamvis alio, & praesertim in ventris cavum redundaret, ut significavit odor stagnantis in eo laticis. Se enim illa facile admiscet humoribus qui tunc a sanguine feceruntur. Itaque; ut exemplum proferam, quod nescio cur non fuerit Sepulchreto additum; Malpighius (x) in Praeceptore suo Natali, cuius ureterem, & renem, ob interceptum calculum coarctata urina, monstrat dilatatos invenit, durante plures dies lethali suppressione adnotavit, salivam odorem, & saporem lotii retulisse, & cutem pariter halitus ejusdem reddidisse. Albertinus autem mihi narrabat, Nobilem illum Juvenem cujus renum structuram Malpighio in Epistola ad Sponium descriptam habemus, in eodem morbo non salivam, urinae odore, & sapore infectam, sed propemodum urinam ipsam expulisse, quod adjectis odori, & saporis color quoque restabatur, affluente ad salivares glandulas urinae materia ea copia, ut buccae, & parotides intumescerent. Quam ob excretionem fortasse tandiu vixit donec, victa suppressione, magnam vim urinae mingeret; quamquam nihilominus ei contigit quod non raro & aliis, retentam longiori tempore urinam tandem reddentibus, ut vitariis humoribus, & visceribus, non multo post interiret. Excretionem alias per quas homines quibus lotium suppressum est, vitam diutius trahunt, aut servant, cum Thomas Bartholinus (y) commemorat; itam quam attigi, salivae mittens, dejectiones, vomitus, sudores enumerat. Dejectionum exemplum in Collega suo profert (z). Vomitus, & sudorem quidem est, distente non protulit, facile est ex aliorum Observationibus supplere. Sic Vallisnerius noster (a) post decimum suppressionis diem accedente vomitu feri, colore, sapore, odore lotium referentis, Virginem durasse vidit donec plurimis intus, & extra in cassum adhibitis, mercurio tandem & dato, & applicito renum vias referavit. Sic Mantuanus Medicus (b) alteram vidit eodem simul & morbo, & vomitu dies primum plus quadraginta, nec multo post duos saltem & triginta vexatam. Sic alius (c) tertiam ad menses quindecim, ut vix aliter quam per nutritiam enemata ali potuerit, donec ejecto calculo, & ichuria, & urinae vomitus desierit. Sed ubi calculi renes, & ureteres obstruentes, dimoveri non possunt; frustra, ut Guilieimus (d) in duobus observavit, lotii vomitiones accedunt, quod, & de aliis tum insuperabilibus morbi causis, tum excretionibus intelligendum est; itaque in femina (e) jam in ore saporem lotii, odoremque percipiente, ipsius sanguinis vomitus, & per nares exitus, si profuit, haecenus profuit, ut ad trigessimum usque diem vitam protraxerit. Verum ut ad propositas a Bartholino excretionem redeamus; dignam in primis adnotatione Caroli Pisonis Observationem (f) quod ad sudores attinet, indicavit; erant autem diuturni, assidui, copiosi, & tam olidi, ut vix ferri posset graveolentia; michi itaque demum succedente, aeger liberatus est. Non sic felici esse contigit Virgini de qua nobis referebat Petrus Nannius. Illi quoque diu propter calculos urina subsisterat, ut jam deploratam existimaret, cum sudor immani copia prorupit, urinam olens. Is quando duravit; duravit autem ad dies; Virgo melius habuit. At eo cessante, intra dies paucos thoracis hydrope absumpta est. Sed haec felicitas ad tempus fuit altera olim Patavii Virgo, de qua ex spectata fide Medico narrat Marcellus Donatus (g). Scilicet non toto quidem ex corpore, sed tantum ex regione ventriculi resudabat humor ad plurimum librarum pondus, colore, & odore urinam referens, cum haec non solum, sed & alvi suppressa essent recementa. Quae, cum sex ipsos menses nihil antea urinae redderetur, supplevisse, tunc videlicet fluente alvo, credita fuerant. Quin etiam insensibilis perspiratio supplere videtur in juvene femina, quae rarissimo, sed eodem notissimo Verona exemplone guttam quidem urinae excreverat duos jam & viginti menses, cum illud Cl. Zevianus (h) memoravit. In ejus autem cubiculo feminae, lotii odor percipitur, quem & exhalare videntur indusia. Pluribus interim ea morbis, quamvis nullo cerebri, conficiatur. Sed & Patavina, illa in marasmodum tandem incidit. Quae attuli, etsi fere attinent ad eos quibus lotium retentum est vitio renum,

qua causa ex parte in eo quoque fuerat Juvene de quo ex Valsalva dictum est; tamen satis indicant unde & illi pereant quibus vesicae dumtaxat, aut urethrae vitio diutius retinetur, nec tamen ea simul vesicae inflammatio est, cui, aut subsequenti gangraena mortem liceat imputare. Id ad genus spectare crediderim hanc alteram Valsalvae Observationem.

6. VIR annorum septuaginta, cum diuturna minigendi difficultate laborasset, ut non nisi catheteris ope urinam redderet, aucto in dies morbo, in Bononiensi Nosocomio S. Mariae de Vita decumbere coactus est. Ibi dum a lithotomo per catheterem urinae exitus, sed incassum, querebatur, subsecuta laboriosa respiratio, cum itere mortuus est. VESICAE urinariae fibrae adeo creverant, ut cordis lacertos figura, & magnitudine referent. Prostat glandula excrecentia ad pyri formam, vix ullum transitum permittens, ex assiduo catheteris impetu phlogosum in ima parte conceperat. Ventriculus cordis dexter polyposa concretionis inchoamentum ostendit.

7. Phlogosum ejusmodi non fuisse illius mortis causam manifestum est. Verum in corpore longa aetate, ac creberrima lotii retentione sic infirmato, ut decumbere cogere, quam vitiatum sensum esset sanguis, non difficile est conjicere. Non mirum igitur, si accedente excretionem quae per catheterem tolli non poterat, inter hujus inaniam irritamenta, inceperint demum quae brevi hominem conficerent. Vel sine illis irritamentis, paulo postea fortassis, sed nihilominus interiret, ut tot alii, & in his Vir quoque cuius historiam, sicut accepi ab eodem Medico quem tibi alias (i) laudavi, Maritato, huc adscribam.

8. VIRO in hoc Nosocomio decumbenti ob lotii suppressionem, jam bis eductum hoc fuerat, & magna semper copia, per immisam argenteam fistulam. Cum ab hac aut aeger, aut alii ne vesicae, cervix nimis irritaretur, timerent, proptereaque abstinere; mors non sine convulsivis symptomatibus ingruit. DISSECTI facina, quantum sensus judicare poterat, viscera omnia atque adeo vesica ipsa quoque reperta est; sine ullo enim inflammationis initio tantummodo distenta erat, ut eam lotii copiam facile contineret quam vix tria vitrea vasa continuissent quibus ad sanguinem, & secta vena excipiente, aut ad urinam etiam, nostris in regionibus utuntur.

9. Ego quam distentam, nec tamen inflammatam, vesicam haud semel invenerim, cum alia alibi (k) ad re scripta Observationes ostendunt, tum quaedam praefertim monstrabit quam ubi agam de Claudicatione (l), perscribam. Nunc ut intelligas, quantum vesica impune extendi nonnunquam possit, subjiciam quid hic annis superioribus honesta femina acciderit, mihi notissima, & nunc satis bene valenti. Primipara erat, & duos supra quadraginta annos nata. Cum propterea nihil cederent pelvis ossa, hujusque ima pars esset angustior, ibi haesit magnus infantis caput, & compressa urethra, & proxima vesicae parte, lotium cohibuit. Non sine magna difficultate immissa est demum argentea fistula ex illis quas ad mulieres habent; sed incassum. Immitti debuit altera ex longioribus quibus utuntur in viris, sed minus curva: jamque ad palmum subierat; nihil tamen urinae exibat. Altius itaque agenda illa fuit, ut haec exiret; exivit autem ad libras circiter quatuor. Parva erat muliercula; quo magis intelligis, quantum (id quod alius quoque & peculiariter extumescens abdomen indicabat) quantum, inquam, extendere se vesica debuerit, imo vesica pars superior, quando inferior adeo, ut distentum erat, compressa. Attamen infans, qui non modo erat mortuus, sed & gravius olebat, mox detracto, nihil ex vesica quidem noxae, aut periculi superstit. At si ejus plurimum distentae exempla queras, & quem exitum pleraque habuerint, attendas; ut rupitionem seponas, quam inde vel in bovis vesica deprehenderunt (m), invenies certe pro alia in aliis sive partium, sive sanguinis, sive urinae ipsius dispositione, & natura, longe aliter multis, quam proposita mulieri, accidisse. Pervulgatum est, haud raro nimis distentam vesicam amississe vim se contrahendi, id quod nonnunquam brevi contingere ex Maucharti (n) Observatione colliges, qui post vesicae ichuriam ante quadriduum inchoatam, est pri-

primo exactio biduo lotium, nec semel, educendum curaverat, & vesicam in cadavere invenit proflus vacuum, amplam tamen animadvertit, non contractam, ut solet. Neque minus vulgatum est, inflammatione facile corripit, cuius initia & in eo cadavere extabant, ut in totalis inflammatio ipsa reperta est multo amplior. Post hanc quae facile sequantur, Auctores doceant quos maximae distentionis vesicae testes citat Henricus Meibomius (o), qui tamen nescio quomodo unam Hildani Observationem pro duabus producat. Eandem enim quam preste libro de Lithotomia cap. 5. memoravit, fufius Centuria II. Obs. 65. descripsit Hildanus, ibique ulcus e vesicae cavo in Rectum usque intestinum pertinens in mortuo demum illo Sene ab se reperitum proponit. Multo autem saepius inflammationem id sequitur quod ab altero ex citatis a Meibomio Auctoribus Panarolo (p) ter observatum invenies, gangraena videlicet, in lethalem sphacelum transiens. Ego post inflammationem quae diutius distentam vesicam corripuerit, nunquam gangranam amplius vidisse memini, quam in aegritis Viri corpore quod inexploratum in Theatrum Anatomieum Bononiense temere imperiti juvenes importandum curaverant A. 1706.

10. IS, ut postea compertum est, renum, vesicae, ilei intestini vitii obnoxius, aliquot jam dies urinam reddere non potuerat. Itaque tumido, & nigrescente jam abdomine mortuus erat. VENTRIS inferiora praefertim viscera, & in his vesica, nigricabant, ut scroto quoque, & hoc intercepta intestini quod dixi, portio, nigredine in partes non modo omnes proximae, sed ad media usque femora se extendente; ut cito caritas Gymnasium inficeret. Vix ipse nonnulla cursum in renibus animadverti, quae cum alio loco (q) tradiderim, non hic iterabo.

11. Ilei interceptio urinae suppressionem, an haec Ilei interceptionem praecesserit, pro certo scire non potui. Illud scio, quod & alii Litteris (r) scripti, ad Ilei inflammationem lotii suppressionem accedere. Sed & plures aliae sunt causae adest vesicam posita, quae in hac lotium remorantur. De fortis, in difficili partu ejus cervicem premente paulo ante (s) dictum est: quin etiam in gestatione uteri, postremo praefertim tempore, mulieres sunt quarum aliquas probe novimus, quae mingere nequeunt, nisi supinae. Huc adde; ut quae rarius accidit, praeterea; scimus enim, muliebri urethrae adnatum exterius corpus glandulosum pugni magnitudinem excedens (t), scimus acriora medicamenta, naturam, ut arctius adtingeretur, adhibita, illud urethram premendo, haec inflammationem vehementissimam concitando, lethalem attulisse urinae suppressionem, quam etiam a sanguine, & vulnerati omenti vase paulatim destillante, in pelvi autem coagulato, & vesicae collum valde comprimente, inductam fuisse (u), non ignoramus; huc, inquam, adde multa, & duriora scybalis, aut praetumidas haemorrhoides, quae idem collum ad pubis os apprimant adeo ut exire nihil possit. Ad has attinet quod adolescenti mihi per senem, & felix in mea Patria Chirurgus asseverabat Joannes Amatorius, ubi circa imam vesicam fibrae stagnante sanguine, aut humore turgent, egregium afferri auxilium sanguisugis ad venas illas admotis. Sic in Avo qui etiam tum vivebat; Nobilis, meique, etiam ob humaniorum litterarum studium, amicissimi Viri Petri Scanellii cum per catheterem nonages immisum urinam ipse educere debuisset, illo demum remedio, post tot alia incassum administrata, sublatam esse pertinacissimam suppressionem. De scybalis autem notissima est Wepferi Observatio (x), ad quam, in Sectionem quoque hanc Sepulchreti relatum (y), sed non absque iis operarum erroribus qui intelligi non sinit, adjungere alteram potes quae in Additamentis legitur ad proximam Sectionem XXV. (z) Eundem felicem exitum quem prima a clystere injecto proponit, cum alibi plures, tum hic praecipue Hebraeus expertus est, cui nulla alia auxilia profuerant. Sed tum quae emolliant injicere satis est, praefertim si quod periculum subest vesicae inflammationis, aut suspicio convulsivae ejus sphincteris constrictionis. Quorum neutrum satis mihi attendere visus est senior Medici Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

cus qui mihi duas tres felices curationes narrabat suas; datis enim quae alvum vehementius cicerent, hanc simul, & suppressam urinam movisse. Sic enim ajebar, tamen hanc non movissem, at saltem quanto plus humoris ex alvo eduxissem, tanto minus per renes defluxisset ad vesicam magis magisque distendendam: movi autem eum simul qui vesicam jam distendebat, cum Rectum intestinum laceffendo, non potui proximae vesicae fibras non simul ad contractionem stimulare, inique magna ex parte amissam vim reddere. Scilicet non satis animadvertet, nullam esse arctius cum imo intestino Recto conjunctam vesicae partem, quam infimam, seu mavis urethrae initium, nec quid propterea consequatur, si tum forte pars hac initio aliquo jam teneatur aut inflammationis, aut convulsivae. Equidem inficias non eo, interdum a paralyti, alias ab ipsa distentione vesicam se contrahendi vim amittere. Sed hoc ajo, urinam in vesica suppressionis causas foveret esse distinguendas, nec semper facile adeo, ac cito, ut ex Maucharti exemplo supra (a) collegimus, sublatam a distentione vim qua vesica se contrahit; esse concipiendam. Ostendit hoc; ut alia praeterea, canis a Boerhaavio (b) dissectus, in quo est urina triduum jam retenta plenissima esset vesica, hac tamen exiguo vulnere pertula, exsiliit urina ad magnam altitudinem: & vesica ita contracta est, ut pene nulla cavitas superesset.

12. Sunt & aliae complures causae quae ut lotium possint in vesica retinere, ita eos quos dixi, alioquin prohibent stimulos, ut puta quod domestici remedia loco apud quosdam esse, scio, ut laterem, frigida antea immersum, plantis apponant mingere non potentes: quos felici audacia imitatus est, cum junior esset, Medicus amicus meus glacie ipsa pedibus paulisper admota. Quae ut aliquando hebetem vesicae vim per stimulos Cruralium nervorum fines potuerint excitare; intelligis certe, quam noxia esse irritamenta possint ubi ab acrimonia urinae inceperit hujus retentio, aut ubi secundum Solutissimi Pujati (c) conjecturas, & Experientissimi Benevoli (d) Observationes, quod nudata sit vesica mucosa illo quo adversus nimios urinae stimulos limita est. Sileo, cum ipsa in scroto procidit, est hunc casum ex quo meus ad me scriptus Georgius Georgi Medicus nunc apud Pisaurenses Spectatissimus non adeo rarum esse, cognovi, ut putabat Meryus (e), qui cum bis a se visum descripsit, nullum sibi esse notum Auctorem, fatebatur qui ejus fecisset mentionem. Certe enim ex Platero in hac Sepulchreti Sectione (f) vidi commemoratum, & Sectione proxima superiore XXIII. (g) ex Bartholino, & legi etiam apud Ruyschium (h), qui vidit non semel (i), ut vere est a Christiano Andrea Kochio (k) indicatum, ubi alteram Boerhaavii quoque memorat ejusdem casus Observationem: ad quam, aliaque, ut anilogram (l) in mulieribus hic omittam vesicae prolapsum, de quo, deque ejus signis interea potes Meryum ipsum (m) & Praef. Bassium (n) consulere; illam quoque addes quam in Viro Nobili habuit Doctiss. Valcaerghus (o). Sed si rarus hic casus est, qui cum incidit, urinam licet; quod ejus proprium, sive pathognomonicum indicium est; & vesica ejicere, quam aeger manibus cum scroto attollat, aut comprimat; aliae sunt tum frequentes, ut a paulo grandiori calculo, & si Hoffmannum (p) audiamus, qui unam praefertim suarum Observationum (q), dissectionumque sic explicat, a spasmio ipsius vesicae, tum minus frequentes, ut ab arois, vel ut idem (r) vidit, & valde laceris per foetidum pus quod e rene sinistro, ulcere penitus consumpto, & exsello, in pelvim deciderat, exterioribus vesicae tunicae, aut etiam ut a tuberculis; sunt, inquam, aliae urinae in vesica suppressiones, in quibus ab additis stimulis ut nihil auxili, sic plurimum detrimenti afferatur. Sunt autem aliquando in vesica, aut ad ejus collum tubercula, tamen, uti perspicue a laudato Benevolo (s) demonstratum est, saepe Medici vel praestantes in iis ponendis concepti fuerint. Sunt, inquam. Nam et si Ruyschius (t) unum representat exemplum; plura tamen occurrere, in adjecta Observatione (u) satis indicat. Quae tubercula viderit Drelincurtius (x), quam excrecentiam Sylvius (y), quam carunculum Tulpus (z), quam Smetius (a), quam

(x) Op. Posth. (y) Cent. 4. Epist. Med. 18. (z) Ibid. & Epist. 21. (a) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 50. (b) Hist. de l'Acad. R. de Sc. A. 1715. Obs. Anat. 3. (c) Act. N. C. Tom. 3. Obs. 6. (d) Exerc. de Sangui. nat. n. 68. (e) Eph. N. C. Cent. 6. Obs. 59. (f) De Morb. ab aqua S. 4. c. 6. Obs. 127. (g) c. 27. cit. supra ad n. 2. (h) Dei Fiat. 1. c. 11. (i) Epist. 27. n. 4. (k) Epist. 3. n. 19. & Ep. 39. n. 33. (l) Epist. 54. n. 12. (m) Act. N. C. Tom. 8. in Obs. 2. (n) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 41.

(o) Exerc. de Catheterismo thes. 17. (p) Jatrologium. Pente. 1. Obs. 27. (q) Epist. 38. n. 45. (r) Epist. 34. n. 8. (s) n. 6. (t) in Append. 1. ad Obs. 19. (u) Vid. Hoffm. Medic. Rat. Tom. 4. P. 2. S. 2. c. 7. in ipso fine. (v) Auctar. Hist. Apopl. 13. Schol. 8. (w) Mem. de l'Acad. R. de Sc. A. 1713. (x) Obs. 17. §. 4. in Schol. (y) Dec. Obs. 3. n. 5. (z) Differ. (a) Advers. Anat. Dec. 2. n. 9. (b) Affect. in lib. & cat. rar. Defect. in Ratiocin. (c) Vid. tamen & Epist. 43. n. 14. (d) Mem. cit. (e) Dec. 3. Obs. Anat. Chir. 2. (f) Differ. de Saxis, Acub. & cat. (g) c. 7. supra ad n. 11. cit. Epist. Obs. 1. (h) Ibid. (i) Ibid. Obs. 8. (j) Diff. 2. cit. (k) Sect. 25. Obs. 1. §. 4. (l) Ibid. Obs. 10. §. 6. (m) Ibid. Obs. 8. (n) Sect. 25. Obs. 1. §. 4. (o) Sect. 24. Obs. 13. §. 31.

quam Hildanus (b) invenerint, habes in ipso; ne longius te abducam; Sepulchreto, ubi & alia facile reperies eodem spectantia. Fortasse & illius adhuc memineras, quam olim in I. Epistola Anatomica (c), a me deprehensam non secus ad urinariam, quam in fellea vesica, proposui. Et quamvis tuberculorum quæ in urinario oboriuntur meatu supervacuum sit exempla producere, cum in ipsis Hippocratis Aphorismis (d) eorum facta sit mentio, & suppurationis per quam tolluntur; tamen non futurum tibi ingratum credidero: si ad historiam Sacre illius Virginis quæ dies LXVI. clysmatum nutrimentum ope, Ramazzino (e) medicinam faciente, servata fuerat, hoc quoque addam quod ab ipso accepi, eandem videlicet cum postea lotii suppressione correpta esset, catheteris autem recusaret auxilium, re post dies aliquot ad extremum deducta, urinam simul cum pure non multo, nec ullo, nisi urethra, dolore emittere cepisset, atque ita morbi causam fuisse tuberculum in urethra natum, ostendisse. Cujus ut opportuna suppuration morbum sustulit, sic remedium quæ supra diximus, irritamenta adauxissent.

Sed tubercula tamen ejusmodi facile in pus abire possunt, viamque liberam reddere. At scirrhus tumores, aut ad scirrhi duritiem vergentes, quales sæpe in Prostata glandula fieri, aut ex ea excrecere solent, quis facile ab ipsa natura, nedum ab arte, speret sublatum iri? Talem vero fuisse, credo, illam ejus glandule excrecentiam quæ supra (f) ex Valsalvæ Observatione descripta est. Talis certe fuit tumor universæ Prostate in hac quæ sequitur, nostra.

13. CIVIS meus, Vir Patricius H. M. annos natus amplius sexaginta, quadrato corpore, & robusto, facie rubente, habitu ad obesum inclinate, herniosus, adolescens virulenta gonorrhœa laboraverat, semper vero multum, & sæpe etiam merum biberat. Cum multum quoque, & creberrime mingeret, vix anno ante levi quodam retentionis urinæ principia tentatus fuerat. Anno autem 1710. IV. Nonas Martii quasi repente omnino suppressa est. Affinis ejus Medicus clysteribus, balneis, sanguinis ex hæmorrhoidibus missione, remediis etiam quæ, tunc simul adstrictam, alvum moverent, auxilium afferre fatagebat; sed incassum. Itaque demum catheterem immittebat, quod non ita difficulter & tum, & postea peractum est. Singulis autem immisionibus septem fere urinæ libræ, etiam modicum quod potaret, daretur, primis quidem diebus ex quo illud cepit fieri, educebantur. Intermediis; nam dies vixit circiter quindecim; paulo pauciores; ultimis rursus ad septem. Et primis quidem diebus aliquem ad mingendum sentiebat stimulum, nullum intermediis, rursus aliquem ultimis. In urinis interdum aliquid sanguinis conspectum est, interdum quadam parva quasi membranarum tenuium frusta. Postremis diebus alterius humeri dolor accessit; febris penultimo: novissimo, cum post eductum mane lotium, argentea fistula extraheretur, animadversum est, tinctam esse; id quod antea acciderat nunquam; haud secus ac si in vitriolico humore fuisset. Eo die ad vespertinam inclinate, ecce rigor, & tremor, calente tamen cure; hinc pulsus obfcuratio: quo iterum se non sine intermissione procedente, alter accidit tremor: hora autem quinta noctis mors.

CADAVERIS dissectioni, rogatus, cum aliis Medicis interfui postredie sub primam noctem, quo tempore ab eo qui medicinam fecerat, a Chirurgo, ab aliisque, eadem omnibus confirmantibus, ea quæ modo sunt scripta, accepi. Peritonæum vidimus, ad hypogastrium præsertim, livens, intestina autem ferme sublivida: in summo distenta vesicæ fundo exterius vasa sanguine turgida, interiorum tunicam hic illic rubescentem: tunicas autem omnes crassiores multo quam æquum esset; itaque vel emissio lotio, majorem quam solet, magnitudinem vesicæ retinebat. In eo priusquam totum emitteretur, grumum non ita parvum animadvertis libere natantem, qui nihil magis quam semilaceram hydatidem, referebat; mihi vero attentius examinanti tenuis polyposa concretio visus est, quæ membranulas in se convolutas, & concidentem mentiretur: ejusdemmodi autem parva illa fuisse frusta quæ in extracta urina interdum apparuissent, ii qui viderant, affirmabant. Cum igitur causam hujus suppressionis inquireremus; ad imam vesicam se fe obtulit. Prostata glandula præter naturam tota extumescens, eaque duritie prædita, ut quasi ex cartilagineis, & ligamenti commissa substantia constare fe-

cantibus videretur. Alba erat nisi quod locis quibusdam, præsertim vero in utraque superficie, a stagnante in vasis sanguine nigricabat, idque a dextris magis quæ ex parte scrotum magna distendebat enterocèle.

14. In hac quæ modo propolita est, suppressionis causa omnes qui aderamus facile consensimus tum quia alias quoque a præstantibus Viris, ut post (g) dicitur, eandem inventam, agnitamque fuisse, non ignorabamus, tum quia proclive erat intelligere, cum tumor, & durities Prostatae incepit, ceptum quoque ægrum esse principio aliquo retentionis urinæ tentari, cum vero demum usque adeo tumor auctus fuerat, ut repentina accedente sanguinis per eam glandulam, circumque ipsam majorem motus tarditate, meatus per eam ductus, non nisi immisso catheteris solido corpore, satis urinæ patere posset, hanc amplius nequissimè per se sibi exitum aperire.

Nec dicas, sanguinem, adhibitis ad proximas venas hircudinibus, quod auxilium supra (b) laudavimus, priorem motus celeritatem recuperare, & sic tumorem imminuere debuisset. In pleno siquidem ejusmodi corpore non detracto ante omnia è brachiis sanguine, multo major hujus copia eo unde arceri oportuisset, ob minorem factam resistentiam facile influxit. Mitto quærere, an etiam ob balnea tunc in usum tracta, & an etiam stimulus accesserit ab iis præsertim quæ ad alvum sollicitandam præbebantur. Illud quoque omnino num serius quam decussit, urina educi cepta sit, quod præ catheteris, quæ tunc, quippe supervacua ægro jam mortuo, ut consuevimus facere, filebamur, vulgo objectum audivimus. Obiciendi causa erat quæ hic memoretur non indigna. Acciderat per eos dies, ut quatuor alii Cives præter eum de quo dictum est, eodem morbo de improviso corripere, & quod postea Halæ Magdeburgicæ vere anni 1730. Cl. Bassius (i) observavit plane inauditum, ut legitima gonorrhœa epidemice grassaretur, sicuti Observationibus quatuor prolatis testatur, id nos Foro Livii, Urbe non pro eo ac meretur, fuisseque olim, incolis nimium affluente, vere anni 1710. in vesicali, ut vocant, ischuria, cujus quinque proferre possemus, intra paucos dies habitas, Observationes, non vulgari exemplo animadverteremus, quas fortasse non ita ablimili modo, ac suas ille explicavit, magna ex parte explicare liceret. Cum igitur ex quinque nostris Civibus quatuor, quorum aliqui medicinam ipsi feceramus, Civitas evasisse, illum unum cujus dissectionem legisti, interisse videret; providentiam cæterorum in catheteris tempestiva immisione laudabat, Medici de quo loquimur, tarditatem, jure, an injuria? redarguebat. Sed ut alie in aliis morbi cause aliæque corporis, & partium, & urinæ conditiones sunt, ita alia alii Medico in alio ægro tante esse eorum quæ cito agit, aut differt, ratio potest. Me quidem in meo, facilius cito, sed frustra adhibitis, in catheteris usu celeritatis non penituit, quamvis Chirurgus nimia adeo videretur, ut propter exiguum hypogastri tensionem nihil urinæ in vesica esse asseveraret. Quem non tam signa, quæ aberant, ischuria renalis, & signa cætera, quæ aderant, molestissima vesicalis, quam res ipsa continuo refellit. Immissa enim fistula, lotium eduxit ad libras tres magno cum ægri levamine, mirantis, unde sibi qui parum bibisset, tantum urinæ in vesica esset, quippe ignorantis, non raro cum ea suppressione diabeticam quandam affectionem conjungi, quæ mihi interdum occasione præbuit dubitandi, an hæc illius causa fuerit, vesicam dormiente homine, ita, & tam celeriter distendendo, ut mox in expectato se contrahere amplius non possit. An vero æger in cuius vesicam Fabricius noster ab Aquapendente (k) scribit, tantam lotii copiam, natura crismi moliente, influxisse, ut cum illud reddere nequiret, fuerit per catheterem extrahendum, an æger is, inquam, ut meus, dormiret, an, ut ex febre continua, & periculosa decumbebat, hebetus esset sensibus, sicuti pro certo nescimus, ita alterum licet facile suspicari; neque enim aliquin apparet, cur ex quo urina primum in vesicam paulo copiosius fluere coeperat, non eam reddiderit, & sic deinceps faciendi, caverit, ne quanta quanta afflueret, omnis in vesica retineretur.

15. Ejus quæ paulo ante dicta est utriusque morbi conjunctionis, diabetis videlicet, atque ischuria, ne apud alios exempla quæras, cujusmodi in primis esset in Sepulchreto illud Hildani quod, ad Senem attinens supra (l) me-

memoratum, in hac Sectionem relatum est §. 8. Observationis X. quæ primo quidem loco proponitur; nam altera, per incuriam eodem numero designata, continuo succedit; neve ego alia adjungam recentissima, mihi quæ cognita: satis est historiam relegas in qua versamur (m). Videbis, ut modicum tunc æger biberet, quanta nihilominus in vesicam deflueret urinæ copia. Piger ejus renes, & jecur non inspexisse. Neque ideo piger quod ex eorum inspectione sperarem me causam assequi posse illorum quæ in diabete contingunt. Namque ut seponam mirabiliora quæ de legitimo narratur (n), quorum aliqua sine cauto examine accipiendi non videntur; non minus certe mirabile est quod vel nostra ætate Venetiis (o), & Bononiæ (p) constat in spurio, quem vocant, accidisse duabus Virginibus, ut altera intra dies 94. urinæ libras reddiderit 3674. altera intra dies 97. reddiderit libras 4171. cum earum utraque non modo aut parum, aut nihil biberet; sed quasi eorum instar qui hydrophobia laborant, & sitiret plurimum, & potionem quamlibet abhorreret. Sane intelligis, quæcunque in renibus; aut in jecinore vitia deprehendantur; Meadius enim (q) semper in hoc viscere steatomatosi aliquid, disiectis his qui ex diabete interierant, ab se reperit esse, testatur; certe, inquam, intelligis, non propterea apparere posse unde, non dico tanta, sed vel dimidio minor humoris copia sit repetenda. Iraque coacti sunt qui Virginum illarum casus explicandos susceperunt, idem facere quod & Meadius denique (r) diserte fecit, & facere jam coeperant Medici (s) sæculo XV; ut ad ægerem confugerent, & multo aptius quam illi Veteres, non ex ipso aere, sed ex aqueis particulis in eo natantibus, immanem illam deducerent vim urinæ. Mihi igitur displicet ea quæ dixi, viscera haud examinasse, non quod in iis causam mirabilem istiusmodi casuum, sed quod diabetis non ita immodici aut cause ex parte, aut effectus potius vestigia fortasse quædam animadvertere potuissent. Idque tanto magis displicet, quanto pauciores extant denotum post eum morbum dissectiones. Ostendit hoc brevitas illius ex proximis Sepulchreti Sectionibus, quæ de eo inscripta est, XXVI. Cærum de Observationibus quæ in ea sunt haud amplius quinque, tres sunt quæ renes exhibent aut ambos flaccidiores, aut alterum saltem collapsum in se, ut pene absumptum. Cum his conveniunt Observationes quas additas non fuisse miror, Ruyschii duæ (t); neque enim suam tunc vulgaverat Hoffmannus (u). Quæ & ipsa, quamvis supponat, diabetem a præcedente lotii in renibus, & ureteribus retentione, provenire, unde ex eo multum in sanguinem regrediat, mox, sub lata retentionis causa, astatim prodituro; eo tamen redit ut renem poros ab ea ipsa retentione, & reversione laxatos significet, cum in quodam Comite qui diabete laboraverat, a dextris & ren duplo magis quam a sinistris, amplificatus, & ureter valde, ac sarcinosis instar dilatatus apparuerit. Ego quoque, ut minime in omnibus explicationem hanc fecerem, quippe cum in omnibus retentione lotii non præcedat, & copia quæ reddunt plures, longe superet quidquid retineri, & in sanguine redire potuerit, sic in proposito a me Viro, aliusque similibus non difficile secerant post retentionem, in eodemque præterea, cum ante ischuriam multum potare, multumque mingere semper foret, vel antea renes laxiores fuisse viderentur. Quid vero accessisset vitii ab humore, quem novissime cum parum biberet, tanta copia renes transmittabant, melius conjicere fortasse possem, si urinas omnes examinarem. Nam quod primis, ultimisque diebus aliquem ad mingendum afferent stimulum, intermediis nullum, facilius a copia esse potuit, quam ab illarum natura, quando copia minori erant intermediis diebus, majori autem primis, & ultimis: nisi forte malis, hebetatum a crebra distentione fuisse vesicæ sensum, ut intermediis diebus haud amplius afficeretur, donec ob parum potum, & ingentem humoris vim a sanguine exclusam, urinæ denique tanto aciores factæ sint, ut vel hebetem vesicam nonnihil percelleret, quo tempore etiam coeperint aliquam hic illic in ea phlogosim excitare.

16. Quod si ut phlogosim, erosionem ullam in vesicæ Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

intima facie conflexisset; minus fortasse grumum illum membraniformem examinarem, quem, in mortui urinæ deprehensum, polypotam concretionem esse, censui; quippe cum ex lamellis tunc factum credere potuissim ex interiore membrana deciduis; neque enim eo tempore controversia erat, quam annis demum superioribus ortam audivi, num sine hæmorrhagia non compescenda accidere id possit. At certe ejusmodi hæmorrhagia non contigerat in Matrona, a Willio (x) memorata, quæ cum longe ante obitum ex urethra eiecisset membranam crassam atque latam, materia sabulosa repleta; e cadaveris sectione constat, illam fuisse partem tunice interioris vesicæ: ut neque postea contigit in feminis duabus, quæ per eundem meatum amplam membranam eiecerunt, ab Ruyschio (y), & Boerhaavio (z) perspectam, harumque alteram lapillis quasi conspersam. Credibile autem non est, tales Viros pro vera membrana pseudomembranam accepisse, præsertim cum Ruyschius multis ante annis qua ratione ars possit, non modo natura, pseudomembranas efficere, docuisset (a), ipseque effecisset. Certe autem pseudomembrana non erat, quippe suis vasis sanguiferis prædita, quam eadem via ejectam a Viro conspexerat antea Rouhaulius (b), qui tres dumtaxat ejus portiones ea amplitudine esse, comperit, ut internæ vesicæ tunice duas saltem partes tertias fecisset, non dubitaret; tantum vero abest, ut hæmorrhagia esset conjuncta quæ cohiberi non posset; lotium sanguine tinctum apparuit nunquam. Equidem haud contendo, quidquid e vesica exit membranæ forma, veram id esse membranam, qui non fuisse in eo illo Cive, censuerim. Sed hoc volo, esse tamen aliquando notas membranarum adeo manifestas, ut internæ vesicæ tunice duas examinauerint, Viris, & pro veris habuerint, non sit repugnandum: nec quia non continuo assequimur, quæ ratione quædam possint absque gravissimis, atque adeo lethaliibus symptomatibus accidere, eo decurrendum esse, ut facta negemus. Igitur quæ in simili controversia de abscedente aliquando interna membrana intermembranam alias (c) scripti, tu hic quoque magna ex parte locum habere, existimato.

17. Nunc venio ad suppressionis causam in prætumida illa, præduræque Prostata glandula repertam. Hanc causam non infrequenter esse, ex Observationibus eorum didiceram, qui in Sepulchreto laudantur, Riolaui videlicet (d), Muralii (e), Dolæi (f), & facile, ut ego intelligo, etiam Reifeli (g): non dixi aliorum quoque, & in his ejus qui ante cæteros nominandus fuisset, Parei (h), quia non magnitudinem tantum, sed & scirrhusam hic spectamus duritiem. Confirmavi postea tum auditis, tum lectis aliis, quæ deinceps habita sunt, ejusdemmodi Observationibus. Audivi in duobus mihi probe cognitis hic Patavii honestis Viris. Legi autem tum apud alios, tum præsertim apud Cel. Heisterum (i) & si glandulæ auctam dumtaxat molem attendas, etiam apud duos alios Spectatissimos Amicos meos, Vallisnerium (k), & Benevolum (l), quibus adjunges Riedlinum (m). Verum non semper tota Prostata est tumida. Haud raro ejus tantummodo superior ambitus aut undique, aut cætera ex parte sic excrevit, & tumet, ut urinæ exitum occludat. Excrecentis adeo ut id faceret, exempla possum, ut puto, ex Sepulchreto indicare: excrecere autem incipientis plures mihi sunt Observationes, quas, ut parva magnorum morborum initia noscas, hic illis ordine subijcere non gravabor. Senem in hac Sepulchreti Sectione describit Rhodius (n), in quo mictionem fecerat sensim difficiliorem, denique autem, mucro addito, urinæ viam omnem intercluserat soli vesicæ orificio appendicula callosa interius adnata, & verius interior ambitus orificii membranofus in articuli magnitudinem excrecens. Certe clarius potuit rem describere, ut is pariter a quo Casauboni, adeo vesicæ morbis vexati, idem orificium in Sectione proxima (o) descriptum leges: quam descriptionem graves insuper obfcurant errores typographorum. Sed si recte ego quæ uterque viderunt, assequor; illius orificii ambitus quem summa Prostata facit, a nuda hujus protuberantia attollebatur. Ejusdem autem glandulæ summum illum ambitum undique excrecere incipientem in Senæ vidi, cujus historiam, ubi de Febribus scriberet (p), ad te mittam.

I 4. Ad

(b) Ibid. in Schol. ad §. 2. (c) n. 43. (d) 82. Sect. 4: & 59. Sect. 7. (e) Constitut. Epidem. Urb. A. 1691. n. 22. (f) n. 6. (g) n. 17. (h) n. 11. (i) Dec. 4. Obs. Anat. Chir. 5. (k) De Chirurg. Operat. ubi de urione Suggest. (l) n. 9. (m) n. 13. (n) Vid. supra, n. 2. (o) Caso proposto da Bartol. Barati a L. dovico Testi con la R. posta di questa. (p) Comment. de Bonon. Sc. Instit. T. 1. sub tit. Medic. (q) Exposit. mechan. Venen. Tent. 1. (r) Mon. Medici. c. 9. Sect. 2. (s) Vid. Mare. Donat. c. 27. supra ad n. 2. cit. (t) Obs. addit. ad Dilucid. Valvular. 13. & Cent. Obs. 13. (u) Consult. Medic. Cent. 2. Cap. 85. (v) Diff. de Urin. c. 5. (w) Aderf. Anat. Dec. 2. n. 9. (x) Ibid. Obs. 18. (y) Sect. hac 23. Obs. 17. §. 5. (z) Theat. Anat. 7. n. 39. (a) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1714. Obs. Anat. 1. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Sect. 25. in Adhuc. Obs. 15. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Sect. 25. in Adhuc. Obs. 15. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17. (u) Ibid. Obs. 17. (v) Ibid. Obs. 17. (w) Ibid. Obs. 17. (x) Ibid. Obs. 17. (y) Ibid. Obs. 17. (z) Ibid. Obs. 17. (a) Ibid. Obs. 17. (b) Ibid. Obs. 17. (c) Ibid. Obs. 17. (d) Ibid. Obs. 17. (e) Ibid. Obs. 17. (f) Ibid. Obs. 17. (g) Ibid. Obs. 17. (h) Ibid. Obs. 17. (i) Ibid. Obs. 17. (j) Ibid. Obs. 17. (k) Ibid. Obs. 17. (l) Ibid. Obs. 17. (m) Ibid. Obs. 17. (n) Ibid. Obs. 17. (o) Ibid. Obs. 17. (p) Ibid. Obs. 17. (q) Ibid. Obs. 17. (r) Ibid. Obs. 17. (s) Ibid. Obs. 17. (t) Ibid. Obs. 17.

enim ea Volumina quibus enumerationes istae continentur, multis ante ejus obitum annis edita, & ab ipso versata; eundem tamen nullum, quod sciamus, exemplum invenisse, propter quod sententiam sibi crederet omnino mutandam. Non fidem ille eorum qui scripserant, vocabat in dubium; sed majorem in aliis sagacitatem, in aliis diligentiam, in aliis suspicandi, dubitandique sapientem morem desiderabat, ut nisi quae praecesserant, comitabantur, subsequerentur, omnia confiderassent, ne satis crederent esse quatuor. Post ejus mortem prodierunt exempla alia, quorum aliquod cum ipso communicatum fuisse, apparet. Illa autem certe legisse non potuit quae in Commercio extant Litterario (x). At si potuisset: plurimum quidem, id quod ipse facio, illustribus, & omni ex parte suspiciendis Observatoribus detulisset; opastet tamen fortassis, ne fere omnia in sexu contigissent ad fallendum prono, quod illorum aliquis non dissimulat, itemque ut in nonnullis vermes fuissent descripti, in aliis vivi revera conspecti essent, in quibusdam ne tum descriptio, tum pictura polyporum concretionum suspicionem inicerent. Nosti enim, quam ipse esset vel in propriis Observationibus habendis suspicax, & si vis, difficilis, Attamen in alienis djudicandis suae caute morositatis affectus habuit Daniele Clericum (y), ipsumque Lochnerum (z); hujusque Amicum Godofr. Thomafium (a). At enim, inquis, aliquos hi excipiunt de tot, qui per urethram dicuntur emissi, vermibus. Nec ego omnes praefracte pernego. Aliquem dumtaxat exspecto qui suis luculentioribus exemplis nonnullas in quibus minus haereo, Observationes confirmet. Quae si tibi forte videntur extra omnem dubitationem posita; per me accipias, licet, dummodo fatearis, crebras adeo, & propemodum innumeras illas quae traditae fuerant, nunc ad raras, paucasque redire. Idque eo magis apparebit, si quae per anatonem examinatae sunt haecenus, spectare voluerimus. Quid magis lumbricum referebat, quam a Cl. Kellnero (b) descriptus, ex urethra post atrocissimos urinariorum partium dolores ejectus? Instituto autem accuratiori examine, nil aliud esse, quam cruorem coagulatum, & tenui quasi tunica cinctum, ipse deprehendit id quod pro lumbrico habitum fuerat. Sed & ii quorum bene multos per eandem viam reddebat Vir amplissimus, teretes intestinorum lumbricos, sicut exacta Thomafii (c) descriptio ostendit, planeque referebant, ut rumor insolita rei dicto citius per urbem diffunderetur. Quorum in mortuo nidus cum frustra in ceteris urinae causa creatis partibus esset perquisitus; demum ex renis sinistri, ejusque ureteris constitutione intellectum est, haud aliud fuisse, quam faculenti, viscidique sanguinis, in illis meatibus eam in formam coacti, inanimes concretiones. Cum veri autem lumbrici ex vesica prodierunt; anatome Alghisium docuit, ut supra (d) diximus, docuitque indicatum a Vallisnerio alterum, nempe Cl. Reinholdum Wagnerum (e), per quas vias illuc ex intestinis pervenissent. Sed jam a dubia, aut certe perrara dysuria causa, nimirum vermibus genitis in urinaris organis, ad manifestam, creberrimamque tranteamus, scilicet ad lapidem vesicae: quanquam de duabus quas, haud amplius, in Valsalvae schedis invenimus, eo morbo affectorum dissectionibus cum alteram, quippe ad apoplexiam magis spectantem, alias (f) perscripserimus; una tantum superest, simul ad vesicae calculos attinens, simul ad infelicem eorum excisionem.

8. P U E R novennis ex calculo vesicae jam sexennium laborabat. Per intervalla multum vexabatur. Urinam crebro praeter voluntatem reddebat, cum filamentis quibusdam, naturali tamen dolore, nisi quando a nimio interdum motu fiebat sanguinolenta. Calculus digito, per anum immisso, modo percipi poterat, modo non poterat. Quem Lithotomus cum extrahendum suscepisset, postquam diu puerum vexavit, magna vi parvum lapidem eduxit. Cum vero inesse alterum, sensisset; rursus puerum adeo torfit, ut in illis cruciatibus suffocari se, diceret; tandem fracti lapidis portionem extraxit. Vix horae dimidium elapsum erat, cum vomere puer coepit, assidue querens

de ingenti dolore in ventris parte infirma. His accessit abdominis levis tumor, febrisque cum magna siti, aliqua spirandi difficultate, & totius corporis jactatione. Itaque obiit una & vigesima post deductos calculos exacta hora. V E N T R E aperto, vesica cum circumjunctis membranis inflammata deprehensa est, & circa cervicem ab anteriore parte dilacerata. In ejus cavo dimidium secundi lapidis relictum erat.

9. Lithotomi aut imperitia, aut temeritas excusari hic profecto non potest. Neque hoc eo dico, quod digito in anum demisso, calculos modo percipere posset, modo non posset, qua de re mox (g) videbimus. Sed eo dico, quod non satis viam extrahendo calculo patefecerit, necesse est, quoniam magna vi parvum lapidem eduxit: quamobrem cum pernicie id accidit quod Celsus (h) monuit, ut *calculus iter, cum vi promittitur, faciat, nisi accipiat*, sicque etsi in pueris facilius partes dilatationi cedunt, quae una ex causis est, cur felicius plerumque in ipsis fit lithotomia; huic tamen vesica est circa cervicem dilacerata. Huc adde vexationem tam diuturnam, & tantam, & calculi alterius, quem magnum fuisse, non legimus, diffractionem, minime, si via satis patefacta esset, fortasse necessariam, sine necessitate autem semper fugiendam, ne aut forcepts interceptam, aut dissiliencia circumjectam interiorem vesicae tunicam laedant, aut dum longa perquisitione indagantur, & protrahuntur, laedendi occasio afferant, aut denique nequod ipsorum forte intus relictum, novo calculo initium praebeat. Quod si istiusmodi lithotomo, ejusque similibus interdixisset Hippocrates, ne *calculo laborantes secarent*; non esset adeo vexatus hic ejus locus ex libello qui *fusurandum* inscribitur. Ille vero id suis prohibuit Discipulis, imperavitque, ut *viris chirurgiae operariis ejus rei faciendum locum darent*; num quod Chirurgiam dedecere Medicum censeret? quasi ipse non esset plurimum in ea exercenda versatus; an ne illorum qui unice essent in singularum partium morbis curandis exercitati, obsecrationi exponeret suos? crederem, si praeter hunc unum, in aliis quoque certarum quarundam partium morbis idem faciendum praecipisset. Cur igitur hanc unam curationem excepit? Illic inclinatum animus, ut cum iis potius faciamus qui exceptam credunt, ut gravissimo inter ceteras illas periculo obnoxiam eo tempore praesertim quo necdum, ut hoc, tot montes, & praecipites, & instrumenta, accesserant, per quae ad perfectionem proximae adduceretur. Sed ad lithotomum illum de quo coeptum erat dici, redeamus.

10. Quod is, digito in podicem immisso, modo calculos sentiret, modo non sentiret, multiplex esse ejus rei causa potest: nec minus peritis, quam imperitis exploratoribus id saepenumero accidit. Peritissimus is certe erat, & est Vir Cl. Jo. Antonius Gallus Medicus, & Chirurgus in primis laudatus, qui annis superioribus Bononia accersitus Faventiam fuerat eodem tempore quo ego ex mea, ubi forte tunc eram, Patria ad non vulgarem Virum, plerisque eorum signorum affectum quae vesicae lapidem comitantur. Digito ille immisso, calculum quem antea perceperat, eo tempore nusquam potuit invenire. Nec tamen propterea nullum esse, conclusimus, cum signa illa peritarent. Imo ne postea quidem, cum viderentur evanuisse. Ab agro enim, mense circiter elapso ab eo die, certior factus sum, cum podagra, cui olim fuisset obnoxius, dein vero a longo tempore amplius non erat, tunc sibi repente rediisset, omnia simul abiisse vesicae incommoda, itaque non dubitare, quin ego in suam, uti optabat, sententiam transire, non a calculo, sed ab arthritica, vesicam irritante, materia fuisse ea de quibus cum adestem, usque adeo conquestus fuerat. Ego vero constanter respondi, quemadmodum ex illis de quibus antea conquerebatur, non pronunciaveram, calculo ipsum pro certo laborare, quia catheterem unde indubium ex sonitu signum fortasse extraxisset, admittere noluerat; sic neque ex illorum obscuritate, quae lotio fortasse ob irritantes particulas, alibi tunc subsistentes, minus acri facto deberetur, posse me pro certo negare, calculum inesse, ne si cathetere quidem admisso nullus perciperetur sonitus. Neque enim ignorabam, aliquos, me adstante, lithotomos, imo Chelfedenum ipsum (i) vel

vel ter immisso cathetere lapidem, qui tamen inerat, percipere non potuisse. Et revera mihi Patavium regresso, nomine aegri significatum est, cum revera priora incommoda ferre amplius nequiret, sibi calculum, cathetere perceptum, feliciter excidendum curasse. Sane etiam Experientissimus Vir Morandus (k) hoc attigit, vesica a calculo dolores interquiescere plures aliquando menses, imo & annos: & ipse in praecedentibus Sepulchreti Sectionibus habes ex Tulpio (l), & Nasio (m) exempla eorum, quorum alteri integrum quinquennium, alteri a pueritia ad annum aetatis 35. aut fere nihil, aut nihil supererat ex molestissimis, quibus antea conflicti fuerant, calculorum qui ingentes inerant, vesicae signis; ut horum primus non secus ac Faventinus noliter crederet, sibi calculum fuisse nunquam. Alios praeterea, qui, nulla unquam de hoc morbo querela emissa, cum decrepiti obissent, aut magnos, aut plures calculos in vesica, mirantibus omnibus, habuerunt: ad quorum historias tres, pariter in Sepulchreto (n) descriptas, addere alias possem, & nominatim ex Alghisio duas (o), quarum altera, ob perforatum in medio lapidem, similis est illarum tertiae, quae Loffium auctorem habet. Et mihi A. 1752. in Gymnasio Anatomen docenti, a spectato Pharmacopola, cujus taberna Gymnasio fubest, perforatus lapis, coram pluribus, oblatus est, ejus qui ab Alghisio pingitur (p), similis, nisi quod foramine erat paulo angustiori. Exiisse, dicebat, superioribus diebus nulla alia ope quam nature, & manus feminae ipsius in cujus vesica conqueverat. Concrevisse autem, coneci, & illum, & siqui alii sunt, praeter Alghisianum, annuli forma, in vesicae infima parte ubi circum urethrae orificium sic aliquando summa Proflata, aut in sequiore sexu glandosum, quod vocant, corpus intra vesicam undique prominet, ut proximi hujus parietes circumcirca subsidant. Quae prominentia, & quod consequitur, subsidencia, etsi in corporibus sanissimis, ut alibi (q) scripsi, levis, & vix ulla mihi se obtulit; nihil tamen prohibet in nonnullis aliis esse aliquanto majorem. Restantes igitur ex ultimis urinae guttis fabulosae, & viscidae particulae nonnunquam possunt in iis qui utrique abundant, in illa subsidencia paulatim concrefcere, & tanquam in forma quadam, annularem ex ipsa figuram accipere, ibique augeri, & subsistere, donec insolitus corporis situs, aut motus, aut causa alia aliqua inde dimoveat atque erigat, & in urethram, quae latior, & dilatabilis feminis obigit, forte compellat, ut huic accidit, & eoque facilius, quod lapidis ambitus ad ellipsim accedebat, cujus alterum extremum paulo esset angustius. Virgo erat, & annos nata octoginta duos, neque ulla unquam noxa, aut molesto sensu admonita, se vesicae calculo laborare, nisi quod tenuiore quam antea, filo urinam se reddere, animadvertenter; donec calculus in urethram lapsus, dolores ex improvito concivit, hique ad eos expellendi conatus adegere, ut intra horae dimidium jam promineret, digitique apprehendi, & continuo eximi potuerit, nullo, ut qui haec narraverat omnia, affirmabat, relicto incommodo. Nec tamen foramen, quamvis urinam transmittit, ceteras, semper arcet molestias, neque arcebat certe in lapide rotundo & levi, ejusdemque ponderis ac Loffianus in Mercatore cujus historiam omnino dignam quae in Sepulchreto relata esset, & Patavii & Norimbergae eodem ferme tempore edendam curavit Carolus Patinus (r), & ne forte credas, id accidisse propterea quod canalus non in medio, sed per anteriorem esset lapidis partem excavatus; primum aspice in Actis Eruditorum Lipsiensibus (s) immantem lapidem, a quo praeter dolorem quandam gravitatem in regione inguinali, vix quicquam mali senserat octuagenarius senex, quoniam urina ad vesicam translata, per canalem in lapidis superficie efformatum, ex ureteribus statim ad cervicem vesicae fuebant. Contra autem vide in Actis (t) Caesareae Academiae quid alter pertulerit, quamvis per faciem calculi in vesicae collo haerentis sinus quidam excavati essent, quos meatuum instar per quos exiret, lotium apertis sibi conservaret. Quin etiam ne tantum tribus viis per medios calculos relictae, lege apud Contolum (u) Cardinalis Franzosii dissectionem, qui per exactam quidem vivendi normam triginta ferme annorum spatium servatus, ad octogesimum sextum pervenit, sed toties fuit calculosis atque urinae passionibus divexatus, licet vesicae calculi simul combinati circulum repraesentarent, rimam per quam transibat urina, sicuti

pictura monstrat, inter se relinquentes. Tum denique accipe quod ex Vallisnerio audivi. Patavii ex Nobil Gente Mantua cui ipse intimus erat, Vir fuit, plerisque morbi de quo loquimur, indicis adeo & tandiu vexatus, ut si ad illa impedimentum unquam aliquod in mingendo accessisset, Medici omnes pariter in eo consensuri essent, ut vesicae calculo teneri, pronunciarent. Sed plures ideo in alia sententia erant, quod semper vel cum stans mingeret, sine ullo obice lotium reddebat. Mortui, ut vivens jussisset, vesica introspicita, calculi in hac tres inventi sunt laeves, & subrotundi, & ob hanc ipsam figuram triangularem inter se juxta positos foramen relinquentes: itaque etsi per medium urina transibat, etsi calculi erant ea figura, atque laevore, unde in aliis repetitum fuisse, video, cur molestia aegros non afficerent; huic certe, ut Patini quoque Mercatori, plura, nec levia attulerant incommoda. Sed hos casus, quos post duos illos primos indicavimus, Tulpii, & Nasii, comparationis dumtaxat causa memoravimus, quod five essent cum aggrorum molestia, five non essent, in his tamen fere omnibus cathetere immisso deprehendi calculi potuissent, non in duobus illis primis, quippe non obvis, sed in diverticulo vesicae conditi, ad hujus latera efformato: de cujus origine diverticuli erit infra (x) aprior dicendi locus. Hic vero attigisse satis est, ut vel hinc quae aegris possint, & quae lithotomis deceptiones oriri, intelligas, si qui antea in vesica erant, in ejusmodi forte sacculum recedant calculi, unde possint iterum pro vario aegri positu, & motu in vesicam redire. Accidet enim non modo ut de pluribus lithotomis alius percipiat, alius non percipiat, verum etiam ut idem lithotomus alio tempore: aeger vero qui antea ex lapidis pondere, subiectum intestinum duri instar scybalis urgente, de tenebris querebatur, contringente autem se inter mingendum vesica a lapidis asperitate dolores, ab eodemque se urinae cursui opponente importunum obicem sentiebat; ubi lapis in sacculum diverterit, ab his omnibus aliisque ejusmodi jam liber omnino sibi, ac solutus morbo videbitur. Sed de calculis inferius plura. Hinc enim si ad meas eodem subiciendas ordinarum quo Valsalvae retuli Observationes est transeundum; ab ea incipiam oportet quae ad dysuriam spectet ab renum praesertim vitio inductam. Ejusmodi autem est quam tibi in extrema superiore Epistola (y) pollicitus sum.

11. V I R annos natus ad sexaginta ob ferocum infarctum femoris, & genu sinistri menses aliquot in hoc cubuerat Nosocomio: nec posteaquam discussus ille fuerat, domum abierat, retentus primum alvi fluxu, post hunc autem levi alterius oculi inflammatione, denique cum hac quoque manendi causa subita esset, restitabat tamen ob inopiam eo majorem, quod multi homo erat cibi, ut iis non contentus quae convalescentibus offeruntur, plura posceret. Hunc igitur ibi inter comedendum illico repentina mors sustulit sine ullis syncopeis, aut suffocationis indicis. Sed neque mora in Nosocomio tam diuturna signum unquam dederat vel leviter affecti thoracis, aut cerebri: vixque, cum omnia inquirerem, a famulis accepi, auditum esse aliquando de urinae acrimonia conquerentem. Cujus originem acrimoniae cum tanto manifestiore in cadavere deprehenderim, quanto improvisti interitus obscuriore; idcirco hoc potius quam alio loco, narranda tibi censei quaecunque vidi sexto circiter a morte die; neque enim ob eas causas quas hic attingere necesse non est, potui citius: frigore tamen, quippe medio jam Decembri A. 1749. ita cadaver servatum erat, ut cum intestina, & mesenterium pridie quam adirem, detraherentur, non modo nihil vitii ostenderent, verum ne gravius quidem olerent. Sed cetera quae vidimus, facto initio a capite, sic habero. CEREBRI hemisphaerium laevum, ut exterius plures habuit vasorum truncos ex iis quae per Tenuem meningem repunt, sanguine turgidos, sic in subiecto ventriculo aquam ostendit subiturbidam non magna quidem copia, sed multo majori quam in dextero, in utroque autem Choroides plexus pallentes. Et cum medullaris cerebri substantia esset subdura, cerebellum laxissimum fuit. In Thorace pulmonis pariter sinistri posterior facies arcte cum pleura cohaerebat: ejusque, & dexteri crepidines late vesiculas ostendebant suas aere distentas. Ceterum neque arteria Aspera,

(x) A. 1731. Spec. 27. n. 5; & A. 1734. Hebd. 39. post n. 4; & A. 1735. Hebd. 36. n. 3; & A. 1735. Hebd. 49. n. 3; ut omittatur A. 1745. Hebd. 4. n. 2, & cat. (y) Hist. Nat. Lumbric. 6. 12. ubi de vermibus cum urina exst. (z) Obs. 99. cit. (a) Obs. 100. seq. (b) Act. N. C. Tom. 5. Obs. 75. (c) Obs. cit. 100. (d) n. 6. (e) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obs. 170. (f) Epist. 4. n. 2. (g) n. 10. (h) De Medic. l. 7. c. 26. S. 2. (i) Vid. Morand. Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1740.

(k) Ibid. (l) Sect. 24. Obs. 8. (m) Sect. 23. Obs. 7. S. 4. (n) Ibid. S. 3. & 7. & Sect. 24. Obs. 9. (o) Lithom. c. 4. (p) Tab. 3. Fig. 9. (q) Advert. 3. Animad. 41. (r) Vid. in Lyceo Patav. cit. Vitam, & Eph. N. C. Dec. 2. A. 1. Obs. 19. (s) A. 1685. Tab. 5. (t) Tom. 4. Obs. 49. (u) De Lapidib. 6. 23. & in calce libri. (x) n. 30. (y) n. 19.

pera, neque larynx, interius quoque perspecta, quidquam vitii habebant, ut neque Magna vasa, nec cor ipsum: in quo nihil polypoli fuit. Aqua turbida intra pericardium non multa; in utroque autem thoracis cavo, ut in ventre quoque, pauca adeo, ut omnis uncias aliquot non excederet. Venter denique; si genitales qualdam, & urinarias praesertim Partes, & arterias aliquot excipias; ceteras exhibuit ferme intra naturam modum; jecur enim, & ventriculus, comestis & epotis semiplenus, aequo apparuerunt aliquanto grandiora. Sed Magnae arteriae truncus lumborum vertebrae insidens, alba ossium alicubi habuit inchoamenta, quae & rami habebant, quin & verum os, sicut ibi praesertim deprehendi ubi se Iliaca dextera bifariam dividebat. Quod vero ad genitales attinet Partes, testiculus dexter triplo erat major quam sinister. Sed hoc fortasse a natura; uterque enim sectus repertus est sanus. Illud a morbo, quod ex utriusque Albuginea tunica, eodemque utrobique loco corpusculum pendebat exiguum, subrotundum, & cum ea tunica albicaret, rubellum, praegressa hydatidis, ut opinor, reliqua; quamquam nihil aquae erat intra tunicam Vaginalem. Renis tandem utriusque structura intima confusa apparuit: neque decant parva cellulae humoris plenae, quarum aliqua; nam cetera aliquanto interiores latebant; ex parte se in superficie ostendebat. Pelvis utraque postquam e renibus aequo amplius descendit ad digitos transversos duos, in ureterem se contrahebat. Ureteres autem medio fere cursu absoluti, fiebant latiores, sinister praesertim, qui & longior ob flexum erat. In utroque, si exterius contrectares, mediocres calculos quosdam, sed raris, locis contineri, crederes. Aperiendo autem, in singulis iis locis hydatides singulas deprehendimus, quasdam rotundas, alias ovales, ex intima tunica in ureteris cavum, neque per petiolum tamen, pendulas. Rotundae minutorum uvarum aequabant acinos, ovales erant secundum longitudinem duplo quam illae majores. Ureteres crassioribus constabant tunicis, quarum intima rubedine perpetua inficiebatur: oblongioribus autem in vesica habant orificia. Haec eam continebat urinam copiam, ut in supposito cadaveris posito ad imam se extenderet lumborum vertebrae. Quin etiam ubi, urina detrusa, aere immisso distenta est, etsi ad eam accedebat formam quae a me alibi (c) proposita fuit; non paulo tamen erat quam solet, longior; ceterum nec crassiores habebat tunicas, neque ulquam intus rubebat, quo colore ne urethra quidem erat infecta. Illud demum quod superiore Epistola (a) promisi, non est omittendum. Ex ora posteriore ejus orificii aqua urethra incipit, duae inter se contiguae protuberant intra vesicam albae, durae, hemisphaericae, modicae, ac parvis magnitudinis prominentiae: quas simul cum subiecta Prostata glandula secundum longitudinem perscans, ei continuatas, ex eademque substantia facies deprehendi. & quamquam Prostata pars aliqua non ea erat albedine, ac duritie; reliqua tamen, & praesertim quae utrinque ab lateribus Seminalis carunculae ascendeat, haud alia erat, quam illius in quam se producebat, geminae prominentiae; ut si haec scirrholae erant, non minus scirrholae Prostatae quoque pars maxima videretur.

12. Cetera quae in ejusdem cadaveris cerebro, corde, aliisque visceribus, in ejusque valis diligenter perfectis ostendi, non sunt hujus loci propterea quod secundum naturam se habebant. Quae cum ita essent; tam repentinae mortis causam non licuit, nisi in vehementissima quadam Tenuis meningis convulsione suspicari, quippe fero quod diuturna in femore stagnatio acris fortasse reddiderat, non satis per alvum egesto; itaque oculi primum, denique cerebri membranas summa cum hominis pernicie adorto. Querelae autem de urinae acrimonia multo antiquiores, opinor, fuerant, quam semoris infarctus: illarum certe origo fuisse videbitur longinqui temporis, si renum, ureterum, vesicae constitutionem spectaveris. Calculi olim fortasse eas omnes partes male habuerant, renes ortu, & incremento; mora autem varia in ureteribus, & vesica, renes iterum, pelvis autem, & partes ceteras quae modo dicebantur, ladescentes, pleraque autem retento lotio amplificantes, & ureteribus insuper noxam peculiarem, quam in iis alias vidisse non memini, internarum hydatidum afferentes, quae & morari ipsae urinam, & vel sine calculis pleraque eorum fecisse, aut saltem

auxisse poterant quae modo a calculis repetebamus. Sed quacunque fuerit causa quae has lesiones importaverit; ab ejusmodi certe renibus non mirum est, aequo acris lotium destillasse; aut ab ejusmodi ureterum glandulis pro humore idoneo ad illos adversas totius falinas particulas obliniendos, aut acrem debuisse, aut nullum amplius fecerni potuisse. Ab utralibet enim causa repetas licet, cur toti pro nativa albedine diffunderent, ad vesicamque urinam mitterent in ipsis aut acriorem factam, aut saltem demulcente illo additamento non temperatam. Quae pressius hic attigimus, magis probabis, si Amicorum nostrorum Clariss. Pu-jati, & Benevoli ea Scripta legeris, eaque huc transferas quae superiore Epistola (b) indicavimus. Jam enim est nobis, promissum ordinem servantibus, ad eam dysuriam quae ex vesica lapide est, transeundum.

13. ANDREAS CORTINIUS Civis meus; Reverendissimi P. M. qui nunc Religionis Quaestor Ferrariensis est, Parens, Antonii autem Avus, mei amantissimi, & Rei Pharmaceuticae, ac Chirurgicae peritissimi Viri, homo subpinguis, parumque exercitatione corporis uti solitus, cum annos excederet sexaginta, alba, & lenta mingere coepit, nec sine dolore. Suspicionem hinc ortam calculi in vesica herentis, catheterem tandem immisso, sibi quidem confirmavit Chirurgus, non agro, qui cum ille calculum tangere se, diceret, ipse calculi impulsu deceptus, non calculum tangi, asseverabat, sed vesicam. Quam opinionem eo magis fovebat, quod a catheteris immisione reddita facilius mictio fuerat. Itaque non jam de hac, sed de quodam potius dolore querelatur in scrobiculo cordis, qui, si paulo concitatus ambularet, gradum sistere cogerat. Accedebant arteriarum pulsus turgidi, & vibrantes, quales saepe solent ab aneurysmate. Nec vero haec cessarunt, cum post longum temporis intervallum rediit urinae difficultas cum ardoris sensu circa pubem. Quin fere assidue erant querelae de illo dolore in scrobiculo cordis: pulsus iidem. Tres, aut quatuor exacti erant anni a primo dysuriae initio, a ceteris autem incommodis menses saltem duodeviginti, cum ego quoque ante Februarii finem A. 1711. ad agrum suum acceperis consolandum potius, ut statim domesticis dixi, quam curandum. Mingeat plus multo, quam potabat: urinae autem ex subflavo albicabant, feri instar quocumque lactis adhuc sit portio admixta, materia deinde subsidente alba, pauca aliquando, & tenui, non pauca alias, & lenta, & gravius olente, eaque majori cum dolore, & difficultate ejecta, id quod circa auroram potissimum solebat accidere. Dolor autem in cordis scrobiculo saevior factus erat adeo, ut aeger perinde esse diceret, ac si a canibus laniaretur, cum ingrebat acerbior per intervalla: quo tempore sternum, & proximam utrinque partes condolere, aiebat, sinistram autem superiorem artum stupidum fieri, & inertem, & cor denique, praesertim si in laevum cubaret latus, moleste palpitare. Hacque fiebant in dies graviora, ut facies haud amplius, uti fere antea solebat, in iis doloris exacerbationibus ruberet; imo jam natus, manus, pedes frigerent, & alvus quam tertio quoque die tactenus solvere levi clystere oportuerat, nunc post singulas illas exacerbationes biliosa effunderet. Ne vero quis forte suspicaretur, eas ex vesicae irritatione oriri; quanto illae acerbiores, tanto simul leviora ad vesicam fiebant omnia, faciliusque urinam reddebantur. Neque tamen, si pecciori, aut ventri admovent manus, quidquam praeter naturam perciperes: imo venter nullam usquam duritiem, nullam prorsus tensionem habebat. Interea somno doloribus interrupto, ciborum appetitu dejecto, siti vexante, vires magis magisque fatiscebant, interni sensus quasi torpere incipiebant, pulsusque ipsi a prima illa magnitudine, & impetu declinabant adeo, ut parvi, ac debiles, sinister praesertim, nec raro inaequales deprehenderentur; in exacerbationibus vero ultimis etiam nulli. In hoc igitur rerum statu quantulumcumque asserre, si non auxilium, at certe levamen potui, non omisi. At fuerunt omnia sine noxa quidem, sed, ut praedixeram, irrita. Itaque cum postridie Nonas Martias duae tresve sanguinis guttae sponte e naribus exciderent, insensum autem noctem a crebro in scrobiculo cordis dolore omnium pessimum duxisset, & mane tamen, silentio dolore, se se ad sedendum in lecto crexisset; post horam circiter eodem revertente, & saevissime urgente, prope dicam subito confusus

etiam est. CADAVERIS, pinguedine etiam tum non pauca praediti, Thorace primum dissecto, pulmones, cor, vasa Magna omnis vitii expertia deprehendimus.

Venter jecur habuit non naturalis coloris, & cysti contracta, ac flaccida, quippe ex qua dolores bilem, ut dixi, toties expresserant. Ventriculi, cetera sani, fundus vix aliquid leviter subatri ostendit. Ren sinister, tota ferme substantia intus consumpta, maxime flaccidus, inaequalem calculum continebat, & urinam qualem aeger mingeat. Quae & dextero inerat: cujus exterior facies in tot quasi globulos, imparis inter se magnitudinis, divisa affurgebat. Vesica tres habuit lapides neque magnos, neque asperos. Ejus interior superficies ex tenuissimo quasi tomento fieri videbatur, excresecbatque ad cervicis latus in durum tuberculum, faba non majus, vesica intus, extraque concolor. Denique in Prostata glandula sinus erat, quo tartari similis materia, & ferme jam calculosa continebatur.

14. Urinae difficultas, quae de agimus hinc Litteris, causas in hoc agro Prostata glandula, vesica, & renes quidem habebant; sed dolorum acerbissimum, quibus adeo confictus, & denique peremptus est, soli quantum ego intelligo, renes habuerunt. Neque enim dolores illos ab infimis ventris partibus excitatos esse, verisimile est, praesertim cum magna vitia essent in renibus, quibuscumque nemini esse potest ignotum quantum ventriculus consentiat, cujus pars dextera scrobiculo cordis responderet. Et consensui acceptum referendum est quod vomitiones soleant, cum renum vitii conjungi: itaque ex illis haec in perobscuro quodam casu (c) nos suspicatos esse, memineris. Fuerant etiam vomitiones immanes in Virgine quam ex renum occulto morbo dolor sub sinistris costis excrucians intra biduum interfecit, ut Epistola XXXVI. (d) propositum est. Fuit tamen aliquando cum sine vomitu, & sine ullo, aut certe cum levibus renum morbidorum indicis non levia horum mala delitescerent (e), aut pro vesicae innoxia vitii imponerent (f). Denique cum renum morbis ventriculi dolorem interdum jungi, certum est: sed non lethalem, neque ab lumborum dolore disjunctum, quorum cruciatus nemo ignorat ut soleant renum, ipsis affixorum, mala comitari aut non acerbis, aut adeo nonnumquam atroces, ut in aliis Litteris (g) ex Ruyfchio retulimus, cum renum superficiem non fecus in globulos divisam, confexerit, ac nos in dextero agri hujus rene observavimus. Verum in nostro hoc casu nulla de lumbis querela, non acerbissimus dolor ad vesicam, non hypochondriorum cruciatus, non vomitiones; sed ad scrobiculum dumtaxat cordis dolores intolerandi unum erant signum renum pessime se habentium. Quae res an ab aliis adnotata sit, ipse quares: certe est tanto magis digna quae adnotetur, quanto magis potest morborum aliorum suspicionem injicere, praesertim si, ut in proposita historia, magnos, & vibrantes pulsus consequatur, molestant autem cordis palpitacionem, stuporemque ac torporem artuum superiorum, & mortem denique ipsam inducat, eamque etiam cum aeger paululum recreatus videtur, pene subito ingruentem. Scilicet id alibi admonuimus (h) esse timendum, cum graves internae convulsionis per intervalla recurrunt. Quod ad genus descriptas doloris exacerbationes referendas existimamus, ab nervorum in renibus tanta irritatione repetentes, ut per alios colligatos nervos ad illas quas modo nominabamus, partes propagata, in singulis ea quae diximus, efficiat.

Illud in hac singulari erat, ut ventriculum quem pleraque, uti commemoravimus, petunt a renibus profecta, non ut illa, ad vomendum concitaret, cum eam tamen ipsius partem saevissime torqueret quae scrobiculo cordis responderet.

15. A. D. O. L. E. S. C. E. N. S. annos viginti praetergressus, a longo jam tempore iis vesicae doloribus, praesertim cum mingeret, cruciabatur, ut sine ejulatu urinam reddere non posset. Purulenta haec erat. Accesserant macies, febris, & reliqua mala quae fere vesicae lapidem comitantur, & quibus tandem, in hoc Nothoomio decubens ante finem anni 1742. absumptus est.

V. E. S. I. C. A. crassa, exulcerata, & ex parte scirrholosa revera lapidem continebat subasperum transversos digitos tres longum, duos cum dimidio latum quae erat latissimus; ad formam autem accedebat ovalem, utrinque depressam: eique multus lentus, cruentus-

que alicubi, mucus circum adhaerebat. Pure autem, & urina pleni erant renes, & ureteres; imo hi tam distincti, ut Ilei intestini diametrum aequarent.

16. Mucus quem calculo adhaerentem vidimus hujus adolescentis, tanta aliquando copia circum aggeritur, ut vel cathetere immisso internosci nequeat lapis a peritissimis Viris, quod Falloppio ipsi accidisse, testis est Marcellus Donatus (i). Eodem mucos inter calculum, & vesicam interjecto etiam cetera incommoda non tolerantur, imo nonnulla etiam augeantur; dolores tamen, si crassior mucus, & magna copia sit, illi minuantur quos calculi creant asperitates. Hinc dolorum, ut de nephriticis quoque diximus, incrementum a diureticis, quod Sanctiorius noster praclaro exemplo confirmavit, relato in Sepulchrii superiore Sectionem XXIII. (k) ubi (l) & illud Donati leges. Itaque in Consiliis quae ipse legi, Valsalva in vesica lapide demulcentia quidem, emollientia, anodyna praebat, & in fomentis, infusibus, modicis clysteribus adhibebat, mulieribus autem etiam in pessis, & injectionibus; sed, ut narcotica, quippe exigua dosi nihil adversus ejusmodi dolores agentia, majori vero periculosa, ita etiam thermalium, aut aliarum aquarum ingurgitationem, ab aliis propositam, cum Albertino improbat, muci absterisionem veritus. Quibus de rebus cum aliis, tum praesertim memini audire ambos in eandem sententiam verba facientes, cum Praefectus Equitum Nucerinam aquam quotidie mane perpotaret. Quin vesicae ulcere teneretur, dubium erat nemini, multoque minus Valsalva qui non semper necessarium crederet, sanguinem in lotio apparuisse, ut urinariis in partibus ulcus esse, pronunciaret. Illud in controversia erat, an praeter ulcus inisset vesicae calculus. Quod alii affirmabant ob dolorem qui jam diu in mictionis fine percipiebatur. Sed assensum retinebant illi, non ignari, ut exulceratam manum, sic exulceratam vesicam contrahi non posse, contringique sine dolore, & hinc quoque esse, cur sicuri ceterarum cavarum partium quas modo dilatari, modo contrungi necesse sit, ita & vesicae ulcera difficiliter fanari queant. Nec tamen abesse calculum, contendebant, quamvis aeger aut saltans, aut curru vectus illius nulla experiretur indicia, neque donec aquam redderet, acerbum adeo sub mictionis finem perciperet dolorem, qualem ubi demum quantum potaverat, excrevisset, rursus percipere incipiebat. Verum etsi neutrum affirmabant, aut negabant; mihi tamen Albertinus quadantenus eo inclinare videbatur, ut calculum esse, non crederet, cum tam copioso aquae potu mucus a calculo auferri, molestiaeque propterea in dies augeri debuissent; contra autem dum aqua transiret, mulieri hac posse ulcus, & dolores, concipiebat, neque hos antea ad pristinam acerbitatem redire, quam omni ejecta aqua, urina pristinam acrimoniam recuperaret. Sed ne talium Virorum, aut ipsis similibus in vesicae calculo affirmando, aut negando haesitatio tibi nimia forte videatur; fac legas quae de summa ejus recte dignoscendis difficultate egregie inter ceteros collegit, & pendit Helwichius (m): quantum aliorum quorundam praecipis temeritas displicebit; tantum illorum cautam prudentiam laudabis.

17. Quod alias huc dissectiones non addam eorum quibus sine externa causa lapis in vesica concreverit, haud tibi erit mirum qui scias, maximam a me vitae partem in hac regione ductam esse, ei morbo, ut quaedam aliae, in quibus Scaphusiana (n), & Gortingenfis (o) laudantur, quam rarissime obnoxia; quod hic alii vident, alii aequis, alii utrisque esse tribuendum, censent. Et certe vina hic tartarea non sunt, ut Medici loquuntur, id est lapidosi crustis dolia intus non obducunt, quod aliis quibusdam locis vidi, ubi alba vina faciunt, ut intra ligneum dolium quasi alterum increseat lapideum. Rubra autem hic vina sunt quibus utimur: qualia vina Brunnerus (p) quidem censuit summa caput petere praebis; vicissim tamen ejus Socer Weplerus (q), cujus sententia ab Hofmanno (r) laudatur, quod inter Scaphusianos suos rari essent calculosi, potissimum eorum vino rubello salubri adscribebat. Quia certis quibusdam locis rubra vina provenire, quae non modo a calculo fervent, sed & inchoatum solvant, quippe etiam tartarum dissolventia quo alia vina in crustavecin dolium, si huic indantur, ex Commercio intelliges

Lit-

(c) Epist. Anat. 1. n. 61. (d) n. 19. (e) n. 13.

(e) Epist. 30. n. 22. (d) n. 20. (f) Epist. 40. n. 15. (g) Vid. supra, n. 4. & 5. (h) Epist. 40. n. 19. (i) Epist. 10. n. 13. (j) De Medica Hist. Mirab. 1. 4. c. 30. (k) Obf. 4. §. 11. (l) Ibid. §. 4. (m) Act. N. C. Tom. 2. Obf. 60. (n) Vid. Eph. N. C. Dec. 1. A. 2. Obf. 37. (o) Vid. Haller. Opusc. Pathol. Obf. 33. (p) Eph. cit. Cent. 9. Obf. 3. in Not. (q) Obf. 39. paulo ant. cit. (r) Medic. Ration. Tom. 4. P. 2. S. 2. c. 11. §. 20.

Litterario (f). Porro quod ad aquas attinet; fluminum hujusce regionis aqua, cujus cum parte aut equali, aut aliquanto, imo, ut saepius, multo majori confertur multum, & sic vina parantur quibus hic fere omnes utuntur, minus terrae, ut ajunt, fortasse continet, aut minus idonea ex qua calculi gignantur. Sic autem loquor propterea quia de unoquoque fluvio plura & varia attendere, & examinare antea necesse est, quam pro certo aliquid pronuncietur: quanquam solet plerumque minus terrae in fluvialibus aquis contineri quam in putealibus, unde est quod plura in domesticis uibus praestare illas videamus quae haec non possunt, aut non aquae, ut puta in sapone dissolvendo, & leguminibus coquendis; & quod ad salubritatem spectat, quis in universum aquas putet quae ad bibendum ab Deo ipso Opt. Max. oblatae in fontibus, amnibusque sunt, illis esse salubiores quas primum homines, longius a fluvio, & fontibus incolentes, necessitate adducti, sibi effossis puteis paraverunt? Quod si sententia quoque Virorum Doctissimorum audienda est; vide quid de puteorum aquis sentiat Meadius (t), quid Platnerus (u): eorum sane iudicio, multiplici ratione suffulto, facile permotus, puteales fluvialibus, universe loquendo, non dubitabis longe postponere. De singulis autem si verba fiant; est ubi certo flumini optimum puteum, non modo aliud flumen, anteponas. Nosti enim; ut cetera praeteramus; certorum fontium ex quibus denique fluvii oriuntur, aquas esse quae ductus suos alia crassissimis, durissimisque, alia tenuibus, mollioribusque laminis terreis incruentis. Quae hic attigimus, ut errori occurreretur cum vulgo existimantium, omnes a vino, aut vini similibus potionibus esse calculos, quasi in aqua etiam horum materia non esset, nec qui nunquam vinum potassent, calculos genuissent. Certe per dies vite sua solo aqua potu usus fuerat is qui proxima Sectione XXIII. (x) Sepulchreti memoratur; ejus tamen vesica lapides continuit 32. Sed quid in hominibus ejus rei exempla quaerimus, cujus, nec rara, obvia sunt in iis quae nunquam utuntur vino, animantibus? Ut enim speciosiora omittam aut ob pondus, ut bilibrem ferme lapidem quem ex equae vesica Lemeryus attulit ad Regiam Scientiarum Academiam Parisiensem (y), aut ob colorem, ut septem octove quos ex vaccina vesica mihi olim Valsalva ostendit parvulos, pilularum forma, superficie minutissimis quasi granulis subaspera, aeneo autem colore, ut pro metallicis quisque haberet qui esse leves, nesciret, quemadmodum pro aureis longe plures illos quos intus, aut extra aureo colore infectos, aut splendentes & rutilos, omnes autem parvos alii (z) in bubulis pariter vesicis invenerunt; ut igitur hos, & fillos (a), aliosque omittam, & in canibus dumtaxat commemorem, & primum a me visos, in una quam peradolescens exercitationis causa dissectui, non modo calculos deprehendi in rene utroque; sed horum dexterum ne tertiam quidem partem retinentem substantiae suae, cum inter calculos alba purulenta materia esset. In altera autem quam olim vetulam experimentorum causa Patavii incidi, calculum intra alterum renem offendi abnormi, & depressa figura, durum, non parvum. Atque ut ad vesicam redeam; tertia canis (forte enim accidit ut quinque haec bestiae, quarum singillatim quidem, calculos memoravi, feminei essent sexus) duos in gangraenosa vesica habuit lapides majorem, & minorem, ovali utrumque figura, sed valde utrinque depressa, imo altera minoris facie nonnihil excavata qua majorem excipiebat. Ea canis undecim annos nata, a longo jam tempore graveolens reddebat lotium, sine ejulatibus tam en, credo ob lavem, eoque saltem non compungentem, calculorum superficiem, donec convulsivis motibus accedentibus extincta est. Quae mihi narravit, dum eos calculos recentes ostenderet, illius herus Vir Generosissimus ex hoc Sacro Philosophorum Collegio. Ab aliis autem in tot canibus conspecti sunt calculi, ut nisi eos tantum feligam qui aut numero, aut stridura, aut pondere, aut sede digniores sunt qui memorentur, haud facile finem inveniam. In cane qui diu stillicidio urinae laboraverat (b), parvulorum cal-

culorum aliquot mille in vesica diſſenta reperti sunt. Alterius (c) vesica unum habuit qui, ob minorem intus inclusum, ætatem referebat, pondo sesquialtera. Sed tertii (d), sæpe cum doloribus, & vehementi ejulatu urinam reddentis, calculum, qui vesicæ inerat aspera; non lævigata, ut in Patavino; superficie, etſi eſſet paulo infra pondus unciarum trium, miraberis tamen magis quam sesquialterem; hic enim canis fuperte genere erat minimus. Denique potius ut sedes quam ut calculus, describatur, præmittendus non est quem probus Juvenis auditor meus annis superioribus mihi narrabat, cum se exercendi gratia, canem perſecaret, deprehendiſſe. Ureteres paulo ſupra locum quo in vesicam influunt, unum in canalem ambo conveniebant, alterutro eorum non latiore: is raro exemplo unus pro utroque mediam perforabat ad inferiora vesicæ partem, in eamque lotium inferebat. Ad hujus igitur canalis initium quo ureteres, ut dictum est, confluebant, hærentem calculum invenit, eumque non ita durum. Non tamen hæc, multoque minus cætera quæ Donatus (e) calculorum congeſſit, exempla repertorum in jecinore quoque, aut ejus vesicula, tum ventriculo, & intestinis brutarum animantium, omnia, ſicut ille fecit, Aristoteli sunt obſcienda, ponenti (f), nullum animal, niſi hominem, calculum fieri poſſe; id enim continuo ſic explicavit, ut de urinae dumtaxat vesicæ calculis præclare appareat ibi quidem eſſe locutum; alio autem loco (g) quem Donatus fugiſſe, miror, diſerte ſcripſit, renes in hoſtiis ſepenumero calculis, & pannis, & papulis reſertos conſpici, atque etiam jecur & cat.

18. Ex eo autem quod alibi (h) tradidit Aristoteles, non solum humorem, sed etiam sicca quedam concretamenta in vesicam descendere, ex quibus calculi conſiciantur, antiquissima origo intelligitur sententiae eorum qui e renibus delabi inchoatos calculos vesicæ omnes, in hisque propterea peculiarem semper nucleum in centro inveniri, tradiderunt. Quorum utrumque est in multis verum esse, non inficior; aliquando tamen libentius habeam cum Hippocrate (i), qui ex diutius cohibita urina id quidem quod tenuissimum in ipsa est, excerni, quod vero crassissimum, ac turbidissimum est, coacervari & concretum, docuit, & primum quidem parum, deinde majus fieri: dum enim voluitur ab urina, quidquid crassum compactum fuerit, ad se ipsum adaptare, atque sic augetur & in totum concretum. Quod citius quidem poſſe fieri, Observatio ostendit Joannis Dolai (k), qui e vesica cujusdam Equitis emissam materiam albam mucilaginosam scribit subito ab aere externo in subflavum calculum riguisse. Sed vel sine aeris externi attractu putrefcere intus remanentem urinam poſſe, experimenta monstrant Prael. Brendelii (l), qui ex illa putrescente calculorum deducit originem, cum videat (m) & duras crustas, & mucosam pulsatamque materiam dare, granis duriusculis distinctam, quæ mox ipsa quoque dureſcat. Eſſe autem urinas quæ facilius, ac citius ista deponant, minime dubitat (n), ubi & duorum infantum meminit alterius vix duos nati, alterius octo circiter dies, qui calculos tum ante mortem excluſerant, tum mortui intus habuere. Qualem autem calculosam materiam in quinquennis pueri cadavere Meadius (o) viderit, & per quos gradus in lapideam duritiem transire, animadverterit, cognoscere ex ipso poteris: quemadmodum ex Cel. Hallero (p) qualia credat prima eſſe in renibus calculorum initia. Sive autem inchoatus calculus, sive calculi materia e renibus in vesicam descendat, aut in hac gignatur, certe calculus incrementum capit ex eadem materia: nec aliena a vero tradere videntur ii qui firmius inter se aptatum iri materiae illius particulas, ajunt, quo lentius incrementum fiet; infirmius autem, quo celerius: & qui majus illud fore ætate quam hyeme, quippe ætate multo minus diluta materia ab aqua, tunc magna ex parte per cutem prodeunte, urinae portione: quæ altera mihi videtur causa, cur, si optio detur, calculi exciſio ab autumnæ potius ad ver, quam a vere ad autumnum differatur. Sed præter inchoamentum calculi sive in renibus, sive in vesica formatum, accreſcit eadem ma-

materia, circum res quoque alias, extrinsecus in vesicam immixtas. Cujusmodi exempla cum a pluribus & scripta, & collecta sint plura; ego iis potissimum describendis quæ ipse, aut Amici vidimus, nec tamen omnibus, immorabor.

19. Nam illud quod mihi se primum obtulit, jam ante hos tres, & quadraginta annos in Ephemeridibus editum est Casarex N. C. Academiae (q). Quin præter meam illam, descriptio altera extat ejusdem ipsius casus, ab eo qui meam editam nesciret, vulgata sexdecim post annis in Adnotatione quadam, Operibus adjuncta Cel. Vallisnerii (r), qui mecum Chirurgo secanti affuerat. Descriptiones quidem ambæ in rebus præcipuis satis conveniunt inter se: in nonnullis autem si quid discrepant; sic habeto, me meam certe scriptis mandasse eodem, ut solitus sum, sectionis die. Et calculus qui adhuc cum acu cui circum accreverat, apud meſervatur, profecto non est durissimus: id quod primum ejus magnitudo cum pondere collata significat. Cum enim ex duabus conflet partibus quarum singulæ ad ovalem figuram accedunt, majorque intra quam acus mucro, & tertia ferme, ut proclive est judicare, pars latet, longa sit digitos transversos tres, lata duos, alta unum & semis, minor autem quæ urethram similiter atque in alia Virgine (s) leges, opplebat, alteri prioris partis calculi extremo sic continuata, ut ad ejusdem lateris extrorsum emineat ad angulum rectum, magnitudine æquet medii digiti articulum tertium; utraque tamen simul cum acu infra pondus est nummi unius argentei philippii. Friabilem autem magna ex parte externam saltem calculi eſſe substantiam, spongiosamque texturam, inspicio ipsa confirmat. Lamellæ enim quadam tenues nonnullis ex locis per se exciderunt, subiectasque cavernulas patefecerunt, albus autem, ut calculus est, pulvisculus, qualis ex cariosis salignis baculis solet, e calculo ultro deſiuit. Quæ ut non licuit in recenti animadvertere, sic tempore interjecto obvia, nunc volui ad descriptionem illam addere. Est igitur hic calculus iis corticibus instructus, qui si alii duriores lapides simul in vesica fuissent, horum occurſu non difficilior potuissent abrupti, & in fragmenta diſſiliendo, qualotium exhibat, cum hoc prodire, quam in fene illo, de quo ex Tulpii Observatione in Sepulchreto (t) relatum est. Nec multo durioris naturæ fuisset calculus, existimabis, quem in Juvene Experientissimus Vir Heisterus (u) cum antea per catheterem percipisset, mox datis paucis, quæ adſcribit, vulgaribusque remediis quorum ope calciformis materia emicita est, intra hebdomadas tres incommoda fuit omnia a quatriennio moleſta, quod anno post felicem illam curationem jam tertio, litteris mandavit. Atque utinam ejusmodi eſſent calculi omnes, qui vesicæ innascuntur. Verum ex Sepulchreto ipso vides, quot silicis duritie fuisset dicantur; imo ex Heistero ibidem (x) proferri grandem quandam omni silice duriorum, ex Brasavolo (y) tamen decem, in Alberto Savonarola inventos, qui ſi in terram projicerentur, veluti trigonalis pila reſiliant, denique apud Lindenium (z) visum a pluribus unum, quo pauci gravioreſ comperti sunt, nempe unciarum 32. durissimum, compactum, silicis colore, triangularem, ex quo cum ferro, ut ex silice, eliciebatur ignis. Quos pariter memorat Panarolus (a) tam duros, ut pyritem lapidem æmularentur; percuisse enim chalybe, flammam evomebant, consulto prætereo, ne forte quia a muliere dicit excretos, fucum illi factum suspiceris, quando Bartholinus (b) vel in ipsa lithotomia sic impositum fuisset a vaſerrimo nebulone Egro nobilissimo, Amicisque præſentibus, multos hinc conſeciſſe, ſcribit, quod e ſuppoſitio calculo ſcintillæ excuterentur, impoſſibile autem ſit, talem in homine lapidem generari: quamobrem vix ſe continebat, quin ſimilis duritie alterum in dubium vocaret, quem, ut humapa ex vesica ſedum, ſibi donatum habebat. Verum illos quos ex Sepulchreto propoſui, omnes in cadaverum vesica inventi dicuntur: & ne fraudis cauſam fuiffe, dubites, primus certe in Sene deprehensus est qui nunquam de calculo vesicæ conqueſtus fuerat, ut nunquam de renibus Senex alter, qui tamen in dextero lapidem habebat, insolita magnitudinis, & figuræ, duritie autem quem-

cumque silicem æquantem, ut Vir Cl. scribit, qui sectioni interfuit, Christoph. Guil. Bajerus (c). Mihi quidem necdum accidit ut vesicæ calculus ostenderetur cum illis comparandus, nisi foeminarum fraude, & Medici unius, atque alterius qui his faciles aures præbuerant, credulitate. Hic enim primum unum vidi, qui non modo; ut Ferrandi (d) verbis utar; *fluviatilis potius diceretur, quam vesicalis*; sed cum revera fluviatilis eſſet, cruore oblitus incautis pro vesicali obtrudebatur. Deinde a Medico aliquo non indocto qui Venetiis ad me scripserat, ab ægra quadam pene quotidie bene multos, nec parvulos excerni, ut fidem non facile credenti faceret, missos plurimos, quos statim ac vidi, miratus, eſſe aliquem potuisse qui non continuo silicis unde ignis elicitur, magna, & rudia fragmenta agnosceret, nihil aliud reſcripſi, niſi ut chymicæ deſtillationi committeret, & quæ prollicerentur, ſignificaret; itaque ab eo nihil amplius litterarum accepi. Nec tamen hæc eo dico, quasi alii alibi id quod ego ubique fui, nusquam conſpexi, videre non potuiſſent. Quin alii nostratum qui ex eo dumtaxat quod malleo renitentur, humanum calculum eſſe poſſe, negabat, ut cætera quoque attenderet, ac diligentius inquireret, auctor fui, quando a Viris Doctis Steinium citari videmus qui humanos lapides mallei ſcibus reſiſtentes in Lithographia propoſuit. Certe autem Morando Viro Experientissimo credendum eſt ſcribenti (e), calculos quos vocat *murales* eandem quam marmor, polituram accipere: itaque invictos perſtare credidit vel ab eo in quo tot ſolenter pericula fecit, lithontripico remedio quod apud Anglos non ita pridem vulgatum fuerat, cujus ope alios non paucos calculos aut imminutos, aut etiam abſumptos fuiffe ipſo quoque in ſeptem chatheteris indicio perceptum eſt, miraturis, ſi viverent, Franciſco Sylvio, & Boerhaavio, præſtari per alkalicos ſales, imo non per alios id præſtari poſſe, dici, quod alter (f) a *ſalis petreæ*, aut *nitri acido ſpiritu*, alter (g) a *nullo fere liquido præter ſpiritum nitri*, eſſici, docuerat. Utinam vero idem omnibus, aut ſaltem plerisque anglici illius remedii uſu præſtitum fuiffe, mirari poſſent: utinam ſaltem, non nocuiſſe. Ad ſi tot illas, poſtea additas exceptiones perpenderis, in quibus & ea ſunt quas a calculi natura, ab ægri ætate, a ejusdemque temperamento petendas Cl. Hazonius (h) expoſuit; quam ſæpe remedium aut inutile, aut noxium eſſe potuerit, non obſcure apparebit: & ſi hiſtorias, & diſſectiones legeris, quas Commmercium Litterarium (i) proponit; facile intelliges, quanta inde pernicies interioribus partibus, & præſertim urinaris, & ſimul ut nulla calculorum, aut calculi (id quod urinarum ſedimenta oſtendiſſent) eroſio fuerit. Quod cum dico, noli putare, iſtam calculorum ſive eroſionem, ſive deſquamationem, ſi quoscunque calculos, & quæcunque lithontripica in univerſum ſpectemus, ſemper eſſe exoptandam. Potes id, ut alios non verſes libros, ex laudato Commercio noſcere. Eſt ubi (k) exempla deſcribuntur, ſectioneſque calculoſorum duorum, attendendus prioris calculi *hinc inde late ac profunde eroſus*; dato enim quodam lithontripico liquore cui verſimiliter id imputandum, exacerbata fuerant omnia, & vesica quidem non eroſa, ſed circa oriſcium alte inflammata. Alibi (l) commemoratur a Cl. Goetio caſus Illuſtris Viri qui nescio cujus remedii uſu *largam* quidem *arenularum*, & *squammularum*, corticem calculi contriti reſerentium, copiam cum lotio reddens, cruciatus ſibi adeo auxit, ut ab hiſce conſectus ſit. Scilicet in mortuo calculus repertus, cortice ſuo viſcoſo & glabro, qui vesicæ lateribus impune adhaeruerat, orbatus, duriori, inequali & aspera ſua ſuperficie cervici vesicæ impactus, lethales illos dolores videtur conciviſſe, ubi eorum præſertim quæ ſupra (m) ſcripta ſunt, veniat in mentem. Felicius tamen quam per anglicum illud lithontripicum, ab non uno Doctiſſimo inter Anglos Medico improbatum, & nominatim a Meadio, (n) cedere hic ipſe tradidit aquam vite calcinatam *ostreorum aliarumve concharum reſtis medicatam*, qua calculorum non duriffimorum *frustula*, nunc *arenularum*, nunc

(f) A. 1735. Hebd. 6. n. 3. & Hebd. 17. n. 4. & Prefat. in not. ad pag. 47. & 132. (t) Exposit. Mechan. Venet. Tent. 6. in fin. (u) Progr. quo aquam font. salubriorem & cat. (x) Obſ. 4. §. 2. (y) Hist. A. 1700. Obſ. Anat. 14. (z) Aft. N. C. Tom. 2. Obſ. 2. & Sachs Gemmarolog. c. 14. §. 8. Vid. & apud Haller. ad Boerh. Meth. Stud. Med. P. 13. c. 2. ad An. 1665. N. 101. (a) Sachs c. cit. 14. §. 6. & Eph. N. C. Cent. 7. Obſ. 7. (b) Earund. Dec. 3. A. 5. & 6. Obſ. 260. (c) Ibid. in Append. sub n. 6. ad Obſ. 23. (d) Dec. ead. A. 9. & 10. Obſ. 170. (e) e. ut. ſupra ad n. 16. (f) Sect. 10. Probl. 42. (g) De Partib. Animal. l. 3. c. 4. (h) Hist. Animal. l. 3. c. 15. (i) De Aere, aquis & cat. n. 23. 23. (j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 4. Obſ. 64. (k) Progr. de Calculi vesicæ & cat. natalib. n. 2. (l) m. n. 1. (n) n. 2. (o) De imp. Sol. & Lun. c. 2. (p) Opus. Pathol. Obſ. 34.

(q) Cent. 5. Obſ. 26. (r) Tom. 3. P. 3. Off. 12. (s) Sepulchret. Sect. hac 25. Obſ. 5. (t) Sect. prox. 24. Obſ. 10. (u) Differt. de Medico nimis tim. n. 36. (x) Sect. 23. Obſ. 7. §. 5. (y) Ibid. Obſ. 2. §. 4. (z) Ibid. Obſ. 1. §. 1. & Sect. 24. Obſ. 10. §. 3. (a) Patrolog. Pent. 3. Obſ. 34. (b) Cent. 4. Epist. Medica. 100. (c) Commere. Litter. A. 1745. Hebd. 40. n. 2. (d) Sepulchret. Sect. cit. 23. Obſ. 2. §. 5. (e) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1740. (f) Prax. Med. l. 1. c. 55. n. 50. (g) Praefat. ad Instit. 6. 791. (h) Quæſt. de his edita n. 4. (i) A. 1740. Hebd. 41. n. 2. & A. 1745. Hebd. 3. n. 2. (k) A. 1733. Hebd. 21. (l) A. 1731. Hebd. 23. (m) n. 16. (n) Monit. Med. c. 10. in fin.

exiguorum nucleorum instar simul cum urina ejecta sunt. De aqua hac auctoris Cel. Roberti Whytt Dissertationem commendat. Experimenta autem ad ejus naturam indagandam Helmsstadii instituta, per quæ alkalino sulphuream esse, apparuit, in alia Dissertatione leges, quæ Præsidi Cl. Krugero (o) ibidem vulgata est. Fuerunt etiam qui cum alkalicis acidis miscerent, & in humorem sic effervescentem conjectos calculos aut penitus, aut quadantenus solvi, deprehenderent, quomobrem ejusmodi ferventem humorem in canum vesicam injecerunt, & quatenus hæc ferre illum posset, explorarunt. Sed ut sana toleraret vesica; num a calculis quoque irritata, & exulcerata? Non certe; quando in exulcerata malum augeri a priore anglico illo remedio, quamvis non ferente, & ab urina quæcum ad vesicam descendit, copia diluto, Morandi experimentis (p) compertum est. Sed ad calculos, acubus incrementis, revertamur.

20. PUELLA Agrestis eadem ferme qua prior illa nobis in Ephemeridibus (q) descripta, ætate; annum enim agens quantum decimum mortua est; cum ante menses sexdecim idem quod prior, faceret, idem merito passa est infortunium. Nam crinalem acum ex orichalco, quamvis ad angulum in medio inflexam cum altius per urethram immisisset, sibi repente e digitis abripit, & totam intra vesicam condit, sensit. Pudore prohibita, non tunc modo, sed propemodum ad mortem usque siluit veram dolorum ac molestiarum quas præsertim in mingendo pertulit, causam: quæ tot, ac tantæ fuerunt, ut tumor demum in hypogastrio, & proxima ilium parte obortus per duo quæ sibi ipsum fecerat, foramina effunderet, majus, & minus, quorum illud erat in ile sinistro, hoc in dexteris, proprie dicti cum Laurentio (r), hypogastrii finibus. Sic affecta in Nofocomium Patavinum uno aut altero ante obitum mense excepta est. Facile ibi animadvertunt, simul cum pure per utrumque illud foramen urinam effundi, persinistrum autem magis, cui suberat cavum non modicum quocum foramen quoque dexterum communicabat. Cum in eo cavo specillum duri quidpiam offenderet; quæsitum est ex me, quidnam hoc esse, existimarem. In memoriam rediit quid in priore puella specillo obstat per fistulam demisso in ilium altero patenter, & lotium cum pure effundentem. Cumque audirem, hanc quoque inter mingendum vesicæ doloribus torqueri, & paucam, eamque purulentam urinam reddere, querendum, respondi, num forte acum, aut rem aliam quampiam in urethram immisisset. Negavit puella donec foramine sinistro per levem communium integumentorum sectionem amplificato, cuspis, & magna pars acus intra cavum abdominis conspiceretur. Tunc quod oculare alius non poterat, nimium sero facta est. Neque enim acus extrahi poterat prohibente adnato calculo quam specillo sive per cavum illud, sive per urethram immisso ut facile erat percipere, ita non licebat sine magnis doloribus vel leviter propellere. Idemque, si quid per urethram vellent ad demulcendos dolores injicere, ne in vesicam admitteretur, obstat. Huc macies accesserat summa, in diebusque puris augebatur copia, & graveolentia, febrique ipsa facta erat vehemens. Quam alimentorum omnium fastidium, vomitus, flavorum liquaminum ex alvo fluxus, tum virium, & pulsuum debilitas consecuta sunt, donec mors tot miseris, & querelis, inter quas nulla unquam de lumborum dolore ab interrogantibus audita fuerat, optatum finem imposuit. CADAVER, quod sceletus cute obductus videbatur, sub dio, in amplissimoque loco ob anni tempus fervidissimum incisum est; Quinque illis enim mensis erat initium A. 1738. Primum omnium, specillum jussu per foramen dexterum in ulceris cavum trajeci, totumque eum sinum patefieri. Erat is inter musculos abdominis, & integumenta, neque ullam usquam, nisi cum illo cavo, communicationem habebat. Quod longum latumque digitos tres, a sinistro ile Albam lineam versus se extendens, tenui postico pariete, quem reliquæ musculorum, & peritonæum faciebant, a ventris quidem cavea separabatur; sed eodem pariete a dextris patente, cum vesicæ fundo communicabat, illacque magna pars acus in ulceris cavum prominebat. Tunc abdomen scis incisum est, ut scilicet ad vesicam non perveniret: quæ etsi parva erat; tamen altius, id est supra ossa pubis cum interna abdominis facie coaluerat ea dum-

taxat parte qua in ulceris cavum patebat, ita ut nihil in ventris caveam effundi posset, in qua reapse effusi humoris non erat quidquam. Sed & omenti, in quo vix aliquid hic illic restabat pinguedinis, ora infima ad proximum vesicæ peritonæum arctissime annexebatur. His ita pervisis, & diductis pubis ossibus, vesica tota in conspectum data, ipsaque cum urethra, quæ sana erat, aperta, crassæ quidem illius tunice, sed contractæ adeo repertæ sunt, ut præter calculum vix posset quidquam continere. Calculo hic illic earum intimæ adhærebant, quæ inæquales erant, & pluribus locis exulceratæ, & quemadmodum ulceris cavum fuerat, gangranosæ. Erat calculus paulo duobus digitis transversis longior, pollicis autem aliquanto crassior, forma ovulum referens cuius vertex superiora spectabat, ut acus quoque mucro cum tota ea parte quæ ad angulum usque de quod dictum est initio, pertinebat, calculo ferme parallela, ab eoque pollicis intervallo sejuncta: pars acus reliqua & ipsa extra calculum erat, quantum conjici poterat, propemodum tota, capitulo dumtaxat cum portione aliqua proxima in medium calculi sinistrum latus firmissime infixo, id est ejus concrectione obducto: quæ illa facie, & extremo utroque inæqualior est, opposita ferme lævis, & subalba, nisi qua, ut tota sinistra, subflavo colore infuscatæ; hæc enim describo, ut nunc video; tunc vero quibusdam locis erat cruenta, cætera fusci obsoletique coloris. Tunc quoque his medicis ponderibus calculus, ut cum acu est, examinatus, paucis granis levior repertus fuerat drachmis septem; nunc paucis granis superat drachmas quinque, & scrupulos duos. Cætera ventris pleræque partes ab naturæ modo sic aberant. Intestina subflava erant quadam, & flavo illo qui novissime deieciatur, humore turgidula: jecur albidum: splen lividior, & paulo major quam æquum esset. Uterus autem, ipsique renes pessime habebant. Illi enim dilatati, pure erant pleni, quale in cavo etiam ulceris multum fuerat, liquido, & ex subflavo albicante, id est pure cum urina commisto. Renes autem æquo majores, dexter præsertim, qui & durior, & cellulis intus excavatus parvis, sed pluribus, eodemque pure, ut pelvis quoque, adeo distentis, ut in sectione alius profluerit. Renis sinistri tunica adiposa, & propria inter se junctæ, crassæ, & duræ ejusdemmodi pus coerebant, quo renis, quibusdam locis erosa, superficies, non secus ac passim interiora, scatebat. Odor autem terribissimus qui ex renibus, & vesica afflabatur, Thoracem porro incidere, cujus viti indicium extitisset nullum, prohibuit.

21. Quæ, sectione sic absoluta, continuo, ut solitus sum, pluribus qui aderant, Nobilibus Viris, aliisque Rei Medicæ, ac Chirurgicæ tum magistris, tum studiosis audientibus, locutus sum, ex his quæ fuit tibi subjiciam, facile intelliges. Quæ causa hæc, & tot alias puellas incitaverit, ut tibi acum capitula in urethram intruderent, non tam in lacunis salacis humoris querenda est, quippe & alibi, & extra illam hiantibus, nisi ad idem genus pertinere forte credas eos quoque canaliculos quos intra mulierum urethram descripsi (f), quam in exquisito membranæ sensu quæ illa intus convolvitur. Nam nisi hanc altius perficerent, accidere non posset, ut repentinè ad valida imæ vesicæ contractione acus ex earum digitis abrepta, intra vesicam tota, præsertim cum longiuscula est, conderetur. Ab illa enim, ejusque sphinctere cum Molinetto (t) infortunium hoc repeto, non a vi quadam, ut ajunt, uteri, quæ, ut exurgeret, in vesicam tamen exsucta non traheret. In quam postquam acus attracta sunt, paulo post nonnullis quidem per se excidunt, ut puellis duabus de quibus apud Vallisnerium (u), alteri dormienti, alteri autem mingenti, credo quibus ex parte solummodo vesicam subissent, uteriam in tertia fortasse fuit, nempe intorta acu facilis in urethra parte altera remanente, altera intra vesicam ad mensum retenta. Cui parti nihil tamen accreverat calculosæ materiæ: quod neque accidisse refertur acui a quarta (x) intrusæ, & post dies quindecim inter mingendum ejectæ, quam pariter infima & acuta parte intra urinæ iter substituisse, illud forsitan indicio est quod de punctio- nis sensu circa vesicæ collum tantummodo querebatur. Sed etsi hæc ex iis quæ attinguntur postea (y) de acuum mucrone urethræ infixo, magis illustrabuntur; non tamen incicias ivero, posse interduum acus quas vesica totas receperit, ita se convertere, ut pariter per meatum exeant

exeat urinarium. Cur vero duabus illis quas novissime dicebamus, intra quindecim dies, imo intra mensem nihil adhæserit calculosæ materiæ, quam multo breviori spatio aliis adhæsisse, novimus, haud una potest esse causa. Nam neque omnibus urina æque est fœta particulis ad subsistendum, gignendumque calculum idoneis, & alia diutius lotium retinent, alia fecus, & alia aliarum acuum materia est, aut superficies. Sic argentæam acum ob id ipsum quod argentæa esset, Vallisnerius (z) conjicit sine ulla calculi addita concrectione e vesica fuisse eductam: quæ tamen conjectura credibilior fiet, si aliis exemplis confirmabitur. Sic ad asperiores superficies facilius videtur concretio adhæsura, quam ad politissimas: & hinc forsitan ratio petenda est, cur plerumque unam acum partem calculus obducit, reliquam nudam omnino relinquit, itaque de duabus quarum cadavera infixi, puellis in priore vesicam acus capitulum, in hac altera acumen perforaverit, quod in illa partem infimam fortasse asperiores, in hac ob eandem causam oppositum extremum concretio facilius obtulerit. Ex iis autem feminis quæ intrusam acum, adnatumque huic calculum non modicum vesica gesserit, nulla, quantum legisse memini, diutius gessit sic quidem ut acu extracta, ipsa fervaretur, quam Veneta illa cujus extat casus a Molinetto, qui A. 1649. curaverat, editus (a) adjecta acum, calculique iconem, quem in Theatro hoc Anatomico fœlebat ostendere, ubi a se visum testatur Moinichenius Epistola ad Thomam Bartholinum (b); neque enim hic Bartholinus, ut aliquis Eruditissimus alioquin Auctor per incuriam scripsit, se his esse potuit calculi postea extracti quam ipse Patavio, atque adeo ex Italia discesserat (c). Idemque is calculus est qui ab eodem Moinichenio proponitur in Observationibus (d): quod ideo attigi, quia in extrema Adnotatione ad Observationem Vallisnerii, quarum utramque sæpe indicavi, non videtur pro eodem agnosci quem Vallisnerius scripserat, in hoc Theatro ostendi solitum, nunc in Musæo suo asserari; nam quod ex Patavina, non ex Veneta exemplum dixerit, id erroris, ut puto, causa fuit, sed facile vitandi, si lectus fuisset Molinetus, in cujus libro descriptum fuisse videtur ignorari, a Lanzonem etiam dico, minus alioqui in Scholio ad illam Moinichenii Observationem miraturo, longo tempore acum ossæm in vesica latuisse sine ulla vesicæ ipsius læsione, nec ullo quidem puellæ incommodo. Quæ ne Moinichenii quidem verba dicere sinebant, multo autem minus Molinetti, non modo quæ in extractione, sed & quæ antea, & postea puella tulit, memorantis. Quod si hujus longe minus quam earum de quibus a nobis scriptum est, vesica ab acu læsa fuit, fortasse id accidit quod acus mucro diutius quam in vesica, in urethra hæsit, extra quam demum urgente desuper calculi pondere detrusus est, ut Molinettus invenit.

22. Eas calamitates, mortemque adeo ipsam antevertet is qui in tempore admonitus, acum priusquam calculus accrescat, ea dexteritate educat, ut minime quo ad ejus fieri possit, ledatur vesica. Quod cum ab aliis de quibus apud Vallisnerium (e), tum præsertim ab Amicis meis duobus feliciter præstitum est, quos alias tibi laudavi, Mariano, & Vulpio. Ille, ut litteris scripsit ad me datis pridie Idus Decembris A. 1720. ex aggre- sti puella, jam sanguinem mingente, acum exemit, cum industrie extraverso posito in rectum traduxisset. Erat autem crinalis acus ex offe. At quam a Vulpio ex puella quadam urbana extractam vidi, erat ex orichalco. Extraxerat autem paucis ante hebdomadis quam eas a Mariano acciperem litteras, nullo alio instrumento adhibito quam ferreo filo lævigatissimo, cujus alterum extremum sic in exigui uncii, & pene annuli modum incurvaverat, ut neque ledere vesicam, & capere acum posset, capere autem elabi capitulum non sineret. Quod si res multo serius, adnatæque jam calculo innotescat, neque is ejusmodi sit, ut facile adeo per urethram possit eximi, oportebit antequam femina cruciatibus difficilioris extractionis subiciatur, solerter inquirere, num forte non vesica modo, id quod suspicari omnibus proclive est, sed ureteres quoque, & ipsi præsertim renes, quæ suspicio ex nostris oritur dissectionibus, tantum jam mali contraxerint, ut vel acu, & calculo detractis, mulieri nihilominus moriendum sit. Conjectura autem renum male affectorum ducetur non tam a lumborum doloribus (quos Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

abesse posse, vidimus (f), aut sicuti in propolita puella (g) fortasse accidebat, a multo favoribus vesicæ cruciatibus secundum Hippocratis aphorismum (h) obscurari) quam ab lotii, quæ longa interdum, nec semel præcesserit, in vesica suppressione, aut crebriore ad acerrimos dolores vitandos retentione, aut exigua nimis excretionem, in qua vitanda cavendum est, nequando assiduo urinæ stillicidio decipiamur, memores, cum hoc retentionem posse conjungi tantæ illius copię, quantum ubi de Claudicatione verba fiunt (i), a me ostendetur: quanquam & aliis id Epistolis (k) jam satis ostensum est; quin Sepulchretum (l) historiam offeret, in qua vesicæ collum laxum adeo ex resolutione inventum legas, ut digitum facile immitteres; itaque urina ægroto non sentiente, ante obitum prodibat; vesica tamen, eaque duplo quasi major, erat nihilo secius tota repleta. Retenta autem urina quantum ureteres amplificasset, ex iis Epistolis cognovisti, & quantum etiam renum caveam dilatasset, ipsamque in uno saltem, substantiam lævisset.

23. Quod si hæc a retenta lotii parte; quanto magis a longa, & repetita totius intra vesicam suppressione, aut a crebra & lotii, & puris ipsius retentione? A suppressione certe habes in Sepulchreto exemplum plura, inter quæ Rumleri (m), & Ballonii (n) quorum hic magnam vidit ureterum amplitudinem; ille eosdem urina plenos, renes autem tantæ in puero magnitudinis, quantæ vix esse possent in adulto: quomobrem Cl. Fantonus (o) jure censuit, cum per catheterem plus urinæ tunc educitur, quam vesica continere videatur, partim a distentis quoque ureteribus, partim ab ipsis nonnunquam ampliatis renibus profluere posse. Nimirum cum plus vesica jam capere non potest, quidquid lotii jugiter in renibus seceditur, ureteres primum, tum renes quoque ipsos distendit. Non id fugit Aretæum (p). Ubi urina in vesica supprimitur, superiores quoque partes, inquit, renes videlicet, replentur: urina ductus (græci Ureteres appellant) distenduntur. Quæ cum etiam accidant, ubi nullus in vesica est, aut antea fuisse dicitur calculus, ut in propositis exemplis, itemque in eo quod a Commercii Litterariis (q) Auctoribus recensetur, aut in Cæsaræ Academiæ Actis (r), aut in Helveticis (s) legi potest; impedito enim urinæ effluxu e vesica ab hujus abscessu, vel a via per Prostatam coarctatione, aut influxu in vesicam ab summa hujus capacitatis imminutione, magnitudo renum & amplitudo ureterum, vel horum saltem dilatatio ut minimi digiti diametrum superarent, vel digiti majoris æquarent, in oculis incurrunt; cum igitur hæc etiam sine calculis accidant; non fuerant sane a calculorum dumtaxat in ureteribus mora quæ descensuræ obstat urinæ, a Viro alioquin experientissimo repetenda, neque ex eo quod cuidam unus in vesica esset calculus, ureteres autem ambo dilatati, arguendum fuerat, calculum illum necessarium ex duobus, quorum singuli in singulis substitissent ureteribus, coaluisse. Cum vero ea quæ diximus, fiant vel ubi vesica potest ad ingentem capacitatem extendi, profecto intelligis, quanto accidere facilius debeant, si aut ipsa, ut in uno ex indicatis exemplis, in se contracta, aut alieno intus corpore aliquo occupata, minus, & interdum vix aliquid spatii urinæ relinquit, sive ischuriam inde, sive stranguriam dumtaxat pariat. Sic post ischuriam, Sylvii Observationem habes in Sepulchreto (t) ureterum pollicem non raro admittentium, atque urinam usque ad renes ipsos in se continentium, ut scribit, non 2. sed 1. Prax. Med. libro cap. 56. tum illam quæ communicata cum Rioloano describitur (u) renum dimidio majorum solito, sero refertorum & turgentium, atque ureterum amplissimorum, & ita sero distentorum, ut minorem digitum facile possent admittere. Post stranguriam autem Cæsarum ibidem (x) leges invenisse renes urinæ distentos & turgidos, quibus dissectis copiosa effluxit, uretes admodum latos: quos etiam post dysuriam ab ejusdemmodi causa laudatus Fantonus (y) amplissimos deprehendit; quo acerbior autem, ut illa, dysuria est; eo graviorem solet stranguriam habere conjunctam. Cum igitur in puellis duabus quarum a nobis sunt inspecta cadavera, acerbissima fuisset dysuria, vesica autem valde contracta, & calculo pene tota occupata; mirandum non est quod lotium priusquam via per acum facta, ab illa egredi aliquanto liberius posset, ea copia in ureteribus, renibusque subliteret, ut illos dilatare, hos autem etiam vitare adeo

(o) Dissert. qua exhibentur Experim. cum aqua Olfocoderm. instituta. (p) Mem. cit. (q) Vid. supra ad initium n. 19. (r) Hist. Anat. hum. corp. l. 6. c. 2. (s) Advers. l. 1. n. 10. & IV. Animad. 24. (t) Dissert. Anat. Pathol. l. 6. c. 8. (u) in Adnot. ad Obs. supra ad n. 19. cit. (x) Ibid. (y) n. 25. & seq.

(z) Obs. cit. (a) e. supra cit. (b) 87. in hujus Epist. Cent. 2. (c) Vid. Cent. 1. Epist. 73. & seq. (d) Med. Chir. 22. (e) Obs. & Adnot. supra ad n. 21. cit. (f) supra, n. 2. & seq. (g) n. 20. (h) 46. Sect. 2. (i) Epist. 56. n. 12. (k) Epist. 4. n. 19. & Epist. 39. n. 33. (l) Sect. hujus 3. l. 37. Obs. 2. §. 5. (m) Sect. 24. Obs. 12. §. 6. (n) Ibid. §. 7. (o) Dissert. Anat. Renov. 7. (p) De Caus. & Sign. Acut. Morb. l. 2. c. 10. (q) A. 1738. Hebd. 33. n. 1. (r) Tom. 1. Obs. 164. (s) Tom. 1. (t) Sect. 24. cit. Obs. 6. §. 8. (u) Ibid. Obs. 16. (x) Sect. hac 25. Obs. 8. §. 7. (y) De Obs. Med. & Anat. Epist. 8. n. 15.

valuerit, præsertim cum pure commistum, quod ex vesica tunica exulceratis manabat. Eustachius (z) namque, ut rebus secundum naturam se habentibus, nihil ex vesica per urinarios meatus egredi posse, confirmabat; tamen in magna, & longa suppressione urine, contrarium accidere in pluribus ægrotis quandoque se, aiebat, observasse. Scilicet valde amplificatis simul cum ureteribus ipsorum quoque in vesica orificiis, nulla iam illorum pars superest quæ inter vesicæ tunicas oblique trajiciatur: itaque non modo tunc potest illac urinæ portio redire; sed & cedere incipiente, aut soluta jam suppressione, se contrahens ad mingendum vesica tanto plus urinæ per amplificata illa orificia furtim compellit, quanto minus potest deorsum, obstantes subinde calculo per urethra orificium expellere. Quod si forte paulo ante calculus minus obstitit, majorique ideo urinæ copia per urethram eiecit, non multa jam restat in dilatatis ureteribus; intelligis certe, si mox iterum se calculus ad urethram opponat, urinam, cum eaque pus, si forte insit, per ureteres ad renes usque, cubante præsertim, dum mingere conatur, ægroto, non difficile compulsum iri.

24. Hæc autem, ut vides, maribus æque ac feminis communia sunt, possuntque ab his quoque lapidibus tandem expectari, qui non circum acum in vesica concreverunt, ut præter eam quam supra (*) descripsimus, adolenscentuli historiam, tot aliæ ostendunt, quarum aliquot, ut Sepulchreto possis adicere, hic placet commemorare. Henricus Henrici in Dissertatione de Abcessu Mesenterii (a) de quinqueenni puella meminit, ejus ureter ex restagnante, ob calculum vesicæ, urina, intestinum mentiebatur, ren autem alterius magnitudinem triplo superabat. Extat in Actis Eruditorum Lipsiensibus (b) Groeneveltii Observatio in puella calculo, ejus ureteres intestinum quoddam Tenue capacitate referebant. Eosdem in fene a vesicæ calculo sæpius stranguria confictati Mauchartus (c) vidit ab urina, quam continebant laci ebullitatio similem, inflatis instat in testini ilei cum renibus maximis, & inæqualibus, quorum pelvis ad ovi magnitudinem erant distenti. In nauta Laubius (d) ab eodem morbo, cum symptomate eodem conjuncto, non modo cum pelvibus ureteres valde dilatatos, sed & cum renibus, altero magno & ulceroso, altero contra atrophiam laborante. Post easdem affectiones Lospichlerus (e) in mercatore ureteres invenit stagnante lotio adeo distentos, ut pollicis majoris introitum facile admitterent: Brunnerus (f) autem in Viro Principe fuisse, refert minus turgidos, sed renem dorso inciso, urinam pleno flumine profusisse.

Dices fortasse, quæ lates in renibus, & ureteribus eorum spectantur qui laborant vesicæ calculo, huic non quando jam in vesica est, sed quando in renibus, aut ureteribus hærebat, esse imputandas, sique Butzmannus (g) censuisse, cum in puero, affectionibus de quibus loquimur, diu cruciati, renis loco sacculum deprehendit puris plenum. Sic Rudolpho Jac. Camerario (h) in puella pariter affecto, purulenti renis, & dilatati erofique ureteris causam vitam esse indidem repetendam. Quin duas Coschwitzii (i), & unam Schulzii (k) extare Observationes, in quarum nulla de vesicæ calculo; sed in omnibus de calculosis doloribus mentio fit: in duabus autem primis purulentos renes, mirum in modum dilatatos fuisse ureteres, in tertia non solum dilatatos, verum etiam in crebras orbis Tenuium instat intestinum tortos ferme ut in Stabulario (l) descripti sunt; tanta vis lotii fuerat in ureteribus secundum longitudinem quoque amplificandis. Quod tamen non ex vesica furtim regurgitasse, eorum monstrabat orificia, quippe ambo in hac tertia Observatione, alterum autem in prima in hærentibus angulosis lapillis, aut frustulis quasi testaceis, spasmoticam fuis aculeis constrictionem inducentibus, oclusa. Ego vero ista alia quoque ratione renes aliquando, & si vis, sæpius, vitiari, & ureteres distendi, negavi nunquam. Imo hoc ajo, si ista præcesserit, tum deinde calculis in vesicam illapsis, eamque obstruentibus, aut compungentibus, secunda ratio successerit; tanto magis a regurgitante purulenta urina labem renem, & ureterum acutum iri, quanto magis antea prima ista ratio labefactaverit. Præclare igitur vides quæ prudentem litho-

tomum morari debeant, ad calculi extractionem post longa, & gravia ægrotantis mala accessitum: aut si forte hujus impatientia exfecare interdum cogatur, quid saltem prædicere oporteat vel post felicem exsectionem posse mali, & periculi superesse. Si a calculis, inquit Aretæus (m), renem ulcera facta sint, insanabiles inde morbi nascuntur, cita colligatio, morsque advenit, præeunte Hippocrate (n), qui de suppuratis renibus vel in universum pronuntiavit, hunc morbum gravem esse, & multos ex ipso ad tabem renalem devenisse: & si ætas accedat gravior, non modo (o) renem, & vesicæ vitia difficulter sanari; verum etiam (p) renem affectiones se non vidisse sanatas supra quinquagesimum annum. Haud equidem ignoro, quantum, ut in plerisque aliis rebus, ita in his quoque fortuna valeat, qui hic A. 1708. non una, nec levi de causa desperatam ab Alghisio Patricio Veneti, annos amplius sexaginta nati, curationem, mox susceptam, & felicissime absolutam ab Eremita illo Jacobo Beaulieu fuisse, meminerim, quemadmodum sciscitanti Cl. Viro Morano fidei osum per litteras significavi, & multo inter initia plenioris metui, neque infelicitas tamen exitus, curationem alteram in Sepulchreto (q) legerim: in quo (r) etiam Fœminæ Principis historia extat, quæ gravissimis renem doloribus cum sanguinis, & puris mixtu antea cruciata, deinde ab his libera, morbo denique alio confecta, in rene ostendit parvum calculum, circa quem cicatrix pulchra, sana & munda dimidii digiti longitudine inducta erat. Quin perlege quam paulo ante laudavimus, Brunneri in Viro Principe Observationem. Non modo eamdem palliativam medendi rationem qua supra (s) diximus Vallalvam uti consuevisse, tantum ei Viro profuisse, intelliges, ut Brunnerus non immerito id scripserit, quod utinam in periculosis casibus lithotomi meminissent, ergo lithotomia in calculo vesicæ non semper absolute erit necessaria; verum insuper quod fidem pene superat, ulcerum quæ calculus, & contraria medendi ratio antea fecerant, cicatrices invenisse. Professorum in vesica Viri ejusdem, quamvis sexagenario majoris. Sed nimirum longe aliud est quæ rarius contingunt, aliud quæ sæpius, spectare: atque, ut ad puellas regrediar nostras, aliud in tempore, aliud nimirum progressu jam morbo accessit: quod ex Observatione apparebit, iisdem quas supra (t) memoravi, litteris ad me scripta a Medico Experientissimo Laurentio Mariano.

25. ADOLESCENTULÆ rustica offesa criminalis acus eodem quo prioribus, modo in vesicam attracta, etsi dolores molestiasque creabat melius; non antea tamen facti confessionem expressit, quam calculo acui adnato, intolerabili cruciati affecta est. Tunc denique cum inspicereetur, acus mucro, urethra prope infimam vaginæ sedem percuta, intra hujus cavum prominens repertus est. Vistum Mariano, si non nihil secundum longitudinem urethra incidereetur, acumen illud in urethram posse retrahi, sique acu & calculo in directum statutus, tentari, an hunc, fragilem fortasse, desquamando sensim, & dextere, ad eam redigeret tenuitatem liceret, ut cum acu eximeretur. Repugnancia aliorum factum est, ut nulla re tentata, sua sorti misera puella relinqueretur. Ut tempus, sic calculus quoque, & cruciatus augebantur, obturatoque jam propemodum toto vesicæ orificio, vix pauca eaque graveolentes, urinæ exibant. Sic febribus quoque accedentibus, tandem vitæ infelicitas factus est finis. VENTRE aperto, pus in hujus pelvi conspectum est, creditumque, a renibus, qui suppurati erant, effusum. Vesicæ, sphacelo correptæ, inerat calculus pyri forma; nam quo magis a capitulo, & superiore acus parte descendebat, eo magis se extenuabat. Cum e vesica, ad quam aliqua adhærebat ex parte, attolleretur, squamulas ad eum locum agglutinatæ reliquit. Et tamen, cum acu lanci impositus, tunc pondere denarios æquavit duodeviginti; cum autem postea hæc ad me scriberentur, non nisi quatuordecim.

26. Qui puellæ alteri, ut dictum est supra (u), acum priusquam lapis accresceret, feliciter extraxerat, huic quoque inchoato, auctoque jam calculo, eximi posse non desperabat, si acus mucrone in urethram reducto, & forci per hunc, calculum extenuare, siqua posset, conaretur antea, quam educeret, Benivenium (x), qui in Vir-

ginis urethra comminuit, prius quadantenus, tum si res non ex voto procederet, Molinettum (y) qui per vim extrahendum curaverat, imitaturus. Et fortasse aliquid profici etiamtum poterat. Postea vero quam calculus usque adeo, & cum ipso mala omnia creverant; quis est qui sperare quidquam posset? Quod si calculus tanto fuisset tenuior, via autem per quam urethra cavum cum vaginæ cavo communicabat, tanto amplior, quanto utrumque in ejusdemmodi casu fuerit necesse est, quem ex Italia missum, in Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis Historia (z) legimus; fortasse & ipse per se pariter intra vaginam excidisset. Crediderim vero in eo quoque casu transitum ex summa urethra magis quam ex vesica in vaginam fuisse, quando successisse legimus, non urinæ per vaginam effluxum, sed urinæ tantum incontinentiam. Sive enim acus e digitis non tota in pluribus intra vesicam abripitur, ut supra (a) coniciebam, sive mavis, postea quam tota abrepta est, contrahente se vesica, in urethram retrahitur, quorum illud veri similis censeo, cum acumen quod digitis tenebatur, non capitulum, in Molinetti, & Mariani certe exemplis, & in totidem quæ continuo proferam, ab urethra parte fuisse, sciam; nihil fieri facilius potest, quam ut capitulo a posteriore vesicæ parte, quippe quam annexa vagina tunc libidine turgens antrosum impellit, antrosum pariter compulso, obliquata acus mucro retrorsum agatur, sique in urethra posteriore parietem, præsertim si acutior sit, se defigat, eumque crebris adactis vesicæ contractionibus, denique pertundat. Quod sicuti factum est in agrestis Adolescentula, quæ hæc me scribente, ab nostratibus Chirurgis opem petebat, ita futurum fuerat in Virguncula annos quatuordecim nata, de qua a Chirurgo, in Re Anatomica a me erudito, non multo post tempore narratum est, quam illa altera oberat, ejus tibi sectionem descripsi (b). Cum sedens, idem quod illa faceret, acus autem capitulo tantæ propemodum crassitudinis quantæ urethra est, in hanc altius intrusisset, repentino matris interventu percussa, simul dimisit, simul altissime absorptam sensit. Dies vix quatuor molestias doloresque tacita pertulit; quindio rem matri, hæc ei quem dixi, Chirurgo aperuit. Qui ex punctationis de qua ægra maxime querebatur, sede conciens, acus infimam partem circa urethra medium infixam hæere, veritus, ne instrumentum aliquo in hanc immisso acus in vesicam penitus compelleretur, annuentibus, imo rogantibus & puella, & matre, uno, mox & altero digito vaginæ indito acum non majoris industria quam felicitate ita decussit, ut cuspis ad urethra orificium se ostenderet, vultellæque prehendi posset. Sic duabus, haud amplius, sanguinis guttulis excidentibus, nulloque superstitie incommodo, acus, quam ad me attulit, exempta est. Erat illa, aut certe videbatur itanæ, crinalis, quatuor digitos transversos longa, euspide peracuta: jamque hic illic quidpiam adhærere copiose tartaræ metæ, mox temere deterse, Chirurgus animadverterat.

27. Nolim ægre feras, tot additis a me exemplis illud confirmatum videri quod ab nonnullis scriptum est, foeminas quibus hæc accidit, pleræque esse Italas. Utinam nostras omnes scirent, quot ex ipsis hac ratione per gravissimos cruciatus ante diem absumptæ sint. Verum agrestes, plebejæve puellæ, ab ætate quoque ipsa rudes, hæc qui scire possint? Nec tamen reticenda a nobis exempla sunt, ut ab horum frequentia admoniti possint Medici siqua forte illarum de urinæ difficultate queri incipiat, diligentius omnia inquirere, & causa dexteritate verum exprimere, dum licet adhuc auxilium ferre. Cæterum neque omnibus Italiae partibus, nec certe quibusdam ex iis ubi ipse, nec brevi tempore, fui, communia hæc sunt, neque externæ omnes regiones ejusdemmodi carent exemplis, quæ minime necesse est hic a me odiosa sedulitate commemorari: alia, si quaeris, ex Vallisnerii (c), alia ex Platneri (d), alia denique ex aliorum lectione intelliges. Nec dubito, quin plura extarent, si tot ubique cadavera, quot in Italia fecerantur, aut nisi foeminarum pleræque pudor cogeret veram morbi causam dissimulare. Aliæ enim, quod vel inter nostras, rustica puella factura erat (e), & aliæ, ut est apud Alghisium (f), & Vallisnerium (g) fecerunt, pertinacissimo silentio rem totam occultunt; itaque facillime accidit, ut simul cum ipsis acus hume-

tur, de qua nemo suspicatur. Aliæ autem deglutitam comminiscuntur; ut tamen in vivis, aut mortuis Medici deprehendant, his fucus fiat. Et fuit quidem olim cum fucus etiam in Italia fieret, ut a Veneta illa Virgine cuius magnum ad crimalem prælongam acum adnatum calculum sub finem sæculi XV. memoravit Alexander Benedictus (h): qui tamen eos rejecit (i) qui per venas a stomacho ad jecur, indeque ad cor, ab hoc autem ad renes, vesicamque transiisse acum arbitrantur; ipse tamen acie sua paulatim multoque tempore intestina penetravisse, viamque sibi fecisse, censuit, ad vesicam, ut in eo probandus quod sententiam damnavit, quam aliis miror vel longo post tempore placuisse, ita in altera proponenda, quæ multo plures habuit affectas, non facile imitandus. Neque enim hic de tenui aliqua acu agitur, sed de crassius, altero per se extremum bene capitatis, altero interdum non ita acutis, semper autem (in istis dico quæ deglutitas ab se ajunt, pudibundis Virginibus) quasi de industria vesicam penetantibus, neque iis præviis, & comitantibus doloribus, ac symptomatibus quæ res, & ejusmodi via posceret. Itaque rarior, nunc saltem, hæc apud doctiores Italos credulitas est, cuius in regionibus quibusdam aliis retentæ vel in nonnullis egregiis libris indicia video non obscura. Relinquebatur, ut non modo acus, sed acum quoque thecam, quam aciarium vocant, eadem traductam via comminiscerentur, quando eam ex vesica etruscæ puellæ præstans Vir Benevolus (k) se scribit exemisse. Hic iterum forsitan moleste feres, Italæ puellæ noxam penes incredibilem attingi. Verum fac legas quæ ad Platneri Institutionum Chirurgiæ §. 1359. (l) sunt adnotata; num prima illa fuerit quæ id molita sit, intelliges. At tamen si via illa Alexandri Benedicti uli essent ad acus alicujus transitum explicandum non in muliebrem vesicam, in quam extrinsecus perbrevis, & expeditus aditus patet, sed in virilem, in quam multo longior, & flexuosus, libentius, ut alibi (m) scripsi, in quibusdam præsertim casibus, crederem. Quod utinam in eo possem quem tibi protinus perscribam: minus questus essem, & adhuc quererem, quanto res certior est, tanto esse ad intelligendum difficiliorem.

28. RUSTICUS annorum quadraginta, a longo jam tempore gravi urinæ difficultate laborabat: neque ob hanc tamen, sed ob frosti exulcerationem, & febrem in Nosocomium hoc venit uno antequam moreretur, mense. Ad febrem primum fusa alvus, deinde adstricta, & macies in dies major accessit, qua ad summum perducta, & facie ca thectica facta, argenteis antiquis ad vesicam cruciatibus confectus est. Morti jam proximus cupere id quod pauci ejus fortis homines solent, visus est, ut diuturnæ molestissimæque dysuriæ causa per anatomen quæreretur. Itaque Chirurgum appellat, eique aperit, se sibi ante biennium acum crimalem ex orichalco in urethram immisisse, quæ num deinde excidisset, an restitisset, juxta ignoravisse, & adhuc ignorare. Quæ autem ratione, & cur immisisset, reticuit, nec Chirurgus ab homine jam moriente, & cum pudore quasi quodam ea narrante quæsit. Hæc cum mihi retulisset tunc forte alia rum secundum, tum præter naturam, in Nosocomio ostendenti, continuo offerri cadaver jussi, hanc etiam, quam brevem credebam, ad cæteras itatim additur perquisitiones. Et quoniam acum ad urethra flexum hevisse, aut si forte postea excidisset, magnam ibi labem reliquisse existimabam; primum omnium urethram illuc usque censui secundum longitudinem esse aperiendam.

SCROTO igitur, quod ab lotii, ut opinor, stillicidio exulceratum adhuc erat, inciso, cum teltes æquo majores, planeque tumidi viderentur; facile apparuit, id esse a tunica crassioribus, albisque factis; non a distenta illorum substantia. Quæ, etsi Vaginalis tunica ad Albugineam passim adhærebat, sic satis sana fuit, ea parte excepta quæ cum inferior connectitur epididymidis globus; hæc enim purulenta erant, & nigricantia. Tunc urethra ab externo ejus orificio per totam penis inferiorem faciem, & perinaeum ad aperta, intimam ejus tunicam neque exulceratam, neque cicatricofam, neque rubentem; imo albicantem, & lavem ubique, crassiusculam tamen factam invenit. Sic ubi intellexissem, ad ulteriora esse nobis transeundum; reliquis omnes Partes quæ ad urinam attinent, extrahi continuo jussi. Erat vesica sine urina, & in se contracta, abnormi autem figura. Nam ad summum dexterum latus excrecebat in quadratum quendam saccum medio-

(z) Traët. de Renib. c. ultimo. (*) n. 15. (a) §. 5. (b) A. 1685. M. Mart. (c) Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 15. (d) Ibid. Obs. 22. (e) Cent. 1. Obs. 28. (f) Cent. 9. Obs. 2. (g) Dec. 3. A. 7. & 8. Obs. 27. (h) Specim. Experim. circa Generat. S. 2. c. 3. Hist. 3. (i) Dissert. de Valvul. in ureterib. §. 5. & 7. (k) Dissert. de Vaf. Umbilical. §. 6. (l) Epist. 4. n. 19. (m) De Sign. & Caus. Diuturn. Morb. 1. 2. c. 3. in fin. (n) De intern. Affect. n. 16. (o) Sect. 6. Aph. 6. (p) De Morb. Popular. 1. 6. Sect. 7. (q) Sect. super 23. Obs. 4. §. 15. (r) Sect. 22. Obs. 26. §. 8. (s) n. 16. (t) n. 22. (u) n. eod. 22. (x) De abditis morbor. causis c. 80. (y) c. cit. supra ad n. 21. (z) A. 1735. Obs. Anat. 10. (a) n. 21. (b) n. 20. (c) Obs. supra ad n. 19. cit. (d) Disp. de Calc. ad vesic. adhr. §. 10. not. 7. & p. (e) n. 20. (f) Lithotom. c. 3. (g) Adnot. ad cit. Obs. (h) Hist. corp. hum. 1. 2. c. 9. (i) 1. 5. c. 13. (k) Observ. 43. (l) not. b. (m) Advers. 3. Animad. 36.

(y) c. cit. supra ad n. 21. (z) A. 1735. Obs. Anat. 10. (a) n. 21. (b) n. 20. (c) Obs. supra ad n. 19. cit. (d) Disp. de Calc. ad vesic. adhr. §. 10. not. 7. & p. (e) n. 20. (f) Lithotom. c. 3. (g) Adnot. ad cit. Obs. (h) Hist. corp. hum. 1. 2. c. 9. (i) 1. 5. c. 13. (k) Observ. 43. (l) not. b. (m) Advers. 3. Animad. 36.

crem, jam nigrescentem. Hic quid esset, & quid contineret, apparuit omnibus, incisa ab anteriore facie primum suprema, quæ inspicenda restabat, urethrae parte, tum ipsa vesica. Et in illa quidem urethrae parte usque ad Seminalem totam carunculam, quæ strigosa erat, suo tamen sinu secundum naturam prædita, nihilo plus vitii deprehendimus, quam in dissecta antea reliqua urethra. Sed continuo supra carunculam, non Prostatae modo, sed & vesicæ interior facies universa occurrit exulcerata, & sub alba quadam quasi eschara obducta. Tunica autem vesicæ, quod secundo fuerat animadvertum, crassæ factæ erant, & in parte livida, ac nigricantes, in parte alba, & quasi scirrhosa. Neque aliter is factus se habebat, de quo modo actum est, quippe non solum orificio æque ac ipse, amplo cum vesica communicans, sed ex huius omnibus productis tunicis factus. Erat intra ipsum calculus, nucis juglandis mediocris, vel potius parvæ magnitudine, & quadantenus etiam forma, humore albumen referente non multo oblitus: ex cuius latere, extremo alteri propiore, acus illa exibat, prominebatque ad digitos transversos duos, parte sui reliqua, quæ ad capitulum spectabat, intra calculum alte, firmissime certe, condita, ut digitum transversum alterum æquare, & fortasse etiam superare posse videretur. Sed pars illa altera quæ ad cuspidem, eamque acutissimam, pertinebat, rectissima, quippe ut in acu quæ ex firmioribus est, neque ex tenuioribus, tantum extra facci orificium deorsum ex obliquo se demittebat, ut in inum contractæ vesicæ finitrum latus acumen infigeret, unde nullo negotio extractum est. Quo tunc esset pondere calculus, non quævis: cum autem quærerem septimo postquam repertus est anno, simul cum acu deachmas duas totidemque scrupulos superabat gravis decem, siue mavis, ut hic se habent medica pondera, semis scrupulo. Subflavum autem ubi asseravi, deposuit pulverem, est enim superficiei non lævi, eaque maxima ex parte ad illum colorem vergente. Cæterum in vesica ureterum orificia multo quam solent, erant majora: ureteres autem latiores, & pure adeo distenti, ut alicubi crassitudinem æquarent pollicis. Et renes quoque fuerunt æquo ampliore, & turgidi: pallidi exterius: intus autem semiputres, & pure cinereo scatentes. Reliqua in cadavere examinare nec opus credidi, nec per tempus licuit.

29. Rarum hanc, & si attente omnia perpendas, singularem fortasse Observationem, inspectante frequentissima Studioforum Juvenum, Doctorumque corona habui IV. Kal. Decembres A. 1742. cuius summam Quinçtili mense insequentis anni Cl. Viro Morando per litteras significavi: qui cum Regia illa Chirurgorum Academia ab se communicatam esse, nec de hoc amplius quidquam quod ad me pervenerit, rescripsit. Significandi autem causa fuerat, ut si forte Lutetia in Urbe multitudine hominum, & cum scientiis aliis, tum arte in primis exsecrandi calculos celeberrima, ejusdemmodi res accidisset; certior fierem, & qua ratione id fieri potuisset crederent, non ignorarem. Ejusdemmodi rem cum dico, acum intelligo ejusdem longitudinis, firmitudinis, rectitudinis, ac nostræ est; neque enim brevior, aut flexilem æque mirum esset per maris urethram in vesicam pervenisse. Legeram quidem apud Paræum (n), calculum e virili vesica exemptum, nucis juglandis crassitie, in quo medio acus ei plane qua fuitore suere solent, similis depicta vissebatur. Verum si intra calculum condita; brevior erat, quam nostra: si e calculo prominens; qua tamen esset longitudine ignoramus. Urralibet autem ratione fuerit; nonnihil flexa esset, an recta; in primis vero num per urethram subisset, nescimus. Alia enim esse potuerunt viæ acui præsertim non capitata, per quas in vesicam transiret. Sic acum similem, si recte memini, Tab. 30. a Cl. Chefeldeno (o) exhibitam, circa quam accrevit calculus e pueri vesica excisus, Doctissimus Vir Meadius censuit per perinaum subisse: & Vallisnerius (p) suspicabatur, ramusculum certæ ejusdem plantæ quem intra calculum vesicæ aprugnæ deprehenderat, per vulnus ab acuto aliquo duroque densi nemoris ramo abdomini currentis apri infictum, illuc pervenisse: qua ratione num aliud pariter lignosum quoddam corpusculum intra calculum esse potuerit qui in suis domestici vesica inventus dicitur (q), ipse existimabis. Porro & altera acui esse potuit via, illa videlicet a Benedicte ex intestinis in vesicam propulsa, quam etsi non facile admittendam esse, scripsimus supra (r), non tamen semper rejiciendam censemus, præsertim ubi illa obijci non possint quæ

tunc objecimus. Rem exemplo illustrare placet, quod ab iis qui cætera huius generis memorarunt, indicatum esse, non meminimus. Habebis illud inter Claudini Responsiones Medicinales (s). Puer acum deglutiverat, quam post annos aliquot, maximo conatu in mingendo impulsam, ipse sibi ex urethra exemit, tenui calculo auctam. Quo illa itinere in vesicam, aut certe in urethram pervenisset, lumbrici ostenderunt longi, rotundi, & vivi, quorum aliquos primis ab acu deglutita annis post urinariam partium dolores minxit, post eductam autem acum, alterum vivum pariter, & longissimum, nec sine materia fetente, & nigri coloris. Quod exemplum ut ad illa addendum vides quæ de vermibus per urethram ejectis verba superius (t) facientes, commemoravimus; sic intelligis, quamvis pueri istius acus duos longitudine excederet digitos, nec capitulo careret, non posse ad illas traduci quæ acus crinales in vesicam sibi, aut, ex ore descendisse, si constet, nihil eorum esse passas quæ in illam ex intestinis apertam fuisse, demonstrant: quod cum de Paræi viro non constet; nihil prohibet quo minus ejusmodi iter in eo olim acum suspicemur habere potuisse. At enim alii sunt in quibus locus nullus est istiusmodi suspitionibus, quippe, ut nos, fassis, altero hordei spicam, altero, si recte intelligo, præteratæ ligulæ tenue extremum se sibi per urethram in vesicam intrusisse. Fateor qui de hoc legerim apud Dionysium (u), de illo autem apud Platnerum (x). Sed extremum id ligulæ quæ longitudine fuerit, & num inflexum esset aliquantum, necdum scio; spica autem ut flexilis sit, non est qui nesciat. Præterea uterque, sicuti videtur, alter certe quod intrudere coepit, ulterius, & in vesicam usque se commulisse, fassus est. Nos vero acum in primam urethrae partem demissam, adeo promovere non perrexit, ut excidisset, an relictisset, plane, ut diximus (y), ignoraret. Sed fac, promovisse; ubi ad magnum illum qui in perinaeum est, flexum perduxisset; qui tandem, quæso, illum superare, & sursum verti acus ista longitudine, & rectitudine potuisset? cur non ibi hæsit? cur adeo acuto mucrone, si hic præcedebat, non ad eum locum se defixit? aut si, ut verisimilius est, non præcedebat, non eum locum, dum acus se converteret, violavit? Nulla enim ibi, ut diximus, cicatrix fuit. Hæc igitur sunt quæ me fateor satis adhuc assequi non posse: idemque falsi sunt omnes peritissimi Viri, & nominatim Cocchius, & Benevolus, qui hac transeunt, & me pro sua quique humanitate invisentes, rem viderunt, & peratente considerant. Equidem in minimis, eoque flexilibus aculeis non hærerem, multoque minus in tenuissimis candelis cereis. De quibus si leges casum, quantum videtur, eundem, tametsi verbis est aliis viginti quinque post annis repetitis (z); ut partem dumtaxat aliquam accipias, minus miraberis, femineam vesicam repente acus in se trahere, cum virilem quoque intellexeris subito candelam absorpsisse.

30. Quod renes, & ureteres in Rustico nostro ampliores, utrique autem essent referti pure, hæc nempe cum iis congruant quæ supra (a) sunt posita, & explicata. Ab eademque causa, urina videlicet ob acerbissimam dysuriam sæpius retenta, eoque debiliorem aliquam vesicæ partem extorsum urgente, facculum repetendum esse puto in quo calculus condebatur. Qua me in opinione tunc etiam fuisse cum in Adversariis (b) primum scripsi quid de istis facculis observassem, ex istdem probe notiti. Eam vero postea ab aliis esse confirmatam, non ignoro, exempla gravidarum proferentibus quarum vesica ex gravissima ischuria in istiusmodi facculos, siue hernias quomodo ipse quoque vocaveram, aliqua ex parte laxata fuerat: quæ tamen inter exempla haud satis video cur referatur quod apud Ruyschium extat Thesaur. VIII. n. CII. nisi forte non id designatur quod ibi describitur, sed illud quod ejus occasione ibidem repetitur, Observatio videlicet Prima Ruyschiana Centuriæ: qua cum Observatione tu alteram confers in Actis Cæsareæ Academiæ (c) propositam; & facile intelliges quid in nobilissima Matrona esset tumor e genitalibus propendens, quo inciso magnus calculus cum lotio prodiiit, hujusque incontinentia, an potius ex non perfunato inflecto vulnere stillicidium successit. Hæc tamen duæ Observationes, & quædam alia quæ ejusdemmodi videri potest, Remberti Dodonæi (d) facculum indicant non magis ab urina impulsu, quam a calculorum pondere effectum, aut certe auctum, eumque in ima vesicæ parte: ubi & Riolanus (e) olim

vi-

viderat, & calculis quidem, (f) sed ad latera, & interdum. Nunc autem ad latera, & præsertim ad finitrum, poni video, in plerisque, & id saltem ab nonnullis quasi esset a natura. Ego quæ de vesicæ naturali figura viderim, jam alibi (g) indicavi. Num sinus præterea, siue appendices, ut vocant, istas habeat, non libenter hic disputabo. Satis mihi esset, si quæ de ea figura ante Weitbrechtum proposui, ita ab nonnullis referrentur omnia, ut post illum proposuisse, si Superis placet, non viderer: quamquam nemo potest illam ejus Dissertationem legisse, quin temporis quo uterque nostrum sua protulit, admoneretur per eam ipsam adnotationem quam Dissertationi illi sponte appositum non minus iusta, quam docta Petropolitana Imper. Academia (h). Nec defuerunt qui finis istos ab Riolo, aliisque visos cum iis promiscue jam confuderint quos ego non a calculis, sed ab diutius retenta urina in vesica, observaveram. Cujus generis esse poterunt appendices illæ duæ quas Bergerus (i) facculum instar ad vesicam deprehendit; nam & lotio plenæ, & in fene erant ex lotii suppreffione mortuo, fuisse autem ejus generis, planius sciremus, si loca adnotasset, ex quibus proficerent. Sed antea fuerant qui facculum vesicæ originem aliter explicarent, alii (k) a primæ ipsa conformatione repetentes, alii (l) a calculo qui inter vesicæ tunicas paulatim crescens, ex his se junctis facculum sibi formet a vesicæ pendente, ruptaque demum, vel ex ea interiore tunica, cum vesicæ cavo communicante: quam communicationis explicationem aliquis non ita pridem suam fecit; quamquam tota Disputatione illa qua varios calculi ad vesicam adherendi modos esse perfectus, facculos istos extra vesicam prominentes nusquam discrete memoravit. Verum duæ illæ facculorum origines si, ut in certis quibusdam casibus, proponantur, non est cur prorsus repugnemus: fin ut in omnibus; cum alia nostra Observatio quæ alias, tum ea præsertim quæ paulo ante (m) descripta est, apertissime refragantur. Vides enim ex Adversariis (n), cum in strenuo potatore alii facci jam essent facculi, alii tantummodo fieri inciperent, horum initia ibi dumtaxat apparuisse ubi ex areis quas interferebantur carneæ vesicæ fibre urgeri tunicæ extorsum poterant. Rustici autem facculum quæ a primordiis potius existimet præexistisse, quam acui, verculo, creberrimæ lotii retentioni successisse? Nec vero calculus inter tunicas, & tunicam increvisse poterat qui acui adnatus est in vesicæ cavum intrusus, nec, quod consequitur, ut ibi in vesicam aditum aperiret, interiorem tunicam disrupisset. Quin ex iis in quibus hos facculos deprehendi, nemo fuit in quo ea tunica esset disrupta, cum in omnibus pariter ac cæteræ, laxata, ad faciendum facculum se expanderet, quod Rustici, & Senis ejusdem de quoad te alias (o) scripsi, dissectionibus relectis, cognoscet. Neque calculos, si Rusticum excipias, intra facculos illos vidi, aut antea fuisse, intellexi: neque facculos ad ipsa ureterum oscula, aut infra, sed supra hæc mihi contigit deprehendere, imo & superius multo, ut ex iis quas indicavi, meis Observationibus perspicies.

31. Alii igitur facculi hi sunt, ac illi quos sibi calculi parant ad illa angusta ureterum oscula subitantes, ibique crescentes, quod novit olim Petrus Francus (p), quamvis neque ab Riolo (q), neque a Willisio (r), neque a tot aliis qui ad hoc usque tempus idem censuerunt, laudatus, uno, quod sciam, Platneri (s) excepto, qui & rarissimi ipsius libri huc attinentem particulam descriptam proposuit. Quod autem Platnerus, Littrius (t), & Abr. Vaterum (u) secutus, addidit, ni calculi inde, excidant, videri sibi novam viam facere, dum contra illa subinde valentius vesica, intra huius tunicas versus cervicem propelluntur: & hanc causam esse, cur sæpe in locis, qui ab ureterum osculis remotiores sunt, reperiantur; illud quidem tunc facilius crediderim, ubi ab uretre intimo viæ pateant ad ea loca, ut ab Littrio conspecta sunt, quas femina calculis apertas veri simillimum est, patulas deinde a subsequente jugiter urina servari debere; remotiora autem ab osculis ureterum loca, ab iis deorsum tantummodo, verbis etiam quæ descripsi, spectatis, intelligenda esse, non dubito, quo tum descendens per ureteres lotii pondus urget, tum contractio vesicæ compellit. Quam igitur ratione tot alias quas Platnerus ipse ibidem commemorat, Observationes explicabimus vesicæ lapidum membrana inclusorum? num omnes ad ureterum oscula, aut infra hæc fuerint?

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

runt? num sic alii quoque in aliis, præter illas, Observationibus in Sepulchreto (x) legendis? una Tulpii (y) in primis (neque enim, cum ibi plures, ex Tulpio sint, omnes Platnerus, sed aliam quandam indicavit) qua 39. calculi in vesica describuntur, quorum latitabat unusquisque involutus proprio receptaculo, & quidem tam recte, ut circa initium crediderit Chirurgus, nihil calculorum illic detineri. Cum hæc junge alteram Holtzappellii (z), calculos proponentem 32. omnes in propriis tunicis inclusos, & invicem contiguos, ut haud aliter quam apes in suis cavernulis sacrum, sic isti calculi in suis quisque alveolis, totam vesicæ cavitatem replerent, exiguo tantum meatu urinae relicto. Num ergo hi omnes infra oscula ureterum condebantur? Et mihi quidem aliquando venit in mentem, ut quemadmodum intra felleæ vesicæ glandulas bilarios calculos inveni (a), ita suspicarer, num forte per glandularum vesicæ oscula, quæ ut in ureteribus patentia nonnunquam deprehendi, sic etiam interdum in continuata vesica patere nihil prohibet, arenulæ minutissimæ in glandularum cava irreperere possint, ibique in calculos suis alveolis inhaerentes augescere. Sed donec in vesicam incidere contingat quæ inter tunicas ibi conclusum habeat calculum quo ex ureteribus pervenire non potuerit, eamque attentius examinare; malim interea a meo illo cogitato assensum cohibere: & quoniam ex meis supra (b) indicatis Observationibus didici, facculorum orificia sæpe esse facculis ipsis multo minoribus; conjecturæ quoque alteri locum aliquem dabo, ut puta si minore calculo ingresso, orificium quacunque de causa magis arctaretur, & pene, aut prorsus occluderetur. Sunt autem facculi unam ad vesicam interdum plurimi, inter eosque etiam parvi, & non modo inferiores, & medias, sed & summas partes vesicæ tenent: quæ cum ex meis illis Observationibus, tum evidentius ex duabus intelliges Iconibus, quas, ut alias quoque dixi, Cel. Heisterus ad latinas addidit suas Chirurgicas Institutiones (c) tanto laudabilius, quanto magis optandum fuerat, ne ab ullo eorum qui postquam de illis facculis sæpius facta mentio est, de Lithotomia scripserunt, prorsus omitterentur.

32. Lithotomi enim interest sub oculis illa habere, unde, ni caveat, facillime possit decipi. Quod si Riolanus (d) docuit, calculos in illis imis vesicæ sinibus nidulantes, cathetere immisso non deprehendi, sique casus a Cl. Jo. Christoph. Mayo (e) descriptis difficultatem ostendit ex illis sinibus calculum eximendi; facile in mentem venit tot facculos in tam diversis vesicæ partibus spectanti, quot sibi incidere casus possint, in quibus, ut mittam curationis difficultates, in ipsa calculi perquisitione fallatur. Et sane, ut apud Cl. Schreiberum (f) video, inde error natus est credendi hominem a calculis perfunatum, in cuius vesica nullus amplius catheteri observaretur, cum tamen in ejusdem cadavere inventi sint novem, quos sex vesicæ facculi continebant. Sed præter lithotomi in explorando calculo deceptiones dum hic modo in vesica est, modo in facculum se subducit, qua de re supra (g) a me satis dictum est; magno insuper cum illis famæ, & ægri detrimento fieri interdum potest, ut qui diebus superioribus lapis in vesica perceptus sit, sectione jam facta, frustra in vesica perquiratur. Quamobrem istiusmodi ægorantibus in quibus modo per cathetrem sentitur calculus, modo non sentitur, is qui antea sensit, varios, & multiplices motus, & positus imperare debet, siquando lithotomus alter non sentiat, multoque etiam magis cavere ipse, ne fecerit, nisi in vesicæ cavo tunc lapidem percipiat. Hæc vero accidunt cum facculi orificium pro calculi mole grandius est, velut in Rustico nostro fuit. Grandescit autem & orificium, & faccus ab urina copia, & pondere, ad quod & calculi adjiciendum est pondus, quo plus urinae circum moratur, eo magis unde crescat, habentis: plus autem urinae in sacco moratur, quo hic augetur magis; sic enim magis quoque distrahuntur tunicæ ipsa facientes, earumque vires tum muscularis, tum elastica, quibus lotii adjuvaretur expulsi, maximopere infringuntur. Itaque facci magnitudo interdum adeo augeri potest, ut perperam pro altera vesica accipiat. Hoc autem non eo dico, quod nesciam, revera geminam a primordiis aliquando vesicam fuisse, qui non modo triplicem, sed & quintuplicem fuisse, sciam. Nimirum quinquæ in muliere publice ostendit Molinerus (h), totidem renibus, sex autem ureteribus prædita, quorum

K 3

bini

(n) Oper. l. 24. c. 19. (o) The Anat. of the hum. body. (p) Opere Tom. I. P. 6. nella Lettera al Giorgi. (q) Eph. N. C. Cent. 7. Obs. 7. cum Scholio. (r) n. 27. (s) Resp. 40. (t) n. 6. (u) Cours d'Operat. de Chirurg. 3. Demonstr. (x) Diff. supra ad n. 27. cit. § 11. (y) n. 28. (z) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obs. 131. & Act. Tom. 4. Obs. 24. (a) n. 21. 23. (b) III. Animad. 26. (c) Tom. 4. Obs. 95. in fine. (d) Medic. Obs. 6. 45. (e) Anthropog. l. 2. c. 28.

(f) Encheirid. Anat. l. 1. c. 30. (g) Epist. Anat. l. n. 61. (h) Comment. Tom. 5. (i) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1704. Obs. Anat. 22. (k) Sect. hic Sepulch. 25. in Schol. ad Obs. 3. (l) Ibid. in Schol. ad §. 7. Obs. 8. (m) n. 28. (n) Animad. cit. (o) Epist. 21. n. 15. (p) Traité des Hernies c. 31. (q) Anthropog. l. 2. c. 28. (r) Diff. de Urin. c. 1. (s) Diff. supra ad n. 27. cit. § 13. & not. ibid. n. (t) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1704. (u) Diff. quæ Obs. par. Calcul. & §. 4. (x) Sect. hac 25. Obs. 8. §. 7. 13. 14. & Sect. 24. Obs. 10. §. 1. (y) Sect. 23. Obs. 7. §. 1. (z) Ibid. Obs. 4. §. 2. (a) Epist. 37. n. 29. (b) n. 30. (c) Tab. 31. Fig. 1. & 2. (d) loc. indicat. supra ad n. 30. (e) Comment. Litter. A. 1716. Hebd. 5. n. 2. (f) Epist. ad Haller de Medicamento Stephens. (g) n. 10. (h) Differt. Anat. Pathol. l. 6. c. 7. in fine.

bini in maiorem, quatuor reliqui singuli in singulas minores velicas inferebantur, quæ per singulares tubulos in maiorem lotium mittebant, rarissimo certe, & fortasse unico exemplo, eoque digniori quod a me commemoraretur, præsertim quando ex omnibus quos legisset memini duplicis, aut triplicis velicæ Observationes indicantibus, unus est Cl. Fantonus (i) a quo ex Molinetto quintuplicis huius mentio injecta sit. Nec me fugit, a primordiis pariter esse aliquando velicæ caveam per septum quoddam in duas divisi, sive illud septum sit in transversum, sive juxta longitudinem positum: in transversum quidem, ut in ovibus, & vitulis quibusdam Ruyschius (k) vidit, in iisdemque ad eundem, ut opinor, modum viderat Blasius (l); quamquam altera cavea magis ad dilatatum urachum attinere videtur, quam ad velicam, itaque, ut ille indicat (m), fere quadrupedibus accidit solis, minimaque est quam semel in homine Blasius (n) deprehendit: secundum longitudinem vero, ut idem Blasius (o) in altero conspexit viro, in quo tamen per accuratam sectionem invenit, duas potius fuisse velicas inter se junctis lateribus conglutinatam, quam unam per septimentum divisi. Quale autem septum, & quomodo situm id fuerit quod in Viro Principe reperiuntur ait Bauhinus (p), mihi quidem non liquet. Illud liquet, quod tot Auctores scribant, a Coitero in Virgine quam alias quoque commemorandi occasionem habui, fuisse inventum, neminem eorum fuisse scripturum, si paulo attentius Coiterum legissent. Hic enim (q) nulla usquam septi mentione facta, in ea se invenisse, primum quidem tradidit, duas velicas urinarias, alteram naturalem, & in sua sede collocatam, alteram ex matricis colli dextro latere prognatam, naturali velica duplo quasi maiorem, lotio plenissimam, & duabus tunicis, ut naturalis velica, præditam: hic nullum meatum aquam vel immixtatem vel eminentem conspectum fuisse. Infra autem, ubi queri posse, dixit, quomodo generata hæc velica non naturalis, ac per quas vias urina ingressa sit in velicam adnatam, respondet, mirum non esse, in hac virgine, utero male affecto, & mensibus male atque inordinate expurgatis, inter membranas, quæ in ventre inferiori multe reperiuntur, aquam hanc tenuem lucidamque collectam, atque membranis expansis, ut in aliis locis factum est, hanc velicam sibi formasse; ut nemini obsecrum esse possit, non alteram urinariam velicam a primordiis congenitam, sed magnam hydatidem vi morbi denique procreatam descripsisse. Qui fieri igitur potuit, ut Riolanus (r) scriberet, duplicem velicam in ea Virgine invenisse Coiterum, utramque lotio plenam, sed urinam ureteribus præditam, quæ portionem urinae in alteram exonerabat? aut etiam, ut Thomas Bartholinus (s) raro velicam cavitates habere duas membrana ceu septo distinctas, quales in puella 35. annorum invenit Volcherus Coiter. Quem nisi in hoc Coiteri septo repetendo secutus mox esset Tulpus (t), & qui Bartholinum saltem diserte nominat, Blasius (u); non in tot alios, quos singillatim indicare necesse non est, vel recentissimos libros idem error permansisset, cujus denique tollendi studium aliquando plura quam voluissim, me verba facere coegit. Sed illuc revertor. Ubi duas, pluresve occurrant urinariæ velicæ, quæ inter se communicant, neque ex certo structura modo jam inde a primordiis fuisse omnes videantur, ut puta si in aliquam nullus infinat ureter, neque ea, in brutis potissimum animantibus facta videri possit ex uracho dilatato, ea, inquam, præsertim si calculus insit, aut stranguria, vel dysuria, vel crebra, ut sæpe in potioribus, plurimi lotii retentio præcesserit, non pro altera velica, sed potius pro naturalis velicæ hernia, id est vi morbi producto sacculo habenda est, qualem, exempli causa, ipse quoque fuisse puto quam Bartholinus (x) in Theatro hoc nostro non ab se quidem, sed a Moichenichio conspectam refert parvam, majori adnatam, & cum hac communicantem. Contra vero pro gemina velica aliquanto facilius habeo, quippe singulis saltem ureteribus in singulas cavitates influentibus, quam in juvene quantumvis dysuria, ischuria, & calculo laboran-

te, describit Stegmannus (y). Illud denique priusquam his de sacculis finem dicendi faciam, non reticebo: attendendos eos esse qui antequam velica infletur, apparent, aut si jam inflata est, imputari nequeunt exteriorum velicæ tunicarum, quas scalpellus forte læserit, hiatui, per quem intimæ, ab aere immisso extrorsum compulsa, sacculum, qui in vivente nullus fuerit, mentiantur, & minus cauti, quod factum interdum animadvertimus, non solentibus, Anatomicis imponant.

33. Quod reliquum est, velicæ tunicas crassiores factas, ut in Rustico (z) de quo hæcenus dictum est, deprehendimus, sic animadvertere potuisti in Puella quoque illa agresti (a), & in Adolescente (b) quorum utrique ex calculo pariter gravis, ac diuturna fuerat mictionis difficultas, inventas esse. Huc velicam adde quam Cl. Dethardingius (c) pingendam curavit, imo quas apud Ruyschium (d) videris, & legeris ab eadem causa transversum digitum crassos parietes habuisse, ut propterea in aliqua inter hos, & magnam calculum paucis tantum urinæ guttis relinqueretur locus. Quæ & Riverio (e) fuerunt nota, scribenti, in ejusmodi cadaveribus illam crassitudinem inventam esse digiti, aut pollicis, ita ut totam velicæ cavitationem interdum impleat, & ipsum calculum proxime amplectatur. Et ne ab Sepulchreto longius te abducam; quamquam in eo (f) hæc quoque invenio ex Riverio deprompta, vel in puero (g) leges medianam digitum transversum aquasse, in altero autem calculo (*) velicam ab extra carnosam factam: quod nec Riverio ignotum, qui (h) velicæ corpus carnosum fieri, adnotaverat. Sed hæc non solum tunc accidit, cum a calculo dysuria est. Ut enim illud præteream quod perlegens huc quoque attinentem Hoffmanni primam quandam Observationem intelliges, superiore Epistola (i) indicatam; vidisti certe in eadem Epistola (k), cum a Prostata glandulæ excrecentia esset dysuria, velicæ fibras auctas adeo fuisse, ut cordis lacertos figura & magnitudine Valsalvæ insipienti repræsentarent; ne hic Piccolomini (l) Observationem commemorem, quam miror in Sepulchreto non esse relata, puellæ videlicet febre assidua, & summis doloribus excruciatæ ob excretionem & acrimoniam humorum, qui cum velicam interiore tunica spoliasset, exterioris fibras carnosas adeo inflammatione vexatas reliquerant, ut totam eam carnosam judicares; ita, inquit, grandævum interdum, & conspiciunt fuisse filibræ! Cum hac conjunges Rud. Jac. Camerarii (m) Observationem velicæ similis massæ carnea, cujus parietes cum essent duorum pollicum crassitie, erat propterea caritas vix major nucis juglandis: quod minus miraberis ubi historiam perlegens quam supra (n) ex Actis Helveticis indicavi, ea crassitudine fuisse velicæ tunicas animadvertes, ut cum fere infantis caput ipsa æquaret, cavum tamen vix nucem capiens haberet. Et quoniam tunicarum illarum fibras, paulo ante dixi, lacertorum cordis fuisse aliquando similes; nolim, te ignorare, eandem comparationem non Valsalva tantum, sed & aliis postea qui in pares inciderunt, Observatoribus (o) placuisse. Nec tu ipse si forte velicam offenderes qualem Cl. Treuius (p) describit, & pingit, quæ, tunica interiore penitus absumpta, pro fibris tunice muscularis ostenderet varios mirumque in modum collectos lacertos, magnis intercedentibus lacunis distinctos; non alia, inquam, uti posses comparatione. Et tamen velica cujus erat substantia sic crassa facta, magnos continebat calculos, eosque asperos. At sine calculis, ut illæ de quibus modo dicebamus, inventa fuit ab Horringero (q) digitum minorem transversum crassa, fibrisque magnitudine chordarum majorum conspicuis, idque ob urinæ acrimoniam tantum ut in Prosectoris manibus pruritus valde molestus excitaverit: a Genfelio quoque (r) crassa ob ulcusculum & excrecentiam in Prostata, purulentum lotium retinentia: a Bajero (s) denique; ne alios hic addam; pollicari crassitie, quia intus ulcerosa, & hinc irritata adeo, ut crebra sua contractione ureterum simul ostia constringendo, remorandoque in ipsis urinam, omnem reliquam eorum partem ad pollicis amplitudinem, pelvisque etiam renum præter solitum dilataverit. Et nos quoque ut in velica, nullo quidem calculo affe-

fecta, crassitudinem tunicarum haud semel conspeximus, non modo ex ultimis (t), sed ex aliis quoque Litteris (u) cognovisti. Nimium sive, ut in bibacibus crebris urina velicam ad ejectionem compellit, sive quancunque alia causa sitim vices gerit, eo conduat uberius sanguis, & tunicas adauget. Ab aliis igitur quoque causis velicæ tunica crassescunt: quamquam multo sæpius ab urinæ difficultate. Sed vicissim ea crassitudine exitimo difficultatem hanc augeri, & interdum fieri, aut servari, ut paucis ostendam postquam Observationem subjecero, quæ si perfici potuisset, in alias potius quam in hanc Epistolam relata esset.

34. NAUTA annum agens quinquagesimum quintum, subpinguis, bibax, non sine difficultate mingere solitus, ob eamque fortasse causam scroti herniæ obnoxius, ob neutrum id vitium in Nosocomium hoc venerat; sed ob faucium dolorem, nec tamen ejusmodi ut urgere interdum prohiberet. Itaque mane cum per Nosocomium ambulasset, mox autem lesum repetiit, in eorumque inventus est, nigra, quæ deinde expalluit, facie. Cadaver postmodum mane etiam tum calens, in gymnasium illatum est ubi Anatomem docere jam coeperam sub finem Januarii A. 1733. VENTRE, ubi visum est, aperto, omentum retractum supra ventriculum, proximamque Colon intestinum, occurrit: hepar quasi marmor elegans ex sububro, & subalbo variegatum, magnum potius sed proportionem eo major lien, nec tamen prægrandis. Remes, & ureteres secundum naturam se habebant; velica tamen grandior, & tunica valde crassius. Urethra sine ullo ulquam vitio, est coronata glandis ad sui præputii fines ulcusculis olim tentata ex cicatricibus videbatur. Herniæ sacculus in scroto conspectus; sed inanis. Arteriae Magnæ truncus per lumborum vertebrae quodammodo tortuosus, ut & Iliaci ejus rami, qui nonnullis in locis duritiem offeant, albidiusque intus maculas habere; sed Aorta maculas tantum. Thorax cor exhibuit æquo majus. In eo Semilunares valvulae duriores quibusdam locis; sed Mitralis anterioris latus non sine offe. Et quamquam ex vena Cava ad septum transversum incisæ sanguis prodierat plurimus niger, fluidus; in utroque tamen cordis ventriculo concretiones erant polyposæ, satis firma compage, colore autem intus ex albo cinereo: quarum dextera, quæ crassior erat, longe se in Pulmonem arteriam, altera in Magnam, nec brevem ad tractum, producebat. Magna autem arteria, quæ truncus totus visus est æquo latior, interiore facie albidus, quales dictæ sunt, maculis a diaphragmate ad cor usque hic illic distincta, eo crebriores has ostendebat, quo cordi fiebat propior ita ut qua tribus minoribus Valsalvæ sinibus excavatur, multo evidenter, & brevi in os mutandas offerret. Præterea certo loco inter cor, & curvaturam, qui locus tres quatuorve digitos in longum, duas in latum patebat, intus pariter rugis erat crassius, & quasi tortuosus inæqualis; neque deerant subobscura erosionis indicia. Cæterum per Carotides non propagabatur macula, nedum vitia reliqua; ut minus ægre tulerim, dum accurata cæterarum Partium non minus quam earum quæ dictæ sunt, perlustratione Anatome, ut sit, in plures hebdomadas trahitur, aliaque interim Partes ex aliis cadaveribus afferuntur, huius caput, me inficio, humatum esse, ut repentinè obitus causam in eo perquirere non potuerim. Pharyngem tantum quæ deposita fuerat cum larynge, examinavi. Hæc, ut tota arteria Aspera, & pulmones, sana. Illius quæ doluisse hominem, dixi, latera juxta crassiora deprehendi, eamque crassitudinem, secando, vidi ipsius pharyngis substantiæ debere, quæ magis distenta, quiddam inter glandulosum & viscidum quali medium referre videbatur.

35. Si quæ ad urinarias Partes, quas hic dumtaxat spectamus, in viro isto pertinebant, diligenter attendas; intelliges sane, nihil fuisse cui difficultas impuraretur mingendi, nisi valde crassas velicæ tunicas. Non me præterit quod in Additamentis ad Sectionem hanc Sepulchreti XXV. (x) ex Guarionio producit, quasi crassitudo de qua loquimur, non semper obesset urinae excretioni, ut in argumento quidem positum est illi Observationi præfixo. Sed præterquam quod Guarionius, si recte ex perpaucis verbis sententiam ipsius assequor, non de dysuria, sed de ischuria est intelligendus, tunc demum contingente cum ea crassitudo, & durities ad summum Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

num pervenire; hoc quoque attendas velim, me dysuriam ipsam non ab omni crassitudine repetere, ut puta cum hæc ab amplificata dumtaxat secundum naturam fibrarum carnearum substantia sit, quæ ad contractionem vel magis idoneas reddit; sed ab ea quæ cum has alienis interjectis succis enervet, tum quidquid reliquum est tunicarum ita infarciat, ut minus flexiles efficiat, eoque contractioni obstantes. Et sane si perleges ex his quæ supra (y) memoratæ sunt, Observationibus illas præsertim quas ex Camerario, & Helveticis Actis indicavi; plane cognosces, crassissimas illas velicas aut substantia fuisse fibrosa quidem, sed scirrhusa, aut dura certe, & callosa; ut tamen, velut illa fuit Horringeri, non essent undique pelvi agglutinatae, multum illis deesset facilitatis ad se contrahendum, unde nixus illi denique, & conatus in mingendo. Quos ab eadem quoque causa vel sæpius in calculosis videre est, nisi forte propter sphincteris infirmitatem urina interdum per se defluat. Sic ejus quem Mauchartus (z) descripsit, velica erat crassa & quasi callosa. Sic in Patricio Pistoriensis vidit Cl. Targionius (a) velica tunicas digitum crassas, callosas, steatomatibus plenas, ut cum distrahi non possent, lotium, nisi paucissimum, inter se, & grandem calculum nequirent continere. Et quoniam cum tunicarum crassitudine angustia fere, & coarctatio velicæ conjungitur, ut ex Fantoni quoque (b) exemplo in eo apparet, qui post diuturnam a velica calculo dysuriam, amplissimos quidem ureteres, velicæ autem ipsius, ob nimiam membranarum contractionem, parvulam capacitatem dissecantibus ostendit; hinc est, quod si curari velint, graviorensi sæpe & molestis, & periculis obnoxii sint. Immissi enim catheteris necessario motu sic prohibito, aut calculi satis perquiri non possunt, ut apud Laubium (c) in illo cujus velica crassa valde, & contracta erat, aut si vim faciat Chirurgus, nullo modo ferre æger possit, ut apud Præsel Schreiberum (d) alter, cui velica contractissima, magnitudinem contenti calculi admodum, atque multum incrassata, nullum relinquebat lacum catheteri convertendo. Eadem autem incisæ, accidere aliquando potest id quod vel in mortuo Schrokio (e) vidit, ut velica admodum crassa, & circa calculum contracta, diffauter ille inde loco moveri, atque ex pelvi extrahi queat. Huc illud adde, si velica ex calculo perquam angusta reddita fuerit, sine gravi erroris periculo non esse locum Foubertianæ curandi methodo, ut recte monuit Cl. Kesselringius (f), optimeque confirmavit Aug. Frid. Pallas (g) quando etiam ea methodo certo quodam adminiculo juvetur. Quod de Raviani quoque methodo vel novo instrumento addito animadvertit (h). Sed & in alto, quem vocant, apparatus scite admonuit (i) velicam sanam, & amplam desiderari. Quæ vero hæcenus dicta sunt de conjuncta cum tunicarum crassitudine, & minori ad se extendendum facilitate capacitatis velicæ ratione ut plurimum immutatione, ea scire, & animadvertere non tantum Lithotomi, sed & Medici non parum interest. Exempli enim gratia, si dysuriæ obnoxius urine in velica corripit suppressio; non facile sibi, ut Chirurgus alias (k) memoratus, imponi sinet a minori hypogastri tensione, ut credat, necdum tempus esset lotii per catheterem educendi. Ex levi enim ibi, sed molestissima, tensione conficiet, jam tantum lotii in velica esse, quantum vix capere angusta ejusmodi, & minus extensibilis velica possit, præsertim si æger senior sit, ut illius tunica duritiem rigoremve ab ætate insuper esse additum, satis veri simile videatur, sique ante suppressionem sæpius quidem, sed parum mingere consuevit. Hæc mihi ad opportune accelerandam suppressæ urinæ educationem perpendisse pœnituit nunquam.

36. Esti jam longius hæc Epistola protracta; tamen si reliqua etiam volumus, ut initio promissimus, quæ ad mictionis vitia attinent, his iisdem Litteris comprehendere, multa, & varia pressius attingamus necesse est. Primum igitur ad cæteras, de quibus hæcenus scripsimus, difficultatis urinæ causas illæ quoque addenda sunt quæ in urethra occurrunt. Huius canalus initia comprehendens Prostata glandula ut indurendo, excrecendoque urinæ exitum impediatur, non modo difficile reddat, superiore Epistola (l) ostensum est. Sed cum ab ulcere, inclusoque pure simul occalleat, & tumet, accidere interdum potest,

(i) Anat. corp. hum. Dissert. 7. (k) Cent. Obs. Anat. Chir. 8. & Musæi Theca A. Repol. 2. n. 1. (l) Comment. in Synt. Vesling. 63. (m) Obs. & modo cit. (n) Part. 4. Obs. Med. 18. (o) Ibid. Obs. 19. (p) Theatr. Anat. 1. 1. c. 31. not. k. (q) Obs. Anat. (r) Anthopogr. 1. 2. c. 28. (s) in additis ad Patris Instit. Anat. 1. 1. c. 20. (t) 1. 3. Obs. Med. 6. 5. (u) Comment. cit. in Vesling. (v) Anat. quart. renov. 1. 1. c. 20. (w) Eph. N. C. Dec. 3. A. 4. Obs. 110. (x) n. 28. (y) Præf. Med. 1. 14. c. 1. (z) Sect. 18. huius l. 3. Obs. 19. & Sect. 23. in Schol. ad Obs. 1. §. 8. (a) Ibid. §. 2. (b) n. 20. (c) n. 15. (d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. Obs. 31. (e) Cent. Obs. Anat. Chir. 89. & Theat. Anat. 3. A. 3. n. 5. (f) Obs. 19. cit. (g) n. 12. (h) n. 6. Vid. etiam Epist. 29. n. 4. (i) Ibid. §. 29. (j) Ibid. §. 29. (k) Ibid. §. 18. (l) n. 23. (m) Vid. apud Brendelium n. 3. Program. l. 1. c. 28. cit. (n) Comment. Litter. A. 1734. Hebd. 6. n. 5. (o) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 23. (p) Eorund. Cent. 6. Obs. 84. (q) Eorund. Act. Tom. 3. Obs. 123.

(i) n. 13. (u) Epist. 4. n. 19. & Epist. 10. n. 19. (x) Obs. 19. (y) n. 31. (z) Eph. N. C. Cent. 7. Obs. 15. (a) Prima Raccolta di Osservaz. Med. (b) De Obs. Med. & Anat. Epist. 8. n. 15. (c) Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 22. (d) Epist. supra ad n. 32. cit. (e) Eph. N. C. Cent. 10. Obs. 100. (f) Dissert. de Hist. & Meth. Foubert. n. 57. (g) Dissert. de variis calculi, secandi Methodis §. 39. (h) Ibid. §. 29. (i) Ibid. §. 18. (k) Epist. 41. n. 14. (l) n. 13. 14. 15. & seqq.

potest, ut effuso pure superficies interna detumescat, imo ulceribus erosa tanto patentiore lotio relinquitur viam, quod callus, non secus ac Prostata scirrhus a Præstantissimo Hallero (m) adnotatus; sphincteri obstat vesicæ orificium constricturo, Tunc igitur fiet urinae stillicidium, ut in Cl. Fantoni (n) Observatione, quam sic explicari posse, reor. Ubi autem res modo ita se habet, modo puri novo e Prostata intercluditur exitus, & hinc infra superiorem illum callum intumescit rursus interna glandulæ superficies; modo stillicidium lotii accidet, modo ejus reddendi difficultas, hæcque interdum tanta ut in suppreffionem degeneret periculi plenam, eo majoris, si ejus glandulæ aut inflammatio, aut durities, & tumor catheteris usum prohibeant. Quæ cum sepe aliis, & nonnumquam mihi in medicina facienda occurrerint; tum Valsalvæ in Equite occurrere video pro quo Consilium scribens A. 1714. respondit, si forte ejusmodi contingat suppreffio, nec lotio naturalem viam referere liceat; quod alii proponebant, ab se quoque probari, ut ferro per perineum scite adacto, novam aperirent. Quin illud insuper addebat, si quid forte id facere prohiberet, tum necessitate urgente, eadem acu per quam hydropicis aqua emittitur, continuo supra pubis ossa, oblique deorsum ad vesicam demissa, urinam posse evocari: quod adnotare volui, ut scires quid ipse quoque de utraque hæsentiret optulandi ratione, si urina aliter educi nequeat, ut ægri interea vita fervetur dum ars, aut natura pristinum referent urinæ iter. Nam quod ad punctiorem attinet in hypogastrio; hanc Petropoli in quodam milite institutam, Weitbrechtus (o) Goetio scripsit a nonnullis laudatam, ab aliis fuisse vituperatam, seque id Chirurgis dijudicandum relinquere, num hæc methodus vituperetur, an laudem & imitationem mereatur: & certe multum levamen per decem dies attulerat, donec videlicet aliæ Partes, & in his quæ urinæ quoque suppreffionis causa fuerant, interitus pariter fuerunt, dissectione ut harum vitia, sic labem nullam qua & quo acus transierat, ostendente, & quod consequitur, judicium confirmante tot qui antea commendaverant, sed tunc ibi fortasse non ita omnibus noti erant, Præstantium Auctorum. Quod vero ad sectionem attinet in perineo, non ignorabat, opinor, Valsalva, in suo Bononiensi Gymnasio auctorem quem sequeretur, se habere, Zecchiū dico, Medicum olim nobilissimum, qui de ea sic ad Rotam scripsit (p), ut appareat, se ejus inventorem felici auxilio credidisse. Et quavis Riolanus (q), ubi ut illam superiorem punctiorem, ita hanc quoque inferiorem sectionem dilaudat, hancque, si opus est, etiam ad perinæi latus, in quo assæclas nunc habet, qui & ibi acu eadem qua in hypogastrio, utuntur; quamvis, inquam, Zecchiū obijciat, id auxilium Medicis Parisiensibus jam a centum annis fuisse usitatum; Zecchiū tamen centum illis annis ante, junior quidem erat, sed ea ætate, ut id ab natura ipsa discere potuerit; ab ea enim edoctum se dicit, cum in calculosis disrupto ad perinæum abscessu, ibi sponte nato, vidisset, dolores molestiasque omnes in urina reddenda cessare.

37. Illud Valsalvæ Responsum de quo modo dicebamus, ad Insulbrem Chirurgetum est, qui ægri nomine ipsum consulens, inter cetera hoc quoque scripserat, digm quod hic non omittatur, memoria se tenere, depre- hendisse lapidem in prostata glandula, dum cadaver in- cideret Eminentissimi Cardinalis Morigii. Scilicet hic morbus est de quo egit Jo. Christophorus Pohlus cum Lipliæ A. 1737. Dissertationem vulgavit de Prostatis calculo Affectis, laudabili sane consilio morbum examians, a quo præter dysuriam, & crebros ad mejen- dum stimulos, alia oriri possunt incommoda, & in his dolores five ad affectum locum, five etiam urethra tota, quippe adversus urinæ acrimoniam, ob imminutam oblinien- tis humoris Prostatae copiam, aut vitiatam naturam, non satis munita. Oportandum fuisset, ut senex bajulus in quo Pohlus eos calculos invenit, nullos in renibus, imo hos sanissimos habuisset, nec supra glandulam Prostata in ipsa infima vesica haud levem inflammationis notam, præfer- tim vero ne circa eum locum tumor, ex illa ipsa glandula orrus, intus emineret cerasi magnitudine, scirrhus, nisi pure scateret, similis. Nimirum signa quæ solerter a mortui amicis collegit Pohlus, dubitare licet num o-

mnia iis potissimum calculis deberentur: ut jure ac me- rito dubitares, si quædam symptomata, a me supra (r) in Cortinio descripta, ad tartaream illam, & ferme jam calculosam materiam referrem, quæ in sinu quodam in- tra eandem glandulam continebatur. In viro autem alte- ro cuius mentio alibi a me fiet ob peculiarem præputii, & glandis nativam constitutionem, cum flavos quosdam parvosque calculos altiuscule in Prostata defixos inveni, quid incommodi attulissent, scire non potui propterea quia peregrinus erat ob thoracis acutissimam, lethalem- que inflammationem in hoc Nosocomium receptus. Illud tamen intellexi, fieri non potuisse ut semen emitteret, quippe calculis ibi positus, affixisque, ut ejus exitum o- minino intercluderent. Fecit illa Observatio, ut aliarum quas legeram, veniret in mentem. Marcellus enim Dona- tus (s) virum in cuius Prostata lapidem infixum depre- hendit, non potuisse, scripsit, semen, nisi paucum admo- dum, aquosumque valde in coitu excernere. Fridericus au- tem Lofius (t) sterilitatis causam refert calculum ex- cessivum meatum illum claudentem, qui a pristinis in ure- thram debiscit. Quibus accensendus videtur Nicolaus de Blegny (u), qui impedimentum feminis ejaculationem in alio pariter fuisse, narrat, ob tumidam duramque sciam carunculam Seminalem, quia semen ibi in lapidem obdu- ruerat, cum vasa etiam ejaculantia lapidibus durissimis scaterent, plerisque pisi forma, & magnitudine. Et qui antea fuerat nominandus, Fabricius Bartholetus in Prostata, ut Rhodius (x) retulit, observavit, a semine retento genitum fuisse calculum, quo vesicæ orificium comprime- retur, urina fluere desit. Ab Rhodio autem, & Bartholino (y) hanc Observationem memorantibus, contra utriusque consuetudinem, mentionem omisam miror illius quam primo loco ex Donato indicavimus, nedum alterius quæ apud eundem Donatum (z) est, lapilli pusilli in Man- tuani Medici Prostata inventi. Sed & Terraneus (a) in fene renibus, liene, pulmonibus calculoso, observasse se, narrat, in tubulis Prostatarum, & Vasorum Deferen- tium ad urethra principium ejaculantibus, parvos, & in- equales calculos, molestiam, & impedimentum tum urinae superflue, tum semini effluxu afferentes. Et ante ipsum in fene alio Jacobus Douglassius (b) invenisse, se retul- lit, aliquot dura corpuscula, pisi albis similia, quo ad consistentiam dicto corpori (in mulieris videlicet tumore deprehento, quod num osseum esset, an lapidofum potius & tartareum, in medio reliquerat) dicto igitur corpori respondentia, magis tamen posita, quo ad faciem externam, quorum quædam ipsi harum glandularum (prostatarum) corpori insidebant, quædam exilibus radicibus membranæ has obtegenti adhaerebant. Has ego omnes Observatio- nes hic tibi volui commemorare, non quod haud satis vul- gatæ sint; plures enim earum sunt quamvis aliæ alio lo- co, in Sepulchretum (c) relata; sed ut posses ad Pohlus nostrasque adjicere, tamen ex nulla adhuc satis peculiari signum elici possit ad Prostata calculos internoscendos. Nam ut in plerisque earum quas protulimus, coercita feminis esset ejaculatio; hæc tamen neque ab omnibus Prostata calculis, neque ab his tantummodo contigit; neque enim omnes ibi sunt, ut meatus feminis ambos ob- struere possint, aut comprimere, neque horum obstruc- tio, aut compressio non ab aliis causis interdum efficiat. Eos- dem autem calculos quando ex feminali materia genitos suspicari non liceat, tunc fierie inter ceteras ex illa quoque existimabimus, quæ granulorum radacæ forma non rarissime nobis intra, aut ad eam glandulam occurrit? Arbitrari per te poteris cum de materia illa, & finibus ipsam interdum continentibus, aliisque Prostata vitii in Gonorrhœæ tractatione (d) verba faciamus.

38. Nunc vitia quædam, reliqua etiam urethrae com- munita, perstringentes, calculos, quos tibi sub hujus in- tima membrana in muliebri corpore alias (e) descripsimus, minime repetemus. Scribemus potius quam in tanto dissectionum cadaverum numero se nobis in tota urethra obtulerint, quæ ad controversiam possint de natura ca- runcularum; sic enim vocitant, attinere, quas olim in ipsa innasce, plerique omnes existimabant, præsertim si virulenta gonorrhœa præcessisset, nunc autem perpauci cre- dunt, urinæ difficultatem, & se catheteri opposcentes obi- ces quæ illi carunculis, alii aliis causis assignantes, & in his potissimum aut cicatricibus, aut turgentibus, & vari-

colis sanguiferis vasis certa urethra loca coarctantibus, quod ad genus ultimum Observatio quoque spectat XXII. ex iis quæ ad Sectionem hanc Sepulchreti XXV. addi- tæ sunt. Quin etiam spongiosum ipsum urethra corpus intra ejus cavum ibi extuberare traditum est, ubi go- norrhœa quædam interioris tunicae sedes magis infirma- verit. Quæ tunica cum adeo tenuis sit; minus, opinor, miraberis, si forte urgenti sanguini cedat, corporis il- lius cellulas distendenti, cum tanto crassiores, & validio- res parietes spongiosorum penis corporum ipsos quoque interdum scias a causa ejusdemmodi in nodum attolli, ut vel olim ab Arancio (f) indicatum est. Id obicem genus frequentius cæteris, quæ minime negat, intra urethram esse, censet Experientissimus Goulardus (g) ut pote quod magis idoneum sit, ut ostendit, ad phenomena explican- da, in hisque illud etiam quomodo nihil obtaculorum in quorundam cadaveribus occurrit qui de illis ad mortem usque conquesti sunt. Scilicet cum vi circulationis sangui- nis, cessante in obitu causa quæ eas cellulas introforum ur- gebat, depletur hæc sensim, & subsidunt, nullumque sui quærentium oculis indicium relinquunt. Attamen credo, cum revera in vivo fuerint, posse oculis in mortuo subijci, si spongiosum urethra corpus immisso fatis tantum di- stendatur quantum in vita fuerat, sicque exsiccati incisa urethra, ille intra hanc spectetur locus, in quo percipi solebat obtaculum. Verum non desunt qui pro ca- runculis adhuc propugnent five alibi per urethram, five præsertim in Seminali ipsa tumente caruncula agnoscen- dis: quos inter ipse quoque fuit Lanciscus in litteris ad Genesium (h); sed nemo fusius ac diligentius rem egit quam Benevolus (i), qui non modo indicatis, ut ille, sed prolatis suis Observationibus id morbi in eadem illa exulcerata caruncula esse, docuit. Neque hic tamen; quod vellem ab uno, atque altero pererudito alioquin Scripto- re animadversum; negavit, imo diserte falsus est (k), alios præterea esse posse in urethra obices, quorum ali- quos & ipse deprehenderit, ab angustis, corrugationi- bus, cicatricibus, & vel ab aliqua nonnumquam carneæ excrecentia: & hoc unum contendit, non ab his, ut ab ul- cerosa Seminali caruncula, peculiaria illa signa omnia esse posse per quæ morbum quo de ipse loquebatur, ab aliis quæ probe norat, obtaculis, urinæ se, & catheteri op- ponentibus, distinguebatur. Quæ si, ut ille suum, allabo- rent alii per certas notas melius internoscenda exhibere; non est dubitandum quin tanti id Medicorum interfit, quan- ti interest aliud in alio obtaculi genere tum prædicere, tum agere, aut saltem vitare. Intelligis, me in hac alioquin difficili ob discrepantes adeo Observationes controversia harum nullas rejicere, Celsi auctoritatem, & Præstantissi- morum Virorum judicium sequentem. Verisimile est, in- quit, quamvis alia in re, ille (l), id a quoque præter- missum, quod ipse non cognoverit; a nullo id quod non vi- derit, fictum. Altruicius autem (m), Heisterus (n), Platnerus (o), quibus & Waltherus (p) addas licet, alia in aliis obtaculorum genera esse, non dubitant, nec referre, si omnes omnia non conspexerint; satis esse quod singula certis sint Observationibus comprobata. Si quam Genesius (q) carunculam ipse deprehendit, & coarctatio- nis a Brunner (r), aliique conspectas. Sed quæ uterque addit, non æque libenter omnia agnoscamus. Neque enim omnia Observationes sunt huc attinentes, sed conjecturæ, vel eadico quæ tanquam Observationes a Genesio subiunguntur. Quid enim hic urethra illa Hip- pocratice (s) quædam, five minuti, ut Celsus (t) loqui- tur, abscessus, quibus cito, ut fit, suppuratis, pure ef- fuso, sentas redditur? Spectent hic cetera. Sed num quicunque se carunculam curasse, credidit, suæ opinionis eandem saltem attulit probationem quam Galenus (u), qui cum ab ulcere enatum, ut conjecerat, carunculam per ca- theterem fregisset, secuta vidit urinæ excretionem non modo cruorem aliquem, sed & carnis fragmenta. Omnino qui carunculas in cadaveribus, quæ certissima has observan- di ratio est, deprehenderint, multo pauciores sunt quam credere videtur Genesius, si eos seponas qui ut excre- scencias carneas in urethra conspexerint; illas tamen non intra hanc natas, de quibus hic quærimus, sed ex ve- fica, unde oriebantur, in urethram propendentes ani- madverterunt. Quæ cum ita sint; minus, ut puto, mi- raberis, si cum tot urethras ex quo Anatomæ studio me-

dedi, attente inspexerim, & quotannis adhuc inspiciam; vix unam dixerō certam mihi esse in ea Observationem carneæ excrecentiæ, cum plures sint cicatricum, & coarctationum, easque illa una non sine his fuerit.

39. JUVENIS ex capitis vulnere in hoc Nosocomio mortuus est circa medium Decembrem A. 1717. VENTRIS dumtaxat visceribus, & Magna arteria, & larynge, in quorum examine tunc eram totus, prius di- ligenter inspectis, & iis qui aderant, demonstratis, hæc præter naturam offendi. Ventrículus erat amplus, vix- que ullis cum rugis. Hepar æquo majus, ut ejus quo- que arteria, Renes cicatricosi; sed penis glans magis, quippe ob magnas cicatrices informis facta, & exigua. Inde urethra ad tertiam usque suæ longitudinis partem coarctata erat manifestissime; neque ullus usquam ex iis apparuit quos ego proposui (x), majoribus canaliculis, quorum ferme locum tenebat linea interrupta, quam tenuis excrecentia luxuriantis carnis faciebat. Cætera ad vesicam usque perattente examinata, & incisa, nihil ostenderunt vitii; ut neque larynx; si epiglottidem mi- nus sanam excipias. Magna autem arteria intus ina- qualis, ossium inchoamenta, & corrosiones, quamvis ob- scuriora, habebat indicia: præterea paulo supra cor ju- sto latior fiebat.

40. SENIS peregrini cadaver ibidem per eosdem fer- me dies incidi, cujus qui fuissent cæteri morbi, in meis schedis non adnotavi. Venerea lue fuisse infectum pa- riter ac Juvenem de quo modo dictum est, quæ adscri- bam, satis ostendunt. VENTRE enim aperto, cum renem alterum maximum, alterum justo contractiorem offendissem, hujusque ureterem prope totum adeo dila- tatum, ut apicem minimi mei digiti admitteret, vesicam autem magnam, crassis parietibus, purulentam; oculos ad urethram, penemque converti. Hujus glans pluribus profundis cicatricibus excavata: urethra autem erat val- de contracta, ut vix unum in ipsa ex iis qui supra di- cti sunt, canaliculis potuerim demonstrare. Reliqua ab natura statu aberrare non sunt visa; nisi quod epi- glottis integerrima non erat, proxima autem lingue pars quæ glandulis operata est, hic illic ulcusculis fœdabatur.

41. Quæ in utriusque urethra animadvertisimus, sicuti a qua causa essent, facile erat intelligere, ita quos esse- tus ederent, id est quæ incommoda in mingendo as- ferrent, scire non licuit, ut neque alia quæ a me in aliis urethris per dissectionem deprehensa ad te alias aut scripsi, aut scripturus sum, Scribam enim (y) ubi de Gonorrhœa (z) in Juvene ex colli vulnere mortuo, ob- longam mihi lineam albidam, nonnihil extantem, obli- que ab urethra medio ulteriora versus tendentem occur- risse, sicuti & chordulas quædam alias in Asthmatico (a) non sine urethrae contractione. Scripsi autem Epi- stola XL. (b) ut in Senem quem ruptum aneurisma su- stulerat, urethram passim cicatricosam offendissem, fibrat- que præterea inter Seminalium carunculam, & vesicam oblique prominentes; itemque Epistola IV. (c) ut in apoplectico Stabulari albidam oblongam lineam, oblique in duobus urethra locis exstantes, & in altero certe se im- misso specillo opposcentes; denique Epistola X. (d) ut in paralytico Viro quem convulsionibus interemerat, obli- quas pariter quædam quasi carneas fibrillas in illa ure- thra sede ubi catheteri obtaculum aliquod se obicere solebat. Nunc si cum linea illa quam paulo ante (e) factam dixi ex tenui luxuriantis carnis excrecentia has quasi carneas fibrillas, & fibras illas, cum harum autem utriusque exstantes lineas pariter obliquas contu- leris; fortasse mecum suspicaberis, certis quibusdam ure- thrae erosionibus excrecentias quædam tenues non rarissi- me succedere, quæ contractæ fibras primum, fibrillas- ve carneas, magis autem, magisque siccatae denique sub- albas, nonnihil exstantes lineas referant: fuisse igitur me sæpius ejusmodi excrecentias visurum, si dum recentius esset malum, inspicere potuissem. Fieri tamen etiam potest, ut quemadmodum urethram non semel vidi ci- catricosam, & manifestissime coarctatam; ita lineas etiam illas eodem censeas attinere.

42. Muliebres autem urethras, essi non sæpiissime, ut viriles; sæpe tamen feci, & diligenter perlustravi. Ne- que adhuc (nisi forte unam, de qua mox dicam, velis excipere) in ullam incidi, quæ cicatrices, nedum excre- scencias haberet: nec mirum in perbrevis, minutus angusto cana-

(m) Opus. Pathol. Obs. 35. (n) Epist. supra ad n. 35. cit. 8. n. 18. (o) Commerc. Litter. A. 1743. Hebd. 2. n. 1. (p) Consult. Med. 38. (q) Encheirid. Anat. 1. 2. c. 30. (r) n. 13. (s) De Medica Hist. Mirab. 1. 4. c. 30. (t) Infr. Chir. P. 2. Sect. 5. c. 38. n. 1. (u) Infr. Chir. P. 2. Sect. 5. c. 38. n. 1. (v) Cent. 4. Epist. Med. 6. (x) 1. 1. Obs. Med. 33. (y) Zodiac. Med. Gall. A. 2. Mart. Obs. 4. (z) 1. 1. Obs. Med. 33. (a) De Gland. c. 5. (b) Vid. Ad. Erudit. Lipl. A. 1707. M. Feb. (c) 1. 3. Sect. 24. Obs. 17. §. 4. & Sect. 34. Obs. 5. §. 4. & Obs. 6. §. 1. & in Addit. Obs. 3. (d) Epist. 44. n. 20. & seqq. (e) Epist. 33. n. 34. (f) De Tumor. p. n. c. 50. (g) Traité des maladies de l'urethre. (h) Eph. N. C. Cent. 6. Obs. 84. (i) Nuova Propoz. int. alla Carunc. (k) c. 2. & c. 3. (l) De Medico. 1. 7. c. 14. (m) De Morb. Venen. 1. 3. c. 4. & alibi. (n) Infr. Chir. P. 2. Sect. 5. c. 38. n. 1. (o) Infr. Chir. P. 2. Sect. 5. c. 38. n. 1. (p) Differt. de collo viril. vesic. & cæc. §. 1. & seqq. (q) Vid. Obs. 84. cit. (r) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 71. & 97. (s) Sect. 4. Aph. 84. (t) 1. 2. c. 8. (u) De loc. aff. l. 1. c. 1. (v) Advert. 1. n. 10. (w) Vid. etiam Epist. 63. n. 13. (x) Epist. 44. n. 7. (y) 1. 1. n. 10. (z) n. 29. (a) n. 19. (b) n. 13. (c) n. 39.

(f) De Tumor. p. n. c. 50. (g) Traité des maladies de l'urethre. (h) Eph. N. C. Cent. 6. Obs. 84. (i) Nuova Propoz. int. alla Carunc. (k) c. 2. & c. 3. (l) De Medico. 1. 7. c. 14. (m) De Morb. Venen. 1. 3. c. 4. & alibi. (n) Infr. Chir. P. 2. Sect. 5. c. 38. n. 1. (o) Infr. Chir. P. 2. Sect. 5. c. 38. n. 1. (p) Differt. de collo viril. vesic. & cæc. §. 1. & seqq. (q) Vid. Obs. 84. cit. (r) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 71. & 97. (s) Sect. 4. Aph. 84. (t) 1. 2. c. 8. (u) De loc. aff. l. 1. c. 1. (v) Advert. 1. n. 10. (w) Vid. etiam Epist. 63. n. 13. (x) Epist. 44. n. 7. (y) 1. 1. n. 10. (z) n. 29. (a) n. 19. (b) n. 13. (c) n. 39.

canali, in quem neque tot qui erodere possunt, humores influant, neque ullus, nedum tantus quantum habet virilis urethra, flexus cadat. Posse tamen nonnunquam in muliebri quoque & ulcera, & excrecentiam, aut certe diuturna obstracula quædam oriri, de Alstruccio, & de Alghisio didici, quorum ille (f) corpus quo urethra cingitur, suppuratum, & fistulosum intra hanc hiar, & pus effundere non semel vidit, alias vero ab eodem corpore tumido, & calloso urethram præter modum arctari; Alghisius autem (g) Virginem memorat, cui tenuis medicata candela ad *carnostatem* urethrae absumendam intra hanc relicta, vesicam subierat. Huc adde *carneam excrecentiam*, de qua mox dicetur, in Vidua quædam a Mullero (h) descriptam. Et mihi quidem semel accidit, cum Vetula cadaver perferretur sub initium A. 1751. ut parvulam excrecentiam triangularem intra urethrae exterius osculum, ex hoc tamen non exstantem ostenderem, per se autem post acutas præsertim febres animadverti sanguifera vascula, quæ plurima, & ferme parallela intima urethrae perperant tunicam, turgida adeo, & conferta, ut ab ipsis tota hæc propemodum nigricaret: accidit quoque semel ut in Virguncula, itemque in Anicula, quarum fortasse alibi (i) incidit mentio, portionem ejusdem illius tunicae extra suum meatus orificium procurrentem viderem. Sed quid hæc, aut illa incommodi in mingendo sustinerent, conicere quidem; sed pro certo tamen scire non potui. De causa pariter cur his duabus pars quædam illius membranae ita ex urethrae osculo promineret, non nisi conjectura erat locus. Atque ut ea uti nollem quæ ex sapientia læcessitis per acus capitulum (k) illo osculo, illaque membrana duci potuisset; restabat altera, a prægressa fortasse stranguria repetenda. Nam conatibus ad expellendam urinam vehementioribus membranam illam deorsum urgeri, & ratio indicat, & laudata Mulleri Observatio confirmat. Excrecentia enim quæ ex urethrae orificio prodians, hoc obturaverat, magna ex parte absumpta, pars interior reliqua non nisi eo quo vesica exonerari solet, conatu fiebat conspicienda. Quæ Observatio excrecentia *carneæ, rubra, fungosa*, quæ *sabæ magnitudine* prodierat ex illo orificio, sita cum exemplo altero conjungatur, quod Cl. Goulardus (l) memorat, *carnostatis* in viri cuiusdam urethra nonnunquam adeo excrecentis, ut ex hujus osculo prodiret, ibique esset amputanda; tanto libentius cum illis facies, quæ inter cætera in urinario meatu occurrentia obstracula, adhuc carunculas etiam agnoscunt. Sed ne ab urethrae feminea recedamus; quid de Corn. Solingeni rarissima quam Salzmännus (m) commemorat, Observatione dicemus, meatus videlicet *urinarii inversi atque digiti minoris longitudine propendentis*? Utque adeone laxam & extensam meatus fuisse membranam? an collum, sive infimam vesicæ partem illac prolapsam, ut credere videtur Salzmännus (n)? qui tamen suam ita indicat dubitationem (o), si modo alia pars oculis se se offerens, sub specie vesicæ Solingenio non imposuit. Alius quoque morbus est, cujus raritatem ut in muliebri urethra ostendamus, pauca de ipsa, & de ejus per eam calculis attingemus. Illa, ut Celsus (p) ait, & nos paulo ante posuimus, & brevior, quam in viribus, & laxior, & quod supra (q) dixerat, simul restior est. Ergo calculus, quod recte idem subiicit, ubi parvulus est, per se sepe excidit. Quin aliquando etiam non parvus, qualis erat quem hic, ut antea (r) scripsi, & vel magis quales ii quos Bononiæ conspexi. De quibus, alii quos Langelottus (s), Jæggerichmidsius (t), Dillenius (u), Schmiederus (x), Treuius (y), alii sine Chirurgia ope exclusos proposuerunt, pluradecere non refert, quando constat, iis majores Sennertum (z), & Tulpium (a) vidisse, nempe illum fere *ovii gallinæ magnitudine*, hunc ut Icon adjecta ostendit, *crassioris, & ponderantem tres uncias cum duabus drachmis*. Quem maximum inter omnes fuisse, credo, de quibus meminisse legisse: inter omnes dico a muliere non modo excretos, verum etiam gestatos; cum in virili vesica ad immane pondus crevisse, sciam. Mitto enim qui *pendebat libram Anglicanam, & binas insuper drachmas*, cui non meminerat Helmontius se parem unquam vidisse; quando in eadem Sepulchreti Sectione (b) in qua

hæc verba referuntur, calculi XXXII. (c), & XXXIV. unciarum (d) proposti sunt, & Cl. Targionius (e) testatur, esse Florentia qui uncias æquet XXXIX. ob id quoque spectabilior, quod in eo deprehensus est qui post prosperam & vegetam senectutem morbo extinctus fuerat in quo leves potius lithialis suspiciones, quam legitima indicia, extiterunt. Eodem pondere alterum video ex Verducio (f) commemorari, ex Launayo (g) alterum unciarum LI. denique, ut maxime mireris, quem Kesselringius (h) spectasse se, ait, apud Cl. Morandum, 6. libras, cum 3. unc. æquantem: quod ipsum pondus; ne forte me in describendo errasse suspiceris: in recensione quoque invenies illius Dissertationis edita in Commercio Litterario (i). Unde fieri auctem putas, ut tantorum lapidum nullum in feminea vesica reperitum esse, legamus? Nempe, aut ego fallor, rectius, breviusque, ut dixi, præsertim vero latius urina iter in sexu sequiore facile excipit, emittitque partem multo maximam viscidæ illius, & tartareæ materie, quæ ob contrarias causas in marium vesica subsistens, usque, & usque, in quorundam potissimum corporibus, accrescit calculo, ejusque adeo auget molem. Quo rarior censeri debet casus, a Cl. Adolpho (k) editus, *calculi oblongi in Vetulae urethra nati firmiterque ipsi accreti*. Quo enim modo particulæ unde is constabat calculus, resistere in ejusmodi canali neque abripi lotii incursum potuerunt? Attamen aut vis hoc impellens, ut in muliere sex & septuaginta annos nata, languidior, aut urethrae membrana alibi ulcerosa, eoque inter cuniculos, & inequalities suas retinens eas particulas, aut denique calculus, primum in vesica natus, & urethram sua aliqua parte ingressus, ibique subsistens, aliis, atque aliis additis ex lente illac, & quasi per stillicidium, ut tunc fere solet, præterlabentibus ejusdem generis particulis, hæc, inquam, aut aliqua, aut univèrsa id quod miramur, & nihilominus rarum est, satis efficere potuerunt. Favent huic explicationi, præter mulieris ætatem, prægressa jam subinde per plures annos obstructio urinæ; præsertim vero calculus ipse in vesicam usque recurvatus. Vide enim meam primam (l) calculi qui acui intra virginem vesicam increverat, Observationem. Is cum sui partem recurvatam haberet intra utrinarium meatum, certe non ab illa parte inceperat, sed ab acu quæ inde aberat; illa autem ipsa pars, tantum calculi appendix, & additamentum, intra contiguum meatum paulatim creverat; ut manifeste, pro fine, non pro initio calculi esset accipienda.

43. Restaret, ut de Diabete, de Urinae Incontinentia, & per locum indecentem Excretionem, & de Urinis non naturalibus scriberem, de quibus singulis argumentis singulae in Sepulchreto adduntur Sectiones. Verumtamen duas ob causas non faciam. Prima est, quod nec Valsalva, nec ego quenkam ex diabete mortuum dissectuimus, quod per se facile coniecimus ex iis quæ de eo morbo attigi Epistola superiore (m). Altera, quod illa omnia quæ in denatis post cæteras istas quæ modo dictæ sunt, affectiones, deprehendimus, jam cum aliis a quibus ipsæ pendebant morbis, quod in his quoque Litteris animadvertere potuisti, proposuimus. Non est autem consuetudinis nostræ quidquam iterare. Quod si in Sepulchreto non esset factum; ad pauciora redissent istas quas diximus, Sectiones, quarum nihilominus duæ primæ adeo breves sunt, ut simul cum Scholiis vix ambæ impleant sex paginas. Præterea in singulis fere quæ ad urinam, aut ad Partes his interveientes attinent, Sectionibus non modo quæ in aliis, sed & quæ in una Sectione posita fuerant, in eadem iterantur. Et novissi jam ex initio superiorum Litterarum (n), quod Sectione XXIV. fuerint repetita. Ea autem quæ illam præcedit, Sectione XXIII. vide, quæso, an eadem quæ Observatione VIII. §. 1. leguntur, legantur partim Observatione IX. partim iis quæ huic subjecta sunt, Scholiis: Sectione vero in cuius argumento hæcenus versatus sum, XXV. an idem quod positum fuerat §. 2. & quod §. 10. Observationis VIII. ponantur iterum §. 19. & §. 17. ejusdem Observationis. Sed & in una ex Sectionibus istis brevissimis, id est XXVII. num id quod traditur §. 3. Observationis I. idem sit quod §. 9. Observationis II. & in hac ipsa II. num

num quod §. 4. idem sit quod §. ejusdem I. si forte dubitas; historias inspicere relatas Sectione XXIV. Obs. X. §. 8. & Obs. II. §. 4. quibus perfectis, omnem tibi dubitationem eximes. Denique; ne pluribus temorer; si Sectionem verses XXVIII. non sine magna admiratione bis invenies una eademque pagina repeti inferius quæ paulo supra posita sunt, primum videlicet maximam Scholiorum partem ad Obs. VI. & VII. deinde vero Observatione XII. historiam *Illustr. Ducissæ* §. 2. & §. 4.

44. Ne tamen a symboli ab his Sectionibus discedere videamur; ad istam ultimam, quæ de Urinis est non naturalibus, pauca adnotabimus, nec multo plura ad penultimam quam esse diximus de Urinae Excretionem per locum indecentem. Utraque, etsi conjunctam non habebunt cadaveris inspectionem; non tamen omni carebunt utilitate. Incidimus aliquando in urinas quæ chylum, & aliquando in alias quæ sanguinem admixtum habere viderentur; ut Medicorum alii rem ita prorsus, ut apparebat, alii vero longe aliter accipiendam esse, contenderent. Controversia illa prima si unquam alibi, tunc profecto hic maxime ante hos quadraginta annos agitata est, cum ultimus ex Generosa Discalciolorum Gente in longo illo, quo confectus denique est, morbo lotium diu reddere perrexit, cujus pars magna lachi omnino similis subsidebat. Ejus Medicorum alter, Vir Clarissimus, & mecum profitendi munere, & amicitia conjunctus, cum sedimentum illud odore omni, & visciditate careret, chylum esse, asseverabat. Negabat alter, qui pus esse, contendebat. Ut diuturnam æm litem, si fieri posset, componerent, omnes qui tunc Patavii in medendo nomen aliquod haberent, alii alio die accesserunt. Menihis magis resurgentem quam litibus implicari, diuque per multas ac varias excusationes tergiversantem, exoravit denique agri levir Alexander Guarinus, in quo pariter vetustum illud, & nobili Poeta illustratum Genus aliquot post annis finem habuit. Cum discrepantium rationes audivissem, urinas examinasse, ægrum diligenter interrogavisse; ita respondi, ut me omnes intelligerent disputantium quidem utrumque pro suis quæque meritis non parvi facere; sed plus tamen veri studii, ut debebam, quam amicitia tribuentem, in secundam inclinare sententiam. Nam chylum quidem per renes exsiluere posse, me dixi non ignorare, si modo laxiores sint per ipsos secretionis viæ (& sane aliqua sic explicabimus eorum exemplorum quæ vel Sectione hac XXVIII. (o) Sepulchreti indicantur.) Verum in nostro ægro ex prægressis diu, & vel tunc comitantibus non obscuris læsi alterius renis indicis, ut se pars chyli adjungeret, pus tamen videri non posse excludi. Nec me fugere, quo fetore infectum pus sepe ex lævis renibus descendat: extare tamen & in odori puris exempla non modo aliunde, ut cum Celsus (p) scripsit, *melius esse pus, sinibil olet*, verum etiam ex ipsis renibus, eaque mox commemoranda. Nam quod viscidum non esset sedimentum; inveniri quidem interdum etiam in renibus maxime viscidis (ut in Sepulchreti eadem Sectione (q)) Verumtamen haud omne pus esse viscidum, & quod cum urinis glutinosum, & tenue ejicitur, id sane Medicos Experimentissimos (r) legi vesicæ, non renibus, tribuentes, & Valsalvam, dissectionibus quoque edoctum, variis consuevisse ab renibus, quam a partibus subiectis, reperere. Quæ ut omnia prætermittentur; haud tamen oblivisci me posse aut Viri illius, aut Præfatis, quorum historias reliquissent nobis Benedictus Silvaticus (s), & Lælius a Fonte (t) tam nostræ similes quam aquam aquæ (ut propterea vix crederem, in tam agitata controversia ab nemine, uti certior postea factus sum, ante me fuisset commemoratas.) In utroque enim illorum ægro signa præcesserant renis alterius læsi, aderantque, ut in nostro, & lenta febris, & macies. Ab utroque urinae reddebantur quarum sedimentum non fetens, non viscidum, sed inodorum, & fluidum, lac ipsum referebat. Hoc esse pus ab renibus defluens, Medicus ille uterque affirmabat. Negabant, in Episcopo præsertim, alii. Diffectio autem, renis illius substantiam aut absumptam, aut abscissu perforatam ostendens, pro affirmantibus stetit. Quæ etsi commemoranti similior dicebam, quam pronunciant, etsi iudicii difficultatem in additis morborum sedibus naturæ statuendis inculcabam, nec me plus sapere quam tot alii qui superioribus diebus consulti fuerant, profitebar; tamen ex Nobilibus & Do-

ctis, qui non pauci aderant, Viris nemini, ut dixi, quam in partem meus propenderet animus, occultum fuit. Neque mortui post aliquod tempus refragata diffectio est, per quam, tametsi fuit ab ignobili Chirurgo clam propemodum instituta, sic satis postmodum auditum est, renem affecti lateris semiputrem inventum esse, & ad exiguum molem redactum. Quod etsi eorum silentio quorum intererat aliter credi, comprobatum est; tamen quia nec ipse vidi, nec meorum quikquam diffectio interfuit, non visum est hic pro certo esse ponendum.

45. Atque hæc Patavii. Venetiis autem inter pauciores controversia altera olim fuerat, Abbatis cuiusdam urinae sanguine, ut videbantur, revera infecta essent, necne. Res ferme similis erat illius quæ eadem Sepulchreti XXVIII. Sectione (u) propoita est; sanguis enim in lotio vel diutius servato non subsidebat. Consultus, auctor fui, ut igne supposito periculum facerent; sic enim sanguinem facile posse coire, seque, si reapse inesset, ostendere. Itaque eo periculo facto, controversia dirempta est. Cæterum quomodo per album linteum, in ejusdemmodi urinam immersum, & mox exsiccatum, idem quæsierit Cl. Burgmannus (x), & quid loco sanguinis, & qua ratione invenerit Schelamers (y), & quomodo in quibusdam sanguis ex vesicæ hæmorrhoidibus secundum Cælum Aurelianum (z) sit repetendus, etsi de hoc fusc ad Præcl. Seraum, pro Nobili ægro Neapolitano in Medicorum diffidio consulente, respondi, in his modo edifferendis te non morabor; sed ut quos laudavi, inspicias, & de iis hæmorrhoidibus Doctissimum Helwichium (*) legas, potius hortabor.

Cum vero in eadem quam paulo ante designavi, Sectione (**) leges, teretia corpora vermiformia, & cruenta a quadam Vidua quam acerbissimus lumborum dolor cruciabat, simul cum lotio vesicæ redidit; eorum substantiæ accuratius examen requirere, per quod apparere posset, ea potius quam teretes exeli a cancro renis particulas, polyposas, in uretre sic formatas, concreciones fuisse. Nam quod lumbri verum non fuerint, Observationis quoque illius Auctor agnovit: qui nisi inter vesicam, aut urethram, & intestina via per morbum aperta sit, quemadmodum supra (a) indicatum est, cum urinis certe reddi non possunt. Quamobrem cum ad ejusdem Sectionis Observationem veneris XXX. quæ uræ acinorum, & frustulorum lactuæ, aliorumque ciborum excretio una cum urinis animadverta proponitur; partim majorem cautionem, & accuratius examen desiderabis, partim etiam quoniam in uno vesica tota exulcerata fuisse dicitur, ulcus aliquod inde in quodpiam intestinum pertinuisse, suspicaberis. Neque enim difficile est, ita se habentem vesicam cum proximo aliquo intestino coalescere, & sic per quampiam ulcerosam corrosionem cuniculum ab illa in hoc duci. Quæ ratione intelligi fortasse potest, quomodo vir de quo ab Yongio (b) scriptum est, cum faculenta urina exiguis passis uræ acinos, foliorumque, ac radicum particulas, aliaque devorata, cum iisque pilulas duas, in longum extenuatas, reddiderit. Nimirum favissimi colici dolores superioribus mensibus antecesserant, ut a veri similitudine non abhorreat, inflammationem aliquod intestinum cum vesica coalescere, & parvo aliquo abscessu facto, pus in utriusque cavum erumpere, apertamque inter utrumque fistulam relinquere potuisse. Nam quod cum Yongius advocatus est, urina nihil grave oleret, neque sanguis, aut pus alvo deiceretur, nec tenebimus esset, neque humor tinctus, per clysterem immixtus, suo locum colore inficeret: communicationem quidem inter vesicam, & Rectum, aut Colon intestinum minus credibile merito ipsi reddiderunt. Credibilem autem fortasse consuevit, si inter vesicam, & partem aliquam huic attigam Ilei intestini esse, concepisset, acerbissimi enim illi qui præcesserant, dolores, ut Colici vocati essent, illaci esse potuerunt.

46. Sed foramen quod a vesica in contiguum Rectum intestinum præter naturam pertineat, ut facilem reddit explicationem lotii per anum reddit; sic aliquando aut ita in mortuis obscurum est, aut sic in viventibus difficile creditur, ut eodem modo vix ac ne vix quidem liceat rem hanc, ad penultimam, ut vides, ex enumeratis (c) Sectionem attingentem, probabiliter explicare. Hæc quæ dico omnia exemplis declarabo. Quorum antiquif-

(f) §. 4. supra ad n. 38. cit. (g) Litotom. c. 3. (h) Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 38. (i) Vid. Epist. 50. n. 51. & Epist. 56. n. 21. (k) supra n. 19. & seqq. (l) Tract. supra ad n. 38. cit. (m) Dissert. de hernia vesicæ urinariæ, thes. 18. (n) thes. 26. (o) thes. 19. (p) De Medic. l. 7. c. 26. n. 4. (q) §. 10. (r) Eph. N. C. Dec. 1. A. 6. & 7. Obs. 7. (s) Dec. 3. A. 3. Obs. 101. (t) Dec. ead. A. 9. & 10. Obs. 242. (u) Cent. 3. & 4. Obs. 161. (v) Commenc. Litter. A. 1733. Hebd. 39. n. 4. (z) Medic. Pract. l. 3. p. 8. S. 1. c. 2. vers. fin. (a) Obs. Med. l. 3. c. 7. (b) 23. Obs. l. 3. g. (c) Obs. ead. §. 1. (d) Ibid. §. 2. (e) Prima Raccolta di Osserv. Med. (f) Vid. apud Boreum de Operat. alt. Aparat. (g) Vid. apud Pal. Dissert. supra ad n. 35. cit. in adduct. ad §. 19. (h) Dissert. ibid. supra cit. n. 53. (i) A. 1739. Hebd. 9. (k) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 239. (l) supra n. 19. (m) n. 14. 15. (n) Epist. 41. n. 1.

(o) Schol. a. ad Obs. 14. (p) De Medic. l. 7. c. 26. n. 20. (q) Obs. 9. §. 1. & Obs. 23. §. 1. (r) Vid. ibid. Schol. ad Obs. 10. & 15. (s) Vid. ibid. cit. Obs. 10. cum Schol. & Obs. 14. cum Schol. (t) Obs. 9. (u) Commenc. Litter. A. 1733. Hebd. 36. (v) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. Obs. 81. (z) Morbor. Chron. l. 5. c. 4. (a) Eph. N. C. Tomo modo cit. Obs. 119. (b) Obs. 26. (c) n. 6. & 29. (d) Vid. apud Th. Boreham Saggio delle Transf. Tom. 3. P. 2. c. 4. §. 29. (e) supra, n. 43.

tiquissimum ex Praxagora est referente: *visum sibi quendam qui per sedem urinam excrevisset, supervixissetque annis duodecim; anno etiam pluribus (quod tunc temporis ipse discessisset, nec de eo quicquam audisset postea) ignorare.* Locum hunc ex Ruffi Ephesii libello de *Vesicae, Renumque Affectibus* (d) ita descripsi, ut in Henrici Stephani Editione legitur *Medicæ Artis Principum*, quem libellum latine redditum extare, non videntur Lindenius, & Mercklinus (e) animadvertisse. Hæc feci te, volui, ne forte mireris, cur non, ut Schenckius (f), & qui ipsum describunt, Praxagoram dixerim quendam vidisse, cui *urina per sedem excrebatur per duodecim annos.* Quod tamen si diserte ita dixisset, ut dixit quidem supervixisse, mirari non oporteret, cum in hac ipsa XXVII. Sectione (g) historiam habeamus viri qui a pueritia ad quadragesimum, imo ad quinquagesimum usque annum *semper lotium per sedem reddiderit*, lithotomus enim e pueri calculum exsecans, sic vesicam, & Rectum intestinum læserat, ut meatus ab illa in hoc descendens post obitum inventus sit *digiti latitudine.* Quod autem in isto artis imperitia fecerat, in Praxagora homine videtur morbus fecisse; ejus enim Observationem Ruffus post illa subiicit, *aliquando in intestinum abscessus rumpitur:* quanquam, ne quid difficilem, de abscessu loquitur renum; nostri autem, Pechlinum (h), cum *urina per alvum quinquies vel sexies quotidie ejiceretur in ischuria hominis renum, & vesicæ calculo laborantis, in medio reliquisset, an illa a vesicâ in substratum proxime intestinum Rectum per novastubulatasque vias, an a renibus ad intestina deducta esset.* Cæterum de vesicæ abscessu, Rectoque intestino Fernellius (i) loquitur, cum *visum esse, ait, illum nonnullam & in anum penetrare, illaque urinam omnem defluere.* Et Hildanus (k), cum post longam vesicæ ischuriam, & purulentas urinas vidisset has demum viginti ultimis vitæ diebus, non per colem amplius, sed per podicem *nunc scorsum, nunc vero mixtas excrementis effluere;* deprehendit, ex vesicæ cavo rotundum ulcusculum in Rectum intestinum produci. Quamobrem, cum ipsi Horstius significasset, mulierem quæ dum ab arbore caderet, genitalis lacerationem retulisset, & mox vulnus temere exterius clausisset, jam *ultra semel spatium nullam urinam reddidisse, nisi quod profluebat serosa humiditas singulis diebus per alvum, non cum alvi excrementis, sed separatim:* minime dubitavit respondere (l), *plane sibi esse persuasum, non tantum collum vesicæ, & uteri, verum etiam ipsum intestinum Rectum ab arbore læsum atque perforatum fuisse.* Et explicatio quidem hæc tenus facilis, & perspicua est, quemadmodum & in Virro Nobili fuisse, si sanguis quem alvo excrebatur, admixtum facile urinam obscurasset; in eo enim invenit Cl. Moraschius (m) adnatum fungosæ carni, vesicæ calculum, qui hanc tandem una cum intestino Recto perforaverat. Sed vicissim Observationes sunt, in quibus hæreas, velut illa quæ ex Actis Helveticis (n) semel atque iterum alia de causa supra a me indicata est. Nam ad mictum cruentum, & dysuriam cum paulo ante vitæ finem illud accessisset, ut lotium per anum exstillaret; vesicæ tamen nullum ulcus, nullamque viam ostendit quæ duceret ad intestinum. Huc adde ex Sepulchreto (o) multo longioris temporis Observationem. Puer enim cui *toto decennio omnino fuit cohibita urina, cujus gutta aliquot per anum, sed minus limpide,* probabant, renes habuit, & ureteres morborum vi inutiles redditos, vesicam autem *nequaquam p. n. perforatam.* Quin & ubi plurimum lotii in vesica erat, ut in eo de quo Rhodius (p) scribit, urethræ caruncula illud supprimebat, ipsum quidem *per intestinum Rectum clare fluxit, sed tantum donec, sublata obstructione, ad consuetam viam naturæ duceret;* ut minime intelligamus,

quomodo per intestinum fluere omnino desisset, si ex vesica ad illud via præter naturam reapse fuisset aperta. Plurima pariter in vesica pueri urina erat, quem ex Benivenii (q) Observatione plures commemorant; nam septimo jam die non reddiderat; cum eam tandem ex ano evacuavit. Sed ne forte credas, ab Rhodio, & a Benivenio prætermisum esse superstes aliquod præternaturalis perforationis indicium; Cl. Reusneri (r) in alio pueri Observationem perlege. Videbis certe, nihil in vesica fuisse lotii quod ex ea viam vi sibi faceret ad intestinum, & tamen septimo ischuriæ renalis *idie urinam colore, odore, quantitate naturalem emulantem, per alvum excretam esse sine secum alvinarum excretionem, sine omni dolore, aut alteratione, idque per dies aliquot ter quaterve quotidie, donec repente per colem reddita est sine omni dolore aut molesto symptmate, & sic naturali modo perexisse mictionem annis infrequentibus.* Haud licet igitur omnem urinam per podicem excretionem ad primum illum modum explicare; sed ubi ob renalem, aut vesicalem ischuriam nimia ejus copia sanguinem prægraverat, neque ullum ab renibus, aut a vesica morbo ad intestinum aperti itineris indicium sit, res ita potius est explicanda ut quemadmodum tunc per vomitum ejici lotium, alibi (s) scripsimus, sic per feces quoque ejiciatur, intestinum videlicet glandulis id præter naturam fecerentibus. Attamen vel ratione ista posita, illud non facile intelligitur, quomodo effusa in tubum intestinum urina sine facum alvi admitione, ut modo referebamus, egrediatur: quæ difficultas neque per illam alteram rationem primam tollitur omni ex parte, ut cum illa apud Horstium femina non cum alvi incrementis, sed separatim urinam ex podice emittebat; Hildanus enim *nunc scorsum* quidem, *nunc vero mixtam alvi excrementis effluere* in suo fene, observaverat. Mihi autem superioribus annis contigit ut in casum inciderem, quem, ejusque causam, & modum cum intelligere conarer, non visa est amplius ex majoribus hæc esse quam modo proposui, difficultas. Juvenis Sacerdos qui ob egregiam indolem, ejusque officio dignam probitatem, & spectatissimos semper mores, omnibus quibus erat notus moriens sui desiderium reliquit, cum mihi narraret, se paucis ante diebus animadvertisse, urinam sibi per sedem prodire, ego qui hypochondriacum, sicuti studii litterarum dediti non pauci solent, ipsum esse jam nossem, primum non credidi, postmodum autem cum ad me regressus illam quæ sic paulo ante prodierat, afferendam curasset; tum denique ex eo diligenter quæsi, an vitio ullo unquam alicujus ex urinariis partibus, aut imi intestini affectu fuisset, an dolore, aut molestia ulla, si non diu antea, at saltem non ita pridem inter mingendum, aut deiciendum vexatus esset, aut tunc vexaretur, cruentine quidquam, aut purulentæ alterutra via exiisset, aut exiret, atque alia ejusdemmodi. Ille vero hæc singula, nedum universa, iis verbis negavit, quæ vel in minus ingenio hominæ fidem facerent. Nulla, ut vides, hic fuerat ex causis quas paulo ante commemoravi, non calculi exsectio, non abscessus, non casus, non ictus, non in vesica, aut renibus lapis, non urina in illa, aut his pressio, & tamen urina, & sæpe quotidie simul e vesica, simul e podice exibat, eaque ipsa quæ e podice, ut plurimum sine alvi incrementis, & sic ad mortem usque, ab alio morbo allatam, id est menses multos perexie absque ulla molestia exire. Is cum decessit, ego forte in Patria longius aberam, ut ne veniam quidem licuerit petere cadaveris perscrutandi, & quod in vivo intelligere satis non poteram, ex mortuo fortasse addiscendi. Sed hæcenus hæc. Proximas Litteras aliquanto breviores expectabis, & valebis.

EPI-

(d) c. 8. (e) Linden. Renov. Vid. Ruffus. (f) Obs. Med. 1. 3. ubi de Urina alien. loc. excreta, Obs. 13. (g) Obs. 1. (h) Vid. Act. Erud. Lips. A. 1691. M. Maj. (i) Pathol. 1. 6. c. 13. (k) Cent. 2. Obs. 65. (l) Cent. 5. Obs. 47. (m) Eph. N. C. Cent. 10. Obs. 56. (n) Tom. 1. (o) Sect. 24. Obs. 6. §. 1. (p) Cent. 2. Obs. Med. 90. (q) De addit. morb. causis c. 7. (r) Eph. N. C. Cent. 5. Obs. 3. (s) Eph. 41. n. 5.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XLIII.

De Herniis agitur.

Hernias, de quibus scribere aggredior, Viri hoc tempore Doctissimi dividunt; id quod minime ignoras; in legitimas, & spurias, legitimas eas in quibus ventris aliquid prociat viciis, spurias cæteras appellantes. Hunc ordinem sequar. Ex illis igitur herniis quarum adhuc restant in Valsalvæ schedis Observationes, hæc pertinent ad legitimas.

2. VIR triginta annos natus; ex capitis vulnere mortuus, cum vivens tres habere testiculos videretur, scroti atque inguinum propterea instituta dissectione, hæc præbuit conspicienda. TESTES quidem erant duo, secundum naturam se habentes. At qui a sinistris tertius esse videbatur, omenti erat portio, quæ intra proprium sacculum, ex peritonæo factum, in scrotum descendebat. A dextris quoque tumor erat, sed minor: quem Appendicula Vermiformis, in similem sacculum prolapsa, efficiebat.

3. Epiploceles, simul, & Enterocœles hic habemus exemplum, & quidpiam in singulari peculiare. Omenti portio, testiculum mentiens in vivo, ad cætera est addenda quæ cum mentiri illum possint, suspicionem olim fecerunt nobis (a) tot. Observationes legentibus testiculorum trium, a Graafio (b), aliisque commemoratas, de aliqua in pluribus earum deceptione, quæ post mortem non fuerint per anatomen confirmata. Et sane Vir iste facile auxisset earum numerum, nisi errorem sustulisset dissectione, quemadmodum, & in alio sustulit, cujus tertium, ut videbatur, testiculum fuisse hydatidem, veritatis magnitudine, & figura persimilem, scripsit Cl. Schreiberus (c). Cæterum omenti portio in scroto reperta, vel per se olim admirationem movisset is quos designat, & sua gemina in uno viro deprehensa ibidem epiploceles Observatione confutat Præstantiff. Heisterus (d).

Appendicula autem Vermiformis, si una cum Cæco intestino in scrotum prociat, ut etiam cum proxima Coli parte; quamquam scio difficultius hanc, quam sinistram Coli partem prolabi; at si tamen laxatis, perfractisve, ut in Waltheri (e) Observatione, dextris Coli vinculis, cum hoc, & Cæco simul Appendicula descendisset in scrotum, eorum pondere peritonæum deorsum urgente; proclivius id esset intelligere, quam solam ipsam adeo flexilem, & levem eo pervenisse, nisi tunc forte fuit, id quod rarius est, recrementis maxime distenta, aut potius paratum antea sacculum a prolapsu intestino Ileæ, hoc in ventris cavum regresso, subiit ipsa, longitudine sua ad id plurimum juvante. Agnovit difficultatem hanc Lavaterus (f), qui tamen Appendiculam in scroto non vidit, ut in eo vidit, & a dextris quidem, intestinum Colon plus quam pugni magnitudine; id quod difficultius esse quam a sinistris dicebam, nisi forte violentiam ictus, aut casus ab alto hernia consequatur, cujus exemplum habes apud Tacconum (g). A sinistris autem Coli partem, aliquando totum ejusdem arcum, in scrotum non raro excidit, Mauchartus (h) affirmat ubi & se ab eo latere, ait, ter vidisse, ab eodemque Parisiensi Cel. Chirurgum herniam Coli deprehendisse, ubi Cæcum simul cum sua vermiformi appendice in scrotum se dederat præceps. Sed & Cl. Henslingius (i) sinistram pariter vidit oscrocelem, octo ulnas intestinum Tenutum, intestinum Cæcum cum processu vermiformi, & dimidiam ulnam intestini Coli completentem. Quæ commemoro, ut in herniis ingentibus scias laxari adeo Coli vincula, ut fiant hoc sequi trahentia suo pondere Tenuia intestina, & vel ipsam Appendiculam, sed una cum Cæco, in sinistram scroti partem prolabi. Sed de magnis enterocœlis erit etiam infra (k) scribendi locus. Nunc, cum alias alibi tum epiploceles, tum enterocœles Observationes ex Valsalva tibi descripserimus; duas, quæ reliquæ sunt hujus ultimi generis, mediocrium licet fuerint, hic subiiciemus.

4. PAUPER annos natus sexaginta, pessimi habitus, herniosus frigido aeri expositus, viribus fortasse deficientibus

tibus cadit, mediumque os humeri frangit, faciem vero leviter contundit. Non multo post tempore interit.

VENTRE aperto, si vasa lactea chylo turgida excepias, & magno tractu intestinum, nullis, qui alibi per mesenterium occurrebant, lymphæ ductibus interceptis, exorta, & alia ejusmodi (quæ ad alterum servamus locum) nihil adnotatione dignum occurrit, præter intestinum partem quæ ex ventre in anulum e peritonæo factum prolapsa, scroto, ut solebat, condebatur.

Thoracis sinistrum cavum cum recluderetur, ab ingressu aeris illico non fecus ac in viventibus bestiis concidit pulmo: quod vero a dextris observari non potuit. Cæterum sani erant ambo pulmões. In Cerebro aliquid aquæ continebatur, & quibusdam in locis gelatinosa animadvertetur concretio. Hujus cadaveris flaccidæ, & molles erant carnes: sanguis autem quasi ferrosus, & parum rubens. Quidquid autem habebat rubedinis, nonnulla dabant solida corpora in eo fero nantia: nullæ tamen inerant fibræ; nam eo sanguine in aquam coniecto, nulla apparuit concretio fibrosa.

5. PAUPER alter annorum circiter triginta quinque, pariter frigoris injuriis expositus, cum sine pulsu jam esset, in Nosocomium est illatus sub noctem, Noctis Januariæ A. 1690. De ventris sævo dolore balbutiendo conquirebatur: quem cum esse crederent ex prolapsu, cui erat obnoxius, intestinum in scrotum; reponere conati sunt. Mane homo obiit. CADAVER dum inciditur, carnes multum emittebant humoris.

In Ventre fuerunt omnia secundum naturam, nisi quod intestinum pars, laxato ad inguina peritonæo, & in oblongum oris angustioris sacculum intra scrotum expanso, etiam tum a dextris prociat. Thorace recluso, pulmões conspecti sunt punctis nigris, atroque sanguine variegati, posteriore autem parte quæ per membranas costis adhærebant, quadantenus inflammata. In cordis ventriculo dextero major, in sinistro minor fuit polyposa concretio cum grumoso sanguine. Cæterum ut per hujus cordis, & fere omnium reliquorum viscerum superficiei vasa lymphatica obvia fuerint, in mesenterio autem quam distenta, & seriem quasi globulorum representantia, aliæque istiusmodi, erit alibi opportunior scribendi locus.

6. Si causam quæris cur has duas Valsalvæ Observationes non alio, sed hoc reulim; dicam. Non alio retuli, quia novissima prioris agrotantis symptomata, posterioris autem dissectione capitis, non extant. Huc autem retuli, ut quæ in hernias viscera prociat, Valsalvam quoque, scires, non per disruptum, sed per laxatum peritonæum prociat conspexisse, neque intra hujus processum, sed intra sacculum ex laxato peritonæo efformatum. Nec supra (l), aut in quinque aliis quas tibi olim ex eo descripsimus (m), herniarum Observationibus quidquam posuit quod repugnaret, imo diserte nonnullam quam scripsit quæ consentirent. Quod si undecim a nobis alias propositas (n) releges; haud aliter invenies. Minime autem miraberis, ubi non tam illam persuasionem quæ plerorumque animos olim occupaverat, quam eorum Observationes attenderis qui, persuasionem illa seposita, accuratis inspectionibus stare maluerunt. Sic Arantius (o) vel in grandibus herniis nihil solutam vidit peritonæi continuitatem. Sic in ista, quæ huc attinet, Sepulchreti Sectione XXIX. in quam nihil de Arantio relatum invenio. Hildanus (p) leges, Riolanum (q), Barbettum (r), quibus addere potes Ruyschium (s), & Benevolum (t) idem confirmantes. Quin hic ultimus cum plus centies occasionem habuisset hæc indagandi, Ruyschius autem non minus sæpe; uterque tamen nunquam ruptum in herniis peritonæum fuisse, asseverant. At enim, inquis, Arantius non negat, posse disrupti; Barbettus autem si paulo infra (u) legatur, sic loquitur, quasi in hernia quam nunc vocant Cruralem, disruptum conspexerit. Non ait tamen diserte, se conspexisse. Diserte vero vidisse se, negant præter

(a) Advers. 4. Animad. 1. (b) De Viror. Organ. generat. intervientib. (c) Nov. Comment. Acad. Sc. Imp. Petropol. Tom. 3. Inter Physica Obs. 6. & Tab. 12. Fig. 2. (d) Eph. N. C. Cent. 5. Obs. 85. (e) Act. Erud. Lips. A. 1738. M. Jun. (f) Disert. de Intest. Compres. thes. 5. (g) Disert. de raris Herniis quibusd. (h) Disert. de Hernia incarcer. c. 3. (i) Disert. de Periton. ad §. 8. (k) n. 7. (l) n. 2. (m) Eph. 11. n. 20. V. n. 2. XXXIV. n. 7. & 5. XXXVIII. n. 3. (n) Eph. V. n. 19. XXI. n. 15. & 16. XXIV. n. 16. XXVI. n. 37. XXXIV. n. 9. 11. 15. & 18. XLI. n. 10. XLII. n. 34. (o) De Tumor. c. 48. (p) (q) (r) (s) (t) (u) Schol. ad Obs. 19. var. fig. (v) Obs. 1. (w) Advers. Anat. Dem. 2. n. 9. (x) Disert. 1. (y) Chirurg. P. 1. c. 7.

ter eos quos diximus, alii, in primis Mauchartus (x), qui in herniis quinque, *solicite ab se in hanc rem distinctis, non nisi dilatatum peritonæum, nunquam ruptum se reperisse*, confirmat, sed & Celeberrimis Chirurgis Parisiensibus, quos de hac ruptura consuluit, certe nunquam obtinisse, licet amplissima illis affluat occasio in hernias inquirendi. Et ne dubites, de mediocribus tantum herniis, an de magnis quoque consuluerit; paulo ante litteras ad se missas ab uno eorum memoraverat, quibus litteris refert, se in ramice *enormi* tres intestinorum Tenuium ulnas cum portione Coli iis diebus reperisse. Quod si majores forte requiris; Henslingius præter illud de quo dictum est supra (y), octo intestinorum ulnas, eoque amplius continentem, alterum dabit (z) a Cl. Hommelio acceptum, qui in bienni infante procidisse ex umbilico vidit omnia viscera chyloepa, peritonæo non rupto, sed tantummodo, ut Henslingius quoque in suo conspexerat, *extenso, atque relaxato*. Et ante illos Meryus (a) in sinistro scroto latere cujusdam senis, ad monstrum magnitudinem amplificato, Cæcum reperit cum initio Coli eo protractum a Tenuibus intestinis, quæ illuc omnia erant prolapsa, semipede supremo excepto per quem ventriculum quoque sic ab sua sede distinxerat, ut recta linea ab diaphragmate versus inferiora ventris descenderet; marsupium tamen, seu sacculus e peritonæo factus, intine hanc tantam molem complectebatur. Nec vero dicas, cum Meryus antea (b) ex Virgine haud parvam illam herniam proposuit, quæ præter duas Coli intestini circumvolutiones, Tenuium tractum quatuor saltem pedum continebat, idque habebat peculiare propter quod mirum est, vix ab ullo eorum qui de herniis postea scripserunt, fuisse commemoratum, ut ab sinistro inguine ad medium usque femur se extenderet; cum igitur hæc Meryus proposuit, nullam peritonæi complectentis injecisse mentionem. Facilis enim responsio est, in hernia cujus involucri non fecus ac quæ inerat Tenuia intestina, gangrana putrefecerat, non fuisse medentis occasionem explorandi, an illa comprehendisset peritonæum, quippe a putredine ipsa jam exesum potius quam ruptum. Idemque dictum puta ad Tacconi (c) Observationem in Virgine altera, cui non infra ligamentum, ut vocant, Poupartii, sed indidem unde prior, a multis jam annis propendens intestina repente demum extra herniam procliderunt, non tam rupto, quam ab eadem causa quæ ima herniæ integumenta exulceraverat, semicorrupto, ut veri simillimum est. Meum illis peritonæo. Quod sane in multo majori, quem idem exposuit, ramice solerter delineato (d) quidquid Coli, & Mesocoli inerat, videbis circumvestisse. Ingentes alias hernias & legi, & vidi, ut quam Teichmeyerus (e) *versus genua usque*, quam Schacherus (f), & quam Meekrenius (g) *ultra genua extensas*, & ne longior sim, quam Cl. Brebivius (h) *ad furas usque propendentem* exhibuere. Sed vix primus hoc dumtaxat tradidit (i), intestinorum Tenuium, Crasorumque, & mesenterii, atque omenti magnam in sua deliruisse portionem, alter an dissectuerit, nescio, duo certe reliqui non fecuerunt, ut neque ego, qui in Præfule generosissimo vidi tantummodo oscheocelem, quæ pictæ a Meekrenio longitudine quidem, non crassitudine impar esset, nec in eo ut quæ viscera continebat, nullo negotio in ventrem possent repelli; sed nulla ratione intra ipsum possent retineri.

7. Nulla igitur, inquit, Observatio est rupti in herniis peritonæi? Ego vero non id contendo; sed hoc tantum, multo quam olim putarent, esse rariore. Et quamquam Dionisius (k) asseverat, omphaloceleum fieri dumtaxat, si ruptum sit peritonæum, sequæ, cum omphalocelas plures & in vivis, & in mortuis aperuerit, nunquam agnoscere potuisse, intus a peritonæo convestiri, imo incisa cute, nullam præterea invenisse membranam; tamen paulo ante (l) vidisti, quantam Hommelius omphaloceleum conspexerat relaxatam, non ruptam, peritonæo comprehensam, & videre poteris, Paulum Barbettum (m) aliquoties in cadaveribus demonstrasse, etsi umbilicus cum subsequenter intestinis initar capitis virilis protuberaret, attamen peritonæum fuisse expansum, sed

nunquam disruptum, itemque Hottingerum (n) in mulieris omphalocele diametro pedem æquante, aut superante, cute detracta, peritonæum, cutis externæ crassitiem & densitatem emulans, locatu difficile, aperuisse, interne intestina firmiter annexa tenens, ut in puella, ab Schulzio (o) dissecta, adnatum plerisque locis habebatur omentum. Huc adde Ill. Halleri (p) Observationem, qui sicut in aliis herniis integrum peritonæi sacculum, ita in exomphalo quoque deprehendit. Quibus Observationibus spectatis, fortasse suspicaberis, in nonnullis saltem Dionisii dissectionibus peritonæum valde extenuatum, arctique cum integumentis connexum, ejus oculos fessisse. In hernia quoque Crurali Cl. Virum (q) lego in rupti peritonæi forata, omenti, Coli, atque Ileii portionem invenisse. Verheyenius (r) tamen qui inter primos hoc genus herniæ, & quomodo ea interclusa ægri moriantur, descripsit, illam fieri tradidit peritonæo ibi paululum dilatato, aut, quod rarissime contingit, rupto; & certe ego, ut tibi alias (f) scripsi, ejus ibi sacculum conspexi, sicut alii pariter, & in his Mauchartus (r), & si majorem sacculum requiris, apud eundem Mauchartum (u) Wernerus, qui ibidem sacculum dilatavit continentem præter longam omenti portionem, Ileii intestini partem longitudine duorum fere pedum cum dimidio. Sed de oscheoce, quæ & frequentior hernia est, & nobis hujus sermonis initium præbuit, si præcipue videndum est; dissimulare non oportet, in ea ipsa quæ huc spectat, Sepulchreti Sectione (x) Observationes extare duas, alteram Joannis Rudolphi Salzmanni (y), alteram Frederici Hoffmanni patris (z), quorum ille in ista hernia peritonæum ruptum ait se ostendisse, hic cum dilatatione externe tunice peritonæi internam ruptam & dilaceratam vidisse. Illud in his perraris, si cum cæteris prope innumeris comparentur, Observationibus desiderari potest, ut quæ causa utriusque herniæ fuisset, minime ignoraremus. Ut enim ingenue, quemadmodum soleo, me tibi aperiam; Fabricium nostrum (a), atque adeo quem sequitur ipse, Paulum Egnerum (b) quadatenus sequor. Scilicet in eo sequor quod ramicem de quo loquimur, vel dilatato, laxatoque peritonæo, vel rupto fieri, docuerunt, & in eo pariter quod cum fit rupto, una vice ac subito ab initio intestinum devolvatur, idque ob causas violentas dumtaxat, & tumor ingens, sive, ut Pauli verba alii vertunt, *immente magnitudinis sit*. In eo tamen sequi non possum, quod vel ubi hæc signa convenierint universa, ruptio semper sit agnoscenda. Meum enim assensionem cohibent tum antea proposita Observationes ramicum ingentium, & quos interdum violenta causa aliqua, ut casus ab alto aut produxerat, aut adauxerat, non rupto peritonæo; tum ratio, quæ, ut Mauchartus (c) ostendit, minime prohibet cogitare quæ subesse causæ potuerint aut a primordiis, aut postea tantæ illius membranæ ad dilatationem proclivitatis, ut subito factum id videatur quod multo antea dispositum fuerat. Quæ cum ita sint; tanto magis Fabricium laudo, quod membranam scripserit (d) hic aut dilatari, aut rumpi: ut plurimum autem dilatari, quanto magis huic ejus pronuntio esse posse locum, intelligo non modo cum herniæ sensim, ut ille censet, & pedentim, verum etiam cum subito sunt. Quod si nunc Salzmanni (e) proferas Observationem in Stabulario, bubonocèle antea laborante, cui ab ictu equi calcitrantis abdomini inflicto mox tota intestinorum moles uno veluti momento in scrotum prolapsa est, ut hoc alium fere ventrem magnitudine referret, abdomine interea valde collapsio, eamque altera, quam ille commemorat, Petiti Observatione confirmes, qui in simili ob eandem causam contingente casu, peritonæi sacculum solutum invenit; ego in utroque exemplo non ægre agnoscam, disruptum fuisse peritonæum; neque enim unquam in animum induxi, tantam huic membranæ firmitudinem, & robur inesse, ut per ictus ejusmodi rumpi nequeat, aut per alias violentas causas, quas propterea allatas esse voluissim in duabus illis, quas in Sepulchreto extare dicebam, Salzmanni, & Hoffmanni Observationibus. Neque enim per omnes causas quæ violentæ dicuntur, nec semper, imo rarius contingere id

cre-

credo. Inter eas, exempli gratia, nunc a multis recentiori, video equitationem: neque inficior, si assiduam nina sit, ramices a peritonæi extensione & facere, & augere posse, M. illius Servilii memor, de quo Livius (f) refert, dum inter concionandum, cicatrices adverso corpore pro Patria exceptas ostentaret, *adaperitis forte quæ velanda erant, tumorem inguinum proximis risum movisse* tum vero illum, hoc quoque quod ridetis, dixisse, *in equo dies noctesque perledendo habeo, nec magis me ejus, quam cicatricum harum, pudet, pœnitetque, quando nunquam mihi impedimento ad Rempublicam bene gerendam domi, militæque fuit*. Consul autem, & Magister Equitum fuerat, ac ter & vicies cum hoste per provocationem pugnaverant. Non erat igitur ejus ramex, sive is bubonocèle fuit, sive, ut Latini inguinum voce utebantur, oscheoce, non erat, inquam, ex istis ingentibus quos ab rupto peritonæo reperunt; magno enim fuisset adea gerenda impedimento, cum præter illum unum quem supra (g) ex Meekrenio memoravi, neminem legerim, cujus expeditas plerique actiones obtulicunt, onusque ejusmodi non impediret. Celerimum igitur atque longissimum calcariis incitato equo cursum, eumque creberrimum rumpendo aliquando peritonæo aptum credo; itemque non omnem saltum, non omnem ab alto casum, non omnem ictum, non omnem clamorem, non omnem denique conatum, cohibitamque respirationem, quæ laxare possint peritonæum, eidem quoque disrumpendo satis esse, existimabo. Et de hac controversia hæcenus. Nunc ad ipsum herniæ sacculum transueamus.

8. Sacculum ex laxato peritonæo non esse hujus processum, ut olim credebant, dilatatum, illum videlicet quem ex ipso ventris cavo vasa Spermatica excipere, & hæc comitatum, in Vaginalem demum tunicam se se expandere, arbitrabantur vel posteaquam Jo. Fernellius (b) dilucide adeo, pro eorum vaforum egressu perforari peritonæum, deducuerat. Sed verum vixit denique opera, & consensione diligentiorum Professorum, quibuscum ut Valsalva, & meæ in herniis Observationes conveniant, relictis quæ paulo fufius descriptæ sunt, plane intelliges. Vide enim Epistola XXXIV. (i) ut discrete neget, sacculum ex processu factum fuisse peritonæi; ut olim credebant, qui vasa Spermatica comitatur, imo huic processui, ajat, a superiore parte incubuisse. Itaque in prima (k) de tribus quas supra tibi descripsi, Observationibus cum omentum intra proprium sacculum, ex peritonæo factum, fuisse scripsit, nimirum proprium dixit, ut a processu qui communis etiam vasis fuisset, continuo distinguere. Ego vero sæpius rem ita proposui, ut interpretatione non sit opus. Sic Epistola V. (l) sacculum fuisse, scripsi, proprium quidem, sed tamen extra vaginam, qualis ea cunque est, Spermaticorum vaforum. Sic XXI. (m) sacculum, & initio & progressu ad internum fuisse eorum vaforum latus, inter membranam hæc obducuntem, & illam tunicam quæ cum musculo Cremasteri admittit. Sic XXXIV. (n) sub hæc ipsa tunica, ab eodemque interno vaforum latere, sacculum descendisse; & prope hujus orificium illa adisse, non ventris cavum, sed peritonæum. In alio autem (o) fuisse prope externum latus eorum vaforum. Sunt quidem inter mea, & aliorum, atque adeo ipsius Valsalvæ observata nonnulla discrimina. Ipse enim sacculum, ut dictum est, vasis incumbens, vidit, in cadavere a parte superiore, id est in homine stante anteriore, quod Viri quidam Eruditissimi perpetuo observari, scribunt. Mihi vero a latere modo interno, nonnunquam externo occurrit eorum vaforum. Est etiam qui viderit, si recte intelligo, inter sacculum, & vasa Cremasterem musculum interjectum: quod multo rarius puto; certe aliter, ut dixi, inveniri. Verum hæc discrimina ut Chirurgis scitu non sunt inutilia; ita non faciunt, ne ego cum Valsalva, uterque autem cum diligentioribus Observatoribus in eo quod præcipuum est, conveniamus, videlicet aliud esse herniæ sacculum, aliud processum peritonæi: quamquam in hoc ipso processu agnoscendo non levis hoc tempore inter Anatomicos est controversia. Nam quod Fernellius cum fieri illum ex interiore peritonæi tunica negavit, ex altera saltem, exteriori, compingit, docuit, qui possint illi accipere qui exteriorem hanc non agnoscunt? Quo tamen in numero haud satis scio, cur Doctus Vir Swammerdamium ex ejus Notis in Hornii Prodromum, Ruyfchium ex Observatione 98. & Justum Schraderum ex II. Dec. Ob-

servatione 5. reponere videatur. Sed qui revera pro ea tunica cellulosa telam proponunt, quando hanc saltem cum vasis Spermaticis in scrotum descendere, non inficiantur, satis interea dant nobis, ut, hac lite nunc seposita, istud, quidquid est, quo vasa illa comprehenduntur, involvens certe, & a peritonæo procedens, vaginæ illorum, hujus autem processus vocabulo designare possimus. Nec Valsalva ipse cum processum dixit peritonæi (p), ab aliqua ejusmodi explicatione longe alienus, ut opinor fuisset. Nam etsi hac in re non idem semper adolescentem me docuit; memini tamen cum denique traderet, nec tendinem musculi Obliqui Externi, nec peritonæum qua vasa spermatica ex abdomine proprie dicto scrotum versus descendunt, nec illum, inquam, tendinem in veri annuli formam perforari, nec peritonæum in vaginam excavari, quorum utrumque plerique crederent; sed filamenta tantum nonnulla hinc, & illinc demittere quæ super ea vasa traducantur, nec aliam esse inter peritonæum, & Vaginalem tunicam connexionem. Unde etiam intelligis, processum illum non quasi canalem quandam perpetuum spectasse, qui primum vasa illa complexus, deinde se ipsum in Vaginalem tunicam explicaret. Nec sane ignorare poterat, tunice hujus cavum non multum fere supra testiculum attollere, non modo anatome id monstrante, sed & Swammerdamio in *Miraculo Nature* discrete admonente, eam tunicam non se se multo ultra testiculos extendere. Quod secutus Blasius (q) inde ea deduxit quæ, ubi de Hydrocele agemus, infra (r) memorabimus: interea in Sepulchreto (s) videre poteris. Quo sicut illa relata sunt, ita etiam referri decebat quæ Swammerdamius indicato loco, & quæ cum eo Justus Schraderus (t) de alio omnino, siquando est, peritonæi processu, alio autem herniosorum sacculo observant. Quid ergo est, inquit, quod narrat Boscius in Sepulchreto (u), ab se ostensam in puero, enterocèle laborante, *vaginam testiculo a peritonæo factam, ita dilatatam in suo exortu usque ad finem & fundum, ut duo digiti facile ingrederentur*? Crederem forsitan perraro aliquo casu disruptas hinc imam sacci herniæ partem, inde summam Vaginalem tunicam in unum tubum coaluisse, aut, quod in singulari quadam sua ejusmodi Observatione suspicabatur Meryus (x), ut quadrupedum plerisque, ita ei puero vaginam istam a ventris cavo ad testiculum perviam obtigisse; crederem, inquam, nisi Boscius id sæpe se vidisse, & ostendisse, affirmaret, putaretque omnibus facile esse visu. Cum vero cæteris, nedum mihi, non modo id non appareat, sed longe aliud evidentissime deprehendatur; reliquum est ut hallucinatum esse hominem, & eos qui aderant, suspicemur, extenuatione fortasse, & adhesionem utriusque tunice cum inter se, tum ad testiculum tanta, ut hic extuberans intra sacculum herniæ in eo omnino esse videretur.

9. Sed cavendæ magis in vivis hallucinationes aliæ, ne intestinum, aut omentum extra ventris cavam prolapsum falso existimemus. Multa sunt quæ ejusmodi errorem incautis objiciant, ut testiculus qui serius, sicuti nonnunquam accidit, in scrotum descendens, inguen attollat, non facile tamen pro bubonocèle accipiendus, nisi forte ab iis qui Brechteldium (y) haud imitatur, scrotum antea, præsertim in pueris, non explorent, nec deficientem in eo testem animadvertant: ut glandula aliqua inguinalis in eam formam aucta quam Epistola XXXI. (z) in Lano descripsi, aut multæ cum sero coagulato, quales deprehendit Reiselius (a): ut alia tandem, quæ ne imponant, cætera sunt diligenter spectanda, & inquirenda. Eram Venetiis, cum mulier Chirurgos, & Medicos, in his Santorinum advocavit, ut quid esset quod sibi in altero inguine prominebat, dignoscere, bubonocèle verita propterea quia repente apparuerat inter conatus adstricti ventris exonerandi. Herniæ aberant signa omnia; nisi quod statim atque eum locum manu tentarent, mulier ructus emittebat. Quæ postquam ob id unum Medicos animadvertit animi pendere, risit, & quamcunque mei corporis tentetis partem, mihi, inquit, ructus illico prodire, audietis. Periculum continuo faciunt, & continuo ructus prodeunt. Hæc mihi, alisque Amicis cum Santorinus referret, cæteris ut inauditum mirantibus, rarum est, inquam, non inauditum. Legere enim memini apud Ertmullerum (b), *rarum esse quod Bartholinus in Actis Med. Hafniens. p. 199. & Rhodius C. 2. Obs. 52. observavit*, ab externa frictione corporis quocunque in loco ructus continuis. Sed ne idem tibi quod Amicis illis meis accidit, si for-

(x) Differt. supra ad n. 3. cit. c. 2. (y) n. 3. (z) ad §. ibid. cit. (a) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1701. Obs. 5. (b) Ibid. Obs. 4. (c) Differt. supra ad n. 3. cit. (d) Tab. 3. Fig. 1. (e) Differt. de Exomphalo inflamm. §. 11. (f) Differt. de Morb. a sua intest. p. n. c. 3. §. 3. (g) Obs. Med. Chir. Posth. c. 5. (h) Act. N. C. Tom. 3. Obs. 25. (i) Differt. cit. §. 18. (k) Cours d'Operat. de Chir. Demonstr. 2. (l) n. 6. (m) Sect. hæc Sepulch. 29. Obs. 1. (n) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 231. (o) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 126. (p) Opusc. Pathol. Obs. 29. & seq. (q) Commenc. Litter. A. 1745. Hebd. 24. n. 1. (r) Anat. corp. hum. l. 1. tr. 2. c. 7. (s) Epist. 34. n. 15. (t) Differt. supra ad n. 3. cit. c. 4. in fin. (u) Dis. de Epiplo Enterocèle Crurali. (v) 29. l. 3. (y) Obs. 3. (z) Obs. 14. §. 3. (a) Pentateuch. l. 1. c. 24. & de Chirura. Operat. ubi de Intest. Hernia. (b) De Re Medica l. 6. c. 65. (c) Differt. supra ad n. 3. cit. c. 2. (d) De Operat. loco indicato. (e) Differt. de Horn. Velic. thes. 21.

(f) Hist. l. 45. (g) n. 6. (h) Physiol. l. 1. c. 7. (i) n. 5. (k) n. 2. (l) n. 19. (m) n. 15. (n) n. 9. (o) n. 18. (p) Epist. 31. n. 5. (q) Obs. Anat. in Hom. ubi de Teste. (r) l. 1. c. 32. (s) Sect. hæc 29. Obs. 2. (t) Dec. 2. Obs. Anat. Med. 5. (u) Sect. cit. Obs. 5. (v) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1701. Obs. 3. (y) Vid. apud Bartholin. Act. Med. Hafn. Vol. 1. Obs. 106. (z) n. 19. (a) Eph. N. C. Dec. 2. A. 7. Obs. 12. (b) Prax. l. 1. §. 4. c. 2. in Prognost.

si forte indicatos ab Ettmullero Auctores in re perrara malis infpicere; in Rhodio quidem feliciorum indicantis memoriam facile desiderabis, sed in Bartholino operarum errore agnito, pag. 199. pro 194. ponentium, reapse inveniunt Observationem viri, qui a leni fritione cuspumque corporis partis statim in tam enormem incidebat eructationem, ut non prius desineret eructare, quam cessaret frictio. Est autem ea Observatio CII. Partis I. Volum. I. laudatorum Actorum, Brechteldio Reg. Matris Medico auctore.

10. Sunt & alia non æque perraro, sed tamen non creberrime occurrentia, nec modo ad inguina, verum etiam ad umbilicum, & scrotum, quæ in herniis dignoscendis morari Medicos possint, & nonnunquam decipere. Sic memoria teneo, in Serenissimo quodam Principe, flatibus quoque inter cætera, & hypochondriacis ventris distentionibus obnoxio, relatum mihi ab ejus Medicis, præstantibus alioquin Viris, paululo supra umbilicum a finisterræ parte esse epiplocelem: quem ego locum explorans, etsi laxam quandam percepi, levemque prominentiam circuli ambitu, cujus diameter tres saltem digitos transversos æquaret; tamen cum subesse nihil inæquale sentirem, Princeps autem ipse non ea interroganti responderet quæ Medicorum confirmarent judicium; malui assensionem sustinere, nec me poenituit, cum aliquot post mensibus ex mortui ob longe aliam causam, ad me missa diffectio, certior factus sum, deceptionem accidisse, a Cel. Heistero (c) indicatam, scilicet nihil ibi sub cute præter pinguedinem fuisse cellulas distendentem membranz Adiposæ, non a peritonæo, quod nullo modo laxum erat, extrorsum compulsa, sed propter majorem eo in loco suæ pinguedinis copiam eo in loco prominentis: quo de genere tumorum ad te alias (d) scribam; Sed ut bubonocelam aliquando mentiantur, ostendit Schulzii (e) Observatio in viro in quo tanto facilius fuisset error, quod cum esset macilentus, nemo tantam pinguedinis copiam vasis Spermaticis adjunctam putasset. Et quamvis præpinguis esset alter quem diffecit Petschius (f); tamen in proclivi deceptio erat propterea quia pinguedo in substantia peritonæi cellulosa collecta, per annulos ad scrotum, non in utroque, sed in dextero dumtaxat latere ea copia progrediebatur, ut ibi oscheoceles esse videretur. Porro in scroto, ubi cæteroquin haud raro cum multiplex simul est hernia genus, alterum ab altero obscuratur, ut cum multa circumjecta aqua prohibet inclusum omentum, aut intestinum, aut ambo digitis tentando internoscere; accidere præterea nonnunquam potest, ut vel simplex genus aliquod multiplex esse, aut non quale est, esse existimemus. Quis enim in illa exempli causa, Vesalii Observatione, quam in Sepulchreto quoque (g) habes descriptam, cum scrotum amplum adeo, & grave animadverterit, quis, inquam, ex sola illaplasi omenti parte esse, putasset, eo usque aucta, ut quatuor aut quinque librarum pondus penderet? Aut quotus quisque; ut ad recentius exemplum veniamus; facile deceptionem vitasset (in quam Gunzius ipse (h) laudabili ingenuitate se incidisse, fateatur) ut cum angustiorum ad inguen, in scroto autem magnum, amplumque cum rotunditate tumorem videret; non ibi intestini quidquam, sed omentum solum, quod inventum est crassius factum, & inferius replicatum, concludi, existimaret? Aut quis denique cui sint incognitæ Observationes, non sæpe obvia, præstantium Virorum quos tibi Epistola XXXIV. (i) laudavimus, cum videat, ad plerumque alia intercepti intestini symptomata, illud non accedere ut via intestinorum intercludatur, affirmare audeat, aliquam horum interceptam esse partem sive ad umbilicum, sive ad inguen, sive in scroto, ut alii, sive ad femoris initium, ut nos deprehendimus (k); & contra, tametsi recrementa nulla transeant, nihil tamen, nisi partem aliquam parietis intestini, esse interceptum, ut nos olim ad inguen vidimus (l), nuperrime autem vel inferius Chirurgus Experientissimus Antonius Benevolus (m). Sed & postea fortasse erit alia in dignoscendis herniis faciles hallucinationes indicandi locus.

11. Nunc enim aliquid attingendum est de iis quæ attinent ad prolapsi in scrotum intestini repositionem, ut satis a me tibi fiat, querenti, num Valsalva a clysterum usu tunc abhorreret? Ille vero, quod ex scripto quoque ejus Consilio intelligitur, sedulo curabat, ut debebat, ne quid reponendis intestinis obstatet, imo ut omnia, quo

ad ejus fieri posset, reducturis in ventrem cederent. Itaque ubi hernia mollior aliquanto facta esset, quod mataxis appolitis crudi filii præstabat, calida permadentibus in qua flores chamæmeli, & meliloti, femina autem lini, & feni græci incocta essent, quarta quaque hora mutandis (sic enim tunc Bononiæ solebant, sæpius tamen mataxis lixivio imbutis; hic spongiis utuntur in calentem amurcam demerfis) tunc intestinorum repositionem blanda manu moliebatur, jejuno ægro, neque alio hujus corporis situ, quam eo quem, ut in more est, jam inde a principio imperabat, tempus insuper impellendi observans quo jussus æger expirationem longius producebat. Sanguinis autem, præsertim ubi hujus nimia copia esset, missiones antea præceperat, cum consueta alia, in quibus & clysteres intelligo, auxilia laudaverat, & parcum tum semper cibi, potusque usum, iis quæ status gignunt, vitatis, ad hæc iusculum emolliens mane, & sero, oleum autem ex dulcibus amygdalis recens expressum, interdiu ex cochleari per vices sumendum sic ut ne plus duabus uncis quotidie absumeretur. Postquam intestina reposerat, ne forte relaberentur, eodem corporis positu, aptoque subligari cavebat, ad quod assutum frustum esset mollis spongiæ, tres digitos longum, totidem latum, unum crassum. Ubi vero per intervalla re sæpius tentata, repositio non succederet, nec gravia interim symptomata aliud capere consilium cogerent, ipse quidem potius quam incautum vexando inflammationem crearet, tum vitare, tum fervare ægrum jubebat cætera omnia quæ dicta sunt sive exteriori, sive interiori molliendi causa in usum trahenda, sed cum iis præsertim toties inculcatum decubitus modum, id est ut altior esset pubes quam reliquus venter; sic enim per se naturam interdum remanere. Contraxi tibi in summam consilium totum, non quod plerumque non sint omnibus communia; imo propterea quod sunt, ut plane intelligas, cum in hoc conveniant quod ratio indicat, ne quidquam in ventre sit quod obstat, utque omnia cedant regressuris intestinis, minime apparere, cur olim, & nostro æquam tempore aliqui a clysteribus tunc abhorreant, per quos sine irrimento quidquid ea via potest ex intestinis subducatur. Nam quod ajunt, descendere clysteres ad scrotum, & ratione ponderis sui intestina magis deprimere, atque herniam augere; id locum fortasse haberet ubi proxima Recto pars Coli in scroto illaplasi esset, aut ubi inverso jam peristaltico motu, omnia ex Recto in reliqua intestina raperentur. Quorum neutrum ab iis dici potest, non primum, quia Colon raro exire in scrotum, fatentur; non alterum, quia cum jam pessima symptomata supervenerint; tunc denique clysteribus ipsi quidem uti permittunt.

12. Ubi vero ad ferrum veniendum est, quæ potissimum ratione utendum sit, cum Valsalva, cujus præcipue scire aves consuetudinem, scriptum non reliquerit; nihil est causæ, cur iis quæ satis ab aliis tractata sunt, immoremur. Nonnulla dumtaxat quæ illius, aut meis diffinitionibus confirmari possunt, paucis attingam. Et primum quæ repositioni maxime officiant, orificii facculi angustia, & durities, & prolapsorum aut ad facculum, aut inter se annexio ut aliquando occurrerint nobis, certa loca ostendunt Epistolam V. (n), XXI. (o), XXXIV. (p), & hujus quoque Epistolæ ipsius (q). Mutationes deinde quas in partibus offendimus aut intra facculum, aut prope facculum positis, animadverte. In his adnotatione maxime dignum est quod Valsalva vidit, ut Epistola habes II. (r), testis videlicet ob veterem, ut videtur, epiplocelem, in Juvene firma alioquin valetudine uso, & annos nato circiter viginti duos, totus in membranofum corpus mutatus. Leges quidem in Sepulchreto (s) testes exiguis, compressos, flavescens, nuscis morschate magnitudinem vix æquantes cum hernia inventos, sed magna, neque ex omento solum, sed ex mesenterii quoque, & ilei intestini non mediocri portione facta, eaque ante viginti annos, & in septuagenario. Et Senex erat pariter is cujus testem, hernia proximum, altero minorem, nec paulo offendi, eundemque intus ex fusco rubentem, quemadmodum Epistola scripti XXIV. (t) Hernia tamen illa erat enterocele, & propter inflammationem lethalis fuit; ut appareat quo ille testis color sit referendus. Hæc igitur duæ Observationes testiculorum magnitudinem ob prolapsi in scrotum partes interdum minui, ostendunt; prima autem illa, aliquando structuram ipsam penitus mutari, demonstrat. Ex quibus ut potes intelligere,

gere, non semper esse verum quod aliqui pronunciant, sterilitatem ex herniis metueri, frustraneum esse; ita conicere etiam potes, herniosos interdum steriles fieri non modo quod vasa, ut Boerhaavius (u) docuit, sacco adnascantur, sed etiam quod præter vasa testes ipsi pondere & mole illaplasi non solum intestini, verum mesenterii quoque, & nonnunquam ipsius dumtaxat omenti diutius premantur.

13. Iis autem quæ in hernia faccum procidunt, partibus quæ aliquando mutationes contingant, & quam facile & quam multos, magnosque errores hæc neglecta animadversio in medendi arte parere possit, scite admonuit Gunzius (x) ubi suam in omento deceptionem estatus. Ad cujus Observationem omenti, in hernia crassioris, & pinguioris facti, antea habitas Sprogelii (y) in vivo, Maucharti (z) in mortuo Observationes adjunges. Et ne omentum solum mutari, credas, illam quoque addes, quæ refertur a Lavatero (a) intestinum papyri madida instar mollium; ut minus mirari oporteat, si, accedente præsertim suppuratione, aut gangræna, rumpantur, & quod continent liquidarum fecum, in hernia cavum effundant, sique hæc aut aliam hernia speciem, aut abscessum mentiat, ut Cel. Heisteri (b) in vivis, mortuisque observata commonstrant. Verum ut in mutationibus subsistam quas Valsalva, & ego prolapsis partibus accidisse, conspeximus; eas ex Epistola intelliges XXXIV. Nec intestinis solum dico, quæ ab interceptione passim aut inflammata, aut nigra, & gangrænosia inveniunt; sed omento quoque, & mesenterio. Illud enim duplicatum, & in corpus teres conformatum leges (c), quod nisi incidendo potui quid esset, intelligere. Mesenterii autem portio ut quasi carnea Valsalvæ (d) apparuerit, ibidem cognosces. Ea, inquam, portio, quæ, si duplicatum intestinum paulo altius descendat, ipsum intra facculum sequatur, necesse est; facilius enim propter pinguedinem, qua multa est prædictum, laxari potest, quam dirumpi. Nunquam autem laxius esse, quam in herniis, intelligitur. Mollioribus atque laxius mesenterii in hernia intestinali frequenter cernitur, inquit Whartonius (e). Uique adeo enim laxatur mesenterium, ut permittat intestinum sibi appensum, quod intra orbitam suam coercere debuerat, in scroto delabi. Sed is quem sæpius tibi, & merito laudo, Benevolus (f) mesenterii laxitatem semper, nedum frequenter esse in istis herniis, indeque primam harum esse originem, digna sane quæ legatur Dissertatione ostendendum suscepit. Quo spectat Observatio, in Sectionem hanc Sepulchreti (g) relata, Hoffmanni patris, vires emplastris sui magnetici, lumbis adhibitis, prædicantis ad retrahenda ex herniis intestinalia. Quæ si tantæ sunt, quantæ ad pervadendum, quod perdifficile est intellectu, crassitudinem lumborum, imo eorum vertebra, & corroborandum mesenterium requiruntur; miror, cur filius ubi de herniarum curatione non uno in loco scripsit, nullam ejus, quod meminerrim, emplastris mentionem fecerit. Cujus tamen cum Ettmullerus (h) confirmet, effectum se vidisse mirabilem; rem, si tibi sic placet, in medio relinquam, præsertim cum siquis velit herniosos corroborantia, & adstringentia, lumbis, ubi se annectit mesenterium, apponere, ei Benevolus non repugnet. Cæterum a Benevolo visa non credo quæ multis ante annis scripserat Cl. Rostius (i), cum in hernioso laxum mesenterium invenisset, nempe viri simillimum esse, hernias intestinales hoc primitus requirere, quoniam intestina eidem mesenterio firmiter alligantur, adeoque e sede sua desistere nequeunt, nisi mesenterium ob quascunque violentias prius cedat; neque credo, ad Præcl. Brendelii manus Benevoli Dissertationem pervenisse, cum eandem magis confirmavit sententiam (k). Ad Rostii enim Observationem, aliasque Benevoli, illamque præsertim in Sartore, cujus magnæ enteroceles majorem partem non jam intestina, sed mesenterii expansio faciebat, habes a Brendelio præcipue quas adjungas, asseverante, cum aliquoties id inquireret, mesenterium ab ipsa origine immodice semper laxatum, & quasi distentum invenisse, imo in bajulo ipsum ibi peritonæum a magnis vasis sejunctum, mesenterium autem in illo atque in altero ultra fidem distentum, ut certe in altero ubi quam minimum esse solet, iis locis trium quatuorve spirituum esset. Et ne forte existimes, a prolapsorum intestinorum Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

pondere hæc fieri, ut lumborum dolores; Rostius admonet, qui a quassante equitatione hernias contrahunt, sentire ordinarie prius tensionem dolorificam ad lumbos, argumento haud obscuro afflicti, tensi vel diducti, ibi affixi mesenterii. Quinetiam animadverte, attentum Medicum Riedlinum (*), cum futuræ enteroceles signa apud Auctores non inveniret, ex sua quadam Observatione multo antea indicasse ex quibus id suspicari possumus; in iis autem primo loco posuisse lumborum dolores. At enim, inquis, certum est ab Eximio Anatomico repertum esse in oscheoceles mesenterium, quod obfusi, funiculi simile, tensum, durumque una cum intestinis descendat. Quid ergo laxum, aut debile in ejusmodi mesenterio fuit, cui hernia originem imputemus? Ego vero ex te quæram, num eo tempore quo descendit, existimes sic tensum, durumque fuisse, nec illi postea id accidere potuisse quod mihi in ipso intercepto omento conspectum esse, dicebam, aut quod in eodem durioris, & quasi scirrhusi laudatis Observationibus Maucharti, & Sprogelii adnotaveris? quæramque insuper, quomodo, nisi laxius fuisset, cum aliquot Tenuium intestinorum ulnis potuisset in amplissimam herniam descendere? certe enim secundum naturam se habens nequit deorsum adeo pervenire. Cave putes, hæc a me Benevoli potius, quam veri, quantum ipse intelligo, tuendi studio, esse dicta, præsertim cum, quod ille faciebat, non omnia mesenterii, sed aliquid peritonæi quoque, & annulorum laxitati cum Rostio, & Brendelio tribuam.

15. Ex iis quæ attigimus, & multo etiam magis ex illis, quos indicavimus, Epistolarum locis, in memoriam redieris, quid de observatis a nobis Bubonocèle, Oscheocèle, Omphalocèle, & Merocele, & de partibus tum prolapsis alias acceperis, ut non sit opus hic iterare. Juvat potius de duabus illis ultimis herniis aliquid adjungere. In Omphalocèle est, quemadmodum a nobis, ab aliisque repertum est, omentum videtur, sicut ejus sedes indicat, debere concludi: non rarissime tamen abesse, sed Jejunii intestini, aut Coli partem sine illo occurrere, & sua, & Arnaldi, ac Petri Observationibus ostendit Rostius (**), ubi & alia animadvergit de vomitu pro vario intercepto intestino citius, seriusve adveniente, nec eandem materiam ejiciente, quæ te legisse non poenitebit. Merocele autem afflictorum si forte diffinitiones, quas addas Sepulchreto, desideras, in Observationibus invenies quas supra (l) indicavi, prætereaque apud Genesium (m), præsertim vero apud eum qui de hac Femorali, sive Crurali, dicta Hernia Dissertationem vulgavit, Cl. Daniele Koch (n). Quas, illasque Observationes inspiciens, cum plerumque in viris habitas fuisse, animadverteris; minus fortasse tibi placebit quod ab Erudito alioquin Medico scriptum est, non facile viros huic herniæ obnoxios fieri: quamquam mihi, ut verum fatear, necdum, nisi in foeminis, accidit, ut eam viderem. Rariores quædam, seu locum spectes quo fiat, seu partes, quæ procidunt, nec Valsalva, nec ipse conspexi. In illis ea est quæ contingit qua Obturator, ut vocant, nervus cum vasis ejusdem nominis prodit, quem nervulum haud scio, cur ille idem Eruditus, quem modo designabam, Medicus cruralem posteriorem dixerit, quo cæteri vocabulo omnium crassissimum significant nervum. Cæterum de hac hernia consules qui in Commercio Litterario (o), & apud Platnerum (p) laudantur. Est hæc multo rarior quæ a Christophoro Henrico Papen (q), sicut in cadavere invenerat, diligenter descripta est, maxime lagenæ oblongæ simillima, ab dextero ani latere incipientis, & intra faccum, peritonæo continuatam, Tenuia intestina cum mesaræo valde elongato, & initio Coli includentis: quæ viscera cum per incisuram ischiadico sacram, ut recte is censet, ad quem Observatio missa est, Cel. Hallerus, deorsum procidissent; nos Hernia Dorialis nomen illi potius alteri, siquando se prodit, reservabimus quam Paulus Barbettus (r), ut bene Auctor novit, & tu in Sepulchreto quoque (s) habes, his verbis indicaverat: experientia me docuit, peritonæum etiam in parte posteriori versus dorsum posse dirumpi, & ibi herniam efficere.

In illis autem herniis in quibus partes spectantur quæ raro prolabantur, Cystocèle est. Quæ de hernia cu n alias (t) ad te scribens mentionem sic fecerim, ut in mu-

(c) Infr. Chir. P. 2. S. 5. c. 120. n. 1. (d) Epist. 30. n. 24. (e) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 225. (f) Syllog. Anat. Obs. 5. 89. (g) Sect. hæc 29. Obs. 15. §. 3. (h) Prolus. de Entero Epiplocele. (i) n. 16. 17. (j) Ibid. n. 15. (k) Ibid. n. 18. (l) Due Relaz. Chirurg. Relaz. 2. (m) n. 2. (n) n. 15. (o) n. 5. 9. 13. (p) n. 5. (q) n. 20. (r) Sect. hæc 29. Obs. 15. (s) n. 16.

(u) Praelat. ad Infr. §. 641. (x) Prolus. supra ad n. 10. cit. (y) Eph. N. C. Cent. 7. Obs. 70. (z) Differt. supra ad n. 3. cit. c. 2. in fine. (a) Differt. ad eund. n. 3. cit. n. 23. (b) Differt. de Hernia Incarcer. §. 10. & 35. (c) n. 9. (d) n. 5. (e) Adenogr. c. 11. (f) Differt. 1. (g) Obs. 14. §. 3. (h) Prax. l. 1. S. 12. c. 1. (i) Act. N. C. Tom. 2. Obs. 178. (j) Profr. de Herniar. Natalib. (k) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 150. (l) Obs. supra ad n. 13. cit. (m) n. 7. (n) Eph. N. C. Cent. 7. & 8. in Append. ubi Conf. Epid. Hungar. An. 1713. in Septemb. (o) c. 2. §. 5. (p) A. 1733. Hebd. 47. n. 1. (q) Differt. de Hydrocel. §. 3. not. 7. (r) Epist. de Rupenda Hernia. Dorali. (s) Chirurg. P. 1. c. 6. vers. fin. (t) Sect. hæc 29. Obs. 8. (u) Epist. 41. n. 12.

mulieribus analogo quodam modo, videlicet non per inguen procidente vesica, accidere indicaverim; nunc addam, in ipsis quoque per inguen aliquando prolabi, ut duar Observationes docent saepius laudati Benevoli (u). Quorum altera cum ostendat, quot annis ante id vitium coepisset, non esse igitur patet a prima conformatione, quemadmodum Meryus (x) existimabat; praefertim quando nec tot aliarum quas tunc ex viris indicavi, ullam esse, memini ejus initium a primordiis usque apparuisse videatur. Qui stat igitur, inquit, ut vehicam seu plenam, seu vacuum tum sua vincula, & nexus, tum peritonaeum, & muscoli abdominis per alterum inguen exire sinant? Legebis ingeniosi Viri Jo. Salzmanni Dissertationem (y) ubi ad ea quae Petitus (z), ipse quoque ejusmodi herniae observator, ad has infirmas difficultates protulerat, alia insuper addit, per quae eadem minoris facias, illamque in primis quae a peritoneo obstante repetebatur, hic memorato a multis, non advertentibus, vesicam non inesse, sed subesse peritoneo. Quas omnes etsi planissime dissolvere non liceret; non tamen haec hernia negari posset, quam non modo alias indicatum signum evidentissime pathognomonium, sed & in mortuis inspectiones confirmarunt, tunc pariter indicat, ut nostri Jo. Dominici Sala apud Bartholinum, & Ruyfchii ipsius; ut mirum sit, fuisse qui anno demum 1713. hunc morbum pro novo haberent, & alii ab alio, sed circa illud tempus primum observatum esse, contenderent: quantum olim etiam Platerus, ibidem a nobis memoratus, statim atque ex scroto in ichuria vesica distento, vulneratoque urina profluxit, hanc cognovit herniam, diserteque descripsit. Et ne forte credas, eam contentione ex parte saltem ad muliebris vesicae herniam attinuisse, simul cum vagina prolapsa; fac memineris, hujusmodi Observationem a Peyer (a) annis ante Ruyfchianam aliquot fuisse vulgatam, & dissectione comprobata, quam etiam in Sepulchreto (b) habes. Hanc aliorum postea & nominatim Virorum Clariss. Bassii (c) & Burgassii (d), Observationes in demortuis secuta sunt. Meryus qui virilis vesica descensum in scroto per cadaveris incisionem praclare confirmaverat (e), muliebris herniam in viva dumtaxat raro exemplo in perineo deprehendit (f). Atque haec non ad iteranda, sed ad praeficienda alibi indicata illustranda, & absolvenda ea quae attinent ad Herniarum Vesicae historiam, dicta sunt. Vel rariorem Cystocoele, est Hystricoele per sectionem patefacta. Praeter illam tamen hujus Observationem quae in Sepulchreto (g) relata est, pervulgatae sunt duae in Doringii Epistola ad Hildanum, quarum priorum, ex Sennerti Institutionibus exscriptam, si perleges, illud quoque animadvertes in tanta hernia, eaque ob ictum orta, peritonaeum, quantum Sennertus visu judicare potuit, integrum persistisse. Verum etiam sine dissectione quis dubitare posset, utrum in tribus aliis herniis fuisse, quarum duas ultra media femora, tertiam ad genua usque propendentem memorarunt Carolus Sponius (h), & Fridericus Ruyfchius (i), quando feliciter natos esse foetus legerit, hernia ab obliterata elevata, quod Ruyfchius vidit, aut post illos editos, herniam valde subfuisse, & sine prioribus internis motibus remanuisse, existimaverit, quae, aut alia ejusmodi indicia Sponius attenderit, necesse est. Huc hernias adde quas alia faciunt prolapsa viscera, ut deprehensus ab Ruyfchio eodem (k) lien in peritoneo dilatatus, ut ventriculus, ejusmodi Observationes duas, quamvis dissectione non comprobata, minime tamen obscuras, commemorat Petrus Kirschbaum (l); ut jecur, per anatem in hernia inventum ab Salomone Reifselio (m). Has, aliasque hujusmodi hernias, si viscus quod continent, spectaveris; ab eo denominabis, ut suam Reifselius Hepatocelelem. Si eam in qua contigerint, abdominis sedem; ab hac vocabis. Nam si Ventris, aut Ventralem, ut faciunt nunc plures, herniam dices; recte quidem dices; sed cum aliud nihil praeter genus nimis late patens indicares; de sede etiam ininterrogari posses, quod non posses, si hanc a primo significasses. In sede autem definienda noli credere te peccaturum, si forte Umbilicalem voces quae non ipso in annulo umbilici sit, ubi vix memini in aliis quam in

aliquo tenello infante, vidisse. Satis sit tibi, frilla fuerit prope umbilicum; socios enim, nec eos vulgares, habebis qui vel sic acceperint, atque accipiant. Sedes autem tot esse possunt, quot sunt abdominis regiones. Sic, exempli causa, sub costis spuris in hypochondrio dextero Lavaterus (n) herniam vidit quae partem intercipiebat Jejunii intestini. Sic alii in aliis, quas omnes continuo is nominat, indicat, regionibus; ut mirari subeat, Rollium (o) ad hypochondria, & ad pubem hernias negasse; nullum enim, quod sciam, inquit, exemplum dari potest, quod illa loca valiter affeeta unquam visa sint. Namque ut alia forte ejus memoriae tunc non occurrerent exempla, qualia nunc obvia sunt, ut vel ipse bis (p) per anatem hernias ad pubem examinaverim; at saltem loci Hippocratis (q) oblitisci non decebat, quem ejus Enarratores perpenderant, utinam satis feliciter, & omni ex parte, Franciscus Vallesius (r), & Hieronymus Mercurialis (s): *Pectus ruptiones, quae quidem circa pubem fiunt, ut plurimum statim sunt immixtae: quae vero paululum supra umbilicum in dextra parte, haec dolores sunt, & anxiose, & febris comitantur inducunt, velut etiam Pistraco accidit.* Hunc locum productum videbis in Dissertatione (t), quam docte, periteque scripsit Vir Cl. B. Ignat. la Chausse.

15. Jam illud sequitur, ut quando de legitimis herniis scripsimus; de spuris quoque, id est in quibus nullius Partis ex ventre prolapsus sit, sermonem habeamus. Sunt haec Hydrocele, Pneumatocele, Haematocoele, Cirfocele, Steatocele, Sarcocele, Spermatocoele. Quae etsi multae sunt; in ipsis tamen universis multos non ero. Nam earum quas Valsalva, aut ego per dissectionem examinavimus, Observationes ex illo quidem omnes; ex me autem pleraque antea accepti.

16. Hydrocelem ex Valsalvae observatione bis descripsi Epistola XX. (u) Quam relegens, facile Malpighii (x) imitatore agnoscas. Uterque enim hydroceles humorem evaporationis ope exploravit. Uterque ex vaginali tunica humoris guttulas expressit; Valsalva insuper ex Albuginea. Ex qua, sicut alibi scriptum reliquit, etiam secundum naturam se habentibus rebus, compresso testiculo, vidit parallelo ordine erumpentes. Sic etiam Malpighius a statibus vaginalis officinis conspexerat profluvium, & repetita saepius compressione alias erumpere quas inter seve innumeras guttulas aliqua grandiores erant. Quamobrem utriusque sententia fuit, per Vaginalem separari humorem in naturali statu paucum, inter eam, & Albugineam matoris instar prohibentis ne ea tunica coalescant, ut sic mollis, suoque aptus officio servetur testiculus: qui humor si per morbum coaceretur, hydrocelem tunc fieri. Non desunt autem hoc tempore qui nihil ibi esse eavi, aiant, nihilque aquae secundum naturam; etsi non ignorent, Vesalium (y) tamen docuisse, Vaginalem tunicam intus esse aquae quodam humore obductam, qui post illum passim ab alii quoque conspectus sit, & Boerhaavius (z) addidisse, in caballo, dissecta vaginali plurimum aquae exprimi posse. Haec non eo attingo, quod illum unum esse censent modum quo hydroceles origo explicari queat. Imo cum meas omnes attentius recolo Observationes, nullam invenio quae non indicet, eas quas ego intra Vaginalem tunicam examinavi, hydroceles a disruptis illic hydatidibus originem habuisse. Quod tibi quoque videbitur, ut opinor, ubi in singulis animadverteris aut hydatides aliquas sive etiam tunc integras, sive semilaceras, aut reliquias earum fuisse superstitas. Quas antequam Observationes proponere, aut commemorare aggredior, scire juvat, intra illud cavum, vel nulla adhuc inchoata hydrocele, aliquando hydatides inveniri, quae si dissiliant, & eam quam continent, aquam primum effundant, deinde aliam usque & usque stillare pergant, non est dubium, quin facturae sint hydrocelem. Nos autem Epistola ad te IV. (a) duarum ibi hydatidum mentionem fecimus, quarum singulae singulis testibus erant impositae, magnae ambae, sic tamen, ut sinistra esset major, ab omni ferme parte soluta, ac libera, eumque humorem continentes, quem igni impositum non concrefere vidimus, sed relicta tenui quadam pellicula, in auras evanescere non fecus ac Malpighio (b) interdum, & Valsalvae (c) falvae

accidit in hydroceles humore ad eundem modum examinando. Sed ad illas Observationes veniamus.

17. MILES vetulus, & gibbosus quos morbos per tulisset, quibusve novissime esset confectus, magis ex mortui dissectione licuit, quam ex viventis narratione, aut Medicorum observatione cognoscere. Paulo enim postea quam fuerat in hoc Nofocomium illatus, vivendi finem fecerat. CADAVER, quale id cunque erat, Gymnasium habuit, ubi Anatomem docebam frigidissima illa quam alibi (d) memoravimus, tempestate A. 1740. Februario mense. Venter nihil ostendit praeter naturam, si quae ad scrotum attinent, excipias, de quo post dicemus, & ossei aliquid in arteriis Iliacis. In Thoracis utroque cavo aqua plurima; in pericardio non pauca, gelu ubique concreta. Pulmones tamen, nisi quod alter magnum ad tractum erat cum pleura connexus, & ad primam bronchiorum partitionem inter plures Bronchiales glandulas unam magnitudinis haud mediocriter habuere, nihil notabilis viti ostenderunt: ut neque crura, aut pedes ullum vel levis oedematis initium. Pericardii, crassioris facili, interiori superficiei, exteriori autem cordis adhaerebat hic illic crassa quaedam quasi puriformis materia, quam viscidiorum, & polyposam ejus aquae partem fuisse, censui quae aqua, ut dixi, intra pericardium conglaciaverat. Ea materia cum a corde avelleretur, pinguedo quae hoc undique, nec pauca, operiebat, hic illic quasi erosa relinquebatur. Quae melius decepti, non sum passus, eorum memor, quae olim animadverteram, ut ad te scribens Epistolam XXI. (e) & XXV. (f) ubi hunc etiam militem obiter commemoro, satis indicavi. Cor ipsum a quo amplius esse visum est, latiorisque esse ramum, Subclavii praefertim, & Carotici arteriae Magnae. Sed amplificatae manifeste erant hujus valvulae, & truncus ipse ad primos a corde tractus. Neque ibi deerant hic illic ossium initia, imo inter tunicas interiores ossae squamulae: quae vel magis extra illos tractus occurrerant, & nominatim intra officina Carotidum finitimum, Internae videlicet, atque Externae, & in Brachiali quoque arteria ad cubiti flexum, & infra hunc. Thoracis vertebrae septem, octavo superiores ita erant posita, ut, Spina ibi in alterum latus curvata, & inflexa, totidem ejusdem lateris costae retrorsum prominerent, & gibbum facerent. Cranium, cum meliora interea oblata essent capita, non aperimus. Restat, ut quae primis diebus, scrotum incidentes, deprehendimus, subjiciamus. Fuit hoc a dextris intus extraque sanum; a sinistris tumidum. Itaque sub crassioribus tunis Erythroide, & Vaginali, intra hujus cavum amplificatum aquam inveni ex fusco flavam, gelu semiconcretam, aliqua, sed non magna, copia. Cum talem inspicerem, longiorem potius visum, quam crassiorum, & longiorem certe Epididymidem; animadvertere parvam quandam fimbriam, ex Albuginea pendente quam proprius majorem illius globum, testiculum convolvebat: quam fimbriam pro disrupta hydatidis reliquiis accipiendam esse, censui, praefertim cum haud procul integrum hydatidem cernebam, ex eadem tunica existentem.

18. VIR fuit ex iis quorum pleraque Partes extremo Novembri A. 1718. Patavii dissecabam, qui alterum scroti latus subtridum habebat. TUNICAE inter Vaginalem, & Albugineam ejus lateris aquam, urinæ colore, non multam inveni, Albugineam autem exiguis tuberculis inaequalem: quae ut pro parvarum hydatidum quae dissiliissent, vestigiis acciperem, hydatides fecerunt nonnullae quas in eadem tunicae is qui aderant, ostendi necdum omnino disruptas.

19. VIR alius inter eos fuit quorum cadavera Bononiae incidi vere anni 1703. qui altero itidem latere non magna hydrocele laborabat. TUNICAE illae eadem duae humorem intercludebant aquae similem in qua caro recens tota est. A majori autem epididymidis globulo per tenue, & breve filamentum parvula hydatidis pendebat. Per id filamentum multo exilius sanguiferum vasculum ferebatur.

20. Quod in his tribus exemplis non magna fuerit aquae copia, inde fortasse repetendum conjiciemus, quod neque omnes omnino dissiliissent hydatides, & parvae fuissent quae dissiliant, neque diu post disruptionem humorem stillare perrexissent. Exemplum autem ultimum faciet ut in memoriam redeas eorum quae de origine hydatidum pariter ex mulierum testibus pendentes Epistola attigimus XXXVIII. (g). Plura vero quae ibi (h) de hydatidibus scripta sunt, ut iis illustratur quae hic Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

scribuntur, ita vicissim illa, si relegas, ad horum faciem illustrationem. Quamobrem exemplis hic supersedeamus eorum quae hydatidibus itidem aliis in partibus contingunt, ut in virorum testiculis. In quibus jam eandem mutationum seriem mecum ex Observationibus recognosce.

21. Et primum fac memineris, ut in Lano, cujus dissectionem Epistola dedi XXI. (i) cum intra Vaginalem utramque esset aqua subflava, hydatides, quae hanc, opinor, non ita diu antea effuderant, apparuerint mihi vesicae instar ex crassis, quasi in se contracti essent, parietibus factae, ideoque jam propemodum solidae, carneae coloris, ab Albuginea prope majorem epididymidis globum, eodem prorsus a dextris, sinistrisque loco, per suum pedunculum propendentis. Hinc; ut id obiter interjiciam; facile intelliges, quid illa fuerit veluti glandula carnea quam per suum petiolum a muliebri ovario pendente Vallisnerius (k) memoravit: ex tam crebra autem hydatidum five adatarum, five nonnunquam dependentium tum in foeminarum ovaris, tum in virorum testiculis observatione novum argumentum capies similitudinis quae inter utraque has Partes intercedit, si rem quidem sic generatim spectemus. Sed a vesicula propemodum solida ad tuberculum, five corpusculum omnino jam solidum pergamus.

22. BUBULCUS post medium Januarii mensem A. 1743. in hoc obierat Nofocomio. Is quibus potissimum obnoxius fuisset morbis, & quibus sublatu, cum pro certo dicere non possim; conicies ipse ex iis quae praeter naturam deprehendi, cum in Gymnasio quae ad Ventrem attinent, & quae ad Thoracem, incidenter.

THORAX; ab hoc enim hic juvat initium ducere; pulmones habuit arcte cum pleura connexos, caetera sanos; cor magnum: arteriam Aortam qua descendere incipiebat, non sine aliqua ossae squamula: Carotides latiores quam soleant, latissimas autem Jugulares venas Internas, dexteram praefertim, quae aere magis ut videbatur, quam sanguine plena, digitum pollicem ferme aequabat. Ventre aperto, oculos ad se convertit sinistra ima pars Coli intestini, flatibus dilatata, eoque compulsa, ut ejus inflexus ille tractus penitus in umbilicali esset regione in transversum locatus, magno obiecto errandi periculo, si quis ibi ex dolorum sede, non Colon, sed Jejunum intestinum torqueret, censuisset. Ventriculus erat amplissimus laxissimusque. Huic lumbrici inerant multi, tunica autem intima deerat ad spatium aliquod a sinistris in fundi posteriore facie, & gangraenae initium apparebat in ea parte quae pyloro propior est. Qua omentum ventriculo cohaerebat, ubi saepenumero, si quas, minimas certe videas glandulas de lymphaticarum genere, occurrerant aliquot, parvae fabae magnitudine. Lien sex digitos transversos latus, duos tresve pollices crassus, sesquipedem longior, substantia fuit valde laxa, & praemolli. Jecur tamen non aequo grandius, intus dimidia ex parte decolor, ex dimidia altera dilute flavum, tres aut quatuor emittebat bilarios ductus quibus latiores vidisse, non memini, uno praefertim qui mihi digiti apicem propemodum admisisset. Quorum dilatationis causa nulla apparebat eo tempore: calculum autem aliquem olim in trunco subsistisse, in quem illi, ut solent, confluebant, fortasse conjecissem, si is truncus, qui latus aliquot erat, ipse quoque ea latitudine esset quae proportionem requiret. In cysti bilis fusca, sed quae flavissimo colore inficeret: cum multa ex illa discissa effluxisset; faeces tamen lentae, earum similes quae in vino subsident, restiterunt. Iliacarum arteriarum altera intorta alibi quasi ut in Splenica videmus: utriusque autem illarum interior facies pene rugosa, & infusca, nisi qua altera uno in loco subalbi aliquid ostendit ligamenti duritiae, necdum ossis.

Spongiosi urethrae corporis bulbos, qui solet intus, extraque a subsistente sanguine nigricare, hic, quod alias vidisse non recordor, nullum continebat, ut ejus cellulae, parulae alioquin, carneo dumtaxat colore subruerent. Testium alter fuit secundum naturam modum, nisi quod inter se, & epididymidem levem pinguedinis laciniam in viro caeteroquin non pingui interjectam habebat. Alter vero ea erat copia valde flavae aquae circumfusus, ut per tunicam Erythroideam fibræ jam nulla amplius apparerent, distentam videlicet a Vaginali, quae non modo ipsa quoque distendebatur, sed caveam suam, semper quidem eo minus latam, quo magis fursum ibat, ad tres pollices extendebat supratelitis supermam partem, fani utique, sed ita in longitudinem producti, ut alligatam epididymidem distraxisse videretur. Pro-

(u) Observaz. 25. 26. (x) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1713. Obs. 3. (y) De Hernia Vesicae Urinar. thes. 22. & seqq. (z) Histo. de l'Acad. R. des Sc. A. 1717. (a) Eph. N. C. Dec. 2. A. 1. Obs. 84. (b) l. 3. S. 31. in Addit. Obs. 5. (c) Dec. 3. Obs. Anat. Chir. 1. (d) Act. N. C. Tom. 4. Obs. 126. (e) Mem. cit. Obs. 1. (f) Obs. 2. (g) l. 3. S. 38. in Addit. Obs. 1. (h) apud Lavaterum Dissert. de Intest. Compress. thes. 13. (i) Advers. Dec. 2. n. 9. (k) l. 1. Dissert. de Hernia Ventris. §. 3. Hist. 1. & 2. (m) Eph. N. C. Dec. 3. A. 7. Obs. 6. (n) Dissert. cit. thes. 4. (o) Diarrh. de Enterocel. c. 3. §. 4. (p) Epist. 5. n. 19. & Epist. 34. n. 11. (q) De Morb. Popul. l. 2. S. 1. vers. fin. (r) Comment. in eum Sect. n. 19. (s) Adnot. in eum librum n. 6. (t) De Hernia Ventrali ad §. 10. (u) n. 24. & 25. (v) Epist. de Struct. Glandul. (w) De corp. hum. fabr. l. 5. c. 13. (x) Praefat. ad Instit. §. 649. (y) n. 30. (z) l. 1. c. 10. locis paulo ante indicatis.

(d) Epist. 13. n. 5. (e) n. 2. (f) n. 24. (g) n. 38. in fin. (h) n. 33. & seqq. (i) n. 19. (k) l. 1. della Generaz. P. 2. c. 5. n. 21.

pe huius majorem globum ex Albuginea prominebat subrotundum corpusculum, quasi ex ejus substantia factum. Vatorum autem Spermaticorum fasciculus crassior quidem erat; sed ex subflava fiebat pinguedine majori ex parte.

23. In hac, aliisve quas indicaturus sum, aut prolatus, Observationibus nolim mireris, si cum multa esset, aut non pauca intra Vaginalem tunicam aqua copia, unum tamen sepe esset corpusculum, nec illud magnum. Reliqua enim magnae hydatidis esse potuit, & quae diu aquam dedisset, tamen denique a longo tempore in eam se contraxisset exiguitatem, & siqua praeterea corpuscula similia fuerant, omnino interdum potuerant evanuisse. Hoc monito, non modo tibi ad memoriam reducam Senem de quo Epistola scripta XL. (1), in cujus altera Vaginali turbida aqua erat non pauca, subrotundum autem corpusculum, Albuginea concolor, ex hac prope globum epididymidis majorem prominebat; verum insuper huc duas alias adscribam historias, quarum altera simul plura confirmet esse potuisse corpuscula, altera ostendat quia interdum ratione Professorum oculos possint effugere.

24. SENEM rusticum in hoc Nosocomio thoracis hydrops confecerat eo tempore quo mihi Januario mense A. 1731. publica incipienda erat Anatome. Itaque ejus cadaver in Theatrum illatum est, & quo par est, ordine dissectum: quoniam hic quoque, ut in Bubulco feci, quae prius examinata sunt, posteriore loco describam.

THORACIS aqua educta, pulmones inventi sunt flaccidi, & male affecti. Cor non item. Abdomine ducto, praeter eade Appendicula Vermiformi, de Valvula Bauhini, de Jecinore, & Lienae, quae cum satis indicata sint Epistola Anatomica XIV. (m), hic iterare non est opera; arteriae Magnae truncus interiore facie passim inventus est inaequalis hic illic, aut offensus, aut ad osseum inclinans. Ex Celiacae autem ramis ille qui ventriculi fundo subenditur, miris adeo ut nunquam ita conspexerim, modis quasi in cincinnorum formam se se totus intorquebat, saepius se retrorsum inflectens. Vesica urinaria in se maxime contracta, crassa, dura, aeri immisso renitens, dilatari non potuit. Intus sanguinolento rubore, quasi ab inflammatione, erat circumcirca infecta ad imam sui partem, quae ex medio ambitus ipsius urethrae orificii ab interiore, eademque posteriore facie protuberantia intra vesicam exstabat, mediocrius uvae acini forma, & magnitudine. Quae protuberantia etsi ipsa quoque a distensis sanguiferis vasculis ibidem rubebat; tamen intus ex alba, compacta fiebat substantia in quam manifeste se Prostatia glandula producebat. Denique testium alter parvus intra aquam erat multum, quae vi frigidae tempestatis in glaciei lamellas ex parte concreverat. Eam tunicam Vaginalem complectebatur. Ex Albuginea autem tum quae testiculum vestiebat prope majorem epididymidis globum, tum quae se producit hunc ipsum globum operiebat, ex singulis, inquam, his locis singula prominebant inter se vicina corpuscula, quae ex densa, duraque substantia compingebantur.

25. VIR qui ab alto ceciderat sub initium Aprilis A. 1740. ut fracta capitis, & thoracis ossa haberet, aliis Litteris (n) perscribam. Nunc quoniam utriusque in scroto hydrocele laboraverat; quid utraque in parte viderim, non reticebo. VAGINALES tunicae aquam limpidam, sed copia non pari, continebant. Nam alterius cavea aut nihil erat, aut parum extra naturalem modum extensa: alterius vero ad summum usque os pubis sensim quidem contractior, sed satis tamen lata, nullisque interrupta cellulis, fibrivae se producebat. Uterque sanus erat testiculus: quoniam is qui in ampliori erat cavea, altero erat, nec paulo, major. Minor tuberculum habuit parvum, Albuginea concolor, & affixum, & quasi ex ea factum, non tamen durum. Major nihil ejusmodi ostendit. Verum cum forte animadvertissem, dum aqua effunderetur qua fuerat circumfusus, nescio quod corpusculum simul exire, in hac quaerens, corpusculum inveni minoris uvae acini magnitudine, & forma quoque, nisi quod haec ad ovalem nonnihil vergens, in medio alterius extremi breve, & tenue quasi collum habebat, ut exiguum referret ampullam, aut si mavis, uvae acinum, periculi tamen ex eadem acini substantia instructum. Sane & hoc corpusculum per suum illud collum ad partem aliquam adhaesisse videbatur, unde, quacunque ex causa, decussum, in aquam deciderit, in ea facile se observationi subducitur. Alba erat, den-

sa, & compacta substantia ex qua intus, extraque constabat, si particulam excipias minimam, abnormi figura, quae quasi nucleus medium tenebat. Haec enim erat subflava, & pene ossa duritie, cum pars omnis reliqua, inter digitos compressa, nonnihil cederet.

26. Non me fugit quid potissimum adversus ea quae ex propositis Observationibus mihi videor posse coningere, vicissim opponere ipse possis, vel meis, quas alias accepisti, Observationibus quibusdam fretus. Probe enim memini, Epistolis XXIV. (o), XLI. (p), & XLII. (q) testiculos descripsisse, e quibus corpusculum illud exstaret, aut etiam penderet subrotundum, quod mihi quidem ruptae est hydatidis indicium, cum tamen Vaginales tunicae modicum, vix parum, nihil etiam nonnunquam aquae contineret. Quas ego Observationes tantum abest ut velim subterfugere; volo insuper alias ejusmodi adjicere, & quare nulla earum tamen conjecturis prorsus officiat meis, denique indicare.

27. VIR alter perpaucis postquam illum de quo novissime dictum est, secueramus, diebus in Nosocomio decessit: quo serius illatus fuerat, quam hernia in scroto, ut vocant, incarceratione postulasset. Me absente, Medici noster cadaver incidit: qui mox eodem die simul quid conspexisset, narravit, simul nonnullas quas ipse inspicere avebam, Partes ad me curavit afferendas. Quae igitur retulit, primum accipe, ut cum iis conjungas quae supra de enterocoele sunt scripta, accepturus deinde quae ego de hydrocele observavi. HERNIAE sacculus sub Cremastere musculo, & huic annexa tunica Erythroide conclusus, pone se spermatica vasa, & testiculum habebat. In sacculo duplicata intestini Ilei portio leviter eidem annexa erat sic ut digitis separari potuerit, neque tamen in ventrem retrudi, prohibente annuli angustia, & intestini ab inclusa materia dilatatione. Nigricabat annulus, & intestinum non intra sacculum modo, sed in ventre quoque ad proximum femulnæ tractum. Reliqua intestina non turgabant: quoniam in vivente abdomen erat subtimidum. Tetrissimo cadaveris odore prohibitus, non alia, nisi quae a me expectari sciebat, praeterea attigit. Cranio aperto, sanguine multum distenta meningum vasa animadvertit, & serum effusum. Quid ipse in meningibus adnotaverim, scribendi non est hic locus.

Est de nonnullis dumtaxat quae in allato ad me testiculo altero, & propriis quibus etiam tum inclusus erat, membranis conspexi. Intra Vaginalem aqua leviter subflava continebatur, sed pauca adeo, ut tertium cochlearis partem non superasset. Tamen ex Albuginea, ubi, sani alioquin, ut cetera quae ipse examinavi, testiculi supremam propemodum partem convestiebat, subrotundum exstabat corpusculum quod & colore eodem erat quo ipsa tunica, & ex eadem fieri substantia videbatur.

28. SENEX Tridentinus procerus, sed arcibus ventribus, qui unde mortuus est, reliquam historiam, cum de iis ictibus agam, (u) habebis: hic ea tantum quae ad herniam attinent duplicem quam in dextero tantummodo scroto laboraverat. OMENTUM, quod in ipso ventre erat dextrorsum retractum, ex eo descendebat in sacculum qui ad latus fasciculi Spermaticorum vasorum non ultra summam testiculi partem extendebatur. Intus erat laevis, ex eoque omentum nullo negotio in ventris caveam reductum est. Hernia autem altera ad hunc modum se habebat. Erat alter sacculus priore multo minor, quippe testiculo non longior, satis tamen latus, ex laevi, & inseparabili factus membrana, subflavam aquam continens. Is testiculi multo maximam partem cingebat, quippe latera hinc, & hinc arctissime committens sua cum ea dorsi testiculi parte quae utrinque secundum longitudinem epididymidis erat proxima, ut haec particula extra sacculum esset tota.

29. QUI Albugineam tunicam in duas membranas fasciis, & aequabili divisione haud semel diduxerim (x), Cl. autem Teichmeyerum (y) videam id benigne augentem, affirmantemque, in tres evidentes tunicas separari posse; sacculum hunc minorem crediderim ex earum duabus ab interposita aqua effectum, quod hydroceles genus, nisi forte a Fabricio nostro (z) indicatum velis, nescio an ab aliis antea fuerit adnotatum. Genus autem illud quod Viri caeteroquin doctissimi frequentissimum esse ajunt, & ego, nec sine curandi ipsi modo, in illa Introductione (a) agnosco quae adeo antiqua est, ut Galeno adscribatur, illud, inquam, genus nec Valsalva, nec mihi occurrit, neque Experimentissimo Heister (b). Non tamen propterea ab aliis vel creberrime visum negaverim, quin videlicet multo saepius aquam inter membranas cellulas quae supra Vag-

illa quae scrotum proprie dicitur, plus pinguedinis, in imo etiam, vidi, quam in homine praesertim non valde pingui expectassem, cum reliquis ab altero latere ipse incidissem, nec humoris quidquam ex Vaginalis cavo defluere, animadvertissem; inclusus tamen testiculus prope extremum superius parvam habuit excrescentiam rubellam, ex Albuginea exstantem.

30. Post haec addere non attinet, Juvenem de quo ubi de Vulneribus Thoracis (*), & multo minus Virum de quo ubi de Gonorrhoea (f) scribemus, illum quidem uno in teste prope alterum epididymidis globum, hunc vero ad summum epididymidis, illum parvam quasi Albugineae excrescentiam subrubram, & mollem, hunc vero subrotundum corpusculum habuisse; neutri tamen intra Vaginalem plus madore fuisse, quam in sanissimo quovis homine videamus. Jam enim satis ex superioribus historiis liquet, non solum praesente corpusculo, imo pluribus nonnunquam corpusculis, aquam in Vaginali fuisse non multam, sed nullam tunc quoque cum rubella exstaret adhuc excrescentia, quae mihi esset hydatidis non ita pridem disruptae indicium. Quae omnia etsi ita sunt; tamen quando nihil est quod vetet concipere, hydatidem recens disruptam, fuisse exiguum, corpusculum autem quaedam, vel plura, vetustarum hydatidum esse vestigia, denique revehentium vasorum oscula, ut in quorundam Vaginali tunica vix ulla, aut obstruenda esse, ideoque in iis effusam aquam diutius servari, sic contra in aliis majori est numero, magisque patentia; cum igitur concipere haec liceat; satis esse causae non video, cur priores illas conjecturas omnino abicere cogamur. Utunque id est; ex lectis quas proposuimus, ex relictis autem quas indicavimus, Observationibus collegeris, hydatides, excrescentias, corpuscula nobis ut plurimum ad superius testis extremum, atque adeo prope majorem epididymidis globum occurrere, & cum in utroque extarent testiculo, saepius eundem utrobique locum tenuisse, quin etiam ei adnatam, aut saltem proximam, quantum delineatio videtur ostendere, illam hydatidem fuisse quam testis figuram, & magnitudinem referentem supra (z) memoravimus: quae res non prorsus indigna videtur fortasse quae animadvertantur, & quorum causa forsitan ex propro Spermaticorum vasorum fasciculi infertione perquirantur. Verum te illud magis ex me quaesitum puto, num igitur nusquam, nisi inter Vaginalem tunicam, & Albugineam hydrocelem ostenderim. Ego vero ut semel viderim in ipsa, ut arbitror, Albuginea, continuo exponam.

31. SENIS, qui ab alto cadens Martio mense A. 1706. ex capitis ictu mortuus est, reliquam historiam, cum de iis ictibus agam, (u) habebis: hic ea tantum quae ad herniam attinent duplicem quam in dextero tantummodo scroto laboraverat. OMENTUM, quod in ipso ventre erat dextrorsum retractum, ex eo descendebat in sacculum qui ad latus fasciculi Spermaticorum vasorum non ultra summam testiculi partem extendebatur. Intus erat laevis, ex eoque omentum nullo negotio in ventris caveam reductum est. Hernia autem altera ad hunc modum se habebat. Erat alter sacculus priore multo minor, quippe testiculo non longior, satis tamen latus, ex laevi, & inseparabili factus membrana, subflavam aquam continens. Is testiculi multo maximam partem cingebat, quippe latera hinc, & hinc arctissime committens sua cum ea dorsi testiculi parte quae utrinque secundum longitudinem epididymidis erat proxima, ut haec particula extra sacculum esset tota.

32. QUI Albugineam tunicam in duas membranas fasciis, & aequabili divisione haud semel diduxerim (x), Cl. autem Teichmeyerum (y) videam id benigne augentem, affirmantemque, in tres evidentes tunicas separari posse; sacculum hunc minorem crediderim ex earum duabus ab interposita aqua effectum, quod hydroceles genus, nisi forte a Fabricio nostro (z) indicatum velis, nescio an ab aliis antea fuerit adnotatum. Genus autem illud quod Viri caeteroquin doctissimi frequentissimum esse ajunt, & ego, nec sine curandi ipsi modo, in illa Introductione (a) agnosco quae adeo antiqua est, ut Galeno adscribatur, illud, inquam, genus nec Valsalva, nec mihi occurrit, neque Experimentissimo Heister (b). Non tamen propterea ab aliis vel creberrime visum negaverim, quin videlicet multo saepius aquam inter membranas cellulas quae supra Vag-

ginalem tunicam sunt, interclusam, quam intra hanc effusam, proponunt. Diu est cum aliis, & in his certe Gerardus Blasius (c) admonuere, hanc tunicam non extendere se ultra testem, nec vasa spermatica vaginali quadam tunica libera regi; sed pro ea membranas dari plurimas, coagmentatas, vasa haec connectentes: itaque vel rupto ad inguina peritoneo, tamen humori ex ventre ad hoc spatium, id est in Vaginalis cavum, nullum dari transitum, sed vero intra hanc & scrotum ipsum, id est in cellulas inter utrumque interjectas, & cum superioribus illis aut per se, aut vi demum morbi communicantes. Haec fere omnia sequuntur nunc plures, nec ipse nego, ut neque illud quod adjiciunt, pondere tamen aliquando, ut acrimonia humoris, in superioribus illis cellulis collecti, posse disrumpi, aut erodi illud quasi septum membraneum quod inter Vaginales caveam, & illas cellulas intercedit, sicque demum in eam humorem effundi, & unum perpetuum cavum fieri, Vaginales nempe, & spatii quod superiores illae distentae cellulae occupabant. Qua ratione forsitan illam nostram explicabunt Observationem (d) Vaginales caveae ad summum usque os pubis productae, cui quidem explanationi pertinaciter haud refragabimur: quoniam non satis intelligimus, quomodo cum eo consentiat quod non modo alii, sed ipsi quoque agnoscunt, hydrocelem, ut caetera herniae spuriae, dum crescunt, ascendere versus inguina videri contra ac legitimae, quae descendendo versus testes, augescunt. Sed & alteram nostram in Bubulco Observationem (e), cujus Vaginales cavum tres supra testiculum digitos pollices ascendeat, si ad eundem modum explicent, aut nonnullas etiam de tot aliis in quibus ea cavea non magis quam soleat, sursum producta, plus minusve humoris continebat; mirum erit, ne unam quidem unquam supra Vaginalem superstitem fuisse cellulam, quam videremus, humore distentam, imo, salvo illo quod diximus, septo, humorem tamen, quod ipsi fieri posse, negant, intra Vaginalem transiisse. Igitur si ea tantummodo quae nos conspeximus, fideliter, ut solemus, hic quoque narrare tibi velimus, nusquam in scroto, nisi in Vaginalis cavo, humorem collectum vidimus, si praeter Senem de quo novissime locuti sumus, asciticis excipias, in quibus tamen in minutis erat illas cellulas dispersit quae cuti propius subint, ut Epistolis XXXVIII. (f), & XLI. (g) expositum est.

33. Asciticorum hanc hydrocelem, quam potius scroto hydroperem vocant, minime necesse est cum vulgo ab aqua illa repetere qua distentus eorum est venter; cum eadem causa propter quas aqua tunc caeteras per se infarcit cellulas quae cuti subjiciuntur, praesertim autem inferiores, efficere satis possint, ut in scroto pariter illas infarciat, eoque id facilius quod pendulum est, & musculorum viribus parum instructum. Nec tamen infarcit ivero, nonnunquam immani aquae vi quae in peritonaeum nitatur, posse hoc intra scrotum adeo urgeri, ut si scrotum perfores, magno illac impetu ex ventre descendens aqua erumpat, quemadmodum se vidisse, ingenium, si quis alius, Vir narrat, Benevolus (h). Qui cum ait, abdominis anulum tunc fuisse ita dilatatum, ut pugnum admittere potuisset, nobis animum dat admonendi, non licere uti, semper saltem, ingeniosa quadam explanatione originis in asciticis verae hydroceles ab invento adductoque multum, ob ventris tumorem, musculo obliquo, atque sic arctato ejus ostio, oblonga videlicet fissura quam anulum vocant, unde illac transeunt venae Spermaticae comprimantur.

34. Caeterum earum venarum pressio interdum ab immani potius aquarum pondere illis, dum sub peritonaeo transeunt, incumbentium facile repetenda, quantum possit facere ad hydrocelem gignendam, ostenderem, si opus esset, exemplo praesertim quod apud Cl. Bassium (i) leges, magnae hydroceles, quae subligaris, arctius, & validius inguen comprimunt, usum brevi post consecuta est. Et Medicum tamen novi senem, qui ad defluxionem, ut ipse agebat, ad testiculi non modicum jam tumorem intercipiendam adstringentia medicamenta inguini imponi jussit, quasi arteriam invehentem possent, venas autem, & lymphaductus revehentes, tanto magis, quanto infirmioribus sunt tunicis, non possent adstringere. Quae cum me consulens Pharmacopola; is enim erat aeger; ex me audivisset, continuo illa abiecit; & curatio

(1) n. 22. Vid. & Epist. 64. n. 7. (m) n. 62. (n) Epist. 52. n. 34. (o) n. 16. (p) n. 18. (q) n. 11. (r) Epist. 3. n. 22.

(*) Epist. 53. n. 40. (f) Epist. 44. n. 5. (g) n. 3. (u) Epist. 52. n. 8. (x) Adverf. 4. Animad. 1. (y) Vindict. quorund. Invent. in fine. (z) Tentateuch. Chir. l. 1. c. 27. (a) c. 18. (b) Dissert. de Hydroc. n. 18. & Instit. Chir. p. 2. S. 5. c. 123. not. b. ad n. 1. (c) in Observat. supra ad n. & citatis. (d) supra, n. 25. (e) supra, n. 22. (f) n. 26. (g) n. 18. (h) Dissert. 1. (i) Dec. 1. Obs. Anat. Chir. 9.

ratio reliqua magis profuit. Atque, ut cæteris hic omnis causis, Spermaticas tantum venas in hydrocele, & pleurisque aliis illegitimis herniis spectemus; sunt illæ per se ad hæc gignenda, & foyenda mala satis pronæ, five positum attendas, five ingentem ab initio ad finem usque longitudinem, five inertiorem quem revehunt, sanguinem, quippe tenuibus, & actuosius particulis in teste orbatur, five arteriæ sociæ ab origine exilitatem, longissimumque decursum, five adjecti unus Cremasteris mulculi infirmitatem, five denique valvulas in venis ipsis aut nullas, aut paucas, aut officio, id quod injecta testes versus ostendunt, non satis pares in iis præsertim qui crebrius, diutiusque aut veneri, aut veneris cogitationibus intenti, venas illas dilataverint. Ob has igitur causas, ab Doctis Viris satis agnitas, & quæ tamen ad semen rite fecerendum requirebantur, ita sunt hæc venæ ad ea quæ indicavimus, mala inferenda, aut augenda idoneæ, ut si libidinum intemperantia accedat, compressio, ictus, aut aliud quidpiam unde motus sanguinis per ipsas magis retardetur, illa non difficile sequantur, nedum, si ex non vitentur res, augeantur. Atque adeo ex retardatione ista deduci video ab Eruditissimo Scriptore explicationem Observationis Dodonæi, in Sepulchreti quod Sectionem proximam (k) relatæ, & in hac (l) laudatæ, hydroceles videlicet, cum ab interna causa est, in sinistra scroti parte semper, aut saltem, ut illam Observationem contraxit Hildanus (m) ut plurimum occurrentis. Cum enim quod illi de sinistra vena Spermatica quasi a proximo rene ferum in scrotum vehere posset, comminiscerentur, locum haud habere hoc tempore; optime quidem id substituitur, sanguinem ab ea vena in Emulgentem expedire non referri. Exemplum vero quod ad impedimentum explicandum producit, ut si ren proximus calculus, & arena, & ulcere laboret, exiguis autem calculus ex ulcere cum sanguine in Emulgentem venam abripiatur, ex hac autem procidat in Spermaticam, & sanguinis estesse refluxum turbet; exemplum hoc, inquam, adeo in hydrocele rarum est, ut ipse qui proponit, non diffiteatur, imo ab aliis probabilior causam requirit frequentissimæ rei, aut certe ex ejus quoque observatione longe crebrius in sinistro, quam in dextero scroto occurrentis. Mihi vero non alia hic querenda videtur causa quam ea quæ a me alibi (n) cum Doctissimis Viris agnita est, cur ren sinister sæpius quam dexter, sit calculus obnoxius. Cum enim sanguis per sinistram Emulgentem venam, quippe longiorem, & Magnæ arteriæ in transversum impositam, non expedite adeo, & cito, ut per dexteram, feratur in Cavam, Spermatica autem vena sinistra, non ut dextera, in Cavam ipsam, sed in Emulgentem illam sinistram infuat; satis apparet, ubi sanguis in vena utraque Spermatica æque ad subsistendum pronus fuerit, facilius tamen fore, ut in sinistra subsistat, five lentius ascendat, quam in dextera.

Neque aliam proferrem causam, cur Cirfocele sinistrum latus fere semper afficiat secundum Arantii (o) Observationes; quæ tamen, ut & superiores quas modo de hydrocele memoravi, an cæteris pariter Observationibus respondeant, in medio relinquo. Nam & plures plerorumque opus esset editas extare hæc de re in utroque morbo Observationes, & quas Valsalva & ego habuimus, forte accidit, ut quo ex in latere habitæ sint, non nisi perraro sit adnotatum.

35. Sed priusquam de Cirfocele pauca adscribamus, de Pneumatocele, & de Hæmatocele, ut propositus ordo (p) postulat, multo pauciora attingemus. Hanc enim haud vidimus, quippe raro diuturnam, ut cæteræ. Nam cum sanguis five ex vulnere infecto, five ex curatione in scrotum defluxit, cito Chirurgi rationem ipsam, nedum Celsi (q) præceptum secuti, via facta detrahunt. Nonnunquam tamen ex erosione membranarum testiculi notabilis copia cruenti ichoris Vaginalis tunica distendit, ut, hac incisa, cum impetu erumpet, quemadmodum invenio apud Justum Schraderum (r). Pneumatocele autem si ita accipiamus, ut ab aere fiat intra aliquod intestinum inclusio quod in scrotum descendit, cuiusmodi adnotandum in primis exemplum protulit Cl. Hallerus (s); ex parte aliqua fortasse vidi: fin vero ut ab aere, quomodo plerique ac-

ciunt, scroti cellulas distendit; non memini legisse qui sine cæterarum omnium, aut plurimarum, aut certe, ut apud Palinium (t), proximarum scroto partium emphysemate conspexerit. Mihi in jam mortuo ut in solo apparuerit scroto, Epistola habes V. (u)

36. Cirfocele Cornelius Celsus unam ex omnibus herniis ramis, aut ramicum nomine designavit, five scrotum occupet, idque aut exterius, aut interius, five inguen tantum impleat: quem ordinem ut proponit capite, non 17; sed 18. libri 7. ita in curatione sequitur cap. 22. & 24. Quæ adnotare volui, ne, ut ingeniosissimus alioquin Vir, nonnihil hæreas in ramis nomine apud Celsum, obscurumque tibi hoc ejus ultimum caput videatur, in quo bubonocoles quidem, ut finis docet capitis 18; curationem tradit, sed bubonocoles quæ non nisi a varicosis venis fiat. Obscurus est Justus Schraderus, quem eo tibi libentius memoro, quod ejus Observationes in Sepulchreto omittas video. In illa enim ipsa quæ paulo supra (x) indicata est, quæ hæmatocelelem quandam ponit, innumeros quoque perreptantibus vasorum flexus supra modum turgidos fuisse scribit; in superficie vero testiculi, an Vaginalis tunica dicat, incertum, utrobique enim loco esse posse, laudatis capitibus 18. & 22. Celsus docuit. Porro ut in Schraderi Observatione, sic in aliis pariter haud raro accidisse, animadverto, ut cum Cirfocele aliæ essent herniæ conjunctæ. Videtis Horstium quem hic habes in Sepulchreto (y). Relege etiam Epistolam meam locos quibus hæc hernia descripta est, ut fuit a Valsalva, aut a me conspecta. Ille (z) cum juxta primum Celsi (a) modum super ipsum scrotum varicosas venas ita vidit inter se implicatas, ut catenam referrent; hydrocelelem simul invenit. Ego cum secundum ultimum primæ divisionis Celsi (b) modum Cirfocelelem inchoatam in Latio (c), aut absolutam in Figulo (d) deprehendi; simul in hoc reperi hydroceles initium, in illo autem hydrocelelem. Erat præterea in Figulo substantia testis ita compacta, ut alimentum amisisset, sicuti in eo modo Celsus (e) loquitur, videretur, subiectumque habebat corpusculum exiguum osseum: quod in memoriam redigit certam quandam aliam Valsalvæ, nescio quo in homine habitam, Observationem. In dextero enim vasorum Spermaticorum fasciculus intra peculiare membranulas corpusculum offendit osseum: quod cum inter digitos valide premeret, ex duobus factum esse, vidit. Globuli forma utrumque erat; sed alterum grani milii, alterum vicæ magnitudinem, hoc in parte subsistens, illud vero eleganter ad margaritæ similitudinem lavigatum.

Cæterum de Cirfocele hæc adnotavit Arantius (f), maximam, opinor, describens: *tactui turgentia vasa digiti crassitudine se se offerunt, intestinum in modum, orbibus, & anfractibus obvoluta, quæ decumbentibus, magna ex parte delitescunt, byemalique tempore, contracto scroto, minuantur, ac minus infestant, æstate vero maxime.*

37. Steatocele eidem Auctori est (g), ubi adiposus quidam humor in scroto, & circa testem concrevit. Secutus est autem antiquum illius introductionis Scriptorem, quæ inter Galeni libros servata est, qui Scriptorem cum inter cæteras hernias 17. & 18. capit. steatocelelem nominaverit, in hoc altero curationem indicans, adipem ait, esse auferendum. Verum five sebum, five adipem vocare malimus quidquid unctuosi intra scrotum aliquando, concrevit, ipsumque distendit, id certe aut sub cute ipsa congeritur, aut in cellulis interioribus. Prius ad genus attinet quod supra (h) dixi, sub scroto propriè appellato plus pinguedinis, in imo etiam, me vidisse, quam in homine præsertim non multum pingui expectassem; nihil enim ibi pinguedinis, ut certe vix aliquid subest, idque interdum. Sed illud erat inchoatum dumtaxat quoddam vitii hujus: quod expletum videt in Sectione hæc Sepulchreti XXIX. (i) ex Graafio: eodemque fortasse referendum est quod in memorata Horstii Observatione ibidem (k) legitur: *in dextera scroti parte caro adiposa*. Ad interiores autem cellulas spectat quod in cadavere admodum pingui adnotavit, ut supra (l) aliam ob causam dictum est, Cl. Petichius (m), cum enterocoele, aut epiplocele in altero scroti latere esse videretur, nil nisi pinguedinem fuisse in substantia peritonei cellulosa collectam, & per annulos ad scrotum pro-

progredientem: Sic apud Boerhaavium (n) legeris visum ab ipso in scroto tumorem maximum: in obeso enim homine, testiculo sano, & libero, pinguedo luxurians, exorbitaverat per annulum in scrotum cum vasis spermaticis. Schulzius (o) autem non infra inguina videtur offendisse quantitatem magnam pinguedinis a dextris, longe pauciora a sinistris, iisdem vasis arcte intertextam, ut a primo intestinum, aut omentum eo prolapsum mentiretur, idque in cadavere potius strigoso, sicut antea (p), ut aliud ostenderem, a me relatum esse, meminere. Mihi vero, qui interdum vel in macilento corpore pinguedinem iis vasis passim interpositam a summa Vaginali tunica ad annulum usque; cum enim tractum peculiariter tunc observabam; vidisse me, sciam, in homine autem maxime toroso, minime pingui, cum sanissimus esset, occiso, non solum in ima eorundem vasorum sede pinguedinem, sed & inter epididymidem, testemque offendisse, denique in bubulco pariter non pingui, his Litteris (q) descripto, cum fasciculus illorum crassior, qui ad alterum spectabat testem, e pinguedine fieret majori ex parte, inter alterum testiculum, ejusque epididymidem non defuisse pinguedinem: quæ res tametsi ab Anatomicis non est, quod recorder, memorata, fortasse haud infrequens est; mihi, inquam, non tam mirum videtur, in eorum vasorum fasciculo præter modum autem pinguedinem fuisse non semel deprehensam, quam inter epididymidem, & testiculum nunquam fuisse; nisi forte aliquando in Sarcocoele quadam pinguedo pro carne accepta est.

38. Sarcocelis enim carnem non rubram modo, sed & albicantem commemorat paulo ante laudatus Introductionis Auctor (r), & ipse, ut alibi (s) indicatum est, pinguedinis facculos vidi, qui, cum hæc subsistente, intermixtoque sanguine esset infecta, carnem mentirentur.

Porro de hujus herniæ natura, & sede alii in alias, easque inter se adversantes sententias Medici abiire. Valsalvæ enim quod ex Sepulchreto (t) cognoscere, sibi persuaserat, ex omento fieri in scrotum prolapsio. Alii ab ipso testiculo extumescere, & indurascere non differre, existimant. Reliqui autem sicuti non negant, a primo eorum vitiorum interdum posse, minus cauti Observationibus imponi, ut pro sarcocoele accipiant, ita hoc nomine revera excrecentem circa testiculum, & ejus vasa carnem, aut aliam ejusmodi substantiam intelligunt. Raro id tamen, ut Celsus (u) admonuit, aut certe minus sæpe quam vulgus putat, si indubias Observationes quaerimus, videtur accidere, nec fortasse longius a vero aberrasse Olavus Borrichius, cum ad Observationem suam, ut in Sepulchreto habes (x), adnotavit, *frequentem sarcocoelem non tam adnasci testibus, quam in nesci: ubi etiam tradidit, quomodo hydrocele mentiri aliquando sarcocoelem possit, utque illa forsitan, non hæc fuerit, quam radiceis ononidis pulvere, urinam utique ciente, sublatam credunt*. Prudenter igitur tantum tribuit ei sententiæ quam secundo loco memoravimus, ut tamen diserte locum relinquat etiam tertiæ, pro qua stare indicat exempla quæ apud Lotichium sunt, & Hildanum. Hæc ego quaerens, in illius quidem Consiliorum libro 6. (y), in hujus autem Observationum Centuria 4. facile inveniri, miratusque sum, non ex hujus Observatione 65. quidquam in hac Sepulchreti Sectionem esse relatum. Quod si ea quæ per anatonem penitus examinata essent, quærebantur; at erat quæ referri huc posset Blasii Observatio (z), in qua, non ut in illa Borrichii, tota carnea massa nihil erat, nisi ipse testiculus; sed contra, crasso quasi ex glandulis durioribus cortice, nuclei instar, testiculus continebatur. Nos vero etsi minime dubitamus, quin ut a cæterarum partium, ita ab erosio, quæcumque tandem ex causa, testium tunicis morbida possit caro excrecere; in hac tamen per dissectiones necdum incidimus. Sed incidit quidem Cl. Pohlus (a), qui secundum propriam observationem sarcocoelem esse, dixit, *tumorem testiculorum fibrosus & carneum, plus minus durum, & dolorosum, successively ortum, qui aut totam testiculi substantiam augeat, inque molem carni similem convertit, aut saltem partem hujus adnatus excrecentiam veluti carnosam format*. Veruntamen præcipue ut vides, in toto id agnoscit testiculo: exemplum autem proferit sarcocelis ab se dissectæ in qua testis substantia tota in materiam purulentam abierat. Quod si legeris Exercitationi Viri Dieterici Sproegellii (b) Observationes Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

illas in quibus cum hydrocele, ut causa, vel ut effectus, sarcocoele conjungitur; testem videbis repertum livido-atrum, putridum, aut extensum: durum, & ad extra cum epididymidibus corosum & callosum, aut partim putredine friabilem, partim vero perfecte cartilagineosum, & tunicam quoque albugineam cum epididymidibus totam cartilagineam, aut denique tumidum, & cum diffecaretur, pus genuinum flavescens spissum in medietate exhibentem, cum arrosione, & incipienti callositate parietum. Vix in una Observatione (c) tumida & scirrhus glandule inventæ memorantur; sed non in testiculi substantia: num ergo in ejus superficie? an in funiculo spermatico? nam in hoc quoque sarcocoelem agnoscunt, & minime attingunt, si ventrem subit, velut illa quam a Valsalva conspectam descripsi (d) in teste incipientem, & duri instar tuberis quasi glandulosæ naturæ illic ascendente ubi cum simili mesenterii immani tumore conjungebatur. Sed ne a sarcocoele, ipsis in testibus quaesita, recedamus: præclare sunt Ill. Viri Heisteri (e) Observationes. Deprehendit hic testiculos, quales delineat (f) quatuor, ea omnes magnitudine, ut merito redarguerit (g) qui sarcocoelem ovum gallinaceum nunquam excedere, scripserunt. Omnes quoque invenit scirrhosos, & æquali superficie, ut non sine causa affirmaverit (h), testiculos scirrhosos longe frequentiores esse excrecentis & testiculos. Cætera apud ipsum videbis, & in his unum ex iis testibus (i) corruptum, & quasi cancrum fuisse. Interea ad ultimam ex herniis a nobis enumeratis veniamus.

39. Spermatoceles nomine Auctor quidem Observationis quæ XX. est in hac Sepulchreti XXIX. Sectione, herniam accepit quam faciat vas deferens corrugatum, in scrotum descendens, facillime tamen aut manu ope, aut corporis situ resupino intro rediens. Quis esset is Auctor, ut melius possem quid sibi vellet percipere, frustra sub Observatione quaesivi. Est enim subscriptum Idem ibidem, nempe aut Rolfinckius, aut Riolanus, aut Hildanus, aut Roscius; hi enim in proximis superioribus Scholiis, & Observatione fuerant nominati. Quorum neminis cum illa esse verba agnoscerem; casu denique factum est, ut Chirurgiam versans Barbetianam (k), in illa ipsa verba inciderem, nec plus tamen quam quod in Sepulchreto exscriptum est, invenirem. Difficile sane est intellectu minime ignorantibus, quomodo vas semen deferens, adhærens ad vesicam, ureteri autem in transitu impositum, unde Ruyssius (l) in nephriticis doloribus retractionem testis repetebat, & denique per creberrimas cellulosas membranas ubique tum supra abdominis annulum, tum infra ad suum usque ortum cum proximis partibus sit colligatum; difficile, inquam, iis qui hæc sciant, est intellectu quod possit adeo intra scrotum hoc vas descendere, ibique complicari, ut herniam faciat. Quod cum ipse non meminim ab ullo in dissectionibus esse conspectum, nec per eas quod at, Barbetius viderit; suspitioni locum esse, cenleo, longe aliam rem ac quam ipse credidit, fuisse quam ab se dicit non semel observatam. Itaque Spermatocele, quæ si illud mihi significaret, supra esset inter legitimas hernias relata, inter illegitimas retineatur sic intellecta, ut seminis agglutinationem designet in testiculis, quæ hos interdum ad ingentem attollat molem; ut autem verbis quibus olim Collectores Bibliothecæ Anatomice (m) rem hanc proposuerunt petentes, ut ejusmodi hernias liceret spermatoceles vocare: neque enim ista significatio, nedum istud nomen, primum inter Medicos nuperime vulgatum est, ut Vir cæteroquin Doctissimus videtur existimare. Quin rem non semel ab se in viris salacioribus esse animadvertam, Collectores illi confirmant, cum esset obstructio in aliqua epididymidis parte a seminis particulis concreviscibilibus efformata; semel autem oculis ipsis rem usurpasse cum post feminis ita cohibiti, intra scrotum effusionem, indeque ortum abscissum ferro aperiendum, post ejusque expurgationem, non pus amplius, sed ex ea epididymidis parte quæ inter ejus globos media est, semen quod ipsam distendendo perruperat, evidenter prodiret. Quod epididymidis foramen si forte malis erodenti potius abcessus materiæ quam femini distendenti tribuere; negare tamen non poteris quod ratio dicat, si transitus femini in suas vesiculas quacunque de causa interceptiatur, aut si ex vesiculis jam distentis reditus per revehentia vascula in sanguinem prohibeatur; fore ut ab novo semine usque & usque in

(k) Sect. 30. in Schol. ad Obs. 1. (l) in Schol. ad §. 3. Obs. 31. (m) Cent. 4. Obs. Chir. 66. (n) Epist. 40. n. 12. (o) De Tumor. p. n. 6. 51. (p) n. 15. (q) De Medic. l. 7. c. 19. (r) Dec. 2. Obs. Anat. Med. 1. (s) ad Praefat. Boerh. §. 441. not. u. (t) Anat. du corps hum. P. 1. tr. 2. ch. 18. (u) n. 19. (x) n. 35. (y) l. 3. Sect. 29. Obs. 17. (z) Epist. 20. n. 24. (a) l. 7. c. 18. & 22. (b) Ibid. (c) Epist. 21. n. 19. (d) Epist. 7. n. 11. (e) cit. c. 18. (f) c. supra ad n. 34. cit. (g) Ibid. (h) n. 29. (i) Obs. 14. §. 2. (k) Obs. 17. (l) n. 10. (m) Syllog. Anat. Obs. §. 89.

(n) Praefat. ad Instit. §. 712. (o) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 225. (p) n. 10. (q) n. 22. (r) c. 19. (s) Adverf. Anat. 2. Animad. 6. (t) Sect. hac 29. Obs. 15. §. 3. (u) l. 7. c. 18. (v) Sect. cit. Schol. ad Obs. 22. §. 1. (w) c. 3. Obs. 9. (x) 15. Partis 1. (y) Progr. de Hern. & speciatim de Sarcocoele. (z) Obs. quædam selectiores. §. 50. & seqq. (a) §. 51. (b) Epist. 39. n. 2. (c) Differt. de Sarcocoele. (d) Fig. 1. & seqq. cum Explic. (e) in Prolegom. (f) §. 37. (g) §. 34. (h) Part. 1. c. 7. (i) Treatise of the Urinary passag. Sect. 3. P. 5. (m) Tom. 1. in Adnot. ad Graaf. Tract. de Viror. Organ. & cæ.

testibus secreto, testes ipsi, epididymides, & reliqua ejus conceptacula repleantur adeo, ut primum intumescant, quo tempore spermatoceleum esse, dicemus, tum deinde ut structura tenuior, & mollior quæ in testibus præsertim est, paulatim vitietur, disrumpisque vasculis tum semen, tum sanguinem, tum lympham vehentibus, tumores denique misti generis in testibus procreentur. Nunc agemus aliquot exemplis hæc declarem.

40. Quæsti sunt aliqui apud me, quibus illa statibus erant distenta, non tam de tensione, & dolore, quam alii de uno, alii de utroque testiculo tunc potissimum intumescente, cum status maxime urgebant, detumescente autem, nullo prorsus relicto incommodo, cum status remittebant. Credidi, ab intestinis distentis viam semini intercludi compressis vasculis hoc ad vesiculas deferentibus, imo ipsis interdu vasculis, ut delatum non admitterent. Sic quoque memini, cum ante hos triginta annos Rhodigio ad nos Vir honestus venisset, tumori cuidam obnoxius qui inter abdominis musculos ad epicolicam regionem dexteram non semel redierat, diceretque, quotiescunque aderat tumor, testem subiectum moleste sibi graviores fieri, ut sacculo scrotum excipere, & sustinere opus esset; memini, inquam, rem hanc ita ipsi, & Medicis qui in consilio mecum aderant, jam tum explicasse, ut cum Obliquus dexter musculus ab attollente tumore tenderetur, & quod consequitur, oblonga ejus fissura, quæ annulus dicitur, contringeretur, non esset mirandum, si vase quadantenus adstricto quod, illac transiens, semen deferret, non nihil hujus retardaretur ascensus. Sed in hoc, & in illis quoque fortasse viris fieri potest; quamquam resistantis sanguinis indicia non erant; ut compressa, aut arcuata pariter vena spermatica, remorato non minus sanguini, quam semini, ea quæ diximus, essent tribuenda.

Sunt autem inter Valsalvæ litteras quædam ad Virum Principem datæ, cui post nuptias testiculos creverat ad gallinæ ovi magnitudinem. Hunc Valsalva tumorem a subsistente femine esse posse, cogitabat, nec præter rationem propterea quia æger non facile semen, quo abundabat alioquin, solebat emitte, ut interdum re imperfecta a concubitu discederet. Pariter in Juvene de quo narrat Hildanus (n) cujus narrationis summam habes in Scholio ad eam quam in Sepulchreto indicavimus (o), Barbeti Observationem, quis non a femine, sed a sanguine repetat dolorem inguinum, & testiculorum tumorem, imminemtem feminis ejaculationem repente prohibitam consecutus? Evanuit quidem uterque a sinistris; a dextris vero tumor non modo persistit, sed progressu temporis in carnosam ingentem herniam excrevit. Idem ab eadem causa alteri contigisset, nisi tumorem, ad pugni majoris magnitudinem intra annos duos jam auctum, rara felicitate resolvisset Cl. Crausius (p). Generoso autem Viro cujus ejusdemmodi tumorem, nec alia ex origine natum, conspexi, quis contigerit exitus, scire non possum, cum hac transiens, vix me consulto, perrexerit necessarium iter conficere. Inutile certe præter Chirurgi ferrum, auxilium omne expertus fecit, si tumor ejusdem fuisse naturæ ac in Juvene (q) fuit, cui ab non ita dissimili causa exacta & scroto est massa carnis albisimæ, & solidissimæ, in cujus centro globus offensus concludebatur. His autem quatuor cur non ambo testes, sed alter aut tumuerit, aut tumens persistit, quando in utroque pariter teste cohibita feminis copia est in medio veneris æstu, non ita facile dictum est, nisi forte non æqualem utrinque copiam, aut fluxilitatem feminis, aut tunicae, & cremasteris musculi vim, aut reventia vasa ab altero latere magis patula fuisse aut aliud aliquod istiusmodi conjiciamus.

41. Cæterum tumores testium, quacunque a causa originem habeant, ex alia in aliis conitare videntur materia, ut puta (præter exempla hæcenus proposita) ex substantia carnea & nervosa apud Borrichium (r), ex glandulosa, & vesiculis sanguine plenis apud Bartholinum (s), ex ligamentosa, & ex parte ad cartilaginis naturam accedente apud Schraderum (t), ex cartilaginea apud Ruyschium (u). Ego cum in Viro quem de Gonorrhœa scribens (x) commemorabo, testiculum præsertim dexterum æquo grandiore offendissem; dissecans inveni adipis aliquid intimæ ejus substantiæ interjectum, non pessime aliquin se habenti. Unde fieri posse, conjeci, ut nonnunquam ex pinguedine præter naturam innata, & aucta aliqui testium tumores facti deprehendantur. Quod si ingentes,

quos aliquando in viventibus conspexi, in mortuis vidissem, & incidere potuissem; non dubito quin singularia quadam fuissem observaturus, si molistructura respondisset. Nam primum Bononiæ vidi olim grandem adeo, ut ad illum accederet quem Ruyschius (y) dixit prodigiosæ magnitudinis, five humanum maximum, si Curis quoque Posterioribus (z), ut videtur, de eodem loquitur. Sed quamvis minorem, non eo tamen exitu quo ille major, exactum fuisse, audivi. Deinde vero Patavii ea magnitudine testem vidi, ut nisi qua fide sim, probe nosces, tibi scribere non auderem, veritus ne mendacem suspiceris. Nam si Ruyschianus ille caput fœtus humani superabat; is quo de loquor, duo plane superabat virorum capita in unum juncta. Itaque ut rem perraram inspicere, Mayo mensis A. 1730. transeuntem hac hominem cum Atestem repeteret, ubi degebat, venire ad me domum, voluit Antonius Mocenicus Eques Splendidissimus, & Aloysio fratre, qui tum Veterinarum Dux erat, dignissimus. Ubi primum hominem aspexi, ignarus quis esset, & cur ad me veniret, magno hydropæ ascite laborantem credidissim nisi a dextris tantummodo ventrem adhuc obiectum testibus tumere, animadvertissem. Ubi vero omni ablato integumento, & facis detractis quibus tumorem illuc per se vergentem, ad abdomen adductum, hypochondrium usque versus, fervebat, eam quam dixi magnitudinem miratus, contractare cepi; tactum enim ferebat, omni semper dolore carens; mihiq; visus sum quasi sarcoma quoddam tangere, sphaeroidis forma, & sua ubique cute obductum. Qua ex causa, & quomodo cœpisset, quærenti, respondit æger, etsi idem jam inde a puero ibi excepsisset; testiculum tamen non nisi virili ætate in tumorem crescere cœpisse, qui plurimum demum annorum spatio ad eam pervenerat molem.

42. Unum vero hic es admonendus, testium auctam magnitudinem Valsalvæ, ut in ejus schedis est, plerumque debere vidisse tunicarum vitio eisdem vestientium. Nec mihi quibuldam præsertim in calibus id creditum difficile est, qui ut superiore Epistola (a) scripsi, cum æquo majores testiculos planeque tumidos offendissem, non a distenta eorum substantia, sed a tunicis crassioribus factis id esse, comperi. quin etiam in herniis tum spuris, cum legitimis auctam membranarum quibus continebantur, crassitudinem animadverti. Sic in hydrocele quam in Milite supra (b) descripsi, Erythroidem, & Vaginalem adnotavi fuisse crassiores, ut alibi (c) in Lanio, ejusdemmodi herniis affecto, densiore utramque Vaginalem. Sic in Senis epiplocele (d) peritonæum, sacculum faciens, simul dilatari, & crassius fieri, in Juvenis autem enteroepiplocele (e) sacculi tunica non minus crassam, & firmam, quam arteriæ Pulmonaris, & in Mulieris Crurali hernia (f) ita crassam, ut in plures quasi laminas non difficillime posset dividi. Fieri tamen potest, ubi sacculi orificium multo majus est, sicuti in herniis ingentibus contingit, quam annulus, aut ubi hernia iis locis accidit in quibus musculorum tendines nullo secundum naturam hiatus pertunduntur, quemadmodum inter Rectos sunt, & Obliquos, aut supra, infræ umbilicum inter Rectum, & Rectum, fieri, inquam, potest, ut sacculi crassitudo non tantum a peritonæo sit, sed fere a tendinibus quoque, simul cum peritonæo extrorsus compulsi. Itaque Meryus (g) in hernia illa quam pene omnia intestina Tenuia faciebant, in saccum vidit non peritonæum modo, sed & singulos utriusque Obliqui musculi, & Transversi tendines se se evidenter producere, & tres quoque hos tendines quatenus Waltherus vidit in hernia se extendentes, & magnum, quamvis cum illo Meryi non comparandum intestinorum pondus sustinentes, & ne hernia porro cresceret (quam utilitatem in aliis pariter, neque id raro, præstare, arbitrabatur) quo ad ejus fieri posset, obfistentes, ex Actis quæ Lipiæ prodeunt, Eruditorum (h) cognosces. Sed etsi Mauchartus (i) laminam ex fibris tendineis ortam musculi Obliqui Externi non solum delineat (k), verum etiam nomine tunica aponeurotica inter cæteras herniarum tunicas proponit; tu tamen quatenus hæc agnosci a me dixerim; probe memento. Neque enim me fugit, præstantissimos esse Anatomicos, qui in herniis ab se dissectis ea negent percipi potuisse. Quibus ut liberrime credo, sic invitus crederem, Meryum, & Walthereum, egregios Professores, in aliis herniis; neque enim de omnibus loquebantur; cum tanta usi fuerint dilig-

gentia in ea perquisitione, quæ se vidisse ajunt, pervidere non potuisse. Veruntamen, ut hanc interea controversiam seponamus, satis est exemplorum in iis tunicis quas in herniis omnes agnoscunt, unde pateat, quomodo ex illarum potissimum aucta crassitudine testiculos, qui non ita ipse extumuerit, in immanem tumorem excrevisse videatur. Observatio est altera ejusdem Waltheri, in eisdem Actis (l) proposita, qua scrotum, & penis tumida adeo describuntur, ut hic ad genua, illud infra genua se extenderet, crassitudo autem utriusque ei longitudini responderet. Quam ad Observationem nullam meminisse legisse quæ propius accedat quam ea quæ A. 1755. Syraculis missa ad me est, typis exscripta, & publico Civitatis testimonio confirmata. Sed hæc in vivente homine; Walthariana autem etiam in mortuo habita est. In hoc igitur, instituto examine, cutis scroti triplo crassior, cellula autem sub illa adnatæ, interque testiculos pergentes, adeo distenta a tenaci humore compæctæ sunt, ut molem inertis carnis repræsentarent, cui pondus tumoris totius, librarum videlicet ferme quadraginta, potissimum debere videbatur. Erant quidem testiculi naturalibus multo majores, quippe crassiore Albuginea tunica humorem, & topophos comprehendente, ut vix pars exigua, eaque in altero dumtaxat latere tubulis tenuissimis relinqueretur, qui propriam testis substantiam faciunt. Sed hæc quantulum demum universi tumoris partem efficerent, satis intelligis. Itaque scite, ut solet, Vir Præstantissimus Heisterus (m) tumorem hunc ipsam scroti potius quam testiculi, fuisse, censuit, nec aliter de maximis aliis quorum dissectione non habetur, existimavit, quos inter ille est librarum sexaginta, memoratus in Regiæ Parisiensis Academia Scientiarum Historia (n). Noverat quippe Vir Exercitissimus (o), vel in hydrocele, præsertim antiqua, testiculorum tunicas, & præcipue dartum, & vaginalem admodum sæpe crassas reddi, ut crassitudinem æquare viderit quinque vel sex lineas, & quod excedit: quomobrem monuit, triangulari instrumenti apice plerumque non nisi difficillime perferri, ideoque (p) apicem illum non nimis cito esse retrahendum, quia alias tunica non perforata essent. Quin etiam in farcocele quanto Albuginea tunica crassior fiat, nobis facile conjiciendum reliquit, cum postquam illam tunicam incidideret a se fore ut vascula feminis magna, & valde distenta apparerent, æque parva invenit ut in sano & naturali testiculo esse solent, id quod mirandum, inquit, fuit in tanta testiculi distensione. Atque ut crassioris factæ ejus

tunica aliud habeas exemplum, inspice ossi facti humani testis iconem illam quam exhibuit Cl. Reinholdus Wagnerus (q). Cum videris, quanto major naturali testiculo ille fuerit; tum animadvertite, ejus dumtaxat superficiem, crassitie pennæ columbinæ, in os durissimum abiisse, exterius tuberculis ossis pili magnitudine asperum, intus vero læve, qua mediocrem caveam comprehendebat ubi latitabat materia gelatinosa seminis corrupti. Scilicet testis substantia, olim inclusa, nulla jam erat; superficies ossæ, crassæ factæ Albugineæ tunicae debebatur.

43. Verum ut hæc Litteræ superioribus, quemadmodum promissi, breviores sint; alia de herniis, & testiculis huc addere superfedeo, ne de horum quidem dolore quidquam adjecturus, nisi ut Observationes legas, quas supra (r) indicavi, Cl. Virorum, & in quibus dolorem fuisse, invenies; in pluribus autem invenies; quomodo se habuerit testis, attendas. Simul ex una earum quæ Heisteri est (s), facile cognosces, quæ ratione non modo in agro illo, sed in altero etiam quem describit Sproegelius (t) dolores a testiculo ad lumbos possent propagari. Nec alia adjicio, quamvis de Testiculorum Dolore Sectio proxima Sepulchreti inscripta sit. Tota enim vix duas simul cum Scholiis paginas implet, in eaque, ut omittam Observationem IV. fortasse ex I. compendio ortam; certe V. ut Bonetus ipse fatetur, ex §. 2. repetita est. XXII. Observationis Sectionis superioris, Scholiorum autem, quod non fatetur, ad Obs. illam I. pars aliqua, etiam ubi sanguinis Circulationi apertissime adversatur, jam adoptata ab ipso fuerat, & appositæ ad §. 3. Obs. XXI. ejusdem superioris Sectionis, ut Scholii partem Observationi II. hic subijcit, quam illic subjecerat Observationi XX. Sed illic quoque non tam mirum est, Observatione XXIII. iteratum esse quod §. 2. Obs. XV. positum fuerat, quam in una eademque pagina idem in prima parte Scholii ad §. 2. Obs. XXII. rescribi quod scriptum modo fuerat in secunda Scholii parte ad §. 1. Neque dicas, a me pariter in hac Epistola repetita esse plura, quæ in aliis, mea, aut Valsalvæ observata narrans, propolueram. Aliud enim est quæ jam satis dicta sunt, iterare; aliud quæ ne passim discernerentur Observationes, alibi ad ipsas explendas tradita sunt, summam perstringere, ut oportuniore, quemadmodum ibi promissum sæpe fuerat, loco perpendantur. Morem hunc, te, ut sperare juvat, probante, servabimus; illum vero, quem haud dubitamus a te quoque minus probari, non sequemur. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XLIV.

Verba fiunt de Gonorrhœa.

ETSI pauci forte sint Anatomici a quibus tot fuerint, quot a me, urethræ viriles dissectiones, & diligenter perustrate; tamen aut rarius quam vulgo existimant, luculentiora in eo canali vitia occurrunt quæ contagiosam Gonorrhœam comitentur, aut nescio quo casu factum est, ut cum magnus hominum hæc infectorum sit numerus, illa ego vitia tam luculenta vix unquam, aut ne vix quidem conspexerim. Quid Valsalvæ acciderit, ignoro; neque enim scriptis mandavit si quid forte in eis invenit qui cum laborarent eo morbo, decesserant. Quid aliis contigerit, legi. Quæ vero ipse viderim, aut non viderim, nunc eo ordine ad te scribam, ut ab extimo urethræ orificio incipiens, ad intimum quod ad vesicam est, perveniam.

2. Cum in Adversariis (a) causas protuli, cur prima gonorrhœæ virulentæ sedes videretur mihi in iis potissimum, quos detexeram, majoribus urethræ canaliculis itatuenda, inter eas causas hanc non omisi, quod ex iis præcipue canaliculis, maligno halitu suscepto irritatis, provenire is humor posset qui primo ejus morbi tempore ex urethra solet destillare. Neque enim verum est semen, ut comparatio cum hoc docuit aliquando vel illos ipsos, qui improbanda opinione seducti, ut morbum abigerent, venerem sæpius exercebant: quod ut ab iisdem accepi, sic etiam ab aliis certior sæpenumero factus sum, eo primo tempore necdum ullum esse in perinæo molestum sensum qui altius descendisse vitium, indicet. Neque rursum id quod tum destitit, verum est pus, cum dolor necdum is sit qui erosionem significet, neque sanguinis ulla adhuc vel levissima tinctura, nedum guttula apparuerit. Quibus nunc addere, opinor, liceret Summi Viri Senacii

(b) Observationes, secundum quas globuli materiæ in gonorrhœa effluentis majores sunt, globuli autem qui ulcerum pus faciunt, sunt minores, & inæquales, si utriusque oculo exquisitissimis vitris instructo aspiciantur, & cum sanguinis globulis comparentur. Itaque Rondeletium in primis secutus, qui caute sapienterque, ut in Sepulchreto (c) habes, materiam illam puris similitudinem referre, aut puri similem esse, dixit, ego quoque puriformem appellavi. Placuit ea gonorrhœæ in canaliculis sedes, non dico Cockburnio (d); huic enim, Docto alioquin Viro, vel præter modum perplacuit; sed magno Boerhaavio (e) dico, & Illustri Hallero (f), ibi primæ speciei gonorrhœæ sedem agnoscitibus, & cur irritatione in erosionem demum abeunte spongiosi urethræ corporis, sola membrana a canaliculis divisi, non raro sanguis ipse effluat. Placuit & Viris aliis Eruditissimis cellularum multiplicium nomine canaliculos designantibus; quibus tamen, haud satis intelligo, quomodo Littrei quoque glandulam comprehendant, aut quomodo ipsi qui canaliculos nunquam memoravit, horum etiam, in gonorrhœa male se habentium, Observationem tribuere videantur, quasi ea in Commentariis legeretur Regiæ Scientiarum Academia Parisiensis A. 1711. De muliebris autem urethræ canaliculis, non secus ac in virili a me descriptis (g), & de sebaceis quas item reperi, nympharum, proximorumque labiorum glandulis (h), quarum has hoc ipso nomine, illos cellularum appellatione significant, verba hic non faciam propterea quia cum in mulieres incidere nunquam, quæ certa quadam exteriori gonorrhœa laborarent, aut cum interiore ven-

(n) Cent. 4. Obs. 64. Exempl. 1. (o) n. 39. (p) Eph. N. C. Dec. 3. a. 5. & 6. Obs. 282. (q) Hist. de l'Acad. R. de Sc. A. 1708. Obs. Anat. 4. (r) Sepulchre. S. hac 29. Obs. 22. §. 1. (s) Ibid. §. 2. (t) Ibid. supra ad n. 35. cit. (u) Theat. Anat. 9. n. 51. (v) Ep. 43. n. 5. (w) n. 51. cit. & Tab. ibid. 3. Fig. 1. (x) n. 58. (y) n. 38. (z) n. 17. (a) Epist. 21. n. 19. (b) Ibid. n. 13. (c) Epist. 34. n. 9. (d) Ibid. n. 17. (e) Mem. de l'Acad. R. de Sc. A. 1701. Obs. Anat. 3. (f) A. 1738. M. Jun. P. 2. (g) Differt. & cmt. supra ad n. 3. cit. (h) Fig. 2. ad DD.

(i) A. 1725. M. Novembr. cum Tab. 5. Fig. 1. (m) Differt. de Sarcocoele §. 36. (n) A. 1711. Obs. Anat. 1. (o) Differt. de Hydrocele n. 32. (p) n. 36. (q) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 30. (r) n. 38. (s) Differt. ibi. cit. §. 30. (t) Obs. ibid. cit. §. 51. (u) IV. Anim. 9. (v) Traité du Cœur Supplém. ch. 8. n. 5. (w) Sect. huc 31. l. 3. in Schol. ad Obs. 1. (x) The Symptoms &c. of a Gonorrhœa ch. 4. (y) Prælect. ad Instit. §. 654. (z) not. & ad eum locum, & nota ad §. 657. (a) Advers. 4. Animad. 24. (b) Advers. 1. n. 11. & 12.

arentur, obierint; statuere non possum, an hac aliquando in iis canaliculis, illa in iis glandulis sedem habeat. Nec in viris felicior fuit, ut insectos reperirem gonorrhoea eadem exteriore, quam spuriam olim appellasse dicuntur Medici Monspelienses (1), ut querere possem, an ejus materia e glandis superficie prodiret nullo ulcere affecta, an ex glandulis coronae glandis ejusdem, ut sic Littrii sententia confirmaretur, ea coronae granula pro glandulis, non pro papillis, quemadmodum Ruyschius, habentis. Littrii sententiam dixi; neque enim mei unquam fuit, qui cum illam commemorarem, assensum ab utraque cohibui, diligentius postea quaesiturus; ut mirer, esse potuisse qui cum mea l. (k), & IV. (l) Adversaria legissent, primam mihi sententiam tribuerent, imo ea de re celebrem litteram, si Superis placet, Ruyschium inter atque Morgagnum subortum esse, scriberent. Ruyschius enim hoc quidem excidit (m) me, granula illa pro glandulis descripsisse & delineari curavisse: ego vero sperans, ex meis Adversariis omnes facile agnitos, optimam & occupatissimam Senem meam non satis affectum esse mentem, superfluum existimaui vel uno verbo respondere. Huc tota celebris illa recidit. Hisce exterioribus gonorrhoeis multo rarior illa est quam vidit, euraque Cl. Wolffius (n). Humor enim ex urethra destillabat semini analogus primum albus, dein viridis factus, cum maximis in mingendo doloribus, & penis incurvatione, nec tamen impuram venerem, imo nullam venerem, sed alias, quas enumerat, causas erat illa gonorrhoea consecuta, quod & ille asseverat, & ipsa, ut Hippocrates (o) loquitur, ostendit sanatio, facile nimirum, & cito per data remedia obveniens, quae causis illis erant opposita. Sed hac, & gonorrhoea quae vulgo dicitur sicca, five, ut proprie esset juxta Cel. Astrucii (p) monitum appellanda, dysuria venerea sicca, praetermissis, ad eam quae frequentissima est, & de qua scribere ceperamus, noster contrahendus est sermo. Igitur quae de hac per difficultates conspiciere potui, ex iis cognoscere Observationibus quas continuo subijciam, initio ducto a longiuscula historia, sed eo gratiore tibi futura, quod cum alias (q) de Angina mentionem injeci, maxime quaestus sum, in gravissimo ejusmodi morbo, Sectiones eorum qui confecti illo sint, adhuc desiderari. Quod igitur vel mihi tunc deerat, hic primum habebis; extremo autem loco quae ad hujus Epistolae argumentum spectant, ex eadem historia non omittentur.

3. FABER lignarius triginta tres circiter annos natus, procerus, & magno corpore, habitu subpingui, antea, quantum sciri poterat, sanus, cum a vino, & igne praeter modum incaluisse, noctu frigidissima tempestate domum petiit. Ibi vehementi febre, & angina correpto accersitis illa eadem nocte Medicus sanguinem e brachio mittit. Nihil remittente morbo fertur mane in Nofocomium: ubi idem auxilium iteratur, sed frustra adeo, ut pomeridianis horis sanguinem miserint e pede. Proximo die cum caetera pariter quae antea, & quae tum dabantur five, ut lente poterat, deglutienda, five exterius admovenda, nullam afferrent utilitatem; mane rufus e brachio sanguis est missus, a meridie autem ex iis quae sub lingua sunt, venis; nam Jugularis, ut voluissent, aegro eum qui requirebatur, positum non ferente, incidi non potuerat. Post haec omnia non modo non decreverant, imo semper magis invalescentibus febre, & corporis jactatione, & cum his simul deglutendi, loquendi, spirandi difficultate, cum tertio jam morbi die dixisset a quindécim, aut certe non multo pluribus diebus virulenta gonorrhoea laborare, vena iterum pedis secta est. Sanguis, toties educus, crustam in summo habuit nunquam; sed duriusculus semper fuit, paucosque cum sero. Collum erat subitumidum; non facies, quae nec rubicunda erat. Duabus circiter a novissima vena pedis sectione interjectis horis etsi pulsus adhuc persistabat validi; ipse tamen aeger proximam esse mortem, praesentit. Quae revera mox ingruit eodem die tertio circa meridiem, sic tamen, ut casu videri posset ingruisse. Cum enim eam qua utebatur, aquam poposceisset, & incautus fortasse in fauces paululo plus demittere voluisset; continuo ea ratione mortuus est, ut qui adstantes, inde suffocatum existimarent. Cum dies instaret quo die tradenda Anatomes initium facere in Theatro debebam, id est XIV. Kal. Februarii A. 1748. cadaver, biduum, an triduum servatum, nihilominus, quippe frigidissimo anni tempore, idoneum maxime fuit, ut vel vigesimo sexto ab interitu die nonnullis etiam tum ejus partibus uti possem. Totum igitur ordine

ac diligenter profectum, cum alia quae hujus loci non sunt, adiutanda obtulit, tum haec praefertim, quae ab ultimis ad prima rediens hic scribam. CEREBRI vasa tum quae extra, tum quae intus sunt non intra ventriculos modo, sed & passim per medullarem substantiam, sanguine erant distenta, ea autem magis quae per sinistram Tenuis meningis partem repunt. Ea meninx, ut caeterae omnes hujus corporis membranae, five incidere, five discindere velles, magis quam solet, renitebatur. In Lateralibus ventriculis aquae paucillum fuit subcrustae. Lingua visa est aequo crassior: certe autem vasa ostendit per faciem superiorem a basi apicem versus tendentia a remorante sanguine crassiuscula, nedum manifesta. Et uvula quidem, ac palatum mobile sana erant. Tonsillae vero & membranam habebant qua obteguntur, a flavo sero subistente crassiore factam, ut gelatinam quandam sublavam referret, & ipsa tumeabant, sed magis sinistra, quae durior erat, & si exprimeres, aut secares, pus emittebat. Proximae laryngis non cartilagine solum, sed & proprii musculi, quos singulos perlustravi, labes omni, & inflammatione carebant. Vitium autem in membrana erat quae larynx intus, extraque vestitur, intus quidem levius, sed extra gravius. Intus enim rubicundior illa erat, quam solet, ut in vicina etiam parte Asperae arteriae & subtimida quoque, sed leviter, ut glottidis rima non propterea appareret angustior. Quae autem eadem membrana epiglottidem amiciebat, tum a facie cava, tum a convexa, tum a lateribus quoque tumida erat, & alibi coccinea, alibi ex coccineo fusca, minus tamen a facie cava, quam alibi, neque ab ea tota, sed a tertia dumtaxat suprema parte. Secundo perspicuum erat, eum tumorem, coloremque sanguini, & sero deberi, nil nisi membranam, junctosque acinos glandulosos distendentibus, quorum pars humorum in convexa facie jam converti in pus incipiebat. Porro quae eadem membrana laryngem exterius a tergo operit, ipsa, & innexi glandulosi acini magna inflammatione tenebantur, a lateribus praefertim. In singulis enim lateribus se attollebat in singulas protuberantias paulo minori quam digiti minimi crassitudine. Haec ab regione imae basis Cricoidis cartilaginis profecta, & inrer ascendendum convergentes, eo usque perveniebant, ut altitudinem cartilagineum arytaenoidum aliquanto superarent, ab his tamen, ab eaque summa laryngis parte omnino sejunctae, reliquae inferiori adherentes. Duo inflammata condylomata esse, dixisses, formam, & colorem aspiciens, eundem videlicet atque ad epiglottidem descripti, nisi quod in his plus erat ex coccineo, minus ex fusco. Difficans autem, membranam, & acinos esse, vidi, a remorato sanguine, & sero tumentes, idque a sinistris magis: quod latus, ut in tonsillis quoque & Tenui meninge diximus, magis affectum fuit. Habes quam sedem hujus anginae, & quam naturam deprehenderim. In Thorace neque turgidi, neque inflammati erant pulmones; sed omnino sani: quanquam ut de caeteris membranis dixi, illa quoque ex quibus ipsi construuntur secantibus, aut distrahentibus renitebantur magis quam solent, & sinister archissime fuerat cum plura connexus, cum dexter esset omnino solutus. In pericardio paululum aquae fuit rubentis, neque id certe ab admisso inter incidendum sanguine: erat enim illa aqua vi frigoris in lamellas concreta intus inter. In corde quod aequo amplius, vel magis in quo erat corporis habita ratione, mihi visum est, nihil polyposi, ut neque alibi, conspectum est, sed niger sanguis non multus, isque nec fluidus nimis, neque concretus. Magna arteria a valvulis ipsi praefixa, quae, ut cordis reliquae, sanae erant, fere ad Coeliacam usque vitia habuit plura, eaque manifestissima. Nam maculis quibusdam, quamvis nec creberrimis, neque adhuc in osseam duritiem vergentibus, hic illic intus albebat. Intus quoque, si macularum loca excipias, nusquam fere albam, sed ex rubro fuscum superficiem habebat, neque laevem & nitidam, ut solet, sed parvis quibusdam & humilibus excrescentiis inaequalem, ejus quem dixi, intus extraque coloris, variae autem formae, & magnitudinis sic tamen ut maximas lupino, ad cujus figuram accedebant, operire potuisses. Eas cum aspiceres, molles crederes; sed cum incideres, non minus duras, quam arteriae parietes, deprehenderes. Id vitii quo propius a corde arteria ab erat, eo erat majus; neque in Carotides tamen, neque in Subclavas se extendebat, neque infra Coeliacam: sub qua vel primum illud albarum macularum vitium multo minus,

nus, ac minus fiebat. Praeter haec, omnes arteriae Magis parietes erant aequo duriores. Denique Sinus Valvae quartus non multo quidem, sed perspicue tamen erat amplior, quam secundum naturam. Illud quoque in venosorum cordis Sinuum, seu mavis in auricularum cordis septo animadverti: quae facie ad venam spectat Pulmonarem, & accedit ad anteriorem, sulcis erat parallelis, neque ita parvis, excavatum. In Ventre, cujus viscera gelu induruerant, & bilis ipsa ex parte aliqua in sua vesicula, sanguis autem intra lienem congelaverat, nihil quod ab natura norma abesset, inveni, si globulum in mellea excipias, hujus limbo propinquum, & nihil magis forma, colore, magnitudine quam coctum vitellum majusculum, referentem ex iis qui in gallinaceo ovario extuberant. Nihil erat aliud nisi pinguedo, sed colore magis quam reliqua, flavo, nullique intus, quae animadverti posset, membranae lamellis intercurentibus, intra unam comprehensa membranam, in sphaerica vesicula modum conformatam. Propter ea quae ultro de gonorrhoea fassus ager fuerat, diligenter urethram totam perlustravi. Prostata glandula aequo major videri potuisset, nisi esset, ut in magno corpore, magno quoque cum pene conjuncta. Sana ipsa, sana caruncula, sana vesicula, & semen, & oscula per quae vesiculis expressum est. Sed ne canaliculi quidem nostri peculiare quiddam ostenderunt, nisi quod urethrae interior facies aliquanto humidior apparuit, & rubicundior quam solet. Ex Cowperi glandulis altera, quod minime rarum est, desuit; alterius substantia in duram firmamque ligamenti instar erat mutata.

4. Igitur ne ab hujus Epistolae proposito longius abeam; mitto quae ad anginam spectant, & peculiaris quae in Aorta observata sunt, vitia hoc loco perpendere; haec, inquam, & alia omitto; & illud quod ad gonorrhoeam attinet, tantummodo attendo. Si duram faciem Cowperi glandulam seponas, quae res si ad gonorrhoeam pertinet, certe ad recentem, atque adeo praesentem non pertinet; vides utique, nihil referri ad hanc posse, nisi auctam in canaliculis humoris secretionem; unde humidior urethrae facies, & ab acris irritante ejusdem humoris natura rubicundior. Spectare huc potest quod in viro altero vidimus, aliud agentes.

5. VIRI nimirum thoracis inflammatione sublati cadaver, muscularum aliarumque ejusmodi partium examinatum idoneum, non quae praeter, sed quae secundum naturam sunt, inquirentes, accurate in Nofocomio magna ex parte secueramus sub Martii finem A. 1747. cum testiculos perlustravi, in quorum altero ea deprehendimus quae sunt Litteris superioribus (r) commemorata, forte animadvertimus, compressa proximi penis glande ex urethrae officio materiam aliquam prodire. URETHRAM continuo aperimus tota ea parte quae cum pene extra corpus pendebat, suspicati, hominem gonorrhoea laborasse. Nec tamen praeter ruborem dilute coccineum, quo interior canalis illius facies infecta erat, & madorem quandam per quod majorem, quiddam conspiciere licuit quod ad suspicionem attineret. Urethrae partem reliquam secare cum in alterum distulisset, diem, aliis, ut fit, observationibus abducti, hanc perferre oblitus sumus.

6. Hic tamen nihil nisi suspicio fuerat. Accipe jam quae, cum certa esset gonorrhoea, quamvis non recens, invenerimus.

7. JUVENIS annum agens vigesimum quintum, cujus flavescere facies, virulentam gonorrhoeam vetustam recentiore altera ante sex menses renovaverat. Qua perstante, ex profundo vulnere in colli sinistram latus inflicto, tantum sanguinis, & toties profluxit, ut inevitabilem mortem attulerit inter initia A. 1740.

CADAVER ob praegressas haemorrhagias propemodum exsangue, eoque anatomicis perquisitionibus aptissimum ibidem, nostris inspectantibus Auditoribus, tanto diligentius profectum est, quod per paucula habuit ab natura constitutione discrepantia: quae prorsusquam de urethra scribam, indicabo. In Cerebri Lateralibus ventriculis cum plexibus Choroidibus, ob eam quae modo dicta est, causam pallentibus, aquae non ita limpidae paucillum fuit. Colli vulnus ad ramos denique non tenevas sanguiferorum vasorum haud procul a mediis cervicis vertebrae pertinebat. Venter jecur habuit durum, lobulis praefere conspicuis, lienem magnum. Ubi ad genitalia ventum est, praeputium, glandem, urethram

totam perattente inspicies, nihil usquam ulcerum, erosionis, ruboris inveni, nec quidpiam aliud quod ad praesentem gonorrhoeam attineret, si madorem excipias, quam solet, majorem, a media urethra ad glandem usque pertinentem. Ad gonorrhoeam autem illam veterem, diuturnamque spectare haec credidi, primum ab eo ferme loco unde mador incipiebat, existantem oblongam albidam lineam, ulteriora versus oblique tendentem, quam Epistola XLIII. (f) memoravi, & pro excrescentia reliquis habui carnis quondam luxuriantis: deinde etsi in Prostata glandula, & caruncula ipsius colore, & substantia nil vitii animadverti; osculorum tamen per quae semen in urethram extruditur, sinistram deletum, aut certe obtusum, dexteram autem adeo angustum, vix ut viderim, tenuissimamque setam immiserim: tum Seminales vesiculas ita strigofas, nihil ut continere intelligeres, quod reapse constitit omnibus, cum eas vel saepius premendo, ne per dexterum quidem de quo modo dictum est, osculum quiddam exivit; in testiculis tamen nullum quod in sensu incurreret, compertum est vitium: denique ut omitam, vix aliquod fuisse Cowperi glandularum indicium; possumus enim, ut alias (t) docui, a primordiis deesse: meorum canaliculorum, praeter unum, eumque angustum, & brevem, nullum prorsus apparuisse; ut eum madorem quem ab ipsis, non solum, sed potissimum deducere consuevi, hic maxima ex parte a minimis illis ante nos vulgatis, repetere oportere: quorum tamen neutros Eustachium olim perfectos jam habuisse, effi contrarium egregius, humanusque Juvenis diserte affirmet, tabulaeque ejus hoc, ajat, docere, si tandiu perges mihi credere donec Tabularum quae id doceant, numeri indicentur, non dubito quin longo tempore sis crediturus.

8. Miraberis forsitan in propositis Observationibus cum praesens esset gonorrhoea, non plura nobis occurrisse quae ad praesentem quidem referri possent quam urethrae madorem, nonnunquam cum rubore conjunctum, quando; ut Terranei (u) Observationem mittamus, urethrae omnino inflammatione livescens, glandularumque in ea disgregatarum, quae minimi nobis canaliculi sunt, immodi- cam extumescens; in hac ipsa prima, quae de loquimur, urethrae parte Vesalius (x) fossulam quae intra glandem est, plurimum in hoc morbo ulceribus infestari, scripsit, confirmantibus passim aliis, & nominatim Cl. Astrucio (y), in ea fossula compertum esse exulcerationes graves plerumque latere in gonorrhoea. Nemo hoc ipsum erat ex iis unum quae ipse quoque mihi non occurrisset, mirabar praefertim cum toties ejusmodi agrorum querelas audiverim de acerbo dolore ibi insigniter, dum urinam reddunt, torquente, ut Vesalii verbis utar; quando Terraneus (z) non ut alii, & in his Astrucius (a), dolorem intermedium acrem, urentemque commemorat, imo tunc plerumque vix percipi, ait, sed aegro jam a metu cessante, per omnem urethrae ductum acriter admodum urere, maxime qua in glandem desinit. Quem ego dolorem qui missionem consequitur, non propterea immينو; sed de eo qui comitatur, querimonias maximas audivisse me, dico, ut in aliquos nonnunquam inciderim, se lotium reddituros negantes, nisi opportuno quopiam auxilio tormentum quo tunc cruciarentur, levarem. Quibus est a me satis factum, cum urinae acrimoniam quo ad ejus fieri posset, minuendo, tum praefertim ratione haud ita dissimili atque Araatius (b) quos dolor haemorrhoidum male habebat, minori cruciati alvi excrementa dejicere docuit dum super lasanum sederent, repentis hydraei plenum, cujus foru non solum clausus, sed mox etiam in deji- ciendo apertus anus leniretur. Nempe & ego in vitream matellam, tepido lacte semiplenam, demittere illos penem docui, & cum dolorem eo foru paulisper mitigasset, tunc intra ipsum lac servato pene, urinam sensum, & si- ne conatu emittere. Fuerunt & quibus cum pro lacte oleum forte esset ad manus ex lini seminibus recens expressum, hoc uti placuit. Magnum utrique inde levamen se retulisse, confirmare: hi alteri illud etiam addiderunt, cum tumidum esset, dolensque praeputium, eo more servato, intra unum, haud amplius, diem praeputii tumorem, doloremque abiisse. Sed haec obiter: quae, casus distinguendo, & aliquid in lacte pro reidoneum incoquendo, reddere poteris utiliora. Illuc revertamur. Etsi Vesalius, atque alii

(1) Hist. de l' Acad. R. de Sc. A. 1732. Obs. Anat. 4. (k) n. 11. (l) Animad. 14. in fin. (m) Thest. 10. n. 98. (n) Commerce. Litter. A. 1742. Hebd. 47. n. 2. (o) Sect. 2. Aph. 17. (p) De Morb. Vener. l. 3. c. 5. (q) Epist. 14. n. 36.

(r) Epist. 43. n. 30. & 41. (f) n. 41. (s) Advers. Anat. 4. Animad. 15. (u) De Glandul. post c. 5. Obs. 5. (x) De corp. hum. fabr. 8. c. 14. (y) De Morb. Vener. l. 3. c. 1. §. 2. (z) loc. cit. (a) 2. cit. §. 3. (b) De Tumor. p. n. c. 60. (c) Anthropol. l. 2. c. 30. (d) De Chirurg. Oper. ubi de penis Chirurg.

alii vera dixerint; non omnes tamen gonorrhœæ, neque semper, eadem acrimonia sunt. Casus quidem tulit, idque unum mirandum est, nunquam mihi nifileves, aut meliori earum tempore in dissectionibus occurrere. Sæpe tamen in ea vestigia incidi quæ satis ostendunt, quas vel in hac prima urethræ parte fuisse inventuras læsiones, si cum illæ urgerent olim, dissecuissem.

9. Legisti enim paulo ante (e) in illo Juvene quem vetusta gonorrhœa male habuerat, vix unum, eumque angustum, & brevem, meorum canaliculorum fuisse superstitem. Vix unus pariter in quodam Bajulo apparuit, quem ex casu ab alto mortuum, ubi de Vulneribus, Ictibusque (f) agitur, describam, cujus urethra qua alteri lateri coronæ glandis respondebat, veteris læsionis servabat indicium. Neque uno plures in peregrino Senne reliquos fuisse canaliculos, vidisti Epistola XLII. (g), cum glans cicatricosa, & urethra valde contracta, quid olim præcessisset morbi, indicarent: imo ne unum quidem amplius superfuisset, indidem (h) nosti in Juvene in quo illa eadem indicia non deerant; ne quid dicam de Viro alibi (i) describendo. Nihil autem veri similis est, quam ab inflammatione, & exulceratione in canaliculis demum orta, tenues membraneos ipsorum parietes alterum ad alterum adhæsisse, cavumque interceptum sic perisse: fuisse enim in illa eadem urethræ parte exulcerationes, coarctatio ibidem, quin etiam in ipsa canaliculorum sede luxuriantis carnis excrecentia commonstrabant. Quod si gravior quidem, sed aut non adeo gravior, aut non omnibus canaliculis communia fuerint illa vitia; aut omnes, aut nonnulli poterunt esse superstites. Sic in quodam Viro quem sub Novembris finem A. 1718. in Nosocomio dissecabam, cum prægressæ veneræ luis indicia in primo urinario meatu offendissem; paucos quidem, sed nonnullos tamen restare adhuc canaliculos vidi, non secus atque in Lanio, qui, ut scripsi ad te Epistola VIII. (k), in præputio ulcuscula, in urethra cicatrices habebat, fuisse perpaucos, legisti, neque uno aut altero plures in nobili Viro, quem lues veneræ non semel affecerat, XXVIII. Epistola (l) memoravi. Omnes autem fuisse memini in Stabulario (m), cujus alioquin urethram trium circiter ab extremo orificio digitorum transversorum intervallo lineis duabus albidis inaequalem deprehendi, videlicet aut cicatricum, aut excrecentiarum vestigiis. Ubi tamen attentius illi ab aliquo inspectum qui sapius sit in eorum, cum secundum naturam sunt, contemplatione versatus, nescio quid tunc percipitur aliquando, unde aliquid esse passos, intelligatur, velut mihi in eo de quo mox scribam, accidisse, scio. Ut iis autem quibus hi majores omnes obliterantur, deesse tantum constat quantum fecerere iidem solebant humoris ad urethræ parietes adversus lotii acrimoniam illinendos; sic rationi consonum est, illos præ cæteris, nisi urethra tota occiderit, obnoxios fieri in posterum ardoris sensui abeodum lotio, & si hoc acrius sit, etiam erosioni: reliquos autem pro numero amissorum canaliculorum, aut pro noxa canaliculis illata, levioribus quidem, sed ejusdem generis, tentari molestiis. Sed hoc satis sit attigisse. Ad id quod modo indicabatur, veniamus.

10. ASTHMATICI qui in Nosocomio decesserant, quædam in Gymnasium Partes illatæ sunt, cum in virili altero cadavere Anatomen traderem A. 1746. Juvat enim ejusdem Partes ex non uno, cum licet, corpore, aliasque aliter dissecas ostendere: quod tunc facere ferebat animus in vesiculis seminalibus, & pene. VESICULÆ est cellulis intus erant humidis; nihil tamen feminis continebant. Caruncula, & quidquid ad superiorem urethram spectabat, bene se habebat. Sed cum inferiorem perfecturi, crassiusculo specillo per infimum orificium indito, eam partem quam glans complectitur, aperuissimus, cujus superficies partis nonnihil erat inæqualis, ulterius immittere specillum volentes, ultra se quid digitum non potuimus. Tum a superiore, quæ aperta erat, parte idem conati, idem obstaculum, cum ad eum qui designatus est, locum accederemus, offendimus. Paulatim igitur ab ea facie aperientes, ut soliti fumus, quæ facies nostris opposita est canaliculis, hæc denique animadvertimus. Tractus erat transversorum digitorum trium, aut eo amplius, quo proclive erat intelligere, urethram olim fuisse exulceratam. Per eam enim faciem in qua illi sunt canaliculi, tres quatuorve exstant in transversum ductæ albidæ, & quasi tendinæ chordulæ, vel potius intinæ, non valde prominentes, nec usquam se ab interna urethræ

membrana sejungentes. Erat inter chordulam & chordulam interstitium, tum medio ferme inter primam & ultimam loco urethra se tanto spatio quantum duo circiter occupassent transversi digiti coarctabat, ut ibi dimidio propemodum quam supra, aut infra, esset angustior. Cum hæc omnia intra eorum de quibus loquimur, canaliculorum regionem caderent; ipsi tamen, eorumque orificia primo quidem aspectu non præter naturam se habere videbantur. Ubi vero oculos attentius defixi, & accuratius inspectavi, satis cognovi, certo quodam modo quem facilius ipse percipere quam verbis explicare possim, ab naturali consuetudine discrepare, ut non obscurum esset, minorem quidem quam proxima urethra, sed aliquam tamen noxam olim pertulisse. Quod & chordularum, id est cicatricum sedes in eademtaxat urethræ facie, nempe inter canaliculorum orificia, confirmare videbatur, quippe indicans unde irritans virus & demum exulcerans distillasset.

11. Jam vero ad ulteriorem, uti promissimus, urethræ partem transeamus. Occurrit hic quoque gonorrhœæ sedes, nobis altera, Littrii prima, videlicet, ut ipse constituit, Cowperi glandulæ; sic enim pergam appellare, quando Mercurius, nescio quam ob causam, suo jure videtur cessasse, tacite ferens, si eas ab Littrio quoque, nec semel, nominatas esse, ostensasque in Regia Scientiarum Academia (n), atque insuper in hujus Historia (o) primam earum inventionem Cowpero diserte fuisse tributam. Cæterum quam raro hæc glandulæ gonorrhœæ sedes sint, illud præclare ostendit quod Littrius (p) cum affectorum gonorrhœæ cadavera secusisset circiter quadraginta, unum modo reperit in quo harum glandularum vitia apparerent, quæ diligenter cum omnibus quæ ad id gonorrhœæ genus attinent, partitæque describit, ne causam quidem reticens cur rarum sit. Minus igitur miror quod in cadaver non incidim viri eo affecti. Prægressi tamen olim indicia a me conspecta esse, opinor, live cum has glandulas, aut harum alteram, ut in Fabro lignario de quo supra (q) dictum est, mutatum deprehendi in duram substantiam; non raro enim post inflammationem glandulæ solent indurefcere, five cum vestigia offendi in illarum ductibus non inflammationis solum, verum etiam exulcerationis, velut in eo de quo protinus dicam.

12. JUVENIS, a capitis ictu in Nosocomio mortui circa medium Aprilem A. 1718. genitalia, in quorum anatome sæpe tunc eram occupatus, diligenter incidi. Et cætera quidem intra naturæ modum inveni.

URETHRA autem ne recte se haberet, statim veritus sum ac resecta glande cavam in hac cicatricem animadverti. Glandula tamen Prostata, & Littrii, & Seminalis caruncula nihil quidquam vitii offenderunt. Sed cum urethræ partem reliquam aperuissim, & primos aliquot ex meis canaliculis deletos vidissem; neque enim ulla eorum incipiebant apparere orificia, nisi quatuor circiter transversis digitis ab extrema urethra intermissis; attentius inspectans omnia, subitit in Cowperi glandularum ductibus, quorum dexter æquo tenuior, sinister autem æquo crassior per intimam urethræ tunicam transpicebantur. In tenuiorem frustra quidquam immittere conatus sum; ut parietes ab inflammatione vel coaluisset, vel ad summas angustias contractos existimaverim. Contra sinister, subavo mucoso humore distentus, specillum non tenuissimum admissurus videbatur; & reapse nullo negotio admisit, sed a parte glandulæ; nam extremum oppositum in urethra habebat finem perangustum, atque adeo obscurum, ut hinc esse censuerim quod ita ipse humore esset plenus, & glandula ejus crassa, cum altera exilis esset, ac strigosa.

13. Hic quæres, cur illas ejus finis angustias conjecterim a prægresso ulcere esse potuisse. Nempe recordabar, Littrium in eo cadavere in quo uno dictum est (r) hoc gonorrhœæ genus deprehendisse, nunquam exulcerationem nisi ad oras, & circum oras adnotasse osculi alterius illorum ductuum, Cowperumque ipsum in explanatione ejus Figuræ (s) qua ambos eos ductus delineavit, monuisse, alterius orificium amplum admodum in eo subiecto esse ex ulcere. Et viderunt quidem ambo ulcus ad osculum ductus; sed illi, alter certe, erodens adhuc, ego vero, nisi me conjectura fallit, ad cicatricem perductum; itaque illi patentius orificium videre potuerunt; ego a cicatrice adstrictum conjicere. Quia Terraneus (t) prorsus obstructum osculum, indeque ductum mire dilatatum

tum offendit, eumque sinistram: quo in latere accidit ut tres isti, & ego orificii vitia deprehenderemus.

14. Sed ab illis osculis ulterius per urethram pergentes, ad alterum hujus pervenimus locum de duobus in quibus Vesalius (u) non modo quod omnes, adnotavit, gonorrhœa affectos graviter cruciari, sed & causam protulit quare in hoc altero crucientur, cum penis rigit. Is locus imo perinæo respondet. Ibi enim ob canalos reflexum, declivemque ac humillimam sedem cum restitit erodens humor, ibi quoque magis quam in reliqua meatu sede erodit, (aut certe irritat) erosus autem meatus, quando una cum penetrandis, solutionem unitatis vehemens inibi percipit. Nec vero tunc solum, sed dum etiam postremas lotii guttas sursum inde promoturi, per advolutos musculos eam comprimunt meatus partem, de molesto ibidem sensu conquerentes audiuntur. Eum locum cingit Littrii glandula: eoque loco exulcerari urethram, credo, cum ibi ipse quoque lineas nonnunquam viderim illas excitantes, quas pro cicatricibus habeo, Terraneus autem (x) ulcera ostenderit ex diuturna gonorrhœa. Sed hæc interdum, Sæpius enim ad ea quæ Vesalius ait, explicanda loci illius irritationem, inflammationemque satis esse, arbitror. De hoc genere quid a me conspectum sit, accipe.

15. SENEX decrepitus, lue veneræ plurimos jam annos male multatus, ut quæ loqueretur vix intelligeres, urinæ autem difficultate, & gonorrhœa denique a duodecim jam annis laboraret, his malis, & ipsa ætate lente confectus, e vita cesserat ante medium Januarium A. 1717.

CADAVERIS quædam partes in Nosocomio dissecantes, hæc quæ ad propositos morbos spectarent, animadvertimus. Uvula, cujus pars deerat, per ligamenta epiglottidis cartilago ita erat cicatricosa, ut nihil magis. Itaque ea cartilago inæqualiter contracta, in triangularem propemodum verticem desinebat, multo caninæ similior, quam humanæ. Quin vitium in laryngem reliquam, & huic proximum Asperæ arteriæ truncum se propagabat: eratque arytenoidum altera quasi luxata, non compari parallela: intra illam autem arteriam inæquales magnique prominebant quasi lacerti; exteriore autem sede duobus infra cricoidem cartilagine transverfis digitis ad alterum membraneo musculoso interstitii lateris glandula exstabat ciceric magnitudine, & forma, colore autem cinereo, intus ex rubro fusco, in rotunda videlicet cavea quam albi, nec laxi parietes comprehendebant. Eam glandulam pro una ex tot illis, ibi a nobis delinatis (y), accepimus: quæ oculo ob interna vitia foramine ad arteriæ cavum pertinente, sic, & fortasse olim magis, excrevisset.

Venerem priusquam aperiremus; crani enim, & thoracis aperiendi tempus non fuit; manifestissimas a bubonibus inguinum cicatrices adnotavimus. Tum visceribus cæteris quæ sic satis intra naturæ modum esse visa sunt, prætermittis, in urinaris substituis Partibus. Renes valde parviterant, & ob hemisphæricas protuberantias inæquali superficie: substantia tamen, nisi quod firmior fuit quam soleat, magisque compacta, nihil vitii ostendit; quanquam in renis alterius pelvi feri aliquid inerat albidum, & turbidum. Ureteres & multum dilatati, & intus rubentes fere ad renes usque conspicebantur; utraque autem hæc noxa quo magis ascendebat, eo magis decrefcebat. In dextero circa medium, interiore tunicam vidi exitantem, & se duplicantem, ut annularem mediocri altitudinis quasi valvulam faceret contra urinæ cursum converfam. Cum ambo essent mucosa materia semipleni; ab interiore eorum facie a medio sursum prostabant hic illic majores, minoresve sphericæ, ut videbantur, guttæ, quas spongia abstergere nequiquam conatus, cultello amotas, & inter digitos compressas, statim in humorem lentum, & quasi tabaci dilutissimo colore infectum, abire vidi; ut postquam hydatides, sicuti alias (z) ad te scripsi, ab eadem tunica pendentes inveni, ejusdem generis illas de quibus loquor, guttas fuisse, arbitror. Porro vesica ex crassissimis tunicis facta, per quarum internam faciem crassi quasi lacerti, varia inter se implicatione conjuncti, transpicebantur, albo turbidoque humore scatēbat. Tum a glande, cujus alterum coronæ lateris ulcere olim exesum fuerat, urethræ incisionem exorsus; nihil fere adnotatione dignum reperi donec ventum esset ad Littrii glandulam. Erat ea sedes confertissimis sanguiferis vasculis intus obducta, ut longe magis ex atro quam

consuevit, ruberet. Prostata autem glandula nihil obtulit in quo morarer, præter brevissimos, & superficiares sinus tres ex ampliori osculo in conimodum se contrahentes, inter carunculam recte se habentem, & vesicæ orificium secundum urethræ longitudinem positos.

16. In hoc uno sic affectam ad perinæum urethram vidisse memini: cui tamen affectioni causam præbere quoque potuit restitans, decrepita præsertim ætate, eo in loco pars aliqua urinæ, ejusque non secundum naturam se habentis. Certe in tot aliis nunquam fuit, quos gonorrhœa prehenso descripti, neque in Epistola hac tantum, sed in aliis etiam, & nominatim in Molitoris quodam famulo (a), qui dum gonorrhœa teneretur, interiens, noxam in pendula, quam dissecare non licuit, urethræ parte habuerit, necesse est, quando in summa hac non secus ac tot ali, nusquam habebat. Unde ergo factum est, inquis, ut in Prostata glandula, & caruncula ipsa feminali vitium esse, communi quadam sententia traderent? Nimirum quia ut humorem in gonorrhœa distillantem, si esset legitima, semen esse non infectum, ita, si spuria, venereo miasmate contaminatum, non dubitabant eo tempore. Postea vero cæperunt Medicorum aliqui suspicari, id quod in legitima effluit gonorrhœa, non semper esse ipsum semen, quippe cum plures viderent non ita macescere, & enervari, ut copia humoris posceret, annos haud raro pergens profluere; si semen esset. Et sane videmus quam in maciem, & infirmitatem virium incidant qui nimis crebro per venerea infomnia ad longum tempus semen effundunt. Quorum ego aliquos novi qui nullis proficiantibus auxiliis, veriti ne in lethalem demum atrophiam præcipitarentur, ita penem sibi dormituri instita ex molli aluta sub ipso margine coronæ glandis circumligare non infelicititer instituerant, ut donec penis non rigeret, nihil hinc sentirent incommodi; ubi vero rigere inciperet, eam continuo molestiam crearet, ut simul cum somno tolleretur periculum feminis effundendi. Multum porro ultra illorum Medicorum suspensiones processit Boerhaavius (b), diserte negans, semen verum se unquam novisse absque turgentia venerea sive in somniis, sive extra somnia fuisse effusum; ut rarissimus sit morbus oporteat, in quo sponte, & sine sensu effundatur. A Prostata igitur glandula id esse censuit. Equidem hæc non dico quod credam, verum semen sine venereis cogitationibus nunquam effluere. Credo enim ubi laxiores, aut erosæ sint oræ foraminulorum per quæ semen in urethram descendit, aut ubi ipsum aqualius sit, posse absque illis cogitationibus defluere, ut nonnullis accidit a calidioris climatis injectione, aut ab duriorum alvi recrementorum excretionē; nisi & illis id quod exit, semper paucum adeo, & tale sit, ut a Prostata deducere liceat; his vero nunquam esse queat a vesiculis feminalibus. Quod ut semper, quemadmodum olim arbitrabantur, non fieri, scio, ita nonnumquam fieri, negare non possum.

17. Ventum est, ut vides, ad postremam in urethra gonorrhœæ sedem, Prostata videlicet glandulam, & carunculam Seminalem. Quarum hæc si exitus feminis aut laxitate, aut erosione patulos tunc semper ostenderet, aut illa si ita in omnibus exulcerata esset, ut ulcus ad feminis canales, per ipsam glandulam traductos, perveniret; nihil esset cause, cur feminis fluxum, semper revera tunc fieri, negaremus. Atqui in pluribus nihil quidquam istorum est, ut non modo quæ hæcenus in hac Epistola scripsimus, fere omnia satis ostendunt, sed aliorum quoque Observationes confirmant, in quibus Terraneus (c) est, & quem ipse laudat, Blancardus, potissimum autem Littrius (d), qui ex propriis inspectionibus primum statuit gonorrhœæ sedes tres, in quarum singulis morbus interdum est, illas duabus reliquis; de tribus autem unam facit Prostata glandulam: deinde ostendit, cum sedes in Cowperi esset glandulis, in Prostata non fuisse, & quam difficile in hanc, aut in carunculam ab illis virus propagetur. Sed, ut hæc vera sint; in aliis tamen, ut in plerisque eorum qui gonorrhœa quam virulenta, & quam diuturna vexati fuerint, in Prostata quoque & caruncula repertum esse vitium, inficiari non licet. Ut si eam quod scripsit Whartonius, (e) excretoria Prostata glandulæ foraminula, in fanis inconspicua, in illis evidentius corni; pervulgata sunt, atque adeo in Sepulchreto (f) extant Bartholini, Severini, Wirfungii Observationes ejusdem glandulæ in gonorrhœa ulceribus, aut

(a) supra, n. 7. (f) Epist. 53. n. 37. (g) n. 40. (h) n. 39. (i) Epist. 50. n. 30. (k) n. 28. (l) n. 6. (m) Epist. 4. n. 19. (n) Mem. A. 1709. & 1711. (o) Annor. coronæ A. 1711. (p) n. 31. (q) supra, n. 11. (r) Vid. in Afr. Erud. Lips. A. 1702. M. Novemb. ad Tab. 8. Fig. 1. litt. II. (s) De Glandul. Obs. 6. & Fig. 1. ad D.

(u) c. 14. cit. supra ad n. 8. (x) De Glandul. c. 5. & Obs. 3. (y) Advers. I. Tab. 2. Fig. 1. (z) Epist. 41. n. 18. (a) Epist. 24. n. 18. (b) Prælect. ad Institut. §. 776. (c) De Glandul. c. 5. & Obs. 3. & seq. (d) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1711. (e) Advers. c. 31. (f) Sect. hac 31. Obs. §. 1. & 2.

abcessu afflicta, post gonorrhœam autem cicatricosa: legiturque ibidem (g), ut in eomorbo curationem desperaret Guenotius, ubi digito in podicem immisso, renitentem illius glandulæ tumorem perciperet. Nec defuit alia postea habitæ ejusdem glandulæ a gonorrhœa vitiatæ Observationes. Quarum duas potissimum juvat proferre, alteram Brunneri (h), Geneslii (i) alteram. Hi enim cum de excrecentibus in urethra earunculis inter se adeo discrepant, ut has primus figmentum Chirurgorum esse, diceret, ut pote qui catheteris impedimentum in quadam, non a caruncula quæ nusquam erat, sed ab urethra insigni strictura, & coarctatione, seu ex aduisione, fuisse observasset ferme ut nos in Asthmatico supra (k) descripsimus; Geneslii autem qui in altero, ejusmodi quidem carunculam, nullam vero coarctationem vidisset, pro carunculis contenderet; cum in hoc igitur dissentirent; in eo plane conveniebant, quod secundus in suo, qui post virulentas aliquot gonorrhœas in novam incidere, circa prostates diversâ invenerat ulcusculum, & primus, quod in suo præter summam ibi quoque meatum angustiam, viderat circa prostates miram cicatricum ex ulceribus antiquis, inveteratis, tunc persanatis, faciem conspicuam fuisse. Quod vero ad Seminalem carunculam ipsam attinet, non in Sepulchreto dumtaxat habes (l), ut Vesalius hac in Urbe extremos ambos fines vasorum semen deferentium qui in lateribus carunculæ conspectum quodammodo in cæteris fugiunt, in quodam, hoc morbo laborante, apertis laxoque offenderit; verum etiam apud Cl. Benevolum (m) tum ejus Observationem in viro qui duodeviginti jam annos eundem pertulerat morbum, magni & callosi ulceris sic intra glandulam Prostata latentis, ut pus tamen per carunculam tantummodo emitteret, ulcere pariter intus erosam, tum Observationes alias (n) exulceratæ in gonorrhœa carunculæ ejusdem, ex Genga commemoratas. Caruncula autem, ut nosti, parva adeo est, vix ut ulcus esse in ea possit, quin amborum, aut alterius saltem canalē feminis finem corrodant, eique jugiter distillaturo viam sic vel magis aperiat, quam cum eorumdem canalium laxa nimium, patulaque sunt oscula. Ulcera vero quæ in Prostata sunt glandula, non omnia id faciunt; sed ea dumtaxat quæ hinc in illa ejus parte sunt per quam alter, ambove eorum canalium traducuntur, quæ pars pone urethram summa est, inde vero ulcerosis cuniculis actis, sibi, & puri, & femini aditum in urethra interiorē faciem aperiant, sive contra ab hac ad illos usque canales serpentes perveniunt. Cætera ejus glandulæ ulcera cum secreto in ea humore pus committunt emittunt aut per propria ulcerum ipsorum quæ intra urethram patere possunt, orificia, aut per naturalia glandulæ ejusdem oscula: per quæ, cum sine ulcere laxiora tantummodo sunt, solus ille humor, non pus, non semen, effluit. Atque hæc attigi, ut veterum nostrarum vestigia quæ mihi aut in ea glandula, aut in caruncula, aut in utraque videre contigit, vel me tacente, intelligi liceat quo attinerent.

18. Et primum quidem offendi superficialia, veluti albidas illas exstantes lineas, excrecentiarum, ut opinor, reliquias, aut tres illos perbreves sinus quos supra (o) in decrepto Sene descripsi: alia autem profunda, & profus abdita, ut ex proxima cognosces historia.

19. SENIS cadavere usus sum A. 1742. ad Anatomen publice inchoandam, cujus quoniam morbi qui fuissent, scire pro certo non potui; ideo quæ præter naturam inveni, pressius indicabo. THORAX cor habuit magnum, & crassis parietibus, arteriæ autem Aortæ initium æquo latius, & creberrimis intus maculis distinctum albis, quasi tendineis, necdum offeis. Venter autem, ante perlustratus, in eadem arteria obtulerat ejusdemmodi, sed leviores, maculas; si duriorē excipias unam quæ ad orificium erat arteriæ Sacrae, ipsamque angustius quam ejus esset trunculus, videbatur reddidisse. Quæ, & qualia pylori annulo infiderent corpora, glandulæve extarent in pylori antro, cum scribendi occasionem habuerim Epistola XXIX. (p) nihil est causa cur hic reperam. Jecur facie convexa propemodum tota cum diaphragma-

te erat connatum. Lien iusto crassior, & latior, colore intus coccineo diluto, arteriosis autem qui cum subibant, ramis ipsis quidem flexuosis, sed toto unde veniebant, Splenicæ arteriæ trunco nullis profus flexibus contra atque solet, contorto. Renes pro latitudine iusto longiores. Vesicæ crassiores tunica. Denique Prostata glandula ea parte qua urethra anteriora tenet, inclusam penitus intra suam substantiam habebat caveam, mediocris uvæ acini figura, & magnitudine, cujus parietes eodem quo reliqua glandula, colore, membranula quadam, quasi tumoris folliculo, conveſtiti videbantur: nihil autem continebant.

20. Quid hoc cavo olim comprehensum fuisset, & quomodo postea inde abiisset, cum esset obscurum; in memoriam redi, quid anno ante in Sene altero vidissem, de quo ubi de Febribus (q), ad te scribam. Scilicet in Prostata glandula amplificata, & exteriorē ambitu ex rubro fusca, intra substantiam reliquam, cæteroquin secundum naturam se habentem, granula alicubi inveni quasi tabacici ex sublavio nigricantia. Erant hæc haud procul ab interiorē urethra facie, alia quidem hoc illuc disjecta, alia autem in unum cavum, eo de quo modo dictum est, multo minus, conspata. Num ergo illud quoque majus cavum istiusmodi plenum granulis fuisse, credemus? Sed quid ea granula sunt? in pluribus enim, neque tunc primum, deprehendi. Et in Adversariis (r) quidem pro humore habui qui in Prostata feceratur, in eam formam coacto: nec esse quidquam video, cur in præsentia quoque non habeam. Verum quæ causa sit unde formam, coloremque sic mutet, prægressane olim venerea lues, an vitii aliud genus, in medio relinquo; ut illud pariter de quo suspicio in aliis Litteris (s) injecta est, an ea granula materia interdum esse possint calculorum qui in hac glandula reperiuntur. Nunquam tamen intra ipsam, majorem eorum granulorum copiam offendi quam in Figulo, ut relegendis Epistolam VII. (t), facile cognosces: in quo antiquæ huius tribus ob nullum ad glandem superfluit fructum vestigium, deliberabis, non secus atque in Sene de quo Epistola scriptum est XXIV. (u), cui cum vix unus, isque tenuis, superesset de majoribus urethrae canaliculis, ea granula non deerant ad latera carunculæ Seminalis. Placet huc alia duo adscribere exempla in Viris qui tamen quibus obnoxii fuissent affectionibus, omnino propemodum ignoro, quæ tamen in aliis quoque corporis partibus haberent ab naturæ norma aberrantia, non reticebo; neque enim profus inutile, ut alibi quoque vidisti, cenſeo, præter naturam inventa commemorare saltem ut quæ sæpius, quæ rarius in certis ætatibus, & habitibus corporum, morbida occurrant, comparatione instituta cognosci liceat.

21. VIRI annos nati quatuor & quinquaginta quem apoplectica affectio lente fecerant, cadaver A. 1728. Gymnasio est datum, unde Publicæ Anatomes initium fieret, donec meliorum cadaverum copia esset. Itaque Caput non attigimus. Quæ Venter, & quæ Thorax quoque ex parte, adnotanda obtulerint, hic habebis. INTESTINA quidem laxa erant, & quasi inflammata: nullum tamen aut ipsa, aut ventriculus erosionis habebant indicium, ut recens causa aliqua credi posset id quod in Duodeno describam, effecisse, præsertim cum pus, gravis odor, crassitudo, & inæqualitas laborum, aliaque omnia ulceris indicia abessent. Intervallo gemini transversæ digiti infra pylorum locus erat in quo interiores deerant intestini tunica, sicque orificium relinquebatur digiti capax, quo immisso, facile extrorsum cedens tunica omnium extrema in quoddam quasi diverticulum formabatur. Lien sanus; sed multo minor iusto, & plane exiguus. Arteriæ Magnæ truncus intus habuit quæ parte lumborum vertebris adhærebat, squamas offeas non mediocres: idem tamen intra thoracem, non secus ac cor, sanissimus fuit. Vesica urinaria æquo minor pro reliqua corporis magnitudine. Nihil in urethra animalis peculiare, nisi granula quasi tabacici ad oscula Prostatae glandulæ.

22. VIRUM alterum, illo aliquanto juniorem quo cor-

corporis habitu, & unde mortuum, & ubi, & quando fecerim, obiter dixi, cum de hæmorrhoidibus ipsis scriberem Epistola XXXII. (*); ut quid in summa urethra viderim, hic addere fatissit. CARUNCULA Seminalis ad latera habuit ea de quibus loquimur, granula, a quorum aliquibus loci madore, ut opinor, dissolutis non vicina modo reliqua, sed & seminalium ductuum oscula flavescerebant. Animadverti simul, hæc oscula multo quam soleant, fuisse ampliora, figura autem elliptica. Unum vero ipsorum paulo quam alterum, majus erat.

23. Nunc quoniam de caruncula ipsius vitii sermo fieri coepit, possem, nisi supra (y), aut alias (z) faciendi occasionem jam habuissem, vitia alia his quæ modo dicta sunt, contraria duorum quæ in ea sunt, osculorum proponere, viderelicet ut alterum multo majori quam soleat, angustia viderim, alterum profus occlusum, imo ut neutrum, atque adeo ne majus quidem, ipsi interiectum, Sinus orificium obdeformatam a veteri huc carunculam, dignoscere poterim, ac demonstrare.

Habes igitur quas pollicitus initio sum, quales eæ cunque fuerint, meas ab uno ad alterum urethrae extremum Observationes in iis qui gonorrhœa aut tunc laborant, aut olim laborassent, aut etiam laborasse videri possunt. (*)

24. Non me fugit, vel extra urethram, eique propiores glandulas, alias huic morbo sedes in seminales Vesiculis, in Testibus, imo in Urinaria etiam Vesica, & Renibus fuisse assignatas. De quibus singulis cum pauca cursum attigerim; his Litteris finem imponam.

25. De Seminalibus Vesiculis, præter Majorum, & in his Rioli, qui in Sepulchreto (a) laudatur, sententiam, Observationes habemus Littreii, si quod promiserat (b) cum de Gonorrhœa ageret glandularum Cowperi, præstitisset. Cæterum proclive est intelligere, a caruncula, & Prostata glandula, cum seminis canales, per hanc traducti, & in illa hiantes, erosi sunt, facile morbum posse cum Vesiculis communicari. Cujus rei nobis tunc fortasse indicium extitit, cum in Juvene (c) annos nato viginti quinque, strigolos adeo atque exsuccas contra atque ætas illa fert, Vesiculas deprehendimus: eadem enim virulenta inflammatio quæ extremorum seminis ductuum alterum olim contraxerat, alterum obcæverat, in Vesiculas propagari potuit, easque vitari. Noli tamen quotiescunque alicui, longa & dira gonorrhœa laboranti, accidit, ut in venereis somniis effundat semen sanguinolentum, foetidum, & sordibus, ac pure inquinatum, noli, inquam, propterea continuo credere, vitium ad Vesiculas jam pervenisse; potuerint enim aliquando purulentæ, & foetida sordes, & cruoris aliquid a tranſeunte, sano aliquo, semine abripi, atque averri ex ulceribus quæ urethram, & Prostata glandulam, & Seminalem carunculam occuparent. Ab his enim ultimis ipsis ulceribus non semper necesse est, vitium cum Vesiculis communicari; tamen non difficile communicari posse, diximus.

26. Sed num pariter facilis est a Vesiculis in Testes morbi transitus? Ab illis in hos, cum vi adstringentium remedium exitus intercipitur, virulentam regurgitare materiam, eoque tumere ipsos, & ex parte sedem esse gonorrhœæ, docuit Whartonus (d); huius enim verba sunt, quamquam id minus perspicue in Sepulchreto (e) significatur, quæ ferme describit, non modo secutus est Graafius (f) tunc etiam cum ad id confirmandum, gonorrhœam femininarum procul dubio, ait, cum proſtatis careant, a testibus provenire. Hanc tamen confirmationem Graafius postea (g) abiecit, necesse est, cum mulieres & prostatas habere, & fluído in testibus semine destitui, tradidit. Quod si Whartono, aut Graafio tunc cum Whartonum sequebatur, in mentem venisset Observationis Panaroli (h), qui in mortua post assiduam gonorrhœam, inventam scribit vomica in uno quoque testis; hinc etiam fortasse pro opinione ista sua argumentum duxissent; infirmum tamen, quando, non ut

Bonetus isti, haud accurate descriptæ, Observationi (i) titulum fecit, Gonorrhœa muliebris a vomica in uno Teste genita; sed longe alium præscripsit Panarolus, Vomica in testibus mulieris ex antiqua gonorrhœa. Scilicet ut alias in partes, sic in ovaria quoque traduci potest ex diuturnæ gonorrhœæ sede venerem virus posteaquam sive per lymphæ ductus, sive per vasa sanguifera absorptum, sanguinem infecit universum; neque enim magis quam alia complura quæ apud Vercellonum leguntur, placet illa quam excogitavit (k), via a vagina per hypogastricas arterias ad ovaria, quasi arteriæ e partibus juxta quas tranſeunt, aliquid acciperent in ulteriora importandum. Non est igitur ex Panaroli Observatione gonorrhœæ sedes in muliebribus testiculis ponenda. Num vero saltem in virilibus? Minus difficile aliquanto; si id tamen alia quam eorum tumoris observatione, quando adstringentium vi suppressa est gonorrhœa, comprobetur. Minime enim necesse est, ut si materia cujuslibet repentinam, violentamque suppressionem tumor partis alicujus consequatur, eo continuo decurramus, ut ex tumente nunc parte eam materiam antea profuissæ, aut in illam nunc regurgitasse, affirmemus. Posse tamen intempestiva adstringentium vi auctam irritationem, aut inflammationem a suprema urethra, ad junctisque Vesiculis per vasa, semen deferentia, ad testiculos propagari: & posse quoque, idque facilius, & citius, eo usque produci, ut inter ea vasa, & Vesiculas viam seminis ferme interceptat, a quo propterea retardato testiculi distendantur: & posse denique materiam quæ per urethram exercebatur, sanguinis alveum subire, & cum sanguine in testiculos inferri, non negamus. Sed modorum horum trium esse unum vides, nempe secundum, per quem tumere quidem testes, intelligas, neque tamen venereo contagio infici, & quod consequitur, non fieri sedem gonorrhœæ virulentæ.

27. Non paulo autem longior est via ab urethra ad renes, quam ad testiculos: & malum tamen, si diutius perſisterit, ab urethra ulterius serpere, & vesicam, ureteras, & tandem ipsos etiam renes inficere, Dodonæus (l) affirmat. Huius enim verba esse, animadverti, quæ in prima Scholii particula ad Observationem IV. leges huius Sepulchreti Sectionis XXXI. ab ipso Dodonæo sumptam; sed neque ibi, neque titulo ad quem amandamur, de Hypogastrici Doloribus, id est Sectione XXIII. ubi sub Observatione habetur VI. §. 4. ex toto descriptam, cum de urethra universa exulcerata, & sanguine concreto plena neutrum ulla mentio fiat. Verum ut ad renes usque serpat malum, diuturnitas, ut vides, a Dodonæo requiritur: & gonorrhœa quæ Observatione illa proponitur, annos perſisterat duodeviginti. Quo tamen modo, ubi vesica exulcerata est, vitium per urinam vel multo citius possit cum ureteribus, renibusque communicari, alia a nobis Epistola (m) indicatum est: quo ex loco quædam posses tanquam conſeſas, si opus esset, prudenter accipere, & ad hanc Dodonæi Observationem; ut tres nostras non ita dissimiles (n) omittamus; accommodare. Nam in gonorrhœa tam diuturna, tamque atroci, quæ dysuria, & quæ interdum stranguria esse debuerit, satis apparet, vesica autem plane rigida (non plane frigida, ut ineptissime descriperunt operæ in Sepulchreto nec extendi, nec contrahi poterat. Sed & salva vesica, a gravibus, & repetitis gonorrhœis renes posse vitari, vel ex ea evidenter elucet Vallæ historia, quam inter initia ejusdem Epistolæ (o) proposuimus, non serpente igitur ex urethra malo, sed vias sanguinis subeunte, per easque ad renes traducto. Cæterum utcunque se res habeat; non propterea vesicam, ureteres, renes gonorrhœæ sedem esse, putabimus, tum quia nihil seminis, aut humoris ad semen atinentis ex iis profuit partibus, tum etiam quia ex iis distillans ichor nequit, nisi forte vesicæ sphincter sit laxus, aliquando ferme sine lotio guttatim in urethram venire, & mentiri gonorrhœam. Sed manum de tabula. Vale.

(g) in Schol. ad Obf. 4. (h) Eph. N. C. Cent. 1. Obf. 97.
(i) Exund. Cent. 6. Obf. 84. (k) n. 10.
(l) Sect. cit. Obf. 2. (m) Propos. int. alla Carunc. c. 3.
(n) c. 5. (o) n. 15. (p) n. 17. (q) Epist. 49. n. 18.
(r) IV. Animad. 14. (s) Epist. 42. n. 37. in fine.
(t) n. 11. (u) n. 6.

(*) n. 10. in fine. (y) n. 7. (z) Epist. 40. n. 29. (A) Vid. etiam Epist. 60. n. 12. (a) Sect. hac in Schol. ad Obf. 4.
(b) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1711. (c) supra, n. 7. (d) Adenogr. c. 31. (e) Sect. hac Schol. 2. ad Obf. 5.
(f) Ibid. Schol. ultimo ad Obf. 1. (g) De Mulier. Organ. Generat. c. 6. id fine. (h) Pentec. 1. Obf. 14.
(i) 6. in Sect. hac. (k) De Pudent. Morb. c. 3. §. 3. (l) Medica Observat. c. 41. (m) 42. n. 23.
(n) supra, n. 15. & Epist. IV. n. 19. & XLII. n. 40. (o) n. 2.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XLV.

Agitur de Uteri tum descensu, tum, ut mulieres
ajunt, ascensu.

Quod scripsit Hippocrates (a), Uteri quocunque e sede naturali moti fuerint, morbos afferunt, siue foras processerint, siue intro cesserint, hujus erit Epistolæ argumentum, quæ duabus proximis Sepulchre- ti Sectionibus respondebit, XXXII. de Uteri Procidencia, Descensu, & cat. & XXXIII. de Hystericiis Affectionibus, Suffocatione, & cat. Visum est enim unis Litteris bina hæc morborum genera comprehendere, ne æquo breviores aliquin forent, quando nec Valsalva dissectiones huc attinentes reliquit, & nos perpaucas habemus, quas tu, quales cæcunque sint, animo, ut soles, libenti accipe.

2. Primum igitur, quod ad uteri prolapsus, descen- sumve attinet, præclare nosti, Fernelio (b) tunc uteri descensum esse, cum deorsum quidem, sed necdum ex- trorsum se demisit, prolapsus vero cum se invertens præcipit foras, quod ex vehementiore solum pariendi conatu accidit, nisi quod interdum ex imprudentis quo- que obstetricis, secundas violenter detrahentis temerita- te. Rem plane absolvisset, si prolapsus alterum genus non omisset, tum videlicet cum se non invertens, sed intra inversam vaginam conclusus uterus extrorsum pro- labitur. Nam in descensu quoque vagina tantum se in- vertat, quantum uterus descendit, necesse est. Hæc au- tem se invertit ob eandem five externas, five internas, ob quas uterum descendit, causas, vincula scilicet utrius- que simul aut distrahentes, aut laxantes. Quas inter causas quomodo ipse quoque uterus, ipsaque vagina re- censerit possit, infra (c) ostendimus. Præter hos veros uteri five descensus, five prolapsus, vaginæ etiam pro- lapsus est, non levior modo, sed nonnunquam tantus, atque ejusmodi, ut quem secundo loco memoravimus, uteri prolapsus mentiri possit, qualem descriptum, pictumque videris ab Jo. Guiljelmo Widmanno (d) qui a sola factum intima vaginæ tunica inve- nit.

3. Hæc morbi genera omnia apud vetustis quoque Medicos agnoscentis commemorata, imo apud vetustis- simum omnium Magistrum Hippocratem, si prolapsus illum excipias in quo uterus se se invertit. Quem tamen a Celso (e) indicatum esse, IV. in ipsum Epistola satis vi- deor ostendisse. In Hippocraticis autem libris non modo vaginæ prolapsus, uterorum nomine foras prodeuntium (f) memorari, curatio ipsa monstrat, sed & verum uteri ipsius descensum, & secundum prolapsus genus verba illa, Si vero propinquissimum fuerint uteri (g), & Si peni- tus expulsum exciderint uteri; dependent velut scrotum (h). Si vero extra pudendum os uterorum exciderit & cat. (i) Hæc fere omnia cum a posteris ad patrum us- que nostrorum memoriam sine ulla dubitatione jure meri- toque servata essent; imo plures, alii aliis temporibus, pro- pendentem uterum extirpatum esse, salva muliere, ne- que id rarissime, nimia plerumque, ut verum fateamur, credulitate non dubitasset, ne de illis quidquam dicamus qui eo usque processerant, ut ab ipsa postea mu- lieribus liberos nihilominus, si Superis placet, procrea- tos esse, contenderent; extiterunt denique, ut ex Sepulchreto ipso præclare noveris, in Re Anatomica, & Chirurgica exercitati Viri, qui ut recte se nimia alio- rum credulitati objecerunt, ita non recte in contrarium adeo cecurrerunt, ut non modo concedenda quædam, verum insuper sana illa de uteri prolapsu antiquissima dogmata ipsa quoque pernegarent, & quod magis mi- rum est, aliquot celebres utriusque illius Facultatis & Me- dicinæ Magistros affectas suos facerent, & astipulato- res.

4. Nam uterum quidem, superstiti muliere, nonnun- quam extraordinario & rariore casu excisum esse, cur non potius cum Georgio Wolff. Wedelio (k) dicamus, quam nunquam cum Jo. Guiljelmo Pauli (l), doctæ aliquin hac de re differente? Nimis enim durum videtur de tot qui illud ab se factum, conspectumve scripserunt, om- nes deceptos pronunciare. Certe autem si edita tunc fuisset, aut ad ejus manus pervenisset Slevogtii Obser-

vatio (m), hanc saltem non fecus ac Abr. Vaterus (n), agnovisset omni deceptione carentem. Magnum enim corpus e mulieris naturali exsecum, cum excrecentiam esse, putaret Slevogtius, & a fordibus purgaret; præ- ter opinionem deprehendit, theca instar crassæ uterum cum tubarum reliquis continere secundum naturam se habentem: quæ Jansenes Professores, & Medici plerique alii, & Studiosi centum conspexere: mulier autem illa feliciter est restituta. Quod si me interpelles, querendo, cur neque hanc, neque aliam aliquam aut magna ex sec- tis non modicis uteri vasis hæmorrhagia continuo sustu- leri, aut paulo post grave vulnus, quod propendens simul cum utero vesica, huic quoque necessario inflandum ef- fe, animadvertit Ruyschius (o); ad primum fortasse di- cam, distractis diu, eoque contractis vasis, & corruptio- ne insuper sensim, ut in mortuis sphacelo carnisbus, ad- juvante, non multum sanguinis debuisse profundi, ad al- terum autem, vel inversam superiore dumtaxat parte fuisse vaginam, vel non exteriori quacum vesica conjungitur, sed intima solum tunica inversam, ut vesicam trahere secum non debuerit. Quæ si fieri potuisset, non probas; neque enim mihi undique placuit; meliora ipse per te que- res; videndum est enim, ne Slevogtio, & siquis præte- rea alius est Vir Spectatus qui se diligenter aut in exciso corpore, aut in cadavere examinasse rem tulerit, nullam tribuere fidem videamur. Quod examen ut facile, & bene poterat, vellem instituisse Molinettus, qui (p) se tutissimam semper esse expertum, & adhibuisse pluries, di- cit, uteri amputandi rationem, in vetulis præsertim: in quibus inversio uteri, de qua hæc ait, quanto rarior est, tanto post amputationem examinanda erat diligentius, ne forte aliquid erroris subesset, cujus suspitionem per- petua illa curationis felicitas videtur augere. Est etiam multo recentior altera inversi uteri, feliciterque excisi Observatio, in qua examen omisum nolles post excisionem, cum ante hanc casus iste similis fuisse dicatur casui, ex Wepfero in Ephemerides relato Inelytæ Nat. Cur. Aca- demie Dec. 2. A. 5. Obf. 50. ubi tamen non modo non invenias uterum inversum, sed excrecentiam quam Wep- ferus ipse ad vaginam potius quam ad uterum attinere potuisset, indicaverat (q), imo ex iis quæ intra biennium postea eidem mulieri acciderant, attinuisse, con- firmaverat (r). Nec vero inversi dumtaxat uteri, sed & extrorsum cum vagina prolapsi in vivis, mortisque diligens est requirenda examinatio, præsertim postquam ex laudata (s) Widmanni Observatione constat, solius inversæ vaginæ prolapsus ita imponere interdum posse, quasi intra ipsam uterum simul prolapsus esset. Nam si Ruyschii Figuras (t), secundum huic casum expri- mientes, cum Widmanni Figura conferas quæ primum repræsentat; nihil invenies discriminis; ut alia omit- tam; in eo quod præcipui signi loco ad alterum ab altero internoscendum habebatur. Scilicet internum ute- ri osculum in media infima prolapsi corporis parte, ut in Iconibus est Ruyschii, sic in ea Widmanni a te cer- ni, credas, cum tamen a sola vagina effectum fuisse, dis- sectio ostenderit, quæ vaginæ interior tunica, crassior facta, ipsa quidem prolapsa, uterus autem in sua natu- rali sede inventus est. Quæ ratione igitur, inquis, in viva femina rem hanc internoscemus, magni utique momenti ubi de amputatione oporteat deliberare? Idem quod tu, quævisit Abr. Vaterus (u). Sed nihil constituit: imo obvium quoddam signum inutile esse posse, indicavit, fretus eadem Widmanni dissectione. Mihi vero ex re qua- dam alia quam ante sectionem animadvertens Widman- nus, dubitare cepit, num id quod videbatur uterus, revera esset, mihi, inquam, cogitatio orta est ex ea ipsa re signum petendi, ut cognoscamus, uterus sit, an non sit: Nimirum per osculum quod uteri esse, incer- tum sit, specillum oblongum immittenti si idem quod il- li accidat, ut sine obstaculo adigere possit multo ultra na- turalem cavæ uteri longitudinem, nec tamen propendens corpus hanc superet, neque interiori jam sit putrefactione

alte

alte exesum; indicium, opinor, habebitur, ut in re am- bigua, & perdifficili, non contemnendum, illud osculum, non ad uterum, sed ad vaginam dumtaxat pertinere: con- tra vero, si contra. In mortuis autem si rem sapius cul- tro examinasset qui uterum nunquam descendere, aut prolabi, contenderunt; non omnes aliorum Observatio- nes ad vaginæ unius prolapsus, aut ad ejus, & osculi uterini excrecentias referri oportere, censuissent; quasi vero præter ea quæ ipsi viderunt, aliud videre potuis- set nemo.

5. Facile quidem, utroque ipsis damus, eos qui ute- rum abscondisse se, scribunt, fere omnes illiusmodi aut excrecentiis, aut vaginæ prolapsibus fuisse deceptos, quod, velint, nolint, illi quoque fateantur, necesse est, qui post excisionem, mulieres filios peperisse, tradiderunt; nisi forte res longe rarissimas duas in unam eandemque mulierem cecidisse, contenderent, ut exciso utero fuis- set superstes, & duplicem a primordiis uterum habuis- set. Sed ut dicere ingressus eram, num ex eo quod in excrecentiis, vaginæ prolapsibus pro utero accipien- dis tot Chirurgi decepti sunt, num, inquam, illud con- sequitur, deceptos pariter esse omnes qui uteri descen- sum, prolapsumve se vidisse, scripserunt? Quod vero non consequi, cum ratio ipsa, tum evidentissime ostendunt Observationes quam plures ad aliquot addenda quæ in Sepulchreto producantur. Illas, vel me tacente, in- dicabit Slevogtius (x), & copiosior in iis colligendis quæ ad hanc Sepulchreti XXXII. Sectionem attineant, San- denius (y): in cuius Sectionis Additamentis mirum in primis est, eas Observationes deesse, quæ ex Ruyschia- na Centuria excerpti eo tempore potuissent, non secus ac quæ ex pervulgato Bohnii libro mox a nobis com- memorabitur. Ad has adjicies quæ tunc non extabant, partim supra indicatas, partim infra indicandas, præte- rea quæ alias five descensus uteri, five prolapsus, ad quas pertinent Vateri (z) una, Cl. Phil. Adolphi Boehme- ri (a) altera, amba, ut cætera, per dissectionem evi- dentissime comprobata.

6. Cæterum est Medici quidem, & Chirurgi, ut in illa Epistola (b) in Celsum dixi, aspectus inversi uteri nimis est rarus, idque rarissime evenire, Graafius (c) scripserat; Obstetricibus tamen, imperitis præsertim, & in puerperis certarum regionum haud rarissimum esse, ex libris intelligo, in primis quæ ex II. Adversariis Ruyschii Decade (c). Inde etiam patet, non semper aut ex illarum imperitia, aut ex harum vehementiore pariendi conatu inversum uterum extrudi, sed a cona- tibus quoque exonerandi uteri post partum. Est prætere- ca causa alia, sed quod ad affectum hunc attinet, longera- rissima, nimirum cum ampla excrecentia, fundo uteri intus innata, suo pondere invertit uterum, deorsumque trahit, quemadmodum Sandenius quidem proposuit (e). Certe autem cum uterum fuisse inversum, anatome ostendit; nam intra ejus cavum, illa facie comprehensum quæ exterior antea fuerat, uteri vincula, & Fallopii rubæ, & ovaria conclusa deprehenderunt. Quæ ratione facilius intelliges, quomodo in Henrici ab Heer relata in Sepulchreto (f) Observatione in uterum, ab aggra- ta exsecum, prolabi potuisset pars non modica intellini Coli, & simul cum illo, ut quæ intra ipsum inversum contineretur, amputari. Colliges etiam ex Sandenii Ob- servatione (g), posse nonnunquam mulierem inverso, nec reposito, utero, hebdomadas plures vivere, imo ex Genslii Curatione (h) post plures dies in suam denique sedem restitutum, servari. Verum hæc rara sunt, si cum tot aliis cito funestis casibus conferas, ad quos addenda est producta a Bohnio (i) primiparæ mors intra horulam consecuta violentam uteri sua sede, vacua inventa, de- tractionem, & vel citior, si recte intelligo, in femina a- lia de qua ex Champan refert laudatus Boehmerus (k).

Alter quoque uteri, id est sine inversione, prolapsus neque adeo creber est, ut integrum ejus Observatorum catalogum retuleris Blasius in commentariis ad Veslingium, quemadmodum hallucinatus scripsit Graafius (l), nec rur- sus adeo rarus est, ut præter Ruyschium viderit nemo, quod Widmanno (m) haud excidisset, nisi obli- to, ut sit, Observationum Plateri (n), & Peyeri (o). Descensus potius uteri, & prolapsus vaginæ potissimum, haud raro occurrit. Itaque inversi uteri prolapsus non nisi femel, non inversi nunquam mihi accidit, Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

ut hic audirem. Descensum autem uteri, & vaginæ pro- lapsus tum in viventibus interdum vidi, tum in mor- tuis animadverti.

7. Rogatus, ut honestæ feminae annos natæ viginti quinque, naturalia inspicerem, ut quidnam esset corpus teres, penis simile, intra vaginam propendens, digno- scerem, continuo esse uteri cervicem vidi, quæ infra me- dium vaginæ descenderat. Uteri osculum, quippe in nu- pta quidem, sed quæ nunquam peperisset, angustum erat, & circuli propemodum forma: ex eoque paucillum fan- guinis exire conspexi; nuperrime enim in menstruis mu- lier fuerat; ut si quis forte dubitaret, an hæc ex utero prodeant, posset illa inspectione convinci. Sed jam quæ in mortuis animadvertimus, bestiis primum, deinde & mulieribus, proponamus; sic enim non a solo pondere, sed a causis etiam aliis quæ in corporibus a- gant secundum finitorem positæ, hæc mala fieri, per- spicuum erit. A Valsalva autem quod primum scri- bam, olim accepi.

8. CATELLAM prægnantem cum dissecaret, inver- sam offendit vaginam, conjunctumque uterum non pau- lo quam solet, vaginæ orificio propiorum. Quam sedis uteri mutationem hujus quoque cornua, & præ- sertim dexterum, in quo tres erant catuli, confirma- bant. Secuta enim erant uterum, neque modico spa- tio, vaginam versus.

9. VACCAM, quæ vaginæ prolapsui obnoxia fue- rat, ob hanc ipsam causam dominus mactari voluit, cum gravida esset mensis jam circiter septem, veritus, ne in partu moreretur, sicque ejus viscerum, & carni- um pretium vilis fieret. VAGINAM cum utero na- ctus, illam inversam ad tractum aliquem inveni qua cum extrema uteri cervice connexa est. Ibi vero vagi- na exulceratione non carebat. In utero, & fetu, quo- niam secundum naturam se habebant, quæ adnotavi, huc minime attinent.

10. Sed sicuti in his brutis non poterat morbus pon- deri imputari deorsum urgenti, aut trahenti; ita in mu- lieribus sæpenumero posse, reor, velut in hac de qua protinus scribam.

11. ANUS Bononiensis hemiplectica plures jam an- nos hæcenus fuerat, ut totum alterum corporis latum movere non posset, cum denique in altero quoque movendi facultatem amisit. Eidem ex naturalibus teres quoddam corpus existare dicebatur. Novissime thoracis morbo con- fectam in Nofocomio dissecimus circa A. 1704.

THORACEM, aliis occupati dissectionibus, non atti- gimus. Caput vero, ab Amicis apertum, nihil adno- tatione dignum habuit, præter serum Crassam inter me- ningem, & Tenuem. Ipse Thyroidea glandulam, quippe tumentem, & præduram, & Ventrem, quod ad ute- rum, & reliqua genitalia attinebat, diligenter inspexi. In illa glandula quid deprehenderim, satis est alibi (p) ostensum.

In Ventre autem summum uteri fundum aliquanto inferiorem quam par esset, obtinere sedem, animadverti, nec tamen tanto, ut posse ejus osculum illuc quo dicam, pervenire, suspicarer. Extra naturalis multum dilatati labia corpus tres quatuorve transversos digitos longum prominebat cylindri forma, valde crassum, factum ex substantia, ligamenti simili, & lævigata, nisi qua ad anum exulcerabatur. Esse vaginam inversam, fa- cile agnovi. Itaque ad summam anteriorem ejus corpo- ris partem urethræ erat osculum, & sub hoc singula ab singulis lateribus satis patentia lacunarum foramina. In medio autem partis infimæ orificium erat, mox abiens in uteri osculum, per quod specillum ad summum usque cavæ uteri parietes nullo negotio trajiciebam. Mira- tus insolitam longitudinem, vaginam incidi, atque in- tra ipsam, conclusam reperi uteri cervicem, permulto quam solet, longiorem factam; nec mirum, cum cer- vicis ipsius, fundique uterini parietes non firmi, ut se- cundum naturam consueverunt, sed laxi valde essent, ac flaccidi, ut cætera quoque erant omnia, quæ in pelvi ad uterum attinebant.

12. Evidens est, vaginæ adeo crassæ pondere deorsum tractum fuisse uterum, cujus fundus aliquanto inferior fuisset, nisi cervix jam inde ab initio, ut puto, ea esset laxita- te, ut se præ cæteris distrahi, distendique in raram i- stam longitudinem sineret; neque enim cum hac erat, opi- nor, illa ejus longitudo comparanda, quam Vaterus (q)

M

ab

(a) De loc. in hom. n. 59. (b) Pathol. I. 6. c. 16. (c) n. 12. (d) Eph. N. C. Cent. 8. Obf. 98. (e) De Medic. in Præfat. (f) De Excessu. foot. n. 4. (g) De Morb. Muliebr. I. 2. n. 37. (h) Ibid. n. 38. (i) Ib. n. 39. (k) Differt. de Procid. Uteri c. 4. (l) Progr. addit. Diff. Schacheri de Placenta Morbis. (m) Vid. in calce Obf. von Sanden de Prolapsu Uteri. (n) Differt. de Sarcom. e pudendo muliebr. & cat. thes. 7. (o) Theat. Anat. 8. n. 103. (p) Differt. Anat. Path. I. 6. c. 12. (q) in Schol. ad n. 4. (r) Dec. ead. 2. A. 7. Obf. 94. (s) supra, n. 2. (t) Obf. Anat. Chir. Fig. 2. 8. 11. (u) Differt. de Polypo ex utero egresso thes. 10.

(x) Differt. de Muliere gravida lapsu vag. uteri & cat. §. 12. (y) Obf. supra ad n. 4. cit. (z) Differt. de Polypo & cat. ibid. cit. thes. 8. in fine. (a) Differt. de Prolapsu & Inversu Uteri, in Præfat. (b) IV. (c) De Mulier. Org. c. 10. (d) c. 10. (e) Obf. supra ad n. 4. cit. (f) Sect. hac Obf. 6. (g) §. 27. (h) Act. Erud. Lips. A. 1716. M. Maj. (i) De Renuco. Villner. Sect. 2. c. 4. ver. finem. (k) Differt. supra ad n. 5. cit. §. 12. (l) c. 10. cit. (m) Obf. supra ad n. 2. cit. (n) l. 3. (o) in Addit. ad hanc Sepulchr. Sect. Obf. 5. (p) Epist. Anat. 9. n. 39. (q) Diff. de Sarcom. & cat. supra ad n. 4. cit. thes. 3.

ab se visam indicat, cum uterum hinc prolapsa vagina deorsum traheret, inde vero enormis ovarii amplitudo ulterius descendere prohiberet. In femina autem altera quam tibi Epistola descripsi XXXIV. (r) aucta crassitudo, & quod consequitur, pondus glandosae urethrae corporis, uterum quidem aliquanto deorsum traxerat; sed quia cervix non ista erat laxitate, osculum non adeo descenderat, itaque glandosum ipsum corpus, in medio suae partis imae pertusum urethrae orificio, propendebat, uterique osculum mentiebatur. Nec sane ibi accusari poterat uteri pondus, quippe ea parvitate, & partium tenuitate. Quod cum dicimus, non ideo inficiamur, praegravem a pondere quod praeter naturam sit, uterum in aliis vaginam invertere, secumque deorsum rapere, cuius rei praclarum habes exemplum in Hartmanni Observatione quae inter Additamenta ad Sepulchreti XXI. Sectionem (f) relata est. Vides igitur, tum vaginæ pondus, distractis uteri ligamentis, hunc aliquando secum ducere ad inferiora, tum uteri pondus alias, nexibus vaginæ distractis, hanc invertere, secumque deorsum protrahere. Neque enim ea ligamenta, aut hi nexuses se se distrahi non patiuntur, cum membranae sint, & ab internis saepe causis laxiora, distractio autem, qua de loquimur, saepius longo tempore paulatim fiat. Magnus certe erat ille uteri prolapsus quem Peyerus (t) descripsit, cum uterus extra naturale provolutus, intra vaginam inverfam penderet. Nec tamen, egregius inquit Anatomicus, rupta fuerant uteri, & vesicae vincula, sed tantum laxata. Dixit autem & vesicae vincula, quia cum utero vesicam urinariam similiter mutata sede procubuisse, per dissectionem deprehendit: quod mirum tunc ipsi visum, & plane novum, necessario accidere in eiusmodi prolapsu generis, admonuit postea Ruyschius (u).

13. Quod si mira haec videntur quae tamen paulatim fieri solent, ut diximus, & longo tempore, illud non caret admiratione, quod, tamen multo minus sit, sit citissime, brevique tempore ab ipsa natura. In partu enim; ut verbis Slevogtii (x) rem eloquar; osculum uteri ad orificium vaginae propius accedit, hancque ex longo plicatili canali in amplum circulum distendit, transverso embryoni respondentem. Quin etiam ubi propter foetus crassitudinem, viarumque angustias tardius, aegriusque fit partus, tunc saepe numero per continuos natus parientis, osium matricis a capite infantis plane, & ad pollicem unum vel duos latos, extra vulvam propellitur; hoc enim, quod Munnickius rarius crediderat, satis frequenter sibi occurrisset, nec aliquid portendisse mali, testatur Slevogtii. Illud mirabilis, quod utero gravido extra naturalis oras intra vaginam inverfam propendente; foetus nihilominus editus sit, Cuius rei primam, quod sciam, Observationem, quae ipsius Harveii (y) est, ad alias addas quae a Cl. Sandenio collectae sunt: ad quas ea quoque spectat, quam postea proposuit Prael. Helmslandensis Professor Fabricius (z). Quae omnes est infervere possunt ad eos convincendos a quibus uteri prolapsus intra inverfam vaginam negabatur, non secus ac illa Observatio quam cum Widmanno (b) communicavit Cl. Friedius; hic tamen ex iis illas dumtaxat velim attendas quae uterum exhibent in ipso partu prolapsu. Minus enim de mirabilibus, vinculo eorum de quibus dicebamus (c), illas distractiones posse fieri quae sensim, longoque temporis spatio sunt, praesertim cum foeminae sic affectae molesto sensu non careant, illis distractionibus respondente, neque pristina facilitate aut Rectum intestinum, aut vesicam, aut utrumque exonerent: quam difficultatem in quadam cui vagina extrorsum propendebat, hanc sublevando emendatam, non tam a compressione eorum meatuum, quam ab ipsorum distorsione propter alligatas propendentes vaginae fibras in obliquum trahentes, & sic eorum cavum arcantes, repetebat Slevogtii (d). Ceterum si nexum vaginae multo quam sit, ampliorem faciebat, cum secundum totam suam longitudinem subjacenti intestino accuratissime adhaesi, existimabat (e).

14. Haud equidem dissimulo, quae alias (f) sunt a me dubitationes propositae, non penitus mihi posse eximi, nisi praevio examine accuratiori cadaverum his morbis laborantium, cuius instituendi facultas mihi a longo jam tempore non est data. Inter eos certe frequentissimum

esse fateor vaginae prolapsu, & hunc multis, pro uteri prolapsu imposuisse. Verum interiore tantum vaginae membrana, humorum affluxu laxata, & extensa, procidit? an utraque? Illud non modo plures, in quibus Wedelius (g), frequentius fieri, docent; sed & omnes, quod Widmannus (b) ait, consentiunt. Et sane ubi rem sic ponas; quaedam ex difficilibus facilia intellectu facis, quorum aliquod supra (i) attigimus, aliud Wedelius (k) indicavit. Sed interea, praesertim si prolapsus magna sit longitudine, multoque magis si ut Widmannus (l) proponit membrana interior ab summo ad imum penitus avulsa, deorsumque reflexa propendat; in illas alias quas alibi indicasse me, dixi, dubitationes incidat, necesse est. Nec tamen omnium simul parietum vaginae inversio facillimos habet explicatus. Praeterea, utrumlibet ponas; haud ita perspicuum est, post vinculoz, & nexum distractionis, quomodo interdum saltem, arte opitulante, recuperare haec partes queant pristinae sedem, in eaque permanere.

15. Ars autem praeter alia, interius, exteriusve adhibita, remedia, pennis utitur sive in annuli, sive in aliam formam quae foramen habeat, contructis. Neque enim, ut saepius in Recti intestini prolapsu, ita hic quoque licet praetermittere id auxilii genus. Hic enim duo sunt quae curationem reddant difficiliorem, utri pondus, cum antea procidit, inevitabile, repositam vaginam rursus invertens, & sphincter mulculus neque tam valide, neque tam arte vaginae orificium conclusum servans, quam anum suus. Itaque ergo vagina iterum extrorsum provolvitur, referens aut intestinum, aut aliud, ut puta, quemadmodum apud Hippocratem vidimus (m), serotum, quod & apud Harveium (n) referebat. Ut malum indecens, & perincommodum aut tollatur, aut certe occulatur, illi excogitati sunt pessi. Quorum si omnes cuiuscunque adhuc cognita forma, & structura, uteri prolapsu non modo non curarent, sed plerumque peiorem redderent, ut apud Virum Doctum legēbam nuper; jam diu a Medicis, & Chirurgis, ipsique mulieribus abjecti essent. Ego vero, ut alias (o) ad te scripsi, proficuum potius eorum usum, cum foeminam dissecarem, his obnoxiam morbis, animadverti. Neque tamen inficior, ubi aut violentius intrusi, aut inepte, ac perperam contructi sint, aut mortem, ut Benevolus (p) vidit, aut detrimentum afferre posse, praesertim si in eorum usu nihilominus foeminae diutissime perseverent, & ne abstergendis quidem, & purgandi gratia unquam extrahant. Vides in Commercio Litterario (q) quid duabus ob eiusmodi causas acciderit. Invenies, alteri circa glomum, quem intruserat, contortorum filorum tartaream quandam materiam contraxisse ea altitudine, ut undique tres digiti partes quartas aequaret, ea autem duritie, ut scalpro opus fuerit ad desquamandam; ea denique molestia, ut jam acerbissimam itranguriam induxisset; alteri autem a ferro pefso, quamvis cera, ut ille etiam glomus, obducto, vaginae, & proximi intestini ulcus ortum. Huc meam addam Observationem, quam tamen libentius inter alios ad quos magis attinet, morbos retulissim; si cum de iis scriberem, habuissim; attamen haud omittendam hoc loco censui, quippe huc extrema saltem parte spectantem.

16. MULIER consistente aetate, mediocri habitu, & statura, nullo alio incommodo quam catarrho a frigidi aeris injuria, laborabat, cum ad hunc accessit febris ob quam continuo in Nosocomium illata est. Acuta enim erat, & cum magna spirandi difficultate; genarum rubore, permolesto in thorace ponderis sensu, duriusculis pulsibus conjuncta. Incausum quae oportebat, facta sunt omnia. Expectorare, id quod unice optabat, nihil poterat. Humiles, & intermittentes pulsus sunt facti, respiratio autem difficilis adeo, ut novissime jacere non posset. Igitur quincto ex quo febricitare coeperat, die e vita cessit circa medium Martium A. 1748. CADAVER ibi, Studioforum Juvenum gratia, diligenter, & ordine perfectum est. Sed hic tibi quae in Thorace, & Capite praeter naturam invenerim, primum exponam. Etsi pulmones turgidi, ad pleuram costas succingentem fere ubique, praesertim autem a sinistris, arte adhaerebant; e sinistro tamen thoracis cavo serum, quod a pure admixto albicare libentius dixisses, si ulla poris hic fuissent indicia,

dicia, ea copia profluxit, quam septi transversi pars sinistra, non fornicata, sed potius depressa, cum a ventris cavea inspicieremus, antea significaverat. Eiusmodi pars feri peculiariter inter pulmonem sinistram, & pleuram qua prope vertebrae fere medias thoracis, costas vestiebat, ad non parvum tractum concludabatur, quo tractu albas concreciones, membranae instar crassissimae, tum pulmo, tum pleura adhaerentes habebant, eaque dumtaxat parte pulmo durior, densiusque factus, inventus est. Neque tamen agra de peculiari ad dorsum molestia querebatur, ut neque de pungente dolore, cum pleura utroque in latere roseo rubore ad non parva spatia ruberet, neque demum; nam haec omnia diligenter quaesivi; de cordis tremore, aut de animi defectionibus aut in Nosocomio, aut domi unquam conquesta fuerat, etsi in pericardio ea deprehendi quae continuo describam. Pericardium erat amplum, & fero ejusmodi plenum, quale in thoracis sinistra cavea fuisse, dixi; ut a primo non pericardium, sed apertum magnum quandam abscissum videre crederes. Eo fero exhausto, superficies omnis pericardii interior, exterior autem cordis, & auricularum, & Magnorum vasorum lura apparuit, obducere omnia materia quadam ex albo cinerea, nihil magis quam calcem, parieti modo induram, referente, ut continuo in mentem venerit Guarinonii, qui, sicuti alias (r) ad te scripsi, in huiusmodi inflammatoris pulmonum, & pleurae morbis cor quasi calce coopertum offendit, id est polyposus, ut ibi explicavi, & hic rursus vidi, concretionibus, membranarum crassam sed laxam, mentientibus, nullo negotio ut detrahendam, sic quoque disceperdam. Quae detracta, omnia quae operuerat, naturali colore, & constitutione in conspectum venere, nisi quod pericardium crassius factum erat, & subrubrum, id est non inflammatione quidem, sed phlogosi tamen affectum. Cor, aequo majus visum, nigrum, qualis passim in hoc cadavere occurrebat, sanguinem utrobique habuit, in dextero autem ventriculo, annexaque auricula etiam teretes polyposas concreciones. Cerebri medullaris substantia, quacunque incideres, ut & Lateralium ventriculorum superficies, vascula sanguine turgida ostendebant: in iidem autem ventriculis erat serum colore ad subflavum obsoletum inclinate. In Ventre hac adnotaveram. Lien grandis; jecur maximum, ut sinistram quoque occupans hypochondrium, ventriculum deprimeret; itaque gula, in hunc delinens, portio ad transversos digitos duos infra diaphragma apparebat. Sed praeter eam magnitudinem, vitium in illis visceribus percipiebatur nullum. In subiecto vena Cavae truncus oblonga, & crassa erat concreto polyposa. Tandem quod ad muliebria attinet, uterus sinistro lateri aliquanto propior erat, quam dextero, & antroforum concidebat. Ovaria praelonga, sed exilia, alba, dura cum eo iungebantur per sua vincula, non paulo quam soleant, crassiora. Quae per Lata uteri vincula discurrunt, vasa nigro sanguine nimis turgibant, hic illic varicosa. Cum a summo utero ad imum vaginae orificium sectionem perduxissem; fundi illius, & continuatae cervicis cavum muco plenum vidi, gelatinis instar ferme perspicuo, nulloque colore infecto, & eo tenuiore, qui ad uteri osculum esse consuevit, neque hic deerat. Muco illo superiore adempto, minima excrecentia, circuli ferme ambitu, ex rubro fusca, leviter exsistere conspexi est e fundi interiore facie. Dempto autem crasso inferiore muco, infima cervicis pars infolitis quibusdam lineis inaequalis apparuit brevibus, rubicundis, secundum longitudinem positus, & nonnihil prominentibus. Vagina etsi rugis a medio deorsum non carebat, erat pro statura, quam mediocrem fuisse, dixi, aequo longior, & latior, condebaturque ligneo annulo, prolapsus indicium, eo situ locatum quo alias vidisse non memini. Cum enim ellyplis forma esset; longiorem a xem secundum vaginae longitudinem statutum habebat, brevior autem, sed ita brevior, ut tamen multum distenderet utrumque latus vaginae, secundum huius latitudinem positum. Utrumque igitur eorum laterum quo loco ab annulo pressum fuerat, prominebat in excrecentiam, majoris amygdalae decorticatae forma, & magnitudine, duritie cartilaginea, albam, nisi quod eorum altera in medio livebat; ut proximam a scirrholia in peiorem naturam minari mutationem videretur.

17. Haecenus de uteris foras procedentibus; nunc, ut pollicitus sum (s), de intro cedentibus. Non puto autem, a te expectari, ut in hac tanta Anatomiae luce in errorem jam diu explosum, eiectionumque relabam, & cum Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

mulierculis illos credam ad septum transversum, & ad fauces ipsas, si Superis placet, ascendere. Sive Majorum aliqui, Galenum (t), qui ab eiusmodi erroribus alienus fuit, ut saepius solebant, secuti, verbis magis quam re, utero ascensum tribuerunt, sive alii a flatibus, convulsi intestini laxam partem aliquam in globi formam distendentibus, cum Fernelio (u) decepti, uterum in ventriculum efferri, propriis se manibus revera deprehendisse, affirmarunt; nos certe Hippocraticis retentis vocibus uterum intro cedentium, non uterum sursum tendentem, sed irritamentum dumtaxat ab utero, quo nomine tubas quoque, & ovaria hic complectimur, per nervos, membranase ad superiora ascendens nunc intelligimus. Sed quamquam Hysterica affectionis vocabulo hanc unam quam modo diximus, proprie designari posse, credimus; non tamen vulgari consuetudini adeo refragatur, ut cum iis alterari velimus, qui aliunde ortos varios saepe, ac multiformes foeminarum morbos eadem illa appellatione comprehendunt: quemadmodum neque cum iis alteramur qui vocare hos malunt hypochondriacos; tamen haud rarissime non magis in culpa sint hypochondria in illis ex utrobique sexu quos hypochondriacos dicunt, quam uterus in his quas hystericas alii nominant. Si quid utriusque commune est, vitium potissimum est in nervo, ut vocant, systemate: recteque fecisse Cl. Flenyngium (x) credimus, qui utriusque generis morbos uno eodemque accepit vocabulo Neuropathia. Itaque non miramur, cum saepe eorum insultus, non ab utero, aut ab hypochondriis; sed a terrore, ab indignatione, ab odore etiam aliquo repente cooriantur. Sic pariter intelligimus, quomodo eosdem opportune dato opio felicitate praeverterimus. Nam etsi ab imo ventre, atque adeo ab hypochondriis ipsis, & ab utero insultum origo esse videretur; propagatio tamen noxii motus per nervos certe, membranase fiebat. Exemplum in hypochondriaco Sacerdote praecipue opio recurrentis epilepsiae a me alias (y) habuisti. Nunc pressius quemadmodum auxilio eodem in foeminis duabus hystericois, quos vocant, paroxysmos praeverterim, commemorabo.

18. Matrona erat nobilis, sed inopia simul, & mariti absentia afflicta, cui plures jam filios pepererat floridiore aetate. Eam febres prehenderant intermittentes, quarum initium majore in dies frigore molestius fiebat. Ecce autem frigentem tanta spirandi difficultas occupat, ut non nisi erecta cervice id possit, nec sine stertore, eaque pectoris constrictione, ut se misere contorqueat, jam jam instare mortem, dicat. Credidit tunc agra, & qui agra adstant, ut frigus, sic etiam cetera quae dicta sunt, incipienti febre accepta esse referenda. Verum cum eadem, & graviora quidem vel extra id tempus saepe recurrerent, creberrimis, citissimisque totius corporis concussionibus stipata, eaque insuper ad guttur constrictione, ut quamvis acerbissime torqueretur, clamare non posset; quorū sensus spectaret, ob omnibus intellectum est. Vix diligenti, nec brevi, curatione insultus primum, denique & febres abegi. Interjecto, opinor, anno cum alia iterum febres, & aliquot post diebus priores illi redire gravissimi insultus coepissent, sed eadem quotidie hora; consilium cepi eos, si possem, praevertere. Itaque una ante illam hora laudani opiatum dimidiatum, haud amplius, granum dedi. Nullus eo die insultus, nullus duobus quibus idem auxilium repetitum est, insequentibus diebus. Quarto; ne quid dissimulem; morbus remedio validior fuit, an quod huic natura afflueret? Ceterum cum ille fuisset brevior, neque amplius rediisset, viresque minus afflictae essent; longe citius, atque facilius quam superiore anno, febrim profligavi.

19. Cur dixerim, an quod ei remedio natura afflueret, exemplum alterum monstrabit. Gracilis Virgo contumaci hepatis duritie, & cum hac conjunctis tot, tam variis, & tam diuturnis incommodis laborans, ut credere posset nemo intra adolescentiam non esse perituram, nedum ad decrepitam aetatem; nuper enim adhuc vivebat, perventuram, iidem annis quibus illa Matrona, a me tunc Medicum in Patria agente, quotidie propemodum invisebatur. Ad cetera enim mala, in quibus fuisse memini multo acerbiores quam in Matrona, dolores capitis, & sanguinem vel minus bene quam in illa, ex utero respondentem, febris accesserat quae tempore vespertino cum frigore quotidie redibat. Eo cum frigore postea cepit sensus angustiae pectoris, & respirationis difficultas ingruere. Quae intra perpaucos dies adeo aucta est, ut federe agram cogeret, & se contorquere, & brachia

M 2

ver-

(r) n. 11. (s) l. 3. Obs. 54. (t) Sect. hac 32. Sepulchr. Obs. 5. (u) loco supra indicat. ad n. 4. (x) Dissert. supra ad n. 4. cit. 4. & 5. (y) in Addit. ad Exercit. de Generat. ubi de Partu. (z) Program. quo facil. extraxi. foet. in procid. uter. (b) Obs. supra ad n. 2. cit. (c) n. 12. (d) Dissert. modo indicat. §. 16. (e) Ibid. §. 11. (f) Epist. 33. n. 15. (g) Dissert. supra ad n. 4. cit. c. 1. & 2. (h) Obs. supra ad n. 2. cit. (i) n. 4. (k) Dissert. modo indicat. c. 4. (l) Obs. indicat. (m) supra n. 2. (n) loco supra ad n. 13. indicat. (o) Epist. 22. n. 22. in fine. (p) Olfervaz. 3. (q) A. 1733. Hebd. 10. n. 5. & A. 1738. Hebd. 22. n. 1. ad Part. 7.

(r) Epist. 20. n. 37. (s) n. 1. (t) De loc. aff. l. 6. c. 5. (u) Patholog. l. 6. c. 6. (x) in Neuropathia. (y) Epist. 9. n. 7.

versare, & miserandum in modum conqueri, cum poterat; subinde enim haud poterat. Frustra fuerunt remedia cetera primum ne augetur insultus, deinde nerediret, donec ad laudanum opiatum confugi, cuius ope illum quotidie arcendo, post aliquot dies expertus sum, vel laudano omisso, non reverti. Die exinde vigesimo quarto cum reverfus esset iterum, cumque ego eadem ratione arcere, sed non eodem exitu, conatus essem; venit in mentem, non remedium, sed remedii formam mutare. Itaque una pariter ante horula tot guttis laudani opiatii Sydenhamii datis, quot dimidiato grano solidi prioris laudani responderent, voti compos ita sum factus, ut cum ceteris deinde malis, velut antea, non cum illo amplius insultu pugnandum fuerit. Sed minus in hac Virgine mirum fuit, opium abegisse paroxysmos evidenter convulsivos, quam in altera apud Riverium (z) hysterica Virgine eosdem cum gravi soporoso affectu conjunctos; imo quam in alia non modo cum affectu soporoso, verum etiam cum breviartuum paralyfi invadentes. Hos enim, cum cetera auxilia non prodessent, eadem qua Riverius, ratione sustulit Solers Feltrienus Medicus Guilielmius meus. Attamen in Riverii agra non deerant convulsiva symptomata; in hac autem ultima saltem periodicum totius corporis frigus. Quod vel unum pro convulsivo accipere non dubitabat in ipsis intermittentibus febribus Experiens Vir Berryat (a) & pro causa habere eorum quae alia in aliis sequebantur, ut si praevertere illud posset, hac quoque arceret, id quod dato una ante frigoris initium hora medicamento opium habente se consecutum esse in quamplurimis, testabatur. Congruere autem, intelliges, quatuor de quibus a nobis dictum est, foeminarum curationes, antequam ille scriberet, ad eundem modum peractas; si animadverteris, gravia cuiusque symptomata fere aut cum frigore quod febri praecederet, aut, sicut in ultima, loco febris redire pergeret, certa quotidie hora recurrisset.

20. Quid mihi in affectionibus hystericis praeverendis feliciter cesserit, expositum est. Sed contra, per quae illa interdum excitata sint, observantibus Hippolyto Francisco Albertino, & Joanne Hieronymo Zannichellio, ut ab ipsis accipi, non te celabo. Narrabat primus, ab infusione, quam vocant, fennae convulsiones hystericas, nec semel, vidisse obortas; quod facile credes, a vellicatis videlicet intestinis, & torminibus concitatis. Testabatur alter, quod nisi in odorem, neque eum tamen acutum, aut suavissimum, rejicias, minus facile intelligas, certe sibi cognitum esse, balsamum de Copaitae uterinis affectus vehementer movisse. Hic fortasse me interpellabis, quaerens, num hoc in hypochondriacis quoque viris sit animadversum; si vero non sit; quare igitur hystericum, & hypochondriacum morbum unum eundemque esse, plurimi hoc tempore contendunt?

Pedetentim, quaeso. Neque enim vel in ipsis hystericis eadem semper aut prodesse, aut nocere inveniuntur, neque eadem in omnibus occurrunt symptomata, ut neque in hypochondriacis. Quo minus urgeri a quibusdam Doctissimis alioquin Viris qui ex adverso pugnant, tot inter utrumque morbum discrimina oportuisset, quasi illa quae memorant, omnia in hystericis semper, pleraque autem in virilis sexus hypochondriacis nunquam essent animadversa, vel quasi ea quae multo & saepius, & gravius in mulieribus, quam in viris contingunt, aut non essent ejusdem generis, & gradu tantummodo discrepantia, aut nervosum mulierum systema, & corpus, & vivendi rationem, ac virorum inter se comparantibus non appareret, cur eadem causa multo & facilius, & saepius, & acrius in illarum nervos debeant, quam in horum, agere. Nec vero hac attigimus quod nobis placeat cum quoquam alterari; imo vero, ne alii inter se altercentur. Quin si ea quae supra (b) scripsimus, relegas; quo simus animo in hac controversia perspicies, & quamvis sciamus, non in cunctis quae hystericis dicuntur, uterum, aut ejus tubas, & testes inquirentibus Anatomicis vitium prodere; illas tamen in quibus irritamenta ab his partibus incipiunt, a nobis proprie hystericas appellari. Itaque si quid hystericis in ea forte Vidua quam Epistola descripsi XXXV. (c) fuisset, dixeris, menstruis octavum jam mensem carente, nec sine sensu aliquando ad jugulum ascendens cuiusdam rei, in uteri autem summo pariete prulentam pustulam habente, materiamque intra tubas coloris ex carneo flavescens; tibi, quamvis fortasse possem, non refragabor. Imo duas huc addam foeminarum historias, quas

ut ipsae, ceterique credebant, ego quoque hystericas fuisse, assentiar: si prius totidem quas Sepulchreto adjicias, commemoravero. Altera Cl. Mayeri (d) est in muliere, cuius uterus magnus, totusque, singulari exemplo, in osseam substantiam mutatus, ut malleo fuerit diffringendus, intra suum cavum, ad internum osculum arctissime oclusum, pus continebat lactiforme, paulo crassius, non foetidum, in centro ad viride inclinans. Ea foemina ab illo tempore quo uteri tumorem cepit animadvertere, ab hystericis passionibus libera fuit; ut possis suspicari, ex eo quod uterus irritari amplius non potuit, illam passionem desisse. Historia altera a Cl. Helwichio (e) est, qui mulieris utero exteriori, tanquam per pediculum annexas invenit excrecentias quatuor cavas, ejusdem cum illo texturae, ex ovario autem altero prominentem facculum, qui, incisus, materiam nigricantem gelatinosam ad semenciam cum impetu emisit. Mulier, ut idem alio exposuerat loco (f), ex illis evidenter fuerat, quas convenit inter omnes Medicos, uteri affectionibus esse obnoxias, sive has apneas, sive suffocationes quis vocaverit, sive etiam contractions quaedam contigerint; ut Galeni (g) verbis utar. A marito enim se juncta, in eam naturalium pruriginem inciderat, ut a furore uterino parum abesset, mirumque non fuerit, si spasma horribiles accesserint, fauces praecurrentes, eamque spirandi difficultatem afferentes, ut in suffocationis periculum saepe adducerent, qua denique inopinato confecta est: cuius suffocationis effectum potius quam causam, fuisse, credes secundum ea quae alias (h) scripsimus, polypos in ejusdem mulieris corde inventos. Sed jam ad duas quas paulo ante promissimus, Observationes veniamus.

21. MERETRICEM juveniculam, pinguiculam, bibacem, quae olim pepererat, nunc posteaquam menses jam quatuor sanguis ex utero non responderat, hystericis affectionibus, deinde etiam mania laborantem, ex universis convulsionibus mortuam, in Nosocomio hoc secui sub Februarii finem A. 1717. VENTER jecur habuit eo colore, quo, elixum, est: bilis tamen quae ex ejus vesicula excludaverat, croceo colore vividissimo proxima infecerat intestina. Testes albi, duri, scirrhusi, aequo majores, & suapte pondere quasi pone uterum tracti. Uterini fundi interior facies sanguinolenta quasi muco non secus oblita videbatur, ac si menstrua jam iam instarent, aut nuperime fluxissent: praeterea in illa ipsa facie ex substantia uteri parvula, & per pauca prominabant tubercula, verrucarum similia. Urethra aperta, quae crebris canaliculorum suorum oculis erant pertusa, ex horum nonnullis, leviter comprimendo, albam lentamque materiam dabat, quae, nisi ibi sana fuisset omnia, pus videri, & gonorrhoeae virulentae suspicionem movere potuisset. Thoracem pluribus, quas hic memorare necesse non est, observationibus occupatus, non referavi. Cranium referat fuisse; sed ab iis qui crederent, me cerebrum non esse dissectum, hoc factum, me absente, aegreque ferente; eram enim obmaniam, & convulsiones diligenter inspecturus. Nihil fuisset adnotatione dignum, relatum est praeter polypositas, quas & ipse in iis quae forte supererant, vidi, in vasis sanguiferis concretiones.

22. Hepar quasi coctum, in hydropicis animadversum, habes hoc III. Sepulchreti libro Sectione XIX. (i), itemque in Additamentis ad Sectionem XXIII. (k): sed & in cachecticis dumtaxat, Sectione XX. (l) Huc eos adde in quibus cachexia propediem esset manifesto se proditura, quo pertinere censeo latomum, & bajulum, quorum illum a Jacobo Sylvio olim, hunc vero a me factum Epistola XXXVI. (m), & III. (n) memoravi. Huic quoque scorto quid immineret, suppressio mensium indicabat. Sed, ne a proposito longius abeam, ad hoc illa uteri quasi verruca, & testium illa constitutio, quae praegressos in ipsis morbos significabant, ut conjicere per te potes, attinebant. Verum in proxima muliere earundem partium vitia fuerant manifestiora.

23. FOEMINA erat Venetijs annos nata ad quadraginta, infirma sortis, impudica, vino dedita, statura juvenis, & pingui corporis habitu. Obnoxia haec erat vel leves ob causas timori, ex quo tremebat, & quasi animo linguebatur. Vomebat saepe, ut nihil solidi cibi retineret, piscem autem ne gustare quidem posset. Cum de morbis ejus ceteris ex familiaribus singillatim quaereremus; constanter respondebant, nunquam decapitate, nunquam de corde, ut puta de ejus vehementi pulsatione,

tionem, palpitationem, aut alio affectu conquestam, nec unquam, quod scirent, thoracis inflammationibus fuisse tentatam: quae cur non praefuisse, adnotemus, sectione perfecta facile intelliges. Morbum de quo unice quaeretur, affectiones, aiebant, fuisse uteri, quem sibi huc illuc per ventrem tunc moveri, & ad fauces ascendere cum suffocationis interdum sensu, asseverabat, a quo tamen sensu cito liberabatur. Ipsi Kalendis Januariis A. 1709. vespertino tempore costas sibi quasi concidere, quae est, iussitque, mulierculam advocari, quae, ut vulgus credebatur, relevare sciret. Sub auroram cum se gravissima hystericis affectione corripit, dixisset, utrumque huc illuc oberrantem, ad fauces jam ascendisse, eoque se suffocari; intra unam, aut, summum, alteram horam est mortua, nulla ad os spuma, neque ullis, qui sub oculis adstantium caderent, convulsivis motibus agitata. CA-DAVER cum ex officio secare deberet Santorinus, certisque de causis, id quod prudenter maluisset, differre non posset: a me uno, qui ab ejusmodi corporum dissectionibus, non nisi iusto interjecto tempore, perpetuo refugii, majorem in modum per amicitiam etiam atque etiam contendit, ut simul esse vellem, eoque pacto exoravit, ut plus temporis inquisitioni daremus, an reapse mulier mortua esset, quam ex cuius partis vitio. Quorum illud tanto diligentius praestitimus, quod oculos non adeo turbidos, corpus autem nihil ferme rigidum, & decima a morte hora circa thoracem etiam tum calens, eo anni tempore invenimus. Itaque eorum memores quae Galenus (o) ex Heraclide Pontico, ex aliisque praeis Medicis commemoraverat, nihil eorum quae tunc, aut postea in ejusmodi explorationibus fieri consueverunt, praetermissimus, nimirum carptam lanam flocculum, tenuis cerei flammulam, nitidum speculum ad os, nareque admove: populum aquae plenum scrobiculo, quem vocant, cordis, & non uni pectoris loco, quasi Winslowii (p) monita divinafsemus, imponere: manum, digitosque non modo ad cordis regionem, verum etiam ad Carotides in collo arterias, & ad Iliacas, quae per anteriora ossium pubis ad femora descendunt, quorum illud postea confirmavit Illustris Senacius (q), hoc olim Riolanus (r) praemonstraverat, femel, iterum, saepius, si quid forte pulsus perciperet, attente applicare: pulveres demum, quibus maxime in his tentaminibus fidebat Hollerius (s), per quos videlicet sternutamenta evocarentur, stando in nares alte conjicere. His omnibus, aliisque id genus minime contenti, cum leviter incisae alterius femoris cute, forte sanguinem, quamvis lente, prodeuntem, & prodire pergentem vidissemus; venam ad cubiti flexum phlebotomo sic aperuimus, ut si mitendus esset sanguis. Tum vero sanguinis quidem pauxillum exivit, sed & serum a sanguine separatum, ut fecissemus jam intra eam saltem venam a reliqua massa, intelligeremus. Quo tempore alii pariter tentaminibus uti volumus, quae, si quopiam forte perniciosis soporis genere mulier oppressa esset, auxilii loco valentissimi saltem ad expergefaciendum esse possent. Acutissimum enim mucronem, ut apud Fortunatum Fidelem (t) est, sub ungue sensim defiximus: praefertim vero candens ferramentum, ut Mistichellius (u) ad apoplecticos excitandos, plantis admovimus. Quae omnia cum essent irrita, & quod calor ad thoracem principio perceperamus, evanesceret; satis quassum esse, statuiimus: & nihilominus pedetentim cutem primum, tum deinceps, aliquo semper inter unam & alteram simplicem, brevemque incisionem relicto temporis intervallo, Adiposam, quae valde crassa erat, membranam, denique & musculos incidimus. Dum cuncta quae dicta sunt, faceremus, spatium habuimus animadvertendi, artus quidem non esse macilentos, ut neque caput; sed praepinguem abdomini, & thoraci nullo modo respondere; praeterea posteriorem corporis faciem, in quam moriens decubuerat, ex rubro liventem, anteriorem vero neque ad caput, neque ad collum, neque usquam, si superiores exciperes femorum partes, ruborem, livoremve ullum habere. Nunc quae in Ventre primum, & quae deinde in Thorace deprehendimus; Caput enim (nec fortasse necesse erat) attingere non potuimus; tecum eo ordine communicare juvat, ut incipiam a Thorace. Cum huius integumenta, & musculos a subiectis ossibus, & cartilaginibus amovissemus; magnum in his vitium apparuit, quod crassiores mammae, & crassissima imposita pinguedo ante sectionem ita occultabant, nullum ut sui

indicium daret. Scilicet sternum circa suae longitudinis medium extrorsum prominens annexas utrinque costas secum attollebat: costas autem quae his proximae subiciebantur, valde subsidebant: ultima denique, exiis dico quae aut per suas, aut per aliarum cartilagineas cum sterno committuntur, rursus, ut naturalis pectoris structura postulat, prominebant: itaque ad singula sterna latera singulae magnae erant costarum depressiones, quas mammae & pinguedo, uti dictum est, extrinsecus inaequabant. Thorace recluso, sinister pulmo aliquo loco, & leviter: dexter autem ferme undique, superiore excepta particula, arctissime ad pleuram adherens inventus est per quandam quasi membranam, quae praeter naturam tunicae pulmonis induta erat. Pulmones ambos cum secaremus, dueros, & quasi tendineos pluribus offendimus locis; spumoso praeterea humore, quasi saliva quadam, passim scatentes. Pericardium non paucam habuit aquam ex fusco turbidam. Cordis autem uterque thalamus nigrum sanguinem, & fluidum, qualis ferme ubique in hoc corpore occurrebat: dexter insuper modicam polyposam concretionem, albam, sed mollem, cui similis altera in Pulmonari fuit arteria, plurimo cum sanguine. Hoc turgidissima erat auricula dextera; frigidula autem sinistra. Verum huic auriculae annexus ventriculus, naturali amplior, non unum obstruit animadversione dignum. Namque, ut tendineas omittam fibrillas quae inter Mitrales valvulas, columnasque ducuntur, visas esse plures quam soleant; certe earum columnae erant aequo crassiores, durioresque, ut multo potius tendineae, quam carnae, viderentur, si ve colorem speciales, qui albus erat, si ve renixum attenderes quem secanti scalpello objiciebant. Praeterea in ejusdem ventriculi parietibus hic illic passim quadam occurrebant loca in quibus carnea substantia cordis aut alba, aut ex rubro alba ita erat, ut a primo glandularum quasi quarundam specie imponerent; sed eodem illo peculiari renixu, dissecantibus similem se columnarum ostendit. Vitium hoc carnis cordis, in tendineam naturam degenerantis, quo magis ab interiore ventriculi facie ad exteriorem pergebat, eo fiebat evidenter, pertinebatque exteriori ad eum quoque locum cui septum cordis respondet. Quin pinguedo ipsa huic visceri imposita non omnis secundum naturam se habuit. In posteriore enim facie cordis per duos non parvos secundum longitudinem tractus inaequalis erat, ibidemque ex fusco rubescebat. Arteria Magna a corde ad curvaturam usque propemodum totam, non valde quidem, sed evidenter tamen dilatata, prope septum transversum aequo angustior visa est. Incisa, & sanguine, quo non carebat, effuso, ostendit tota interiore facie a corde ad ramos saltem usque Emulgentes, particulas quaedam albidiores, & lineas nonnihil extantes: praeterea non eo solum quem modo dicebam, tractu, sed & alibi quantum ex dissecitis superioribus quibusdam ejus ramis cognovimus, intimam tunicam facile adeo a proxima sejungendam, ut levissimam scalpelli frictionem magna ejus frusta sequebantur. In Ventre autem haec videamus. Omentum lienem versus retractum. Perturbatos intestinorum situs. Haec, Colon praecipue, & Rectum, aere multum distenta. Mesenterium quidem, ventriculum, splenem, & jecur, cuius vesicula bile turgebat, sana, Pancreas autem, quod, ut nonnulla Tenuia intestina, declivior praefertim parte rubebat, glandulosis acinis iusto firmioribus, & inter se magis distinctis, Uterum denique, Tubas, & non parvam Vaginae partem, cum ibi sic satis, tum praefertim postridie, ut plus temporis, & diurnum lumen haberemus, e cadavere adempta, diligentius examinantes, haec adnotavimus. Posteriori fundi uterini faciei exteriori circa medium adnatus erat per brevem pedunculum globulus, nihil magis albedine, forma, & magnitudine referens, quam parvum cerasum immaturum, quem secantes, ex fibrosa quidem, sed callosa substantia, confusisque fibrarum ordinibus, factum deprehendimus: cuiusmodi alter globulus intra ipsam parietem uteri crassitudinem erat conditus. Mox apertus uteri fundus multo apparuit subcruento muco foedatus: quo detecto, cum, appressis subitis digitis, undique ex fundo quidem; non ex cervice, multoque minus ex vagina; prodeuntes mediocri expressione sanguineas guttas ostendissem; tam displicuit Santorino quod pro certo scire non potuissemus, an mulier prope abesset a menstruis, quam se antea (x) horum scaturiginem in vagina potius esse, quam in utero, credidisse. Cervicis superiore parte

(z) Cent. 2. Obs. 26. (a) Mem. presentés à l'Acad. R. des Sc. Tom. 2. (b) n. 17. (c) n. 16. (d) Commenc. Litter. A. 1731. Spec. 30. post n. 4. (e) Eph. N. G. Cent. 3. & 4. Obs. 142. (f) Erynd. Cent. 1. & 2. Obs. 148. (g) De loc. aff. l. 6. c. 5. (h) Epist. 24. (i) Ob. 3. §. 12; Obs. 4. §. 21. (k) Obs. 86. (l) Ob. 2. n. 1. (m) n. 27. (n) n. 4. & 5.

(o) c. 5. supra ad n. 20. cit. (p) Mem. de l'Acad. R. Sc. A. 1738. (q) Traité du Cœur l. 3. ch. 7. n. 5. (r) Encheirid. l. 5. c. 45. vers. finem. (s) De Morb. Intern. l. 1. c. 19. (t) De Relat. Medic. l. 4. c. 1. (u) apud Lancis. de Subit. Mort. l. 2. c. 5. n. 22. quod postea Mistichellius ipse confirmavit Tratt. dell' Apoplef. l. 2. c. 6. & S. 3. c. 3. cap. 8. & seqq. (x) Opusc. Medic. a. n. 5.

parte excepta, reliquum longe alio rubore infectum erat, quasi ab inflammatione videlicet, qui ab altero latere magis ad fuscum inclinabat, nec tamen usquam cervicis substantiam alte pervadebat. In Tubis quoque mucosus humor fuit; sed albus. Utraque erat aeri, per majus orificium immisso, in uterum pervia; nec deerant prope id orificium hydatides. Testium uterque ab inclusis cellulis tumebat; sed alter magis, qui præter magnam, minores quoque plures habuit cellulas, omnes fero plenas, una excepta in qua pus album fuit. In altero simul cum cellulis, & vesiculis ferum continentibus, alias vidimus cellulas intus nigricantes. In utriusque autem superficie oscula animadverteramus, tenue specillum admittentia; præcipue vero in membranis per quas cum Testibus Tubæ necluntur; Alas Vespertilionum vocitant; plexus, nervosque eleganter discurrunt. Qui cum ex crassioribus essent quos antea confpexissem; videlicet, inquam, hic plexus, & hi nervi sunt quos in Adversariis (y) indicavi, & alias fufius me descripturum promisi: quod cum Santorinus ipse postea (z) fecit, nisi memoria, ut fit, excidisset, meus ille Adversariorum locus, cum plexum non scripsisset, vel non plane cognitum, vel ne antebac quidem observatum.

24. Nolo ad longam historiam longas quoque Adnotationes attere. Satis sit pauca, eaque summam ad-jicere. Quod igitur ad sternum attinet certo loco extrorsum prominens, costæque suis cum cartilaginibus, qua crassas sustinebant mammas, crassamque pinguedinem, utriusque adeo introrsum depressas; extat Riolani (a) locus: In mulieribus mammosis & obesis, detracta mole mammarum, sternum acuminatum deprehendi, & Pectus angustum, quod in illis causa fuit dyspnoæ: istam angustiam excitaverat pondus mammarum. Hoc ultimum mihi dubium est. Nisi enim mulieres maximam temporis partem supinæ jaceant, quod obesitas & mammositas non ita commodum est; mammarum pondus costas potius extrorsum trahet, quam introrsum urgeat. Quod nec rigidi adstrictique thoracis usui possis imputare; qui enim costis noceat; mammas non noceat? Quapropter malim vitiosam istam structuram a primordiis repetere: quæ quoniam in præpinguibus, mammosisque non nisi per dissectionem apparet; ideo in his, ceu res inexpectata, Anatomicorum oculos, animosque longe magis percussit, quam in macilentis, in quibus si est, vel ante sectionem obvia est. Verum unde unde sit, non est dubium, quin pulmonum partem coarctando, tanto minus per hos facile sanguinis circulationem, expectantemque respirationem efficiat, ubi præsertim a convulsione, aut aliunde causa aliqua accedat quæ utramque faciat difficiliorem. Quamquam autem perdifficile est in præpinguibus illiusmodi & mammosis feminis, nisi forte ad sternum, & ad mammarum latera digitos validius apprimendo, id vitium cognoscere; tamen si illas multo difficilius quam cæteras ejusdemmodi, respiratio, nulla apparente causa, male habeat; num forte id structuræ vitium in causa sit, licebit ex nostra, & Riolani Observationibus suspicari. Huc facile addere exemplum potes, e Commercio Litterario (b) petiitum, nobilis femina asthmate conficta, cujus asthmatis causis merito accenseri videbis malam pectoris conformationem; sinistri enim lateris costæ, sigmaris instar, intro curvate, thoracis caveam mirum in modum angustam faciebant, & cor, bovino longe majus, in dexterum latus deprimebant. Cum autem obesa & pinguis esset ea femina; veri simillimum est, vitium illud costarum sub multa pinguedine delituisse.

25. De sensu autem illo, quasi concidentium costarum, ad quas relevandas mulierculæ suas sæpe accerunt Medicas in quibusdam præsertim Civitatibus, ut in mea quondam vidisse memini, equidem quod pro certo dicam, non habeo. Sed tamen suspicor, confundi cum eo sensu molestias, noxasque aliquas ex iis quas intro vergens xiphoides cartilago asserit solet: quibus de noxis post Cödrachium (c), & Septalium (d) videre potes quæ in Sepulchretum relata sint ex Diemerbroeckio (e), ex Barbetto (f), & Boneto ipso (g): quam-

quam & costarum quarundam notharum cartilagineis interdum deprimi, nec leviter asserere posse incommoda, quæ tamen earum in pristinam sedem restitutione, muliercula id præstante, continuo sublata sint, ex Sepulchreto eodem (h) scies. Sed num eæ cartilagineis ad ipsas duas extremas costas, aut ad ultimam attinuerint, nec potius ad earum aliquam quæ supra duas extremas proxime sunt, infimarum illarum cartilagineum notabile vitium facit, ut dubitem, multoque magis, cum inferiorem earum lego superiori incubuisse. Caterum in proposito a me femina sensus de quo loquimur, ad aliquam ejus generis attinuerit causam, an ad aliam quam tibi in muliere alia exposui (i), præstat in medio relinquere, quam hic inconsultius decernere.

26. Quod vero ad carnem cordis substantiam attinet degenerantem in tendineam, inde illud primum intellexeris, non temere a me alibi (k) fuisse positum, id posse fieri, cum videlicet in eo esset, ut quæ ratione interdum fit illa substantia in ossammutata, explicarem. Tanto autem magis decrevere vires cordis, quanto plures ejus partes ex carne tendineæ fiant, proclive est vel ex his colligere, quæ eodem loco (l) scripta sunt. Porro decreverant in eo ventriculo cui majoribus viribus opus est, nimirum sinistro, qui præterea, ut proximus quoque Magnæ arteriæ caudex, vitium alterum habebat, dilatactionis. Nec mulier tamen de vehementi cordis pulsatione conquesta fuerat; namque in vitis aneurysmaticis Albertinus (m) quoque pulsationem aut sane medicam, aut longe minorem comperit, ubi substantia cordis a basi ultra medietatem ipsius consistens, & colore quasi tendineæ, aut flaccida nimis evaserat, nempe cordis robore ab utralibet constitutione debilitato. Verum hæc vitia omnia, & alia quæ in Magna arteria descripti, & quasi tendineæ multis locis facta pulmonum substantia, eorundemque, & cordis per costarum depressionem coarctatio, hæc, inquam universa, præclarè vides, ut exitiale facere potuerint cum respiratione, tum circumfinitionis sanguinis interceptionem, ubi solito violentior nervorum, iisdem Partibus inservientium, convulsio accessit.

27. Hanc, ut leviores alias quibus obnoxia mulier fuerat, ab utero, & testibus originem habuisse, ea quæ in illo, & his præter naturam confpeximus, & incipiens illinc quasi ascendens uteri sensus, videntur significare. Nam est uterum; id quod fieri non potest; e sua sede sursum progressum non offendimus; intestina tamen quæ mentiiri id possent, non modo statibus distenta vidimus, sed a confueto sitibus etiam dimota. Ad quæ convulsio per nervos facile prorupere confueverat cum iis communicantibus qui tubis, & testibus subservientes in Alis Vespertilionum crassiores a nobis confpexi sunt, quippe sæpius orto a testibus irritamento vexati. Hic fortasse dices: at sæpe in aliis, uteri, & testium noxæ inveniuntur multo majores, quæ tamen istiusmodi gravibus affectionibus non fuerant confictæ. Vero. Sed non omnibus æque acris materia inest quæ irritet, neque omnibus æque nervi ad irritamenta suscipienda pronti, ut femina huic, a levi quacunque timoris causa trementi, neque demum omnibus, ut huic, ea viscerum præcipuorum vitia, ut, si vehementior urgeat convulsio, resistere non possint. Quo magis illis hystericiis, iisque hypochondriacis timendum est, quibus aut humorum, aut præcipuorum viscerum labem simul esse graviorem, aut sciamus, aut merito suspicari possumus. Quod cum haud satis attenderent Medici quidam, alioquin non indocti; Juvenem memini hypochondriacum, nimis, & assiduus, inanibus ut plurimum, querelis eorum aures jam diu lassare solitum, cum ideam, febri correptus faceret, ipsi autem, ut confueverant, minus crederent, febremque illam contemnerent, antea ipsum, doloso morbo confectum, decessisse, quam illi periculum, non dico prædicarent, sed præsentirent. Tu igitur vel in querulis istiusmodi personis, cautam, ut soles, & accuratam diligentiam retinebis. Neque enim hæc unquam; negligentia autem sæpe nocuit: cui plerumque, si vera fateri volumus, imputandum est, quod moriatur aliquis, de quo Medicus securus fuit (n). Vale.

EPISTOLA ANATOMICOMEDICA XLVI.

Sermo est de Veneris impedimentis, & Sterilitate in utroque Sexu.

ETSI quæ proxima succedit Sepulchreti Sectio XXXIV. non ea modo quæ ad Sterilitatem spectant, sed & ea quæ ad Salacitatem, complectitur; nobis tamen in illis quidam imitari Bonetum placet; in his vero nec quidquam suppetit quod proferamus, & quædam, ab eo producta, melius omitti potuisse, censemus. Quid enim ad salacitatem quod Spermatice venæ dextera, & sinistra in Emulgentes influent (a)? aut certe quod essent plures (b)? præsertim cum postea ex aucto earum numero minor ad venerem aptitudo (c), ex illo autem in Emulgentes influxu feminis admodum aquosi, & frigidi generatio (d) deducatur. Quid pariter huc renes maximi (e)? aut contra, exigui (f)? Non equidem ignoro quæ olim traderentur de venarum illarum officio, & quæ pro renibus quoque sint vel a Bartholino ipso (g) disputata. Sed quando illa jam sustulerat sanguinis circumfuentis notitia, quæ autem ad renes attinent, diserte a Boneto (h) paradoxon vocantur; potius indicari in Scholio aliquo poterant, quam inter solidas Observationes recenserent. Sed præterea quod ad Sterilitatem, aut Fecunditatem spectat, haud immerito prætermitti potuisse quædam, arbitror. Exemplum proferam duo. Qui virgini vim attulerat, testibus intus, extraque omnino carebat (i); Testes igitur femini gignendo non serviunt. Olim quidem his esse potuisset locus, quando ista videlicet quæ ibidem laudatur, Aristotelis sententia doctos habebat astipulatores: quos inter vel Catullum ponere, non dubito, quem proximi Poetæ non temere doctum appellarunt, de Atty hæc scribentem, (k) Devoluit illa acuta sibi pondera silice. Nunc autem quid testiculorum ista cum ponderibus comparatio? aut asseveratio ista, nulla spermatice vasorum ullatenus testes subire? aut demum quid inter vim illatam virgini, quam inferre castrati possunt, & fecunditatem, quæ polleere certe non possunt? Est etiam animadversio dignum illud de femina (l), in qua a nimio coitu mortua ligamenta teretia, quæ parte vicina sunt utero, semine repleta sunt deprehensa. Scilicet hæc olim probari poterant; nunc vero non possunt, haud fecus ac illa quæ superiori Sectione (m) de femine muliebri in tabis corrupto, aut in utero, vasisque Deferentibus propolita sunt. Sed nos, hinc prætermittis, quæ probabiliora sint de utriusque sexus Sterilitate, jam proferamus, & primum quidem ex Valsalva.

2. VIR erat quidam, mutus, non ex eo tamen quod auditu careret; audiebat enim; idemque nullo sine in facie, five in pectore, five sub alis, five in scroto habens pilos: quorum pauci dumtaxat in pube ad radicem ipsam penis conspiciebantur. Is annos natus triginta quinque acuta febre, cum lumbricis conjuncta, absumptus est. GENERATIONIS organa omnia, diligenter examinata, nihil quidquam ostenderunt vitii.

3. Fecundus fuerit, an infecundus, Valsalva non addidit, neque an pilis ab ortu ipso careret; vidit enim Cel. Heisterus (n) virum qui, nullo prægresso notabili morbo, omnes toto corpore amiserat pilos, nec intra decennium recuperaverat. Credibile tamen est, eum de quo Valsalva id scriptum reliquit, natura & glabrum, & infecundum fuisse; ut res utraque permoverit ad accuratum virilium omnium examen suscipiendum. In quibus cum vitii nihil apparuerit; indicat Observatio hæc, ab invisibilibus Partium sperma fecerentium, aut perficientium structis illud quidquid est, existere quod & semen fecundum, & pilosum corpus facit. Certe autem utrumque horum simul videmus tempore pubertatis, id est cum structuræ illæ intimæ satis jam explicari ceperunt, contingere. Quin etiam levius aliquid in cute nonnunquam mihi sterilitatis mulierum indicio fuit, cum ad ab ortu, & perpetuum foret. Vidi enim, duas in quibus nihil prorsus erat quod fecunditatem non promitteret, cum egregie valentibus viris sterile conjugium habuisset. Cum attentius omnia considerarem; cutem in Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

altera contra ac vitæ genus, ætas, habitusque corporis indicabant, minime, si tangerem, mollem, lævemque offendi; in altera cuticula opertam animadverti, quæ vel in facie jugiter in squamulas, & furfures abibat. Huic similem, cum Litteras has describerem, pariter infecundam tertiam vidi. Et mihi quidem hæc videntur posse repeti a sebaceis cutis glandulis aut æquo paucioribus, aut non ejus cujus par fuisset, naturæ materiam fecerentibus. Sed quomodo ea retenta, aut minus suo officio apta materia intus obstat conceptioni, incertum.

Jam vero ad vitia in ipsis generationis organis evidenter veniamus.

4. Mulieres florente ætate steriles duas, alteram ob vesiculas in scirrhis ovarii fere nullas, alteram ob earum humorem omnino concretum non fecus ac si ad ignem fuissent coctæ, Valsalva observavit. Quarum historias cum tibi alias (o) descriperimus, non est cur hic repetamus.

Ad nostras igitur transimus.

5. VIRI in Nosocomio hoc mortui sub extremum Novembrem A. 1717. Anatomæ studio, plerisque Partes dissectas, cum præter naturam quædam se habere, animadverti. UTERES æquo latiores utroque occurrebant nonnullis locis. Ab altero autem latere tum Seminalis vesicula, tum vas semen Deferentis pars ei vesiculæ proxima parietibus erat scirrhis, membranea substantia in cartilagineam propemodum mutata.

6. Ex Observatione hac apparet, quantum feminis perfectioni, & ejaculationi desit. Neque enim quod per Harderi glandulas addi, aut per lymphæ ductus detrahi solet, addi hic, aut detrahi, nec vis quam contrahentes se vesicularum, & imorum Deferentium vasorum tunica, femine antea distentæ, in hoc exerunt dum ejicitur, sperari hic poterat. At enim ab altero latere nihil horum deerat, inquis. Sed tamen quantum ab latere opposito inertis, & aquosi feminis defluere poterat, tantum optimo cui se adjugebat, detrimenti asseveratur. Quin sensim potest adeo increfcere durities, & crassities tunicarum feminis ductus, in altero latere ad extremum accedentis, ut proximum alterum premat, eique officiat. Sic me respondisse memini laudato alias Viro Laurentio Mariano, cum anno vertente 1736. hunc ad me generosi Juvenis scripsisset casum. Ei qui nullius unquam mulieris, una excepta uxore, notitiam habuerat, ex eaque filiam susceperat, Spermatice sinistra vasa non sine dolore intumuerant cum epididymide, & vase hinc semen Deferente, quod, molli testiculo servato, durum cum epididymide percipiebatur. Et remedia quidem imposita dolorem post aliquot menses valde imminuerant; tumorem autem, duritiemque non valde. Cum a dextris, quantum extrinsecus judicari poterat, sanissima essent omnia, & ad gignendum, transvehendumque semen aptissima; nihil tamen hujus, ægro, Medicis mirantibus, in concubitu egrediebatur. Caterum coalitus alterius vasis, semen ad vesiculam Deferentis, itemque calculi in altera vesicularum concreti Observationes, quas aliis addas, illius quidem ex Brunero (p.) Walthero (q); hujus vero ex Valentino (r) habebis.

7. De strigosis autem vel in Juvene vesiculis seminalibus, & de obcæcatis, quod Waltherus (s) etiam vidit, feminis in urethram viis, quæ, cadavera fecans, animadverti, adscribere huc possem, nisi cum de aliis morbis, & præsertim de virulenta Gonorrhœa verba faciens, hæc tecum alias (t) communicassem. Ob eandemque causam omitto quæ ad calculos attinent Prostatae glandulæ, femini exitum intercludentes. Hæc enim Epistola habuisti XLII. (u)

8. De magno pariter urethrae vitio quod A. 1718. in rustico Juvene cum Cel. Collega Vallisferio examinavi, hic fufius scriberem, nisi ille tertio exinde anno (x), iterumque omnium ejus Operum Editores (y) vulgassent. Itaque nonnulla tantum adjiciam.

M 4

EPI-

(y) l. n. 14. in fine. (z) Obf. Anat. c. 11. §. 17. (a) Encheirid. Anatom. l. 6. c. 14. (b) A. 1733. Hebd. 37. n. 2. (c) De Prostatu Mucron. Cartilag. (d) De Morbis ex Mucron. Cartilag. (e) Sepulchr. l. 2. §. 1. in Additum. Obf. 11. (f) Ibid. l. 3. §. 7. in Schol. ad Obf. 19. (g) l. 2. §. 1. in Schol. ad Obf. 116. (h) Epist. 26. n. 25. (i) Epist. 27. n. 17. (j) l. 18. (k) De Bonon. Sc. Inst. in Opus. T. r. (l) Cels. de Med. l. 2. c. 6. (m) Obf. 1. §. 1. & 2. (n) Ibid. §. 8. (o) in Schol. ibid. (p) Obf. 6. §. 8. (q) Animad. 33. ad fin. (r) Schol. ad Obf. 1. §. 5. (s) Obf. 1. §. 2. & Schol. (t) Caron. 62. v. 5. (u) De Gland. Duct. ubi de ear. in hom. Demonstr. (v) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obf. 197. (w) Epist. 36. n. 17. & Epist. 20. n. 7. (x) Eph. N. C. Dec. 1. A. 6. Obf. 68. (y) loco modo indic. (z) Epist. 44. n. 7. & Epist. 40. n. 29. (u) n. 37.

(a) Obf. 1. §. 1. & 2. (b) Ibid. §. 8. (c) in Schol. ibid. (d) Obf. 5. §. 3. (e) Obf. 1. §. 5. & 6. (f) Obf. 2. §. 1. (g) Vid. Advers. Anat. 3. Animad. 33. ad fin. (h) Obf. 6. §. 8. (i) Obf. 4. §. 11. & 12. (j) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obf. 197. (k) Obf. 1. §. 2. & Schol. (l) Caron. 62. v. 5. (m) De Gland. Duct. ubi de ear. in hom. Demonstr. (n) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obf. 197. (o) Epist. 36. n. 17. & Epist. 20. n. 7. (p) Eph. N. C. Dec. 1. A. 6. Obf. 68. (q) Eph. N. C. Cent. 9. Obf. 72. (r) Tom. 3. P. 3. n. 28. (s) Epist. 44. n. 7. & Epist. 40. n. 29. (t) n. 37.

Cum scrotum non penitus esset, sed antequam solum, in duas partes divisum, inter utriusque superiora orificium fuisse canalis urethrae, inde vero ad apicem usque glandis per totam inferiorem penis faciem, qui multo erat brevior quam in Icone (z) representatur, non jam canalem, sed femicanalem perrexisse, id est urethrae parietem duntaxat superiorem, eumque laevem, & nigrum; ut paulo minus difficile crederes adolescenti, & mulierculae quae ab eo se gravidam factam dicebat, quorum alter asseverabat, cum, sublevato non-nihil pene, mingeret, lotium per femicanalem decurrere; altera, ejaculatum ab eo semen vaginam ingredi; non interlabi. Lotium certe, cum ad parietem mingeret, altius vidimus quam orificium urethrae, ascendisse. Neque nos fugiebat quid penis structura ferat, & quae Graevius (a), laudatusque ab eo Harvey propterea viderint, nimirum penem admodum exiguum prima fronte apparentem, ubi inflatus esset, ex occulto se in corpus ingens protendisse, interdumque, praeter quam cum tentigine provocaretur, nihil in corrugato praeputio supra scrotum, praeter summum glandis apicem, prominuisse. Itaque concipiebamus, hoc se distendente parvo quidem, sed non exiguo, pene, simul quod Juvenis affirmabat, extrorsum protendi illam ejus partem in qua urethrae orificium spectabatur, sicque vaginam satis subire, ab hujus autem inferiore pariete se ad apertam urethrae partem reliquam applicante, ex femicanali canalem fieri, non secus atque femicanalibus accidit, quos in Adversariis (b) descripsi in testudinibus, & viperarum penis, ubi suarum foemellarum naturalibus excepti sunt. Haud equidem scio, num trimestri infanti, quem ab se visum Palisius (c) scripsit, sicut ibi urethrae canalis ubi nostro Juveni, definebat, ita femicanalis ad glandem pergeret: hoc scio, si ejus conformatio haud alia erat ac nostri, minus certam esse potuisse praedictionem, id vitium, in habilem generant, do redditurum, multumque incommodi in reddendo, da urina allaturum. Nec me quidem praeterit, antiquos Medicos, & Chirurgos vel in iis quibus ipse urethrae canalis ad glandem usque producitur, sed subter hanc hiat, hypopadias propterea nuncupatis, idem, quod ad gignendum attinet, pronunciasse, confirmantibus recentioribus, & nominatim Dionisio (d), ubi quaedam vel post ortum causas indicat hujus vitii. Sed miror tamen, cum Fabricium nostrum; id quod eorum Scripta offendunt; perlegerint; nihil excepisse in ea praedictione; sed omnino hic esse necessarium Chirurgi opus, tradidisse, quando ille diferte admonuit (e), se tamen ab iis qui eo vitio tenerentur, vidisse liberos esse genitos, quod & alii (f) confirmant. Quapropter magis Ruyfchium laudo, qui cum olim (g) censuisset, vitium, ut puto illius quod descripsi, non dissimile sterilitatem asserere; ita, de hoc altero verba faciens, rem moderatus est postea (h), ut doceret, hoc affectu laborantes raro impregnare uxores. Sed ad illos ut redeam quibus urethra obtigit aperta magna ex parte, & in longum femicanalem conformata; A. 1756. priusquam hanc recenserem Epistolam, alter ad me rusticus Juvenis adductus est annos natus viginti duos, cui sic erat ut in priore, nisi quod femicanalis initium paulo distabat a summo scroto, pilis instructo, nec vel leviter bifariam diviso. Huic quoque lotium non excidebat inter pedes; sed ad parietem jaciebatur: penis autem, cum tentigine distenderetur, ex brevi, non paulo, ut ipse affirmabat, fiebat longior. Quod ut rationi consonum erat, sic illa quae cernebantur, & praesertim paulo minor femicanalis longitudo non improbabile reddebant, hunc pariter praegnantem foeminam, quod uterque fatebatur, fecisse. Qui Petropoli (i) multis post editam Vallisnerii, meamque Observationem annis, urethram in sulci, aut femicanalis modum patentem viderunt, de sexu definiendo solliciti (qua de re querendi nobis quidem causa non fuerat) an ea structura gignendi vim impedire omnino posset, non quaesiverunt. Cl. autem Vir Abr. Kaau Boerhaavius cum eorum observatione proferret, pro nostra, quam vidisse non videtur, sententia stetit: pro qua Cel. etiam Hallerum (k) stare, credes, ubi eam sic in transitu refert, & statuerum in puero quoque, cuius deformitatem similem vidit, si provecta aetate; triennis enim tunc erat; inspe-

(z) Cent. cit. Tab. 2. Fig. 1. (a) De Viror. Organ. ubi de nervos. penis corporis. (b) IV. Animad. 4.
(c) Anat. du corps hum. P. 1. tr. 2. ch. 17. (d) Cours d'Operat. de Chir. Demonstr. 3. (e) De Chir. Operat. ubi de glande non perfor.
(f) Eph. N. C. Dec. 1. A. 3. Obs. 91. (g) Musc. Anat. Thec. C. Repol. 1. n. 1. (h) Thec. Anat. 8. n. 30.
(i) Nov. Comment. Acad. Sc. Imp. Petropol. Tom. 1. in Physic. (k) Comment. Soc. R. Sc. Gotting. Tom. 1.
(l) Act. N. C. Tom. 4. Obs. 65. (m) Tab. 6. Fig. 1. & 2. (n) 1. n. 10. (o) ad n. 8.

glandem deorsum curvaret. Quarum rerum in duobus illis aliis quos inspexi, Juvenibus nulla erat propterea quia id corpus parietem suum inferiorem aut nullo modo, aut vix supra scrotum extendebat, superior autem, five is qui inter nervospongiosa penis corpora excipitur, facile, sicut in quibusdam accidit, crassior esset, ut satis cum glande posset communicare. Intelliges hoc quod antea ex Ruyfchii Figura quae, in Observationum Centuria, est 76. illa autem quae in novissime descripto Juvene conieci, longe clarius est Centuria ejusdem Figuris 81. & 82. comparatis cum 75.

10. His quae modo dicta sunt, confirmari vides quae recentiores Medici, imprimisque Boerhaavius (p) ex penitus perpensa colis structura enucleatus docuerunt, ut aliquando spongiosum urethrae corpus, & glans tendi possunt, flaccidis manentibus, imo abtentibus; sic enim noster Plazzonus (q) vidit; penis corporibus, ita vicissim accidere, ut his distensis glans flaccida maneat; utrolibet autem modo generationis opus laetatur. Porro sunt plura, & varia distensionis impedimenta non secus ac plures sunt, & variae causae distensionis. Quas inter causas vesicularum feminalium non solum vera, sed & apprensus plenitudo videtur esse ponenda. Apprensus mihi tunc dicitur, cum vesiculis non tantum quidem inest seminis, quantum revera ipsae continere alias possunt, sed quantum continere possunt eo tempore. Sic mane experientia, seniores etiam aliqui, tentiginem patiuntur, quam, urina reddita, continuo abigunt. Urina enim distendebat vesicam, haec vero subiectas illa praesertim sua, quam nos propiussumus retrorsum extuberante basi vesiculas comprimebat, ut sic imminuta earum capacitate, vel modico semine haud secus distenderentur, quam, non compressa, plurimo distenduntur. Et Medici quidem Experimentissimi, in hisque Gulielmus Ballonius (r) ex hoc phaenomeno utile consilium traxerunt. Minus ad venerem valens, coeat, inquit ille, post multam titillationem & cum retenta urina & meendi summo desiderio. Sic quod post Galeum (s) iidem adnotarunt inter calculi vesicae indicia penem aliquando intentum praeter rationem, ubi gravior praesertim ac major calculus sit, eodem quoque explicabimus modo. Eodem quoque dixi, non ignarus, modis etiam aliis hac posse explicari phaenomena. Sunt tamen casus in quibus alia praeter alia congruere possit explicatio: quin fieri etiam interdum potest, ut plures ejusmodi causae ad eundem producendum effectum conveniant.

11. Sed de Viris satis. Nunc ad Mulieres transeamus, initium ducentes ab duabus, quarum naturalia non fecus ac trium de quibus supra diximus, Juvenum, petiuntur est a nobis, ut accurate examinaremur. Ruitica erat, cuius naturale omnino secundum naturam se habebat. Sed is in quem abit canalis, ut Celli (t) aetate vocabatur, nunc vaginam appellamus, vix tertiam justae longitudinis partem superaverat, cum ibi repente finem habebat. Nulla ad eum locum, aut infra cicatrix, nulla in mulieres, aut parentibus recordatio ulceris, aut alterius praegressi vitii unde vaginae latera coalescere potuissent; exulceratis enim his locis five ab lue venerae, five ab difficili parto, five a causa quavis alia, ubi Chirugi, aut Obstetricis incuria accedat, quam facile eorum latera inter se concrecant, exempla docent complura, quorum aliqua indicabit tibi Marcellus Donatus (u), alia nos infra memorabimus. Sed non solum nihil ejusmodi praecesserat in hac femina; verum laevia insuper, nitida, aequalia omnia, ubi id quod erat vaginae diduxisset, & explicasset, sic apparebant, ut non magis hujus latera quam illud in quod definebant, quasi lacunar a natura esse, & ex eadem substantia, eademque structura primitus fuisse facta, intelligeres. Nec vero id lacunar urgenti explorantium digito, aut mariti jam per triennium peni, membranae instar quae in transversum ducta esset, quidquam cedebat, sed ut solidior crassiorque paries, renitebatur. His ita animadvertis, cum ex muliere, florente adhuc aetate, & egregia valetudine praedita, quaesivissem, num ut caeteris, ita ipsi quoque, si non singulis mensibus, at aliquando sanguis inde fluxisset, aut saltem per certa intervalla dolores ad lumbos, pubemve orirentur; illa vero haec omnia negasset; idem suspicari cepti quod in altera: quam ubi descripsero, eam tecum suspicionem communicabo.

12. Narrabat haec altera, non se quidem esse imperforatam, sed angusto adeo foramine praeditam, ut non ignobilis in doctissima Civitate Medicus, idemque Chirurgus, cum in prima pubertate inspexisset, consilium dederit immisissae quae ad id essent idonea, paulatim dilatandi; caetera enim aetatem, & virum, si nuberet, perfecturum. Se vero aliquid illorum quadantenus & aliquid immisissae, & nonnihil foraminis orificium ea ratione dilataste, ulteriora ferre non potuisse: virum quoque cui a triennio collocata esset, crebris conatibus idem orificium paulo magis amplificasse; subire autem nunquam potuisse. Quibus auditis, inspexi ea mente, ut si crassior forte hymen, tenuiorque patens foramine distaret, incisionis auctor essem, ut fuerunt alii, & in his Blasius (x): si angustiae per vaginam altius pergerent; quid & quatenus factu opus esset, excogitarem; necdum enim Cl. Benevolus imitandum aequae facilis ac felix curationis exemplum (y) propofuerat; cum plurimis post annis ejus Observationes prodierint. Nam quae a Blasio (z) in quadam cui id a partu acciderat, curatio exposita est, nimis aspera, ne dicam ob laesum Rectum intestinum, longior fuit. Sperare autem, ut praegnantem denique facta muliere, quemadmodum illi accidit de qua retulit Antonius (a), ab uteri ipsa gestatione vagina dilataretur, minus ausus essem, ut qui inter rarissima exemplum id ponerem. Et videbis certe, non idem contigit alteri foeminae de qua iisdem in libris verba fiunt (b), imo quanto labore, & si quae secuta sunt, attendas, periculo quoque, Benevolus (c) cum Quercio inter partus dolores vaginam coacti sint dilatare ad medium duntaxat longitudinis suae coarctatam ob vulnus in pueritia acceptum; cum illae duae sic natae fuisse videantur. Haec autem quinquae mulieres tenue foramen habebant omnes, per quod aliqua ad uterum via pateret: quale in ea quoque esse, suspicabar, cujus historiam describendam suscepi. Verum ubi foramen de quo mulier narraverat, conspexi; illico ex ejus sede orificium urethrae esse, cognovi, gratiasque agendas esse Deo, quod mulier ulteriorem ejus meatus dilatationem non pertulisset, ex qua illud procul dubio accessisset incommodi, ut lotium retinere non posset. Unde intelligis, Anatomes imperitiam tantam aliquando non modo in vulgaribus chirurgis, & tonsoribus, de quibus haud ita abimilia referunt Platerus (d), & Petrus de Marchettis (e), sed & in Medicis esse non ignobilibus, ut urethrae osculum, magno aegrotantium derimento, aut certe periculo, non dignoscant; nisi hic forte aequius est insipientis aut festinationem, aut praedudicam ex male sibi de foramine perangusto narratis opinionem accusare. Tunc oculis ad eam naturalis partem conversis, quae pone id osculum proxima sequitur, scilicet in qua vaginae orificium patere solet, nullum usquam foraminulum, nedum foramen, occurrit attentissime inquirenti: clausus omnino is erat locus, non membrana quae prementi cederet, sed firmissimo solidoque pariete. Dubitanti mihi quid potissimum consilii darem; neque enim hic de concreto genitali, ut in Cornelia Gracchorum matre (f), id est de illius inter se glutinatis oris, ut loquitur Celsus (g), agebatur, aut de membrana ori vulvae opposita, quam idem (h) memorat, quarum neque incognita, neque difficiles sunt curationes, sed de casu in memoriam revocante quem legeram apud Nabothum (i), Medici cultro vaginae coactum, qui pariter ab ortu esset, tollere satagentis, ab opere autem desistere coacti, cum altius procedere vidisset coactum, simulque sanguifera vasa majora apparere, unaque Nabothi sententiam (k), si interstitium carneum ad sit, crassius videlicet; ab ejus sectione partim propter haemorrhagiam enormiorem, partim ob inflammationem subsistentem, praestare abstinere: haec igitur animo versanti opportune venit in mentem eadem querere quae ex muliere superiore (l) quaesiveram, num menstrui sanguis prodiret unquam? num ullae per intervalla ad lumbos essent, pubemve molestiae? Ex quo enim scripserat Aristoteles (m), foeminis nonnullis os uteri compressum, concorporatumque ab ineunte aetate ad tempus usque menstruorum perseveravisse, mox urgentibus menstruis, doloreque insistente, aliis sponte disruptum esse, aliis dissecum a Medicis; probe memineram, quot, & qualia tulissent foeminae plures a coarctato in vagina, & utero menstrui sanguine donec a Chirurgis ante, & post Fabricium nostrum ab Aquapendente (n) secta impervia membrana ad orificium vaginae, cu-

(p) Praelect. ad Instit. §. 654. (q) De Partib. Generat. 1. 1. c. 31. (r) 1. 2. Consil. Medic. 26. (s) De loc. aff. 1. 1. c. 1.
(t) De Medic. 1. 4. c. 1. ad fin. (u) De Med. Hist. Mirab. 1. 6. c. 2. (v) Part. 2. Obs. 6. (w) Offic. 2. (x) Part. 2. cit. Obs. 7. (y) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1712. Obs. Anat. 2. (z) Hist. A. 1728. Obs. Anat. 2.
(a) De Medic. 1. 7. c. 28. (b) Ibid. (c) Obs. Med. Chir. 60. (d) apud Plin. Nat. Hist. 1. 7. c. 28.
(e) De Medic. 1. 7. c. 28. (f) Ibid. (g) Disput. de Sterilit. Mulier. n. 7. (h) Ibid. n. 23. (i) n. 31.
(m) De Generat. Animal. 1. 4. c. 4. sub. fin. (n) De Chirurg. Oper. ubi de Hymene imperfor.

curarentur, hoc enim ibi pro ore uteri acceptum esse ab Aristotele, Fabricium dubitasse (o), miror; quasi vaginæ orificii occlusio tanta nonnunquam esse non posset, ut siue per vim disrupta, quod Aristoteles dicit, siue quod Fabricius ait, incisa, nonnullarum, sicut ille continuo scripserat, mortis causa fieret, quod posse, vel ex iis quæ paulo ante attigi, satis intelligis. Quantum autem, & quid malorum ante curationem tulissent illæ, exempla docebunt ab Donato (p), ab Severino (q), a Fabriciis tum nostro videlicet (r), tum Hildano (s), ab Ruyfchio (t), ab Nabotho (u) propofita. Quibus addes illa insuper quæ alii, & in his Cl. Viri Fantonus (x), & Kannegieserus (y) describere. Nam Benevolus qui tres perlanaverat, quibus incommodis vexatæ essent, cum sic in transitu eas memoraret, (z) adungere prætermisit. Nec vero eæ tantum fœminæ quæ naturali occlusio natæ erant, iis malis post pubertatem fuerunt obnoxie, sed etiam illæ quibus a difficili partu vaginæ orificium concreverat, cuiusmodi historiis adjungens quam in Commercio Litterario (a) videbis commemoratam. Quacunque enim de causa foramen omnino est nullum per quod e vagina, confluens intra uterum sanguis exeat, hinc noxas retentus afferat, necesse est. At si foramen aliquod sit; non illæ plane imperforatæ dicendæ sunt, nec mirandum, siquæ earum gravidæ fiant, quemadmodum illarum quinque de quorum summa vaginæ ipsius angustia paulo ante diximus tres factæ sunt, ut alia quoque, cuius descriptio est apud Hildanum (b), cum in membrana vaginam occultente exigua essent foraminula. Itaque his omnibus per vias, quamvis tenues, menstrua prodibat purgatio: de qua si per quosdam quæstionem esset, quibus non licuit eas vias inspicere, sed ex maritis dumtaxat scire, uxores sibi impervias esse; fuisset illa indicio, ne, cum eadem factæ essent prægnantes, sine ulla virilis feminis admisione factas esse, existimarent: & exempla mulierum proflus imperforatarum pauciora fortasse in libris haberemus. Verum ut menstruis illæ expurgationibus non carebant; sic malis carebant quæ aliis diximus coacervatum in vagina, uteroque sanguinem afferre. Quæ cum ita sint, neque illarum molestiarum ullam, non dico adesse, sed neque initium earum quodquam, neque menstruum purgationem in duabus, a me inspectis, fœminis unquam fuisse, audirem, contra autem, utramque cernerem optimis viribus, & colore, & valetudine præditam, ut sanissimæ quæque ea ætate solent, quæ videlicet adhuc florens erat; suspicari cœpi, fortasse ut paulo vaginæ canali, aut orificio, sic utero quoque ab ortu carere; ut si vel Chirurgi ferro tolli obtaculum posset, periculum tamen subesset, ne simul cum eo vesica, aut intestinum aliquod proximum, absente nimirum utero, pertunderetur, non secus ac grave ejusdem generis periculum suberat in memoratis alias (c) infantibus quibus anus erat imperforatus, simul autem totum Rectum deerat intestinum. Itaque earum utrique auctor fui, ut æquo animo ferrent, conjugium male initum potius dissolvere, quam se temere fecundas præberent.

13. Nec vero illa mihi objicias, non defuisse, nec deesse mulieres quæ sine menstruis purgationibus sanæ vivant. Equidem & ipse nonnullas novi; sed de iis idem sæpe quod de duabus prioribus dubitavi. Atenim, inquis, plurimæ sunt, quæ illis carentes purgationibus pepererunt. At tu deme earum numero quotquot sub longe alia plaga ac nostrates, vivunt: deme viragines quas vocant: deme etiam quæ non integra valetudine utuntur. Jam istæ plurimæ ad non ita multas redibunt. Vel sic tamen, ais, plures erunt, quam quæ sine utero natæ sunt. Ego vero comparationem istam tunc jure institui, faterer, si quam facile fuit Medicis illarum numerum adnotare, tam harum pariter fuisset. Illæ enim ultro se indicant ipsæ, quippe rem; si spectes sexum universum, & regiones quæque non remotissimas, perraram sanæ, & admirabilem proferentes. Ex cæteris autem omnibus quæ cum paucis illis collatæ, tanto plures sunt quæ videlicet sine illis purgationibus sanæ quidem vivunt, sed nunquam pariunt, quot tandem cadavera diffecta sunt? nisi autem diffece, utero careant, an prædictæ sint, certe nec ipsæ, nec quisquam alius docuerit. Cum igitur neutrum liceat pro certo scire; quis prudenter in his audeat, quasi u-

terum ineffe constaret, obicis, si forte occurrat, tollendi opus suscipere neque ad vitam servandam, neque ad agrotationem ullam auferendam necessarium, & fortasse non modo inutile, sed etiam periculosum, præsertim si obex opponatur quem aut sedes, aut crassitudo quoque, & durities ostendant nec facile, nec sine magno discrimine tollendum? Duas ego fœminas scio (nam libro careo in quo tertia proponitur, a Cl. Casp. Bosc (d) laudata; quartam vero imperforatam, & sine ullo quidem vaginæ vestigio, sed non sine aliqua tamen, quantumvis, inutili, uteri adumbratione fuisse, lego (e)) duas, inquam, scio, quas sine utero in lucem editas anatome demonstraverit, alteram a Columbo nostro (f), alteram a Cl. ejus cive Fromondo (g) diffectam; ut hoc ipsum mihi indicio sit, multo plures ex iis quæ menstruo sanguine carerent, potuisse ab Anatomicis absque utero inveniri; nam ut rarum hoc videatur, multo rarius verum necesse est, si præter illas nulla alia fuissent, ambas Professoribus Cremonensibus obtigisse. Cum utrique illarum deesset uterus, via deerat quoque pervia, quæ ad sedem uteri ferret, ut primam, cui vaginæ portio dumtaxat erat, cum priore de duabus quas ego inspexi; alteram, ejus erat vaginæ orificium imperforatum, cum altera liceat comparare. Visama Columbo siqui Chirurgus incidere aggressus esset; viscus aliquod fundo illius vaginæ portionis attingit simul incidisset, a cuius visceris compressione fortasse erat quod mulier quoties cum viro coiret, mirandum in modum conquerebatur. Conspicantur a Fromondo siqui scalpello curandam suscepissent; primum quidem septum obstitisset validum, firmum, & fibris adeo solidis intertextum, ut ad cartilagineam naturam proxime accederet. Quod dum vi adhibita perfererent, nihil facilius factu fuisset, quam ut vaginæ cavum subesset putantes, hujus parietes, quippe inter se coalescentes, & fortasse etiam aditum ipsis Rectum intestinum, aut vesicam urinariam convulnerent. Denique fuissent ii parietes sejungendi. Quarum rerum quis præstare possit nullam in fœminis, a me inspectis, subfuisse? Nemo certe, ut neque, uterum, sicuti in diffectis illis deerat, non defuisse. Est præterea nonnunquam uterus vel in adultis mulieribus parvus adeo ut perinde sit ac si deesset, quemadmodum propria Observatione infra (h) confirmabo, si prius, ut de occlusio exterior ejus, id est vaginæ orificio verba feci, sic de impedito interioris osculo nonnulla subjecero.

14. Oris uterorum conclusi non uno in libro Hippocratico (i) mentio fit. Conclusionis plures, variæque possunt esse causæ: quarum pleræque examinavit Vallisnerius (k), in externas dividens, atque internas. Quosdam attingamus. Inter illas ponebant quondam cum Hippocrate (l) omentum in præpinguibus os uteri comprimens. Quod Vesalii qua ratione explicaret, paulo fufius ex Sepulchreto (m) dices; eum enim locum (n) in posterioribus editionibus ille contraxit. Scilicet videbat eximius Anatomicus hinc quam molle omentum, inde vero quam crassi, & renitentes parietes sint uterini osculi. Itaque omentum eo usque inter vesicam, illudque osculum descendere, concipiebat, ut molles summæ vaginæ parietes alterum ad alterum apprimendo, viam femini ad proximum osculum intercluderet sua mole, & pondere, & brevior præsertim, aut languidior penis ad summam vaginam non perveniret, eamque distendere non posset. Quam Vesalii explanationem minus ægre ferrem, quam nudum Hippocratis dogma recentiores quosdam Anatomicos esse secutos: quanquam concipere omentum non possumus inter vaginæ summam partem, vesicamque interjectum, nisi difceptos qui ibi esse inter utramque solent, imo nonnunquam aliquanto etiam supra conspiciuntur, cellulofos nexus intelligamus, qui cum in præpinguibus ipsi quoque pinguedine fascii sint, fortasse non ita facile cedant, locumque præbeant omenti ponderi. Cum autem in ejusmodi fœminis cellulosa quæque membrana pinguedine distendantur; proclive est intelligere, ut possint ab aditis præpinguibus intestinis, aut a pinguedine incrementum tubarum Fallopii membranarum, earum fimbriis, aut saltem membraneo vinculo quod Alam Vespertilionum vocitant, hæc omnes particulæ, aut ex ipsis aliquæ in suis ad generandum necessariis motibus impediri; sic enim juvat Vallisnerium (o) interpretare-

terpretari, aut certe aliquid ad ejus explanationem adjicere.

15. Inter causas autem internas os uteri obturantes idem cum aliis excrementis ponit in uteri cervice natus (p), & cum ipso Hippocrate lapides quoque (q). Ego quæ de excrementis observata habeo, in proximam Epistolam differo. Calculos in utero necdum reperi: quos tamen ab aliis nostra etiam memoria, non modo olim, conspectos scio, quorum historiam indicat Vallisnerius. Sed vellem, plures, omnesque adeo tum legisset quæ collectæ sunt apud Schenkium (r), cum alibi (s) vix illud concessit, non esse improbabile in utero quoque lapides gigni. Historiis enim illis perfectis, aliisque insuper additis, ut puta illa quæ apud Bartholinum est (t), itemque illa quam in Sepulchreto (u) habes, præclare intellexisset, toties, & ab ejusmodi Viris in ipso mortuarum fœminarum utero lapides fuisse deprehentos, ut minime esset necessarium suspicari, siqui calculi ex viventium utero elapsi, detractive, ut nominatim in Larisæa illa apud Hippocratem (x) ancilla, dicerentur, eos ex vesica potius, ejus a calculis vexatæ peculiaris simul indicia non extarent, quam ex utero, prodixisset.

16. Porro in causis internis, uteri os occultentibus hujus constructio est, & conglutinatio, quarum exempla invenies inter producta a Cl. Hallero (y), addere autem poteris alia, ut Fabricii nostri ab Aquapendente (z), & Experimentissimi Benevoli (a), ex cuius Observatione suspicari licet, præter constrictionem, membranam forte aliquam fuisse quæ ob ortu usque uteri osculum clauderet. Sane autem idem Fabricius (b) membranam, quæ vaginam efformat, ait, se digitis immisisse observasse in viva per totum continuam, & uteri orificium colantem: Littrius vero (c) in diffecta sterili muliere membranam vidit quæ interius vaginam vestit, non secus uteri osculo, ac vaginæ superficiei, adhaerentem, ut illud occluderet. Sed & post ortum superexcrevere membranam, non dubitavit Hippocrates (d). Cum mulier genituram suscipere non posset, necesse est, inquit, membranam superexcrevisse in osculo uterorum. Qua de membrana quid ipse viderim, hæc tibi ostendet Observatio.

17. FœMINA annos nata ad quinquaginta, clauda adeo, ut artus inferior dexter brevior esset quatuor digitis, quam sinister, ex asthma in Nosocomio decesserat sub Januarii finem A. 1747. quo tempore, ut solitus sum, in Gymnasio Anatomico docebam. PECTORIS erat perangustia: eoque aperto, multa intus aqua inventa est: cætera non perquisiverunt, quippe festinantes, nullaque alia de re solliciti, nisi ut quæ lotii, & generationis causa crearetur, Partes accurate demerent, & in Gymnasium afferrent. Utraque diligenter perlustravi. In illis, postquam ab annexis Magnis truncis profectas arterias, venasque Iliacas a dextris tenuiores, quam a sinistris, spectavi, renes animadverti pro fœminæ statura quæ parva fuerat, non parvos, sanos tamen, quantum æstimare potui: sic etiam in vesica, cuius pars infima phlogosi apparebat affecta, ureterum oscula aliquanto ampliora. Quod ad genitalia attinet, ut hic præteream quæ hujus loci non sunt, in primisque hymenem, atque alia quæ integerrimam virginem præter expectationem significarunt; primum ex iis quæ sine dissectione adnotare potui, eadem phlogosis fuit in hymene dumtaxat, eique proxima naturalis exterior facie, & ex hac parvula præter naturam affurgentia tubercula, pariter rubra: & phlogosis item in Fallopii Tubis, Aliisque Vespertilionum: testes autem scirrhi, & superficiei quasi in tessellas divisa. Tunc aperto uteri fundo, & suprema proximæ cervicis parte, superficiei illius coccineo colore, hujus ne rubescence quidem animadverti. In illo five posteriora, five anteriora spectantes, excrementis inerant humillimæ, non modico tamen ambitu, planæ, & vix ultra superficiei demissæ, quæ intus extraque colore magis fusco quam reliqua superficiei, rubebant. Porro ut quod reliquum erat cervicis introspecerem, cum antequam id fecarem, specillum tenue a fundo uteri osculum versus demitterem; transitum ad hoc non patere, sensi. Itaque incisa vagina, osculoque resecto, cum specillum ne illinc quidem immisissum transiret; diligentius inspectans, osculum vidi, cuius prominens corona secundum naturam se habebat, nisi quod parvo infra osculum spatium corrugationem quasi aliquam ostendebat. Osculum ipsum perangustum, & circuli omnino forma. Cum introscerem, exiguo ab ipso intervallo oculis se objecit mem-

brana albidæ, ipsum fortasse coarctans, certe occultans: eaque siue descendenti, siue ascendenti specillo obstat. Nec vero ad valvulas erat referenda quas alias (e) in cervice virginei uteri delineavi; neque enim illarum singulæ nisi ex parte cervicem occludunt, omnes autem ita sunt positæ, ut ascendenti quidem specillo obstant; sed descendenti obsequantur. Non tamen negabo, istam quam modo descripsi, membranam quopiam fortasse foraminulo, ut Littrius (f) in sua vidit, fuisse pertusam, aut ab aliqua saltem sui ambitus parte paucillulum inter se, & cervicis parietes intervalli reliquisse; quando nihil intra uterum collecti humoris deprehendi: nisi existimemus, nec antiquam adeo fuisse membranam, & humorem potuisse a revehentibus vasibus absorberi.

18. Credere autem malim, rem aliquam ejusdemmodi, aut paulo interiorem Nabothum (g) spectasse, cum extraordinariam uterini orificii interni angustiam, scripsit, in viventibus non magis innotescere, quam solitariam ovariorum conformationem vitiosam. Neque enim ignorare poterat Vir Doctus, non semel tradita hæc fuisse ab Hippocrate (h): si os uterorum conclusum fuerit; fit spissum velut grossius: & si digito contigeris; deprehendes durum ac convolutum, & digitum non admittit: & quotidie peritosis Chirurgos digito immisso ad uteri usque osculum examinandum, stante præsertim muliere, pervenire. Quin idem osculum, aliter locata muliere, nempe uti cum speculum quod vocant uteri, immittebant, potest vel sine eo speculo, ut non semel vidi, in conspectum venire, maxime si vagina brevior sit, immisso videlicet, loco speculi, eburneo, aut crystallino congruæ latitudinis & longitudinis infundibulo, simulque lumine ea etiam, si opus sit, ratione quæ a me tibi alias (i) indicata est.

19. Obliquitas quoque osculi uteri obstat potest femini, hunc subito. Obliquitas autem illa osculi consequitur uteri obliquitatem, ut Hippocrates (k) docuit, scribens, si uteri obliqui fiant, etiam os ipsorum obliquum fieri. Sed ego cum de obliquo utero aliis Litteris (l) astutus sim; eo jam transeo, ut promissam exigui uteri Observationem subjiciam.

20. MULIERCULA annorum circiter sex & sexaginta, statura quidem infra mediocrem, majori tamen multo quam ut ad pumilionum genus referres, quæ cum olim annos plurimos bajuli qui nunc diem oberat, hominis robusti, sed bardi, conjux fuisset, nunquam pepererat, novissime paulo ante medium Decembrem A. 1749. in Nosocomium venit infirmis viribus, nulla alia de re quæta, nisi de fame; erat enim mendica, & de frigida tempestatis injuriis. Cum ibi igitur, ut refocillaretur, cubaret, ecce repentino animi deliquio corripitur, & intra horam conficitur. VENTREM aperientes, improvisæ mortis causam statim deprehenderunt, ruptum videlicet in mesenterio abscessum, ex eoque in ventris cavum effusam materiam graveolentem: quæ res tanto citius huic anui, quam rhedario, ab Illustri Heistero (m) descripto, exitum attulit, quanto hæc infirmioribus erat viribus, & graviore, ut opinor, ætate. Ea autem exhausta, absterasque materia, & mesenterio cum intestinis amoto, continuo urinarias, & genitales Partes diligentissime e suis sedibus detrahere, ut ego mandaveram, perrexerunt, utraque ibi, sicuti ex viro pridie ostenderam, ita ex muliere Studiois Rei Anatomicæ protinus ostendendas. Quod & feci, non ut naturalem, quemadmodum alias, sed ut præternaturalem, quando sic contingerat, & in parte perraram earum constitutionem viderent. Et in renibus quidem id vitii erat, ut vesicas illas, feri plenas, in superficiei partim extantes, partim semisepultas ostenderent, dexter præsertim qui magnam habebat ad extremum inferius, & faciem præterea hic illic, si attente aspiceres, inæqualem. Ureteres tamen non dilatati, imo parvulis osculis in vesica hiantes, sana quidem, nisi quod cum runicæ ejus cæteræ essent in se contractæ, extrema tamen erat non modo laxissima, sed si vel leviter traheres, facile sequens, & a cæteris late secedens. Urethra denique, cuius erat iusta longitudo, si intimam faciem inspiceres; minimas hic illic quasi vesiculas subvideres. In genitalibus autem plura a consueta natura norma recedebant. Ut enim omittam in ejus ætatis fœmina, & bajuli uxore, naturalis parvitatem, nympharum autem tantam exilitatem, vix ut earum initium, idque levissimum, brevissimumque appareret; clitoridis glans, & præputium nusquam occurrebant; sed utriusque loco rotundum,

(o) c. seq. (p) c. supra ad n. 11. cit. (q) Chirurg. Eff. p. 2. ubi de Sectionib. c. 46. (r) loc. cit. (s) Cent. 2. Obs. Chir. 60. Exempl. 3. (t) Cent. Obs. Anat. Chir. 33. (u) Disp. cit. n. 4. (x) Opusc. Med. in Schol. ad Patr. Obs. 30. n. 3. (y) Act. N. C. Tom. 6. Obs. 88. (z) Observ. 1. (a) A. 1734. Hebd. 25. ad finem. (b) Obs. 60. cit. Exempl. 2. (c) Epist. 35. n. 3. (d) Disp. de Obsteric. Errorib. & caus. §. 7. in fin. (e) Disp. Anat. ab Hallero collect. Tom. 5. pag. 227. (f) De Re Anat. l. 15. in ipso fine. (g) Imperfor. mulier. & caus. Obs. (h) n. 20. (i) De Nat. Mulieb. n. 33; De Morb. Mulieb. l. 2. n. 50; De Sterilib. n. 1. & caus. (k) Ist. della Generaz. P. 3. c. 1. n. 5. & seq. (l) Sect. 5. Aph. 46. (m) Sect. hac 54. Obs. 4. in Schol. ad §. 4. (n) De hum. corp. fabr. l. 5. c. 4. (o) n. 5. cit.

(p) Ibid. n. 6. (q) Ibid. n. 7. & c. 2. n. 43. (r) Obs. Med. l. 4. prope fin. (s) Opere T. 3. P. 3. n. 12. (t) Cent. 4. Hist. 64. (u) l. 3. S. 24. Obs. 18. §. 10. (x) Epidem. l. 5. n. 13. (y) ad Boerh. Praef. ad Infl. §. 675. not. i. (z) De Chir. Oper. ubi de vitii quor. causa fœminæ concub. non admitt. (a) Observ. 1. (b) loco modo cit. (c) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1704. Observ. Anat. 13. (d) De Sterilib. n. 13. (e) Advers. Anat. l. Tab. 3. (f) supra ad n. 16. cit. loco. (g) n. 20. Disp. supra ad n. 11. cit. (h) De Morb. Mulieb. l. 2. n. 50. & De Nat. Mulieb. n. 33. (i) Epist. 34. n. 13. (k) libro novissime cit. n. 39. (l) Epist. 43. n. 31. & seq. (m) Dissert. de Hernia Carn. §. 28.

tundum, nec parum exstans tuberculum, eadem qua naturale, cute obductum. Quam cum incidissem; materiam multam offendi ejus prorsus naturæ ac quæ sub clitoridis, penivse præputio congeritur, albidam, semisiccantam, & propterea quasi in pelliculas, ut tum solet, quarum alia aliis incumbunt, dispositam: sub ejus autem materiæ ima fere parte clitoridis glandem, ejusque præputium, utrumque tenue, & parvum; ut tuberis illius protuberantia multo maxima ex parte ab ea materia efficeretur. Quæ a me idcirco pluribus hic verbis descripta est, quod ex hac Observatione dubitatio quædam tollitur, quam Santorinus (n) infirmaverat, summi alioquin Viri Boerhaavii (o). Certe enim cum incisa a me cutis neque foraminis, neque cicatricis ullum prorsus haberet vestigium; nunquam illuc se conjicere materia potuit quæ ex urethræ canalculis prodiret; sed neque ex glandulis aliis proximis; ut jam pateat, ex fontibus qui in mulierum glande, aut præputio sint, & quod consequitur, virorum quoque, esse derivandam. Cæterum clitoridis neque corpusculum, neque crura, neque ullus ex iis quos illi solent attribueret, musculis deest: plexus autem Retiformis exigua erat crassitudine. Etsi autem hymenis vix unum atque alterum, idque leve, restabat vestigium; vaginæ tamen orificium ea erat angustia, ut virum nunquam admisisse videretur: certe crassiores de quatuor minoribus meæ manus digitis non transmississet. Vaginæ autem, secundum longitudinem apertæ, & explicatæ latitudo erat vix paulo amplior duobus digitis transversis, longitudine quatuor non æquabat. Nullæ intus carunculae, nullæ rugæ, si perbreves, & angustam exciperes pone alterum vaginæ orificii latus quasi corrugationem. Uteri osculum nulla extuberante corona cinctum, forma erat propemodum circuli, fed parvi adeo, ut mediocre specilli capitulum non admitteret. Inde ad supremam usque extimamque fundi uteri partem haud tantum erat intervalli, ut æquaret maximam mei digiti pollicis latitudinem. Neque indicata longitudine erat latior summa, id est latissima uteri pars; nam reliquum ne latitudinem quidem æquabat apicis digiti minimi, vel antequam incidere, speculata. Incidendo, parietum crassitudinem reperi tum fundi, tum cervicis tenuiorem quam ubi in ea Graafii Figura (p) quæ uterum exhibet infantis, die 23. ex quo edita fuerat, mortuæ, tenuissima delineatur. Quæ ex Figura cum ea quam paulo ante indicavi, longitudine comparata, facile intelliges, ex quo mulier quæ de loquor, nata fuerat, non videri ejus uterum crevisse, aut si in latum crevit supremam parte, certe proportionem longe, atque adeo nimio minus vel in parva muliere crevisse quam reliquas ejus corporis partes, nec facile unquam menstruum sanguinem ejecisset. Cæterum ut in ea Figura vides, ita in muliere hac quoque duplo erat longior cervicis cavea quam fundi uteri; sed vix subobscurè cerni in cervicis cavea poterant fibræ aliquæ, eæque dumtaxat in longitudinem ductæ: ejusque interior facies alba, fundi ex subrubro fusca. Attamen Fallopii tubæ erant multo quam tanta uteri parvitas ferebat, longiores, osculoque inter fimbrias aperto: quanquam alterius fimbrias minimis, albidis, subrotundis corpusculis offeis, aut certe præduris, exterius asperas deprehendi. In Alis Vespertilionum plexus erat nullus; nervi tamen multi secundum earum longitudinem decurrebant. Vincula Teretia hic uteris habuit valde tenuia. Lata autem, id quod ex ejus parva adeo latitudine consequeretur, perquam ampla. Quorum summas oras frustra inspectavi, ut quales testes mulieri huic obtingissent, viderem. Tunc vasa Spermatica, quæ visa hic non multo quam soleant, tenuiora, diligentissime persequutus præsertim quæ Lata adibant uteri vincula, cum proxima, ex qua hæc vincula incipiunt, peritonæi porione annexa adhuc, accurate depicta, nullos omnino huic feminae fuisse testes, nullumque eorum vel perobscurum inchoamentum, præclare cognovi.

21. Ex his quæ in frequentissima Studioforum corona demonstravi, satis superque intelligis, ut opinor, perinde fuisse huic mulieri ex quo isto utero præditam esse, ac si omnino caruisset. Quam rara autem sit exiguitas, a me descripta, ex omnibus quæ in Sepulchretum congesta sunt, parvi uteri exemplis ipse poteris existimare. Amatus quidem ait, (q), *solere hujusmodi uterum, contractum videlicet ac parvum, in nonnullis non raro conspici præcipue sterilibus, & quæ nunquam pepererunt: quibus mamillæ quoque parvæ, & contractæ sunt, ut ex*

illis uteri parvitas & exiguitas etiam arguatur. Sane & ipse steriles quædam mulieres novi, quibus præter papillam, & areolam, vix ac ne vix quidem mammarum esset quidquam. Sed quem tamen uterum designat Amatus? nempe quem viderat inter rectum intestinum & vesicam contractum, ut altera vesica ab imperitis crederetur. Num vero quisquam vel imperitissimus poterat quem ego conspexi, pro altera vesica accipere, brevem, angustumque adeo, nullaque propemodum crassitudine? Quod repones pariter Juceii Observationi (r) in altera sterili, uterum instar pomi Borsdorffiani minoris contractum proponentis. Quæ Observatio, ut ex instituto certe debebat, minime in Sectione hac commemoratur. Commemoratur autem altera (s) in qua uterus exiguus & artus fuisse, scribitur, qualis puella 10. aut 12. annorum. Qui propterea nihil ad nostri parvitatem; quamvis ille compressus præterea dici non posset ab utre, ex ipso initium fumente, & ventris capacitatem jam a sexennio expleante. Describuntur denique ex Rioloano Observationes duæ (t), quas, si paulo attentius legas, unam eandemque esse, sentias. Nec sane aliud discrimen est, nisi quod in prioribus Anthropographiæ Editionibus (u) unde prima describitur Observatio, nomen matronæ appositum est; in posterioribus (x), unde altera, prætermisum; nam quod capitis numerus neutrum respondet, fortasse ex operam incuria est: tuberculum autem quod in cervice memoratur, & in Sepulchro (y), pro sterilitatis causa accipitur, Rioloanus, si quæ præposuit, attendas, videtur pro fecunditatis causa accepisse, præsertim cum ea matrona sterili non fuisset, imo liberos olim tres edidisset. Verum utcumque hæc sunt; quod ad nos attinet, in eo est quod cum anno ætatis 55. decessisset, exiguum matricem, durissimam, ac ferme cartilagineam habebat. Vides autem exiguitatis modum ab Auctore non definiti: & quamvis hæc summa reperta esset; ab ortu tamen, ut pote in ea quæ ter pepererat, non fuisse; sed a morbo, qui postea sensim, ut duram adeo matricem fecerat, sic etiam contrahere potuerat. Quod fac meminere cum in alias incidit hujus generis Observationes, in eamque præsertim in qua (z) femina diuturno faccato hydrope confecta uterum quidem leges nuci moschate magnitudinem non superasse; eundem tamen instar cartilaginis induratum fuisse. Observationem autem alteram (a) qua parvum instar ovi columbini invenerunt, explicandi occasione proximis Litteris (b) habebimus.

22. Sed in nostra Observatione illud præterea rarum fuit, quod testes deessent: qui vel duarum in quibus nullum prorsus uterum fuisse, diximus (c), in prima tantum, non pariter in altera defuerunt. Quorum ego, & tubarum vitia, quæcumque in dissectionibus conspexi, si vellem omnia singulatim his Litteris comprehendere; nullas hinc accepisses longiores. Sed nimirum operam supervacuum fumerem, cum eorum pleraque alii Epistolis scripserim, aut sim scripturus. Itaque nonnulla hic attingam, quæ commodum alibi non esset locum habitura, de tubis primum, tum de testibus.

23. MULIERIS annos nata circiter quinquaginta cum exacta genitalia in Nosocomio demonstrarem in eunte Aprilis A. 1743; hæc duo animadverti. UTERINI oculi corona, quæ erant crassissima, prominentiam insuper una ex parte habebat subrotundam, quam secundo, albam intus vidi, scirrhusamque esse, censui. Tubarum autem neutra tenuissimum specillum, per majus orificium ad aliquem tractum, jam inditum, ultra eum locum admisit; re autem vera utramque vidi esse prorsus imperviam.

24. FEMINÆ alterius, quam necdum quadraginta annos natam thoracis acutus morbus, chronico superveniens, absumperat, cerebrum de quo nihil hic attinet dicere, & generationi attributas partes ibidem eodem anno circa medium Decembrem ostendens, in his quædam offendi non indigna quæ huc referantur. A NATURALI ut incipiam, in quo illæsus hymen femina hanc virginem fuisse, demonstravit; subrubentia alibi alioquin semilunaris hymenis cornua ad rubentem quandam quasi annulum perveniebant, quo tamen urethræ finis cingebatur. Urethræ autem alterum, quod ad vesicam spectat, orificium, & proxima ipsi urethræ intima facies nigris, parallelis, crassis, exstantibus lineis secundum longitudinem distinguebatur, quæ vascula erant

vi-

videlicet sanguine distenta. Vaginam, osculum, & cervicem uteri ipsa quidem non secus ac par esset, invenisse habentia. Uteri autem fundus cum protuberaret aliquanto magis quam solet, neque hujus rei causam in parietibus, qui sani erant, reperire; in cavea reperi, cui tres innatae erant excrescentiæ. Harum maxima paulo minori erat ambitu quam unguis digiti pollicis, nec valde crassa, undique soluta, nisi qua per non tenuem pedunculum cum summo cavæ sinistrolatere committebatur: intus extraque magna ex parte cruenta adeo ut nigricaret: paulo minus dura, quam parietum uteri substantia. Ad summum quoque oppositum latus par erat nigredo; sed nulla ibi excrescentia. Erat autem altera aliquanto infra eum locum intervallo, subrotunda mediocris, & ejusdem ferme ac prima, naturæ. Minima tertia, paulo infra ipsam primam locata, compuncta aquam emisit, quasi hydatidem intra corticem ex nigro cruentum contineret. His ita conspectis, cum ad Alas Vespertilionum oculos convertissem; in eam singulis inter ipsum testem ac tubam ternos quaternove globulos majores, minoresve animadverti duos, & ex rubro fuscis; ut a primo scirrhusas conglomeratas glandulas esse, crediderim. Verum scapello adhibito, sub cortice membraneo illius quem dixi, coloris, nucleum invenisse album, lævem, & facile excidentem, durum, ut offeus, an lapideus esset, dubitares, figura, & magnitudine quoque, si eductum e maximo globulo spectares, pisi mediocris. Globuli minores nucleum huic similem, sed minorem, continebant, nisi quod in uno ex minimis per nucleum materia inerat alba quidem, fed submolli; ut ex ea duos concrevisse nucleos, facile conjiceret. Intelligis, quid impediementi ab interiectu & pondere istiusmodi globulorum futurum esset, tubarum motui, & propiori ad testes accessui. Verum insuper hi quidem erant exiguus, contracti, & strigosi. Tubæ vero pariter imperviae atque in superiore muliere dictum est, nisi quod tenuissimum specillum aliquanto tamen propius uterum admittebat.

25. Etsi vero qualem in duabus hisce feminis deprehendi tubarum occlusionem, talem reapse in aliis quoque, ut ex aliis habes Epistolis, nonnumquam inveni; longe plures tamen fuisse, fateor in quibus cum oclusas primo tentamine existimarem, post accuratorem perquisitionem revera fuisse pervias, animadverti, & quod in I. olim Adversariis (d) scripseram, insectus temporibus confirmavi. Sic vero aliis pariter observatum esse, testimonium comprobant Experimentissimi Halleri (e), non sapisime tubas obstructas esse, recte contra Ruyschium Morgagnus Advers. I. Sane autem cum Ruyschius in Observatione (f) quam Sepulchro non additam fuisse, mirum est, duos tubarum occlusionis modos haud obscure proposuisset, quorum unus est quando altero extremo cum teste arctius sunt coalitæ, alter, cum obstructæ sunt alter; manifestum esse omnibus potuit, mea illa Adversaria attente legentibus, de primo verba me non fecisse, utpote in quo nulla est opus perquisitione, ut evidentiissima occlusio in conspectum veniat. Quæ cum ita sint; fateor, me legentem quæ Ruyschius (g) pro se reposuit, quantum eximia Summi Anatomici erga me humanitati obstructum me sensi, tantum esse miratum, cur ipsi visus sim illum tubæ cum teste coalitum nunquam oculis spectasse meis. Spectaveram autem, & spectavi etiam postea, ut meæ adeo Epistolæ ostendunt, nec solum in vetulis (h), sed & in junioribus (i); & in utrique interdum utrinque (k), alias ab altero dumtaxat latere (l). Sed & Observationes super sunt aliæ, quarum huc duas adscribere non gravabor.

26. ANUS, ex capitis ictu mortuæ, genitalia cum annexis urinariis Partibus ad meallata sunt, Anatonem in Gymnasio tradentem, sub Januarii finem A. 1743.

AORTÆ truncus qui interrenes descendebat, intus a summo ad finem usque faciem ubique habuit maxime inaequalem, & quasi corrosam ob ossas squamas, crebras adeo, ut Lumbiarum arteriarum oscula ne agnosceri quidem facile possent. Tubæ autem uteri ita cum testibus, alioqui non tumidis, concretæ erant, & confusæ, ut altera præsertim, quæ fimbriis omnino carebat, a teste internosci non posset.

27. MULIEREM intra trigessimum circiter a partu diem lenta febris absumperat. Eodem ad me, tempore propemodum eodem, fed A. 1746. quidquid ex genitalibus ejus potuit, allatum est. TESTIS enim, & tuba dextera inter se, & cum proximo Colo intestino glutinata, magna jam ex parte abscissa

corrupta fuerant, quem febris illius, ac mortis præcipuam causam fuisse, arbitror. Uteri constitutionem, puerperæ convenientem, alio describam loco: satis hic erit quod morbidum visum est, adnotare. Scilicet coronæ osculi pars quædam, anteriora spectans, ex violaceo nigricabat: sed & secundo ab osculo ad cervicem usque longitudinis medium, intra hujus parietum substantiam nigredinem animadverti quasi sanguinis intra dilatata vasa subsistentis.

Testis denique sinister colore quidem, & magnitudine a sano quocumque non discrepabat. Mollior tamen erat, fœtusque humidior, ut quali ex gelatina potius, quam ex alia substantia, factus videri posset. Nihil usquam lutei, nihil vesicularum fuit, si cellulam excipias sphaericam, exigui uvæ acini magnitudine, inanem, ex crassiuscula, albidique tunica factam. Quæ cellula, sub ipsa testis membrana sita, indicium suidederat priusquam ille incidere. Nam sub obscura quasi cicatrice, ei cellulæ respondente, sublati quiddam transpici videbatur.

28. Non puto, ex hac utriusque testis, & alterius tubæ constitutione capiturum te esse argumentum ad sententiam impugnandam quæ nunc doctioribus plerisque, aut certe bene multis placet de usu istarum particularum. Ejusmodi enim argumenta, ab Nabotho quoque (m), & ab aliis olim inculcata, non modo seipsas quam sint facile soluta, sed & alia non paulo in speciem difficiliora, ut cum femina quædam objecta est, quæ cum a longiori tempore non esset gravida, quam ut fœtus vix tertiam partem aquaret longitudinis minimi digiti, utrumque tamen testem scirrhusum habebat. Satis enim est ut cum femina concipit, testis alterius non minor particula sana sit, quam quæ ad unam maturam vesiculam, sive potius ad unum maturum pertineat luteum corpus. Quod ubi officio perfectum est suo, si ipsum quoque, dilatante se morbo, vitietur, & vel in scirrbi naturam degeneret; nihil id laudat sententiæ officit. Vitiari autem posse intra non plurimas hebdomadas, nedum intra novem ipsos gestationis uterini menses, quid est quod asserere prohibeat? Quo magis mirandum est, fuisse haud ita pridem qui tubas obijceret sine fimbriis, & occluso prorsus quod inter has est, orificio in muliere ab se inventas quæ ante octo annos pepererat! quasi vero sic natam fuisse, credere oporteret, nec potius a morbo non antiquo iis particulis multatam esse, præsertim cum *pulbus aliquis pyriformis, materia subalida fluida turgens*, quam pus fuisse, credibile est, fimbriarum locum occuparet. At enim *fictiones intellectum quidem adjuvant, inquit, rei veritatem non demonstrant*. Sed ubi demonstrationibus non est locus, sententia autem quæ istiusmodi impugnatur argumentis, jam satis multis fulta est rationibus, atque observationibus; quid cum his verisimilior congruat, videndum est, idque reponendum. Atque ut intelligas, quanto aliter mihi atque illi, videatur; illi ne octo quidem anni ad hujusmodi vitia inducenda satis erant: mihi nonnumquam satis est ipsum alicujus partus difficilioris, & insecti non felici puerperii tempus. In tali enim partu vehementes, crebrique nifus gravem uterum urgent (quod alibi etiam attingi (n)) in testes, tubasque subjectas, quæ particulæ ad pelvis os appropinquunt, & inflammationis initium contrahunt, quam augent mox lochia, exempli gratia, parcius fluentia. Tanto autem facilius contingere hæc, arbitror, quanto magis in prægressa uteri gestatione violenti, frequentesque vomitus illas particulas præferunt, atque concusserint, aut aliæ causæ aliquæ jam lædere inceperint, & ad capiendum vitium disposuerint. Sed his missis, ad historias revertamur, & quoniam de tubarum peculiaribus, & de his, ac testibus communibus vitiis quædam attingimus; nonnulla testium quoque peculiarium vitia strictim proponamus.

29. FEMINAM quadraginta circiter annos natam apoplexia olim tentaverat, novissime autem rediens confecit. Ex ea, cum publicas Anatomicas demonstrationes haberem A. 1725. nullæ aliæ in Gymnasium illatæ sunt Partes, nisi quæ lotii excretioni, & generationis operi interveniunt. RENIBUS interiectus Magnæ arteriæ truncus initia, sed levissima, intus ostendebat ossicularum squamularum. Renes ipsi, qui non ita multa pinguedine erant exterius præditi, eadem inter papillas ea copia facti erant, ut majorem non meminere. Testes ambo quidem erant strigosi; sed dexter multo magis contractus: ex eoque hydatidis exstabat castaneæ figura, & magnitudine, subfalsam aquam intra tunicas continens crassas, interiore facie æquales, & læves. In sinistro penitus

(n) Obs. Anat. c. 10. §. 12. (o) Epist. de Fabr. Gland. (p) De Mulier. Org. Tab. 24. Fig. 4. contra litteram G finisram.
(q) in Addit. ad Sect. hanc 34. Obs. 2. (r) quæ 1. est in Addit. ad Sect. 10. l. 2. (s) Sect. hac 34. Obs. 4. §. 17.
(t) Ibid. §. 3. & 5. (u) ut in illa A. 1626. l. 2. c. 34. (v) ut in illa A. 1649. eod. c. (y) Vid. inter titulos Obs. 4. post n. 4.
(z) Commerc. Litter. A. 1731. Spec. 19. n. 2. (a) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obs. 105. (b) n. 26. (c) supra, n. 13.

(d) n. 30. (e) Historia dissect. fem. gravidæ §. 2. not. b, & ad Praelect. Boerh. ad Instit. §. 668. not. e.
(f) Cent. Obs. Anat. Chir. 83. (g) Advers. Anat. Dec. 1. c. 2. (h) Ibid. & Epist. 11. n. 47. (i) Epist. 29. n. 14. & Epist. 26. n. 13. (m) Disp. de Sterilit. Mulier. n. 11. & 12. (n) Epist. 39. n. 38.

tus condita erat cellula rotunda, minori uvæ acino haud major, quam albi & crassiusculi parietes efficiebant intus inæquales, & humoris aliquid complectentes.

Cæterum in neutro ex naturalibus vesiculis ulla fuit.

30. Cum hæc vesiculæ ad generandum sint necessariae, siue ipsæ, ut plerique credebant, sint ova, siue potius in luteum corpus mutantur, perinde esse, vides, siue profusus desint, siue non eum quem debent, humorem contineant. Itaque mirandum non est, si mulier, sana aliqui, & juvenis, juvenique, & valido marito nupta, sterilis fuerat, in qua Vallisnerius (o) vesiculas omnes turbida, & fuliginosa materia, parumque fluida plenas offendit. Neque non timendum erat, ne infœcunda fieret, si vixisset, juvenis altera, intra horam a primo partu mortua, in cuius utroque teste, Alexander Bonis ad me scripsit, vidisse se cum Santorino quamplurimas variæ magnitudinis vesiculas, pellucidum quidem humorem continentes, sed in quo parvum corpusculum candidum, quameunque examinares vesiculam, conspiciebatur. Quam desideratissimorum Amicorum Observationem tibi libentius memoravi, ut morbi effectum esse posse, intelligas, quod graves Auctores pro fecundæ factæ vesiculæ indicio proposuerunt.

31. Quot huc præterea addere possem, ni longior esse nollem, me vitiorum testium muliebrium Observationes, velex iis conjicies quæ de ipsis illorum vitiis, aliis

quidem rarius, aliis autem persæpe a me repertis, prefatus olim in I. Adversariis (p) indicavi. Quem locum, ut plures, idem confirmantes, commemorarunt; sic nefcio cur vix perpauci, in quibus præcipue fuit Cl. Vir Paitonus (q), alterum se locum legisse, ostenderint, ubi in Adversariis IV. (r) quid, & cur mihi videretur de vesicularum, & luteorum corporum natura, & usu, proposui; cum plures tamen post annum quo illa sunt edita 1719. eadem essent suis in scriptis repetituri. Sed ad locum illum primum ut redeam; qui meis illis, aut aliorum consimilibus Observationibus abusi sunt, ut aut testes esse inutiles, aut mulieres ut plurimum steriles fore, contenderent, ii minime animadverterunt, neque ut plurimum, si juvenes, sanæque incidamus, ea vitia occurrere, neque necesse esse ad concipiendum, ut omnes utriusque testis particulae sanæ sint, neque demum, cum præter testes, tot alia muliebres partes, quæ ipsæ quoque sæpe vitiis obnoxie sunt, ad gignendos liberos sint necessariae, revera non perarò, sed neque ut plurimum, neque ob eandem causam, mulieres aut infœcundas esse, aut fieri, vereque olim hæc ab Hippocrate (f) scripta esse: *Atque tot, ac talia muliebres contingunt, propter quæ non pariunt, antequam cœventur, & propter quæ omnino steriles fiunt. Quare mirari mulieres non oportet, quando cœvent quidem, non autem sæpe pariunt.* Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XLVII.

Agitur de Menstrui Fluxus vitiis, & de Fluore Muliebri.

ETSI Bonetus singulis hisce argumentis singulas Sectiones attribuit XXXV. & XXXVI; tamen non una mihi causa est, cur ambo his unis Litteris complectar. Nam illud primum animadverti, si longa, & crebra Scholia detrahas, eaque ex quo meliora in Medicis Scholis tradita sunt, haud raro inutilia, non ita multas in istis brevibus aliquin Sectionibus Observationes superesse. Deinde ex his esse aliquas, ut Bonetus ipse fatetur, ab eo alibi propositas, imo & nonnullas quæ, ipso non sentiente, in una eademque Sectione repetuntur, ut puta in XXXV. Observationem IV. in ea iteratam quæ sub Observatione VII. ultimo loco est, nempe §. 10; in Sectione autem XXXVI. eam quæ Observationis I. §. 1. legitur, repetitam §. 2. Quæ repetitiones eo minus ferendæ sunt, quod aut secundo loco imperfecta historia est, ut in exemplo altero, aut etiam utrobique, ut in primo. Nec vero dicas, utrinque rejici lectores ad rit. de ventris tumoribus lib. 3. Versandæ enim sunt grandæ paginæ centum octoginta sex, ut in eam denique historiam incidamus, longe aliis verbis incipientem, eoque minus facile reperiendam, sub Observatione LV. §. 23; sed ne ibi quidem accurate descriptam, neque ullis, quibus opus erat, animadversionibus emendatam. Scripserat enim historia Auctor Dodonæus eo ipso quod indicatur, capite 34. ex ejus Virginis utero, quantumvis exulcerato, nulla ideo toto morbi tempore excrementa descendisse, quia hymen obstabat, quod natura virginibus concessit. In Sepulchreto autem legimus qui natura virginibus concessit. Verum utrobique modo legas; quomodo virginibus cæteris menses effluunt? imo isti ipsi quæ erat quinquaginta quinque aut sex annorum, si ante morbum non effluxissent: quomodo id Dodonæus omittere potuisset? Igitur nec quod natura concessit, nec qui natura concessit legi potest. Postremo aliquot miror suis cum Scholiis Observationes, ut quæ Sectione XXXV. sub Observatione I. proponitur, non, ut institutum postulabat, ad morborum causas, sed ad naturales menstrui sanguinis fontes attinere: hosque in vagina, si productas attendas Observationes, constitui. Quas quidem ego inficiatus sum nunquam; etsi mihi necdum contigit, ut alibi quam in fundo uteri viderem; nec magis facere possum rationes quasdam quibus ad illud confirmandum utuntur, velut illa quæ in Scholio subijcitur §. 2. Observationis I. nimirum vaginæ aliquando cancrum aut scirrhum supervenire incurabiles, eoque magis si menstrua deficiant, quia sanguis qui expurgari solebat, ibi diutius cunctatur, remanet, & calefit: rarius in fundo & cavitate ipsius uteri maligna ista ulcera, & tumores nascuntur. Hoc enim; ut alia præteream; num rarius fiat, tibi satis ostendunt pleræque Sectionis proximæ Observationes. Verum hæc, & de naturali menstruarum purgationum causa Ob-

servationem III. cum prolaxis adeo, quæ ipsam consequuntur, Scholiis omitamus, & propoliti memores, primum de Menstruis ea quæ ad morbidam constitutionem attineant, ex Valsalvæ Observationibus describamus.

2. VIRGINI quæ falacior videbatur, vividior certe erat, necdum menses fluxerant, cum anno exacto duodevigesimo extincta est. UTERUS erat exiguus: fundi tamen longitudo non minor, quam cervicis.

3. Satis hoc est, ut intelligas, in hac tamen Virgine crevisse uterum magis, quam in ea Muliere quam superioribus descripsi Litteris (a); ut exiguis quidem esset, sed pro ista ætate exiguis, confirmetque Observatio conjecturam de illa nostram, mensibus nunquam esse purgatam. Excitare etiam potest ad suspicandum, nam quod virginibus nonnullis, sanis aliquin, alacribus, & jultum corporis augmentum consecutus, menstrua annis aliquot postquam plerisque solent, proveniant, num, inquam, tardiori aliquando uteri incremento adscribere oporteat. Novimus generosissimam Virginem, in earum quas modo indicavimus, numerum referendam, quæ nupta antequam menses, annos aliquot expectati, apparerent, fecundissima tamen fuit, utque id minus miraremur, eadem profusus ejus quoque matri contigerant. Nimirum satis est, quod tunc fecimus, ubi egregie valent, expectare, & nihil movere, ne operi quod natura tardius aliquando perficit, moram forte nostris intempestivis auxiliis afferamus.

4. VIRGO altera, multos jam annos mensibus carens purgationibus, diuque ulceribus in tibia vexata, tabefacta periit. IN THORACE, & Ventre stagnabat aqua. Testes sine ullis vesiculis, ex substantia constabant subalba ad pancreatis similitudinem, sed molliore. In uteri interiore facie corpora glandulosa protuberabant quam plurima, nisi quod in summo fornice pauca erant.

5. En exemplum alterum quod Medicis quibusdam obijcias nimis properantibus, ut menses ciant. Non reputant scilicet, quam variæ & inter se discrepantes causæ esse possint cur illi non fluant, & continuo ad ea decurrunt quæ moveant, quasi uterus ipse satis paratus semper esset ad incitatum sanguinem transmittendum. Itaque haud raro vitii causam augent, non tollunt. Prosperè cedunt illa in plerisque, ubi sanguis est viscidus, aut ab nimia feri copia iners; abundare enim plerumque hoc vidi, parte reliqua missi sanguinis fere in cylindrum æquo tenuiorem contracta, cum illa purgatio aut ex toto, aut magna ex parte deesset: quin etiam sic esse animadverti vel in quadam cui a quinque aut sex, haud amplius, diebus fuerat illa medio in cursu ex terrore suppressa. Verum qui possint remedia illa bene cedere non modo cum sanguis e contrario ferventer est, aut copiosior, sed cum ipse quidem sic satis recte se habet, uterus autem sicior est, & contractior, aut, quod ex diuturnis quibusdam morbis, ut in proposita Virgine, suspicari licet, organico quopiam

piam vitio affectus? Nempe alias humectare, & laxare præstat; alias autem vitia alia, quo ad ejus fieri potest, resolvere. Nobilem ego Medicum novi qui ad cœnæ mensuram uti consueverat chalybis scobe, mista cum massa pilularum de aloë, & de ammoniaco, & concreto eichoreæ succo, addito insuper cum remedii vim augendam censeret, pauxillo dictamni Cretici, myrrhæ, & croci. ex quibus confectas pilulas quotidie dabat fere binas ante parcam cœnam, mane autem jusculum, & herbas, & radicibus medicatum quæ emolliendi, & quæ aperiendi facultatem haberent: hisque auxiliis ferme semper sui voti compotem se factum aiebat; modo apta simul servata esset vivendi norma. Scilicet hic, cujus ego remedia commemoravi, non quod non vulgarissima sint, sed quod alia aliis sint facultatibus prædita, sæpius potuit id quod susceperat, efficere, melius tamen effecturus, si quid potissimum in singulis feminis præstare oporteret, scire licuisset. Unum enim, sed præ cæteris conveniens, auxilium citius, & efficacius rem gerit. Sic alius mihi notus est Medicus, qui cum videt, aloeticis esse locum, nihil nisi pauca aloes grana, quacunque re quæ amaritudinis sensum prohibeat, involuta, quotidie exhibet, hisque dumtaxat feliciter menses revocare se, dicit, quam granis multo pluribus, aut aliis simul datis remediis. De vivendi autem norma minime negligenda quod diximus, tanto certius est, quanto evidentius, ad erroribus in ea admisis expurgationem hanc valde imminui, & interdum suppressi. Ita; ut veteri exemplo recentem quarundam errorem notemus: Galenus (b) memoria tradidit, Romæ sua tempestate contrigisse, cum vulgo mulieres aquam frigidissimam ex nive potarent, ut aut nullo pacto, aut prolixius imminute purgarentur.

6. Sed ad auxilia ut redeam menses cœntia; est aliquando cum locus siue in præsentia, siue in posterum ipsis est nullus; ut puta cum uterus ejusmodi vitio affectus est, ut tolli non possit. Exemplum ab Experimentissimo accipiam Benevolo (c). Quatuor ille virginibus retentum in utero cavo menstruum sanguinem, chirurgicus usus præstidit, emisit. Earum tres primæ singulis postea mensibus secundum naturam leges sanguinem ex utero prodeuntem viderunt. Quartæ ne octo quidem, aut decem post annis, Medicis omnia incassum tentantibus, unquam proditit. Quid ita? Nimirum quia hæc nec breviori tempore, ut illæ, neque minore quamdam, minusque noxii sanguinis copiam, sed triennium ipsum, ut jam duas, & triginta libras æquaret, nec sine putrida purulentaque admixta materia, in uteri cavea retinuerat. Veri igitur simile erat, lastam hujus interiorum faciem, cicatrice obducta, non patula amplius habere oscula, unde itatis temporibus sanguis exiret. Quid autem, rebus ad hunc, aut ad similem alium quempiam modum se habentibus, ab iis quæ sanguinem incitent, remediis expectare liceat, nisi ut malum ad malum addas? Parcius hæc alimentis utantur, & incisa, cum opus est, brachii vena, sanguinem mittant.

7. Nunc quando in sermonem quem tibi esse pericundum scio, de medicis curationibus deficientis menstrui sanguinis ingressum sum; priusquam ad contrarii vitii anatomicas historias transeam, quoniam adversus hoc alterum præsidium plurimum fideret Vir indolens, atque experiens Jo. Hieronymus Zanichellius, subijcere non gravabor. Cochleas ex parvulis istis, & albicanibus, quæ super carduo stellato inveniuntur, exacte una cum testis contundi in mortario jubeat, additaque modica portione conservæ, ut vocant, violarum, in linteo suspendebat, liquorem, compressionis etiam ope, descendentem excipiens. Hujus liquoris satis recentis uncias tres mane, totidem meridie ante prandium, totidemque vespere ante cœnam propinabat, cum a dissoluto sanguine, & irritantibus particulis fœto, nimium ipsius ex utero cursum fieri, censebat. Ea autem felicitate, confirmabat sibi hunc liquorem respondisse, ut ad sanguinis etiam expectationem, si ab istis causis fieret, compescendam transulisset, nec mihi aliter hæc concederet, nisi pollicito, quo ad ipse viveret, nemini, quod & præstiti, revelaturam. Hoc etiam ab illo accepi: cum mulier septem ipsos annos uteri hæmorrhagia, irritis præsidii omnibus, laborasset, bene ac feliciter ab se esse perlatam, dato limonum succo, & salis spiritu pari pondere. Dedit autem propterea quia certam quandam scorbuticam in ea sanguinis constitutionem esse, conjecerat; expertum autem antea esse, quam profuisset aliis idem illud remedium ore continere, cum scorbutus graviter hoc erossisset. Ex his, quæ ut narrabat ille, sic ego refero, apparet, in hoc, ut in aliis quoque morbis, magni interesse causarum conjecturam: neque enim omnibus idem opportunum esse remedium potest.

Interdum vero ne ulli quidem, nisi forte inter initia, locus est, velut ex ea intelliges, quam huc ex Valsalva atextam, historia.

8. MULIER annum agens alterum & quinquagesimum, ante quinque, aut sex annos ingenti per naturalia sanguinis profluvio vexari cœperat, sic ut grami sanguinis ad felibræ pondus exirent, minoribus aliis postea subsequenibus. Serosa quoque interdum prodibat colluvies, alias humor aquæ similis in qua caro recens lota est. Qui si effluxus aliquando supprimeretur: molesti præ cæteris erant vehementer & dolor, & ponderis sensus in hypogastrio, donec rediens effluxus levaret. Ad hæc accedebat interdum urinæ difficultas, quæ post aliquos labores tandem cum sanguine fetido, putridisque filamentis reddebatur. Ischiadicus insuper dolor utrinque mulierem prehendit, noctu præsertim adeo saviens, vix ut brevem sonum capere posset. Tum hysterica convulsiones tanta vi ingredebant, ut fere moribunda, nec semel, videretur. His successit ventris universi tumor mediocri cum summa faucium siccitate, & crebra flatuum eructatione, ciborumque aversione propterea quod vel pauca assumpta illico tensio ad regionem ventriculi molestissima consequebatur. Hæc, & vomitus, cum alia denique silerent incommoda, nunquam mulierem dimiserunt. Quin duobus circiter ante mortem mensibus, vomitus, qui alias rarior, frequentior est factus sic quidem primum, ut nihil, nisi quos sumere solebat, vitellos, rejicere cogeret, cæteris quæ cum iis sumplisset, omnino retentis, deinde vero ut novissimis viginti ferme diebus ex quolibet alimentorum genere vix quidquam retinere sineret: itaque deficientibus in dies viribus, e vita excessit. IN

CADAVERE adeo emaciato, ut vel musculi quasi prorsus essent excarnes, vix ullum sanguinis vestigium usquam supererat. Venter totus falso opplebatur fero, in quo nonnullæ omenti portiones, atque alia quamplurima filamenta natabant. Peritonæi interior facies corpora ubique ostendebat non valde absterilia induratis pancreatis glandulis. Ventriculus exiguus, totusque contractus. Renes, quod ad eorum substantiam attinet, sani. Sed dexter minimos varia forma calculos intus habebat: quorum in sinistro nullus. Uterum uterque urinam continebat, sinister paucior, at dexter, ad minimi digiti crassitudinem dilatatus, erat totus urinæ plenus. Denique fordidum ulcus, & foetidum erat in collo uteri, in cæteris partibus secundum naturam se habentis.

9. Sive ulcus profluvii sanguinis acrioris effectus, siue exilis paulo majoribus vas, ipsius vel ab initio causa fuit; quæ ad ulcus, & profluvium postea accesserunt mala, non difficile possunt intelligi, nervis ob ulceris sedem in consensum trahitis, & sanguine ob ingentem ipsius, crebramque jacturam male reparato, ideoque seroso reddito. Inde enim dolores, hysterica convulsiones, & vomitus; hinc vero, aut potius utraque ex causa ascites, vas videlicet a convulsione sæpius contractis, & sanguine tardius propterea per ipsa circumacta, & sero quo abundabat, facilius effuso. Urinæ autem difficultas, & non nisi post conatus excretio a vicinæ exulceratæ partis dolore, & constitutione, sicuti a retardata excretionem illa, in uteribus lotii retentio, & dexteri præsertim dilatatio ab illapso, & remorato calculo ex iis qui fuerant in rene ejusdem lateris, fortasse grandiusculo, sed neque cum ejectus est, inter tot alios dolores, molestiasque animadverso, neque postea in urina, iis sedata quæ naturale totum inquinabant, cruentis, & putridis sordibus adnotato.

10. Si post Valsalvæ Observationes, accipere quoque aves meas; relegas quæ in utero descripti (d) earum quæ vel imminutis, vel ex toto emanantibus menstruis, interierant. Neque enim hic iterabo, Sed potius ab novissime proposita Observatione profluvii non sanguinis modo, sed & serosæ colluviei, ad Muliebrem Fluorem transibo, quod erat alterum Epistolæ hujus caput. Quem ad morbum etiam nullas Valsalvæ habeo Observationes peculiariter attinentes; tamen ex meis tot supersunt, præsertim si causarum quarundam hujus Fluoris initia persequi velim per dissectionem animadversa, ut, nisi caveam, vereri potius debeam, ne excessurus sim, quam non expleturus quem plerumque servare solitus sum, Litterarum modum.

11. Muliebris Fluoris fontes in utero plerumque sunt. Rarum est enim quod in Historia legitur Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis (e), ex amplo alterius ovarii abscessu, quocum tuba communicabat, in hanc purulentum serum, ex eaque in uterum, ex hoc denique in vaginam defluxisse. Ipse autem uterus feri fons est multicoloris aut simplicis, aut purulenti. Hoc vero defluit ex utero, aut vagina exulceratis. Illud ex utero fere, cujus aut

intima

(a) Ist. della Generaz. P. 2. c. 5. n. 14. (p) n. 30. (q) Della Generaz. dell' Uomo Disc. 3. (r) Animad. 28. (f) De Sterilibus n. 5. (g) n. 20.

(b) I. de venæ sect. advers. Brasiliatensis. c. 3. (c) Observaz. I. Ep. 45. n. 21. (d) A. 1700. Obs. Anat. 5. (e) Ep. 19. n. 13; Ep. 21. n. 29; Ep. 31. n. 26; Ep. 38. n. 34;

intima membrana non secus atque illa narium in coryza, rheumate quodam afficiatur, aut ora vasculorum, post emissum menstruum sanguinem, se hactenus contrahant, ut sanguini quidem exitum, ejus autem fero non intercludant, quod ut alio in aliis colore infectum est, ita in omnibus non eodem colore fluorem facit. Atque hæc quidem in Adversariis (f) indicavimus. De rheumate autem hoc uteri diserte ante Recentiores, locuti sunt præclari Medici, in hisque Gulielmus Ballonius (g) qui *catarrhum* appellavit, & Lælius a Fonte (h) qui *dehiscitionem uteri*, & *tangam rheumatismum* esse, dixit, ante eos autem olim Galenus (i) qui *propter uteri rheumatismum* hos Fluores fieri, docuit. Ego vero ad eos primum qui priore aut altera ratione, aut alia, quam adjiciam (k), tertia ex simplici sunt fero, deinde ad eos qui ex purulento, referendas Observationes proponam.

12. VIRGO annos nata circiter sexdecim, post quindecim dies ex quo febrem pertulerat domi, in Bononien- se S. Mariæ de Morte Nosocomium illata est. Vix illata, lumbricos vomuit, quorum unus erat rufus, spithama longior, crassitudine ferme par calamo scriptorio. Hos etiam domi, præcedente lachrymatione, non pruritu narium, vomuerat. De dolore querebatur cuius sedem ad hypochondrium sinistram, eamque viciniam appositam manu sic indicabat, ut ventrem, an pectus designaret, satis percipi non posset. Pulsus frequens, parvus, debilis. Sæpius interdiu dormitabat. Per hæc triduum transiit. Quo tempore mulieres quæ ancillabantur, præter cætera incommoda, album quoque fluorem esse, animadverterunt. Quarto die sæpe delirare visa est. Pulsus debiliior, ac minor. Lingua rubra, & arida. De capitis dolore querebatur. Die quinto in soporem valde prona, infecta autem nocte multum vociferata est. Diebus sexto, & septimo eadem perstabat: urinam autem, quam sæpe multam reddiderat, plurimam tum, etiam inficia, reddebant. Die ex quo in Nosocomio esse ceperat, octavo, sopore obruta, mortua est. CADAVER altero a morte die consecutum, qui dies fuit III. Kal. Aprilis A. 1706. Cranio aperto; hinc enim juvat eorum quæ vidimus, narrationem incipere; quidquid meningibus continetur, mollius fuit. Inter meningem Tenuem, & rotam Oblongatæ medullæ basim non pauca aqua: quæ passim intra ventriculos quoque, & subruba fuit. Choroides plexus pallescebant: vasa autem, ut alibi per Tenuem meningem totam, sic etiam per Laterales ventriculos repenti; sanguinæ erant turgida: ex iisdemque ventriculis cum ea meningis nullo negotio avellebantur, quam alba aut cinerea illorum parietes facientis substantiæ lamella, ubique paris propemodum crassitudinis sequebatur. Thorax pulmones habuit, præsertim sinistram, intercedentibus membranis, ad pleuram adhaerentibus quibusdam locis tum ad medium, tum ad imum. Dexter superioris lobi superficie intus, cum per investientem membranam globulos quosdam creberrimos transpexisset, milii seminibus haud majores; pulmones, cætera sanos, incidens, eosdem globulos ubique deprehendi, crebros quidem, sed intervallis disjunctos, duos, & quasi, ut videbantur, tartareos. In corde non fuit quod adnotarem; cum vix in auricula dextera polypus cortex grumosi sanguinis latus obtegeret. Abdomen, quod exterius ad illa lividum apparuerat, diducentes, jecur videramus ad medium imæ convexæ faciei macula infectam non magna, circuli ambitu comprehensa, ex cinereo albicante, qui color in visceris substantiam descendebat. In vesicula ad nigredinem vergebat bilis. Lienis quoque lima facies ex livido nigrescebat, ea tamen nigredine vix ultra tunicam se producente. Pancreas visum duriusculum. Ventriculus, quantum extrinsecus judicare licuit, sanus. In Tenui intestino lumbrici teretes manu percepti. Tunc oculos ad ea quæ in pelvi sunt, convertentes, in hac paucam aquam animadver- timus. Vesicam autem, quæ urina distenta fuerat, cum annexis genitalibus eximentes, in ejus intima facie vas- cula conspeximus sanguine tumida ad magnum tractum, ut supra oscula ureterum per quos pergebant, incipien- do, ad urethra usque initium sic apparerent: quin etiam inter ea vascula, locis aliquot, guttas effusi sanguinis per intimam tunicam transpicebamus; in urethra autem ipsa sub interiore ejus membrana, suis vasculis irrigata, gran- diora his alia, sanguine multum distenta. Nympharum sinistra, quæ dextera latior, & usque adeo longior erat, ut ad labiorum frænum perveniret, interfusam substan- tiæ suæ aquam continebat. Porro vaginæ orificium, & hymen ex rubro nigra, & grave olentia, proxima autem vaginæ pars hic illic ex livido flavescens, non obscu-

rum gangrenæ indicium dabant. Ab his infimis ad su- periora conversus, sinistram tubæ latius extremum deor- sum tractum animadverti ab hydatide, acinum uvæ ma- jorem aquante, quæ in attigua increverat parte Alæ Vespertilionis. Sed ea grandiorum hydatidem ab alter- rius testis membrana pendulam fuisse, intellexi ex subro-undo corpusculo, quod etsi erat in se contractum, intra crassiores tamen tunicas modicum etiam tum cavum fer- vabat, & ab eo teste pendebat. In quo corpora duo erant condita subrotunda, alterum altero majus, utrumque au- tem ex nigra tunica factum, & ex concluso quodam quasi sanguinis grumo, rufi tamen coloris. Testis alter binas pariter, inæquales, & ex nigra tunica constructas, conti- nebat cellulas; sed inanes. Parvus erat uterus, & ex pa- rietibus constans parvæ crassitudinis. Ejus fundi superior pars tota a conspicuis sanguiferis vasculis intus rubebat. Cum mucum, secundum naturam se habentem, uteri osculo, & proximæ cervicis parti absterfissim; comprimentem in- feriores uteri fundum, cervicem, & osculi uterini co- ronam, prodire ex his locis omnibus, & ordinatè qui- dem, vidi albam crassiusculam materiam, quæ unde albus fluor provenisset, non obscure significavit.

13. Cæteras historię hujus partes eo quo spectant, per te referes; nos enim de affectionibus quibus de alibi fa- tis scripsimus, hic iterum nolumus verba facere. Satis est partem ultimam attendas: neque propterea quod mate- riam albam crassiusculam expressissim, diximus, aliud fuisse quam serum, credas, cujus particulis cæteris quæ aqueæ sunt, mora decedentibus, aut in alveum sanguinis revertis, reliquæ superflue eum colore, eamque cras- situdinem, ut in feri videmus evaporatione, referentes.

14. VIRGUNCULÆ annorum quatuordecim, post ventris dolores in Nosocomio Patavino mortuæ sub ini- tium Februarii A. 1719. cum genitalia membra Anato- mies studio ad me afferenda curassim, quid morbi præ- ter expectationem deprehenderim, scribam, si prius duo quæ in Ventre adnotata sunt, dum ea membra exime- rentur, indicaverim. VENTRIS viscera hic illic tu- berculis erant inæqualia. Omentum autem crassissimum fundo uteri adhaerebat. Hic vero etiam tum erat valde parvus, qualis videlicet puellam deceret quam, si pu- bem spectares pilis vix ullis instructam, necdum plane puberem posses dicere. Cum incidissim; fundi cavum inveni humida materia plenum, ex albo in flavum, & subviridem colorem vergente. Qua deterfa, fundi in- terior facies apparuit in minuta alba tubercula passim excrefens. Porro nulla osculi uterini corona protube- rat: ipsūque, & proximam vaginam, & inferiorem quoque hujus partem, & hymenem phlogosis tenebat; ut facile esset conjicere a fluidiori acriorique materia illius parte defluente inferiora fuisse irritata, dum cras- sior in decumbentis Virguncula utero subsistens, mi- nutis illis adhaerebat tuberculis, quæ aut ipsa effecerat, aut e quibus fortasse prodierat.

15. Fac tibi alterius adolescentulæ veniat in mentem, cujus pariter uterini fundi intimam faciem parvulis qui- busdam tuberculis, verrucarum similibus, inæqualem de- scripsi (l); facile intelliges, esse illam faciem in hujusmodi alia pronam: id quod excrefentia confirmabunt, de quibus postea dicetur. Noli autem mirari quod in puella id ætatis esse potuerit mulieris Fluor. Pluribus enim circa pubertatis initia incipit, nonnullis etiam vel multo citius, raro quidem, non secus ac raro, sed re- vera multo citius menstruum fluxus est observatus. Le- ge; ut alios omittam; apud Terraneum (m) Observa- tionem nobilis puellæ novem circiter annorum a muliebri Fluore perfanatæ, imo alterius quæ, illa minor annis duo- bus, eodem morbo tenebatur, & quasi serum lactis non- dum clarificatum emittebat copiose, non sine ardore ali- quo, & pruritu.

16. ANICULÆ quæ in hoc Nosocomio nescio quo ex morbo nuper decesserat, cum Partes quasdam ante me- dium Decembrem A. 1744. Studiois ibidem Juvenibus demonstrarem; in nonnulla quæ præter naturam erant forte incidi. CORDIS valvulæ Tricuspidales hic illic duriores, nec Semilanares erant sine duritie. Quin Magna quoque arteria ossæ hic illic intus habebat squamulas.

Testibus hydatides aliquæ adhaerebant. Cum, vagina incisa, uteri osculum retexissim; apparuit hujus ora quasi in partes duas ab anterioribus ad posteriora divisa. Nempe e singulis ejus orae lateribus singule extabant mediocres excrefentia, in quibus, sicut etiam in proximis cervicis parietibus, latebant cellula, seu mavis vesiculæ, in iis- que

que major aliqua, plenæ omnes illo ipso mucos; nisi quod hic flavescerebat; qui secundum naturam solet ad o- sculum inveniri. Dum in cervice sursum versus inciden- da pergerem, ecce ex ipso fundo uteri repente prodit se- rum flavescens quantum cochleari vix excepsisses: quod serum quomodo in eo fundo etiam tum cum uterus exi- meretur, & hac illuc volveretur, retentum esset, non erat facile hic conjicere. In alia enim, cum idem occur- rerit, credere potui, sero obstitisse intimos cervicis lacer- tos, quos crassiores factos, & confuso ordine sitos vide- bam. Quæ res hic non fuit: summa autem fundi pars fer- me tota, præsertim posterior, fædo intus colore infecta ex nigro rubescebat, parum tamen, si incideres, profun- do, & sine graveolentia.

17. Mulieris quoque Observationem referre huc po- tes, quam Epistola XLV. (n) proposui. In illa enim & fundi, & continuatæ cervicis cavum mucos erat plenum tenuiore quam qui ad osculum esse solet, in eaque mulie- re etiam fuit. Scilicet ex fundo uteri, ut in descripti Vir- guncula, atque Anicula materia ex albo flava, serumque flavescens, ita in ea pariter muliere indidem videtur mu- cus ille tenuis provenisse; neque enim e Tubis quas frus- tra in omnibus examinavi, provenerat. In Virgine autem quam ideo primo loco posui (o), quia dum viveret, Fluor in ipsa fuerat reapse animadversus, materia alba non ex fundo uterino, sed ex infima hujus parte, ex cervice, & osculo expressa est. Quibus ex inferioribus locis materiam, humoremque defluxisse arbitror in iis quoque feminis, quarum continuo unius subjiciam historiam, aliarum commemorabo.

18. MULIERIS cujusdam viscera quæ in ventre sunt, post medium Martium A. 1741. in Nosocomio inspecta anatomici studii causa, quamobrem quo morbo con- fecta esset, non adnotavi. Inter ea quæ secundum natu- ram erant, hæc quæ minus erant, animadverti. VEN- TRICULUS ad umbilicum usque se extendebat. Duo- denum intestinum erat latissimum. Uterus totus sic tra- ctus erat sinistriorum, ut manu in medium non posset retrahi, obstanti Lato Ligamento quod multo erat angu- stius inter ejus latus sinistram, & pelvim, quam inter hanc, & dexterum. Fundi inferiorem faciem color in- ficiebat, propemodum sanguineus, ut coronam quoque osculi; nisi quod hic magis in atrum vergebat. Erat præ- terea hæc corona quasi in duas parvas prominentias di- visa. Tum ex osculo, & cervice, mucus prodibat, non qualis solet, sed crassus, & ferme puriformis.

19. Spectare huc, opinor, quæ ad realias scripsi fuisse a me in mulieribus aliis (p), nec non in Virgine quadam (q) observata. Namque in Meretricula uteri osculum alio quodam, & crassiusculo humore fœdum vidi, tum ejus qui in Tubis erat, tum virilis seminis satis dissimili. In Muliere autem altera cum osculi co- rona, & vagina oblita essent materia alba; non pote- rat hæc altiore quam ab osculo, originem habere; lon- ge enim alia erat materia quam supra osculum animad- verti. In Virgine autem cujus vagina sub albo, & crassius- culo humore magis madebat, aut ab eadem corona, aut a vagina etiam ipsa provenisse illum, ostendit superiorum partium dissectio: nec aliunde repeti posse in alia visus est de qua alibi (r) scriberetur. Porro in corona, osculo, proxi- maque cervice interdum prominere, interdum latere vesic- ularum quæ secundum naturam haud aliud contineant, quam limpidum, & in fila ductilem mucum, qualis ad ea loca effusus conspiciatur, ex iis satis nosti quæ in Adversariis (s) olim proposui, & confirmavi: de quarum vesicularum fortuita efformatione commentum recentioris Ana- tomici hic non est opus rejicere, cum jam ab aliis reje- ctum sit. Quid autem vetat, ut in cæteris videmus gland- ularis, ita in his quoque morbi vi pro eo mucum materiam aliam separari, modo albidam, & crassiusculam, modo etiam aquosam? Quin ubi eorum Scripta legas qui ante me vesicularis iis in sedibus conspexerant; plerisque, ut in I. Adversariis (t) scripsi, cognoscas, ex ea quam forte in vesiculis præter naturam aquam invenerant, ipsas pro hy- datidibus accepisse. Quam aquam a me quoque aliquando ob eandem causam in illis esse deprehentam, Adversaria IV. (u) satis ostendunt. Igitur ut secundum naturam mucum illum effundunt; sic vitata in illis secretionem, & al- bidam crassamque materiam, & aquosam possunt effundere.

20. Quoniam vero non solum in parte uteri inferiore, sed in fundo etiam ipso, quantumvis rarius, vesicularis vi- dimus eundem quem ad osculum, mucum habentes; nam in fundo quoque scaturiginem aliquando poterit aquosa, Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

aut crassa, albæque materia, aut alius denique coloris Fluor habere. Decet quæ rarius vidisse diximus, pro- positus Observationibus hic confirmare, præsertim cum hæc ad uteri excrefentias attineant, de quibus proxime se- quitur, ut verba faciamus. Ad Observationem igitur quam Epistola habuisti XXXIV. (x) excrefentia quæ pro- prius supremum fundum, vesiculis hujus generis tegebatur, & ad alteram quam, cum erit sermo de Claudicatione (y), habebis, tuberculi quod in ipso supremo fundo ex illa- rum aggerie constabat, has adde quæ sequuntur.

21. VETULÆ urinarias, & genitales Partes ad me attulerant, Anatomen in Gymnasio explicantem Februa- rio mense A. 1740. AORTÆ truncum, dum illas examinarem, animadverti non carere intus ossiferum squa- mularum initiis, quamvis perpauca, & macularum in- star se habentibus. Uteri fundo adaptato, non mo- do qua cervici erat proximis, vesiculas conspexi, sed & aliquanto superius ex altero illius latere parvum quasi racemum pendere vidi ejusdemmodi vesicularum, quas inter se connectebat alba interjecta substantia, ex qua & petiolus fiebat, nec brevissimus, nec tenuissimus, ra- cemum alligans ad intimam uteri membranam, quæ sana erat, ex eademque alba constabat substantia.

22. Sed quoniam hæc vesiculæ, nisi quod nescio quo casu olim fuerant ex uteri membrana divulsæ; ipsæ ea- rumque mucus ad naturæ normam se habebat; ut ex Observationibus intelligas, posse interdum quem conti- nent mucum ab ea norma, ut supra indicavi, sive co- lore, sive consistencia, ut loquuntur, desciscere; pri- mum fac memineris, cum ex uteri osculo, quemadmo- dum aliquanto superius (z) retuli, prominerent excrefen- tia duæ, ex his vesiculis factæ, mucum in his ipsis fuisse colore flavescens; tum proximam quas lege Observationes.

23. VIRGINIS annos nata triginta tres genitalia di- ligenter secui post medium Martium A. 1717.

UTERUS, ut pleraque alia, naturalem constitutionem servabat. Nam etsi vasa circa ipsum erant tumidiora, & interior quoque ejus substantia sanguine turgerebat; hæc tamen ab instante esse menstruum fluxu, fundi intima facies ostendebat, quæ, digitis subtritus appressis, sanguinis guttas emittebat, quibus absterfis alia succedebat: quod frustra in cervice, & vagina tentabatur. Interea dum hæc experirer, & iis qui aderant, demonstrarem, excre- scentias binas animadverti, alteram in fundi latere dextero cervici proximo, alteram paululo infra in eodem cervicis latere. Parva erat utraque, & ex vesiculis compacta simili- bus. Verum secundo, quæ inferiorem faciebant natura- lem mucum dedere; & quæ superiorem, limpidam aquam.

24. MULIER annorum quinque & septuaginta cum be- ne valere videretur, apoplexia prehenfa, eaque intra tri- duum confecta est. Ventris dumtaxat viscera in Gymna- sium illata sunt, cum Anatomen docerem Februario men- se A. 1735. MESARÆI glandulæ erant nonnullæ tum procul ab annexis intestinis, tum præsertim haud pro- cul, ubi tres quatuorve inter se vicinæ, sed non contingen- tes; quæ glandulæ naturali cum essent colore, & specie, non parvam fabam magnitudine singulæ æquabant, quod in fe- mina id ætatis mirum quibusdam, & fortasse etiam præter naturam videbatur. Appendicula Vermiformis, ut parte vix tertia cava esset, in Epistolis Anatomicis (a) satis indicatum est. Illud hic non omittendum, ex osculi uterini corona in vaginam pependisse excrefentiam mi- nimi cerasi magnitudine, exterius subnigram, & tubero- sam, quam incidendo, nihil aliud esse, reperi, nisi ag- geriem vesicularum aliquot grandiuscularum, quarum ut aliquæ mucum de quo sæpius diximus, naturaliter con- stitutum, sic quædam aquam continebant.

25. Vides, ut eadem vesiculæ & mucum illum, secun- dum naturam se habentes, & alia, in hisque aquam si forte vitata sint possunt secernere, sive in fundo uteri, ubi rarius, sive in cervice, & osculo, ubi multo crebrius conspiciuntur. Cujus ad osculi coronam, a qua nos ex- crescentiam istam, ex vesiculis constantem, vidimus pepend- disse, attinebat fortasse magnus ille tumor, variis locis cellulis aquosis repletus, quem ex genitalibus mulieris ex- cisum Ruyschius (b) describit; quippe qui ex confinio oris uteri, sive circa uteri os internum emergebat. Flu- res autem de quibus ipse hactenus verba feci, omnes ex sim- plici fero sunt. Quorum quidem, neque ita raro, alios alia ratione abactos, aut valde imminutos scio, in iis aliquem ex albo flavum factum, & contumacem, quem aqua sustulit, data bene multis dies, qua in aqua herba saponaria recens cocta esset, usus quoque succini albi, & vini potus in quod

(f) IV. Animad. 27. (g) l. i. Confil. Medic. 56. sub fin. (h) Consult. Med. 117. (i) De Symptom. Caus. l. 3. c. 4. (k) infra, n. 19. & seqq. (l) Epist. 45. n. 21. (m) De Glandulis post c. 5. Obs. 2.

(n) n. 16. (o) supra, n. 12. (p) Epist. 26. n. 13. & Epist. 21. n. 47. (q) Epist. 31. n. 33. (r) E. f. 50. n. 51. (s) l. n. 32. & IV. Animad. 39. & 40. (t) n. 31. modo indicato. (u) Animad. 40. indicata. (v) n. 33. (y) Epist. 56. n. 20. (z) n. 16. (a) Epist. 24. n. 62. (b) Theat. Anat. 8. n. 102.

modicum radicis farfæ parillæ infusum fuerat. Nunc ad eos Fluores transeundum est, in quibus serum defluit purulentum. Qui, si quemadmodum plerumque solent, ex uteri cancro fiant exulcerato; insanabiles sunt vel inter initia. Equidem memini cum pro juniore generosa Matræ, eo morbo ante duos, haud amplius, menses correpta, & jam vehementer laborante, ego, & Senior, non vulgaris famæ, ejus Medicus consilia conferremus, isque sermonis sui hunc finem fecisset, grave quidem esse malum, sed tamen quod recens esset, aliquid a remediis sperandum; continuo me sic dicendi initium fecisse, quod ipsi aliquam spem relinqueret, id mihi omnem prorsus adimere: qui enim ejus generis morbus tam brevi tempore tantos progressus habuisset, hoc ipso, etiam si aliunde insanabilem esse, non constaret, satis ostendere, se remediis omnibus majorem fore. Neque ea me fecellit opinio, muliere, nec multo post, suis acerbissimis cruciatibus, assiduis vigiliis, & ferocæ ac fuscæ, tetrici odoris, saniei jugi defluxu, aliisque confecta, quæ fuit ex Archigene tradidit olim Aetius (c), & ante hunc Paulus (d). Cujus de iis signis prolixum locum describens Fridericus Hoffmannus (e), memoria lapsus, quod in iis non est mirandum qui multa scribunt, ex Aretæo esse dixit lib. II. cap. LXVII. quod caput in toto Aretæo nusquam est, hujus morbi notas proponente cap. XI. libri II. de signis, & causis diuturni morbor. Ibidem Hoffmannus, Recentiores quidem parvam hanc uteri affectionem notasse, inquit; se vero aliquoties observasse, eadem omnino ratione, iisdemque symptomatibus ac eo quem in Paulo indicavimus, loco exacte profertur. Parum notaverint illi, necne, ipsis perceptis, existimabis, Mihi quidem sæpius visa est, quam voluissim, quippe non modo insanabilis, sed levamen vix aliquod in nonnullis admittens, in quibus, opinor, vaginam magis afficiebat; hæc namque, paucis unciis recentis lactis in quo pauxillum solum esset compositionis alicujus opium habentis, in Rectum intestinum sub noctem injectis, brevem quidem, sed optatissimam quietem capiebant. Ex iis tamen quædam fuit, cui prima nocte nihil id profuit, sed postmodum, idque constanter. Eidem si opium daret, dolorum quidem remissionem, & sompnum conciliabat; sed hunc is mentis stupor excipiebat, ut ægra quereretur. Signa tamen, quod ad Fluorem attinet, quem potissimum hic spectamus, nonnullam ex parte varia fiunt. Leges Graæii (f) Observationem, cum dissectione conjunctam, quam in Sectione hac Sepulchreti XXXVI. omittam esse, plurimum miror. Videbis, acerrimam quidem, sed concreti albuminis instar albicantem materiam ex utero undique aut exulcerato aut scirrhus in vaginam descendisse, Aut relege historiam a nobis Epistola XXXIX. (g) tibi descriptam. Amplissimum scirrhum in cervice uteri, & vagina ferme tota exulceratum fuisse, intelliges, sic ut ex ulcerum certis partibus alba defluere materia posset, ex magnis autem profundisque ejus generis ulceribus gravem odorem perceptum esse nullum.

26. Eam ego historiam in qua de his, quæ modo commemoravi post sanguinis profluvium, muliebrem Fluorem, & exulcerati in utero canceri indicia sermo fit, huc eram libenter dilaturus, nisi inter Ventris Internos Tumores ibi producere oportuisset. Aliæ quoque meæ erosarum muliebrem Partium Observationes hic haberent locum, ni satis esset alio (h) reservare. Interea aliorum quasdam, a te, si velis, Sepulchreto addendas, Observationes indicabo. Quas si perleges, reperies in iis omnibus, post uteri hæmorrhagias, & purulenta profluvia suppuratos in eo tumores, aut ulcera deprehensa esse. Sic Maximilianus Preussius (i) inter cystes, uxoris suæ uterum implentes, describit quæ abscessus referebant ichore purulento, ex viridi albicante, summeque fetida refertissimos, in iisque unam quæ ut vesicam urinariam, cum utero circumquaque in unum quasi viscus coalitam, hinc inde perforaverat; cumque urina pus consimile e corpore sæpius effunderat; itaque pus non ex utero solum, sed utrinque, at in utero genitum, effluebat. Sic Jo. Mauricius Hoffmannus (k) deterfo pure quo turgida erat, caritatem internam uteri cavernulis & loculis plurimis interdistinctam conspexit. Sic præsertim Godofredus Klaunigius (l) ulcus cancerosum in interno uteri collo ejuscemodi deprehendit, ut illud ipsum collum nil nisi externam tunicam sive membranam ostenderet, reliqua substantia penitus consumpta. Quæ tanta uterinæ substantiæ intra tempus non ita longum consumptio me sepe induxit, ut optarem, in ea Observatione quam lu-

terioribus Litteris (m) commemoravi, in qua uterus admodum parvus, instar ovi columbini & quasi corrugatus in femina annorum circiter duodequadraginta repertus est, ut optarem, inquam, eundem fuisse dissectum. Nam cum ægra per totam vitam fluore albo laborasset; a veri similitudine fortasse non abhorret, sensim quidem, nec ab ejuscemodi ulcere, sed diu tamen ita lesam uteri substantiam, & ita absumptam fuisse, ut non tam ipse, quam extrema ejus membrana corrugata, & subsidens, ad eam denique parvitatem redigeretur.

27. His tibi indicatis, jam faciendum mihi est quod promisi, ut magnorum illiusmodi morborum, & quod consequitur, causarum Fluoris parva initia, id est uteri excrecentias, tumoresve mihi per anatomen observata pergam proponere, non omnia tamen, sed quæ huc sensu magis attinere. Scilicet aut exteriora illa sunt, aut interiora. Primorum, huc minus attinentium, Observationes Epistola XXXIX. (n) presse commemoravi. Interiorum quæ alibi expositæ sunt, mentionem hic faciam, & quasdam, alium locum non facile habituras, adjiciam. Qui vero tumores intra ipsam parietem uteri crassitudinem increverunt, quorum unum descripsi Epistola XLV. (o), hic ideo omittitur, quia non semper, etsi plurimum augeantur, ad uteri cavum perveniunt, quemadmodum immanis ille ostendit, de quo superiore Sepulchreti Sectione legeris XXIII. (p). Ad interiora igitur spectant præter minuta illa tubercula, quæ supra (q) descripsi, & parvas illas quasi verrucas, quas ea occasione commemoravi (r), excrecentiæ quasdam parvas, aliæ alia forma, singulæ in singulis quibusdam uteris (s) animadvertæ, tum deinde aliæ humillimæ quidem, & planæ, sed plures, nec modico ambitu (t), itemque de tribus duæ saltem per non tenuem pedunculum utero affixæ, minisque dura quam ipse substantia, eaque intus extraque cruenta adeo ut nigricaret (u), denique scirrhus in corona osculi uterini tuberculum (x). Sed hæc antea ad te scripsimus. Nunc reliqua adjiciamus. Quod si alia præterea conspecta ab aliis noscere fortasse cupis; reperies inter cætera, a Cl. Gvolff. Han. Langio (y) post vexationem ab obsterice utero illatam animadvertæ, tuberculum quoddam scirrhusum, ejus osculum sic obturans, ut nec flatui exitus, nec stylo introitus pateret: ab juniore autem Vernero (z) deprehensum intra fundum uteri hydropicæ Virginis glandulosum corpus, nucis magnitudine. Sciens alia omittito; & ad meas reliquas Observationes protinus transeo.

28. FEMINA consistente ætate, ex thoracis morbo obierat in Bononiensi Nofocomio S. Mariæ de Mort. extremo Aprilis A. 1706. Ex illa cum Ventris viscera perlustrarem; hæc præter naturam in genitalibus animadverti. VAGINA infima ulceris vestigia ferabat, urethra orificio proxima: quæ in altero naturalis labio erant manifestiora. Hæc prægressa luis Venereæ suspitionem injiciebant sicut excrecentia quoque ad podicem ex alba quadam substantia. Inde oculus ad ovaria, tubalque convertens, albidilla vidi, & frigidissima, superficie quibusdam sulcis in serpentis modum perductis excavata. Cum secarem, durisscula inveni, deprehendique in altero inanem cellulam, quam tunica duæ, interior nigra, exterior cinerea, comprehendebant; in altero præter minores vesiculas humoris plenas, majores cellulas duas, easque vacuas, quarum altera tunicam habebat ex parte osseam factam, altera autem omnino osseam, atque ita fulcata in ut quorundam quasi intestinulorum gyros referret. Tubarum uni corpusculum, forma, & duritie cocto humori Crystalino simile mediocri pisce, exterius propter majus orificium adhærebat; alteri ad longitudinis medium aggeries corpusculorum haud dissimilium, sed longe minorum. Magnus uterus, crassique parietibus, fundi præsertim. Cujus aperta cavea erat circa longitudinis medium multo amplior in transversum, quam soleat; ibi vero, aut potius paulo superius erant in altero latere anterior uteri facies, & posterior inter se per intersectam membranam connexæ; ab opposito autem latere excrecentia incipiebat quæ ei uni loco affixa, cætera soluta, se extendebat circuli forma cujus diameter aliquanto esset amplior transverso pollice. Crassitudine erat modica, superficie rubris maculis hic illic distincta, substantia autem eadem ferme qua uterus, nisi quod mucosi aliquid intermixtum habere videbatur, eoque facilius quam illa distrahi. Cervicis cavum initio, & sine multo erat arctius, quam consuevit. Ab illo autem initio, & a latere, descriptæ excrecentiæ opposito, altera pendebat parvula, eadem atque illa substantia, sed tota rubente superficie saturo colore, pyri figura & petiolo pendens

dentis, nisi quod anteriore, & posteriore facie erat planata.

29. Hæc altera excrecentia mihi sua forma in memoriam redigit eos uterinos polypos quos ab ima cervice excrecentes, & pendulos Ruyschius (a) delineavit post illam Observationem, quam huc in Sepulchretum non esse relatam miraberis, cum acris Fluoris magnam copiam cum illis conjunctam fuisse, memineris. Ejuscemodi autem excrecentiæ, non secus ac narium polypus, ut cancerosa possint, ac malignæ fieri, malignumque ulcus adjunctum habere, satis illa docet Observatio, ostenditque, non temere a nobis uteri excrecentias hic spectari, ut esse possint pessimorum ejus morborum initia. Quæ mente quatuor alia hæc addemus exempla, omnia a nobis, cum in publico Anatomen traderemus, conspecta: quorum primum ad hanc infimam, & parvam, cætera ad superiorem majoremque excrecentiam illam attinebunt.

30. MULIERIS, ex qua singularem venosum truncum, nec tamen exilem, vena Cavæ trunco a sinistris parallelum, hinc cum eodem qua Iliacam excipit, inde cum Emulgente vena communicantem, alias opportuniore loco fortasse describam, cum Partes iis venis proximas, in quibus arteria Magnæ truncus fuit, levia incipientium ossium brachiorum indicia per faciem anteriorem ostendens, A. 1728. attentius inspicere; hæc in genitalibus adnotavi. OVARIA, seu mavis testes, parvi, quorum alter strigosior, alter vesiculas quidem nullas, sed perpaucas cellulas continebat, quarum minores, nisi quod intus nihil spectabile habebant, majoris erant similes quæ intra tunicam crassam, ex subflavo albicantem, sinum comprehendere videbatur ductus instar longiusculi, exiguis in transversum ramulos emittentis: quanquam veritus sum, ne tunica, quæ olim fortasse cavum sphericum continuerat, postea collapsa, & in se contracta, suarum rugarum intercapedine eum ductum, eosque ramulos mentiretur. Alas Vespertilionum inspectans, ut nervos in iis plexus ostenderem, in una vix levissimum exiguumque plexus quasi inchoamentum ostendi; in altera ne hoc quidem. Ad uteri osculum prominentia erat quadam colore viridi. Paulo supra, ab jam jam infimæ cervicis pariete per brevem, albidumque petiolum parvula excrecentia pendebat lævis, & ex rubro fusca, figura minus quidem oblonga, sed cætera ejus per similes minoris excrecentiæ quæ in superiore muliere novissime descripta est.

31. MULIER annos nata quinquaginta, aut plus eo, trigesimo ex quo vulnus capiti inflicum fuerat, die mortua erat ineunte Februario A. 1738. Nihil fere ex ea inspicere potui præter genitalia. In quibus hæc animadverti. TESTES duriores erant, aridi, & sine vesiculis. Cum inter se nullo modo discrepant, multo minor plexus nervosus fuit in dextera Ala Vespertilionis. Apertus uteri fundus exhibuit in ima facie posteriore excrecentiam mediocrem, ad circuli formam accedentem, depressam, & superiorem tantum sui parte ab intima uteri membrana disjunctam. Cujus ipsius membranae potius quem uteri substantiæ, excrecentia esse visa est. Hanc enim, & subiectum uteri parietem, eamque membranam perlecans, & inter se confrens, ex eadem magis compacta substantia ex qua membrana, factam excrecentiam reperiebam, prætereaque eadem exterius lævitate, eodemque ac membrana illa, colore præditam, si modo summam qua disjunctam fuisse, dixi, crepidinem excipias, quæ sola rubebat.

32. Intuenti hæc mihi in mentem venerat suspicari, hanc, & ejuscemodi alias excrecentias fortasse nihil aliud esse quam membranam uteri intimam, a placenta novimestri abhæsiōe certo loco assurgentem in iis præsertim, a quarum utero non sine vi aliqua fuisset avulsa. Sic enim intelligi cur hæc excrecentiæ circuli forma sint, & cur non æque in omnibus quæ pepererint, manifestæ. Memineram autem apud Ruyschium (b) legisse, etsi protuberantia, quæ in vaccis uterum gerentibus reperitur, & quæ nil nisi efflorescentia Uterina sunt, quæ tempore graviditatis eo loco ubi connectitur fetus placentalis, in tumorem avolvitur, non conspiciantur in mulieribus, dum uterum ferunt, tamen eo loco, ubi placenta se se utero applicat, uteritunicam interiore nonnihil se se in tumorem quoque attollere. Sed contra animadvertēbam videri Ruyschium non attendisse, in vaccis jam inde ab ortu eas protuberantias exitare, easque in prægnantibus amplificari dumtaxat, ut reliquas uteri partes, neque, inani Morgagni de Sed. & causis Morb. Tom. II.

postea constringente se utero, evanescere, cum is levis muliebris intimi uteri tumor (de quo alibi videbimus qualis sit, & an sit ab ea uteri tunica) nec antequam placenta se se arctius utero applicuerit, nec postquam uterus, foetu edito, satis se contraxerit, nobis appareat: neque sane tunc quoque sibi apparere, Ruyschius dicat. Præsertim autem recordabar, ejuscemodi formæ excrecentias in virginibus quoque uteris, aut certe earum quæ nunquam peperissent, a me esse inventas, velut in hac quam protinus subijciam, historia.

33. VETULÆ quæ ob cruris ulcusculum in Nofocomium excepta fuerat, dum ibi non illibenter morabatur, idem accidit quod haud raro aliis quoque, ut ex impuris halitibus in febrem incideret primum, ut ex prævio frigore videbatur, intermittentem, mox ubi Peruviano cortice inhiberi non potuit, continuum factam, & acutam, nec sine vaniloquio. Itaque mulierem sustulit. Cujus viscera inspectans ferme omnia circa medium Februarium A. 1736. pauca hæc quæ morbida visa sunt, adnotavi. CEREBRI meninx Tenuis vasa habuit sanguine distenta, nulloque negotio ex profundis sulcis qui sunt in ejus visceris superficie, detrahi potuit.

E Corde egressa Magna arteria tum supra valvas, tum alibi, ut puta qua per Ventrem decurrebat, alba intus futurorum officulorum ostendit initia. Uterum nunquam fuerat gessisse, hymenis inspectio docuit, humilis quidem, sed integri, certe nusquam dilacerati. Idemque, utero inciso, cervicis intima structura confirmavit, magna ex parte haud alia atque in iis quæ non pepererunt. Fundi tamen, in transversum dilatati, posteriorem internam faciem superius excrecentia obducebat, circuli figura: quæ ab latere ipso dextero incipiens, haud ita procul a sinistro definebat, non multo minori esset diametro quam illa quæ supra (c) in Bononiensi muliere descripta est. Sed non, ut illa, erat soluta, si parvam excipias partem quæ ad sinistram inferioremque oram pertinebat: reliqua ei faciei uteri inhærebat, quæ paulo ante dictum est. Tenui erat crassitudine, plana superficie, colore exterius cruento; interius ex subalba, compacta, ac firma constabat substantia.

34. MULIERCULÆ cachectica, & pene hydropicæ, membra quæ urinæ, & quæ generationis causa creata sunt, examinabam sub finem Januarii A. 1749. cum in primis hæc offendi. REN sinistère superficiem habebat pluribus illic cellulis seroplenis, sive hydatidibus mediocribus, minoribusque inaequalem. Nam etsi magna ex parte intra id viscus, erant condita sic quidem, ut ad pelvim nulla earum perveniret; tamen extorrum quoque prominebant, ut aliquæ earum, quæ diffuserant, serum in ventris cavum effundendo, incipienti alicui materiæ nonnihil addere potuerint. Ren alter nullam conspicuam habuit in superficie; nam una, quæ mediocri inerat, inter superficiem, & pelvim, ad neutrum perveniens, condebatur. Urinaria vesica, parte saltem ima, tota intus a confertissimis vasculis rubra erat, & inflammata. Quod vero ad genitalia attinebat, utero innatus erat tumor sphaeræ forma, cujus diameter sesquidigitum aequabat. Tumoris pars major extra uterum prominebat; minor in pariete hujus anteriore, ad alterum latus, sic erat condita, ut ad cavum visceris non perveniret. Durus erat totus, interius albus, albedine tamen quibusdam minus albis maculis hic illic variegata. Interior facies cervicis quidem erat alba, & inaequaliter, ut ita dicam, tuberosa; fundi autem rubra, & in duas leves prominentias assurgens, quarum neutra, nisi in superficie, rubebat.

35. Ad has quatuor Observationes, in Gymnasio, ut dixi, habitas, placet aliam addere, quam habui in Nofocomio circa medium Decembrem. A. 1748.

36. MULIER ibi consistente ætate mortua erat, quæ diu melancholico delirio, & febricula domi laborasse dicebatur, neque enim pro certo id scire liceat, ut neque cur demum morti esset proxima, cum in Nofocomium illata est. Tuum erit ex iis quæ, cunctis propemodum visceribus perlustratis, præter naturam adnotavi, quibus morbis macerata esset, conjicere. CADAVER mediocri erat habitu. Cerebrum; ut hinc incipiam; nulla peculiari duritie; laxum autem cerebellum inveni. Intra cranium nihil usquam aquæ offendi. Nec in Thorace graviora conspexi. Imo ne pulmones quidem usquam ad pleuram vel minimo nexu alligabantur. In corde vix aliquid concreti sanguis habebat; in vasis autem Magnis nihil prorsus: vidi autem sanguinis modicam copiam ex Aorta jam descendente prodire.

N 2 Sed

(c) Tetrah. 4. Ser. 4. c. 94. (d) De Re Med. 1. 3. c. 67. (e) Medic. Rational. Tom. 4. p. 1. S. 2. c. 10. in thes. pathol. S. 8. (f) De Mulier. Organ. c. 9. (g) Epist. 33. n. 2 & 6. (h) Epist. N. C. Dec. 3. A. 5. & 6. Obf. 126. (i) Earund. Cent. 8. Obf. 27. (j) Earund. Cent. 3. Obf. 6. (k) Epist. 12. n. 2. & Epist. 11. n. 1. (l) Epist. eadem n. 17. (m) Ibid. n. 24. (n) Ibid. n. 23. (o) Ibid. n. 23. (p) Ibid. n. 23. (q) Ibid. n. 23. (r) Ibid. n. 23. (s) Ibid. n. 23. (t) Ibid. n. 23. (u) Ibid. n. 23. (v) Ibid. n. 23. (w) Ibid. n. 23. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 23. (z) Ibid. n. 23. (aa) Ibid. n. 23. (ab) Ibid. n. 23. (ac) Ibid. n. 23. (ad) Ibid. n. 23. (ae) Ibid. n. 23. (af) Ibid. n. 23. (ag) Ibid. n. 23. (ah) Ibid. n. 23. (ai) Ibid. n. 23. (aj) Ibid. n. 23. (ak) Ibid. n. 23. (al) Ibid. n. 23. (am) Ibid. n. 23. (an) Ibid. n. 23. (ao) Ibid. n. 23. (ap) Ibid. n. 23. (aq) Ibid. n. 23. (ar) Ibid. n. 23. (as) Ibid. n. 23. (at) Ibid. n. 23. (au) Ibid. n. 23. (av) Ibid. n. 23. (aw) Ibid. n. 23. (ax) Ibid. n. 23. (ay) Ibid. n. 23. (az) Ibid. n. 23. (ba) Ibid. n. 23. (bb) Ibid. n. 23. (bc) Ibid. n. 23. (bd) Ibid. n. 23. (be) Ibid. n. 23. (bf) Ibid. n. 23. (bg) Ibid. n. 23. (bh) Ibid. n. 23. (bi) Ibid. n. 23. (bj) Ibid. n. 23. (bk) Ibid. n. 23. (bl) Ibid. n. 23. (bm) Ibid. n. 23. (bn) Ibid. n. 23. (bo) Ibid. n. 23. (bp) Ibid. n. 23. (bq) Ibid. n. 23. (br) Ibid. n. 23. (bs) Ibid. n. 23. (bt) Ibid. n. 23. (bu) Ibid. n. 23. (bv) Ibid. n. 23. (bw) Ibid. n. 23. (bx) Ibid. n. 23. (by) Ibid. n. 23. (bz) Ibid. n. 23. (ca) Ibid. n. 23. (cb) Ibid. n. 23. (cc) Ibid. n. 23. (cd) Ibid. n. 23. (ce) Ibid. n. 23. (cf) Ibid. n. 23. (cg) Ibid. n. 23. (ch) Ibid. n. 23. (ci) Ibid. n. 23. (cj) Ibid. n. 23. (ck) Ibid. n. 23. (cl) Ibid. n. 23. (cm) Ibid. n. 23. (cn) Ibid. n. 23. (co) Ibid. n. 23. (cp) Ibid. n. 23. (cq) Ibid. n. 23. (cr) Ibid. n. 23. (cs) Ibid. n. 23. (ct) Ibid. n. 23. (cu) Ibid. n. 23. (cv) Ibid. n. 23. (cw) Ibid. n. 23. (cx) Ibid. n. 23. (cy) Ibid. n. 23. (cz) Ibid. n. 23. (da) Ibid. n. 23. (db) Ibid. n. 23. (dc) Ibid. n. 23. (dd) Ibid. n. 23. (de) Ibid. n. 23. (df) Ibid. n. 23. (dg) Ibid. n. 23. (dh) Ibid. n. 23. (di) Ibid. n. 23. (dj) Ibid. n. 23. (dk) Ibid. n. 23. (dl) Ibid. n. 23. (dm) Ibid. n. 23. (dn) Ibid. n. 23. (do) Ibid. n. 23. (dp) Ibid. n. 23. (dq) Ibid. n. 23. (dr) Ibid. n. 23. (ds) Ibid. n. 23. (dt) Ibid. n. 23. (du) Ibid. n. 23. (dv) Ibid. n. 23. (dw) Ibid. n. 23. (dx) Ibid. n. 23. (dy) Ibid. n. 23. (dz) Ibid. n. 23. (ea) Ibid. n. 23. (eb) Ibid. n. 23. (ec) Ibid. n. 23. (ed) Ibid. n. 23. (ee) Ibid. n. 23. (ef) Ibid. n. 23. (eg) Ibid. n. 23. (eh) Ibid. n. 23. (ei) Ibid. n. 23. (ej) Ibid. n. 23. (ek) Ibid. n. 23. (el) Ibid. n. 23. (em) Ibid. n. 23. (en) Ibid. n. 23. (eo) Ibid. n. 23. (ep) Ibid. n. 23. (eq) Ibid. n. 23. (er) Ibid. n. 23. (es) Ibid. n. 23. (et) Ibid. n. 23. (eu) Ibid. n. 23. (ev) Ibid. n. 23. (ew) Ibid. n. 23. (ex) Ibid. n. 23. (ey) Ibid. n. 23. (ez) Ibid. n. 23. (fa) Ibid. n. 23. (fb) Ibid. n. 23. (fc) Ibid. n. 23. (fd) Ibid. n. 23. (fe) Ibid. n. 23. (ff) Ibid. n. 23. (fg) Ibid. n. 23. (fh) Ibid. n. 23. (fi) Ibid. n. 23. (fj) Ibid. n. 23. (fk) Ibid. n. 23. (fl) Ibid. n. 23. (fm) Ibid. n. 23. (fn) Ibid. n. 23. (fo) Ibid. n. 23. (fp) Ibid. n. 23. (fq) Ibid. n. 23. (fr) Ibid. n. 23. (fs) Ibid. n. 23. (ft) Ibid. n. 23. (fu) Ibid. n. 23. (fv) Ibid. n. 23. (fw) Ibid. n. 23. (fx) Ibid. n. 23. (fy) Ibid. n. 23. (fz) Ibid. n. 23. (ga) Ibid. n. 23. (gb) Ibid. n. 23. (gc) Ibid. n. 23. (gd) Ibid. n. 23. (ge) Ibid. n. 23. (gf) Ibid. n. 23. (gg) Ibid. n. 23. (gh) Ibid. n. 23. (gi) Ibid. n. 23. (gj) Ibid. n. 23. (gk) Ibid. n. 23. (gl) Ibid. n. 23. (gm) Ibid. n. 23. (gn) Ibid. n. 23. (go) Ibid. n. 23. (gp) Ibid. n. 23. (gq) Ibid. n. 23. (gr) Ibid. n. 23. (gs) Ibid. n. 23. (gt) Ibid. n. 23. (gu) Ibid. n. 23. (gv) Ibid. n. 23. (gw) Ibid. n. 23. (gx) Ibid. n. 23. (gy) Ibid. n. 23. (gz) Ibid. n. 23. (ha) Ibid. n. 23. (hb) Ibid. n. 23. (hc) Ibid. n. 23. (hd) Ibid. n. 23. (he) Ibid. n. 23. (hf) Ibid. n. 23. (hg) Ibid. n. 23. (hh) Ibid. n. 23. (hi) Ibid. n. 23. (hj) Ibid. n. 23. (hk) Ibid. n. 23. (hl) Ibid. n. 23. (hm) Ibid. n. 23. (hn) Ibid. n. 23. (ho) Ibid. n. 23. (hp) Ibid. n. 23. (hq) Ibid. n. 23. (hr) Ibid. n. 23. (hs) Ibid. n. 23. (ht) Ibid. n. 23. (hu) Ibid. n. 23. (hv) Ibid. n. 23. (hw) Ibid. n. 23. (hx) Ibid. n. 23. (hy) Ibid. n. 23. (hz) Ibid. n. 23. (ia) Ibid. n. 23. (ib) Ibid. n. 23. (ic) Ibid. n. 23. (id) Ibid. n. 23. (ie) Ibid. n. 23. (if) Ibid. n. 23. (ig) Ibid. n. 23. (ih) Ibid. n. 23. (ii) Ibid. n. 23. (ij) Ibid. n. 23. (ik) Ibid. n. 23. (il) Ibid. n. 23. (im) Ibid. n. 23. (in) Ibid. n. 23. (io) Ibid. n. 23. (ip) Ibid. n. 23. (iq) Ibid. n. 23. (ir) Ibid. n. 23. (is) Ibid. n. 23. (it) Ibid. n. 23. (iu) Ibid. n. 23. (iv) Ibid. n. 23. (iw) Ibid. n. 23. (ix) Ibid. n. 23. (iy) Ibid. n. 23. (iz) Ibid. n. 23. (ja) Ibid. n. 23. (jb) Ibid. n. 23. (jc) Ibid. n. 23. (jd) Ibid. n. 23. (je) Ibid. n. 23. (jf) Ibid. n. 23. (jg) Ibid. n. 23. (jh) Ibid. n. 23. (ji) Ibid. n. 23. (jj) Ibid. n. 23. (jk) Ibid. n. 23. (jl) Ibid. n. 23. (jm) Ibid. n. 23. (jn) Ibid. n. 23. (jo) Ibid. n. 23. (jp) Ibid. n. 23. (jq) Ibid. n. 23. (jr) Ibid. n. 23. (js) Ibid. n. 23. (jt) Ibid. n. 23. (ju) Ibid. n. 23. (jv) Ibid. n. 23. (jw) Ibid. n. 23. (jx) Ibid. n. 23. (jy) Ibid. n. 23. (jz) Ibid. n. 23. (ka) Ibid. n. 23. (kb) Ibid. n. 23. (kc) Ibid. n. 23. (kd) Ibid. n. 23. (ke) Ibid. n. 23. (kf) Ibid. n. 23. (kg) Ibid. n. 23. (kh) Ibid. n. 23. (ki) Ibid. n. 23. (kj) Ibid. n. 23. (kk) Ibid. n. 23. (kl) Ibid. n. 23. (km) Ibid. n. 23. (kn) Ibid. n. 23. (ko) Ibid. n. 23. (kp) Ibid. n. 23. (kq) Ibid. n. 23. (kr) Ibid. n. 23. (ks) Ibid. n. 23. (kt) Ibid. n. 23. (ku) Ibid. n. 23. (kv) Ibid. n. 23. (kw) Ibid. n. 23. (kx) Ibid. n. 23. (ky) Ibid. n. 23. (kz) Ibid. n. 23. (la) Ibid. n. 23. (lb) Ibid. n. 23. (lc) Ibid. n. 23. (ld) Ibid. n. 23. (le) Ibid. n. 23. (lf) Ibid. n. 23. (lg) Ibid. n. 23. (lh) Ibid. n. 23. (li) Ibid. n. 23. (lj) Ibid. n. 23. (lk) Ibid. n. 23. (ll) Ibid. n. 23. (lm) Ibid. n. 23. (ln) Ibid. n. 23. (lo) Ibid. n. 23. (lp) Ibid. n. 23. (lq) Ibid. n. 23. (lr) Ibid. n. 23. (ls) Ibid. n. 23. (lt) Ibid. n. 23. (lu) Ibid. n. 23. (lv) Ibid. n. 23. (lw) Ibid. n. 23. (lx) Ibid. n. 23. (ly) Ibid. n. 23. (lz) Ibid. n. 23. (ma) Ibid. n. 23. (mb) Ibid. n. 23. (mc) Ibid. n. 23. (md) Ibid. n. 23. (me) Ibid. n. 23. (mf) Ibid. n. 23. (mg) Ibid. n. 23. (mh) Ibid. n. 23. (mi) Ibid. n. 23. (mj) Ibid. n. 23. (mk) Ibid. n. 23. (ml) Ibid. n. 23. (mm) Ibid. n. 23. (mn) Ibid. n. 23. (mo) Ibid. n. 23. (mp) Ibid. n. 23. (mq) Ibid. n. 23. (mr) Ibid. n. 23. (ms) Ibid. n. 23. (mt) Ibid. n. 23. (mu) Ibid. n. 23. (mv) Ibid. n. 23. (mw) Ibid. n. 23. (mx) Ibid. n. 23. (my) Ibid. n. 23. (mz) Ibid. n. 23. (na) Ibid. n. 23. (nb) Ibid. n. 23. (nc) Ibid. n. 23. (nd) Ibid. n. 23. (ne) Ibid. n. 23. (nf) Ibid. n. 23. (ng) Ibid. n. 23. (nh) Ibid. n. 23. (ni) Ibid. n. 23. (nj) Ibid. n. 23. (nk) Ibid. n. 23. (nl) Ibid. n. 23. (nm) Ibid. n. 23. (nn) Ibid. n. 23. (no) Ibid. n. 23. (np) Ibid. n. 23. (nq) Ibid. n. 23. (nr) Ibid. n. 23. (ns) Ibid. n. 23. (nt) Ibid. n. 23. (nu) Ibid. n. 23. (nv) Ibid. n. 23. (nw) Ibid. n. 23. (nx) Ibid. n. 23. (ny) Ibid. n. 23. (nz) Ibid. n. 23. (oa) Ibid. n. 23. (ob) Ibid. n. 23. (oc) Ibid. n. 23. (od) Ibid. n. 23. (oe) Ibid. n. 23. (of) Ibid. n. 23. (og) Ibid. n. 23. (oh) Ibid. n. 23. (oi) Ibid. n. 23. (oj) Ibid. n. 23. (ok) Ibid. n. 23. (ol) Ibid. n. 23. (om) Ibid. n. 23. (on) Ibid. n. 23. (oo) Ibid. n. 23. (op) Ibid. n. 23. (oq) Ibid. n. 23. (or) Ibid. n. 23. (os) Ibid. n. 23. (ot) Ibid. n. 23. (ou) Ibid. n. 23. (ov) Ibid. n. 23. (ow) Ibid. n. 23. (ox) Ibid. n. 23. (oy) Ibid. n. 23. (oz) Ibid. n. 23. (pa) Ibid. n. 23. (pb) Ibid. n. 23. (pc) Ibid. n. 23. (pd) Ibid. n. 23. (pe) Ibid. n. 23. (pf) Ibid. n. 23. (pg) Ibid. n. 23. (ph) Ibid. n. 23. (pi) Ibid. n. 23. (pj) Ibid. n. 23. (pk) Ibid. n. 23. (pl) Ibid. n. 23. (pm) Ibid. n. 23. (pn) Ibid. n. 23. (po) Ibid. n. 23. (pp) Ibid. n. 23. (pq) Ibid. n. 23. (pr) Ibid. n. 23. (ps) Ibid. n. 23. (pt) Ibid. n. 23. (pu) Ibid. n. 23. (pv) Ibid. n. 23. (pw) Ibid. n. 23. (px) Ibid. n. 23. (py) Ibid. n. 23. (pz) Ibid. n. 23. (qa) Ibid. n. 23. (qb) Ibid. n. 23. (qc) Ibid. n. 23. (qd) Ibid. n. 23. (qe) Ibid. n. 23. (qf) Ibid. n. 23. (qg) Ibid. n. 23. (qh) Ibid. n. 23. (qi) Ibid. n. 23. (qj) Ibid. n. 23. (qk) Ibid. n. 23. (ql) Ibid. n. 23. (qm) Ibid. n. 23. (qn) Ibid. n. 23. (qo) Ibid. n. 23. (qp) Ibid. n. 23. (qq) Ibid. n. 23. (qr) Ibid. n. 23. (qs) Ibid. n. 23. (qt) Ibid. n. 23. (qu) Ibid. n. 23. (qv) Ibid. n. 23. (qw) Ibid. n. 23. (qx) Ibid. n. 23. (qy) Ibid. n. 23. (qz) Ibid. n. 23. (ra) Ibid. n. 23. (rb) Ibid. n. 23. (rc) Ibid. n. 23. (rd) Ibid. n. 23. (re) Ibid. n. 23. (rf) Ibid. n. 23. (rg) Ibid. n. 23. (rh) Ibid. n. 23. (ri) Ibid. n. 23. (rj) Ibid. n. 23. (rk) Ibid. n. 23. (rl) Ibid. n. 23. (rm) Ibid. n. 23. (rn) Ibid. n. 23. (ro) Ibid. n. 23. (rp) Ibid. n. 23. (rq) Ibid. n. 23. (rr) Ibid. n. 23. (rs) Ibid. n. 23. (rt) Ibid. n. 23. (ru) Ibid. n. 23. (rv) Ibid. n. 23. (rw) Ibid. n. 23. (rx) Ibid. n. 23. (ry) Ibid. n. 23. (rz) Ibid. n. 23. (sa) Ibid. n. 23. (sb) Ibid. n. 23. (sc) Ibid. n. 23. (sd) Ibid. n. 23. (se) Ibid. n. 23. (sf) Ibid. n. 23. (sg) Ibid. n. 23. (sh) Ibid. n. 23. (si) Ibid. n. 23. (sj) Ibid. n. 23. (sk) Ibid. n. 23. (sl) Ibid. n. 23. (sm) Ibid. n. 23. (sn) Ibid. n. 23. (so) Ibid. n. 23. (sp) Ibid. n. 23. (sq) Ibid. n. 23. (sr) Ibid. n. 23. (ss) Ibid. n. 23. (st) Ibid. n. 23. (su) Ibid. n. 23. (sv) Ibid. n. 23. (sw) Ibid. n. 23. (sx) Ibid. n. 23. (sy) Ibid. n. 23. (sz) Ibid. n. 23. (ta) Ibid. n. 23. (tb) Ibid. n. 23. (tc) Ibid. n. 23. (td) Ibid. n. 23. (te) Ibid. n. 23. (tf) Ibid. n. 23. (tg) Ibid. n. 23. (th) Ibid. n. 23. (ti) Ibid. n. 23. (tj) Ibid. n. 23. (tk) Ibid. n. 23. (tl) Ibid. n. 23. (tm) Ibid. n. 23.

Sed in ventre plura fuerunt quæ animadverti. Et primum, cum abdomen incideretur, sanguis in hypogastrio inter musculos repertus est, in grumos, quasi ut in fugillatione, concretus: cuius rei incognita erat causa, neque in ventris cavo quidquam recentis læsionis ei loco respondebat. Lien ea fuit longitudine, ut a sua sede incipiens, ad Ilium os perveniret; cui tantæ longitudini cæteræ dimensiones non congruebant. Laxus erat, nec lividus, sed magnam partem rubens, anteriore saltem facie. Bilis plurima suam vesiculam distendebat. Aquæ fuit aliquid in ima pelvi. Vesica interius ad urethræ orificium, & aliquo supra hoc spatio sanguiferis vasculis

erat distincta. Uterus aliquanto sinistrorsum inclinatus, & ejus tamen osculi orificium, incisa vagina, quæ tota propemodum livebat, & grave olebat, magis erat a dextris quam ea ferret inclinatio. Causa erat ejus corona, quæ æquo durior, a sinistris tumore quodam augebatur.

37. Sed de excrescentiis, & tumoribus internis uteris; ne quod vereri nos, diximus, crescunt hæc Litteræ præter modum. Ex illiusmodi autem vitii, quæ ut crebro deprehendantur, intelligis, mirum non est, si causa aliqua accedente, pessimi interdum tumores, hisque ulceratis insanabiles Fluores fiant. Proxima Epistola quidquid restat muliebrium morborum persequemur. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XLVIII.

Verba sunt de Gravitate Falsa, Abortu, Partu infelici.

SI forte miraris, tot ejusmodi argumentis unam hanc a me Epistolam tribui; miraberis magis, duas, haud amplius, neque eas longissimas, Sectiones XXXVII. & XXXVIII. in Sepulchreto tribui non illis modo, sed simul etiam aliis pluribus, in quibus sunt Gemellorum Origo, Hermaphroditus, & Virginitatis Notæ. Quæ mihi argumenta neque hic tractanda arbitror, ubi institutum postulat, ne de aliis quam de abditis morborum causis per anatomem quæstio agatur, neque, si tractanda essent, aut ullum, aut magnam apud me pondus haberent pleraque eorum quæ de illis, aliisque ejusmodi rebus in hæc Sectiones relata video. Quod ne temere a me dictum putes, exempla nonnulla indicabo. Quid enim ad Gemellorum Originem Observatio ista (a) Gerardi Blasii, qui testium vesiculas, ne dicam hydatidem facile quandam extra horum alterum harentem, sine ulla dubitatione habet pro ovis? vel quid ad eandem Originem ista quæ subjicitur, Appendix? in qua; ut alia præteream, a sententia Blasii non discrepantia; *auræ seminalis per vas Deferens, sive Ductum brevem, id est testis vinculum teres, ut opinor, ad ipsum usque testem traducitur; quasi eo vinculo quadrupedum foemina non careret: ovi ductus gallinarum rectus esse dicitur, & laxior; in homine vero angustus, & valde tortuosus; quasi cum in gallina laxior est, non simul esset, quanto muliebri tuba longior, tanto etiam, id est præter omnem comparationem, tortuosior. Adduntur & hæc; tubarum cum testibus connexio est magis indaganda, ne forte quæ lacinia, seu fimbria illarum dicantur, effectus sint disrutionis, videlicet ne tubæ cum antea testibus secundum naturam fortasse adhæsisent, ab illis per incuriam, dum intestina extrahuntur, committere abrumperentur; quasi tubæ ex longe tenuissima membrana fierent, earum autem fimbriæ ea structura, figuraque essent, ut possent ad eum modum produci: est inter uteri cervicem, & testem alter qui semen transvehit, ductus, qui cervicalis dici non absurde posset; quasi ductum ejusmodi esse vas quoddam sanguiferum, non constaret. denique, ne longior sim; per teretia uteri ligamenta seminalis materia, nec non alia in utero coarctata excrementa ad inguina expelluntur; quasi manifestum non esset, ea ligamenta cum uteri cavo non communicare. Et hæc quidem de gemellorum origine, & generatione. De Hermaphroditis autem quorundam dissectiones istæ tres? (b) quando cum femineo naturali penis conjunctus neque urethræ orificio erat præditus, neque urinam emittebat; ut vel sine ulla dissectione nihil esse aliud, constaret, quam magnitudine monstrata clitoridem. De Virginitatis denique Notis satis erat nihil attingere, quam duas, tresve istas (c) in extrema Sectione XXXVII. Observationes proponere, ex quibus lectores partim vix fiant, quænam inter notas illas non sit ponenda, partim credant, ne hymenem quidem, qui tamen præcipua, siqua alia, Virginitatis est nota, in illis esse commemorandum, præsertim cum in adjecto Scholio carunculæ etiam solæ pro ea præcipua nota haberi posse dicantur, neque minus ad Piliæ hujus sententiæ propugnatorem, quam ad alios lector rejiciatur. Quibus de rebus tanto minus hæc me quidquam addendum puto, quod satis alias quid observaverim, in Adversariis (d), quid autem censeam, fuisse in eo Responso dictum est quod inscribitur super judicio Obstetricum de Mulieris Virginitate.*

2. In Sectione etiam XXXVIII. non pauca sunt

quæ aut non eo loco poni, aut adjecta animadversione aliqua omnino emendari debuissent. Neque enim pro his possis dicere quod pro plerisque eorum fortasse quæ supra notata sunt, nimirum quo tempore edebantur, necdum iis meliora fuisse proposita: quanquam & tunc multo meliora jam prodierant, & tanto magis eo tempore quo Sepulchretum reculum, & auctum est. Scilicet recentissimis Observationibus opus non fuerat, ut hæc, quorum aliqua continuo indicabo, non sine emendatione proferrentur. Observatione I; ut omittam, quædam in cuiusdam fœtus (e) dissectione ita proponi, ut cum secundum naturam sint, ipsa quoque a plerisque lectoribus credi possint ad vitiosam constitutionem atinuissæ; quis ferat (f), funiculum foetuum umbilicalem communiter & in omnibus ulnarum aliquot longitudine esse solere? aut quis mirum esse, credat (g), a femina quæ septies abortit nunc brevior, nunc longior a conceptu temporis spatio, editos omnes abortivos fuisse tamen ejusdem magnitudinis, pollicis articulum fere æquantes; quis, inquam, hoc mirum credat, nisi forte qui non intelligat, alios quidem alio tempore fuisse ejectos, omnes tamen eodem mortuos? posse enim mortuum fœtum vel plures menses in utero retineri, etiam sine corruptione, & fetore ullo, satis præter alias, in primis apud Ruyschium (h), ea monstrat, quæ continuo sequitur Observatio (i). Observatione autem II. (k) cum fœtus quidam cujus exitum viarum tumor prohibuerat, compresso ab uno latere cranio repertus esset; inde hoc inferitur: *ex quo clare elucet, non solum vim expultricem uteri facere ad protrudendum fœtum, sed & ipsum infantem allaborare ad sui e carcere liberationem*; probaturne tibi hæc rei, cæteroque per se non falsæ, conclusio: quando mater 5. aut 6. diebus doloribus paribus laborasse dicitur, infans autem post primos illorum dolorum dies nullum vitæ signum edidisse; ut minime constet, an utriusque, an matris unius conatibus ea cranii compressio debeatur? Verum hæc satis sint. Per te enim quatuordecim exempla perlegens, quæ Observatione I. ita proferuntur quasi omnia ad abortum attinerent, intelligens, num secundo, quod ad partum spectat, inter reliqua esset locus, multoque illud magis, num ad institutum pertineant omnes quæ in IX. congeruntur, Observationes; cum pleraque earum certe non ad præternaturalem, sed ad naturalem attineant uteri tum in gravidis, tum in puerperis constitutionem. De qua noli hæc quidquam a me expectare. Ad descriptionem enim longe aliam pertinent quæ ipse quoque de constitutione illa neque semel, neque indiligenter observavi. Sed ut ingenue quo studiis inservirem tuis, hæc in memoratis Sepulchreti Sectionibus notavi; sic ultro fateor, plurima in istis esse probanda. Quorum capita in his Litteris sequar, alia tamen interjiciens, aut adjiciens quæ & necessaria esse, & huc spectare, existimabo.

3. Et primum, quod ad Gravitudinem Falsam attinet, nimis notum est, haud ita raro Medicos falli sive in vera pro falsa, sive in falsa pro vera habenda. Urinam vero certa semper extarent signa; his enim freti docti saltem, attentique Medici neutrum in errorem laberentur. Certum utique, & manibus, interdum oculis quoque, est obvium graviditatis veræ signum, fœtus in utero motus; quem qui semel, præsertim frigida; sic enim excitari solet; manu imposita, bene perceperint, non illis intestinorum a flatibus, non alii ulli motus imponent, usque adeo peculiaris ille est, & qui non nisi a vivo fœtus

cor-

corpore edi possit. Verum primis non solum mensibus hoc signo caremus; sed & cæteris interdum, imo nonnunquam postremis, sive ob fœtus infirmitatem, sive aliis de causis. Memini, rogatum quondam me esse, ut adolescentulam inviserem, cui postquam Chirurgus e mamma cancrum, ut aiebant, tumorem abstulerat, venter a novem jam mensibus tumere cœperat. Quo minus renati, ut sæpius solet, & tunc in utero timebatur, cancrum tumorem signa, interrogando, reperiebam; eo diligentius, ac diutius tumentem uterum contrectavi. Cum prægnans hic videretur, ego vero motum perciperem nullum; parentum autem præsentia non sineret mestrigidam petere, in quam possem calentem; ætas enim erat fervidissima; manum demittere; fœvocavi adolescentulæ Medicum, negantemque, se motum unquam in eo ventre animadvertisse, hortatus sum nihilominus, ut quamvis intactam eam Virginem omnes crederent, caute ipse prudenterque ageret, nec quid in aliis ejus similibus paucis ante annis accidisset non sine medentium dedecore, oblivisceretur. Quid quæris? Intacta illa Virgo paulo post infantem edidit. Est igitur signum quod dixi, certum, cum est; nec tamen non gravida potest esse mulier, cum abest. Aliud legi, ab doctis alioquin, & experientibus Viris pro certo, & in omnibus gravidis occurrente propositum, umbilicum videlicet protuberantem contra atque in hydrope, cunctisque aliis ventris tumoribus. Sed num in acite nunquam protuberet, quem ad aquas educendas nonnulli perforat protuberantem, itemque num quam causam prominentis umbilici in gravidis ipsi proferunt, ea non sit aliis qui intestina sursum urgeant, tumoribus communis; hæc, inquam, aliaque non quæram, cum ipsi ante finem tertii mensis non extare hoc signum, fateantur, cumque insuper aliquando accidat ut gestatio uteri cum hydrope conjungatur. Ne Plateri Matronam (l) hic memorem, solitam quoties uterum gerebat, in acitem incidere; pauci sunt Medici qui utrumque aliquid non conjunctum non viderint, aut qui saltem si cauti, prudentesque sint, alienorum errorum non ignari, an conjuncta essent, dubitaverint. Quo magis annis superioribus miratus sum, doctum cæteroquin Medicum, & valde exercitatum, cum mecum consilia iniret pro Illustri Matrona, quæ anasarca, & acite laborans huc venerat, de nulla alia re sollicitum quam de efficacibus adversus utrumque hydropem medicamentis statim propinandis, verba fecisse. Ego vero cum tenellos Matronæ filios, ipsamque ætate florentem viderem, neque interrogando certior fieri possem, uterum tunc feret, necne; ista, inquam, medicamenta omnia probo, sic tamen ut priusquam de hac re qua de quaero, non liqueat, in usum trahi non incipiant; interea autem levioribus quibusdam, & tutis in utramque partem remediis utatur, aptaque in primis vivendi norma. Sapiit mulier, mihi quæ aulcans, domum reversa, suo tempore ad me misit qui gratias ageret, nunciaretque, filio edito, simul a morbis illis solutam, nihil ex iis, nisi crurum tumorem, supervisse. Complures quoque esse, video, qui signo nitantur veritissimo, quippe in Hippocratis Aphorismis (m) proposito: *Quæ utero gerunt, his uteri os comprimitur*, indicio utique non contemnendo, & perutili primis illis mensibus, quibus priori, ut supra dictum est, non est locus. Itaque hoc feliciter usum sum, cum licuit; licuit autem perraro; nostratibus feminis ejusmodi explorationi plerumque repugnantibus. Nec temere tamen sum usus, non ignorans, esse uteri morbos, in quibus, ut in parte docet Hippocrates (n), ejus osculum conviveret. Imo ob eandem causam non satis esse, credidi, si ad constrictionem illam osculi ejus quoque coronæ incrementum aliquod additum esse, non imperitus Explorator perciperet, aut si digito ea corona sursum non nihil compulsa, mox hanc, subducto paululum digito, & stante muliere, relabi fimens, gravius uteri pondus animadverteret, aut denique si idem osculum posteriora versus inclinatum magis sentiret. Hæc enim est Hippocratico signo adjecta ipsius vim augent utique; tamen magnopere non fidendum, censui, nisi cum ea corona, ut Galenus (o) olim admonuit, æquo durior non esset, uti autem morborum, vitiorumve, in quorum certe quibusdam inclinatio quoque antrosum est, unde osculum retrorsum convertitur, omnia abessent indicia.

4. Igitur ne veram graviditatem pro falsa accipiamus, est ratio habenda accuratissime eorum omnium tum quæ adfunt, tum quæ abfunt, in primis qui si mulier antea gestavit uterum, an eadem quæ alias, signa initio præceperint, ex quibus nunc pariter se gravidam factam censeat. Ob hujus Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

enim rei, fallacis quidem interdum, sed non propterea negligendæ, contemtionem sæpe vidi Medicos in errorem prolapsos, ut ex tribus saltem, quas placet subicere, Observationibus præclare intelliges. Hæc omnes ad Feminas pertinent Generosissimas, primam hujus, reliquas meæ Civitatis.

5. FÆTUS ante sex menses, & dies aliquot; neque enim ab eo tempore mulier cum Viro consueverat amplius; conceptus fuerat, matre ob solitas initio post cæteras conceptiones molestias, quin gravida facta esset, non dubitante. Jamque uterus tertio mense tumere cœperat, cum, profluente multo ex hæmorrhoidibus sanguine, detumuit, ut deceptam fuisse mulierem, arbitrarentur. Itaque est postquam, eo fluxu conquiescente, recreata erat, iterum venter intumesceret; non propterea gravidam putavere. Rediit novissime idem fluxus, eique febris accessit. Tunc vero cum ipsa jam, nedum Medici, nihil de graviditate amplius suspicaretur; sanguis e brachio, & postmodum etiam e pede missus est, tum deinde medicamentum datum ad alvum solvendam. Paucis postquam datum fuerat, horis ecce inopinanti-bus omnibus, fœtus ejicitur mortuus, & septima post hunc hora Secundæ. Quæ cum fœtu, & eorum quæ dixi, omnium relatione ad me allata fuerunt postdie mane, qui dies fuit IV. Kal. Septembris A. 1727. FÆTUS a vertice ad calces erat sex transversos digitos longus, funiculus umbilicalis novem, sed mira tenuitate, ut filum referret modicæ crassitudinis, sine ulla intorsione, ubique æquale. Corpusculum fœtus, qui erat masculus, bene intus extraque conformatum, nisi quod caput totum ita apparebat, quasi a lateribus fuisset compressum. Albus prodierat, nunc fuscus erat factus. Viscera fere omnia pallida, & obsoleto colore, jecur in primis, quod ex subflavo erat pallidissimum. Non modo urinaria vesica inanis, sed & Colon intestinum, & Rectum. Cum sanguinei coloris, non modo sanguinis, nihil usquam ostenderet quæ cunque fœtum feceres, sive ejus funiculum, qui ad me integer, hinc umbilico annexus, inde placenta, allatus fuerat, cumque primi saltem ab illo in hanc rami essent tenues, quidam quasi globi, non nihil in longum se extendentes, magni, nigricantes, & sanguine ferme fluido distenti, per Secundarum membranam faciem placenta, hic revera pro parvitate fœtus amplissima, suberant, transpicebantur. Cæterum est fœtus corpusculum neque erat exterius flaccidum, neque rugosis integumentis opertum, ex ipso, aut ex Secundis quidquam gravis odoris usquam exiit; non dubitavi tamen quin diutius in oculo utero, aut mortuus, aut certe infirmissimus, & mortuo similis jacuisset, antequam prorsus moreretur.

6. Repentinus multus sanguinis fluxus exfanguem, ut ex dissectione apparuit, fœtum ejusque funiculum reddiderat, & hunc præterea adeo gracilem. In eo autem quod fœtus esse crederetur nullus, excusandus error Medicorum aliquanto magis, quam in proxima historia.

7. FÆTUM pariter immaturum, & mortuum ejecerat altera Matrona mense Sextili A. 1716. Huic se gravidam esse, ex consuetis sibi indicis putanti, Medicus ut abundantem, quemadmodum existimabat, minueret sanguinem, e brachio miserat pondo libræ. Cum venter postea non ita pro gestationis tempore tumeret, mulierque iis mensibus quibus fœtus motum animadvertere consueverat, non perciperet, tum Obstetrix, tum Medicus ipse, Vir alioquin doctus, sed quam semel animo imbibisset opinionem haud facile deponens, non fœtum, sed molam utero geri, pronunciarunt. Qua pronunciatione cum percussus esset, gravique mestitia afflictus mulieris animus; forte accidit ut ipse in Patriam ætate illa secederem, inciusque rerum itarum, ejus rogatu a Con-sanguineis, Viris nobilissimis, meique amicissimis, ad ipsam adducerem. Quam bono, ut solebat, colore, & nisi quod tristis erat, bene valentem cum aspicerem; quid tibi, inquam, Medico opus est? Nempe, inquit, ut ex eo sciam, gravida sim, necne. Tum ego cum interrogando, & ventrem contrectando, nihil audirem, nihilque perciperem, unde non gravidam esse, crederem, imo ex ipsa, itemque ex intima ancilla quæ ei semper fuerat a cubiculo, eadem omnia nunc esse, & fuisse, intellexerem quæ in prioribus fuerant uteri gestationibus, si duo illa exciperes de quibus antea dictum est: gravida es, inquam, nec duo ista, opinor, deessent, nisi quod in aliis gestationibus, cum junior esses, non fecisti, sanguinem eaque copia, mittendo, fœtus robur imminuisses, ejusque

N 3

incre-

(a) 4. in Sect. 37. (b) Ibid. Obs. 6. (c) Obs. 7. & 8. (d) I. n. 39. & IV. Animadv. 23. & 24. (e) 5. 3. (f) 5. 7. (g) 5. 8. (h) Thes. Max. n. 49. 158. 210. (i) 7. (k) 3.

(l) Obs. I. 3. ubi de Extuberantia (m) Sect. 5. Aph. 52. (n) Ibid. Aph. 55. (o) De loc. aff. I. 6. c. 5.

incrementum retardasset. Tum demum quis iussisset, ejusque de mola pronuntiationem audivi. Ibi ego, quæ ipsam rationes permovere, nescio: mea certe me permoveant, ut de mola ne suspicer quidem; fœtum vero imbecillè, & quem nisi apta vivendi norma, animique alacritate recrees, in periculum adducas, a te gestari, quo ad licet ejusmodi in rebus, confirmo. Vera hæc erant; at serius quam oportuisset, inculcata. Cum enim ipse multatim abiissem; non ita multis interjectis diebus, accidit, ut mulieri nec opinanti oruenti quidpiam e naturalibus prodiret. Medicus autem præjudicata opinione adductus, ut molam citius deturbaret, rhedam conscendere, per inæqualia, atque aspera loca equis concitatis ire iussit. Dolores inde oboriuntur. Domum reditur. Mittuntur ad Medicum qui consulat quid agendum. Hic vero clysterem imperat: quo reddito, se venturum, promittit. Dum redditur, una moriturus fœtus, Secundæque ejiciuntur nulla cum mola. Venit non ita multo post Medicus. Occurrit ancilla de qua antea dictum est, iisdemque propemodum verbis excipit, quibus in re non valde ablimili, ut in Sepulchreto (p) habes, Medicos olim excepti suos generosissimam Veneta Matrona Helena de Mocenicis. Ancilla enim illa fœtum ostendens, en mola, inquit, quam hec gestabat mea. FœTUM, cum ut dixi, abessem, dissecare non potui. Sed gracilem, & nihil grave olentem fuisse, ab iis qui viderant, accepi.

8. Venia tamen digni sunt Medici, nisi si pertinaciam falsam cum opinione conjungant. Multo dociliorem, ut continuo intelliges, ibidem inveni alterum A. 1721. 9. FœTUS quem immaturum, & mortuum ejecit mater, historiam nunc tertiam accipe, eo digniorem quæ diligenter scribatur, quod mola simul ejecta est, eaque præcesserat quæ, ut in Observatione quadam Schæcheri (q) cum hac quadantenus conveniente, opinionem veræ graviditatis propemodum tollerent. Matrona habitu, & statura mediocri, de qua nullam facile meminimus quæ plus sanguinis gigneret, felix plurimum liberorum mater, nonnunquam tamen etiam abortionibus obnoxia, cum post ultimum partum quem immanis lochiorum copia erat consecuta, tristius hævem traduxisset. Aprilis mense ex consuetis sibi indicibus, cum menstruum emanatione conjunctis, se rursus concepisse, censuit. Secuta est appetitus ciborum tanta dejectio, vix ut vespertino dumtaxat tempore comederet, præsertim cum quidquid mane fumeret, vomitu rejiceretur. Huc accessit circa Idus Junias sanguinis ex utero profluvium. Adversus quæ mala, agræ non prorsus insolita, cum alias post multa incassum adhibita, aquæ Nucerinæ usus profuisset, tunc minime profuit. Ob hæc Julio circiter medio ab agræ advocor, venæ sectionem supra quam dici possit, perosa. Itaque ea saltem quæ pertinaciter non recusaret, commendo, ut puta usum *gelatinarum* ex vituli cruribus, coralia in pollinem redacta, cydonitem, & pauca alia de hoc genere quæ utrique malo ita adveniant, ut sanguinis tamen cursum violentius cohibere non possent. Utrumque interea peribat malum, sic tamen, ut non difficulter ferretur. Quotidie enim mane surgebat mulier, stabat, sedebat, ambulabat, rheda etiam cum vellet, minus probantibus nobis, per urbem vehabatur, nec quidem fere prodibat sanguinis. Noctu dumtaxat, cum fide supina, sive in latus sinistrum cubaret; in dexterum enim haud poterat; profluebat, sive lecti calor moveret, sive non jacentis uteri osculo aliquid se opponeret quod operiret, aut quasi obturaret. Præter id quod noctu effluerat, magna erat concreti sanguinis copia quæ cum primum surgeret, excidebat. Inter hæc ad cæteras morboris causas gravissima quadam cum repentino terrore accessit ex nec opinato Viri infortunio, quod ut Civitas unita versâ commiseratione, ita Uxor læchrymis, & planctu excepit. Et ea quidem quæ prima infusa est, nocte sanguis ferme omnino substitit. At proximis vel fufius effluxit. Jam non erat quispiam qui tanta, & tam crebra sanguinis effusione spectata, gravidam crederet esse posse mulierem; sed ne ipsa quidem credebatur amplius. Mihi tamen, quamvis senior, auscultabat Medicus sæpe inculcanti, iudicium adhuc, ut in muliere quæ sanguine adeo abundaret, esse sustinendum: conceptionis solita indicia omnia præcessisse; abortionis in effuso sanguine, accurate semper inspecto, vestigia necdum ulla apparuisse: lente quidem uterum intumescere; verum si parcius tandem sanguis efflueret, citius fortasse tunc se elaturum. Dandam igitur

operam, ut ejus effluxus parcius fieret; sic enim mulieris quoque vires servari facilius posse, quarum lapsus jam incipientis crura indicium dabant non æque firma atque hæcenus fuerant, & minus roseus quam antea, faciei color. Cum alia quæ ea mente exhibuerat, minus responderent; dare cepit veterem rosarum conservam, ut vocant, vitriolatam, quæ, & confectione alkermes; sic enim appellant; sine odoribus excipiebatur contusa citrea femina, & in boli formam redigebatur. Hoc bolo & ventriculus aliquanto melius se habere incepit, & sanguinis multo minus profluere. Tunc vero; tertia jam pars præterierat Augusti mensis; non solum tumere cœperant mammae, ut in prioribus uteri gestationibus, sed etiam venter altius se attollere. Hic iterum mulier, cæterique in depositam graviditatis opinionem redire, sed etiam venter altius se attollere, meumque turbaret animum, creber in utero punitionum sensus. Quæ me res movit, ut ventrem manu diligentius contraxerem. Quod dum facerem, magis aliquando turbatus sum, uterum percipiens, non umbilicum versus acuminatum: sed in transversum utroque latere versus acuminatum; nec, si paulo fortius premerem, sine dolore id ferentem, præsertim ad dexteram iliacam regionem. Vultu quidem, ut debebam, non modo verbis, apud mulierem suspicionem dissimulavi meam. Hanc Medico tamen, & Viro mox aperui, vereri me, dicens, ne præter fœtum mola subesset: nec tamen propterea nisi id quod agebatur, agendum; neque enim ubi mola suspicio esset, & majus in dies, quo minus sanguinis exiret, uteri incrementum, iis esse locum quæ vehementer adstringerent, præsertim cum sanguis nonnullis quidem noctibus haud ita parce, plerique tamen satis modice jam prodiret: nec contra ubi facile profluvium redire posset, simulque cum mola, fœtus esse crederetur, ad pellentia, ne in solis quidem molis semper tuta, decurrendum; sed observando, & pro re nata moderando sanguinis fluxum, quiete præterea & animi, & corporis, aptisque alimentis mulieris vires ad cuiuslibet enixus casum esse conservandas. Hæc igitur dum attente fierent, post dies non ita multos, XV. Kal. Septembris, mulieri, dum forte staret, aquæ repente ex utero proruperunt neque odore, neque re alia ab iis quæ parturientibus prodire solent, nisi forte copia paulo majori, discrepantes. Vocata continuo Obsterix cum proximi partus nulla præterea videret indicia, imo uteri osculo oclausum digito perciperet; hæc nobis curavit significanda: qui nisi novi appareret aliquid, interea quiescendum esse, respondimus. Unus, alter, & tertius jam dies sic erant exacti, me non valde mirante, quippe memorare, non modo apud Harveum (r), totque alios legisse, verum etiam in Cive altera mea nobilissima aquarum effluxum multo ante extremum gestationis vidisse, felici nihilominus partu non ante legitimum tempus consecuto; ægre tamen hic ferente, ubi fœtum neque robustum, neque solum esse, existimarem. Die autem quarto, cum venter qui ab aquarum exitu detumuerat, iterum cœpisset tumere, ingruentibus partus doloribus; mola primum, deinde fœtus mortuus ejectus est, novissime autem, tribus interjectis horis, nec sine difficultate, & magna sanguinis profusione, Secundæ exierunt. Servata est mater, quæ undetrigesimo post anno obiit ex maligno ulcere, ut accepimus, in utero, an vaginâ, sed postremis illis annis oborto. Certe eo tempore quo fœtum illum gerebat, & eo quod protinus, & deinceps factis diu infecutum est, nihil fuerat unde uteri, aut vaginæ exulcerationem jure posset suspicari, indeque sanguinis illas effusiones repetere, ut posses in femina, ab Raygero (s) descripta, quippe quæ cum acerbissimis lumborum, & inguinum doloribus immanem primum uteri hæmorrhagiam passa est sex, septemve ante partum hædomadis, post puerperium autem profluvium, quo intra perpaucos menses confecta est, fortidissimi nigricantis humoris. Quod si nostrum cum propositis a Phil. Jacobo Hartmanno (t), & a Cl. Gutermanno (u) calibus tibi placeat conferre; non difficile intelliges, abortus, pariter cum mola conjunctos, quanta, & quamdiu profusio sanguinis præcesserit, neque tamen hic ab aperto in vaginâ sanguiferi vase, nedum ab utero, aut vaginæ exulceratione, deductus sit, aut deducti debuerit. Sed cætera quæ ad abortum attinent, a nobis descriptum, persequamur. MOLA, eloto qui adhæserat, sanguine, haud crassior inventa est digitis transversis duobus, aliquanto autem longior, sectaque, nonnihil spongiosa, & quasi carnea apparuit. Secundæ nihil ostenderunt vitæ. Fœtus

Fœtus qui sequioris erat sexus, novem digitos transversos longitudine non æquabat. Caput univertum, & collum a magna quasi fugillatione, sine ullo tamen fœtore, nigricabat. Cætera, etiam interiora, nihil præter naturam, quantum videre potui, habebant. Inepta enim mulierum morositate, vix licuit ventrem aperire, in quo ventriculum non inanem, quadam autem intestina animadverti ab iis quæ secundum naturam continebant, subnigra. Sed ne id quidem permisissent, nisi, ut solari possent Parentes, qui decepti marem amisisse tristius ferebant, uterum exiguum quidem, sed immisso per naturalis rimulam tenui specillo, cum hac manifestissime communicantem, sicuti curiosi ipsis pollicitus eram, ostenderem; clitoridis enim existantior, rimulamque prætegens, ut in ejusmodi fœtibus solet, magnitudo illis pro pene impoſuerat; nec mirum, quando sæpius Chirurgis, atque adeo Medicis ad eundem modum impoſuit.

10. Neque immerito hoc a medicum, cognosces ubi ab Auctore Scephs utriusque de Vivipara Generatione in harum altera describi fœtum animadvertitis, qui vix attingens tertiam partem digiti auricularis, completus tamen erat, & distinctus in omnibus suis particulis, ita ut vel sexus masculinus optime distingueretur. Scilicet in hunc errorem, quem verbum istud optime sine ulla adjecta dubitationis, aut accuratioris examinationis mentione, satis indicat, non incidisset, si anatomes exercenda magis, quam impugnanda, studiosius, eadem quæ folertes Anatomici, in primis Ruyschius (x), de tanto faciliore ea quæ diximus, in dignoscendo sexu deceptione, quanto minor est fœtus animadvertisset. Quem vulgarem errorem exterminari, parentum interest, qui per sæpe abortus eo gravius ferunt, quod marium illos quod esse, putant qui sunt femellarum. Cæterum ut ad propositam historiam redeam, an fugillatio illa capitis inde orta sit quod aquis aut omnino, aut maxima ex parte jam effusis, non membrana illis disſente, sicque deorsum compulsa ad viam fœtui dilatandam, sed fœtus, matris conatibus propulsus, ipse sibi per angustias oris uteri exitum aperire debuerit, an potius, si, quod facile acciderat, is credatur antea mortuus, lesionem ejusmodi quæ non nisi in vivens corpus, aut in cadaver recentissimum cadit, vel pridem, quæcunque ejus rei causa fuerit, vel statim a morte, capite jam antea deorsum converso forte contraxerit, itemque an mola culpanda hic sit, quæ, ut ipsum præcessit, sic inter ejus caput, & os uteri interjici potuit, viamque angustiorē facere, eademque obstaculum illud fuerit, quod, ægra stante, sanguinis exitum intercludere ex utero, quippe tum de super compressa, videbatur, in medio relinque. Quod vero aquas effusas ex amnio fuisse, non dubitem, ejusdem fœtus, qui non nisi quarto post die exclusus est, cum alia faciunt, tum illud insuper quod copia esse visæ sunt paulo majori quam debebant. Neque enim ignoro fuisse ingeniosæ cogitationem, aquas ante iustum tempus prodeuntes, non ad eum qui denique ejicitur, fœtum, sed ad alterum attinere qui simul quid cum eo conceptus, verum in vitæ primordiis extinctus, & deinde colliguitus istas quæ exitum anticipant, aquas reliquerit intra amnium proprium donec earum jugi incremento hoc adeo distendatur, ut alterius robusti, & ad maturitatem prope adducti fœtus vehementioribus motibus resistere nequeat. Sed ut de aquarum illo incremento hic minime disputemus, atque ut præterea concedamus, huic cogitato quibuldam in casibus esse locum fortasse posse, at non erat certe in nostro, ut pote cum fœtus imperfectus esset, ac debilis, neque in propositis a Peterfonio (y), & Dethardingio (z), fœtus enim qui caput, jam exertum, rursus in uterum retraxisset, ibique alter duas, alter septem hebdomadas donec partus tempore omnino prodirent, restitisse scribuntur, suis profecto, non alienis aquis exitum aperuerant: aut si exempla hæc, quod ultro fateor, firmas requirebant probationes; alia tamen haud deerunt creditu faciliora, eodemque spectantia, si otium tibi ad querendum fuerit. Cæterum præmaturnum, & qui fere innoxius sit, aquarum exitum repetere plerumque solitus sum a rupto dumtaxat chorio, sic effluere finiente quod inter se, & amnium plus minusve illarum forte intererat secundum Observationes Ruyschii (a), & aliorum (b); quamquam hi nescio quam inde al-

lantoidem humano in genere commenti sunt. Aquarum vero ex amnio ipso ante iustum tempus eruptionem illam esse, non dubito, quam merito Hippocrates (c) *malam* pronuntiavit. Quamvis enim post ipsam non semper infelix sit partus: sæpius tamen minus est felix, sive illam ut causam, sive ut effectum spectemus. Ut causam quidem; nam effusa tunc aqua viam opportune fœtui neque dilatat, neque lubricat. Ut effectum autem; sive enim a minus firmis sit Secundarum membranis, sive ab nimia aquæ copia, sive ab ejus denique acrimonia, id quod Martiano (d), neque injuria, magis displicet, quomodo hæc duo novissima internoscamus, docenti; non bona certe aut de fœtu, aut de matris, aut de utriusque constitutione vel solidiorum, vel fluidiorum, vel utrorumque significat, contra atque ad partus, & puerperii optabilem felicitatem requiritur. Ex his proclive erit tibi explicare quadam, ad præproperam aquæ eruptionem, ad aliaque in proposita Matrona, & ejus partu, & fœtu, spectantia. In Mola autem suspicionem quæ mensura induxerint, ex historia intelligis, ubi ipsa, qualia ea cunque sint, memoravi. Non facile utique est ita illius præsentiam cognoscere, ut audacter affirmes: ex signis tamen notis quæ Majores nobis reliquerunt, pudenter licet suspicari. Eorum plurima; quamquam non omnia simul occurrere necesse est, collecta videbis a Lamzwerdio (e), ex cuius innominati libro, maxima aliquot ex parte in frugifero, a quibusdam ætate hac nostra fuisse descripta, animadverti. Nec tamen ego istam molam aut ante partum, aut post dissectionem ex iis esse quæ veræ appellantur, censui; imo pro uteri polyposa concretionem semper habui in muliere præsertim (quæ me res magis in eam suspicionem perduxit) cujus ex utero tantam prodire sanguinis copiam, & tam facile concrecentis, viderem.

11. Scilicet Molarum alia cum legitima sint, alia quæ illegitime sic appellantur, ex utrisque tamen quedam possunt aut cum fœtu conjungi, & sæpe abortionis causam afferre, sive uterum irritando, sive ejus cavum non parva ex parte occupando; aut sine fœtu adeo incrementum, ut graviditatem mentiantur. Sed illegitimæ possunt in virginibus quoque intactis, castisque viduis progigni; legitimæ, nisi apud eos qui, diffidentibus cæteris, ponunt in mulieribus subventanea ova, non possunt. Illegitimæ; ut de his primum dicamus; aut ex sanguine in uteri cavea subsistente, aut ex interiore aliqua ejus excreſcentia fiunt. Has ex certa basi, pedunculove cognosces, per quem, ut Ruyschius (f) proposuit, cum utero continuantur, aut certius ex sanguiferis hujus vas in eisdem productis. Illas autem quæ multo crebrius occurrunt, & ad quas plures quæ in Sepulchreto extant, non difficile revocabis, non secus ac in vasis, & corde ipso cætera polyposa concretiones, ex sanguine fiunt: quas cur in uteris, ut Lancisius (g) docuit, etiam virginibus cum Hoffmanno (h) agnoscere nolimus, haud satis causæ esse, video, earum præsertim quibus menstrua uberius fluant, aut insolita non sit hæmorrhagia uterina; hoc enim, ut simili quopiam modo interpretandum cenſeo Cel. Virum Abrahamum Vaterum (i), qui in virginibus saltem quibusdam agnovit. Concretiones hujusmodi Ruyschius (k) docuit, qua ratione, etiam si quidpiam membranarum instar adjunctum habeant, a molis quibusdam, inter legitimas ab aliis positis, distinguamus. Quibus de molis priusquam pauca attingamus, non est tibi quadam nostra Observatio singularis conformationis polyposarum quarundam uteri concretionum reticenda.

12. Nobilis in Patria nostra Matrona fuit, procera statura, colore, & habitu laudabili prædita, quæ nonnullos quidem intra primos gestationis menses fœtus ejecerat; sed inter eas abortiones sæpe tamen gestatione absoluta, vitales filios pepererat prægrandes, interdum & geminos, non sine gravi labore, & moleſto puerperio. Inter hos difficiles partus fluori haud raro obnoxia fuerat albo, & innocuo, interdum levi etiam, medio inter menstruas purgationes tempore, sanguinis stillicidio, quod semper Viri congressus, paulo vehementior præsertim, non sine dolore aliquo renovabat. Hæc igitur mulier anno exacto circiter trigesimo quarto, cum fluore ille albus plane desisset; novo morbi genere per intervalla cepit laborare, sæpius intra biennium recurrente, novissimis autem tribus mensibus A. 1723. & primo infrequentis anni, quo ego

(x) Theſ. Anat. 6. n. 48. 51. 54. 59. (y) Eph. N. C. Dec. 3. A. 1. Obſ. 62.
(z) Earund. Dec. 3. A. 5. in Append. m. 8. ad cit. Obſ. 62. (a) Theſ. Anat. 5. n. 56. prope fin. & Theſ. 10. n. 154.
(b) Vid. Litter. Mem. de l'Acad. R. de Sc. A. 1701. & Commerc. Litter. A. 1732. Hebl. 36. n. 3. (c) Coac. Prænot. Sect. 3. verſ. 187.
(d) Annot. ad eund. verſ. (e) Hist. nat. Molar. uter. c. 16. (f) Cent. Obſ. Anat. Chir. 58.
(g) Eph. ad Mulebacher. (h) Differt. de ignot. uteri struct. §. 19. (i) Diff. qua Mola prægrans & cet. theſ. 12.
(k) Cent. citate Obſ. 29.

(p) 1. §. 3. in Schol. penult. ad Obſ. 58. (q) Progr. de Hemorrhag. Gravidar. (r) in Additam. ad Exercit. de Generat. ubi de Uter. Humor. (s) Eph. N. C. Dec. 3. A. 3. Obſ. 435. (t) Dec. ead. A. 4. Obſ. 84. (u) Act. N. C. Tom. 3. Obſ. 78.

menſe per litteras conſultus ſum, ac certum ſemper tem-
pus redeunte, menſtruorum videlicet. Tunc enim obor-
tus parvus doloribus, & primo, aut altero die ſanguinis
curſu incipiente, vel uberius quam pro conſuetudine ef-
fluens, in medio ſere eo curſu ex utero ejiciebatur cor-
pus, ut apparebat, membraneum, idque ea forma, ea-
que magnitudine quæ triangulari uteri cavæ factis re-
ſponderet, modice convexum exterius, quæ facie erat
inæquale, nec ſine plurimis filamentis, quæ ab fedibus
ad quas adhæſſent; abrupta effe videbantur, cavum au-
tem interius, quæ facie erat læve, & madidum quali ab
aqueo humore, quæ antea continuiffent, in exitu autem,
per amplum foramen, quod in uno erat anguloſum, a
diſtractione facile apertum, emiſſiſſe. Hujus ejectionem
corporis lochia multa conſequabantur, pro mulieris con-
ſuetudine ſæpe interrupta. Quod ſi nonnunquam id cor-
pus non interiret, ſed in frutula diviſum per vices pro-
diret; tum dolores, & lochiorum fluxus per vices pariter
redintegrabantur. Singulis autem illis quatuor menſibus,
quibus a Viro fe abſtinerat, cum ſingulas has permo-
leſtas quali abortiones paſſa eſſet mulier, nec remedia,
a pluribus qui conſulti fuerant, egregijs Medicis im-
petrata, quidquam profuiſſent; rata, ſibi eſſe multo conduc-
cibilis, ſi novem ſaltem menſibus a doloribus vacaret;
ſecubare noluit amplius; itaque Martio menſe A. 1724.
gravida facta eſt. Ultra Junium tantum ſætum non per-
tulit. Sed hoc conſecuta eſt, ut Julio, duobuſque inſe-
quentibus menſibus rite, ac ſine illa moleſtia menſtrua
fluèrent. Cum vero nulla apparuiſſent menſe Octobri,
ſub Novembris initium reverſi dolores ſunt cum deſcripti
corporis ejectione, cæterique de quibus ſupra dictum eſt.
Diutiusque ſtatis intervallis eadem redire perrexerunt, ut
cum ipſe uno ex annis proximis Foro Livii eſſem, ejectionem
viderim corpus, quod ut abſens reſcripſeram, ex polypoſa
concretionem erat factum, membranam mentiente in modum
diſpoſitam parvi marſupij triangularis; ut proclive eſſe in-
telligere, viſcidæ ſanguinei feri particulas, ex uterinis va-
ſorum oculis prodeuntis, quæ albi floris forma olim excer-
nebantur, nunc viſcidiores factas, ad omnes uteri parietes
intimos adhærere, ſiſque in polypoſam membranam con-
creſcere, quæ ad cavæ illius imaginem, quam in Adverſa-
rijs (/) triangulū propemodum forma eſſe, confir-
maviſſus; quali ad typum quandam conformata, marſupium
reſereret, in quod expreſſa quæ inter viſcidiores illas
particulas fuerat, feri parvas aquæ retineretur, & marſupium
ſervaret vacuum, & læve intus redderet: retineri autem facile
quæ live ob exitantes intra cervicem lacertos, five ob
hujus, ſi cum fundo conſeratur, angulias, five ob con-
niventiſ oculi impedimentum ſubſiſtentes viſcidæ particu-
læ, ibique inter ſe viſcidæ contingentes, jam inde ab
initio marſupium occluderent: hoc denique ſanguini, ſin-
gulis menſibus erupturo, primum quidem obicem oppo-
nendo, efficiere, ut diſtenderentur uteri vaſa, ſiſque do-
lores concitarentur; deinde vero cum urgentis ſanguinis
vi a parietibus uteri diſtraheretur, cruciatus augere; no-
viſſime undique avulſum, non ſine magna ob illam va-
ſorum diſtentionem & prævia, & comitante, & ſequente
ſanguinis copia ejici. Habes, quæ initio, & poſtea fuerit
mea de hoc morbo opinio: quæ in eo quidem mihi, Pla-
teri (m), aliorumque Obſervationum, vel Actio (n) olim
non incogitatum memori, minime novus videbatur;
quod ſtato menſtruorum tempore cum his concretio ali-
qua, idque diutius, ejiceretur; ſed in eo quod concre-
tio ſingulari illa forma eſſet, quam apud alios legiſſe non
memini; quin Platerum memini diſerte ſcripſiſſe, *nul-
lam ſe cavitatem in ſua poſuiſſe cognoscere*. Eorum qui
conſulti fuerant, aliis uteri excreſcentiam hanc noſtram
effe, viſum eſt, aliis polypoſam quidem concretionem,
ſed ex ſanguine per vaſa aliquod, in utero ipſo eroſum,
deſtitante. Qui ſi, ut ego, aut inſpexiſſent ipſi, aut in
Mariti multo accuratioribus quam Medici, litteris ad me
miſiſſi deſcriptam legiſſent; eas opiniones, ut puto, facile
depoſuiſſent, quas tempus quoque a vero alias fuiſſe,
oſtendit. Nam ut morbus poſtea diutius duraverit; ſinem
per ſe, & per ætatem habuit tandem. Cum enim ad tem-
pus acceſſit quod mulieribus ſolent deſignare menſtrua pu-
gationes; jam primum, non ſingulis menſibus, ſed ſin-
gulis annis, bis terve, dumtaxat, redire cœpit: cum ve-
ro ſinem illæ habuerunt; & ipſæ habuit: neque ullius in
utero vel levis eroſionis indicium, aut qualiſcunque ex utero
incommodi unquam exitit quoad mulier vixit, vixit autem
donec cancer, in altera poſtea mamma ortus, ſeptuagene

fimo anno jam proximam confecit. Porro Medici quo illa utebatur, fentientia fuerat, concreciones illas de quibus dictum est, fubventanea esse ova, cum idem, credo, spectaret quod illi qui polypofas molas ab iis quæ ex fubventaneis ovīs effent, per caveam quæ intrahas, non intra illas foret, internoscere docuerunt. Qualia ova tamen effent in mulieribus agnoscenda; difficile tamen est dicere, cur in ista se explicarent semper in triangulari formam, singulisque mensibus semper unum præsto esset quod in uterum descenderet. Sed hæc hætenus. Nunc de legitimis, sicuti promissimus, molis pauca adiciamus.

13. Legitimas Viri ætate nostra doctissimi eas dumtaxat molas appellant quæ sine pravâ conceptione non fiunt. Sed alii ex fœtu, & Secundis, alii ex placenta solum fieri posse, credunt, si quacunq; de causa rerum harum fieri possit, mœtur, ut facile pro iis quæ ab origine fuerant, agnosci nequeant, sive massam quasi carneam, imo carne multo duriore, sive aggeriem vesicularum, ut quam olim Mercatus (o) vidit, representent. Ruyschius tibi in manibus est, qui in placenta vel sola utrumlibet mutationis genus ostendit cum alibi, tum præsertim in Observationibus: ex quibus anno editis 1690. curnihil eorum quæ hic, aut supra (p) indicavi, ad Scholia saltem harum Sectionum augenda, relatum sit in Sepulchretum, non video. Placentas enim minorum fœtum non rarissime in utero fuisse, ab eoq; se conftringente magis magisque compressas, longe aliud ac erant, non modo figura, sed & substantia carni durissimæ simili, videri docuit (q). Placentas autem fœtum majorum ibidem refractantes, interdum degenerare in vesiculas, humoris aqvisi plenas, idem, quis alius, præclare ostendit, cum unam eandemq; placentam invenit (r) ex parte sanam, ex parte in ejusmodi vesiculas jam mutatam. Quæ Observationes etsi veræ sint; tria tamen, aut quatuor sunt addenda. Primum, neque minorum fœtum placentas non aliquando in vesiculas degenerare, cum Ruyschius idem in placenta fœtus trium fere mensium initia hujus mutationis, in altera autem placenta ipsam mutationem magis inculentam demonstraverit (f). Alterum, nec soli placenta mutationem hanc convenire, quando non tantum ex posterioribus Observationibus Ruyschii constat, velin funiculo umbilicali vesiculam ipsam plures vidisse (s); sed & ex vetustioribus (u) manifestum est, eundem funiculum tot vesiculis præditum ipsi nonnunquam occurrere, ut totus videretur concatenatus vesicularum aqvis humore repletarum: quin etiam ex Vallisnerii nostri Observatione (x) certum est, post immanem vesicularum numerum, ex utero ejectam esse placentam; ut; nisi hanc ad alterum fœtum pertinuisse, comminifaris; liqueat, ex placenta igitur mutatione illas non fuisse, quod ex aliorum quoque, ut puta Cl. Gutermanni (y) inferre potes Observationibus. Tertium, cum eodem Vallisnerio, quem ea pariter quo modo adnotavi, fere omnia video animadvertisse, dubitari fortasse posse, num illa placenta in vesiculas degeneratio tunc fiat cum in utero post excludum fœtum subsistat, an priusquam is excludatur, fit facta. Ego certe in quadrimetris fœtus placenta, quæ simul cum eo excluda fuerat, vesiculam vidi aqua plenam. Attamen sic ista mutatio sæpius in placentis quæ cum fœtu prodeunt confpicuerit. Quartum denique, cum supra dictum sit, neutrum hoc molarum genus fieri non præcedente conceptione, & neutrum sane ab intactis virginibus, quod legisse meminerim editum sit, summa profecto & peritia, & diligentia in examinando, nec minori prudentia in pronunciando opus esse, siquid illa ex iis quæ a viro se abstinuisse creduntur, aliqui ejiceret quod ad alterutrum genus spectare primo videretur, ne forte non placenta, sed mera sanguinis concretio, aut excrementa quæpiam esset quæ carnis, aut vesicularum de quibus diximus, similitudinem gereret. Excrementis enim quæ carnem referant, aut caro sint, passim extare, est notissimum: quæ autem ipsarum vesicularum similes sint, i Litteris superioribus (z) est traditum. Quin etiam ut in ventris cavo hydrops est interdum ex hydatidibus, ut puta quales Ruyschius (a) pinxit peculiari facco inclusas, ita non repugnat, hydropem uteri nonnunquam fieri ad eundem modum, præsertim cum hunc; nisi forte pro eadem ex vesiculis, ut alii malunt, habendum; capite de uteri hydropæ Aëtius (b) descripserit, Humoris copia, inquit, in utero confuit, & aliquando corpuscula quedam, vesicæ sellis similissima, in ipso generantur, in quibus humor colli-

colligitur. eaque corporcula infra vocat *pellicae*, & aqua *refertas veficas*. Nec defunt exempla diuturni hydropis foluti per immanem ex utero excretum hydatidum numerum, quale propofitum leges a Cl. Kannegieffero (c) in vetula annos nata circiter feptuaginta: quanquam effe aliqui poffunt qui in hac quoque hydatides illas ad veram molam attinuiffe, fufpicerent, nimirum ex placenta fetus, dum ætas adhuc ferret, concepti, poftque hujus obitum multos per annos gefata. Quod ideo dico, quia Cl. Rideux (d) molam alterius, fed legitimi, ut non dubitat, generis a Vidua annum agente feptuagefimum feptimum ejectam, quamvis æa magnitudine, & pondere; ut mirum fit, nullum unquam fui indicium dediffe, cenfet tamen ob eas quas profert, rationes ex conceptu ortam mulieris cum annum ageret quinquagefimum quartum, nempe anno quo menftrua purgationes, nihil ad id ufque tempus imminuta, repente delierunt; nonnum autem filium anno ediderat quinquagefimo primo. Quibus pofitis duo colligas, licet. Alterum, ut videas, an hinc poffis ex aliqua faltem parte explicare, quomodo foemina, de qua apud Valinerium (e) legeris, ipfa quoque totidem liberorum parens, quorum ultimum credebatur anno propemodum quinquagefimo peperiffe, anno demum feptuagefimo fecundo placentam ejecerit, ad eamque annexum fruftum, libra pondo, carnis informis, fi quandam in fummo excipias ocelli fimilitudinem, intus vero implexus quafi cujufdam intellinorum: item quomodo alia (f), hac poftrema anno major, cui olim fecundæ, nunc iterum menftrua uno atque altero menfe redierant; cum multo grandiori carnis frufto venas; fi veræ tamen venæ fuerunt, fuamque tandiu potuerunt fervare formam; excluderet. Alterum, ut liquet forte ejufdemmodi ex Vidua aliqua vel diu poft mariti obitum prodeat quod ad veræ molæ naturam accedat, imo verâ molâ, non propterea de ejus pudicitia continuo dubites, quando, ut fupra dictum eft, potuit olim in abortu, vel minus animadverfo, placenta in utero fubfiftiffe. In Virginibus autem etiâ hæc locum minime habent; & in ipfis tamen, ut dicebam, diligenter etiam atque etiam videndum eft, ne facilis contingat deceptio. Quæ ut quoad ejus fieri poteft, vitetur; in carnofis quidem excrescentiis, & in polylopi fanguinis concretionibus æa juvabit attendere quæ fupra (g) ad id memorata funt, & indicata ibi Ruyschii loco perlegere, quin etiam addere Cl. Schlierbachii (h) Observationem, qui tametiâ molam vidit *quadantenus vafculofam, copiofis fimul hydatidibus refertam, quibus multa pinguedo interfecta apparebat*: non propterea ex Virgine effe, negavit, credo quia vel in polylopiis concretionibus aliquid faepe quod pinguedinem mentiatur, & aliquid interdum quod vafa quadantenus referre poffit, confpicimus; de hydatidibus autem paulo ante dictum eft. Sic etiam Phil. Jac. Hartmannus (i) nec a pinguis cuticula fpecie, nec a pluribus tunicis, fibris vafis intermixtis & albis, neque demum a veficulâ intus bærente, & gelatinam continente fe decipi, paffus eft, quin coagulum fanguinis effe agnofceret in ea tamen in qua fi molam veram effe, dixiffet, nullam inde labem ejus, quippe nuptæ, honefto nomini apheriffet. Itaque non quid appareat, fed quid fit, accurate querendum eft; veræ enim fida, verâ vafa, veræ tunica, exiiffe confecta vefica fine viri ufu effe non poffunt. Imo hujusmodi vefica inter molas omnes maxime legitima effer, quippe inchoamenti embryonis, & humoris in quo is natus, involvitur, fi molæ nomine, ut a plerisque nunc accipitur, res hujusmodi comprehenderetur: quanquam hanc ipfam vocabant *molam veficularem* idem Hartmannus (k), & hunc fecutus Cl. Gottwaldus (l), qui ejus Icone fatis earum fimili quas edidit poftea Ruyschius (m) fuam illuftravit Observationem. Hæc igitur in Virginibus effe non poteft, nec quantum fciat, illa pariter quæ aliquanto melius mola veficularis appellaretur, id eft aggeries veficularum in modum racemi difpofita. In qua agnoscenda ne qua deceptio contingat, haud inutile, opinor, fuerit magis accuratas defcriptiones, Iconesque earum infpectare quæ poft conceptionem ejectæ funt, ramofæque, aut ramulos in illis attendere, ad quos appendæ

non raro prodire. Quales descriptiones, Iconesque apud Ruyschium, quamquam veficulis ipsis non femel pinxit, & multoties memoravit, & bis nonnunquam intra duodecim dies vidit (*n*), haud æque invenies ac apud Malpighium (*o*), & Vallisnerium (*p*). Certe autem parvæ illæ ex veficulis factæ exerefcenciæ quas mihi intra utrumq; videre contigit, ramulos oftendebant nullos ad quos veficulæ appendenderent, quippe inter fe confipatæ, coherentesque aut per fe, aut per interjectam neque tenuem, neque ramofam fubftantiam.

14. Cæterum vesicularum quæ ex utero ejec-tæ sunt, tot profant Observaciones, totque harum collectiones ab Eruditiss Viris sunt indicatæ, ut in sylvam ligna ferre videri possem, si alias huc, mihi notas, fugiss adderem. Nam & Foroliviensem Matronam scio quadragesimo circiter ab hinc anno vesiculas alias majores, alias minores, alias minimas edidisse, & hic pariter uxorem Prætorii famuli A. 1727. ejecisse plurimas, fœtus qui expectabatur, loco, & Albertinum sub initium A. 1724. semel, atque iterum mensis intervallo a femina quadam non sine febre, sævisque doloribus exclamam vidisse aggeriem vesicularum, quæ rubri rubefi majores acinos, mihi quod colore erant paulo dilutiore, figura, & dispositione referebant: nec vero color alias fuisse itas ac eas de quibus loquimur, vesiculas, ostendit, quando non Tulpus modo (7) quasdam quæ aqua crocea, sed & Lancifus (8) alias quæ in uno eodemque racemo inter cæteras limpidi, aut subflavo latice plenas, subrubro veluti crureo distendebantur, huc attinuisse, non dubitarunt, ut neque Cl. Viri Magnenius (9), Dechiappa (10), & Gutermanus (11), quorum hic in quibusdam majoribus, alter in omnibus; quomodo enim erant majores; sanguineam, vel rubellam intus maculam confpexerunt, Magnenius autem in altera molâ nonnullas flavescences, duas tantum, aut tres exterius rubescences, in altera ejusdem mulieris omnes; quæ erant innumere, & miliares; rubicundissimasprehendit. Quibus denique addes Ill. Hallerum, ubi (12) vesiculos albis descriptis, qui petiolis, ex placenta emissis adhærebant, in ipsaque quæ placenta, ait, vesiculas rubicundas magis fuisse pariter sibi innexas. Mitto alias in quibus nihil quod ad rubrum colorem spectet, adnotatum est, ex utero ejec-tas vesicas, five solutæ exierint, ut fortasse quæ in Commercio Litterario A. 1745 (13), certe autem, ni fallor, quæ a Præcl. Phil. Conrado Fabricio (14) memorantur, five non soluta quidem, sed confuso ordine dispositæ, ut quæ a Cl. Wogau (15) describuntur, five demum usæ instar racemorum collectæ, ut quæ a Cl. Viris Jo. Sebast. Albrecht (16), & Jo. Jac. Treyling (17): quod ad genus ferè omnes spectabant de quibus paulo ante relatum est. Ad me quoque allatæ sunt interdum ex eodem genere quamplurimæ, præsertim A. 1716. quas pot ferum violenta abortione exclusum Veronenis mulier ejecerat. Eas simul cum eo qui miserat, Vallisferio examinavi. Sed ob eandem, puto, quæ dicta est, causam, nempe ingentis jam tum ejusmodi hiftoriarum numeri, cum ipse postea, quod sciam, Observationem hanc non eiderit, ego pariter prætermittam. Addam potius, quale initium vesicularis molæ in canis utero deprehenderim A. 1723; neque enim tot profant hiftoriæ molæ ejusmodi in utero viva, quot ejec-tæ; multo autem rariores sint molæ in brutis animantibus oportet, quando non Aristoteles solum (18) in mulieribus illas aut solas, aut maxime gigni, scriptis, sed etiam inter Recentiores Harderus (19) ejusmodi quicquam ex bruti utero excretum negat se conspexisse, rogatque cæteros, ut si quid de his compertum habeant, vel olim experiantur, publico sibi nec non invident. Non me fugit, in gallinarum ovis five exclusis, si vive in ovario herentibus molas fuisse repertas, ut a Vallisferio (20), & a Gottwaldio (21). In perfectis autem quæ vocant, brutis, animalibus, de quibus Harderus videtur loqui, non inficior, esse fortasse exempla posse hoc quod ego producturus sum, inchoamento luculentiora: in præsentia tamen legisse non memini: & quamvis Eruditissimus Vir ajat, in vacca etiam molam vesicularem Vallisferium descripsisse; in cane fortasse voluit dice-

re, in

(1) Tab. 3 & IV. Animad. 42. (m) Obs. l. 3. ubi de Inanimat. Exer. (n) Medic. Tetrabib. 4. Serin. 4. c. 80.
(o) Sect. hac Sepulch. 37. Obs. l. 9. 4. (p) n. 11. (q) Obs. 18. 29. 58. (r) Obs. 33. (s) Thes. Anat. 6. n. 102 & Tab. 5. Fig. 3. 4. 5.
(t) Ibid. n. 45 & Tab. 2. Fig. 3. (u) Obs. 12. & (x) Opere Tom. 2. P. 1. ubi de Partu Ventrular.
(y) Ach. N. C. Tom. 3. Obs. 58. (z) n. 20. & segg. (a) Obs. cit. Fig. 24. (b) Medic. Tetrabib. 4. Serin. 4. c. 799.

(c) Agt. N. C. Tom. 6. Obf. 89. (d) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1735. (e) Tom. 1. cit. P. 2. c. ultim.
 (f) Eph. N. C. Dec. 6. Obf. 74. (g) n. 11. (h) Agt. N. C. Tom. 7. Obf. 64.
 (i) Eph. N. C. Cent. 3. A. 5. & 6. Obf. 206. (k) Eaurud. Dec. 2. A. 10. Obf. 157. (l) Eaurud. Dec. 3. A. 0. & 10. Obf. 159.
 (m) Thef. Anat. 6. Tab. 2. (n) Advers. Anat. Dec. 2. c. ult. (o) Op. Poeth. (p) Opere lon. cit. & Eph. N. C. Cent. 9. Obf. 73.
 (q) Obf. Med. 6. c. 32. (r) Epist. supra cit. ad n. 11. que prima est apud Valisfieri. 12. deila Generez. P. 3. c. 3.
 (s) Agt. N. C. Tom. 1. Obf. 166. (t) Ibid Obf. 167. (u) Obf. cit. supra ad n. 9. (x) Opusc. Pashol. Obf. 40.
 (y) Hebd. 33. in fine. (z) Propem. ad Diff. 1. b. Hoffmanni not. c. (a) Eph. N. C. Cent. 9. Obf. 85.
 (b) Commenc. Litt. A. 1738. Propem. n. 1. in fine. (c) Agt. N. C. Tom. 5. Obf. 132. (d) De Generat. Animal. 1. a. c. 7.
 (e) Eph. N. C. Dec. 2. A. 2. Obf. 185. (f) Opere Tom. 1. P. 3. pag. 126. & Tom. 2. P. 3. pag. 212. n. 6. & pag. 243. u. p.
 (g) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obf. 157.

re, in qua revera describitur (b); sed ejusmodi, ut ipse sit falsus, difficile judicari, num esset aliqua, præter naturam productio nata ex utero substantia.

15. CATELLA quæ multoties pepererat, sed binos, haud plures, singulis partibus, cum ante mensam cane inita, gravida facta crederetur, novissime dies aliquot tristes visa, repente convulsivis motibus correpta, sine ullo ejulatu mortua est. Herus, Vir doctus, meique amicus postmodum ad me venit, petiitque, ut si commodum esset, causam mortis quærerem: quod ipso qui cadaver attenti iussit, alique in Re Anatomica exercitatis spectantibus, continuo præstiti. CEREBRI Laterales ventriculi, & præsertim sinister, magnam vim aquæ continebant, quam non diu ante mortem illuc effusam rubor Choroidum plexum indicabat. Cordis cavæ plenæ sanguinis ferme concreti, nigerrimi. Ventris potissimum membrana; nam alibi quoque pingues fuerant; ea pinguedinis copia, circa uterum præsertim, referre erant, ut tenuem totum utriusque tubæ tractum demonstrare vix potuerim. Testes, etsi prope alterum eorum conspiciebantur hydatides, nullam ex iis quas secundum naturam plerumque solent, vesiculam habuerunt; nec mirum, quando toti quasi carnei videbantur ex contractis videlicet corporibus quæ lutea in vaccis, & mulieribus appellamus. Per vaginæ interiorem faciem hic illic prominebant subrotundæ glandulæ inæquali magnitudine, scirrhusa duritie. Inde ad uterum progressus, initium sinistri hujus cornu omnino impervium offendi. Erant tamen cornua ambo inaccessu tortuoso, & hic illic magis, minusque protuberantia, quamvis non ita indistinctas cellulas usquam dilata, ut in prægnantibus jam ab aliquo tempore canibus videre consuevimus. Tota interior eorum facies ad tactum tenera, rubebat. Sed iis locis ubi exterius majores cæteris protuberantia apparuerant, humor continebatur crassus, mucosus, ex viridi albus, ut pus referret, inodorus, nullum fœtus inchoamentum ostendens. Hunc autem humorem complectebatur mollis quadam rubenque substantia, in qua vesiculæ se probebant aqua plenæ, aliæ alia magnitudine, sed parvæ omnes, nec plurimæ.

16. Inter reliquas falsæ graviditatis causas merito in Sepulchreto post Mosas referri video alios non modo uteri, sed & quarundam præterea ventris Partium tumores. Uteri quidem sive ab internis sint, externive excrecentiis, sive ab humoribus in ejus visceris parietibus, aut ejus etiam cavæ resistentibus, interclusi per osculum exitu a quacunque causa id vel constringente, vel obstruente. Quorundam autem aliorum viscerum, in primisque mesenterii. De quibus fere omnibus rebus cum alias a me plura, aut pauciora scripta sint; hic ea repetere non oportet. Illud vero potius expediam, quod ex me quaeritur esse a te, memini, quando, & quomodo ob renem unum dumtaxat a primordiis creatum sic promineat venter, ut vel Anatomice possit decipi, & pro uteri gestatione accipere? id enim inter cæteras causas graviditatis emittentes in hac Sepulchreti Sectione (*) fuisse proposuit. Etsi prospicio, in tanto prolixiore quam putas, sermonem oportere me ingredi, ut tibi a proposito hujus Epistolæ digredi videri possim; faciam tamen non ilibenter, tum quia, si hunc prætermittam, nullus mihi supererit opportunus tuæ isti postulationi satisfaciendi locus, tum quia simul in aliquem ordinem innumeras ferme renis unius Observationes redigere conabor, quod, si potero, non erit inutile effectisse. Nunc enim certe multo mihi facilius esset tibi satisfacere, si qui post Pinum (**) inventi unius tantum renis exempla collegerunt, Schenckius (i), Bauhinus (k), Riolanus (l), Panarolus (m), Rhodius (n), Hornius (o), Blasius (p), Francus (q), Hilscherus (r), alique deinceps exempla omnia quæ, sua quisque ætate jam edita, facilius poterant, proposuissent, & proposita in certas classes distribuissent. Illi vero aliqua, in obviis etiam libris extantia, prætermiserunt, & quæ produxere, ea fere promiscue indicare consueverunt, cum haud

difficile esset in ea dividere in quibus ren unus factus est pro duobus, & in ea in quibus factus est ex duobus, & prima illa rursus in ea in quibus ren suum occupat latus, & in ea in quibus, Spinæ impositus, medium tenet. Ad illa prima attinent, & rene quidem suum latus servante, præter vetusta ex Aristotele (f), ea quæ tot posterius, & in his Sphærius (t), & Solenander (u) ex Matth. Stico, Plazonus (x) cum Silvatico, apud quem legere præstabit, Hallerus (y), Petschius (z) proposuerunt, & si meam seponere hinc malis dubitationem, Epistola XL. (a) indicatam, etiam Tulpius (b), & Meekrenius (c). Quam dubitationem seponas licet in Observatione Hilscheri (d): etsi enim a te addi hæc possit ad eas quæ in Sepulchreto sunt ad renalem ischuriam a calculis attinentes; tamen, ut cætera omittam, satis indiciorum ab solerti Persecutore congestum est, unde renem alterum a primordiis defuisse, intelligamus, non secus atque in Professore illo Cabrollo (e), & in memoratis alias (f) a nobis adolecente Manfredi, catella nostra, & cuniculo, imo & Sacerdote, & muliere Valsalvæ, & Poupartii puella. Fuit autem in muliere illa id quoque indicio, unum ab natura fuisse renem quod hic binis pelvibus instruebatur, binisque ureteribus: quot in Panaroli (g) item juvene, & in Laubi (h) milite, non solum fuisse, legimus, sed præterea ex ureteribus alterum in eam se inmisisse vesicæ partem cui ren nullus respondebat. Memoratis hæcenus exemplis quæ ad primæ classis partem primam omnia spectant, verisimile est, alia plurima adjungi posse tum quæ in præsentia non succurrant; neque enim mihi id unquam sumam, ut omnia putem aut legisse, aut meminisse; tum quæ Scriptores sic expresserunt, ut unum dumtaxat renem fuisse, dixerint, veluti Columbus (i), Fernelius (k), Casparus Wolphius (l), Laurentius (m), Boscus (n) & suam, & paternam indicans Observationem, Jo. Scultetus (o), Saltzmannus (p): ex iis autem qui a Viris Eruditissimis Rhodio (q), & Hallero (r) laudantur, Lopez, Ronseus, Duretus, Handwigius, Humelius, aliqui fortasse exempla scripserint ad hanc classem attinentia: fortasse dico propterea quod ex indicatis libris alii mihi non sunt in manibus, alii vero, quantum ego quidem potui quærere, ea non exhibent quæ dicuntur, non secus ac Carpi in Mundinum Commentaria frustra versavi; exemplum enim illud aliud quod ait Riolanus (s), ubi maxime esse debuisset, non inveni. Nec vero quia ex utrisque illis Auctoribus plerique scripserint, eum unum renem fuisse magnum, imo aliqui, ut Columbus, maximum, ut Fernelius, mira magnitudinis mole, ut Boscus, magnitudinis, & latitudinis fere incredibilis; idcirco a te continuo putandi sunt de rene dixisse qui non ad hanc primam classis primæ spectaret partem. Probe enim memineris, quantum ren ulterius possit excrecere (t): cur non igitur cum unus tantum est, magnus esse queat in suo latere? imo etiam prægrandis, si forte vis morbi accedat, & calculus, pure, lotio retento, ut in exemplo non uno ex iis quæ supra allata sunt, distendatur. Quæ cum dico, noli putare, probari a me quod Vir Doctus scripsit, cum ren unus fuit, ex cunctarum observationum testimonio, semper magnitudinem renis naturalem multum superavisse. Neque enim in cunctis Observationibus hoc video adnotatum: quin video Panarolum (u) discrete admonentem, in sua ipsam quantitatem non excessisse, & Valsalvam (x) in suarum altera, naturali fuisse magnitudine. Quamobrem a vero minus discessit Riolanus (y), cum scripsit, si ren unus reperitur, fere gemini magnitudinem æquare. Utinam quæ continuo adjicit, probare possem, & supra dorsum jacere, paulum remotis canalibus Aorta & Cave, ut sedem præbeant solitario reni. Sed quot exempla proferunt auctores suam retinentis sedem, ex superioribus manifestum est. Supra dorsum autem jacentem, & Magna vasa (quod tamen vel nunc non semper adnotatum est) remotentem si fere omnes unius renis Observatores vidissent; res quoque has, quippe non minus ipsis raras, quam renis unitatem, simul ab se visas indicassent; quod cum illi haud fecerint qui nihil

(b) Opere Tom. 2. P. 2. vers. finem. (*) XXXVII. Vide titulum Observationis 3. præfixum ad n. 6. qui pro n. 7. ibid. ponitur. (**) Annot. ad pag. 51. 8. Opusc. Anat. Eustach. (i) Obs. Medic. Rar. l. 3. ubi de Renib. Obs. 2. & 3. (k) in Notulis ad Theatr. Anat. l. 1. c. 22. (l) Anthropogr. l. 2. c. 26. (m) Jatrologist. Pentec. l. Obs. 3. (n) Manuiss. Anat. Obs. 32. (o) Annot. g. ad Botall. Obs. Anat. (p) Append. ad Bellin. de Renib. (q) Eph. N. C. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 176. (r) Prolus. de unico reperi. Rene. (s) apud Schenck. Obs. cit. 2. (t) Ibid. Obs. 3. (u) apud Rhod. cit. Obs. 32. (v) Opusc. Pathol. Obs. 60. (w) Syll. Anat. select. Obs. 5. 77. 78. (x) n. 14. (y) l. 4. Obs. Med. c. 38. (z) Obs. Med. Chir. c. 40. (a) Prolus. cit. (b) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 16. (c) De Re Anat. l. 13. (d) Physiol. l. 1. c. 7. (e) apud Schenck. Obs. cit. 2. (f) Hist. Anat. hum. corp. l. 6. c. 23. (g) De Facult. Anat. Lect. 2. (h) Trichias. admir. pag. 89. (i) apud Stæhelin. in Tentam. Med. th. 1. (j) Obs. 32. cit. (k) in Access. ad Boerh. Meth. Stud. Medic. P. 7. Sect. 4. c. 14. (l) c. 26. cit. (m) Vid. Epist. 40. n. 14. (n) Obs. 3. cit. (o) Epist. 25. n. 4. (p) Encheir. Anat. l. 1. c. 28.

aliud, nisi unicum renem memorarunt: ideo verisimile esse, supra dixi, eorum Observationes ad classis primæ partem primam spectasse, non ad secundam, quam, sit licet multo rarior, quasi omnia exempla unici renis complectentem, solam ponebat Riolanus. Quæ de parte priusquam dicam, commodius est, ut secundam classem expediam, ad quam renem non tam pro duobus factum, quam ex duobus, referre debet. Quod ita accipias velim, non quasi negarem, in nonnullis de supra allatis exemplis unum ex duobus renibus videri factum, ut cum duplici & pelvi, & uretre instructus erat, aut quasi contenderem, ex duobus renibus qui primum divisi creati essent, alterum postmodum cum altero, crescente embryone, coaluisse. Nihil enim aliud hic mihi volo quam quod primi obtutus iudicio apparet. Princeps, quantum memini, id vidit Jacobus Berengarius (z). In quodam renes erant, inquit, continui ac si esset unus ren. & habebat duas venas, & duas arterias emulgentes, & duos poros uritides cum uno solo puniculo involvente: qui occupabat loca solita renium, & etiam medium dorsum, quod est in loco inter splenem & hepatis parum infra ea. Eodem ille unus ren spectat ab Rondeletio (a) visus, qui forma lunari erat, ambobus nimirum renibus simul conjunctis, & quem ex Doldio Blasius (b) exhibet, & quem Riolanus (c) ab se inventum describit supra spinam collocatum. ... cono deorsum vergente, cornibus sursum erectis. Nec alio artinere credo conspectum a Piccolhomino (d), nisi quod conjunctio inter superiores partes renum fiebat, ut cum transversus vena cave & arterie magne incubaret, resima illius atque sinuata facies deorsum, gibba vero atque convexa sursum spectaret; qualem & figura, & positi in monstro vidit Ill. Winslowius (e). In exemplis cæteris cornua erant, sicut in illis prioribus, sursum conversa, ut in Th. Bartholini (f), Stalpartii (g), qui apud Nuckium (h) quoque simile asperit, Cel. Halleri (i), Vernouii (k), Petschii (l), & ne de Graffecio, & Bæchio plus dicam, quam quod ex Hallero (m) scio, nempe alterum vidisse renem ex duobus conatum, alterum meminisse renem ex duobus conatum, utque ad Italos redeam; meus olim discipulus Jo. Orontius Azzariti Apulus ad me misit A. 1721. descriptionem, & delineationem unici renis, in quem, cadaver humanum Venetis secans, incidit, cum Bartholinio (n), ad quem maxime accedebat, haud inutiliter conferendi; nam, præter cætera, indicare posse, credo, unde Spermatica arteria oriatur quas Bartholinus scripsit fuisse nullas. Anno autem 1732. Amicus dum viveret, meus, alibi quoque laudatus, Bonazofius (n) renem proposuit ejusdem generis. Ego denique A. 1740. circa medium Decembrem in sexenni puella inveni, & cunctis qui aderant, Præstantibus Viris, & Studiois Adolescentibus in Nosocomio demonstravi renem unicum: quem apud me videre poteris non negligenter descriptum, & pictum, his potissimum a plerisque memoratorum discrepantem, quod lobus dexter a sinistro distabat intervallo non ita magno, & ima parte ille huic imposita, & sulco, nec profundo tamen, & ab anteriore tantum facie quasi divisa; istam faciebat neutro lobo tenuiorem. Francus autem (o) unus, quod sciam, isthmum vidit, & pinxit maxima vasitate, & amplitudine. Cum vero nihil dicat de crassitudine, imo lobos ajat fuisse singulos in ea sede quam renes solent occupare, sicut in aliorum Observationibus fuisse, intelligo, in quibus ut totus ren esset maximus, tenuiori tamen dumtaxat isthmus Spinæ incubabat; nolui hæc exempla cum iis confundere quæ ad secundam attinent, ad quam jam transeo, meæ divisionis partem, illa complectentem in quibus totum renis unius corpus Spinæ imponebatur. Quo renem pertinere illum, censuebam, quem cum Jo. Vasseo Carolus Stephanus (p) conspexit unum tantum renem in medio spinæ exacte situm, eumque maximum, & quem dixerat Andemacus (q) nonnunquam unum tantum medie spine innexum apparuisse. Notissimus est autem qui a Botallo (r) descriptus & pictus, tantus erat, ut ex quatuor constare videretur. Neque ignotus est quem Cabrolus (s) in memorati Professoris servo

unum, sed mole incredibili offendit incubantem vertebri lumborum: quibus inhaerentem pariter vidit unicum & quædam amplum. Cel. Fantonus (t). Eodem referes quem in puella annicula invenit sapius laudatus Hallerus (u). Atque ut redeam ad vetustiores, simulque ad illud propius accedam cuius gratia sum in hunc longum sermonem ingressus; Vesalius (x) scripserat, interdum in habentibus ventrem impenso prominulum, & vitiatum costarum ductum se vidisse unum, eundemque maximum, super vena cave, & arteria magne corpora, renem collocatum. Eustachius vero (y) ejusmodi quidem insolitam renis unici sedem olim, semelque, conspexisse se, tradidit; sed illud dumtaxat recte meminisse, quod medie spine innixus hærebat, & magnitudinis mole numerum supplebat; subiecitque hæc. Verum unicuique tantum renem illis natura præcipue tribuerit, qui & ventrem habet eminentiorem, & vitiatum costarum ductum, fateor me ignorare: hortorque anatomie studiosos, ut diligenter observent, num verum sit, an secus. Ab eo tempore non recordor legisse qui Eustachianæ hujus hortationis meminerit, cum in magnam incidit renem Spinæ impositum, nedum cum duorum loborum isthmum in transversum illac traductum offendit. Imo utroque in casu aut nihil adnotatum reperi in exemplis hæcenus productis, aut cum recte homo valuisset, ferro, laqueo, maligna febre sublatum esse; si Piccolhomini, & Azzariti excipias Observationes, quorum ille malam corporis constitutionem fuisse, indicavit ab isthmo fortassis venam Cavam, & arteriam Magam prementem, eoque utriusque muneri officiente, hic vero ab eadem causa aneurysma repetebat arterie illius, inter appendices diaphragmatis ortum, quod & vertebra: eroderat, & magna demum sanguinis copia in sinistram thoracis cavum effusa, vitam ademerat. Sed isthmus plerumque, ut dixi, tenuior, nisi forte sensim crassescat, aut sanguis, præter modum auctus, subjecta Magna vasa distendat, nocere adeo non solet. Ego cum in puella isthmum reperi neutro, ut dixi, lobo tenuiorem, lobos autem non valde inter se distantes, quippe qui consuetam renum sedem non occupabant, sed ipsis vertebra: lateribus incumbant; non neglegendam mihi Eustachii adhortationem existimavi. Verum nec puellæ abdomen prominens fuerat, nec costarum ductus ab naturali recedebat norma; ut si forte quisquam cum Vesalio voluisset ab insolito illarum antrosum flexu causam deducere, cur lobi ab sua sede fuissent exclusi, nequaquam posset. Quod tamen venter non eminere, minus hic erat mirum, cum ren totus neque esset ex maximis, & parvam tantum sui partem anteriorem haberet impositam vertebra: sedi. Vix autem credo, cum huic sedi, adeo per se prominenti, moles superaddita esset prægrandis unius renis, ventrem non eminuisse. Quin nostrum Plazonum (z) lego eam mulierem in qua ibi ren erat ejusmodi, initio, id est antequam incidere, prægnantem putasse: quod pariter putaturum, sive pariter suspicaturum, fuisse Spiegelium item nostrum fuisse, existimo, si mulier fuisset in quo (a) renem offendit istius femine persimilem. Jam vero per te vides, etiam quod de Plazono loquens modo dicebam, in hac ipsa XXXVII. Sepulchreti Sectione (b) inter falsæ graviditatis exempla relatum sit; id tamen non nisi de suspitione Anatomici, cadaver mox dissecturi, esse accipiendum. Neque enim vivente, & interrogata muliere, imponere pro uteri gestatione potest tumor, non paucis ante mensibus inchoatus, sed a primordiis usque extans. Imponere autem potest ren alteruter, non ab natura, sed a morbo grandior factus, eoque delapsus in hypogastrium. Sic in Matrona de qua in Historia leges Regiæ Scientiarum Academicæ Parisiensis (c) utrum mentiri potuisset a tribus quatuorve mensibus gravidam, præsertim cum mentruus sanguis non responderet, nisi mulieris ætas, & valetudo, quæ mox infecta sunt, aliud fuissent.

De falsâ graviditate hæcenus.

17. Proximum est, ut de Abortu, pressius tamen verba faciamus. Nam ejus Observationes tres jam supra (d) attulimus, cum de graviditate vera pro falsa habita dicereimus: propemodum autem infinitum est illius causas

(z) Hist. de Anat. Ventr. Inf. ubi de Renib. (a) apud Schenck. Obs. cit. 2. (b) cit. Append. Fig. 13. (c) Anthropol. c. cit. 26. (d) l. 2. Prælect. Anat. 22. (e) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1740. (f) Cent. 2. Hist. Anat. 77. (g) Cent. 1. Obs. Rar. Med. 30. (h) Ibid. (i) Opusc. Anat. P. 2. Tab. 6. Fig. 9. (k) Comment. Acad. Sc. Imper. Petropol. Tom. 3. (l) Syll. cit. 5. 79. (m) Accession. ad cit. c. 14. Meth. Stud. Medic. (n) Comment. de Bonon. Sc. Acad. Tom. 2. P. 1. (o) Obs. cit. 176. (p) De diffict. part. corp. hum. l. 2. c. 15. (q) Anat. Instit. l. 1. (r) Obs. Anat. 1. (s) Obs. cit. 14. (t) Diffict. Anat. Renov. 7. (u) Opusc. Pathol. Obs. 59. (v) De corp. hum. fabr. l. 5. c. 10. (w) De Renib. c. 30. (x) apud Rhod. Obs. cit. 32. (y) Ibid. (z) Obs. 3. 5. 7. (a) A. 1732. Obs. Anat. 7. (b) n. 5. 7. 9.

fas omnes, five quæ in fœtu sunt, aut Secundis, five quæ a matris oriuntur morbis, vel enumerando percensere. Horum complurium, a matre in fœtum transeuntium, exempla collegit Fridericus Hoffmannus ea Dissertatione, quæ est de *Morbis Fœtuum in utero materno* univèrse inscribitur, in iis fere subsistit qui a matre communicantur. Nos contra de illis prioribus hic loquemur; nec de omnibus tamen. Sed quoniam supra de placenta vitii quibusdam scripsimus; nunc alia nonnulla ex ipsis quæ aut abortus causæ sunt, aut eundem periculosum faciunt, attingemus. Abortus causam esse posse, non dubitamus, placenta crassior factam, atque durior; nam primum sua aucta mole fœtui uteri spatium angustius reddit, quemadmodum a Cortesio (e) quoque animadvertum est ubi illam docuit aliquando crassissimam, imo & durissimam fieri. Durities autem ineptam reddit officio suo; itaque fœtus, nutrimento orbatus, perit: quod sua scirrhusa placenta Observatione confirmat Abr. Vaterus (f). Fœtu autem mortuo, si placenta restet utero affixa, ex hoc nutrimentum ipsam capere, & sic vel crassior fieri quam antea esset, idem, nec solus, existimat. Sed est vicissim cum propter nutrimenti interceptionem & ipsa, & fœtus mirum in modum extenuatur: quod ut Clarissimus Virorum Hoyeri (g), & Moeringii (h) Observationes ex parte indicant, post sanguinis ex utero profusum, ejeci fœtus macilentus, & iusto minoris cum funiculo umbilicali pene exsucco, aut placenta parva, & quasi exsucca, paucoque sanguine prædita; sic plenius hæc, mecum ab Amico Medico communicata, ostendit historia.

18. Fœtus utero gerebatur, quinto jam mensi proximis, cum matris nuntius subito assertur acerbissimus de instante obitu absentis Viri. Dolore simul, & timore percussa, fœtus motum ex eo tempore primum languidiorem factum animadvertit, deinde nullum. Octavo ex quo amplius hunc non sentiebat, exacto die, abortiit. PLACENTÆ, & mortui fœtus, & umbilicalis funiculi mira fragilitas. Ille albus erat; in hoc vasorum aliquid fere exsuccum.

19. Abortum ob alias quoque causas factum, redire sæpe, & quidem intersecto eodem a conceptione tempore quo prior acciderat, ut puta quarto, tertio, secundo ab ea mense, & ejus tamen reditum per idonea remedia prohiberi, ex Stahl (i) noveris. Ego vero nullum sæpius rediisse memini, quam qui a gravi, & repentino animi affectu primum inductus, sicuti apud Schulzium (k) legi, ad 23. vices rediit eodem semper a conceptione, quo primum contigerat, mense, nimirum tertio, tamen nulla Artis præsidia a Medicis celeberrimis omittentur. Quanta igitur vis sit in ejusmodi animi affectibus, vides. In proposito autem a me casu crediderim, utero, & quod consequitur, ad hunc affixis placenta radiculis accidisse, ut quæ a fœtu, & placenta ad matrem revehebantur, facile transirent; difficile autem quæ a matre ferebantur ad placenta, & fœtum, cum illa, sic animo affecta, nec satis mittere posset nutrimenti, nec satis preparati, nec satis valide uterum versus compulsi eo tempore quo in hoc omnia magis magisque augeri in dies ex naturæ instituto oportebat. Fuit contra cum a repentino mortis frigore contractis cum materno utero extremis placentalium tubulis suspicarer, sanguinem ex sanissimis aliquoties fœtibus reditu prohibitum, & in jecinore, tunc maxime distento, & tenero, coacervatum vim huic attulisse, & in ventris cavum prorupisse. Observationes huc apponam: tu, ut malueris, explicabis.

20. Fœtus a brevi, ut mox intelliges, tempore vacca gerebat, cum, ab infcio hero vendita, fuit maciata. UTERUM, & fœtum secui diligenter, qui palmo non erat longior a summo capite ad caudæ initium. Bene omnia se habebant, nisi quod circum hepar effusus sanguis, nec paucus, concreverat.

21. Fœtus vacca altera gestabat bimestrem, cum pariter ablatione maciata est. UTERO, & quæ ipso continebantur, perfectis, sana omnia offendi, nisi quod fœtus venter ea copia sanguinis effusi distendebatur, ut priusquam aperirem, id ex nigredine conjecerim quæ per tenuem abdomen transpicebatur: jecurque tenerrimum, una ex parte lacerum, unde is effluxisset, indicavit.

22. In provectionibus autem fœtibus num idem accidat, ignoro. Certe ea quæ ex placenta duritie detrimenta fœtui provenire, supra (l) indicatum est, primis dumtaxat gestationis mensibus fuit observata. Fœtus

autem jam validos, & partui propinquos, ii præsertim qui multum alimenti per os tunc sumi, non dubitant, haud facile credent propterea perire, nisi forte placenta fere ex toto dura facta sit, aut aliter suo prorsus muneris inepta. Quæ enim ex causa vitiatam aliqua in parte non semel vidi, ex eadem posse in multo majori parte vitari, non puto, esse dubitandum. Quid viderim, subjuncta Observationes ostendent.

23. Fœtus partui maturus, cujus motum ante biduum quidem perceperat mater, postea autem non perceperat, mortuus editus fuerat. SECUNDÆ cum ipso ad me sunt allatæ sub initium Junii A. 1731. In illis hoc unum quod præter naturam esset, inveni. Cum faciem placenta cavam inspicierem, intra ejus substantiam, duorum a funiculi insertionem digitorum intervallo, corpus transpexi colore ex albo sublavum. Quod secans, compactum vidi ex crassis quasi membranis, quarum alia aliis essent impositæ. Cum majus non esset articulo ultimo mei digiti minimi; satis causæ non est visum, cur ipsi fœtus obitum imputarem, aut eam quam in visceribus plerisque molliudinem, animadverti tantam, ut non jecur modo attractu diffunderet, sed renem quoque tunica incisa, horum substantia pulvis instar rubicundæ se effunderet.

24. GEMINI æque sani, & vivaces, iusto partus tempore nati erant, Junio pariter ineunte, sed A. 1742.

SECUNDAS, quas Mediavia meus continuo ad me perferendas curaverat, diligenter examinans, cum alia quæ hujus loci non sunt, tum hæc quæ sunt, animadverti. Placentarum altera (nam singulis fœtibus singula obtigerant, inter se quod rarius fit, omnino sejuncta; non modo membranarum claustrum erat ut solet mediastino membraneo omnino pariter divisum) placentalium igitur altera haud ita procul ab ora corpus habuit digiti pollicis diametro, a convexa ad cavam faciem pertinens, ut ab utraque pariter conspiceretur. Totum ex alba constabat substantia, inter se ubique simili, nec duriore, quam ipsa placenta. Ex eademque alba substantia in placenta quoque altera corpus fuit, sed in convexa tantum facie, neque majus parvo cicere.

25. Attamen GEMINI ambo æque erant, ut dixi, bene valentes; ut facile intelligeres, nea majori quidem albo corpore quidquam detrimenti fuisse illatum. Si diutius in utero hi permanere debuissent: num forte artificii potuissent ea corpora, aut in eam structuram transire quam in illius alterius fœtus placenta proposui, sicuti an idem genus esset vitii, hic minus, illic autem magis provectum, aut alterum, nescire me, fateor.

Vitium erat certe, quod si ad illud addere volueris, cujus supra (m), quandam fœtum describentes, mentionem fecimus; non uni, præter alios magis in vulgus notos, esse morbo obnoxiam placenta, fateberis. Qui si plurimum se extendat; quin abortus causa, mortisque fœtus esse possit, non videtur dubitandum. Sic enim & scirrhi placenta solent, in quos fortasse animadversa a nobis vitia decursu temporis degenerassent. Abortum enim inde viderunt Cl. Viri Jo. Sebast. Albrechtus (n), & Jo. Justus Fickius (o) fœtum uterque monstrosum, longæque minorum, quam graviditatis initium requireret, cum placenta substantiam Fickius scirrhusam adeo conspexit, ut suo muneri nullo modo par esse jam posset, corruptum vero, & quasi exsiccatum funiculum umbilicalem; Albrechtus autem dissectis per placenta tumores parvos, intus albicantes, glandulis scirrhusis simillimos, interque eos circa funiculi ortum hydatidem, sublateo humore plenam. Ad quem locum Cl. Roedererus (p) quoque vesicam vidit, quæ ejusdemmodi humor continebatur, sed multo majorem, cujus fundum ipsa placenta substantia constituebat, scirrhus molliori plenam. Quoniam autem ab umbilicalis quoque funiculi corruptione, ut paulo ante dicebamus, abortus deductus est; non est prætereundum, posse etiam deduci ab nimia funiculi aut crassitudine, aut tenuitate, aut brevitate, aut longitudine. Primæ, & secundæ causæ exemplum memoratum videbis apud Ruyschium (q), qui primæ, quippe non infrequenter etiam pinxerat (r). Intelligis autem, ut humoris ad embryonem importandi, aut ab ipso revehendi æquo tum major, tum minor copia ipsi est lethalis, ita funiculi vasa iusto aut capaciora, aut exiliora funiculum posse facere aut crassiorum, aut tenuiorum, nec nisi inter ea quæ magna sunt admiratione digna, id ponendum esse quod

quod Ruyschius (s) unus, quod sciam, & semel vidit, infantem vegetum esse natum in cujus funiculo umbilicali tumor erat durus, ex substantia factus partim carnosa; partim heterogenea, pauco humore permixta; nisi forte exterius situs erat, ut premendo, vasa facere exiliora non posset, nec ante postremum gestationis tempus faciem incrementi sumere inceperat. Brevior autem cum est funiculus; tractus per fœtus agitationes, placenta vim affert, aut certe noxam, cujus rei extant Observationes in Sectione hac Sepulchreti XXXVIII. (t). Ad quas eam addas licet, quæ ab Littrio (u) proposita est, funiculi adeo contorti, ut non tenuior modo, sed & breviori dimidio esset factus. Prælongus vero in crebris, variisque fœtus motibus agitationes, placenta in modum aut laquei, aut nodi dispositionibus, ut illum strangulare (x), aut propria vasa contrahere vehementer possit. Hæc enim vi duplicis, artisque nodi, qui non nisi lenta cautaque manu diduci potuit, præclara invenit Cl. Gutermannus (y), egregie consiciens, primam nodi formationem indicatam esse a motuum fœtus immutatione, post hanc autem magis deinceps, magisque auctam, & cum tandem eorum motuum jam nihil omnino perceptum est, nodi artissimam factam contractionem fuisse significatam.

Sed in placenta quoque adaucta in dies noxa, ut puta ob funiculi brevitate, aut propter scirrhum, vitiumve aliud quod in illa plus plusque crescat, idem successuum morus decrementum, quod abolitio denique consequatur, accidere, cum ratio indicat, tum præsertim Observationes confirmant, quarum aliquam in Sepulchreto (z) invenies, alias ex Dissertatione (a) conicere poteris Cl. Petri Stuarti, qui proposita ab se dogmata ex ore Experientissimi Friedli se fatetur (b) accepisse.

26. Nunc placenta vitia quedam alia, unde abortientes periclitantur, attingemus. Sciebat Ruyschius (c), plurimos fuisse Medicos qui ignorantes, mensibus gestationis primis placentas per se quidem esse parvas, sed ob multum plerumque sanguinem concretum, uadique archius adherentem, multo quam revera sint, videri ampliores, has apud eas quæ abortiverant, conspiciat, & fœtum qui ei amplitudini responderet, frustra expectantes, cum is qui fuerat, aut propter exiguitatem non perceptus, excidisset, aut propter molliudinem in nihilum, aut in liquorem abiisset; medicamenta fœtum expellentia, non sine gravi detrimento matri dedissent. Itaque Medicos de hac facili deceptioe censui esse admonendos. Quod nos monitum eo magis inculcandum existimamus, quod præter sanguinem illum adherentem, augentemque, reapse æquo magis crescere placenta ipsam, exiguo fœtu jam mortuo, hæcque tanto facilius oculos elusuro, de Vateri sententia, supra (d) indicavimus.

27. Sed vitium est alterum multo periculosius. Cum enim fœtus immaturus, aut certe eo tempore, si violentia ab sit, non prodituri, placenta, ut suis petiolis acerbata poma, artius plerumque utero sit affixa; interdum accidit, ut sit artissime, idque eo periculo quod hæc Valsalva Observatio satis demonstrat.

28. MULIER annos nata tres & triginta, cum, uterum ferens, ex uno in alterum locum grave quoddam pondus fœmel, atque iterum transfuisset; fœtum quidem septimestrem, an octimestrem parit; sed hunc Secundæ non consequuntur. Postridie febri cum rigore corripitur; quæ semper magis magisque invalescente, paucis post diebus respirationis gravitas accedit. Interea fetida materia e naturalibus exibat cum frustis Secundarum nonnullis. Denique convulsivi motus, & singultus ingruunt: venter valde intumescit, & ægra undecimo a partu die moritur. VENTRE aperto, intestina, & ventriculus flatibus adeo tumida reperta sunt, ut hic quadruplo majus spatium occuparet, quam secundum naturam soleat. Dissecto utero, magna placenta portio occurrit, cujus pars per os uteri propendebat, pars utero arcte adeo affigebatur, ut vix posset, cultri etiam ope, separari. Erat hæc, naturali obscurata structura, indurum corpus, & pessime olens conspitata. Eam autem, cui adhæserat, uteri partem altior inflammatio occupabat, quæ per reliquam etiam illam faciem, sed leviter, extendebatur.

29. Sive ad Infelicem Partum, de quo jam nobis scribendum est, sive ob violentam causam, quæ infantem, eo tempore non exitum, ejecit, ad Abortum Observationem hanc referas; manifestum est, affixam utero pla-

centæ partem mulieri mortem attulisse. Eam autem partem, soluta reliqua, affixam mansisse necesse est vel ob placenta vitium, radicales ibi aut crassiores, aut longiores, aut crebriores utero infigentis, vel, quod eodem redit, ob hujus vitium, artioribus ibi, aut profundioribus, aut confertioribus poris eas radicales excipientis, vel ob vitium aliud aliquod, aut placenta, uterove peculiare, aut etiam utriusque commune. Sed quodcumque id vitium fuerit, quod causa alia aliqua, conatus illos in transferendo pondere confecta, indicata autem a partus acceleratione, videtur auxillis; certe Observatio hæc ut numerum earum adaugere quibus nituntur contententes, placenta nunquam esse in utero relinquentiam; ita Ruyschii quoque affectis, non fecus ac tres quas in Sepulchreto habes Sectione hac XXXVIII. (e), aniam dat ad reponendum, tunc saltem non esse ad placenta extractionem properandum, cum arcte adeo est utero annexa, ut vix possit, sicut in ista muliere, cultri etiam ope, separari: hoc enim voluisse Ruyschium (f), cum ad extractionem decurrendum non esse monuit, si placenta ita firmiter hæreat utero, ut, nisi expertus ipse, nemo crediturus sit, nimirum si ita teneat uterum, ac si illi concrevisset: nec vero ipsi, eumque sequentibus vicissim deesse Observationes gravium detrimentorum, atque adeo mortis, appropriatæ extractionis violentiam confectæ. Equidem non mihi tantum sumo, ut componam lites vetulas, & priusquam inter multo recentiores agitentur, inter nostrates, editis in utramque partem Scriptis plurimis (*) hinc a Monilia, inde a Ramazzino, in longum tempus productas. Hoc tantum dicam, magna pro re nata hic opus esse & exercitatione, & prudentia, ut, quod difficillimum est, in neutrum præceptorum Celsi peccetur (g): satius esse anceps auxilium experiri, quam nullum: (h) nec subire tamen speciem ejus vi occisa, quam fors ipsius interemit. Et vim sane timent Gravissimi Viri, qui post utriusque partis bene perpenas rationes scripserunt, nec assentiantur, nullum unquam sive ab arte, sive potissimum a natura, si prudenter, ac paulisper expectes, auxilium superesse. Quod & ego non semel vidi e sedili in lectulum transeunte puerpera, uterique interea dum paulatim se in ea quiete contraheret, Secundas simul excutiente. Nec aliter ab sola puerpera de uno in alterum locum translatione vidisse leges Cl. Hoyerum (i). Quod si illa versaveris quæ super hac controversia scripta sunt nuper a Medico Experientissimo Andrea Palla (k); cum omnia perspicies magna eruditione, doctrinaque tractata, tum præsertim laudabis ejus prudentia consilia, & monita, in hisque illud (l), ut ab obstetricis sedili in quo jam sessa languet mulier, placenta frustra nitens eliminare, transferatur in lectulum, ut jacentis cor, uterique mox possint quod sedentis non poterant. Sed in illas de quibus dicebamus, nunquam non pertimescendas, ancipitis deliberationis angustias Medicos perperæ adducit improbanda obstetricum festinatio, earum dico quæ, levibus doloribus vix obortis, cogunt parturientes præproperis conatibus fœtum ejicere. Natura enim paulatim omnia & pedetentim ad facilem partum disponens, utri quoque cum placenta nexu, si tempus detur, procliviores ad sejunctionem facit, imo ut conjunxerat, sic ipsa dissolvit: at si non datur, circum addita sanguinis copia magis adstringit. Quem tunc quo imperu non illuc modo, sed & alio compellat, satis ostendit femina illa (m) cui inter partus labores, ex nisu sortiori & intempestivo, rupto plexu Choroide, tantum sanguinis effusum est, ut cerebrum in angustum notabile spatium comprimens, lethalem induxit apoplexiam.

30. Gravi quoque reprehensione eadem obstetrices sunt dignæ, cum adeo properant, ut membraneas Secundas ipsæ perrumpant, quod nisi urgente aliqua necessitate, ut puta si crassitudine, aut duritie ea sint, quæ partum, jam facile alioquin proventurum, diutius, nec sine periculo, morentur, faciendum non esse, manifestum est. Sæpius enim intempestiva aquarum effusione partus non una de causa ex facili difficilis fit. Quid? cum ex difficili impossibilis, & lethalem faciunt, ut quando, viis non satis patentibus vel quod primipara, & provectione ætate sit mulier, vel quod ossium pelvis angustior ambitus, tumoreve obstet aliquis, aut quando fœtu non bene ad exitum converso, ipsa parturientem ad nimios conatus, nixulque adigunt, aut quæ fœtum audierunt validius pellere, uterum in contractiones vehementiores, aut sanguinem certe, & spi-

(e) Miscell. Anat. Dec. 9. Epist. 3. (f) Diff. supra ad n. 11. cit. thes. 10. (g) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 51. (h) Commenc. Litter. A. 1736. Hebd. 21. n. 3. (i) Differt. de Abortu c. 1. (k) Disput. quæ corp. hum. momenta, alterat. specim. expend. §. 14. (l) Thef. Anat. 6. n. 17. (m) Commenc. Litter. A. 1732. Hebd. 30. (n) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 104. (o) De his Vid. Epist. 8. p. 29. (p) Thef. 6. Tab. 2. Fig. 5. & Tab. 3. Fig. 2. (q) Differt. de Fœtu peti. §. 15. (r) Advet. Anat. Dec. 2. n. 10. (s) Thef. 6. Tab. 2. Fig. 5. & Tab. 3. Fig. 2. (t) Thef. 9. n. 3. (u) Obs. 1. §. 7. & 9. (v) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1701. (x) Sepulchr. Obs. 1. cit. §. 8. (y) Commenc. Litter. A. 1731. Specim. 20. (z) §. cit. 7. (aa) De Secundis. Salust. & cit. c. 2. §. 8. (bb) in Proem. (cc) Thef. Anat. 6. n. 17. (dd) Obs. 10. §. 2. 3. (ee) Advet. Anat. Dec. 2. n. ultimo. (ff) De his Vid. Epist. 8. p. 29. (gg) Da accide. 1. 2. c. 10. (hh) Ibid. L. 5. c. 26. n. 1. (ii) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 51. (jj) Ragionamento aggiunto al Disc. int. al Falso di sangue & cit. Consider. 13. (kk) A. N. C. Tom. 1. Obs. 237.

Tenuibus esse videretur. Contra, Duodenum multo amplius erat quam solet, longiorque insuper tractu a dextris vertebrarum se demittebat. Tenuia reliqua obsoleto, & livido colore erant. Mesarai glandulae non exiguae, sed mediocres, sublevi pinguedine, & visu, & tactu percipiebantur. Jecur magnum: in eoque sulci duo, quasi digitis non leviter impressi, a convexa faciei summo, inter se ferme paralleli, non brevissimum ad tractum antrorsum descendebant. Aequo crassior lien, & gibba facie quibuscumque quasi granis subasper, colore autem intus pallido. Uterus denique sinistrorsum inclinatus, totam habuit anteriorem faciem asperam, nec tamen exulceratam; quamvis atro sanguine scdam, totam, inquam, fundi, non cervicis; tametsi uterini oculi corona erat crassior.

39. Nec mihi praeter eas quas pollicitus sum, aliae defuit uteri, in latus alterum, sed a tumore in opposito latere, inclinati, Observationes. Satis autem in praesentia haec sunt quas ad octo addidi, aliis Litteris ad te scriptas, primum ut intelligas, uteri obliquitatem non esse rarissimam, deinde, ut omnibus inter se collatis, nocuas, num sapius illa, quod nonnulli videntur credere, dextrorsum accidit, an haud minus saepe sinistrorsum. Non hic vacat alienas Observationes inspicere. Sed tamen de duabus quas in Sepulchro legisse memini Joannis Riolani alteram (d), alteram Francisci Sylvi (e), illa dextrorsum, haec sinistrorsum proponit. Illud denique, (f) nostris omnibus, facile colliges, quae Ruyschius (g) gravia incommoda ab laterali uteri inclinatione fuisse, credit, dolorem hypogastrii, conatum expellendi frequentissimum, mingendi desiderium continuum, aut certe non satis expeditam mictionem, de his feminas in quibus a me id vitium uteri deprehensum est, non esse conquestas; tametsi in quibusdam non leve id esset, nec defuerit crebra Medicorum interrogatio, quamquam ipsas male haberent. Quin Ruyschiana Icon (g), qua inclinatus uterus exhibetur, non ostendit eam quoque annexae vaginae partem quacum arcte scimus urethrae initium coherere, sic inclinatum, ut oporteret ad mictionis incommoda illa cum Ruyschio inde repetenda.

Sed de obliquitate uteri satis. Rara est contortio ad obliquitatem additae Observatio, in historiis legenda quae in extrema parte sunt laudabilis Dissertationis Rudolphi Jacobi Camerarii (h). Repertus enim est uterus in latus sinistrum ita inclinatus, ut pars fundi anterior versus idem latus simul intorta videretur. Eratque ea intortio, ut mox (i) scribitur, conspicua, & orificium uteri angustando, partum forte simul impendebat, foetus praesertim & pessime locati, & aequo majoris, & in matre parva, eademque obesa. Vides, quot interdum possint infelicis partus causae uno tempore convenire. Sunt vero & aliae, ut cum cervix uteri excrecentia aliqua occluditur, velut in muliere cujus dissectionem Historia exhibet Regiae Scientiarum Academiae Parisiensis (k): aut cum os uteri duritie est ferme cartilaginea, quale in femina annos nata necdum quadraginta deprehendit Praecl. Helmshtadiensis Professor Fabricius (l), & merito, quippe vehementer resistens necessaria in partu dilatationi, inter causas partus difficilis, & praeternaturalis referri, censuit: siue cum funiculus umbilicalis multo brevior quam solet, obstat foetus, exitum sibi molientis conatibus, aut si hi validiores sint, ad praeproperam placenta avulsionem, imo etiam ad sui ipsius abruptionem est aptus. Sic videbis, quanto in periculo & foetus, & mater fuerint, cum funiculus vix 6. transversos digitos longus a Cl. Stegmanno (m) conspectus est. Ex reliquis autem partus difficilis causis, quando prope innumerae sunt, & alia nobis multa adhuc, & varia restant; unam, sed inter illarum praecipuas non infrequentem, hoc loco praestabit attingere.

40. Ea est foetus in utero mortuus. Qui hanc primum difficultatem creat, ut plurimum dubitetur, num revera sit mortuus. Erant olim quoniam facile, ut tristitia docuerunt exempla, in signis quibusdam acquiescerent, & si meconium, exempli causa, per naturalia parturientis deflueret, extinctum jam esse foetum, non dubitarent. Cujus fallaciam signi cum alii alibi, tum ipse multo evidentissime hic cognovi A. 1730. Mercatoris uxor annos nata circiter undetriginta, a triennio ferme loco vini aquam bibens, cum ad legitimum quinquaginta, an sextae gestationis uteri terminum non infeliciter pervenisset, tantam aquarum vim uno atque eodem tempore e

genitalibus profudit, ut omnes mirarentur; non ipsa. Sciebat enim, se multo plus aquae bibisse in hac gestatione, eamque per urinam vias mensis ultimo parcius quam solebat, prodidisse. Illud mirabatur, cum alias aquarum effusionem semper infantes suis cum Secundis illico secuti essent, partusque fuissent felicissimi, tametsi illi omnes intra diem quindecimum vivere deflissent; mirabatur, inquam, nunc post aquas profusas pridie sub auroram, qui dies fuerat XII. Kalendas Martii, alterum jam advenisse diem, neque praeter aequum qui destillare pergebat, humorem, quidquam exiisse; cum ecce eodem mane simul cum eo humore cepit meconium defluere. Quamobrem post meridiem ad me ventum est, ut inviserem, & consilia conferre cum ejus Medico non gravaret. Quem cum audivissem ea facere, & dare cogitantem, unde uteri, qui conquieverant, dolores, conatusque restitutum iri, speraret; ego vero, inquam, primum omnium quaerendum arbitror, an foetus ea figura sit dispositus quae secundum naturam requiritur, aqua, si vivus sit, ne absit, vereor, atque, ut sic verear, meconii exitus facit. Sed quid ait obstetrix? Illa vero, ajunt, in transversum locum censuit, quantum ex materni abdominis contrectatione potuit existimare: Vivum autem esse, mater non dubitat, quae vagientem sibi videtur audivisse. Mittamus hoc, inquam, quod incertum est, de vagitu. Illud vero quod opinionem confirmaret meam; obverso enim ad vaginam posice, & adjacentibus podici partibus forte compressis, potuit etiam necdum respiranti stercois exprimi; cur obstetrix immixtis digitis non comprobavit? Mulier enim, inquam, de passuram id pernegat. Ego vero: quid si opus esse, dicam, manum in uterum inferere, foetumque, si oporteat, in meliorem figuram convertere, extrahere. Quod si illius animus nunc flecti non potest; sic habete; nisi aut obstetrix decepta sit, aut figura quam dixit, in meliorem mutetur, sine Chirurgi tandem opera, sed nimis fera fortasse, non esse infantem proditurum. Quorum alterutrum fuerit, necesse est. Sed utrumlibet fuerit; mutatam postea esse figuram, dixerunt, uterique obortis doloribus, infantem naturali figura, quamvis non sine summo ob magnitudinem labore, in lucem denique editum esse. Illud est certum quod ad institutum sermone maxime attinet, neque ante octavam infestae noctis horam, & viventem adhuc; nam & paulisper postea vixit; prodidisse: id est horis minimum quindecim ex quo, intra uterum haerens, stercois coeperat emitte; ut evidentissime appareat, emissionem hanc fallax esse mortui foetus indicium.

Hac autem retuli, quia inhaerentem adhuc muliercularum, & vulganimis errorem non nisi aliis, atque aliis subinde additis, & inculcatis Observationibus evellam. Neque enim, ut supra indicabam, me fugit, quoties idem fuerit antea visum: quin; ut caetera exempla omittam, ex historiis paulo ante (n), cum uteri contortione memoraveram, laudatis altera tibi praeter ostendit, quincto post ejectionem meconium die puellam esse editam vegetam, & vivacem. Scilicet non modo compressio aliqua, praesertim ventris, quae, foetus corpore male complicato, non difficile accidit, sed & stercois, tunc ferme fluidi, aut major copia, aut acrimonia intestinum irritando, vim potest vincere, modicum eo tempore, sphincteris circumjecti. Quid? quod vis illa non solum ob paralyticum, verum etiam ob summam virium foetus infirmitatem nulla esse interdum potest. Quas vires mox tamen posse, ut post syncopem, refocillato cum matre foetu, magna ex parte restitui, Medicos nunquam obvisci decet, qui nolint vel ab aliis pluribus indicis falli, quae ad mortuum foetum dignoscendum proponi solebant. Exemplo sit nullus in funiculo umbilicali, imo nullus in foetu arteriarum pulsus. Certum quidem est, foetum vivere, si pulsus revera percipitur. Revera, dixi; nam quod Lancisius (o) in summo Procere accidisse, narrat, ut in mortui carpo nescio quis pulsus esse, contenderet, qui nusquam nisi in sui ipsius digitis erat, idem vereor ne multo facilius contingere aliquando possit Chirurgus qui intra calentes mulieris locos digitos ab opere ipso, & quaerendi labore servidos inferuerit. Quam ad vitandam fallaciam eos laudo qui Chirurgum admonuerunt, ut simul perceptorum ab se se pulsuum, simul suorum quos in carpo altero animadvertendos a quopiam curet, numerum conferat, ut si idem sit, falli se, intelligat; sin contra, non falli. Verum et si

et si id quod diximus, certum est, non tamen continuo sequitur, si pulsus nullus sit, foetum esse mortuum; languere enim maxime tunc vires possunt, sed mox redire. Extra uterum autem propendens funiculi, aut artus nec pulsus nullus, nec frigus, nec livor satis signi dant infantis extincti; nam intra contracti uterini oculi angustias ita contracti esse possunt, ut, si artum vel gangraena corripere incipiat, ab eoque cuticula abscedere; periculum quidem summum in quo vita versetur, manifestum pateat; vitam autem jam profus defuisse, pro certo non pateat. Sane Uratislaviae et si viderem, & frigidum erat propendens infantis brachium, ut, tanquam procul dubio mortui, amputandum judicaretur; ipse tamen tertia die vivus editus est (p).

41. Attamen ubi aut ipsa evidentium causarum, & rerum series, aut pleraque, & constantia quidem, aut graviora signa, ut cuticulae capite facillima abscessio, humor ex utero destillans cadaveris odore, & signa alia sunt istiusmodi, ubi haec, inquam, Medicos, Chirurgo vel peritiores illic adduxerint, ut unanimi confessione infantem esse intus emortuum, censuerint; altera se obicit difficultas, num manibus continuo educere, an aliis uti antea auxiliis praestet. Memini, cum Bononiae Medici studiis operam darem, duabus illustribus Matronis uno eodemque anno accidisse, ut parere non possent, & cum utriusque foetus conferretur mortuus, ex altera Chirurgi manibus cito detractum, ex altera autem expectatione, & clysteris praesertim usu emollientis simul & stimulantis, fuisse ejectum, priore illa paululo post mortua, hac servata. Qui utriusque Medicus fuerat, Vir doctissimus est rationes proferret, cur in illa sibi fuisset propterandum, in hac expectare licuisset; tamen non parum ex servata laudem, atque ex non servata notam retulit, injustam ut opinor, sed tamen apud non ignobiles etiam Medicos, & Chirurgos. Et quamquam minime dubium est, quin pro alia rerum conditione aliter agendum sit; vix tamen, nisi ex concordia Spectatissimorum Medicorum sententia egeris, omnem in ancipitis auxilii usu reprehensionem effugies, praesertim si forte, ut in hoc, prudentis exercitatieque Chirurgi copia desit. Neque enim satis est matrem servare; videndum est insuper, nequid uterus detrimenti capiat. Consultum fuit annis superioribus pro generosa Muliere, quae cum post quatuor felicissimos partus opus habuisset in quincto Chirurgi manibus, qui cum pedibus prodeuntem infantem protrahere posset, atque adeo deberet, iis introsum repulsi, dum in caput vertere, & hoc arrepto educere tandem studeret, mulierem, delicatam aliquam, tandiu, & tam violenter vexavit, ut non modo inflammatoria febris, quae pene ad interitum perduxit, sit concitata; sed & tribus infectis partibus infantes nunquam caput, sed brachium semper exerentes, se obtulerint, ob virum, ut credibile est, certa parti ipsius uteri illatum ita ut non ex aequo ab omnibus partibus illos sustentando, aut expellendo, figurae perverse causa fuerit. Quo magis, si nihil est quod properare cogat, & bona parus emortui figura sit; parturientis spatium, naturaeque dandum esse; arbitror, quo hac parienti conatus, doloreque incitet, illa vero simul collectis viribus conitti possit: quos nixus utile interdum est eaus peritissimae manibus ventri impositis nonnihil adjuvare. Sed quia natura aliquando aut in iis doloribus movendis segnior est, aut non eos quos vellemus, sed convulsivos potius, nostrosque proposito adversos movere; nostrarum erit partium hos tempelive sedare, illos, si reapse tamen id possumus, promovere. Ad parturientem accersitum esse me, memini, quae malis, quos dixi, doloribus jam diem unum atque alterum vexata, neque somnum poterat capere, neque alimentum quidquam retinere, sed vomitu omnia coquebatur rejicere. Ei igitur priusquam vires profus collaberentur, cum dimidiatum opii granum dedissem; simul retineri alimentum cepit, simul sunt dolores illi sedati; ut mox legitimis doloribus advenientibus, osculoque uteri, quod priores contractum servabant, recluso, puer feliciter editus sit. Sic autem agendo, non Deventerii (q) solum, quod tunc sciebam, sed & eximii Medici Richardi Meadii (r), id quod nunc video, viam tenuisse me, gaudeo. At segnior natura in altero quidem, de quo dicebam, casu, ad id accommodatis clysteribus atque abdominis inunctionibus primum quoad ejus fieri sic potest, adjuvanda est; tum si haec satis non faciant, aliqua de eodem genere propinando quae naturam invitant potius quam acrius, nec sine periculo stimulent, aut certe agitent. Rideas fortasse, si id narrem quod in vico agri Patavini annis Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

superioribus accidisse, de certis auctoribus cognovi. Parere non poterat mulier. Chirurgus ejus vici oleum leucon lutei vulgaris ad uncias quatuor mittit, quo videlicet, ut solet, abdomen inungant. Rustica quae adstant, imperite mulieres ad portum credunt esse missum: itaque continuo dant bibendum. Sic illa parit. Hoc casu edoctus Chirurgus ejusdem cheyrini, ut in officinis vocant, olei tantundem tribus, aut quatuor aliis quas par urgebat difficultas, eodem exitu propinavit. Hinc Patavii nota mihi femina datum est, quae mortuum ejicere infantem non poterat, & sic quidem infantis caput aliquanto magis descendit: quamquam ob nimiam magnitudinem cui pelvis imus ambitus par non erat, sine Chirurgi auxilio prodire non potuit. Leucon quidem illius flores ad menses, ad foetum, ad secundas promovendas a Medicis datos esse, notissimum est. Sed oleum in quo iidem flores macerati fuerint, propinatum esse, non memini: nec mirum, cum tot minus injucunda extare in eundem usum putentur. Attamen haud profus inutile fuerit hoc quoque memorasse, si forte oleo quis credat aut leucon vim, qualis ea cunque sit, temperari, aut potius cum hac exeritur, opportune simul leniri, si quid, ut in convulsivis doloribus paulo ante ostendimus, leniendum est.

42. Quod supra (s) expectari posse diximus, nisi quid urgeat, sic potissimum, accipias, velim, nisi putrescentis foetus apparere signa incipiant, quae citius adveniant ubi jam aquae ejectae sunt; per disruptas enim membranas ad mortuum corpusculum aer subit, corruptionem illam afferens, quae ut serius plerumque, & sine acutis parentis febribus ea foetum cadavera invadat quae extra aeris contactum sunt, ex historiis intelliges quae diu antea conceptorum foetuum officula referunt sive per abdominis abscessus, sive per anum ejecta, matre ut plurimum salva. Quae historiae ex quo suam Albulas (t) protulit, ad eum numerum excreverunt, ut cum illas non unus collegerit, nonnullae desiderantur, quae addi poterant, plures autem desint, quae tunc non extabant. Ex illis est, ut opinor, quam ex propria Observatione habita A. 1667. vulgavit Dominicus de Marinis (u), cujus foetus cranium per matris podicem, ut reliqua ossa, excretum afferebat Guilelmus Riva. Ex his autem quas memoria nostra vel sola Italia obtulit, sunt certe non paucissimae. Nam; ut foetum praeteream quem e Recto mulieris intestino a se extractum, ad me, ut inspicerem, misit Chirurgus indastrius Venetus Nicolaus Patuna, quo de foetu ipse (x), & Santorinus (y) scripserunt, idem Santorinus (z) foetum, in Patavino agro fortasse etiam nunc viventem, commemoravit, quae foetus ossa per eandem excluderet viam, tum Vir Cl. Franciscus Seraus me per litteras Neapoli datas sub finem A. 1739. certiorum fecit, indidem excreta fuisse ab alia muliere non ita pridem infantis officula. Ex abdominis autem abscessibus hoc nostro saeculo educta Brixiae, & Verceilis foetus aliorum offa Vallinerius noster (a), & Cel. Fantonus (b) tradiderunt. Facile aliae fuerint aetate hac apud nostrates ejusdemmodi Observationes, quarum aut notitia ad me non pervenerit, aut si pervenit, in praesentia non meminerim. Sed quoniam nihil in Re Medica ferme est quod exceptionibus non sit obnoxium; ideo quae de putredine paulo ante dixi, si aer non subeat, serius; si vero subeat, citius, & periculosius adveniente, ea plerumque, non semper, vera esse posui, tum aliis, tum duabus Observationibus adductis, uno eodemque anno editis (c) a Viris Cl. Reusnerio, & Nebelio. Alter enim foetum proponit quinquemultrem utero mortuum, eumque, etsi ob retentas simul Secundas, & aquas aeri aditus non patebat, tamen post viginti, haud amplius, hebdomadas exclusum teteritimo cum foetore. Alter vero maturum foetum legitimo tempore prodire conantem, sed post aquarum effluxum, sui interitus signa tanto certiora praebentem, quod proximis hebdomadis foetidus & sanguinolentus ichor cum membranarum, fibrarumque carnosarum frustulis per muliebria effluebat, denique in skeleton abeuntem, ut crepitus ossium audiretur quotiescunque mulier corpus antrorsum, aut retrorsum flectebat, nulla tamen, quae memoretur, febre, aut gravi alio incommodo conflictata, imo jam per tres annos ossa illa in utero gestans circa sanitatis dispensium. Utinam vero sicuti emortui tot, praeter eos quos commemoravimus, partus intra viventes matris ventrem diu Sepulchrum habuerunt; ita plures vivi ipsi una cum mortua matre non humarentur aut satis tempore ex ejus cadavere eruerentur. Verum dum

(d) Sect. hac 38. Obs. 9. §. 8. (e) Sect. 10. libri huius 3. Obs. 28. (f) Cent. Obs. Anat. Chir. 88. (g) Ibid. Fig. 69. (h) Sp. cin. Experim. circa Generat. Hist. 1. (i) in Schol. (k) A. 1705. Obs. Anat. 7. (l) Progr. Acad. edit. A. 1730. M. Januar. (m) Eph. N. C. Dec. 3. A. 4. Obs. 113. (n) N. 39. (o) De Subit. Mort. 1. 1. c. 16. a. 8.

(p) Eph. N. C. Cent. 3. Obs. 57. in fine. (q) 1. supra ad n. 31. cit. c. 17. 26. 50. (r) Monit. Medic. c. 19. Sect. 5. (s) N. 41. (t) Chirurg. 1. 2. c. 76. (u) Differt. de re monstruosa per urinam excreta. (x) Relaz. int. al. cadav. d'un Feto, & cat. (y) Infr. d'un Feto & cat. (z) Lib. n. 31. (a) Historia della Generaz. P. 2. c. 17. a. 19. (b) De Obs. Med. & Anat. Epist. 7. (c) Eph. N. C. Cent. 5. Obs. 12. & Cent. 6. Obs. 52.

Prosector quæritur, dum accersitur, dum venit, sæpe ii qui vivebant, debiliores præsertim, infantes moriuntur, frustra mulierculis, virisve etiam plurimis, æque ac ipsæ, rudibus, & inscitia plenis, interea dum ille veniat, ut matris os apertum servetur curantibus, quando potius cum aliqua utilitatis spe danda opera esset, ut interea parentis corpus, & venter potissimum, calens servaretur, ratione id præmonstrante, & Stalpartii filii (d) in canis fetibus experimento comprobante. Membranis enim involutos cum in aquam tepidam immisisset, etiam post aliquot horas pulsus eorum invenit. Quin ex illustri in Silesia Matrona (e), ante horas quatuor jam mortua, adveniens tandem Prosector, inciso abdomine, uteroque, viventem extraxit puellum, cum interea usque ad illius adventum jugiter foribus spiritibus, balsamo embryonum, vinique generoso aromatico cum calcitratis calidis extindæ ventrem fovere non omisissent, inde minime deterriti quod nullum in utero motum perciperent, ut opinor. Neque enim Observationis scriptor hæc continuo subiecisset, quæ sæpenumero sunt vera: *Vixit enim ut plurimum fetus, quamquam non semper aperte moreretur.*

43. Satis de parturientibus. Nunc perpaucæ de puerperis quod addamus. Pertinet huc Observatio quam pridie Idus Augusti A. 1707. cum Doctissimis Amicis Venetis, Santorino in primis, habuimus, & de qua non semel in Adversariis IV. (f) mentionem injecimus. Nunc totam accipe.

44. MULIER hysterica affectionibus obnoxia, & faciei colore illauidabili, aliquot liberorum mater, cum uterum novissime ferret, præsentit, partum proximum sibi exitiale futurum. Et reapse inter parturiendum coepit digitis, & abdomine intumescere: mox autem cum puellam peperisset pueri loco quem speraverat, & propter spem nonnullam quendam multo maluisse, idque ipsi de industria ab assidentibus mulieribus occultatum, maritus per imprudentiam revelasset, tanta animi ægritudine correpta est, ut illico pulsus deficeret, corpusque frigeret. Tunc hora vix erat ex quo puellam ediderat, neque præter aliquam membranarum partem, quam sana & vitalis puella secum traxerat, quidquam Secundarum prodierat, siue quod placenta arctius adhereret, siue quod obstrictrix naturæ opem expectandam censuisset, ut quæ neptem meminisset suam olim resistantem placentam feliciter ejecisse decimo jam a partu die. Cum igitur neque pulsus, neque calor redirent, intra scilicet horam ex quo hi defecerant, mors supervenit, non intermissa, quod in eo pulsuum defectu miraberis; ad ultimum usque vitæ extremum confueto sanguinis ex utero effluxu.

CADAVER incidimus hora ab interitu vigesima quarta. Cujus ex ore, & naribus multa, & grave oleus aqua effluebat. Ventris tumor erat tantus, ut majoris, ne in asfictis quidem, a nobis visi recordemur. Qui, peritonæo inciso, non nisi parum subsedit; fiebat enim tum a ventriculo, & intestinis, aere mirum in modum distentis, tum ab utero his subjecto, qui rotunda sui mole totam pelvim non tenebat modo, sed excedebat. Hinc cum omnibus quæ ad ipsam attinent, partibus priusquam excideremus, effusam in ventris pelvim cruentam aquam animadvertemus. Antea autem vasa quæ sub femina cute prope genitale sunt, oppleta sanguine animadverteramus: & pubis ossa quæ junguntur inter se, cum ante sectionem digito tentata, densissime, aut certe laxissime conjuncta viderentur, reapse, junctura vix cultro attackta, alterum ab altero discessisse, humore aliquo prodeunte. Nec dissimilia, cum mox juncturas ossium ilium cum Sacro examinarem, videre nisi sumus; ut non longe a vero abiisse crederemus, qui non solum primiparis, sicut Hippocrates (*) docuit, sed & aliquando, etiam in partu non valde laborioso, coxendices disparari, tradiderunt. Excisum uterum attollentes, prægrandem concreti sanguinis massam per vagina orificium effundi, conspeximus. Nympharum vix quidquam apparuit, an quod in partu cedentes, ne proxima cutis laceretur, se extendant, brevi post tempore ad pristinam formam redierunt? Sic Fabricius noster ab Aquapendente (g) priusquam in Virgine membranam incidere occludentem illud orificium, maximeque impositi sanguinis vi distentam, nymphas ferme nullas apparuisse, adnotavit, quas mox, illa membrana incisa, sublatæque tensione, efformatas, conspexit. Ex quibus, si a partu res semper ad eundem modum, ut indicat Dionysius (h), se habet; unum ex nympharum usibus conjicere cum eo potes. Dum exteriora spe-

ciabamus, lacunas quas in Primis Adversariis (i) anno superiore proposueram, Amicis ostendi, subalbum, quali in ea femina, neque ita paucæ, abundabant, humorem exprimens. Mox etiam lymphæ ductus uteri animadverti, & demonstravi, quemadmodum & lutei corporis in teste altero structuram. Sed de his, & de Teretibus uteri vinctulis quantam, ob vasa quibus magnam partem compinguntur, sanguine distenta, crassitudinem haberent, & de utero ipso quibus ex fibris, sinibusque constaret, & his, valisque sanguiferis exterioribus quam amplis, tum de uterini osculi amplitudine, nec minori cervicis, quam fundi ipsius dilatatione, creberrimis denique in illo osculo, imaque cervice mucosis glandulis; de his, inquam, omnibus satis in Quartis Adversariis (k) scriptum est. Nunc si quid ibi non habuit locum, est abiciendum, ut illam, quemadmodum promissi, jam totam habes Observationem. Telsis uterque non sine aliquo in superficie foraminulo conspectus est, per quod tenue specillum intro admittebatur. In illo autem eodem teste, in quo luteum corpus, subrotunda fuit ossæ cellula, in hujusque cavo cruentus humor. Tubæ longiores quam alias solent. Vaginæ parietes extenuati, ipsaque multo quidem latior, sed nihilo brevior, rugis autem dumtaxat aliquot, urethræ corpori glandoso respondentibus. Uteri osculum ex rubro nigrescens, & alicubi laceratum. Nullæ intra cervicem extantes chordulæ, neque membranulæ. Supremo uteri fundo placentam sic adhæsisse, ut tubæ utriusque orificia obtegeret, manifestum erat. Eademque etiam tum, ex parte, adhærebat. Sed qua adhæserat, ibi jam valde contracta erant uteri oscula; qua adhærebat, ampla quantum in illis Adversariis dictum est, verissime, ut cætera: quod ideo hic confirmo, ne quibus in talia necdum incidere datum est, paradoxo alio forte quam Græci voce hac uti consueverant, sensu videantur. In sinibus quibuscumque illa oscula communicabant, nihil erat sanguinis.

Thorax denique; nam caput non attigimus; pulmones habuit; si posteriora excipias in quæ sanguis ob supinum cadaveris positum, ut solet, descenderat; totos ex albo foede viventes. Cor supra quam dici possit, flaccidum, nihil fere sanguinis in auriculis, dexteroque ventriculo, nihil autem prorsus in sinistro continebat.

45. Multum quidem sanguinem ob placentam ex parte solutam, per uterum effluxisse, non negaverim; copia autem exiisse tanta, ut is effluxus mulierem occiderit, dubitari fortasse potest. Nam neque de ea copia quærentibus nobis ab iis quæ attulerant, feminis affirmatum est, & vasa quædam ut legisti, sanguine etiam post mortem erant distenta; non fere sanguine vacua, ut Cl. Tabarranus (l) in mulieribus invenit, paucis post partum horis profusio sanguinis extinctis: tum pulsus, & calor non paulatim antea, sed tunc repente atque omnino defecerunt, cum res puerperæ molesta ac gravis narrata est; nihil enim ejusmodi eo tempore audire convenit feminas, minusque illas quæ, hysterica affectionibus obnoxia, proclives nervos habent ad convulsiones, quæ si viscera nobilia corripiant, inferiores facile perdunt, ut mulieri accidisse, leges, quæ a prægressis laboribus, & ab difficili partu laissa, mox post ipsum, inter loquendum, repente præter omnem opinionem convulsa mortua est, cum aliam nallam Cl. Jo. Sebaſt. Albrechtus (m) suspicari causam posset, nisi molestum eo tempore nuncium a puerpera auditum. Neque aliter feminæ hujus nostræ mortem accidisse, iis omnibus Doctis Medicis visum est qui cum ea quæ relata sunt, mecum audivissent, tum cadaveris dissectioni interfuerunt. Tu vero priusquam judices, illud etiam attendito, quantum in tumorem, & hunc flatulentum mulieris venter increverit. Habes autem vel Sectione hac Sepulchreti XXXVIII. quasdam Observationes quibuscumque nostram conferas. Primum V. quæ per incuriam sub numero quoque XIII. repetita est, feminæ, cui mortuæ decima a partu hora totus venter fuit flatibus tumens. Sed quoniam ejus uterus gravis plenus, & multæ vacuationes memorantur, non secus ac ab Eustachio (n) in puerpera illa Romana copiosus sanguis excretus, in qua renum propria membrana ab inclusis flatibus fuit adeo distenta, ut magni tumoris speciem primo intuitu referret; at tu Observationes IV. & IX. leges ex iis quæ in Appendice adjiciuntur. Neutra hæc morrhagiam; sed utraque intra non nimum a morte tempus ventrem flatibus supra quam dici possit, tumidum factum proponit. Quod si mulieres istas dum parturirent, non postquam pepererant, mortuas dicas, earumque primam jam putridum utero fetum gessisse; vide, quæso, ut

Hof.

Hoffmannus (o) tametsi inter prævias causas abdominis inflationem nimias sanguinis profusiones, etiam in partu, reponat, mox tamen istam inflationem ob contrariam causam mulieres obnoxias faciat, ut si lochiorum fluxus non rite successerit, aut cohibitus omnino fuerit. Quæ non attingo, nisi ut memineris, tumoris ejusmodi ventris causas esse plures, & inter se discrepantes. Ex his tamen quæcunque in femina hac nostra fuerit, si historiam releges, jam fuisse, nosces, priusquam sanguinis profusio facta esset; mulier enim coeperat antequam pareret, digitis, & abdomine intumescere. Illi quoque mulieri de qua scripsit Phil. Jac. Hartmannus (p), proximis ante partum diebus a flatibus intestina tumeant, qui tumor a partu, tametsi nullum sanguinis profusum, imo lochiorum esset remora, usque adeo increvit, ut Coli præsertim intestini superior, & inferior tractus filio tres partes unæ longo vix posset comprehendere; itaque ima ejus pars sphacelo correpta, & rupta ventrem fetidissimis foribus opplevit, feminamque secundo a partu die sustulit: cujus utero intus per omnem superficiem placenta reliqua hærebant, digito facile avellenda: in cervice autem ipsa cruor hæsitabat. Verum ne de iis solum quæ præter naturam in descripto a nobis cadavere occurrerunt; sed de aliis etiam, quæ ut totam hic haberes historiam, omissa non sunt, aliquid simul attingamus; utinam ne apud Confarinatorem, non paucis infuturo suo necessarii libris carentem, sed apud Antonium Sidobre (q) Viri Doctissimi legissent omnia quæ cum ipso de lacte uteri ductibus communicaverat Chyrcus; non enim facile censuissent, eosdem esse ac quos ego lymphæ ductus in puerpera hac vidi. Optasem pariter, ut qui hos ab Ruyschio, aliisve conspectos dixerunt, illius locum, & annum quo viderint alii, diserte indicassent, quando ego quo tempore, & quibus ostendissem, non reticeram (r). Qui post me conspexerint, scio, inter quos animadvertas velim, doctum quoque Stehelinum (s) in distento utero vidisse, feminæ videlicet gravidæ. Sed qui muliebri utero ex vero, non ex bestiarum anatomicæ appinixerint, necdum pro certo scio; ut non mirer, si Illustri Viri Heistero (t) vasa hæc, hæc, inquam, ut humano adhuc utero appinguntur, ficta esse videantur. Quod autem ad ossa attinet pubis, & ilium, non puto, ex illis te esse, qui rarissime in partu accidere, contendunt, ut eorum junctura ita laxa uti a nobis conspecta sunt, deprehendantur, & cum illi accidit, rachitidis potius, lui veneræ, aut cachexiæ, & huic quidem in majori gradu, imputandum. Sed puerpera certe nostra, quamvis non bono esset faciei colore; neque cachexia, in majori præsertim gradu, neque ullo ex aliis illi morbis afflicta: nec mihi affinis Matrona ullo omnino ex iis laboraverat, quæ cum in puerperis de dolore ad juncturam ipsam ossium pubis querebatur, & cum propterea a me locum tangi, Maritus voluisset; distans manifeste alterum ab altero tunc habebat; extra puerperiam non habebat. Et cum prope innumera hujus generis extent Observationes, quas est multi collegunt, quasdam, si recte memini, omiserunt tamen, & nominatim Veslingii (u) illam, quando in parturiente pelvim levem impulsu cedere ac vacillare percipiebat, ossibus tam sub pube, quam ad latera ossis sacri, pollicis minimum spatio diducis: quem digitum Santorino (x) quoque facile fuit in recentibus quibusdam puerperis inter pubis ossa indere: cum igitur tot extent Observationes; præstatne credere, in cunctis morbos illos fuisse accusandos, præsertim cum qui illas scriperunt, eorum nullam mentionem injiciunt? an cum diductio seu major, seu minor non modo non rarissima sit, sed frequens, nequaquam præter naturam esse? imo in quibus sit, ab hac fieri; si enim sensum, & sensum tollitur, & partum, quo ad ejus fieri potest, juvat. Noli enim existimare, ad hunc esse inutile id quod pelvis angustias amplificat; nam quæ proferuntur pelvis dimensiones, quasi ad fœtus transitum sine ulla ossium diductione sufficerent, sumptæ videntur in seculo, cum mentio fiat nulla tot partium quæ inter nuda illa ossa, & transeuntem infantem sunt interjectæ, & ne utri quidem, cujus tunc osculum ad vagina orificium descendit: quæ partes ut in multis illas dimensiones haud satis imminuant; at in multis contra imminuere valde possunt. Sensum autem ad laxitatem juncturas in his disponi, ut cum Pineo in Adversariis (y) indicavimus, cum in gravidis nonnullis admoto ad juncturam ossium pubis digito percipiendi occasionem habuimus, tum hæc recentiores, confirmatum per dissectionem vidi-

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

mus a Cl. Exup. Josepho Bertinio (z) duarum mulierum exemplo, alterius quadrimestrem, alterius septimestrem fœtum gerentium; cartilago enim inter ossa pubis & solito crassior deprehensa est, & unctuofo humore imbuta in earum utraque, sed in secunda præsertim, in qua etiam sine ferro, sed levi manus auxilio alterum os illi ab offe sacro plane dirisum est. Quam in gravidis inchoatam, in parturientibus auctam, sicque in puerperis sæpe animadvertam juncturarum pelvis constitutionem si graves Auctores attendissent; non facile, ut opinor, harum diductionem ponentibus objecissent, a lanionibus vix posse illas diffingi, aut duos robustos homines hinc, & hinc trahentes, ne summa quidem vi ossa pubis diducere valuisse. Nec vero id mirum; neque enim ita erant ut in puerperis, disposita. Sane & eorum ingenium laudo qui multis subnixi argumentis, diductiones istas ut impossibiles oppugnaverunt. Sed quod toties conspectum est, id fieri non posse, inutile est probare velle rationibus, quas frustra nemo dissolvendas suscipiet, cum satis superque sit eorum omnium qui rem viderunt, & iis qui aderant, ostenderunt, testimoniis certissimis statim refellere.

46. Sed puerperas morbi non modo celeres, velut is de quo novissime dictum est, aut quem apud Cl. Henricum Sandenium (a) ex sesquipalmarum parietum uteri crassitudine, vel potius ex ea quæ non ita rara, imo non infrequens causa est, nempe uteri sphacelo in una atque altera descriptum videbis a Cl. Jo. Henrico Fuchio (b); non modo, inquam, puerperas morbi celeres, verum etiam lenti extinguunt: nonnunquam longo post partum tempore, imo donec vixerint, male habent. Ut lenta febris ex testis, tubæque abscessu puerperam abstulerit, aliis a me Litteris (c) scriptum est, ostensumque simul, qui fiat interdum, ut ab laboriosa uteri gestatione, partuque difficili ea particula magnum detrimentum capiant. Ut vero ejusdem gestationis tempore ab utero, visceribusque aliis compressum, eoque aliquando inflammatum omentum in oblongum, & ferme scirrhum tumorem conformetur, qui a partu, ut mihi quoque occurrit, in nonnullis restat, easque dolore nonnunquam, incommodo autem aliquo semper afficit, Ruyschius (d) docuit, & ante ipsum indicavit Bauhinus (e) cum scripsit, nonnullis post partum circa ventris medium collectum omentum remanere, ita ut non leves dolores (quod tamen, ut dixi, non est perpetuum) perferant. Et hi quidem acerbissimi, & pertinacissimi post partum in illa fuerant, quæ longo tempore iis conflictata, & tandem confecta (f), omentum habuit contractum in funis modum. Sed vesicæ, & uteri fundo sic accreverat, ut cum doloribus ea conjungerentur symptomata, ob quæ hysterica aliis, aliis calculosa visa fuerat. Huc adde non dolorifica, sed permolesta, alia mala, a minus felici partu relicta, claudicationem, uteri prolapsum, urinæ incontinentiam, de quibus sermo in aliis Epistolis; & in hac ipsa (g) ex parte habitus est. Denique; omnia enim quæ huc attinerent, enumerare non est animus; hemorrhoidas in ore matricis, id est ad vagina orificium a Celso (h) olim, & ab Auctore libri quem Galeno quondam tribuebant, de Cynecis memoratas, jure meritoque Arantius causam habere fere difficilem partum, tradidit eo capite (i) quod de hemorrhoidum illarum noxis, causis, signis, & curatione conscripsit. Paulus autem Barbetus (k) addidit, quibus indicis sanguis ex ipsis fluens a menstruo internoscatur.

47. Postremo partus infelicitas non in matre solum, sed etiam in edita prole spectanda est, siue hæc mortua qua de re supra dixi, siue monstruosa insuper exeat, siue demum vivens quidem, sed aut monstruosa, aut gravi alio vitio affecta nascatur. Primum igitur de Monstris seu mortuis, seu vivis editis, quædam proferam, minus ad controversiam quæ de eorum origine a Viris Doctissimis hoc sæculo agitata est, quam ad Observationes ipsas spectantia, ab hac Valsalvæ initium ducens.

48. MONSTRUM, ut vulgo videbatur, bufoni similis, mater sæpius antea filios nunc mares, nunc feminas promiscue pepererat, illos omnes undique sanos, has autem, quæ duæ fuerant, quarum altera tunc annum agebat XIII. altera paucos annos vixerat, fardas ambas, & quod consequitur, mutas. Novissime cum ante octo circiter menses concepisset; toto autem hujus gestationis spatio semper morbo jacuisset, & præ mœstitia sæpius flere consuevisset, fetus autem motum si cum aliorum motu quos antea ediderat, conferret, adeo languidum animadverteret ut interdum ferme crederet mortuum; eo quo

(d) Exercit. de Nutrit. Fort. §. 41. in fine. (e) Eph. N. C. Cent. 3. Obs. 57. (f) Animadv. 26. 27. 29. 33. 45. (*) De nat. pueri n. 43. (g) De Chirura. Operat. uni de Hymene imperior. (h) L'Anatom. de l'homme Démonstr. 4. Sect. 2. (i) Tab. 3. (k) Animadv. supra ad n. 33. indicatis. (l) Observ. Anat. n. 30. (m) Act. N. C. Tom. 4. Obs. 50. (n) Traité de Reub. c. 45.

(o) Medic. Rat. Tom. 4. P. 4. c. 15. thes. pathol. c. 8 & 15. (p) Eph. N. C. D. c. 3. A. 9. & 10. Obs. 102. (q) Traité de Variol. c. 7. (r) Auct. Anat. IV. Animal. 43. in fine. (s) Tentam. Med. P. 1. Thef. 6. (t) Comp. Anat. n. 236. (u) Epist. 25. (x) Obs. Anat. c. 11. c. 4. (y) III. Animal. 15. (z) Quæst. de hoc argum. Propositio Præfide Bouvart. n. 5. (a) Observ. de Prostat. Uter. §. 14. in fin. (b) Act. N. C. Tom. 2. Obs. 155. (c) Epist. 46. n. 27. & 28. (d) Cent. Obs. Anat. Cher. 63. (e) Theat. Anat. l. 1. c. 12. (f) Eph. N. C. Dec. 3. A. 4. Obs. 7. (g) n. 33. (h) De Medic. l. 6. c. 18. n. 9. (i) §. 6 in l. de Tumor. p. n. (k) Anat. Præf. l. 4. ad fin.

eo quo diximus tempore femineum foetum in lucem emiit, Secundis quidem praeditum naturaliter se habentibus, sed aspectu monstrum adeo, ut bufoni potius, quam puella, similis, si inferiores excipias artus, infimamque ventris partem videretur. Primum erat parvus, ut longitudine palmum non aquaret, sed hoc tanto brevior esset, quantus est transversus digitus pollex. Deinde collum omnino deerat, ut mentum contingeret medium pectoris, imo vix digituli intervallo distaret a cartilagine Eniformi. Tum oculi quidem perfecti erant; sed auriculæ multo inferius quam soleant, collocatae, summos humeros tangebant: os hians nasus erat ad superiora imperfectus; nam hujus radix, & frons tota deerat. Ad hæc, abdomen quasi in marsupii ejusdem modum protuberabat deorsum propendens, in cuius marsupii medium umbilicalis funiculus, secundum naturam constitutus, se se inferebat. Denique artus superiores ita sterni annectebantur, ut extendi non possent. In posteriore autem corporis facie Spina in tres quasi gibbos distincta cernebatur, quorum summus capiti, medius thoraci, infimus ventri respondebat. Hæc exterius. ABDOMINIS autem diffinitione compertum est, marsupium in quod extuberabat, laxatis ipsius, non integumentis modo, sed & musculis debere, in eoque, tanquam in sacco quodam, jecur, lienem, ventriculum, & intestina omnia esse posita: quæ aliquo viscerum, ut quæ Thoracem continebantur, ad naturæ normam constructa erant. Ubi ad Caput ventum est, confusa rerum occurrit compages. Neque enim ossa, cranii fornicem efficere solita, neque cranii cavum inveniebantur; sed ossa dumtaxat abnormi figura, alia parva, alia aliquanto majora, inter se intricata musculorum nexu colligata. Cerebri autem ne vestigium quidem repertum est, nisi quod corpora occurrerunt, cerebri nates, & testes perbellè referentia; sed figura tenuis; nam exterius membranis nexibus undique firmata, interius non cerebri substantiæ ullo pacto similia erant, sed corpori potius cuidam, mediæ, inter glandulosum, & spongiosum naturæ. Quod etsi neque cerebrum desuisset, & puella hæc vivere potuisset; tamen non secus ac sorores, necessario furda fuisset propterea quia utrumque foramen per quod a cerebro ad aures nervi mittuntur, firmissima occludebatur membrana, ut ne tenui quidem filamento nervo ullus relinqueretur transitus. Nec vero magis licuit Spinalem medullam, aut principium quoddam invenire ex quo nervi initium capebant, quæ cæteroquin per ventrem, thoracem, artus naturaliter ferebantur. Nam vel crassissimos, ut puta Crurales, persequendo ubi ad Spinam accederes, sensum fieri exilliores vidisses, & in Spinam quidem infigi; verum in hac tota non modo nullam esse medullam Spinalem, sed nec cavum ullum quo medulla comprehendere posset.

49. Etsi Valsalva scribere omisit, mortuus, an vivens hic foetus editus sit, nescimus quomodo se haberent renes, vesica, uterus, nervique per caput discurrerent; ea tamen quæ scripsit, satis sunt, ut præclare intelligamus, vitium ejusdem foetus præcipuum ad illa attinere, de quibus XII. ad te Epistola (1) actum est, cum ab hydrocephalo cranium magna ex parte, totum autem cerebrum saepe absumptum esse in istiusmodi foetibus (sane pro bufonibus non raro habitis (m)) confirmari, neque exempla (n) eorum reticui, in quibus præterea non solum medulla Spinalis, sed quod multo rarius est, inveniri tubus non potuit quo hæc conderetur. In eam autem Epistolam hanc Valsalvæ Observationem idcirco non retuli, quod præter illa, habet alia, sive mentum, sive spinam, sive artus superiores, sive demum abdomen, & pleraque spectes hujus viscera, ut huc potius differendam esse, censuerim. Quo certe ob non absimiles causas distulissim, si tunc habuissim, Baronii quoque Observationem quæ paulo inferius (o) subjicietur, fortasse autem & alteram meam, quæ tertia est puellarum, quas ipse dissectui, cerebri carentium; omnes enim haud secus ac ista Valsalvæ, & illa Baronii, foetuum fuerunt sequioris sexus; quod ad illud addes quod in ea Epistola (p) obiter animadverti. Sed meam illam Observationem tertiam nunc accipe: cui non dissimilis, præsertim ob Spinam simul bifidam, biennio post Hafniæ habita est (q).

50. MONSTRUM; sic enim vocabant; triduo, an quadriduo ante hic editum, mihi a Chirurgo quodam ostensum est Februario mense A. 1746. Quod ut dictum sectione comprobarem, ad me domum attulit, hæc narrans, mulierem, felicem hæcenus aliorum liberorum parentem, felicem

quoque hanc ultimam uteri gestationem habuisse. Cum vero ad hujus finem jam venisse, aut propius abesse, existimaret; difficili præter opinionem partu puellam hanc mortuam, & per pedes ab obstetrice detractam emisisse, Re tamen vera non paulo minorem vidi quam esse debuisset; neque enim septimestris foetus longitudinem æquabat, & parvam quoque, ut dixi (r), illam suam Valsalva conspexerat: quod, si caput ab inclusa aqua antea distentum amplificatumque concipiamus, non difficile, sicut alias (s) ad te scripsi, intelligi potest. Cæterum optime nutritum, nihil male olens, & necdum abscedente cuticula, pulchrum hoc fuisset corpusculum, quippe reliquis egregie conformatum plerisque partibus, nisi deformitates hæc accessissent, quod nullum apparebat collum, & supra oculos vix aliquid erat frontis, ex eoque loco pro communibus corporis tegumentis, una erat membrana rubea, quæ capitis, minime ibi extuberantis, imo in posteriora declivis, superiora obducens, per medium dorsum ad thoracem ferme infimum pergebat, quanto magis descendens, tanto minus lata. Sub qua posteriore membrana parte assurgebant protuberantia duæ ossæ, ut videbantur, quæ singula a singulis lateribus capitis profecta, & quo longius ab ipso descenderant, eo minus elata, magisque inter se accedentes, Spinam subesse bifidam indicabant. Ad ejus membrana latera non deerant integumenta communia, quibus, ut reliquum omne corpus, inum quoque caput utrinque operiebatur, non solum auriculis, quæ humeros contingebant, ibi præditum, sed & capillis; quasi cutæ quæ fuisset proxima, a summo avulsa, & lacerata, quæ remanserat cutis capillatæ pars, ea se deorsum contraxisset. Atque hæc exterius conspiciantur. ABDOMEN autem incidendo, primum pinguedo multa in conspectum venit, quæ passim multa pariter ubicunque erat cutis, huic subiciebatur, deinde reliquis diductis parietibus, viscera omnia tum Ventris, tum mox Thoracis optime constituta. Ad Caput denique transeunti, sub incisa rubra illa membrana, quæ erat tenuis, nihil quod pro cerebri, cerebelli, & Oblongatæ medullæ reliquiis accipere fortasse possem, apparuit, nisi duo quasi cornicula, quæ crassa, mollia, & ex rubro fusca, singula in singulis anterioribus basis cranii lateribus prominebant; dissecta enim præter concretum sanguinem, mucosam quandam ostendebant materiam. Iis corniculis illa ossis frontis pars suberat quæ fornicem orbitæ posteriorem facit. Nam anterior deerat, deerantque scincipitis ossa, & de ossis occipitis quidquid non est ante magnum, quod nullum propterea hic erat, ipsius foramen. Temporum autem ossa erant quidem, sed deorsum in latera, retrorsumque protensa. Ad quorum illa foramina quæ Auditorii ingrediuntur nervi, frustra horum, ut aliorum pariter in hac cranii basi, initia quævisi, Minusque idcirco miratus sum, cum mox oculos, qui suis cum palpebris bene erant conformati, inspicendo, Opticos nervos æquo esse graciliores, & intra orbitas, ut visum est, desinentes animadverti. Tum linguam prælongam vidi, nec pro longitudine satis latam. Respondebat hæc maxillæ Inferiori, cuius ea erat longitudo, ut ultra Superiorem, quamvis hic inter descendendum valde in anteriorem protensam, se antrosum extenderet; neque tamen ejus partes dextera, & sinistra quo magis a mento recedebant, eo magis, ut solent, inter se distabant. Itaque longius quidem, sed multo quam consuevit, angustius erat inter utramque intervallum, quod singularis insuper arcuabat utriusque crassitudo. Ad menti autem inferiora, nulla intercedente, ut in pueris, linea, ambæ in unum os coaluerant. Jam vero ut dicam de Spina; non huic omnes revera deerant colli vertebrae, sed tres dumtaxat, cæteræ autem erant inter se constrictæ, ut quædam nonnullarum partes cum proximarum partibus concretæ essent. Quod etiam in duabus, aut tribus ex iis quæ in thorace supremæ sunt, cernebatur, quarum vel ipsa erant Corpora in unum conjuncta. Ab his Spina incipiebat simul retrorsum ire, simul se in latera sinistrum curvare: quæ incurvatio ubi ad lumborum vertebrae ferme pervenerat, in contrarium mutabatur, sicque per Sacrum etiam os pergebat. Sed prima incurvatio multo erat major quam altera; quare hæc cum paululum attolleret os ilium sinistrum, illa scapulam dexteram valde attollebat, & ut costæ universæ aliter in eo, quam in opposito latere, prosterant, efficiebat. Erant autem costæ a dextris undecim, a sinistris duodecim, cum thoracis vertebrae essent omnino undecim, lumbares sex. Quod vero adnotatione dignius fuit, bifida reapse erat Spina. Namque ut summa cervicis vertebra, ita omnes dein-

deinceps reliquæ, si quæ infra penultimam sunt lumborum excipias, quidquid ossis Corporibus ipsarum additur, ut pro Spinali includenda medulla tubum efficiant, id omne hinc & hinc reclinatum ad latera, expansumque habebant; ut duæ illæ exterius fierent protuberantia de quibus supra dictum est. Itaque non secus atque in celebri Littrii (r) Observatione, ut nullus tubus, sic nulla erat hic Spinalis medulla. Videbis, siquando Patavium veneris, universum sceletum, a Mediavia nostro diligenter apparatus, eaque omnia quæ in ossibus descripti, præclare ostendens. Effer autem aspectu multo pulchrior, si ut in cæteris quæ plurima habeo, foetuum sceletis, ita in hoc quoque ossa omnia ad albedinem perducit potuissent. Quæ etsi dura sunt, neque ulla ab eo cura prætermissa est; tamen, quod omittendum non credidi ad Observationis hujus complementum, fuscus quidam, & subniger color a certis præsertim ossibus, & nominatim a plerisque eorum quæ in artubus longiora sunt, penitus auferri non potuit. De quibus longioribus artuum ossibus nec illud silendum est, minori esse crassitudine quam in foetibus parvis huic altitudinis solent, majori autem longitudine.

51. Anno eodem 1746. cum forte Septembrem mensem in Patria traducerem mea, Philippus Baronius, Baronii illius qui de Pleuropneumonia scripsit, pronepos, meus olim gratus auditor, tunc autem apud Meldulenses suos qui ipsum ante diem amiserunt, Medicus exercitatus, ad me cum Iconibus Observationem misit, illis ab te diebus habitam, quæ cum Valsalvæ Observationi, paulo ante (u) proposita, non una in re consimilis sit, hoc loco non omittetur.

52. MONSTROSAM, quinto gestationis mense jam exacto, puellam ejecit mulier annuum quidem agens trimesium sextum, fed decolor, gracilis, a laboribus quos supra vires pertulerat, prævisque cibis diu, multumque extenuata. Quæ præterquam quod minus firma esset valetudine, viro quoque juncta erat non robusto, atque adeo torpido: ultimisque ante abortionem hanc mensibus territam se in somnis facie persimili istius quæ in puella erat, testabatur. Scilicet ultra supercilia nihil erat frontis, aut capitis: nasus depressus, os hians, auriculæ humeros contingentes, dexteraque earum deorsum valde inclinata: nullum collum, nullum mentum, quippe facie infra auriculas, & os continuo in pectus desinente, ut sicuti superiore, ita inferiore quoque careret sua parte. Abdominis musculi, & communia, ipsi imposita, corporis integumenta, anteriorem ventris multo maximam partem non convertebant; sed eam laxa, & in amplissimi marsupii modum extensa membrana operiebatur, in quam muscoli, & integumenta illa, paulatim sensimque extenuata, demum abire videbantur. Intra hanc membranam, tenuitate pellucidam, jecur, & intestina conspiciantur, extrorsum propendientia. Pollex digitus in dextera desiderabatur: quæ manus ita sursum retorta erat, ut inter se, & brachium comprehenderet angulum ferme normalem. Hæc a fronte. A tergo autem videre erat dorsi regionem capillis instructam: ad ejusque regionis summum medio inter scapulas loco amplam profundamque rimam, alterius oris instar hiantem, quam vertebrae, ibi desinentes, faciebant. Nec multo supra eam rimam, ab occipite lata oriebatur basi planus quidam quasi musculus, qui, ut erat cætera solutus, si antrosum versus extenderetur, oculos, nasumque ex parte obtegebat; sin ad posteriora reclinaretur, ad lumbos usque operiebat dorsum. Erat autem is adulti hominis linguae simillimus figura, & magnitudine. Ex quo puella hujus parvitatem facile poteris intelligere. Tamest in hac descriptione nonnulla desunt, eaque præsertim quæ per dissectionem, si licuisset, inquiri debebant; tamen ex frontis, & reliqui, ut ex Iconibus adjunctis colligo, cranii fornicis defectu, itemque ex foramine, seu mavis rima qua supremæ habant vertebrae, satis intelligere mihi videor, non minus in hoc, quam in Foroliviensi foetu (x), quodcum hunc confares, cerebrum desuisse. Cæterum & mihi A. 1735. foetum Patavii inspicere licuit, secare non licuit, cuius huc, accurate a me tunc collectam, historiam addam cum ob alia ad matrem ipsamque attinentia, tum quia in eo certe quod ad abdomen attinet, & sine dissectione conspici potuit, ad propositas Valsalvæ, & Baronii Observationes proxime accedit.

53. MONSTRUM infantem Matrona peperit nata annos unum & quadragesima, sic satis sana, plurimorum certe liberorum parens, quos feliciter gestatos, optimeque

omnes conformatos ediderat. Huic novissimo Octobri mense, & deinceps cæteris ad diem usque XI. Kal. Julii nec menstruus sanguis provenerat, & venter deinde suo tempore, mammaeque intumuerant, & cum bono faciei colore satis bona valetudo fuerat. Nec tamen se gravidam esse putabat propterea quod plura deerant cæterarum gestationum indicia, tantus in primis ventris tumor, quantus alias solebat, & infantis motus, qui alias maximus, & assiduus, nunc autem nullus. Huc illud acceperat ultimis mensibus, ut in hypogastrio tumor durus, & circumscriptus, oblongæ instar distente vesicæ, plerumque perciperetur, qui mox repente evanescere videbatur. Cum hæc ita essent, cumque ultima ante prænotatum diem hebdomada insolita urinæ sæpius reddendæ necessitas, & sensus ponderis naturalia versus accessissent, mox autem mammae triduo ante non nihil detumuisse, & pridie denique fuscis crassique humoris, subruenti autem matutino infensit diei tempore perpaucæ guttæ e naturalibus defluerant; obortis a prandio parturientium doloribus, perfacile & nulla adjuvante obstetrice integram adhuc membranam amion; nam chorion sursum erat revolutum; cum annexa placenta edidit. Quæ longis sæpius partus doloribus, & difficulti, tardaque placenta ejectione conficiari alias confuevisset, novam hanc tantam facilitatem eo magis mirabatur, quod cum & menstruum, & partus tempore plurimum effunderet sanguinem solita esset, nunc paucus, ut proximis pariter, si unum excipias, diebus exiret. Atque ut de matre nunc omnia absolvam; surrexit ad solita domestica munia, non trigesimo, ut post alios partus, sed tertio, an quarto post die, & mox etiam domo egressa est, neque ea res non robustæ aliquo mulieri noxæ fuit; imo, si unquam alias, bene se habuit, posteaque rursus uterum gessit, & vivam, egregieque conformatam prolem edidit.

Sed contra ut deformis esset quam tunc ejecerat, scribamus. Secundæ, quantum judicare potui, ab naturæ norma non discrepabant, nisi quod placenta pro eo quod mihi designatum fuit, integri amni volumine, aliquanto minor visa est; diametro enim erat transversorum digitorum trium cum dimidio. In amnio cum subflava, & turbida aqua, nec tamen fetida, mortuus infans non minus longus mihi quidem est visus quam esse ut plurimum solent qui inter quinquid, & sextum mensem ejiciuntur. Facies ei prælonga, in qua carnosus, ut videbatur, globulus ex imæ frontis medio prominebat. Sub eo oculi, inter se contingentes; nullus enim erat nasus; non palpebris, sed pellucente membrana, per quam transpicebantur, obducti. Os suo loco, quod hians denticulos Incisores ostendebat. Apertum erat in medio abdomen, ex eoque intestina effusa. Aperta quoque ad lumbos communia corporis tegumenta, sed hiatus ultra illa non descendente. Artus etiam omnes pessime habebant, Superiores quidem a cubito deorsum; quam brevissima enim erant brachia, & contorta, hisque manus pariter contortæ addebantur. Inferiores autem in distortos desinebant pedes; crus vero finistrum ab arcu advoluto umbilicali funiculo aut fractum erat, aut magis quam cætera, distortum.

54. Quid? si mater horribilis cujusdam supplicii spectaculo interfuisset, aut quidpiam tale pictum vidisset, aut saltem, ut ea de qua paulo supra (y) dictum est, somnasset. Illa vero se quidquam ejusmodi aspexisse, aut vigilantem, dormientemve cogitare pernegabat, aut vim ullam sive cadendo, sive confringendo, comprimendo, seu denique vehementius concutiendo; nam hujus quoque causæ in violentissima convulsiva tussi exemplum (z) habemus; gravido ventri attulisse: hoc tantum, se tota ea gestatione ægro tristitque animo fuisse, fatebatur; ut si gestationis horum quatuor monstrorum foetuum, & Foroliviensis quoque illius (a), inter se conferamus, mirum sit, ejus quem secundo loco (b) descripsimus, felicem adeo gestationem fuisse. Cæterum quæ modo quasi adversus vires maternæ imaginationis dicebam, sic accipias velim, ut si ab homine sint cui minime placeat quidquid monstri in prole occurrat, continuo a viribus illis repetere. Extant enim plures vitiorum ejusmodi, & ejus nominatim de quo loquimur, enumerationes non modo apud Confarinatores, verum etiam apud Illustres Viros, qui exemplum illorum vitiorum, aut ejus generis aliquod ab se, aut ab aliis visum primi ediderunt (c). Tu vero si plerisque eorum inspicias ex quibus exempla producuntur, videbis, quam facile a prægnantium imaginatione illa repetantur, & tunc etiam cum

(r) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1701. (u) n. 48. (x) Vid. Epist. Anat. 20. n. 56. & seq. (y) n. 52.
(z) Commerce. Littér. A. 1737. Hebd. 9. n. 2. (a) Vid. n. 52. ad finem. (b) n. 50.
(c) Vid. Sachs Eph. N. C. Dec. 1. A. 1. Schol. ad Obs. 135. Schroëck. Dec. 2. A. 6. & 7. Obs. 232. Goth. Ben. Preuss. in Append. ad earund. Cent. 7. & 8. Rictor. Act. N. C. Tom. 8. Obs. 88. Stalpart. Cent. 2. P. 1. Schol. ad Obs. 35. alioque; sed præ cæteris Haller not. c. c. & seq. ad Prælect. Boerh. §. 694. & Opusc. Anat. 6. §. 15. not. III. & seq. & Opusc. IX. not. 2. & seq. ad §. 3.

(1) n. 5. & seq. (m) Vid. Haller de Foetu Hum. sine cerebro not. 2. (n) Epist. 12. n. 8. (o) n. 52. (p) n. 6.
(q) Vid. Rob. Steph. Henrici Descript. Omenis not. ad §. 11. (r) n. 48. (s) Epist. 12. n. 7.

cum a violentia quapiam externa deduci satis possent, partes suae imaginationi quoque assignentur. Quae tamen probare non possum; est tamen vicissim ubi durius mihi videatur a communi ista Summis etiam. Viris sententia prorsus discedere. Quae Boerhaavius (d), quae Swietenius (e), quae alii graves, spectataeque fidei Auctores ab se conspecta de hoc genere fuisse, ajunt, nemo pro veris non accipiet. Singula ab interno vitio aliquo posse alias fieri si quis contendat; non pertinaciter negabo. Sed tunc indidem facta esse, non potero facile fateri. Incidit in nasi globulum praegnantis foeminae mori bacca; & infans prodit, in cuius nasi globulo mori exstat bacca, magnitudine, colore, subrotundis acinis, scabritie, minimisque pilis perfecte expressa. In alterius gravidae cervicem ex arbore decidit eruca, quae egre inde amoveri potuit; & puella nascitur in cuius cervicis cute prominet eruce effigies varis coloribus, erectis pilis, verbo, sic verae eruce similis, ut ne ovum quidem ovis similis esse possit. Alia mendicum labiis leporinis deformem aspici non sine horrore; & filium edit, labia fissuris deformata, visis in mendico etiam ad dimensionem usque simillimis gerentem (f). Audit alia (g) de puellula cuius dextera praeter pollicem digitis omnibus carebat, quorum locum tenebant ungues, ipsi metacarpo praefixi; haec diu multumque secum cogitat; & fetum ejicit cuius dextera ad eundem modum se habet. Nec illa (h) filenda est quae puellum peperit sine cranio, cerebri locum rubra quadam massa occupante, cum, posteaquam binos liberos ex undis quibus submersi interierant, sine cranio, & cerebro extractos fuisse, intellexerat, fixa & pertinaci ista imaginatione, & praeteriti mali perpetua ruminacione se ipsam cruciaverat: neque illa (i) quae cum puellam enixa esset, hydrorachitide in lumbis affectam, eademque idea sepius repetita, & resuscitata ejus imaginationi continuo obversaretur; proximo partu alteram puellam in lucem edidit illa eadem prorsus deformitate eodem in loco, quo prior, defigurata. Denique, ut aliis quae produci possent, & quorum nonnulla ipsi qui spectavimus, probe novimus, praetermissis, Observationem memoremus ad tres quas postremas tibi descripsimus, ex parte aliqua attinentem; mulier (k) fuit quae fetum edidit pedibus & manibus sursum incurvatis, & binis praeteritis tumoribus deformem, altero ad os Sacrum, altero sub umbilico, qua per abdominis hiatus intestina, & alia viscera egressa, peritonaeum, quo uno continebantur, valde extollebant. Cujusmodi partum cum prudenter obstetrix neque ostendere, neque describere puerpere voluisset; ultro describebat haec ipsa, narrans, se medio gestacionis tempore infantem somnasse qui in ventrem sibi violenter irrueret, eumque artibus ita incurvis, & binis tumoribus, anteriore, & posteriore sic deformatum, quomodo reapse excluderat: adeo ab illo somnio perterrita, postquam fuerat exprobrata, tristem ejusmodi ideam retinebat. Tuigitur, inquis, si maternae imaginationi haec adscribi posse, non negas; rationem, modumque ediffere quo illa efficere haec queat. Sed nimis multa essent in physicis quae a me negari deberent, si propterea neganda essent, quia modum quo fiunt, non assequor. Certe autem nec tu, si verum, ut soles, fateri velis, satis illud assequeris, qui factum sit, ut post certas istas imaginationes morbus praesto fuerit qui fetum haud aliter deformaverit ac ferebat imaginatio, ita uti bacca illa mori, eruca illa, laborum illa fissura, digitorum illa mutilatio, & unguum insolita collocatio, cranii & cerebri defectus ille, Spinae illud vitium, incurvatio illa, iique tumores non modo perfecte sua figura, ceterisque conditionibus imaginationi responderint, verum etiam in ipso nasi globulo, in cervice, in dextera, in labris, in capite, in lumbis, in artibus, in posteriore, & anteriore corporis facie sic extiterint, ut praegressa requirebat imaginatio. Casu haec facta fortasse dices. Me vero facile tibi assentientem habebis ubi certa imaginatio non praecesserit, neque huic exacte adeo & forma, & conditionibus ceteris, & loco res ipsa responderit. Sed ubi & illa praecesserit, & res illi sic, uti diximus, respondeat; ne tu quidem, si omnia diligenter perpende- ris, in casus accusatione omnino poteris acquiescere, praefertim si exemplum non unum, sed complura, ut sunt, spectaveris; neque enim casum facile credes in iis omnibus tam, ut ita dicam, ingeniosum, exactumque imitorem esse potuisse. Quid ergo est? Quod ad me attinet, in multis, & si velis, in quamplurimis casum accusavero; at in quibusdam aliud aliud potius quod me fatear non intelli-

gere. Nunc ut ad fetum redeam quem novissime descripsi; mortem illi attulit aut impedita per funiculum ipsum umbilicalem, quippe cruri arctius adstrictum, sanguinis circumitio, aut aliqua, exteriorum similis, pessima interiorum conformatio, quae & crescendi, & agitando se facultatem facile abstulit. Intestinatorum autem effusio, cuius culpa nonnunquam in rudes, violentasque obstetricum, infantes educuntium, contrefactiones, pressionesque coniecta est, hic certe ubi nihil harum esse potuerat, ipsi fetus abdomini tribuenda erat aut nunquam, aut non satis occlusio. A primordiis enim, ut Harveus (l) in perfectiorum quoque, ut vocant, animalium embryonibus, & nos certe in caninis vidimus, apertum est. Postea autem nisi peritonaeum, muscoli, & integumentum communia prorsus, & firmiter occludant; profecto aut apertum maneat, quamadmodum plures, & in his olim, nec semel, Boscius (m) (quem non memini in hujusmodi Observationum collectionibus vidisse laudatum) offenderunt; aut in marsupium a Valsalva (n) quoque, & Baronio (o) conspectum, laxetur, & si tenuissimum sit, facile disrumpatur ab ipso viscerum pondere, necesse est. Cum enim a peritonaeo dumtaxat efficitur, adeo tenue est, ut vel peristalticum intestinorum motum transpici sinat, uti Ruyschius (p) tradidit, qui tres ad ejusmodi vitia attinentes habet Observationes (q). Quas si attente legas, & inter se, & cum iis conferas, quae Bidloo respondens (r), postea scripsit, ubi eas Observationes raras esse, contendit; fortasse optabis, ne prius sine quadam repugnantia specie multis, & sepius hunc affectum a se visum dixisset. Verum ne quascunque supra ipse produxi monstrorum fetuum Observationes, eas omnes ad partium defectum attinere, dicas; nonnullas addam quae vel cum partium defectu, vel sine ullius defectu auctum numerum quarundam exhibent. Quam misit ad me olim Consulissimus, cum viveret, Medicus Sebastia- nus Trombellius, praeter id de quo modo dicebamus, ab- dominis vitium, magnam infantis alterius partem alteri- tum exterius adnatam, tum interius admittam describens, huc libentissime asserrem, nisi Vallisferio nostro dedis- set, a quo in calce elaborati de Generatione Voluminis (s) edita est, Proferam alteram qua utrumque aliqua ex parte vitium Mediavia meus animadvertit.

55. INFANS Patavii natus est sub initium Julii A. 1736, ex ea parente quae sanos alios, vitalesque & antea ediderat, & post edidit. Huic infanti unum, flaspige- res, erat vitium, tumor, pugnum aequans, in ea abdo- minis regione quae a dextris umbilici, & paululo supra ipsum est. Nudus erat tumor a cute, quae circumcirca in limbum elevata prominulum desinebat; Boscius (r) qui haec ab ulcere fieri in animum induxerat, cicatricem vo- casset, quemadmodum vocare tu quoque poteris ubi ab- dominis hiatus a violentia aliqua factum ponas, & par- tes in quibus hiatus factus est, hinc & hinc in se retra- ctas, nec ferme aliter ac Cl. Praeussius (u), rem explica- re. Inaequalis erat tumor, & tangenti cedens; ut ab inte- stinis factus videretur. Infans primum neque ex alvo quid- quam reddebat, neque mammas fugebat. Mox cepit utrumque facere. Sed viridia deiecit, unde lineta infi- ciebantur maculis quae vix ac ne vix quidem elui possent. Tumor vero qui iam antea erat sublividus, fieri interea lividior, & denique gangraena corripit. Abceden- te, cum tumoris superficie, huic subiecta Rectorum mu- sculorum parte, infans vivere desit quinclo & trigesima ab ortu die. VENTRIS dissectio ostendit duplex huic infanti fuisse jecur, alterum in sede consueta, parvum po- tius, quamvis in praelongos lobos divisum; alterum ma- jus, sed informe, quod per crassam interjectam membra- nam cum illo conjunctum, trunco venae portarum annea- xum, in Cavam autem suas venas infra illud alterum jecur immittens, eo se extendebat, ut adhaerens sibi perito- naeum, adjectosque huic tendines extorsum urgeret, tu- moremque efficeret de quo dictum est. Qui tangenti ideo cedebat, quod cederent intestina quibus hoc jecur erat ex parte impositum. Sed cum duplex esset jecur, bilis vesicu- la nusquam apparuit. Ceterum Tenuia intestina erant secundum naturam constituta, Colon arclissimum.

56. Credemusne, ut duo nonnunquam uno in corpore lienes inveniuntur; imo haud ita raro; tamen id ipsi vidimus (x); ita huic uni infanti duo jecinora fuisse da- ta? an jecur majus, & extorsum prominens, ad fetum alte-

alterum spectasse, cuius caetera partes in utero perierint? sic enim in bicorporeo illo fetu quem Zambeccarius fec- uerat, Vallisferius autem (y) protulit, amborum cor- porum jecinora inter se juncta per interpositam crassam quasi membranam videntur (z). Sed casum factum pu- tabimus, ut jecinoris non sui venae in eisdem pervenire possent truncos ad quos ex proprio hujus infantis jeci- nore venae pertinebant? Nimirum haec difficultas quae in bicorporeo illius fetus plerisque visceribus multo ma- jor est, ad eas attinet quae recenti de origine Monstro- rum controversia causam praebuerunt. Neque in vitula deerant quam A. 1745, ineunte Martio perhumaniter ad me misit Vir Ornatusissimus Jo. Dominicus Lavarinius J. C. Veronenfis. In qua multo plura, & quae ad te scriberentur digniora fortasse animadvertissem, nisi post- quam mortua edita est, atque ut diutius duraret, ventre aperto, & visceribus plerisque ex ipso detractis, tum diaphragmate scisso, & pericardio recluso, dum e mon- tibus Veronam primum, inde autem Patavium translata est, ipso temporis intervallo minus dissectioni, accura- taque observationi idonea facta esset. Pauca tamen, quae adnotare potui, huc adscribam.

57. BICEPS vitula, cuius neque capita, neque colla, si inter se conferres, nec corpus reliquum, si cum aliis vitulis partui maturis comparares, discriminis fere quid- quam, exterius quidem spectata, ostendebat, Thorace aperto, perlustratoque, haec exhibuit. SPINAE, ut ex duabus cervicibus profecta, sic in thorace duae esse pergebat, intervallo aliquo disjunctae, quod quanto il- lae descendebat magis, tanto ipsum magis decrecebat, ut denique infra thoracem non amplius duae essent Spi- nae, sed una. Eodemque ordine breviora fiebant trans- versa ossa, quae colitis crassitudine, latitudine, & sede respondenda, in illo spinarum intervallo singula erant collocata. Secundum id intervallum ferebatur Magnae ar- teriae truncus Descendens, valde amplius, ut qui ex duo- bus, in unum confluentibus, efficeretur, neque binas tan- tum, sed ternas ex ordine, ternasque emittens Intercosta- les arterias quo ad intervallum illud durabat, ut pote cui una earum inferviret. Singula thoracis latera bini, de qui- bus ad te alias (a) scripsi, tenebant magni pulmonum lobi; nam & in bina bronchia singulae dividebantur ar- teriae Asperae, a suo quaque collo descendentes. Thymi quoque erant duo, etiam primo in unum juncti videbantur. Pericardium unum duo continebat, penitus se juncta, cor- da. Haec erant inter se aequalia, eademque intus, extraque structura. Sed in his tamen discrepabant, primum quod cum alterum alterius lateri proximius esset, sinistri fa- cies quae dexterum contingebat, erat, nec leviter, sic ex- cavata, ut naturalem dexteri convexitatem, cui prorsus re- spondebat, exciperet; deinde quod non eandem utrumque faciem sternum obvertebat, sed dexterum quidem eam quam debebat, sinistram autem quam sternum obvertere debuisset, eam dextero obvertebat cordi, eaque facies illa erat, quae, ut dixi, excavata fuerat. Quam excavationem ne suspiceris post mortem a dextero corde, quod forte si- nistro diutius incubuisset, induci potuisse; nec levem il- lam, ut dictum est, fuisse memineris, & eam parietum utriusque cordis in vitula hac, perfecte in utero jam au- dita, & probe nutrita, firmitudinem, crassitudinemque fuisse, scias, ut inde istam non liceat excavationem re- petere. Quod si ut corda, sic reliqua etiam partes satis firmae tum fuissent, nec gravis odor non secanti modo, sed & illis qui prope me aderant, magis, magis- que molestus fieret; alia praeterea, atque alia periben- ter inquirere, & diligenter examinare perrexissem.

Eorum tamen quae in ventre supererant, viscerum nul- lum vidi quod praeter consuetudinem esset duplicatum.

58. Quoniam partus infelicitas quae in prole specta- tur, non solum tunc est cum monstrosa haec nascitur, verum etiam, ut supra (b) posuimus, cum est gravi alio- aliquo vitio affecta; de hac quoque infelicitate pauca qui- dem ob provectam jam longius Epistolam, attingemus, non quod multo plura rei dignitas, atque adeo neces- sitas non postulare. Pauca enim infantum vitia sunt quae re ipsa cadant sub sensu, si cum maximo numero con- feras internorum; haec autem quae humani generis ma- gnanim partem vix editam absumunt, tanto facilius, quan- to minus tunc vasa, & viscera omnia ob teneritudinem ac molliem idonea sunt, ut se adversus praeternaturales distentiones, attritionesve tueantur, nedum ut vitium alicujus alterius visceris, aut vasis corrigant, unde illae, aut aliae in se injuriae proficiuntur. Huc illud gravi- simum accedit incommodum, quod Medici, non ut ab

adultis, ita ab infantibus narrationes possunt, aut respon- siones accipere, ex quibus intelligant, qua parte corporis, & qua molestia afficiantur, & quod consequitur, quo au- xilii genere utendum sit ad hanc, ejusque causam, nisi tolli queat, mulcendam saltem, ac minuendam. Quapro- pter inter illos excellens in primis Ballonius, infantes, & teneros pueros miseratus, non uno loco (c) admonuit, ut quoniam tunc nobis, tanquam cum muris aegris (qui ta- men, adulti, nutu, & gestibus plura significant) agen- dum est; tanto in illis diligentius, quaecunque possumus, morborum indicia adnotemus, & conjecturis persequa- mur; exemplisque docuit suis tum in pleuritide, tum in lapide renum non solum quae in viventibus pueris signa animadvertisset, verum etiam quae in denatorum cor- pusculis per anatomen deprehendisset. Quem nos secu- ti, eandem olim viam in Medicarum Institutionum Idea commendavimus, ut quibus natura suos posse indicare morbos negavit, illos Ars, quasi opportuna, & amica interpres ne deficiat. Quod si haec vel in iis infantum morbis necessaria sunt, qui cum sint illis, adultisque communes, signa Medicis habent notiora; quanto erunt magis in morbis illis qui infantium sunt peculiares!

59. Morbos infantum peculiares appello qui a turba- to sunt peculiari in ipsis naturae instituto, ut puta cir- cumcisionis sanguinis ab ea quae in fetu requirebatur, in eam quae in nato requiritur, mutatione. In illo, ut no- sti, a placenta per Umbilicalem venam sanguis in venam portarum inferebatur, ex eaque pars sanguinis per Canaliculum Venosum in venam Cavam, ex hac autem pars per Foramen quod Ovale vocitant, in sinum venae Pulmo- naris, pars in dexterum cordis ventriculum, ex hoc autem per arteriam Pulmonarem pars in pulmones, pars denique per Tubulum Arteriosum in Magnam arteriam, ex cuius Iliacis ramis non parva sanguinis portio per arterias Umbi- licales in placentam referebatur. Haec nunc in jam nato cum vena ejusdem nominis obligantur, amputanturque, ut jam nihil sanguinis inferri possit, nihil referri. Canaliculus au- tem Venosus, & Arteriosus Tubulus sensim deinde occlu- duntur, sicut Foramen denique Ovale, quod, nisi occluda- tur, solet imminui. Igitur fit ut sanguis ex vena portarum in Cavam non nisi per hepaticas transeat hujus radices, & quemadmodum is qui per Cavam ad cor vehitur, in Pul- monarem arteriam contruditur, sic nihil ex hac pervenire in Magnam arteriam possit, quod per venam Pulmonarem non sit convectum in sinistram cordis ventriculum. Adde huc caetera eo tempore peculiaris, & pro cunctis iis mu- tationibus necessaria natura instituta, ut lac e mammis sugendum sit, deglutendum, & stomacho conficiendum ut diaphragma alterne contrahendum, atque laxandum, pulmones explicandi, aer ducendus, remittendusque, alia hujusmodi. Deinde sic cogita, si qua forte corporis pars sit his novis, necessariisque muneribus minus apta, aut magis resistens, aut faciens ut multo citius, tardiusve quam par sit, ea occludantur viae quas occludendas esse, dixi- mus; cogita, inquam, quid sequi debeat; & facile intel- liges, quam varii, multique esse possint morbi recens natorum peculiares.

60. Illustrare haec juvat exemplo morbi qui sub sen- sus cadat. Nonnunquam nascuntur infantes sine palato, aut nascuntur palato fisso. Sive tunc fuctio, sive deglu- titio, sive utraque impediatur, aut multo difficilior fiat; apparet, sic factum os ineptum, aut minus aptum esse ad lacendum. Sed quoniam morbus & manifestus est, & externus, Ars modum excogitat servandi infantes sive ad plures dies, sive, ubi vitium minus sit, ad longam aeta- tem. Legeris tradita a Cl. Viris Maloetio, & Petito (d); quorum ille natum sine palato refert vixisse dies quindecim, lac ex cochleari in os demittendo; hic ve- ro servatos quosdam, fisso palato in lucem editos capra se- mipleni uberis papillam praebente, cujus crassitudine, lon- gitudine, mollietate simul fissura palati, simul narium ca- vea sic occludebantur, ut subinde esset, ne respirationem impedi- ret, illa retrahenda. Hoc autem in iis esse factum, qui assuescere, ut plures alii quos vidit, non potuissent illis in sugendo, deglutendoque incommodis motibus qui, cum fissum palatum est, requiruntur. Qua assuescendi spe, aut saltem diutius servandi infantis causa, qui Pa- tavii sic natus erat, memini me interim nutriendes ex la- cte clysteres proponendos curasse. Sed manifestus non so- lum, ut dixi, tunc morbus est, verum causa ejus quo- que. Est autem alius manifestus quidem morbus; sed causa incerta, ut puta cum recens nati ictero affi- ciuntur graviore; nam levi quodam fere omnes paulo post ortum tentantur. Cujus levis icteri si certa causa esset,

(d) Praelect. ad Instit. §. 694. (e) Comment. in Boerh. Aphor. §. 1075, ad 2. (f) Vid. Aët. N. C. Tom. 6. Obs. 10. (g) Comment. Liter. A. 1632. Hebd. 20. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9 & 10. Obs. 106. (i) Salzmänn. Dissert. de quibusd. tumor. tunic. ext. §. 3. (k) Schol. ad Praeuss. Obs. cit. (l) De Generat. Animal. Exerc. 69. (m) De Facult. Anat. Lect. 1. in fine. (n) Supra, n. 43. (o) Ibid. n. 52. (p) Cent. Obs. Anat. Chir. 73. (q) Ibid. Obs. 71. & 72. (r) Respons. ad Bidd. Vindic. (s) P. 3. c. 5. & Tab. 3. 4. & 5. (t) Lect. 1. paulo ante cit. (u) in Append. supra ad n. 54. cit. (v) Epist. 37. n. 30; Epist. 38. n. 34; & Epist. 64. n. 2.

(y) c. 7. ad a. 34. cit. & Tab. 7. & seqq. (z) Tab. 10. Fig. 3. & 4. (a) Epist. 19. n. 42. (b) n. 47. (c) Vid. l. 1. Constit. 75. in fine, & Epist. l. 2. Constit. Augusta. A. 1577. ad 2. in Annot. & Constit. Aët. A. 1558. ante med. (d) Hist. & Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1735.

esser, ut opinor, aut saltem conjici plerumque posset illius etiam gravioris. At leviores audivi qui repperent a materno lacte quod statim a partu subflavum sit. Vidi tunc equidem & ego hoc aliquando subflavum. Sed ut semper esset; quomodo interdum vidissem valde flavescentes eos quoque infantes qui nec matris, nec recentis alterius puerperæ lac fuxissent? aut quomodo Sylvius (e) observasset, multos nasci cum ictero, nedum mox post partum ipsis erumpere icterum? Sunt & docti Viri qui omnes recens natos ictericos fieri, arbitrantur, quod ex primo lacte in ventriculo acescente coagulatum fiat, a quo mox Duodenum intestinum distendatur, bilisque, obturata in hoc via, in hepar, & sanguinem regurgitet, quæ hinc dignoscantur, quod rhabarbari, aut saponis paulatim solvatur icterus. At multis illis, cum hoc natis, lac certe in ventriculo acidum factum non fuerat, & de quindecim filiis meis, cum mox a partu flavi omnes, & nonnulli etiam haud ita leviter, essent facti, cunctis per se, nullo prorsus Artis auxilio, paulatim icterus solutus est. His autem omnibus lac, quod nonnulli a matre, alii ab alijs nutricibus fuxerant, acidum esse factum, imo cæteris passim infantibus, diverso adeo tum lacte utentibus, tum ventriculo præditis, acescere, vix est credibile. Crederet fortasse aliquis, novum hoc alimentum plus oleosarum particularum in sanguinem invehere, quam ut jecur par esse possit secernendis; nisi tunc, dicerent, alba esse alvicrementa, indicio non obscuro, bilem in Duodenum intestinum minime influere. Quid ergo est? Si effectus, omnibus communis, communis quoque causa esse debet; a veri similitudine non alienum est, respici oportere venam Umbilicalem, quæ sive ut incisa, filoque constricta inferat in continuatam portarum venam contractionem quandam, sive ut orbata sanguine, a placenta reduce, non juvet hoc utili additamento reliquum per se convectum, a novo alimenti genere fortasse crassiores, utrolibet, aut utroque modo retardet bilis in hepate secretionem, donec viscus hoc, cessante illa contractione, paulatim assuecat, aptumque iterum fiat ad bilem separandam. Veruntamen hæc, ut vides, intra conjecturam sunt.

61. At sunt alia quæ per infantum dissectiones licet confirmare. Legisse memini inter ea quæ Cowperus in Appendice ad Anatomen humani corporis adnotavit, quibus vias illas quas supra (f) commemoravi, Tubuli Arteriosi, & Ovalis præsertim Foraminis, æquo citius occlusas invenit, eos multis sæpe morbis male habitos fuisse, ut capitis, colli, pulmonum inflammationibus. Itaque cum hæc, nulla prævia causa manifesta, recens natos adorientur, non abs re erit præproperam illam occlusionem suspicari. In qua ut ille imminutionem sanguinis laudat; sic tu commendare saltem poteris lac parcius præbitum, & ea nutrimenti unde tenuius, & fluxilius gignatur. Sic enim sanguis qui totus per pulmones trajicitur, & tanto majori copia in ramos superiores irrumpit arteriæ Magnæ, quanto jam minori in descendentes hujus truncum defecit, facilius transibit, & pulmonibus, cerebroque minus officit, a cujus quippe tunc molliissimi, lætione fortasse præter inflammationes, alia mala sæpius sunt in nerveo genere quibus recens nati repente absumuntur, ique præsertim in quibus præter eas præmaturationes occlusiones, sanguis jam ab utero sit copiosior, aut crassior, cerebri autem vasa vel multo quam soleant, inhumiora. Sicuti autem nasci aliqui eo structuræ vitio possunt, ut viæ illæ sanguinis, de quibus dictum est, celerius claudantur; ita e contrario credibile est, oriri nonnullos in quibus oppositum vitium sit, viæque propterea illæ non modo nunquam penitus occludantur, quod in Ovali Foramine haud raro mihi, aliisque occurrit, sed quod de eodem Foramine dictum puta, ne inamnuantur quidem. Hæc autem si qua corpora forte sint ita facta, ut ferre possint, veri simile est, multo plura non posse.

Pertinent hæc quæ XV. Kal. Jun. A. 1722. Vir Cl. ad me scripsit Janus Plancus. Ex me enim quærebatur, num in recens natis infantibus unquam Ovalè Foramen nulla prorsus instructum valvula offendissem. Quærendi autem causa erat, quod in nuper dissecto infante neque ipse, nec Vir, alias a me laudatus, qui tunc Arimini degebat, Romæ postea Pontificiorum Archiatrorum Comes fuit, Antonius Leprotus eam valvulam diligentissime, sed frustra, quæviserant. Universæ autem illius Observationis, quantum ex iis, proximisque Planci litteris collegi, summa digna est quæ hic tibi a me perscribatur.

62. INFANTEM dies natum haud amplius quindecim mors sustulerat; sed quo morbi genere, non constabat. CADAVERE perlustrato, ventriculus bono

lacte refertus, ipseque, & viscera omnia conspecta sunt sana, nisi quod cor, & quæ circa illud sunt, vasa erant sanguine mirum in modum distenta. Vasorum Umbilicalium quæ partes in ventre sunt & Tubulus Arteriosus patebant; Ovale autem Foramen non patebat solum, verum etiam sua valvula prorsus carebat, ut hujus, quantacunque, ut diximus diligentia quæreres, nec vola, nec vestigium occurreret.

63. Quod cum præter naturam omnino esse, Planco rescripsissem; facile in eam venit cogitationem quæ paulo ante dicta est. Et sane intelligis, ubi prorsus desit id quod sanguis a sinistris urgeat: & ad Foramen Ovale magis magisque, si non claudendum, at saltem ex parte aliqua operiendum impellat, perturbatum iri in organo præcipuo certum illum qui requiritur in respirantibus, sanguinis motum; quæ perturbatio nisi imminuatur, sed usque & usque eadem persistet; motus demum cordis, & sanguinis sufflaminetur, necesse est.

64. Vides, ut amplissima, eademque propemodum intentata pateat via ad recens natorum morbos attenta, dum vivunt observatione, accurata autem post mortem dissectione pervestigandos, nisi parentum inepta charitas obitaret. Qui tamen aliquando cum infantes suos alium post alium ad eundem modum amittunt, tum denique, si forte nascituros servare possint, id Medicis ultro offerunt quod alias negassent. Verum haud raro incidunt in Rei Anatomice aut rudes, aut contemptores, quorum ego olim utrumque genus in uno eodemque casu perpexi. Qui recens natos secuerunt, id quod in his maxime secundum naturam est, pro funesto ipsorum morbo referebant, cranio arctius adhaerentem Duram meningem. Qui consulebantur, quantopere contempsissent Anatomen, tunc satis ostendebant, cum hoc ipsum acciperent, probarent, & tanquam fundamentum eorum ponerent quæ erant responsuri. Quod si diligens Anatomes studium nullam præter hanc afferret utilitatem, ut ex corporum secundum naturam se habentium interiore constitutione, quæ præter naturam sint, aut non sint in perquirendis morborum causis addiceremus; magni certe faciendum esset; non contemnendum. Peculiariora autem plura præter ea quæ supra memoravimus, habent tenellorum infantum corpora, ut in horum quoque dissectione esse debeat exercitatus qui latentes vellet eorum morbos inquirere, & ea quæ morbida revera sunt, cum iis signis conferre quæ in viventibus animadvertuntur, & deinde pro utrorumque natura, & gradu, si non curationem, at levamen, & si ne hoc quidem liceat, saltem prædictionem afferre, hæcque ea ratione quam Anatome doceat, explicando comprobare. Sic explicatæ prædictionis; ne a cranio, quod memoravimus, longe abeamus; exemplum in haud ignoto aliquo funesto signo est apud Wepferum (g). Infante enim infantium morte, non solum circa futuras Lambdoidem, & Sagittalem manifestos profundosque sulcos, sed & prope Coronariæ, & Sagittalis conjunctionem foveolam subidentem conspiciamus. Quid ita? Cerebrum enim tunc in se collabitur, subidentemque per Crassæ meningis nexus introrsum trahit quiddam adhuc membraneum restat in futurarum interstitiis, itaque sulcos illos, & foveam facit.

65. Juvabit autem antea quam in recens natis hæc diligens aliquis Vir conetur, quæcunque a Medicis, & Anatomicis accuratioribus in paulo grandioribus infantibus, ac pueris habitæ Observationes, dissectionesque, huc illuc dispersæ, extant, eas colligere; neque enim vel in Sepulchreto extant, nisi disjectæ; ex iisque illas potissimum attendere quæ ad proprias spectant ejus ætatis structuras, aut ad reliquias, nonnunquam majores quam vulgo putant, earum structurarum quæ in recens natis peculiariter occurrunt. Tum deinde Observationes addat quæ ad hos ipsos recens natos attineant, quotquot ab alijs habere sui similibus, aut ab se possit, unumque ex omnibus corpus efficiat, quod a grandiusculis incipiens, in recens natis desinat: possunt enim illi aliqua interdum aut vocalis, aut manu designare, quæ si adnotes quibuscum alijs ultro se offerentibus signis conjunctione sint, tuas sæpe tunc adjuvent conjecturas, cum signa hæc alia in iis deprehenderis, qui neque lingua, neque gestu quiddam valent significare. Et nobis quidem hæc quæ in Re Medica desideratur, partem aggrediendi voluntas fuit; facultas defuit. Namque ut licuisset ægros infantes accuratius observare; mortuos tamen incidere non licuisset. Quorum alterum sine altero ad propositum vix quiddam prodest. Hæc igitur ab alijs; a me autem de iis morbis in quibus utrumque licuit, plures adhuc Litteras expectabis, & valebis.

F I N I S L I B R I T E R T I I.

JO.

JO. BAPTISTÆ
MORGAGNI
DE SEDIBUS, ET CAUSIS
MORBORUM
PER ANATOMEN INDAGATIS
LIBER QUARTUS.

Quo de Morbis agitur ad Chirurgiam, aut ad
universum corpus spectantibus.

Præclariſſimo Viro

JOANNI FREDERICO SCHREIBER

Medico, & Anatomico Præſantiſſimo

Joannes Baptiſta Morgagni S. P. D.



Ogitanti mihi, per quem Inclytæ iſti IMPERIALI Scientiarum ACADEMIÆ, quæ me ſibi anno 1735. benigne adjunxit, hos modo a me editos libros, grati, obſequentiſque animi teſtimonium, meo nomine offerendos curarem, forte accidit, ut inter cætera ejusdem Academiæ Volumina, ſæpe a me in his libris conſcribendis verſata, ultimum quod Petropoli huc eſt importatum, in manus ſumerem, Novorum Commentariorum Tertium. Itaque ſub oculos mihi redeuntes, quas antea excerpteram, Obſervationes Tuæ, Vir Præſantiſſime, ſpem dederunt, Te non ille libenter oblaturum eſſe meas, tum quia ejusdem generis, ac Tuæ, ſunt, tum quia a me ſunt, in quem pro Tua Humanitate quam bene eſſes animatus, vel ante hos duos & viginti annos, cum Lugduni Batavorum degeres, non pauca ex Tuis eruditis ad libellum Jac. Douglaffii Adnotationibus oſtenderunt. Rogo igitur, ut has officii mei partes iſtic ſuſcipere ne graveris.

Quod ſi forte quærās, ex raris ſint, an ex communibus Obſervationes hæ meæ; ingenue dicam, eſſe promiſcue ex utriſque, magis tamen ex communibus, quippe magis ad inſtitutum hoc meum attinentibus. Mihi enim propoſui, non homines admiratione afficere, ſed meos pro quibus poſſimum ſcriberem, Auditores utiliora docere. Longe autem utilius eſt monſtrare iſtis per Medicam Anatomem quæ cauſæ ſint eorum morborum quos ſæpenumero, quam paucorum quos nunquam fortaliſ in Medicina exercenda ſunt viſuri. Et huc facile ſpectabat Peyrus (a), cum ſcripſit, bonum eſſe omni ægritudinum genere deſunctorum cadavera, quorum haberi copia poteſt, diſſecari, atque deſcribi, & Conſultiſſimus Medicus Frieder. Hoffmannus (b), cum ad Artem hominibus ſalutiſeram magis perficiendam optandum fore, exiſtimabat, ut cadaverum, quocunque etiam morbo perierint, ſectiões eſſent frequentiores, & magis diſerte Illuſtris utriuſque noſtrum Amicus Hallerus (c), cum eſſe, ait, in obſervationibus vulgatiſſimorum morborum verius forte quam in iſis prætiis, quæ adeo raro occurrunt, & vel planius, ubi (d) de Jo. Rod. Camerarii Memorabilib. Medic. verba generatim faciens, inprimis autem, inquit, ad rariora, & ad id reſpexit, quod admirationem moveret, eo ipſo minus utilis. Reliquos nunc ſciens, uti ſolitus ſum, brevitatis cauſa omitto, ut potius ex Viri Summi, Veſtrum utriuſque Præceptoris, meique, dum viveret, Fautoris, & Amici ingenui Boerhaavii ſapientiſſimis dogmatibus rem conſiciam.

Statuebat ille (e), ut præclare noſti, omnium optimum inter eos qui obſervaverunt ea quæ in vita contingunt, fuiſſe Hippocratem; ſed qui examinaverunt cadavera poſt mortem, hos optime de Arte meruiſſe. Quid ita? Nimirum quia morbos ſanare ex arte non poſſumus, niſi & morbos, & cauſas proximas dignoverimus, quæ non morbos ſolum efficiant, ſed & eas quæ in horum ſingulis inſint, differentias. Quæ omnia dum ille explicat in iſis præcipue Academicarum Prælectionum Partibus quæ ad Pathologiam, & ad Symptomatologiam ſpectant; quis eſt qui, non dico illa omnia dignoſcere ſe poſſe, ſperet, ſed accedere dumtaxat ad tot dignoſcenda quot homini permiſſum eſt, niſi per morboſorum cadaverum innumeras propemodum diſſectiões? Nam primum quod ad morbos attinet, incredibilem, & augeſcentem in dies eorum enumerationem vel unius oculi oſtendunt morbi, quos cum Galenus, ut eſt apud Eruditiffimum Trillerum (f) jam olim CXII. diverſos obſervaret, Boerhaavius nominat qui CCC. numeraverit ſuperiore ſæculo. Ex quibus ut eos tantum attendamus qui ex diverſis oriuntur cauſis, inſidentque diverſis ſedibus; ingentem vel ſic habebimus numerum. Quantum erit igitur morborum numerus univerſarum corporis Partium, cum aliæ quæque, præter oculos, inter eas ſint, quæ bene multis instrumentis egent ad ſuum perfecte munus implendum, eoque morbis & frequentibus, & multiplicibus

(a) Meth. Hiſt. Anat. Medic. c. 4.

(b) Proœm. ad Diſſert. de Pancreat. Morb.

(c) Præf. ad Opus. Pathol.

(d) ad Boerh. Meth. Stud. Medic. Part. 9.

(e) Meth. Stud. Medic. Part. 14.

(f) Proœm. ad Diſſert. de Fæne Lethali.

cibus magis, quam cæteræ, sunt obnoxia. Unde simul facile est intelligere, quanto major sit, quam vulgus putat, vel uno in morbo, diversarum causarum numerus, & quomodo morbus idem & unus sit, & millecuplus, quod præclaris exemplis Cæcitatibus, Surditatibus, Difficili Respirationis Boerhaavius ostendit, ut Palpitationis Cordis Cels. Senacius (g), & quare paucæ adeo quorundam morborum sanationes, plures autem infelices curationes, multæque interea injustæ querelæ audiantur, quod contra unum eundemque, si nomen spectetur, morbum tot, nec raro inter se contraria remedia in aliis aliorum Medicorum libris laudentur. Scilicet non ut morbi nomen, ita morbus quoque est simplex, sed multas complectitur differentias, a multis non diversis tantum, sed & oppositis interdum causis effectas. Quæ cum ita sint; Ars certe tanto longius aberit a facultate bene curandi, quanto pauciores cognoverit differentiarum causas, & causarum notas. Contra vero propius, quoad ejus fieri potest, accedet, si noverit plures. Nulla autem est alia pro certo noscendi via, nisi quamplurimas & morborum, & dissectionum historias tum aliorum, tum proprias collectas habere, & inter se comparare. Atqui non nisi communiorum morborum habere quamplurimas possumus, rariorum autem ob id ipsum quod rariores sunt, paucas adeo, ut vix, imo sæpius ne vix quidem, tot sint, ut comparatio institui possit, ex qua præcipua existit utilitas. Tam patet igitur, quam quod maxime, communiorum morborum Observationes longe esse utiliores, quam rariorum.

Quas tamen non contemno; imo ideo probo, quod raræ, & mirabiles sunt; interest autem Medici nec has ignorare, cum quia id quod semel accidit, potest iterum accidere, tum quia sic ubi sincera complurium testificatione res mirabiles confirmantur, illaudabili multorum consuetudini occurritur, qui propterea quod mirificæ narrationes hominibus sæpenumero imposuerunt, videntur nimis facile statuisse, nulla quæ admirabilia sint, ab se unquam esse credenda; quasi fieri nihil posset, nisi cujus causa intelligi ab ipsis queat. Sic etiam olim multi Medici, ut legimus apud Galenum (h), rerum quæ manifeste videntur, causam reddere nequeunt, eas esse, omnino negabant, ideoque, ut opinor, quidam etiam ultro rari exempla, ubi causa deficiebantur, reticebant, quos ille vel eo nomine reprehendit (i), quod si ita fiat, scitu digna infinita præteribuntur. Quin veritatis studiosus, inquit, omne debet quod conspiciat, etiam si eum angat causa, sedulo exponere. Quod ego monitum, & eas de quibus dictum est, rationes secutus, non veritus sum in his libris non semel iis quoque Observationibus locum dare quæ explicatus habent difficillimos, ut cum in robusto bajulo, quinquaginta circiter annos nato, cor descripsi puerili corde non majus, neque tamen ut alia nonnunquam inventa æquo minora corda, quidquam habens læsionis, aut vitii, ne in ipsa quidem substantiæ constitutione. Sic & alia etiam sane rara proposui, ut in libro hoc quarto tunicam oculi Retinam ossæ factam, & intra genu articulum osses plurimos innatos globulos, quæ nemini, quod sciam, ante me videre in Italia contigit.

Sed quanto majorem ad raros, magisque ad vulgatiore morbos observandos Nosocomia nobis præbent opportunitatem; tanto sæpius vicem doleo priscorum Medicorum, qui ea caruerint necesse est, si Nosocomia primum instituta sunt non longo ante Justinianum tempore, quemadmodum in Imperiali Academiæ istius Commentariis (k) Vir ostendit recondita eruditione præditus Jo. Henr. Schulzius. Quod si vel posteaquam Nosocomia esse cœperunt, morbos non in ægrotantibus solum, sed & in denatis post quancunque ægrotationem, examinare licuisset; ii per insecta decem admodum sæcula Medicæ Facultatis progressus fuissent, quos conjicere facile est ex his quos fecit postquam tandem utrumque illud permitti cœpit circa initium sæculi XVI Quo magis nostrarum partium est, eorum omnium qui Rem Medicam his temporibus proficuntur, jacturam tot sæculis factam diligenter facire. Omnium autem dixi propterea quia in tanto, ut diximus, numero inquirendarum causarum, notarumque per quas causas internoscamus, nisi unanimi, atque assiduo labore, & studio contendamus, verendum est, ne posteris; quamquam ipsis quoque multum restabit semper, ut in immenso propemodum opere, quod adjiciant; nos tamen aliquanto minus quam possemus, allevasse eorum inquirendi onus videamur.

Sed quid ego hæc meis primis ad Te litteris tam longo sermone tecum ago, quasi hæc omnia aut non melius, quam ipse, nosset, aut non æque libenter ac ego, faceres? Nimium; si nimium in ullo esse potest, in me veri, & publicæ utilitatis studium abduxit longius ab hujus epistolæ proposito, ad quod tandem redeo, Te iterum orans, ut pro Tua singulari Humanitate his libris faveas, quibus nihil accidere honestius potest, quam si per Te, Vir Doctissime, una cum debitis auctoris officiis illustribus istis Academicis offerantur. Vale.

D. Patavii Prid. Kal. Septembr. A. CIO DCCC LX.

JO.

(g) Traité du Cœur l. 4. ch. 11. n. 18. & 19. (h) de Loc. aff. l. 5. c. 2.
(i) de Caus. Puls. l. 2. c. 13. (k) Tom. 13. Class. Hist.



JO. BAPTISTÆ MORGAGNI AD AMICUM EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA XLIX.

De Febribus verba fiunt.



QUI longissimas a me Litteras non ita pridem acceperis, nunc expectas fortasse longiores, ut quarum argumentum sint Febres, morbi omnium frequentissimi, & varii adeo, atque multiplices. Et sane quæ ipsis in Sepulchreto assignatur Libri IV. Sectio I. unam ex prolixioribus esse, vides. Hæc tamen Epistola ut brevissima non sit; certe inter longiores non erit. Quid enim hic, Sectionem illam imitatus, repetam, aut anticipem quæ satis, aptiusque alibi ad te scripsi, aut scripturus sum, de tot morbis agens quibuscum sua certa febris conjuncta est? In illa autem Sectione quamplurimæ Observationes sunt quas Bonetus ipse fatetur, aliis locis quæ indicat, ab se proponi, & ex iis de quibus non fatetur, alias præterea agnovisse videor de quibus idem fateri posset. Quin etiam quidam in illa eadem Sectione non semel positas animadverti: quas singillatim non memoro, quia te puto, si diligentius quam ego, ipsam perlegas, vel plures alias animadvertendum, simulque nonnullas miraturum, in quibus incredibilia leges, ut puta in pestilenti hemitritæ (a) reperiuntur inter cerebri meningis immanem cinicum copiam, ut in pestilentis quibusdam (b) natis passim in humanis corporibus viperas ac lacertas, quæ mille hominum in dies post cruciatu acerbissimos interficerent, aut (c) inventa hominum, & eorum jecora busonibus sententia. Mihi vero statutum est aliquot Observationes quæ ex Valsalvæ præsertim schedis supersunt, hic describere, in quarum plerisque illud potius miraberis, quod post graves, aut citius opinione interimentes febres, vix quidquam, interdum ne vix quidem compertum sit quod earum gravitati, aut impetui responderet, usque adeo id sæpe latet per quod febres interficiunt!

2. VIR triginta circiter annos natus incidit in febrem lentam, nullo attentione digno symptomate stipatam, nisi quod appetitus erat omnino dejectus. Pulsus, & vires in dies deficient. Tandem ex inopinato moritur. DISSECTIO omnia viscera a Valsalva inventa sunt sana, si hæc excipias. Cystis fellea fusco infectam colore bilem continebat, in eaque calculum, molaris dentis magnitudine, colore pallido, facile friabilem. Intus cavus erat, pluresque alios calculos, eosque nigros, inclusos habebat. Pulmones vero nigris maculis erant distincti. Pericardio parum, aut nihil feri inerat. Sanguis in hoc cadavere erat admodum cænosus, in cordis autem ventriculis coagulatus.

3. Sive lentam febrem, sive malignam fuisse, credas; certe quæ per dissectionem reperta sunt præter naturam, in aliis quoque haud raro occurrunt, qui neque ejusmodi ægrotatione, neque præsertim ejusmodi genere mortis absumuntur. Non ita sæpe accidit, ut in corde ipso ea conspiciantur quæ Valsalva in puero vidit, quem hæctica, opinor, febris sustulit, quanquam nonnulla sunt quæ in viyente, & fortasse etiam in mortuo fuerint, an non, scire aueas.

4. PUER quidam macie confectus obiit. COR

valide cum pericardio necebat: quo simul cum pinguedine separato, per omnem exteriorem musculorum cordis faciem quædam passim disjecta albida corpora cernebantur. Horum pleraque figura, magnitudine, colore parva milli grana referebant: nonnulla autem erant aliquanto majora, figura abnormi. Per diaphragma lymphæ ductus satis manifesto apparebant.

5. Sed jam ad ea transeamus, quæ idem in tribus sceminis observavit, ad aliud febrium genus attinentia.

6. MULIERIS annorum triginta, temperamenti biliosi, duplici febre tertiana jam diu laborantis, abdomen baculo percussum est. Excepta in S. Mariæ de Vita Novocomium, de abdominis dolore tantummodo querebatur. Sed tertio ex quo percussa fuerat die cœpit delirare. Pulsus erat parvus, & celer. Non semel vomitu humorem ejecit, aquæ similem, in qua caro recens lota est. Tandem aucto in dies morbo, interit. ABDOMINIS muscoli confusi reperti sunt sic tamen, ut neque exterius, neque intra ventrem ullum extaret contusionis indicium. Hepar subalbam ad duritiem nonnihil vergebat: ejus vesicula quæ insigni erat magnitudine, bilis atro colore infecta, tres circiter uncias continebat, cujus portio aliqua etiam in ventriculo inventa est. Reliqua in ventre secundum naturam. In Thorace pulmones quæ vertebrae spectabant, magna erant phlogosi affecti, cætera sani. Dexter ventriculus cordis medio-crem polyposam concretionem habebat.

7. Qui abdominis ictum, & de illius dumtaxat dolore querelas spectasset, cætera quæ consecuta sunt, læso inde alicui ventris visceri tribuisset. At dissectio quidquid in jecinore vitii fuit, ad diuturnam potius illam febrem attinuisse, ostendit, Valsalva judice, qui huic Observationi titulum adscripsit De Tertiana duplici, sive totum id vitii credidit ad hujus causas, sive ad effectus pertinuisse. Quid ad illud occasione ictus accesserit in biliosi temperamenti muliere, inspectum cerebrum fortasse, ut delirium indicat, significare potuisset. Nam quod ad magnam pulmonum phlogosim spectat; quis pro certo affirmet, cum posteriora teneret, non eam potius, ut alias (d) admonuimus, & passim videmus, fuisse a supino cadaveris posita? quod ad insequentem historiam quoque dictum putato.

8. VIRGO annorum duodeviginti multos jam dies laborans tertiana duplici, deinde ardenti febre correpta, capitis, & totius corporis dolore vexata, moritur.

IN VENTRE ad ilei intestini finem, quæ parte mesenterio annectitur, multa prominebant corpuscula, quæ magnitudine, forma, colore grana referebant pulveris pyrii. In utero plura protuberabant rotunda corpora, glandularum instar: quibus disrupis, viscidus humor prodibat. Præter hæc, omnia in ventre secundum naturam modum. In Thorace autem pulmones quæ dorsum respiciebant, leviter inflammati: & in cordis ventriculo dextero polyposa concretio.

9. Sive rotunda ista corpora exstabant in exteriore, sive in opposita uteri facie, sive item nigra illa corpuscula, vel potius puncta hanc, aut illam intestini faciem tene-

(a) Obs. 57. §. 11. (b) Obs. 62. §. 8. & 9. (c) Ibid. §. 10. (d) Epist. 4. n. 13.

fius (o), neque Actius (p), neque Paulus (q) ex Arabica, sed ex Græca Schola extiterunt; eorum tamen nemo remedia commemorare omisit, quibus devoratis, aut epotis sudores ciantur: quin duo ultimi peculiare de Sudorificis caput conscripserunt. Nec vero hæc eo dico, quod putem, istdem eruditissimis Viris non æque ac mihi esse nota; sed ut intelligas, nimio certa quædam remedia improbandi studio aliquando fieri, ut eorum quæ probe scimus, oblitum esse videamur.

21. Itaque in febrium epidemicis Constitutionibus prudentis Medici est nulli præjudicata opinioni mordicus adherere, sed per se attente animadvertere quo vergat natura, neque ex una observatione, aut fortuita curatione quid in cæteris sit faciendum, existimare. Vidi ego mulierem febri continua laborantem, quam & brachio sanguine emisso, in quo parum feri fuisse memini, illico multo gravior corripuit febris, insolita hæc accensio inquit. Et sane vera illa fuit intermittens febris accessio, quam postmodum altera excepit, & intra quartum diem mulier febre soluta est. Salubris igitur exitit quæ a primo metu incusserat, gravis illa accessio quæ sanguinis missioni continuo succcessit; siquidem febris ex continua facta est intermittens, quæ cito, & facile per se abiit. Sed fortuita mutatio ista fuit, & vel sine ulla sanguinis emissionem, ut puto, adventura. Non est opus exempla alia, crebris inter medendum obvia, addere, ut quid mihi velim, intelligas. Verum non in eventu dumtaxat febrium, sed & in prognosticis eventus indicia quæ fortuito ab his quæ non fortuito significant, sunt discernenda. Inter hæc vulgus etiam ponit, ac læte aspiciat pustulas, & ulcuscula, quæ circa labra oboriuntur, fortasse non peperam. Nam Albertinus quoque (r) illa fæchatur esse etiam crissum, quæ post sequuntur, indicia, & ipse, nec semel, animadverti, eventum spei respondisse, quæquam in continua pessima febri fecisset sperantes, memini; tamen per se, non post terrorem, & decimo quarto morbi die apparuerint, & simul urina cum aliquanti ardore mitteretur: quæ cur ego hic adnotaverim, facile intelliges, si Commerçii Litterarii certa quædam inspexeris loca (s), ad ulcuscula hæc laborum, pustulasque spectantia. De hoc signo tamen non tot ipse habeo Observationes, quot vellem.

Sed aliud quod casu, ut fit, animadvertere cœperam in urinarum inspectione, quam rarissime accidit ut falleret in permagno numero Observationum. Eo enim attentius, sapientiusque adnotare perrexi ex quo in duos gravium Medicorum incidi locos, quos, alia quantumvis de causa, in Sepulchreti hanc Sectionem (t) relatos videbis, Jouberti, & Gradii; Jouberti, inquam; neque enim verba quæ ibi, tanquam Schneideri, describuntur, huius sunt, sed Jouberti ab ipso diserte laudati Tractatu de Arthritide libro 1. cap. 6. quomodo Schneiderus erat citandus non Cap. de Arthritide, & certe alibi, in Sepulchreto (u) ubi Scholii cuiusdam partem maximam ex Schenckio (x) sumptam esse, animadverti, Jouberto verba illa tribuuntur. Hic igitur arenulas febricitantibus non paucis (maxime morbo jam defunctis) copiose cum urina mingi, scripsit, nulla vel præsentem, vel præteritam etiam nephritide. Gradius vero olim docuerat, arenas apparere in declinatione febrium, & post longas febres: distinguuntur autem ab illis quæ significant calculos, quoniam si fricentur digitis comprimendo, facile dissolvuntur. Porro ego non in febribus solum, sive essent vernæ, aut æstivæ, sive autumnales, aut hyemales, sive intermittentes, sive continuæ, sive benignæ, sive malignæ vel cum periculis junctæ, sive inter illas mediæ, aut interdum levissimæ, diuturnæ, aut breves, sive in pueris, aut adolescentibus, sive in viris, sive in mulieribus, & his aliquando etiam prægnantibus, sive demum ex frequentioribus causis ortæ, sive interdum ex singularibus, ut ex ingesto erodente veneno; non solum, inquam, in febribus, verum etiam in nonnullis aliis morbis, a febri sejunctis, & nominatim in capitis acerbis doloribus, & apoplecticis quibusdam affectibus, nonnunquam etiam senilibus, animadverti, quotiescunque istæ arenule apparuerunt, sapientius quidem febrem, aut morbum fuisse aut finitum, aut fini proximum, sed haud raro tamen cum vel declinare necdum cœpisset, vel, si cœpisset, non ita manifeste declinare pergeret, ut dubium adhuc eventum magis quam vellem, non relinqueret. Quemadmodum autem in morbi fine, aut in

declinatione jam certa, & in dies majori facta naturæ victoriam confirmantur; sic ante declinationis initium, aut in dubia adhuc declinatione eandem victoriam ut plurimum portenderunt; namque ut morbus feliciter omnino desit, aut, si recidiva secuta est, ea levior, breviorque fuit. Semel dumtaxat, quod ad te alias (y) scripsi, hydropi qui febrem exceperat, soluto morbi alii graves, neque ita breves sed ii quoque ejusmodi, ut ex iis æger convalesceret, successerunt. At semel omnino ægri interitus ex autumnali maligna febri, quem ego neque ante, nec post illum unum diem invisi, ut febrius, an peccatum aliquid postea aut ab ipso, aut ab assidentibus, aut a Medico occiderit, pro certo nesciam, ut neque an arenæ illæ toto morbi tempore fuissent, an eo primum die apparuissent. Neque enim de iis loquor quæ semper, sed de iis tantum quæ vigore morbi ad declinationem jam accedente, aut hac inchoata, se prodere incipiunt adhaerentes superficiem, ut Gradius (z) ait, urinalis; non urina, ut in Sepulchreto (a) descriptum leges, ubi ne liber quidem in quo hæc scripsit, indicatur. Nempe lotium in præclara luce inspicies, animadvertes vitæ matulæ lateribus arenulas tenues adhærentes, nonnunquam tamen simul in urina superficie natantes, subrufas ut plurimum, subalbas per raro, quales in Juvene quodam cum febri maligna, & peticulis stipata declinaret, vidisse memini.

22. Facta istius Juvenis mentio ad memoriam redigit sanguinem, qui in ejus morbo quater, alias ex incisa vena missus, alias per cucurbitulas eductus, præterquam quod æquo fluidior, seu molliori crassamento semper fuit, tribus certe postremis sive missionibus, sive educationibus hoc circumfusus fero habuit quasi a commissa chylo albescente. Quod non adnotassem, si in bene pasto, ut alias, & certa a sumptis alimentis hora id vidissem. Sed insecuto mense alteri quoque Juveni sanguis missus tertia, & rursus quinta morbi die, utraque serum albicans ostendit, exigua quidem copia, imò ad paucas omnino guttas tertia illa die, cum esset crassamentum durum, & crusta obductum mediocris crassitudinis, quod fuit quinta mollius quam par sit, & obductum crusta non minus quam ipsum, crassa, nec dura illa quidem, sed ita tenaci, & sectioni resistente, ut cultro vix ac ne vix quidem scindi potuerit. Hic vero alter Juvenis febri laborabat, quæ ad malignitatem potius vergebat, quam esset maligna, multo priore illa tum brevior, tum levior, & sine peticulis. In aliis autem malignis febribus in quibus hæc apparuerunt, neque albicans serum vidi, neque molliissimum, imò hoc interdum æquo durius, quin durissimum in aliquo cui folebat alias esse mollius. Præterea memini, cum super febribus quasi pestilentibus, quæ passim A. 1731. veris tempore in ea parte agri Patavini fævebant quæ circum Montaneanam est (sic enim sunt qui nunc dicant; Montanianum Petrus Bembo (b) dicebat) duo ex hoc Gymnasio Medici, mandato Amplissimi Venetorum Magistratus consuleremur, expositum nobis esse, etiam initio ægrorum sanguis nimis ut plurimum solutus, tunc autem nimis concretus appareret, utroque tamen Constitutionis illius tempore peticulas se prodidisse, & vel tunc æqui forte dissolutum haberent sanguinem, his quoque promiscue non secus ac cæteris, easdem provenire; ut proclive esset intelligere, malignam quidem illam vim, quæ in quam pauca, & tenui materia confisteret, communicatio morbi per contagium ostendebat, illam, inquam, ut in una eademque eodem loco, & tempore Constitutione, unam eandemque esse; at sanguinem, ut in his, illisve erat aliter dispositus, ita in aliis aliter vitiatum apparere: Atque ut aliud in aliis manifestum sanguinis vitium tum alia, aut aliter in aliis quædam symptomata induceret, tum alia quædam, aut aliter in aliis remedia posceret; esse tamen & quædam tum symptomata, tum remedia omnibus communia, quamquam illa his multo notiora: quis enim malignæ illius vis communiter omnes inficientis peculiarem naturam, nisi ex iis quæ communiter omnibus proficua, aut noxia observata essent, quædantenus conjicere se posse, crederet? Neque enim est febres hæc non omnino essent pestilentes, hic cogitare quis posset cum celebri de Re Medica Scriptore, ægrorum robur non maligna vi, sed copia sanguinis obrui,

obru, quando præcesserant causæ quæ hanc minuerent potius, quam augerent, & sanguinis missionem experimenta jam satis superque repetita ostenderant perniciosam.

23. Coniungi igitur cum maligna vi solutionem aut coagulationem sanguinis, in neutraque harum malignitatem consistere, credibile est, præsertim cum alterutra in tot aliis, qui maligni non sunt, morbis videamus. Attamen ubi alterutra magna sit, & adjuncta habeat symptomata quibus malignitas significetur, ut in primis citam maximamque prostrationem virum; quæ neque in prægressis evidentes causas, neque in nimiam rejici possit, obruentemque sanguinis copiam; ipsa quoque, ut quæ creberrime, & gravior quidem addens symptomata, cum malignitate solet coniungi, hanc quodammodo comprobabit, velut in multis, in eaque etiam quam ex Mediavi nostro subijciam, Observatione.

24. MULIER annos nata ad quinquaginta, maligna evidenter febri correpta, in Nosocomium illata est. Pulsus diebus sex primis exigui, & obscuri, vix quidem postmodum sunt paulo vividiores fieri. Sed ingens pectoris in respirando angustia, & cordis palpitatio ingruentes, intra biduum mulierem confecerunt. THORACE propterea dumtaxat aperto, sanguis repertus est in sinistro cordis ventriculo semiconcretus; in dextero autem non modo sic congegit, ut ipsum distenderet, sed totus in concrectionem polyposam adeo conspissatus, ut quamvis hæc carne, cum aspiceres, videretur; non minus tamen, ubi incidere conareris, cultro obfisteret, quam tenacissima quævis crusta, sanguini insidens pleuritico.

25. Sanguini autem concrectionis, sive, ut plures loquuntur, coagulationis num causam afferant acida, ut idem autumant, an est quædam afferant acida, non omnia tamen, ut aliis videtur, aut afferant, aut afferre pergant, si forte ex me queras; simul dicam, alias præter acida esse posse causas unde sanguis concrecat, simul quædam meas in misso e venis ægrorum sanguine attente, propriusque inspectando observationes adjiciam. Et primum, cum ego, idque non semel, in sanguinem inciderim, qui acidum quandam odorem nauseosum, atque, ut ita dicam, sylvestrem exhalaret; nunquam accidit, ut quamvis in pluribus malignis morbis sanguinem mittere coactus sim; ut in eo sanguine acidi odoris quidquam deprehenderem. Deprehendi autem in femina quam assidue æstiva febris, itemque in viro, & sexenni puero, quos vernæ intermittentes, benignæque, ut illa, tertianæ, alium alio anno exercebant, in quibus vena certis quicquid de causis secari debuit. Durum quidem puero, & perpaucum cum fero crassamentum fuit; mediocriter autem firmum in illa femina, eoque viro, & in hoc certe cum fero potius paucum, eoque sublavio. Quo etiam in viro accidit, ut cum odorem illum quarta a missione sanguinis hora animadvertissem; post alias septem percipere vix possem, non obscuro indicio, fuisse ejus causam in corpore facilius avolantibus, quam a cæterorum sanguine, in quo post decem aut duodecim horas vigentem perceperam. Nec in iis solum de quibus indicatum est. Nam vel ubi nulla esset febris, ut in recurrente acerbis capitis dolore, itemque ut in scabie, idem sanguinis erat odor, plurimo fero præditi circum crassamentum tenaci crustula obductum, in illo tamen cui caput dolebat, non ita durum, & nigrum, ut in scabioso; quamquam uterque scabiosus erat. Ne vero sanguinem putes in scabiosis omnibus acidum olere; in aliis non oluit, ut neque in Viro Nobilissimo quem erodens cutem crustosa affectio, introrsum temere iis diebus repulsa, male habebat, sanguine sub lentissima crassa pelle diffuens crassamentum habente. Quin illi eidem scabioso cujus secundo loco memini, cum esset quater intra quinq; menses sanguis emissus, ex hoc acidus odor exstitit, non nisi semel. Sed ejusmodi sanguinis haud ita raram, ut vides, affectionem mittamus, ut multo rariorem, quæ Patavii anno ab hinc decimo, non olfaciendo, sed tangendo percepta est, consideremus.

26. Catharina B. honesti viri Josephi R. honesta uxor, mediocri statura mulier, temperatura autem sanguinea, ut cum annum agenti decimum tertium menstrua cepissent, nec copia modica, eadem, vel majori fluere singulis mensibus perrexerint, etiam lactanti, & lac multum post primum, alterumque partum; bis enim peperit; gigantem, tum etiam postea febre inflammatoria quotannis & vere, & autumnis, idque annis duodecim, laboranti, tamen crebro ob eam febrem sanguis mitteretur, imò et si primam earum febrium tanta ex utero hæmorrhagia exceperet, ut ultra undecimum diem perdurans, magnam pulsuum infirmitatem afferret, quam & morbus regius secutus est; post duos tandem menses, promotura urinarum copia solutus: hæc igitur mulier, cujus temperatu-

ram, morbosque omnes ut tibi hæcenus memoravi, ita sum insequentes memoraturus propter illas causas quas, narratione absoluta, attingam; cum annum agens undecimum de funesto carissimi fratris casu improvvisum nuncium accepisset, animoque, acri alioquin, & intrepido, illico defecisset; ad se rediens, menstrua, in quibus tum forte erat, emanasse, animadvertit, postmodum autem iterum vidit, non qualia antea, sed aquæ instar in qua caro recens lota est: cujusmodi, insecutis deinceps aliquot mensibus, stans temporibus prodire. Quamobrem missus est sanguis, nec semel, mox autem sapius in gravissima abortiva febre, quæ sudore finita est. Verum post hæc ad priorem naturam menstrua rediere, neque ipsis oblitum duplex tertiana continua febris, quæ verno tempore quotannis, idque ad decennium, revertens, non nisi iterata sanguinis missione, & dato cortice Peruviano, discedebat. Post id decennium, æstate febres ejusdem ferme generis ingruerunt, sed eo acerbior, & periculosior vexantes, quod sævos conjunctos habebant totius ventris dolores, uterique hæmorrhagiam, tunc fere magis augecentem, cum illi nonnihil se remittebant. Pugnatum est modis omnibus, in his sexies repetita sanguinis missione, cujus serum croceum erat, crassamentum autem durum, & crusta polyposa obiectum. Sed quamvis & febris, & illa symptomata nonnunquam imminuta sint, nonnunquam, ut videbatur, sublata; non tamen his omnibus est finis impositus, nisi per ipsam, magna, si unquam, copia reveriam uteri hæmorrhagiam die ex quo febres inceperant quadragesimo quinto. Cito nihilominus convaleuit mulier, atque ita convaleuit, ut triginta quinq; a postrema hæmorrhagia exactis diebus, mensibus rursus secundum naturam modum redeuntibus, iustoque tempore semper recurrere pergentibus, viginti ipsos menses egregie valens traduxerit. Sed posteaquam ætate A. 1749. magnam, siti cogente, aquæ vim sine ulla stomachi molestia sapius bibisset, quam annis superioribus vel febricitans nullo modo ferre poterat, eo autem qui secutus est, autumnis propter externas evidenter causas corpus laboribus animi ægritudine afficientes, in nauseam, vigilias, dolorem capitis, lassitudinem incidisset; illud accessit proxima hyeme, ut cum thorax, & caput valde æstarent, venter, artusque inferiores frigerent, nec vestibus, nec ullo alio auxilio satis a frigore defendi possent, itemque ut horrore per dorsum vagante corripere per arandio, noctu autem magis cum in lecto se ex uno in alterum converteret latus: quin etiam tremoribus, siquid somni caperet, & repentinis terroribus excitaretur; quamquam nec deerant diurni quidam, falsam certe quadam in re imaginationem consequentes, ob quos identidem animo deficiebat. Hinc illa omnia de quibus novissime dictum est, in dies augebantur, & internæ oppressionis sensus urgebat, caputque in primis grave adeo factum erat, & vertigini obnoxium, ut mulieri fulcro opus esset, ne caderet. Agebat tunc annum quadragesimum tertium, cum Medicum accersivisset suum; is a quatuor annis jam erat Mediavi noster; eique ipsis Nonis Maji A. 1750. hæc narravit omnia, illudque insuper quod in ejusmodi muliere præcipua est adnotatione dignum, menstrua, quorum copia quæ semper fuisset, ex superioribus intelligitur, & quæ proxima ætate non minor fuerat, tamen bis singulis hæbebant mensibus, & quam confecerant, calidiora, atque adeo calidissima, jam sibi ex quo sic affecta esset, non modo imminuta, sed frigida prodire cœpisse, & frigida etiam novissime prodidisse. Quibus auditis, alvo, cujus adstrictionis mulier semper obnoxia fuerat, confestim, sed leniter, soluta, imperatur sanguinis missio, quo non proficiente, sed lentius defluente, illud quod prolixæ hujus meæ narrationis causam præbuit, simul ab ægra, simul a Chirurgo, spectata fidei æque, ac experientia viro, Daniele Fasolato summa cum utriusque admiratione animadversum est, sanguinem, cujus exeuntis vehementem fervorem & illa alias, & Chirurgi, vas quo excipitur, vitreum manu tenentes mirabundi interdum perceperant, nunc adeo frigidum prodire, ut ægra de gelida; sic enim agebat; percubiti flexuram defluente quereretur; Chirurgi autem manus frigore afficeretur. Paucum, & croceum ejus sanguinis serum fuit; nigrum, & viscidum crassamentum. Cujusmodi & frigore, & ferme etiam natura fuit is qui vespere missus est de pede. Cum prope nullum esset hinc, & a remediis quibusdam, ut vocant, cardiacis levamen relatum; non dubitavit Medicus in ejusmodi præsertim femina, quo sanguis in majorem motum concitaretur, postmodum & brachio, & pede mittere eodem tempore. Et voto respondit eventus. Nam & sanguis prodit non adeo frigidus, & dum prodiret, demum sibi oppressionis sensum, mulier agebat, & vespere

(o) Melic. Collect. 1. 8. c. 17. & de Vict. Simpl. ubi de Calamintha. (p) Medic. tetrabib. 1. Serm. 1. ubi de ead. & Serm. 3. c. 48. & 159.
(q) De Re Med. 1. 1. c. 48. (r) in Opus. de Cort. Peruv. Tom. 1. Comment. de Bonon. Sc. Instit.
(s) A. 1725. Hebd. 3. & A. 1737. Hebd. 28. (t) Obf. 40. & Schol. (u) J. 3. Sect. 25. in Schol. ad Obf. 14.
(x) Obf. Medic. 1. 3. ubi de Ren. Symptom. Obf. 5. (y) Epist. 8. n. 30. (z) Prax. in Non. Almanac. tr. 3. c. 14.
(a) in Schol. cit. (b) & rum Venet. Hist. 1. 9. & 1. 10.

oborta febricula, noctu inferiores partes, quæ superioribus mensibus semper riguerant, nonnihil calefecit; mane autem remisit, & mulierem mox reliquit. Bene hæc se habuit dies decem, inferioribus artubus tepidis, pulibus qui duri, parvi, humiles, prementi digito non resistentes antea fuerant, nunc oppressione sublata, in melius conversis, urinisque ipsis quæ prius, ut multæ, sic crudæ, & limpide exercebantur, jam ad naturalem modum, coloremque accedentibus.

27. Accipe nunc reliqua; neque enim satis esse, duco, quæ prægressa, & comitata sint ejusmodi sanguinis affectionem proposuisse, nisi & quæ deinceps consecuta sunt omnia ad certum usque tempus memorentur. Igitur decimo exacto die, ecce levis dolor eam partem metatarsi sinistri pedis invadit quæ digito pollicis respondet, brevissimus ille quidem, ut cum semel primo die, postridie autem tredecies ingruerit, intra semihoram quinque recurret, atque ita evanesceret, ut paulo post illo eodem die mulier exire domo potuerit vix aliquo cum incommodo, nisi revertens cecidisset repente, & sine ulla exteriori causa, in latere dextero, nec nisi aliorum adjuva manibus surrexisset, Domum tamen reversa est: ibique levis primum est dolor, postridie autem magna cum febris acutus adeo, atque assiduus rediit, ut totum illum diem acriter vexaret, nec nisi opio dato quieverit. Insequenti die sine dolore, & febris fuit; ut bene habens electo surrexerit. Die autem proximo convulsione pectoris, & colici vehementi correpta est. Deinceps a febre, & dolore, quibus se magna addebant convulsio, male habita est, remittentibus quidem interdum vel ad triduum, alias vero perstantibus, aut invalescentibus adeo, ut vix spiritum ducere liceret, & denique caput gravi sopore premeretur. A prima illa convulsione dies undecim cum morbo pugnatum est alias dato oleo ex dulcibus amygdalis recens expresso, alias antispasmodicis pulveribus ejusdem generis ac qui a Marchione nomen habet, cinnabari interdum, nonnunquam opio, quod in medio morbi cursu defectum est, cum inutile vel datum ad duogranadeprehenderetur, sæpius autem vena, semel videlicet in brachio, bis in manu, ter in pede incisa, unde novissime emissus sanguis & soporem illum, & convulsionem ferme sustulit, febris superstit, quæ mane quotidie se prodibat siti, ac dolore capitis, & stomachi hæcenus stipata dum ad vigorem perveniret, illis deinde cessantibus, & febris ipsa adeo se remittente, ut vespere nulla esset propemodum, & ægra noctu sic satis dormiret. Quæ febris cum dies aliquot ad eundem modum peristeret, Peruvianum cortice vix ad unciam partem sumpto, mulierem incolumem reliquit. Ab eo tempore triennium sine ullo incommodo tractum est, quod esset adnotatione dignum. Postea autem dolores, febres, convulsiones, alia ejusmodi redierunt, sed prioribus leviora semper, & citius largis sanguinis missionibus cedentia. Ad quæ jam olim a me litteris mandata, hæc placuit addere, quæ cum hæc Epistolæ sub initium A. 1760. describerentur, sedulo a me quaesita de eadem muliere accepi. Anno illam 1758. qui ejus ætatis quinquagesimus primus fuit, menstruis denique purgationibus carere cepisse, quæ ad id tempus & uberrimæ, & coccineæ esse perrexissent. Nihilominus sic satis valuisse, & valere, nisi quod fere assiduus in ventre est glaciæ sensus: qui cum inde ad pectus ascendit, eam affert respirandi difficultatem, ut continuo sanguis, neque copia modica, mittendus sit. Nec deesse quæ id ferant, vires mulieri, bonum adhuc & corporis habitum, & faciei colore servanti.

28. Habes de affectione sanguinis haud minus fortasse admiranda quam cum apud Lowerum (c) in immensi hæmorrhagiae totus propemodum effusus, simul autem junculis identidem sumptis instauratus, hisquamfibi similior efflueret, hominem tamen non vivente modo, sed sanitati restituto; habes, inquam, omnia ex Medici nostri Medica ephemeride, prolixè a me quidem, sed, ut puto, haud inutiliter excerpta. Quanto enim difficiliores hujusmodi res habet explicatus, tanto diligentius danda opera est, ut ab iis qui explicandam forte fuscipiant, nihil ex historia desideretur, secus atque in aliis accidit in quas hæcenus incidi, Observationibus ejusdem generis. Ut enim quod Spigelius noster (d) scripsit de sanguine crasso ac frigido, quem e secta vena post frigidam ab æstuantibus epotam vidit, nec sine difficultate, prodeuntem, omittam, quippe cum potius ab æstophagi frigore intra aditam arteriam Magnam densorem

crassoremque factum, quam actu frigidum videatur intelligere; certe quæ Observatio olim apud Riverium (e) proposita est in muliere admodum iracunda, quæ intra quintam a secta vena diem interiit, tantum abest ut sciamus, quibus prægressis causis, aut comitantibus symptomatibus febris illa esset qua tunc assidua laborabat, ut Thomæ Bartholino (f) per divinationem, ut ita dicam, conjiciendum fuerit, horrorem perpetuum illi febris comitem fuisse. Petrus autem Borellus (g) satis hoc habuit scribere, equitum ducem sanguinem frigidum, in morbo plebotomatum, emisisse; ut ne morbum quidem quo tenebatur, aut quis id retulerit, doceamur. Sed & explicationem addit ejusmodi, ut mirum sit, non jam contigisse id nonnunquam, sed potius non semper, aut non multo sæpius contingere. Denique Gabriel Clauderus (h) explicationem producit aliam, secundum quam in gravissimis apoplexiis semper, aut plerumque id accidere deberet; idem quod apud Riverium est, ait, se in duabus Matronis violento paroxysmo apoplectico correptis observavisse, profliente videlicet, dum e vena emitteretur, in suam quoque manum frigidum sanguine; illarum autem utramque per adhibita, ac data volatilibus secta particulis medicamentis restituisse. E vena autem mulieris nostræ haud profluit sanguis, sed leniter defluxit; ut aliquanto facilius huic suam, qualis ea cumque est, Clauderus explicationem accommodasset. Idem subjicit (i) sanguinis frigidi e naribus stillantis, & urinæ frigidae prodeuntis Observationes. Quod si contigisset, ut scriberet; adjicere potuisset alias tum loci frigidi emissi, ut puta a milite (k), & a puero (l), utroque maligna lethali febre prægravato, hoc insuper jam toto frigido, tum foetus gelidi ejus, non solum jam mortui, & a gelida jam matre, ac mox intra horam moritura (m), sed & vivi a viatura (n) ea toto corpulculo frigiditate intentissima, & ea rigiditate plane insolita & quasi lignea, ut ab ortu ad triduum quod vixit, nisi respirasset, idque admodum leviter, pro mortuo ab omnibus habitus omnino esset. Neque exemplum omisit Clauderus illustri Fœminæ (o), cui aliquot ante mortem diebus exspiratio semper fuerat frigidissima, in extincta autem cum pulmo uterque copiosius haberet scirrhus & vomicae, sinistram tactu excessive instar glaciæ frigidus inventus est, quale frigus neque in altero pulmone, neque in ulla alia corporis parte observabatur. Sed nos & mortuos, & cito morituros seponamus, eosque dumtaxat quos servare potuit Clauderus, quamvis frigidus e naribus sanguis stillaret, aut urinæ frigida prodiret, cum muliere nostra, quæ ipsa quoque servata est, comparemus. Certe & ægræ nostræ menstrua frigida proveniant: quamquam satis discriminis est inter sanguinem ex incisa vena statim manantem, & sanguinem in narium, uterive, ac vaginæ caveas stillantem excidentem, humoremque tandem, postquam e sanguine secretus est per viam longissimam defluentem; ut aliquanto minus difficile sit intelligere, quomodo hæc frigiditas exire, quam quomodo in vena sanguis frigidus esse potuerit. Quod si ut inferiora, ita superiora etiam corporis in ægra nostra tunc friguissent; fortasse alicui veniret in mentem dicere, cum reliquis sanguis qui per viscerum penetralia interea fluere, sic satis calidus, vitæque servandæ aptus esset, cum dumtaxat qui per exteriores venas, ipsique cuti subiectas ferretur, ad hujus frigore refrigerari potuisset. Verum ne huic quidem explicationi, cujusque modi ea sit, hic ullus est locus. Nam & superiora æstuant, neque mulier de sanguinis defluentis frigore conquesta esset, nisi cutis minus quam sanguis, fuisset frigida. Quæ igitur ratione sanguis possit non modo qualis in piscibus est, sed frigidior in viventibus, victurisque hominibus interdum esse, ipse quo ingenio es, disquires. Mihi vero, cui historiam summa fide proposuisse, cum aliisque comparasse satis est, ad alia quæ tamen miranda non sunt, ipsa ad memoriam revocavit, est transeundum.

29. Cum Bononiæ degerem, honestus vir quotidie frigore corripiebatur, quod et si nullus sequebatur calor, de duobus nobilibus Medicis alter pro febre, alter, quoniam æger, eo frigore correptus, cadebat, pro vertiginoso affectu malebat accipere. Perfunctus est usu cardui benedicti, & spiritus salis ammoniaci. Mulierem quoque memini annos natam ad quinquaginta in illud S. Mariæ de Morre Notoconium exceptam, singulis noctibus a certa hora ad matutinum usque tempus frigore

gore prehendi cum tremore, quem pulsus non crebrior quidem, sed obscurior factus, neque aliud præterea comitabatur incommodum, neque calor sequebatur febrilis. Quin pedibus erat assidue frigidis, & sæpe aliis quoque, sed incertis, horis brevi frigore, tremore, & pulsus obscuritate corripiebatur. Cum viginti jam dies res ad hunc modum se haberent; dato cortice Peruviano, primi omnium erratici illi rigores abiire, periodici autem remiserunt, demum hi quoque sine redeundi facto, incolumem fœminam reliquerunt. Sed hi ad febrem sui generis spectare mihi quidem sunt visi. Tremores autem alios, febrilium quidem simillimos, sed cum vero frigore non conjunctos, nedom calore nullo exceptos, quos mea Civitatis Patricium Virum alterius noctibus invasisse, scio, alio retuli, ipsosque multis sponte urinis, multisque lenis pharmaci auxilio per alvum ejusmodi sublatos vidi sine illo cortice: quamquam periodicos quosdam affectus, five febriles ii sint, vel absque eo sæpe abigi, nemo ignorat, five non sint, eo nonnunquam pervinci, a pluribus adnotatum est.

30. Cujus vi corticis tibi perpaucas, in quibus minus respondere visus est, Constitutiones excipias longe certius, si quidem eo quo par est, & tempore, & pondere sumatur, febres profligari periodicas, five illæ intermittant, five ex intermittibus jam sint factæ assidue, five benignæ, five malignæ sint, & perniciose, nunc ferme inter omnes constare, arbitror, quando vel quotdam nostrates Medicos, quos timor olim, & avertatio nescio quæ a corticis usu absterrebant, felicissima ejusdem ope, promptissimeque pernicioforum febrium curationes, quas a nobis quoque in pluribus, splendidisque etiam personis jam ante multos annos peractas viderunt, in meliorem adducere potuerunt sententiam. Sed juxta quo remedium hoc exhibendum est, temporis notitia medentes fugere nonnunquam potest non tam eorum in præsentendo imminente perniciem incuria, quam casu, velut accidit in Cardinali Eminentissimo Joanne Francisco Barbado, quem exitialis febris accessio propemodum sustulit priusquam febre teneri ipsum periodica, sciri posset. Res per se, nedom quia in principe Viro contigit, cujus tibi alias (p) novissimum morbum descripsi, sane digna est quæ commemoretur. Cum enim ita tum sub meridiem se in cubiculum inclusisset, neque ostium hora qua solebat, recluderet; famuli, nihil primum, nisi sacris precibus, ad lectione diutius detineri, postea autem cum jam advesperasceret, mali aliquid suspicati, ostium leniter, deinde cum responderet nemo, validius, sed frustra, pulsantes, inclamantesque, denique per fenestram ingressi, herum sine voce, sensu, motu jacentem invenerunt. Accersitis confestim Medicis præter hæc mala, quæ tamen magis magisque jam remittebant, convulsivos tendinum subsultus, febrimque deprehendit. Quæ, cæteris illis omnibus intra horulam per se abeuntibus, una restitit. Postridie mane Vallisnerius, & ego advocamur. Quæritur, quis, & unde fuerit febris solverit, ut videbatur. Narrat Medicus, erysipelas non multis ante diebus in facie apparuisse. Verum aeris fortasse injuriis: erat enim autumnus A. 1729. æger autem magis de suis Episcopalis munus, quam de se, sollicitus, nunquam decumbere voluerat, neque intra cubiculum se continere; intorsum repulsum, de improvviso evanuisse. Hæsterni morbi se nihil nisi finem vidisse: quem autem ad modum ingruisset, ne ægrum quidem scire, cum quid sibi tot illis horis accidisset, neque tum sensisset, nec modo aliud reminisceretur, nisi se, quasi a tempestate frigidulum, lectum petivisse. Hæc eadem æger confirmabat, quem alacri, ut solebat, erectoque animo invenimus, jam levius leviusque febricitantem, nullo eorum quæ pridie fuerant, vestigio superstit. Quæ tamen quem proprie ad morbum referremus, non una de causa dubitabamus; aliquid tamen monstri intus ali, cum Hippocratis aphorismus (q), tum ratio quodque ipsa dubitare non sinebat. Hanc igitur, illumque secuti interea dum clarius aliquod lumen existeret, materiam erysipelatis, quæ intorsum regressa, magnum ut jam cepisset, posse rursus afferre periculum videbatur, & Medico, Seni utique experienti, & spectato, assensum fumus, qui jam prima illa nocte iis datis quæ sine turba ad cutem ferrent, obsequentem naturam habuerat, ut & noctu sudor, & tunc aliquis adhuc mador sequeretur. Et toto quidem illo die novi, quod animo

madvertemus, nihil fuit. Sed nocte proxima ecce febrilis accessio, quæ tamen præter quoddam convulsivos tendinum subsultus, nihil quidquam grave ostendit usque ad meridiem. Quo demum tempore aut eadem, aut altera potius accessio tot simul, tamque horrida mala protulit, ut continuo omnes arcesceremur. Ægrum invenimus, qui nec loqui, nec percipere quidquam posset, cum difficillima respiratione stertentem, apoplectici similem, nisi assiduis tendinum subsultibus ageretur, pulibus autem perobscuris, & nihil prementi digito resistentibus. Tunc enim vero manifestum fuit quo nudius tertius morbo correptus esset, hancque esse alteram perniciosissimam tertianæ febris accessionem, quæ primæ illi, ut hora, ita etiam gravitate, & numero symptomatum responderet, vel potius antecelleret. Nec spes erat per ea quæ exterius dumtaxat tunc facere liceret, imminens exitum retardandi, cum mala omnia, quæ modo diximus, magis magisque sub oculis, manibusque nostris ingravescerent; ut ex iis qui viderunt, complures autem viderunt; fuerit nemo, quin pro certo haberet, ac per urbem totam inexpectato optimi Pastoris casu percussam, pronunciaret, mox esse moriturum. Quo est in metu ego quoque eram; speculæ tamen aliquid superesse, dicebam, si forte hæc pariter accessio, ut prior, remitteret, si non eadem hora, quippe gravior, at una, aut altera tardius. Itaque ab oculis Medicis, sub vespere, tanquam a conclamato, discedentibus, quævisi, num quidquam, si accessio remitteret, obitare crederent quo minus Peruvianum corticem darem: illi vero, si modo fieri posset, ut interea neque in cerebro, neque in pulmonibus sanguis pertinacius hæreret cepisset, assensum se, responderunt.

Intra primas noctis horas paulatim pulsus minus malos fieri, & apparere sudorem, animadverti: deinde sensim pariter, sensimque ægrum ad se redire, & intra eam noctem, qua ipse domum reverti nolui, exitalia omnia symptomata prorsus evanescere; ut summo mane, restituta deglutendi facultate, & febris ad justam remissionem perducta, jam esset remedium locus. Quod, sicuti in ejusmodi gravissimis periculis facere cum Eximii Medicis solitus sum, tum ex iisdem corticibus apparari antea jufferam, non quorum species sensum dumtaxat fallaci interdum indicio se magis commendaret, fed quorum ope intermittentes febres pro certo abactas esse, constaret, tum ad semunciam in primo haustu sumendum dedi; reliquum autem, quod triplum erat, in multo minores partes per justa intervalla distribui. Eaque ratione consecuti sumus, ne ingrueret accessio tertia, procul dubio ægrum, quem secunda prope consecerat, sublatura.

Sed ne secunda quidem ingruisset, si in primæ remissione idem facere venisset in mentem. Non venit autem, introrsum versi erysipelatis, quod certum erat, materiam spectantibus, non febris: quam, non consecutam, ut sæpius solet mala illa gravissima, sed attulisse, & periodicam esse, quis divinaret? quando neque initium ipsius viderat quisquam, neque Patavii ea tempestate febris ulla ejus generis erat animadverta; etsi per illos dies, ut postea novimus, in Civitate non ita distita eadem fuerat, ægrumque illustrem, dum corticis oblatio ab una ad alteram intermissionem differrentur, proxima accessione jugulaverat. Quamobrem tu, cujus gratia hæc scripsi, siquando casus ejusdemmodi incidat, cujus initium ignotum sit, tamen causa esse manifesta videatur; noli omittere de natura febrium, quæ tunc vagantur percutationes; neque enim semper id quod nobis accidit, ut quæ prima perniciosi generis existat, ea tibi curanda obveniat.

31. Nec vero, si æger non senex sit, ejusmodi febris immunem fore, credito propterea quia Doctus Viris ipsam nunc placeat febrem intermittentem senum soporiferam vocare. Eri enim ea ætate sæpius contingit, & septuagenario erat major tum Cardinalis de quo modo dictum est, tum generosus Comes M. Ant. Trento, quem annis ante eam quinque ab eadem febre periclitantem eodem remedio curaveram, eorum neutro, quod minus frequens est, in febrem recidente; tamen & Mortonus (r) puerum duodecennem, & Tortus (s) puellum teneræ ætatis, nedom alium in medio adolescentiæ cursu his, quas *terbargias* appellabat, febribus laborantes, proposuere. Pariter non quia primos paroxysmos, aut primam alicujus paroxysmi partem sine profundo isto sopore ægri transegerint, velim sine metu his, ne in ulterioribus paroxysmis, aut paroxysmi partibus sopor ingruat. Nam quamvis sæpius antea, quin multo antea; non raro tamen septimo demum paroxysmo advenit: & quamvis

(c) Traët. de Cord. c. 2. (d) De hum. corp. fabr. l. 6. c. 2. (e) Obs. communis. 46. (f) Cent. 4. Epist. Med. 47.
(g) Cent. 2. Med. Phys. Obs. 51. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 4. Obs. 138. (i) Ibid. Obs. 139. & 140.
(k) Earund. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 206. (l) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 34. (m) Eph. N. C. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 80.
(n) Earund. Cent. 9. Obs. 30. (o) Commerce. Littér. A. 1743. Rebd. 21. n. 4.

(p) Epist. 13. n. 3. (q) 25. Sect. 6. (r) Pyretolog. Exerc. 1. c. 9. Hist. 25.
(s) Therapeut. Special. ad febr. period. pern. l. 4. c. 3. Hist. 9. & 1.

io ipsa paroxysmi invasione simul invadere plerumque soleat, ut Sydenhamius quoque (r) significat, idque tempus, juxta Harveyi (u) dissectiones mortuorum in principio accessione, remora sanguinis sit opportunum; non desunt tamen exempla gravis soporis non modo aliis paroxysmi temporibus, quod non infrequens est, sed, quod perarum est, hoc declinante adveniens, quale in Commercio Litterario (x) adnotatum videbis. Hic tu indicia fortasse optabis, per quae dum febris a benigna non videtur differre, conicere possis, perniciosum istud symptoma esse adventurum. Id & alii optaverunt non minus, quam noscere si quis forte ante annum 1731. ejusmodi febres observasset. Cujus utriusque voti vel uno lecto, quem laudavimus, Torto, facile compotes fieri potuissent. Qui cum scripta ante finem saeculi XVI. ab Ludovico Mercato, & rursus ante finem saeculi XVII. ab Richardo Morton de Perniciosi Intermittentibus Febribus in celeberrimo Therapeutico (y) non sine additis Scholiis transulisset, perfecit, ut scire omnes possent, Hippocrati, & Veterum non paucis ignotum non fuisse, Intermittentes Febres aliquando malignas fieri, & exitiales (z), tum quibus ex signis Mercatus generatim docuerit intelligere, eas fore perniciosas (a), speciatim vero in illis de quibus loquimur, per timere, ne tertia, aut quarta accessione gravis somnus, vel gravis alia ex soporis affectionibus omnino essentialis fiat (b). Nec vero praeterenda sunt quae Tortus quoque & generatim, & speciatim ex propria observatione signa proposuit (c), & productis suo loco historiis tum ad cetera genera (d), tum ad hoc quo de agitur (e), pertinentibus confirmavit. Quibus cum jungetur quae ab altero Illustri Medico adjecta sunt signa ad hoc idem genus spectantia (f). Sopor autem gravissimus mox adventuri indicium videbis apud Tortum (g) hoc inter cetera, quod aeger interdum balbutiens verba mutilet, vel unum pro alio proferat, non secus ac si levi apoplexia in lingua paralytica degenerante foret deventus. Est etiam apud eundem Vetulae historia (h), cui in febris exacerbatione cum accidisset non modo ut recte verba proferre non posset, verum etiam manifesta aliqua oris contractio, in frequenti exacerbatione cum eodem sopor insuper gravis accessit, in proxima autem, apoplexia, quae in paralyticam dexteri totius lateris transiit, atque ut scias, haec a febre fuisse, usque Peruviani corticis sublati sunt. Intelligis non solum quae soporem, & post hunc apoplexiam interdum praenunciavit, sed simul apoplexici potius generis, quam lethargici istum esse soporem, praesertim cum eo sterore conjunctum, qui cum graviore apoplexia jungi solet. Quae spectantes Sydenhamius (i), alique insulsum hujusmodi Apoplexiae verae similes plane esse, scripserunt, & Tortus ipse (k), tandem, nisi per corticem inhibeatur, fortis Apoplexia instat occidere, Mortonius autem (l) puerum quem supra memoravimus, bis inventum ab se, ait, sterorem, ceterisque Apoplexiae fortissima symptomata affeclum, senem autem Avunculum suum (m) multos jam annos hebetem & somnolentem, apoplexia correptum fuisse, retulit, ejusdem generis, ut insula remittente, utrumque cortice eodem, larga manu dato, servaverit. Senis vero hujus hebetis & somnolenti, & obesi insuper commemoratio, cum historiis aliis conjuncta, & speciatim cum ea quae in Commercio Litterario (n) ab diligenti sane, ac solerti Observatore descripta est, Anus videlicet quae diu antea brachii stupore, & debilitate, mox etiam capitis gravitate, vertigine frequenti, & magna pedum lassitudine afflicta, sopore profundissimo in febris intermittens paroxysmis corripiebatur; haec, inquam, exempla sollicitum facere te debent in febribus intermittens quae homines detineant istis, aliisve capitis ejus generis, aut nervorum affectibus obnoxios, ne forte sopore isto terrifico, aut, ipso etiam non praevio, apoplexia prehendantur. Namque ut ex laudato Observatore (o) exempla suppetunt apoplexia immedicabilis, & apoplexia subito occidentis, quae soporem secuta sunt, sic & alia habemus in quibus absque sopore affectu praegresso, intermittens correptos febribus rapuit apoplexia. Igitur ubi aeger iis erit obnoxios malis de quibus dicebamus; illi praesertim, sicut alii, fac corticem & tempestive praebes, & iusto ut tempore possit retineri cures; is enim quem subito apoplexia occisum retulimus, ne-

quaquam potuit retinere. Quae me res in Comite Trento, simul quasi apoplectico, ut dictum est, sopore, simul nimia alvi lubricitate affecto, eo magis anxium habuit, quod ejus Fratrem annis superioribus repentina apoplexia sublatum fuisse, non ignorabam. Sed in paroxysmi remissione iis quae ventriculum corroborarent; opii enim vel paucillo tunc uti veritus sum; sic satis admittis, ut retineretur cortex, operam dedi. Deus autem meis annuit votis.

32. Non puto, gravius te ferre; non mirari autem, certo scio, quod pro mortuorum ex hisce febribus anatomicis Observationibus, Observationes protulerim in viventibus habitas. Nosti enim cum in ea quae in Sepulchreto est de Febribus Sectione quasdam hujus quoque alterius generis historias (p) proponi, tum praesertim a periculosis dissectionibus me refugere consuevisse. Quo minus, opinor, expectabis sectiones a me institutas eorum quos malignae febres variolis stipatae absumpserunt, cum scias, me necdum variolis fuisse correptum. Neque enim tanti sum animi, ut imitari audeam Theodorum Zwingerum, qui ut in Sepulchreto (*) etiam leges, cum eo nunquam morbo laborasset, puerum eodem occisum dissecuit. At enim, inquis, vel peste ipsa pereptorum cadavera, jam frigida praesertim, dissecta, nocere negarunt Doctissimi Viri. Ego vero hoc legi; sed quid Thomas Bartholinus (q), & Isbrandus Diemerbroeckius (r), qui eosdem legerant, censuerint tamen, animadverti. Nam primus, nollem, inquit, eorum rationibus nimium fidere; alter vero, cadaver, cum jam plane refrigeratum est, multo quidem minus contagiosum est, quam corpus morbosum vivens; contagiosum autem esse, non negavit, imo exemplo suo quid sentiret, ostendit, cum, etsi erat qui carbunculos in ejusmodi cadaveris ventriculo se ipsi ostensum promitteret; (s) sibi, ait, non placuisse irritare crabrones, & aperta abdominis cavitate contagii periculo se exponere: illudque se credere, quam videre, maluisse: & rursus (t) cum in refrigerato cadavere exatubemata per artuum musculos altius pergere, a Chirurgis, se praesente, demonstratum esse, narrasset; an viscera quoque istisdem inficiantur, oculorum experientiam non habeo, inquit, propterea quod licet contagium a dissectione musculorum parvi faciam, iud tamen ex aperiuntur caritatem abdominis, & pectoris furiosius in astantes irruere posse credam. Noli igitur mirari, quod inter quamplurimos esse malim, quam inter paucissimos, ut idem ait (u), iis credentes, qui cadavera pestiferorum contagiosa non esse, asserunt. Quod si paucissimi non fuissent qui iis crederent; putasse, post tot pestilentias, futuras fuisse tam paucas cadaverum in ipsis extinctorum Observationes, quae in Sectionem hanc Sepulchreti referuntur? perpaucas enim sunt, si demas quae ex auditu scriptae, aut quae incredibilia habent, tum quae repetuntur, ut quae Observatione LXII. postquam §. 3. posita fuerat, §. quoque 7. iteratur. Et ne forte suspiceris, Anatomicos ab illorum dissectionibus inani potius metu, quam rationibus fuisse absteritos; has leges simul cum contrariis perpenas apud eosdem Bartholinum (x), & Diemerbroeckium (y). At si illis perlectis, nullum tamen esse periculum quod metuamus, arbitraris; accipe quid in Theatro hoc nostro acciderit corpora eorum dissecantibus quos maligna damtaxat, non pestifera, occiderat febris. Ex petulari, quam vocant, febre mortuum Professor, juvenis valens ac robustus Stegagnonius, haecenus incidit, ut solos dorsi musculos, Diemerbroeckio fortasse credens id parvi facienti, appareret, cum eadem febre correptus, e vivis ereptus est. At fuerit cadaver illud non omnino adhuc frigidum; certe erat intus extraque jam frigidum cadaver Aniculae, cujus venter cum a Cl. Vulpio A. 1717. Januario mense aperiretur, ipse autem aditarem, ut singulorum viscerum sedem Auditoribus ostenderem, etsi nullus odor gravior solito existeret, nec ullum, praeter intestinorum implicationem, vitium apparebat, continuo tamen insolitum quandam languorem sensi, non secus ac si animi instaret deliquium: mox autem ostensione illa absoluta, cum vix domum uterque rediissemus, pariter febrili horrore, & frigore, & dein calore ad eundem modum, eodemque tempore correpti sumus, indeque ego, quamvis fracta febris vi, per annos aliquot ita male valere coepi, ut in nuncupatione Adversariorum IV. indicavi. Nec mirum est

etsi enim ea foemina pro apoplectica in Nosocomium illata fuerat, & reapse erat; illa tamen apoplexia maligna, ut postea inquirendo compertum est, febris, cum domi agrotaret, non ita pridem accesserat. Vides igitur, ne illud quidem satis esse ad periculum effugendum, cadaver non ante incidere, quam frigidum factum sit: quam cautionem qui laudarunt, illud praeterea animadvertisse non videntur, frigere exterius posse, interius autem calorem retinere, quod ex Epistolis ad te nostris intellexeris non raro fieri, & aliquando vel trigesima a morte hora (z) in ventris interioribus calorem superesse. Num igitur expectandum diutius est? At putrescens cadaver multo magis contagiosum evadere, ajunt, quam corpus morbosum vivens. Nec tu mihi objicias, fuisse, & esse qui, hisce omnibus pro nihilo habitis, impune id fecerint. Nam neque eadem natura, & vis est malignarum omnium febrium, neque eadem Professorum omnium dispositio: quarum neutram cum pro certo scire quisquam possit; nec tutius esse timidiorum consilium, neque, quam audaciorum?

33. Verum, ut ad me, & ad variolas redeam; equidem prima adolescentia cum in ejusmodi ipsarum Constitutionem incidissem, quae neminem ferme ad eum usque diem interemerat, discendi studio abreptus, egressus in Nosocomio Medicum sequi non dubitabam, & qui ex variolis decumberent, eorum quoque pulsus explorare non verebar, nedum cetera adnotare, & inquirere, etiam leviora, ut puta quo collyrio fieret, ut cum reliqua cutis pene tota pustulis aspera esset actorda, in palpebris tamen lavis, ut videbam servaretur, & nitida; fiebat autem aqua stillatitia plantaginis in qua salis, ut vocant, saturni paucillum erat solutum. Quae dum animadverterem; forte accidit, ut unus, itemque alter ex iis aegrotantibus, Medico frustra omnia quae poterat, diligenter praestante, e vivis eriperetur. Quo exemplo admonitus, nunquam postea volui ejusmodi aegros invadere, ne ad Principes quidem Viros accitus. Nec, licet ad hanc usque aetatem processerim, committendum esse, duxi, ut in periculum me volens conjicerem, quando vel octoginta annos natis accidisset, novi, ut a variolarum contagio, cujus jam se immunes putabant, non secus ac pueri, inficerentur, & multo quam hi, facilius perirent; quanquam in saevissima A. 1749. Constitutione Foroliviensi, vetula, ea quam modo diximus, aetate major, eo morbo conficta, raro sane exemplo evasit. Sed quod mihi facere non licuit, ut inde mortuos dissecarem, toties, & tot ab Anatomicis factum est, ut mirari subeat, Viros extitisse ceteroquin Doctissimos, qui post illorum jam editas Observationes, ignorare viderentur, aberraturos a vero, qui variolas alibi quam in cute, praesertim vero in intestinis, tum nunquam, tum semper provenire, contenderent. Horum primos, facile credas, cum in Observationes forte incidissent ejus similes quae a Peyero filio (a) proposita est; alteri autem in alias cum iis convenientes quas ab se habitas memorat Cl. Gunzius (b), utrosque ceterarum obliis, cunctas illi primos quidem, alteros autem his confimiles existimasse; quando multa, jam relata in Sepulchreto, extabant, quarum aliae cum illis, aliae vero cum his aptissime consentiunt. Sunt praeterea quas utrique addendas colligere possis ex laudata Cl. Phil. Contr. Fabricii Dissertatione (c). Atque insuper ut Dissertatio altera (d), quae, Buffero Praefide, habita est, Observationem tibi exhibebit in Serenissimo quodam Principe, cum primis illis convenientem, ita quae cum alteris conveniant, dabunt plures Volumina (e) Caesaris Academiae. Quin aliae non desunt historiae, quae & alibi quam in cute, neque tamen in intestinis, aliisve visceribus, conspectas variolas, aut se indicantes proponunt. Cujusmodi illae sunt quas leges in Aetis Hahnienibus (f), in Ephemeridibus (g) Praelaudatae Academiae, in Opusculis Pathologicis (h) Praestantissimi Halleri, & haec quoque est quam ab eo

qui inter Magistros meos fuit, Jacobo Sandrio, cum Bononia olim essem, acceptam, ferme totidem ac Vir ille Doctus retulit, verbis subijcio.

34. PUER Nobilis, cui paucae exterius variolae, signa autem nulla erant aliarum quae visceribus insiderent, suffocati instar moritur. CORPUSCULUM, ab Sandrio ipso apertum, pulcherrima viscera habebat omnia. Sed una laryngis musculis innata erat variolarum pustula, & circum hanc ater jam apparebat gangraenae color.

35. Porro cum aliis quoque malignis febribus saepe numero gangraenam internam conjungi; imo, si lethales sint, tunc viscerum inflammationes degenerare in gangraenas, ex pluribus, quas in Sectione hac Sepulchreti leges, Observationibus apparebit. Quibus has etiam adjunges. Sanctiorius noster (i) quidam alii putarunt, inquit, febrem malignam ab aliqua gangraena in jecore, vel in alio viscere oriri, quod nos non semel in cadaveribus observavimus. Dominicus Gagliardi (k) in dissectionibus eorum qui a maligna febre pereunt, cum ulcera ab erodentibus medicamentis quae vesicantia vocant, aperta, ipsa quoque gangraena affici incipiunt, internas gangraenas per sepe conspici, affirmabat. Et Josephus Lanzonus (l) Epidemicam describens Constitutionem Ferrariensem A. 1729. in apertis nonnullorum corporibus quos ea febris occiderat, inter cetera aliquas maculas lividas in ipsis intestinorum tunicis memoravit. Tu alia, quae non deerunt, exempla adjicito.

36. Nunc antequam finem scribendi facio, te miraturum non puto, initio praesertim admonitum, nihil repere me velle ex iis quae ad te alias scripsi, miraturum, inquam, non puto, quod de certis quibusdam Febribus nullam hic mentionem injecerim. De earum plerisque egisse me, scis, cum de aliis agerem morbis. Nonnullas tamen, ut puta quintanas, & quae longiora intervalla habent, me fateor non nominasse; neque enim vidi, nisi septimanam excipias, quae, cum Bononia degerem, in Patricio Viro exacte recurrebat: nec de illis dicere quidquam possum, nisi quod etsi quartanis fere succedant, non sunt tamen, ut aliquando factum est, pro quartanis habenda quorum longiora reddita sint intervalla, nisi quartanas pariter cum succedunt tertianis, pro tertianis quarum tardiores facti sint reditus, contra ac Medici ab antiquissimis usque temporibus statuerunt, habere velimus. Quod praclare animadvertit Solers Vir Zevianus meus (m) ubi quartanae mutationem in quintanam, hujus in tertianam, & mox hujus in quartanam, & quartanae denique in sextanam, hancque constantem, in adolescentula a se visam proponit: cujus ultimae febris exemplum perarum est, cum duo, haud amplius, me legisset, meminim, alterum Gentilis (n), Lanzoni (o) alterum. Qui vero post hujus generis febres mortui sint, in iis quid sit inventum, me latet. Sed cum ipsae diuturnae sint, aut diuturnis succedant; veri simile est, post se relinquere eadem ferme quae illae solent. Solent autem mesenterii, aut lienis vitia, aut alterius proximi visceris, & nominatim jecinoris. De quibus simul omnibus exemplum habes apud Cl. Fantonum (p). De liene autem satis ostendimus alias non uno loco, sed praesertim Epistola XXXVI. (q) quae consentientia videbis cum Observationibus, in Sectionem hanc Sepulchreti relatis, ubi de Quartanis (r), & de Eraticis diuturnis febribus (s) actum est. De jecinore ibidem quoque reperies exempla. Quibus cum junges quae Commercio Litterario (t) leguntur de hepatis substantia, praereliquis sedem quartanarum fovente, hincque in plurimis quartana mortuis laesum modo, modo exsiccatum, modo inflatum hepar inveniri.

37. Haec habui quae super plerisque Febrium generibus ad Valsalvae historias adderem ex meis, aut aliorum five mecum communicatis, five lectis Observationibus. Quae tu, ut soles, aequi bonique facies: & valebis.

(r) Epist. Respons. de Morb. Epidem. (u) Exercit. I. de Mot. cord. & sangu. c. 16. (x) A. 1740. Hebd. 13. n. 2. (y) l. 2. (z) Ibid. c. 4. Schol. 1. (a) Ibid. c. 2. ante Schol. 3. (b) Ibid. c. 3. (c) l. 3. c. 1. (d) l. 4. c. 1. & 2. (e) Ibid. c. 3. (f) Vid. Commenc. Litter. A. 1733. Hebd. 32. (g) l. 3. c. 1. (h) l. 4. c. 4. (i) Epist. cit. (k) l. 3. c. 1. (l) Hist. 25. cit. (m) Hist. 26. (n) A. 1738. Hebd. 33. (o) Commenc. Litter. A. 1731. Specim. 24. n. 3. & A. 1734. Hebd. 13. post n. 2. (p) Append. ad Obs. 10. & 29. (q) In Additam. ad hanc Sect. Obs. 19. cum Schol. (r) Consil. de Anat. Pract. n. 3. (s) De Peste l. 2. c. 3. adnot. 12. (t) Ibid. l. 4. Hist. 15. (u) Hist. 32. (v) Hist. cit. 15. (x) n. 3. cit. (y) adnot. 12. cit.

(z) Epist. 3. n. 2. (a) Obs. Anat. 2. (b) In Hippocr. de Humorib. not. 21. (c) exhib. Obs. circa Confit. Eoid. A. 1750. not. 2. ad §. 19. (d) Hist. Hist. morbi, & cadaver variol. c. 1. (e) Eph. Dec. 3. A. 7. & 8. Obs. 97. cum Schol. & Cent. 9. Obs. 52. (f) Tom. 1. P. 1. Obs. 109. (g) Dec. 3. A. 7. & 8. Obs. 47. (h) Obs. 44. in fine. (i) Nuovo Fonte di Protonotici P. 1. (k) Del' Interno istituto P. 2. Vegli. 30. (l) Aet. N. C. Tom. 2. Obs. 109. (m) Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 10. (n) apud Scheuch. Obs. Med. l. 6. ubi de raris febr. typis Obs. 2. (o) sub Obs. 32. (p) A. 1739. Hebd. 30. (q) n. 18. (r) sub Obs. 30.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA L.

Agitur de Tumoribus.

Quos morbos statim post Febres plerique facile proposuissent, Arthritidem, Luem Veneream, alios ejuscemodi, Boneto placuit differre, & inter hos, Febresque interjicere Tumores, Vulnere, Ulcera, & quæ alia ad Chirurgiam spectant. Quæ Facultas, cum minime ignores, quantopere a Valsalva admatata sit, & exculta; fortasse jam plurimas, si minus ex me, quem nosti, non, uti ad mortuorum sectiones, ita ad viventium, natura esse factum, at certe ex illo Observationes expectas. Nec tuam te fessellisse opinionem, ex proximis Litteris cognosces, quæ erunt de Vulneribus. Neque ille tamen paucas habuit de Tumoribus Observationes, Verum alias chartis non commisit, alias commisit quidem; sed earum aliquot aut ipse vulgavit, aut ego aliis Epistolis descripsi. Quæ omnia hac indicabo dumtaxat, ut relegere possis, si velis; nihil autem repetam, si velis, si velis. Ut enim Sepulchri ordinem, qualiscunque is sit, quemadmodum fere solitus sum, hic etiam sequar; non sequar tamen repetitiones. Quorum aliqua non modo, ut multæ, haud sunt illarum Observationum, quæ ultro in aliis quoque Sectionibus posita significantur; sed earum quæ in hac eadem iterantur II. Sectione, ut cum inter eas quæ in Additamentis leguntur, vel prima ipsa cum subiecti Scholii parte, proposita jam supra fuerat Observatione VI. (a) a Boneto, qui locum ipse quidem unde sumperat, non reticuit, aut cum eadem tamen, quod prope incredibile est, accidit, ut una eademque pagina (b) unam eandemque bis ex Garneri historiâ produxerit.

2. Igitur quod ad Tumores spectat Sanguineos five quos sic vulgo appellant, five eos præsertim qui cum rupto venæ trunco aliquo communicant, *varices spuræ*, ut opinor, a Boerhaavio (c) postea nuncupati, quid Valsalva vidit, & censuerit, in mea habes Epistola Anatomica XIII. (d) magisque in Tractatu illius de Aere Humano (e), utrobique autem (f) ea pariter quæ spectant ad Steatomata palpebrarum. Utinam sic diserte iudicium addidisset suum de natura cuiusdam tumoris quem ad huc modum nobis descriptum reliquit.

3. MULIER annos nata ad quinquaginta laboraverat tres jam menses tumore in dextera colli parte duro, oblongo, ovi galli Indici magnitudinem æquante, cuius erat basis in ejusdem lateris arteria Carotide, unde sursum pergens usque ad ejus arteriæ divisionem, finiebatur. Hic aliquando dolebat; aliquando nullum prorsus afferebat dolorem. Tandem viginti circiter ante mortem diebus crebrius vexare cepit, in ipsa præsertim laryngis regione, ut cum peculiari quodam stertore cogeret respirare, cui comes erat in gutture quidam ardoris sensus. Itaque mulierem confecit. Nolo hic, ut in tumore altero feci, quem in sinistra juguli parte durum pariter, & nulla memorata pulsatione, Valsalva descripsit (g), meas tibi conjecturas proponere: ipse, ut malueris, iudicabis. Ego vero ad certiora exscribenda transibo.

4. VIRGINI ingenii vidi, quæ aliquot jam annos, propter atatem ad quinquagesimum circiter perductam, menstruis carebat purgationibus, canerosus tumor in dextro latere prope axillam obortus est. Hic paulatim in crassitudinem quidem parum, sed multum in latitudinem, & longitudinem crevit, ut ad axillam perveniret. Proximus artus oedemate intumuit. Accessit tussis, sputum materie *cattarrhalis*, spirandi difficultas, multa sitis, & mors denique. TUMOR eas quibus infederat, partes, quantum quidem percipiebat sensus, altius non læserat. Proximum artum secundo, multum feri flavescens effluxit, quod omne in Adiposæ membranæ cellulis subliterat. Totum quoque ab eodem latere Thoracis cavum ejusdemmodi replebat serum, multis interjectis concretionibus ejusdem coloris, mediæ autem inter membranosam, & gelatinosam naturæ, quarum pleuræ adhærebant. Pulmones erant adeo contracti, ut primo aspectu quasi deesse viderentur. Cor valde exiguum. Cæterum, quod ad Ventrem attinet, ventriculi fundus multum erat extensus: lien perparvus: jecur a naturali colore ad fuscum inclinans: ejus vesicula exilis, & inanis. Ovaria albicabant: & quamvis naturalem servarent figuram, & molem; valde tamen induruerant.

5. Rondeletii Observationem, in Sepulchretum relatum, non hoc loco, in quo ne memoratur quidem, sed libro II. (b) leges, propositæ similem. In utraque enim canerosus thoracis externus tumor, difficultas spirandi, multumque est in thorace serum: quod in illa tamen succrevisse tumore decrecente, in hac autem crescente, ostendit tempus quo ducendi spiritus difficultas accessit. Faciet hoc discrimen, ut rem aliquanto aliter in illa explices, atque in hac Observatione. Cui ut peculiare est quod ad serosum attinet brachii tumorem, sic peculiaris quoque hujus tumoris causa fuit, nimirum Axillaris venæ compressio a cancro illic se attollente.

6. Sed jam ad alios alterius generis artuum superiorum, aut inferiorum tumores, a Valsalva observatos, veniamus, initio ab iis ducto qui male peractæ venarum sectioni successerunt. Mitto autem quem in Nobili Matrona vidit ob compunctum cum vena tendinem, aut nervum, manu cum acerbissimo dolore plurimum tumente, & eo sedato dolore, assidue tremente: qui tremor non modo posteaquam detumuit manus, sed ad diem usque quo hoc scribebat, videlicet quinque ipsos annos, nullo proficiente remedio, perstabat. Tumorem pariter mitto qui Juveni accidit, venâ in cubiti flexu ab inepto Chirurgo transfixa, effluoque introrsum sanguine, unde magnus postea, longæque, & difficilis curationis abscessus. Tumoris potius a vulnerata eo in flexu arteria, Valsalvæ manu perforata, historiam tibi diligenter describam, quod res majoris momenti est, nec indigna quæ a te cum Observationibus conferatur, visa ibi ab aliis, aut facta, aut adnotata proponentibus, ut puta ab Rockio (l), a Perito Chirurgo (m), a Teichmeyer (n), & ab iis quos dum has Litteras recenserem, legi, Medico Cl. Trevio (o), & industrio Chirurgo Guattano (p), præsertim vero a Cel. Auctore infra (q) laudandæ Dissertationis. Hæc igitur Valsalvæ Observatio est in nonnullis, manca videri potest, ut ab homine qui sibi scriberet, fusa; tamen quædam habet peculiari attentione digna, illudque insuper quod ejusmodi curatio prius a Valsalva peracta est, quam ab aliis peragi vidisset, additurus, quæ erat solertia, atque industria, subinde alia, si diutius vixisset, eique alia istiusmodi suscipiendi operis occasiones se obtulissent.

7. CHIRURGO annorum circiter duodeviginti, dum propter thoracis morbum sanguis e brachio mittitur, arteria vulneratur. Qui miserat, venam incidisse se, credens, non aliter vulnus obligat, ac si nihil nisi venam, incidisset. Post dies aliquot tumor in cubito animadvertitur: qui intra dies amplius viginti ad pomi magnitudinem excrevit. Hunc chirurgus quidam, pus subesse ratus, incidit: ex inciso sanguis incipit exire, sed fine impetu, sanguine videlicet grumis obstantibus, & exitum quasi omnino claudentibus. Verum tribus post diebus, via sibi facta, sanguis erumpit: idque non illo tantum, sed & duobus proximis insequentibus diebus, semel quidem quotidie, at ea copia, quæ cum adstringentibus remediis nullo modo cederet, ægrum quasi ad animi deliquium duceret. Interea & manus, & cubitus, & proximus humerus ferme usque ad medium, intumuerant: inflammatio autem prope incisum tumorem jam erat oborta. In tanto periculo, Medici advocantur, chirurgiam quoque probe callentes, in his Valsalva. Qui, re diligenter perpensa, ita est curationem aggressus. Primum fascia quam nunc torcular vocitant, sic humerum vinxit, ut pro eo acopus esset, prompte illa, facileque laxari posset. Tum vulnus, a chirurgo, ut diximus, tumori incisum, superiora versus secundum arteriæ consuetum iter produxit. Sic toto patente tumoris cavo, quod pugnum ferme comprehendisset, sanguinem, quo plenum erat & concreto, & fluído, eduxit, locumque bene abluit spongias, calefacto vino madentibus. Quo facto, tantisper fasciam laxari iussit, dum effluens sanguis vulneratæ proderet arteriæ sedem. Erat hæc in cavi illius fundo; ut valde incommodum fuerit ob profunditatem, arteriam circumligare. Quam cum tandem, continuo supra vulnus, vinxisset; haud amplius, quantumvis laxata fascia, sanguis exiit. Verum illico quidquid ejus artus erat infra injectum arteriæ vinculum, sentiendi, & mo-

movendi vim amisit, paucisque post horis frigidum est factum: nec pulsus amplius percipiebatur. Hic tamen circa tertium a ligata arteria diem percipi iterum, sed vix, cepit: at circa quintum ad naturalem quasi impetum jam redierat. In hujus diei exitu sanguis in lecto animadvertitur, eoque fasciæ, vulnere circumjectæ mardentes conspiciuntur. Quibus caute ablatis, & vulnere inspecto, nec sanguinis quidquam erumpit, nec unde eruperit, ullum est signum. Ab hac ultima sanguinis eruptione pulsus iterum omnino amittitur, non secus ac si novum arteriæ vinculum injectum esset. At membrum tamen post multos dies naturalem sensum recuperat calorem, motum quoque, sed hunc tardius; nam octo, aut novem menses debilitas restitit, & quædam macies, & fuscus unguum color, & facilis a frigore infusio. Verum eo quod diximus, exacto tempore, hæc omnia desiere; pulsus etiam, quamvis languido, redeunte.

8. Hanc a me cum petisset historiâ Cl. Vir Petrus Paulus Molinellius, continuo, & perlibenter misi, tum ut homini Medica, & Chirurgica Facultate præcellenti, & bene de me merito gratum facerem, tum etiam, ut quam mancans, sicuti ad ipsum quoque tunc scripsi, mittebam, eam ipse, qui Chirurgum illum & viventem noverat, & mortuum dissecuerat, quo ad ejus fieri posset, nobis perliceret. Quod præclare ab ipso factum perspicies, si Dissertationem ejus leges, quæ inscribitur de *Aneurysmate e lesa brachii in mittendo sanguine arteria*. Præcipua huc redeunt, non unum tantummodo, sed plura vincula Valsalvæ arteriæ injectis, cogente sistendi sanguinis difficultate: hominem postea incolumem vixisse, & non nisi trigesimo circiter post eam curationem anno tabe, & ascite confectum esse: eo autem brachio quod læsum fuerat, non secus ac altero, uti consuevisse, quippe cum jam nullum; si utrumque brachium inter se conferres, discrimen agnosceres, ne in pulsu quidem. Quod tanto magis mirandum est, quia in mortui dissectione, cum Brachialis arteria loco ubi aneurysma fuerat, ad tractum duorum pollicum omnino deesset, nempe morbo olim, ferro, & pure absumpta, nulla inveniri arteria potuit quæ pro ipsa communicationem inter superiorem ejus truncum, & Radialem, Unaremq; arterias servaret præter unam, eamque non solum mire flexuosam, sed tenuem adeo, ut difficillimum sit intellectu, quomodo Radialis arteria, influente tam paucò sanguine, & per tot flexus traducto, æque pulsare ac altero in brachio posset, tum æque esse brachium utrumque & nutritum, & robustum, aut certe ad actiones æque idoneum. Et inventa quidem est ea pars nervi quæ in tractu illo eodem erat, in quo diximus Brachialem arteriam defuisse, in prægrandis ganglii modum amplificata. Sed est nervi ejus vires sic augeri potuisse, exultimares; tamen iustum musculorum robur, & partium nutritionem, & arteriarum præsertim pulsum sine ulla influentis quoque sanguinis copia, iustoque impetu, non intelligeres. Certe autem oculo præcipuo arteriæ trunco, *ramos laterales, licet per se parvos, postea distendi, si liquidum, solum in eos agat, Viri Doctissimi, & in his Hallerus (r), ex phlyctis, & hydraulicis non dubitabant: quin idem Hallerus (s) & vulgo notum esse, & se vidisse, confirmaverat, resecta arteria radialis, ita dilatata fuisse, sensum ulnarem, ut rami omnes, quibus prospectus radialis, inde sanguinem acciperent. Quo magis optandum est, ut in cadaveribus eorum quibus olim arteria ipsa Brachialis, aneurysmatis curandi causa in brachii flexu, obligata fuerit, iterum, iterumque ab Anatomis, inprimisque ab eodem Præstantissimo Molinellio perquisito hujusmodi repetatur, ut sicuti quæ in hac prima deprehendit, accurate adeo proposuit, ita in aliis eadem, an alia occurrant injectionis etiam auxilio, certiores fiamus. Ut enim illius arteriæ truncus raro duplex sit; ramos tamen ab ipso tum in Unarem, tum in Radialem pertinentes quos Cel. Winslowius (t) Collaterales vocat, non in cunctis quidem corporibus ad eundem modum se habere, sed plures in plerisque esse, vel ex ejus, & laudati Halleri (u) collatis inter se descriptionibus satis constat. Veri itaque simile est, fore ut alias aut uno plures, aut unus aliquis magis dilatatus ex Collateralibus ramis se se oculis objiciat: quanquam ne sic quidem satis intelligi posset quod Valsalva circa quintum ab ligata arteria diem observaverat; nam si ramorum illorum ditatorem fieri paulatim debet; quomodo tam cito pulsus ad naturalem quasi impetum redierat? De nervis autem; tamen si brachialium communicationes inter se, & fre-*

quens ramorum non unius ex illis in unum musculum distributio facere fortasse debent, ne tam solcite de ipsis idem quod de arteriis, quæramus; sane illa quam Vit. Cl. animadvertit, illa, inquam, nervi simul, ut videtur, cum arteria ligati in prægrande quasi ganglium mutatio digna est quæ pluribus Observationibus in cadaveribus ejusdemmodi, aut in brutis etiam animantibus data opera magis confirmetur, inquiraturque, an influentis in ipsum arteriosi rami manifestissimæ dilatationi, an, si hæc semper non occurrat, vincitur potius nervi amplificatio illa debeatur. Cui voto postquam hæc scripseram, interea satis esse factum, jam video (x) quantum ad brutas attinet animantes, experimentis quæ ut per se laude non vulgari digna censeo; ita si debeam pro Valsalvæ repetitis experimentis accipere; quid in ipsis desiderem, erit alibi, ut spero, opportunior scribendi locus. Nunc enim illud tibi multo utilius fuerit, si quas eadem luculenta, & frugifera Dissertatione Observationes, animadvertionesque Cl. Molinellius proposuit de instituenda aneurysmatis in cubiti flexu curatione tum expeditum nervum cum arteria colligando, tum vero tutius facco etiam aneurysmatis vincula injiciendo, attente diligenterque perpendas, & cum iis quas in posterum peragat, curationibus conjungas. Verum ut ille nobis superiore Valsalvæ Observationem perferat; sic haud satis scio, an invenire nunc possum qui insequentem perficiat.

9. QUIDAM aneurysma in sinistro poplite decem circiter annos pertulerat, vehementem dolorem afferens, & diametro uncias Bononienses tres cum semisse ferme æquans. Is cum a Valsalva curatus esset; novissime tamen perit ob alterum in dextero poplite aneurysma. IN THORACE quoque aneurysma aliud habuit ad arteriæ Magnæ curvaturam.

10. Cum Medicus, & Chirurgus, siquis alius, Eruditissimus Laurentius Heisterus in ea Dissertatione quæ de *Genium Structura, eorumque Morbis* inscripta est (v), monuerit, paucissima in poplite aneurysmata fuisse adnotata, & sane præter ea quæ ipse memorat, vix de duobus me legisse meminerim, quorum alterum uno verbo olim indicavit Severinus (z), alterum nuperime quantum vim sanguinis contineret, scripsit Matanus (a); propterea nolui hanc quamvis obscuram, si species ea quæ mox dicam, & imperfectam, Valsalvæ Observationem omittere, præterea hoc certe ostendentem, quantum aneurysmatibus sint corpora quedam obnoxia. Esti vero Experimentissimus Heisterus eandem quam ad cubitum aneurysmatis curationem, in poplite quoque non impossibilem esse, existimet (b) ob eandem spem (quam nunc videbis a Præstantissimo Hallero (c) confirmatam) ramorum arteriæ a latere communicantium, quin se, ubi casus tulerit, eam curationem suscepit esse, profiteatur; tamen cum plura quam in historia scripserim, de re istiusmodi a Valsalva addita nusquam esse animadvertentem; quæ ipse ratione curasset, statueret non audebam. Erant quidem inter Valsalvæ schedas Icones duæ, scite, atque eleganter delineatæ, quarum altera Popliteam arteriam ab ea facie qua respicit exteriora, altera ab opposita representat se ab exteriori facie dilatantem in faccum oblongum, & quæ magis ascendit, eo angustiore, nec sine tribus arterioforam ramorum osculis, cum angustiori facci parte communicantium; ut nisi ea pars, sicuti solet Præcl. Molinellius, vinculo contracta esset, perdifficilem, & longam manus operam requisivisset; & tamen faccus ab exteriori facie omnino integer ostenditur. Quamobrem, & quod erat homo ob aneurysma mortuus quod in altero poplite excreverat; hoc potius quam illud quod curatum esset, pictum fuisse, ut e mortuo Valsalva exemisset, propemodum conjiciebam. Sed tamen illud alterum quali curasset ratione, non assequabar, donec Cl. Benevoli Observationes versans in locum forte incidi, ubi (d) modum laudans, a me tibi alias (e) commemoratum, quo Valsalva solebat, sanguine sapius misso, & tenuissimo dein victu aneurysmata curare, sic curati, in arteria poplitis, exemplum se in Valsalvæ ipsius Musæo vidisse, testatur, ex homine qui post eam curationem morbo alio confectus fuerat. His enim lectis, iisque Iconibus in manus sumptis, cum animadvertentem, diametro certe longe minori quam supra (f) est propositum, faccum representari; cogitare ceppi, tantam facci contractionem acceptam referendam esse ei curationis generi, quod est Valsalvæ adversus interna, eaque incipientia aneurysmata instituerat, huic etiam fortasse, addita comprimente fascia cum auxiliis aliis exterioribus, adhibere voluisset.

P 4

Quo-

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

(a) Epist. Anat. Med. L. Art. 8. 9. & 10. (b) Ibid. n. 1. (c) Ibid. n. 2. (d) Ibid. n. 3. (e) Ibid. n. 4. (f) Ibid. n. 5. (g) Ibid. n. 6. (h) Ibid. n. 7. (i) Ibid. n. 8. (j) Ibid. n. 9. (k) Ibid. n. 10. (l) Ibid. n. 11. (m) Ibid. n. 12. (n) Ibid. n. 13. (o) Ibid. n. 14. (p) Ibid. n. 15. (q) Ibid. n. 16. (r) Ibid. n. 17. (s) Ibid. n. 18. (t) Ibid. n. 19. (u) Ibid. n. 20. (v) Ibid. n. 21. (w) Ibid. n. 22. (x) Ibid. n. 23. (y) Ibid. n. 24. (z) Ibid. n. 25.

Quoniam tamen quædam video quæ cum hac conjectura non satis consentiant, ideo tuum iudicium facio: ego nihil pronuncio, & ad certiora jam redeo.

11. VIRO quadraginta annos nato parvus, fed pulfans, tumor circa inguen dexterum sensim oboritur. Triennii spatio in dies augetur, grandisque fit. Quarto circiter ante obitum mense doloribus vexare incipit, magnoque, & æquali edemate universum illum artum inferiorem tumefacere. Mense ultimo atrocissimi dolores fiunt, neque ad tumorem solum, sed & aliquando infra malleolum internum: quo uno loco, & sævientibus dumtaxat doloribus, pes sentiebat, omni alioquin sentiendi, & movendi facultate privatus. Nulla unquam hoc toto mense a cruciatibus quies, nullus somnus, donec, languentibus viribus, aliquot dies semisopitus æger jacuit, atque ita deficit.

ANEURYSMATIS hujus ingens erat cavum; nam a cute summi femoris anteriore ad crassissimum nervorum omnium Crurale Posticum perveniebat. Et arteria quidem Cruralis, ex cujus dilatatione tumor inceperat, mediocriter dilatata reperta est; sed aliquot locis dilacerata, aut erosa, per hæc ea copia, eoque impetu sanguinem eiecerat, ut partim corolis, partim cedentibus musculis, ingens, ut diximus, cavum effecisset, illumque ipsum quem memoravimus, nervum sic erosisset, vix ut pauca fibræ superessent, per quas superior ejus pars cum inferiore committeretur. Id omne cavum coagulato sanguine, & polypolis, ut videbantur, concretionibus plenum erat.

12. Diffectio causam præclare ostendit eorum omnium quæ homo pertulit. Nam postquam aneurysma ex legitimo in spurium, ut spurium quidem plerique intelligunt, degeneravit, id est dilatata arteria tunica perrupta, aut erosa sanguinem effundere in viciniam coeperunt, jam neque ea vi, neque ea copia reliquus sanguis mitti potuit in subiectas partes, quæ vis, & copia requiruntur ad servandum ejus expeditum per venas reditum; hinc artus edema. Effusus autem sanguis dum musculos a musculis deducendo, cum interjectis membranis nervulos simul lacebat, aut distrahebat, dolores creabat, sed levius ferendos, quam ubi denique ad crassissimum illum nervum accessit, jamque mora acrior factus coepit erodere. Tandem ubi nervus usque adeo exesus est, unde rami fere omnes proveniunt sentiendi, movendi facultatem pedis afferentes; facultas utraque in hoc perit, si eum excipias locum qui prope malleolum internum est; ad hunc enim locum ramus pertinet qui non a Posteriore illo, sed ab Anteriore nervo Crurali profectus, solet Saphenam venam comitari. Cætera quomodo assiduus doloris secuta sint, explicare non est opus. Præstat ex illorum, mortisque ipsius consecutione animadvertere, ubi aneurysmata vel externa nervis, aut aliis acris sensus partibus proxima sint, tametsi per disruptionem & sanguinis profusionem illico non occidant, per acerbissimos tamen cruciatus interficere demum posse. Quod tibi confirmabunt, præter historiam quam nuper vidi a Guatano (g) editam, cum hac Valsalva conferendam, quædam M. Aurelii Severini (h) in græco homine, & in futuro Observationes. Sed quam his interjecit, aneurysmatis in Anselmo Pagano descriptionem, ut libenter leges, quippe sede, magnitudine, & adjunctis plerisque aliis cum eo quod modo ex Valsalva propositum est, comparandi; ita cum ejusdem prope dixi incredibilem curationem perpenderis, miraberis plurimum, inter problemata super hac ab Severino explicata, præcipuum illud non fuisse dilucidius, & accuratius enodatum, nimirum *computrefacta, dissoluta, diffracta* juxta inguen Cruralis arteria quomodo potuerit admoti ignis vi suos iterum parietes recuperare, ut artus ille non solum vivere, sed eo vix humili baculo aliquantulum nixus, rectus incedere homo valuerit.

13. De aliis tumoribus qui ad hanc quidem spectent Epistolam, præter ea quæ supra dicta sunt, nihil Valsalva scriptum reliquit, nisi forte huc referre velimus perpaucas verba quæ in Medicis Responsis duobus obiter injecit. In altero eorum quod est de Hamorrhoidibus, quædam cum his descripta condylomata esse posse, ait, cæcas hamorrhoides, ut quæ sæpe crassa quasi tunica ex pinguedine obducta videntur esse non vala, ut sunt, dilatata, sed alterius naturæ excrecentiæ. In Responsis autem altero super antiquo ad genu tumore pro exostosi habito, credibile est, inquit, cum tumor statim post retropulsam scabiem in qua, suspicio est, veneni aliquid venere latuisse, prodire coeperit, particulas quæ

sanguinem antea vitantes, scabiem producebant, ad illum articulum remoratas, tumori originem præbuisse aut fibras lacerando substantiæ ossæ non secus ac quercuum fibris insectorum aculeo perruptis, gallæ oboriuntur, aut cum humoribus, per articulum fluentibus subsistendo, quæ res facilis est ob vasorum in ejusmodi locis angustiam; sic enim cum ligamentis, atque tendinibus ferrumina utrorumque crassitudinem, & duritiem adauxerint; quamobrem, si manu comprimuntur, ossis similitudinem omnino referunt, quanquam per diffractionem inquentibus, quod aliquando mihi, inquit, facere contigit, repræsentant substantiam interiorem radicis arundinis; ut crassa quadam comparatione utar.

14. Et hæc quidem Valsalva scripsit. Alia autem quædam a se facta, & observata mihi narravit, aut, me præsentem, observavit, & fecit, quæ nunc tecum communicabo. Quorum primum conferre quadatenus poteris cum ea Fabricii nostri Observationem quam in Adversariis II. (i) olim indicavi, aut cum altera Viri Illustri Heisteri (k), vel potius, si ad ganglia utramque harum referre malis, possis quadatenus, ut dicebam, cum ea conferre, quam Archiater Amplissimus Swietenius (l) commemoravit.

15. VIRGINI, æbæ Valsalva, fuisse exiguum ad malleolum extuberantiam, quæ ab annis plus sexdecim tantos sæpe crearet dolores, ut non semel, nisi domesticis prohibuissent, eum sibi pedem fuisse abscessura. SECTIS ibi secundum cruris longitudinem communibus integumentis, glandulam ab se deprehensam esse parvam, forma ovali, sed depressa, colore, & natura, ut videbatur inter Conglobatas, & Conglomeratas media. Hac adempta glandula, nullum amplius dolorem rediisse.

16. MULIER rusticana, quam cum aspiceres, senio confectam existimares, debilis, squalida, exsiccata, imo ad extremam perducta maciem in Bononiensi Incurabili Nofocomio jacebat. Malorum omnium causa mamma erat dextera, quæ in tumorem excreverat, forma, & magnitudine humanum cerebrum referentem. Is tumor undique, & penitus exulceratus, inter rubram & sanguinolentam substantiam hic illic ostendebat plures quasi glandulas, maximis uvæ acinis pares, sed albas, oblongas, læves. Cum aliud, ob visum præsertim infirmitatem, tentare non liceret; Valsalva venit in mentem tumorem basium quæ ampla erat quidem, sed reliquo tumore minus, circumjecta infirma hæc adstringere quo ad ferre mulier posset. Quæ assidua constrictione paulatim in dies aucta, illud consequabatur, ut oræ tumoris, nutrimento orbata, circumcirca emortuæ, forficibus sine dolore, & sanguinis effusione circumcidi posset, basis autem ambitus magis magicæ minueretur. Hac ratione ad satis longum tempus servata, ingens ille tumor ad exiguum molem redactus, & tuto denique amputatus est. Itaque cicatrice obducta, recreata interea mulier discessit. Quam tunc ea quidem parte perianatam esse, ne dubites; ut cætera quæ narravi, ita uno, aut altero interfecto anno hoc etiam accidit ut viderem. Cum enim forte cum Valsalva in Nofocomio essem, ecce quadam supervenit femina, quæ ipsum, & me quoque, ut notos, salutem, optimo corporis habitu, & colore prædita, ea autem, quantum apparebat, ætate, ut illius alterius quam modo descripsi, filia, vel potius neptis videri posset. Ea vero ipsa erat quæ descripta est, & quæ se non agnoscebat mirata, jam quæ sim, inquit, noscitis, ubi causam cur huc modo venerim, aperuero: & cum dicto pectus ostendit sine mamma, at sanam a dextris, a sinistris quoque, nisi modicum sub mamma cute exstare inciperet tuber. Sic, inquit, prior ille tumor coeperat: veni igitur, ut novus hic, antequam crescat excidatur. Quod proximis diebus a Valsalva factum est, quamvis verente, ne alius postea, atque alius existeret, & vel hac quoque demum adempta mamma, alia aliqua in sede, & præsertim in utero exoriretur. Id vero non sine causa verum esse, nimis sane crebra observatio ostendit: quin pejora vereri potuisset, eruditissima docebit Illustri Viri Trilleri dissertatio (m): quæ perlecta, & iis quæ longe atrociora veteris canceri existipationem ut plurimum consequuntur, spectatis, existimare licet, num tanta insequens malorum atrocitas induciis unius, aut alterius anni satis pensetur: quanquam ægra dummodo ex præsentibus doloribus, lethumque allaturis eximatur, graviores postea adventuros, & sævius interfecuturos aut minime credat, aut, si credat, tamen ut tempore interfecto futuros, non tanti faciat.

17. Tu-

17. Tumorem quoque, sed longe alius generis, a Valsalva excisum vidi. Quem tamen quoniam excisum ego, ipso annuente, persequi, infra in loco describam. Jam enim ad nostras diffractiones transeundum est. Et primum, ne scripta alibi hic repetam; quæ de varicibus illis spuris, & de palpebrarum steatomatibus ipse adnotaverim, in eodem habes Tractatu, in eademque Epistola quæ supra (n) memorata sunt, cum de utroque eorum tumorum genere quid Valsalva tradiderit, indicarem. De steatomatibus autem, aliisque Cysticis tumoribus plura extant digna quæ legas in ea Boerhaavii Epistola quæ de Fabricia Glandularum inscribitur, itemque in Prælectionibus in suas institutiones (o). Et quamvis idem, ut videtur, exemplum tumoris, humorem aquosum continentis, non eodem prorsus utrobique modo, memoria, ut opinor, nonnihil lapsus, proponat, tamen satis constat id quod præcipuum est, ejus generis tumorem vidisse: eamque Observationem licet pluribus exemplis a Cel. Heistero (p) additis confirmare. Eodemque ex parte attinet tumorum quorundam in capite infantis descriptio, quæ ex Blasio in hanc Sepulchreti Sectionem (q) relata est, quamquam erat aqua in plures hydatides dispersita. Magis libera erat, etiam a primo secus videretur, quam ego sic observavi.

18. QUIDAM ex iis quorum collo, & capite usus sum in publica Anatome A. 1750. parvum tumorem ad sinistram ossis hyoidis latus gerebat. TUMOR per diffractionem omnino resectus, & ab lævo cornu illius ossis, ad quod exterius alligabatur, solutus, hydatidum aggeriem repræsentabat, ultimo digiti minimi articulo majorem. Sed illius oram cum leviter pupugissem; turbidula quam continebat, aqua omnis continuo defluxit, vix levissima pressione adhibita.

19. Initium magni tumoris, si diutius vixisset homo, hoc facile esse potuisset: quanquam inter eos qui incipientes adhuc, non difficillime solvuntur, hos potissimum censeo esse ponendos: hujusque fortasse generis fuisse, credo, quem in carpi exteriori parte Uxoris meæ enatum vidi, natis avellane forma, duritie, & magnitudine. Cum enim hebdomadas aliquot pertulisset, ecce mane exasperata narrat, repente, & ex toto nocte illa evanuisse. Vera dicebat, ut statim perspexi. Non multis autem interjectis diebus, idem redit tumor, & tempore multo breviori interposito, repente iterum evanescit, non rediturus, cutem, id quod prius non acciderat, eo loco relinquens minutis quibusdam subrubris punctulis distinctam, quæ paulo post ipsæ quoque per se abierunt. Æstivum erat tempus, & ceratis usa fuerat quæ resolvunt, & pressione, cui tantum tribuisse Valsavam, ex me forte audiverat, ut cum ipse ad alteram scapulam tumorem cysticum gereret, hunc jufferit, ad incrementum retardandum, vel pedibus comprimi. Sed ipsa moderata, sicuti fuisset, pressione vix erat usa primis diebus, ceratis autem non diu, aut certe non assidue, quod nihil proficere viderentur. Nec vero si forte ganglium fuisse malueris; valde repugnabo; erat enim recens, ut minime necesse esset involucris jam includi crassioribus, aut humorem continere quem diuturnus particularum tenuiorum discessus glutinosiorem, minusque dissipabilem reliquisset. Intelligis me de gangliorum materia haud aliter sentire ac sæpius repetitis eorum diffractiones ostenderant. Quarum alias apud Cl. Heisterum (r), legeris; alias autem addes ex observatione Egregiorum Virorum Weissii (s), & Elleri (t). Cæterum natus, ut nosti, tumores cysticos Chirurgi nostrates vocitant; uno comprehendentes vocabulo, non solum tria illa per vulgata genera, sed & alia, quæ fere omnes, si doctiores excipias, quam diversa ab illis interdum contineant, prorsus ignorant, ne suspicantes quidem, ubi durities est, ibi posse aquam subesse, ut in suis utramque Boerhaavii (u), & Heisteri (uu) observant. Sed & alia peculiare tumorum species sunt, exempli causa, quam nemine ferme præcunte, exhibuit, Salzmanno Prælide, Jo: Paulus Kellius (x), constantem ex folis propemodum membranis, quæ lamellatim aliæ aliis impositæ tumorem in cervice effecerant æquantem pondere libras quinque, aut quam potius alios, & nominatim Severinum (y), Experimentissimus descripsit Benevolus (z), substantiam polyposæ similem continentem. Cujus Observationem legens, in memoriam redii alterius, quam Ju-

nio mense A. 1735. Mediavia noster eodem quo habuerat, die nobiscum communicaverat.

20. MONACHO ad rotulæ alterius regionem tumor increverat, pugnum æquans, durus, mobilis, doloris expers, *nativam* vocabant. INTEGUMENTIS communibus incisis, & facile diductis; neque enim ulli arctiores obitabant nexi, & vasa sanguifera creberrima quidem erant, sed exilia; non majori negotio separatus est tumor a tendinibus qui rotulam obtegunt, quam musculus a musculo solet separari. Itaque inviolata tunica, detractus, & dissectus primum hanc ostendit satis crassam, ut dividi in laminas tres posset, ex quibus minus tenuis erat media. Quidquid autem solidi intra tunica continebatur, substantia erat, ut videbatur, polyposa, eaque in cancellos quasi quosdam conformata, ut spongiosam quadatenus referret structuram quam intra ossium capita videmus. Si omnes cancelli diluto sanguine pleni erant.

21. Hujusmodi tumores inter eos poni fortasse possent quos Celsus (a) continere, ait *simile aliquid carni hebeti & crustæ*, nisi inter molles, cedentesque recensuisset. Boerhaavius (b), qui farcomata ex veris fibris carnis procreare, & fieri, non facile credit, sed ex membrana Adiposa, cujus pinguedo ob distenta sanguifera vascula rubram carnem mentiat, etiam sic factos tumores tenui pellicula includi, scribit, & ob hanc totos posse detrahi. Equidem in Adversariis (c) olim tradideram, me in illius membranae faculis interdum pinguedinem ita sanguine infectam vidisse, ut carnem ipsi mentirentur. Sed si ita res se habuit, five rubor potius in confertissimis, distentis quæ vasculis fuit creberrimas, tenuissimasque membranas perrepantibus, pinguedini interjectas, & per hanc transpectas; certe mihi non accidit, ut tunc eas Adiposæ membranae partes in tumorem conglobatas viderem, & peculiari tunica cinctas. Quod tamen ut accidisse aliis, non negaverim; ita non omnes negaturos esse, credo, facile ex veris ipsis fibris carnis, ubi pars aliqua earum lacerata, aut erosa sit, excrecentias nasci carneas. Sed ad tumores cysticos hæc non attinent, ut neque excrecentiæ membranae Adiposæ. Quas cum videri possint Viri aliqui doctissimi cum steatomatibus confudisse, alii ab his quidem distinctissimè, verumtamen inter cysticos tumores posuisse; hic tibi quid ego Excrecentiæ membranae Adiposæ nomine intelligam, & quam ejus structuram observaverim, aperte exponam.

22. Joannes Philippus Ingrassias ubi de *Natta* agit (d) quam in scapulis dumtaxat vidisse se, scribit, in eaque adipem, tametsi aliquando & carnem, non dubitat, quin ad steatoma sit reducenda. Fabricius autem noster ab Aquapendente (e) tradit, steatoma, ubi in capite non est, sed in aliis partibus, *videri continere materiam alii pinguedini potius similem, quam sevo*. Quæ animadvertit præclare ostendit, Majores, etsi in tumoribus non sevim invenirent, sed pinguedinem, non propterea novum tumorum genus constituendum credidisset, ut nostra memoria Littrius (f), qui separandum a steatomate, & lipoma appellandum esse, censuit ejusmodi tumorem, qualem ipse ad viri scapulam vidit molli pinguedine, non sevo, plenum. Sed Ruyschius (g) cum extirpatum ejusdemmodi tumorem paucis describeret postea, vocare steatoma perrexit. Palsinius autem (h) duos tumores memorans ejusdem generis, qui ad immane pondus in dorso excreverant feminarum duarum, neutro utitur vocabulo, & quod illi omnes quos nominavimus, alii discrete fecerunt, alii sic ut saltem recte perpenis omnibus, idem conicere possumus, an peculiari cysti hi quoque earum feminarum tumores comprehenderentur, ipse indicare prætermittit. Nec vero ille, nec cæteri satis aperte significant, quæ pinguedo in iis tumoribus reperta est, an ea esset cellulis comprehensa plurimis, ut in membrana Adiposa, an, nullis interjectis membranulis, totum illud cavum impleverit; ut qui legunt, possint suspicari, fuisse eam, si non *oleum liquefactum* quali Boerhaavius (i) plenum tumorem librarum octo, e dorso bajuli exemptum, se cum Ruyschio vidisse, testatur, at saltem *substantiam quæ nihil esset, nisi oleum*, ut paulo superius dixerat, tumorem alterum memorans, an eundem, quippe totidem librarum, & a Ruyschio visum. Non igitur, ut aliqui fortasse fuerint, certum

(g) Hist. 2. Aneurysm. Hist. 2. (h) De recond. Abscess. nat. l. 4. c. 7. (i) Animad. 24. (k) Dissert. de Tumorib. Cystic. singularib. n. 36. (l) Comment. in Boerh. Aphor. §. 1084. (m) De nociva Canceri inveter. Extirpatione. Hist. præsertim. 3. & Observ. addit. §. 17. & seqq.

(n) n. 2. (o) ad §. 711. (p) Dissert. supra ad n. 14. cit. (q) Obs. l. 5. §. 5. (r) Instit. Chir. P. 2. S. 6. c. 171. n. 2. (s) Vid. Commerce. Litt. A. 1745. Hebd. 24. n. 1. (t) Vid. Act. Erud. Lips. A. 1750. M. Octobr. (u) (uu) Vid. supra ad n. 17. (x) Dissert. de Tumore tunico membranac. §. 1. & 7. (y) l. 4. supra ad n. 10. cit. c. 2. & 3. (z) Observaz. 16. (a) De Medic. l. 7. c. 6. (b) Prælect. §. supra ad n. 17. cit. (c) II. Animad. 6. (d) in fine Tract. de Tumor. P. n. (e) in fine Append. l. 1. Chirurg. (f) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1769. Obs. Anat. 3. (g) Epist. ad Boerh. (h) Anat. du corps hum. t. 2. ch. 24. (i) Prælect. ad §. cit. supra ad n. 17.

certum est, omnes quos diximus, tumores excrescentias fuisse ipsius Adiposæ membranæ, ut illum quidem circa scapulam mulieris a Blasio (k) descriptum, & *Excrescentiam Adiposam* ab ipso nuncupatum: quem inter superiores omisi, non quod in ea dissimilis esset, quam continebat, substantia; hæc enim non nisi pinguedinem referebat substantiam; sed quod eadem, non mollis, at cartilaginea quodammodo esset duritie prædita. Ego vero Observationem olim ad Schröckium misi adiposi magni tumoris, qui scapulam ipse quoque occupabat, & scemina quidem, ut plerique eorum de quibus indicatum est. Illam si legeris, a Schröckio enim est edita (l), eoque hic non repetetur; & cum eadem alteram junxeris, quam protinus subijciam; in illa enim indicavi, non percipis; quid meæ discrepent a cæterorum Observationibus, atque sententiis, facile intelliges.

23. VIRO, nulla, quam sciret, prævia causa, in communibus alterius natis integumentis exiguis apparuit tumor. Qui paulatim augetur, ad eam demum magnitudinem pervenerat, ut pueri caput, nisi superaret, at certe æquaret. Globi erat forma, qui per brevem pedunculum, non crassius genio digito pollice cum nate commissus, deorsum pendebat. Idem utriusque color qui in cute reliqua. Nulla, si contraheres, durities, nulla fluctuatio, nulla pulsatio, nullus dolor. Sed moles incommoda sedenti, pondus autem (tamen lata, atque facia, etiam me distrahendo tumor increverat, ut poterat, sustentabatur) stanti, ambulanti molestem, & febrem denique, ac vehementem caloris sensum, quæ duo aliquando longiore, & concitior ambulationem sequebantur, hominem coegerunt, ut Valsalvam consulere. Qui, his perpensis, cum tumorem amputandum esse, non dubitaret; paucis post diebus, me inspectante, sic rem peregit. Postquam pedunculum propius tumoris globum injecto vinculo constrinxit, & ne sic quidem supra vinculum pulsationem ullam perceperit, quæ grandiusculæ arteriæ indicium faceret, transversum pedunculum supra vinculum incidit. Neque plus sanguinis prodit, quam expectasset; vix una arteriola se ostendente, eaque exili adeo, ut sola compressione sit cohibita, nec ulla vena paulo crassius præter unam, quæ tamen erat mediocris, per latus pedunculi sub cute scandente, manifestamque jam ante sectionem. Vultus autem, bono etiam hominis habitu, & tempore; ver enim erat A. 1704. Artem adjuvantibus, cito perlanatum est.

TUMOR ut, me inspectante, a Valsalva excisus fuerat, sic a me, illo inspectante, perfectus est eodem die. In ipso excisionis loco, priusquam dissecare inciperem, quatuor, aut quinque apparebant in transversum secti quasi cylindri digiti crassitudine singuli, ex quibus constabat pedunculus. Hos igitur persequendo, nihil aliud esse tumorem, vidi, quam eorum productionem. Crassiores enim facti, inæquales, flexuosi, in pluresque singuli divisi universam illam efficiebant molem. Nec scalpello opus erat ut sejungerem; digitis melius, & facilius, sensim pergendis sejungebantur. Eadem autem & in pedunculo, & ubique eorum structura, & natura fuit, nimirum quæ Adiposæ membranæ est, ut nihil ab hac discreparet, siue ambientes, interjectæque membranulæ, siue mollem, digitos ungentem, & ex albo ad flavum inclinantem, qualis in corporibus est sanissimis, pinguedinem quam continebant, spectares. Vasa sanguifera, nisi ad supremam partem, eaque tenuia, quod ex animadversis in amputatione futurum præferam, nulla in oculos incurrerunt. Cæterum cute universus tumor cingebatur paulo crassius, ut scalpello in duas laminas dividere liceret.

24. Præclare ex hac Observatione, & ex ea quam ad Schröckium misi, cum hac in re quaque præcipua convenientem, te perscrutatum non dubito, tumores hos duos, a me dissectos, nihil nisi Excrescentias fuisse ipsius quæ sub cute est, membranæ Adiposæ, quippe non ex pinguedine magis, minusve liquida, & peculiari cysti undique comprehensa, sed ex pinguedine factos cellulis inclusa membranæ, non eadem solum structura, & natura qua in Membrana illa manifestissime præditis, sed quod pedunculi & basis, ab illa amputatæ, transversa ostendebat sectio, cum ea Membrana evidentissime continuatis. Neque enim interior de duabus laminis in quas dixi cutem dividi potuisse, pro peculiari cysti accipienda est, non modo quia in altera illa Observatione non licuisset, id scio; verum etiam, idque præcipue, quia in Observatione utralibet si cystis fuisset quæ tumorem undique

complecteretur, certe portio illa cystis quæ supremam partem comprehenderet, intus in sua sede relicta esset, cum simul cum tumore excisa non sit: non fuisse autem intus relicta, ex eo intelligitur quod vulnus ægri utriusque facile perlanatum est, & sine ope eorum quæ folliculi relicta portionem exedendo, aut putrefaciendo absumunt, qua non absumpta, nec vulnus ad firmam cicatricem perducitur, & tumor postmodum revertitur: quorum neutrum istis accidit.

Ad hoc ipsum tumorem genus pertinuisse, crediderim, quem pro omphalo-epiplocele habitum a Medicis Præstantibus, alias (m) tibi commemoravi; cum in mortuo nulli ibi hernia, sed prominentia tantum fuerit a pinguedinis copia, quam cellula quidem continebant subiectæ membranæ Adiposæ, nulla autem peculiaris cystis complectebatur. Eodem autem pertinuisse, certo scio, quippe cum ipse dissectum, & sicut hic requiro, ita se habuisse, perspexerim, globum illum sanæ pinguedinis quem sub abdominis pariter cute, sed paulo altius, nimirum ad Eniformem Ventræ cartilaginem, alia tibi olim Epistola (n) indicavi, itemque eum quem in femore Anus alterius a me diligenter perlustratum, alias (o) describam. Horum similem de duobus quos Littrius proposuit, illum fuisse quem ipse quoque in decrepita mulieris femine deprehendit (p) facilius crediderim, quam supra (q) ad viri scapulam commemoratum, ut in quo non solum nullam cellularum mentionem injecti, sed & cystim discrete posuit qua cingebatur, cum in muliebri illo cellulas quidem, cystim autem neutquam memoraret, imo ubi ad amputationem veniendum est non cedentis iis quæ initio adhibenda exterius commendat, nihil relinqui vel de tumore, ne forte repulset ex cellula aliqua jam laxata, ut ait, non ex cystis reliquis, quam si tunc ullam dissecasset, ibi non fuisset omisurus. Tumorem ex pinguedine factum Littrius rarissimum credebatur, nec fortasse antea visum. Elsholzius (r) tamen ante illos duodequadraginta annos sub nomine steatomatis dissectionem tumoris ediderat qui militi prope interfemineum natus, adipem continebat, tenuissimis membranulis per totam hujus massam dispersis, in cellulas quasi distinctum. Quem ego tumorem, vel dissecti Icone spectata, ab iis quos ipse persequi, credere possem vix discreparem, nisi circumjectis folliculis memoratus esset, itque crassitie calorem fere æquans. Sunt & alii, quorum mentio fit ab Alexandro Camerario (s), pinguedinem, aut pinguedini materiam similem continentes; sed cum ea, alia atque alia, & in his glandulas interjectas habentes, aut in Adiposa membrana non subsistentes, ut pro legitimis hujus Excrescentiis, quales a me intelliguntur, habere non possim, ut neque in Commercio Litterario (t) propositos ex pinguedine factos, ubi, aut mamme instar, suis cellulis coarctata, tenaci, dura, crassa, cui ampla valde vasa cruorem vehentia erant interpersa; quamquam hos initio haud aliter ac a me descriptos, esse potuisse, non nego, hos autem, & illos omnes tibi auctor sum, ut huic Sepulchreti Sectioni merito adjungas. Nec aliter sentio nominatim de tumoribus duobus, quorum alterum descriptum Jo. Georgius Hoyerus (u), alterum Elias Camerarius (x), ille in femina provectæ ætatis circa scapula sinistræ regionem, hic in viro ad genu, & supra. Multa in utroque tumore, quod ad interjecta, ad penitiorem sedem, ad pinguedinis consistentiam attinet, mutare importuna ægetarum curatio potuit, & quæ glomeramina glandulosa, sed ex materia adiposæ simili constantia, & qui plurimi quasi alveoli dicuntur, e quibus pinguedo mollior exprimebatur, hujus cellula olim fuisse potuerunt. Sed hæc ex conjectura; illud certum, si ego, ut in mesaræo, ita sub cute ipsa invenissem tumorem ejus generis, qualis parvulum descriptum habes Epistola XLIV. (y); nunquam me inter legitimas membranæ Adiposæ Excrescentias fuisse relaturum, nam pinguedinem concludebat neque cellularum laminis interscissam, & sphaerico uno folliculo undique comprehensam.

25. Quæcumque autem causa certo loco cutem laxet, ut minus resistat ponderi, aut molli pinguium plurimarum cellularum ibi magis augetur, ubi minor resistentia est, præsertim si compressio, aut occlusio aliqua accedat seu venularum pinguedinem ex iis cellulis revehentium, siue etiam foraminum in proximis cellulas transmittentium; non difficile nobis rationem præbet intelligendi originem Excrescentiarum de quibus loquimur, & immane incrementum quoque, ipso nimirum pinguedi-

guedinis pondere magis in dies, magisque tum cellulas, tum cutem laxante: quamobrem cellulae alia atque alia, sublata priori resistentia, se explicant, mirumque in modum amplificanc. Quantum autem ad pinguium etiam tumorum amplificationem faciat sublata resistentia, duo illi præsertim ostendunt quos paulo ante (z) dicebam a Cl. Viris descriptos Jo. G. Hoyer, & Elia Camerario. Erosi enim, aut incisa ab ægri cute, & penes tota eorum adiposa substantia, aut non exigua hujus parte adempta, quam mirum illi, & quam acceleratum ejusdemmodi substantiæ incrementum ceperint, ex utriusque historiis cognoscere. Esti vero de Membrana ipsa Adiposa verba faciens, nihil hoc loco nisi cellulas nominaverim; non propterea de ejus structura tibi præscribere quidquam volui. Sive enim majusculas quasdam ejus membranæ partes facculos, aut lobos malueris appellare, minores autem lobulos, & minimas demum cellulas, aut acinos, siue hæc omnia uno cellularum vocabulo comprehendere, siue membranas revolutiones, & complicationes dicere, siue etiam membranas laminas varie inter se inclinat; perinde erit ad rem propositam intelligendam, Auctoresque habebis in singulis iis nominandi rationibus non contemnendis. Quarta enim est ab Illustri inter recentiores Anatomo: tertia a Sanctorio nostro (a), qui sic præluxerat iis a quibus cæteras habemus: secunda usus est Glissonius (b), cum Malpighianam, ut puto, necdum legisset, cum scripsit, ut neque Glissonianam Malpighius, cum ante hæc, opinor, edidit suam (c), quæ ferme eadem ac illa fuit quæ a me primo loco indicata est. Eamque, si volueris, sequi potes: quid enim prohibet majores partes in minores, & has in minimas dividere? præsertim cum Malpighius nufquam, si probe memini, discrete negaverit, eas partes inter se, & cum cæteris communicationem habere, neque docuerit, membranas facculos, seu lobulos ovalem habere figuram, sed ovalem pene, imo diversimode figurari; & esse instar lobulorum, quibus componuntur etiam pulmones, qui lobuli ut variis sint formis, ostendunt Icones quas Epistolis de Pulmonibus adjunxit. Illudque insuper antea scripserat, contineri sacculo minimos lobulos diversæ figura, pinguedine repletos. Cæterum ad Excrescentias ut redeam ejus generis de quo dictum est; non ex Adiposa tantum membranæ quæ sub cute est, sed etiam ex internis aliis, & nominatim ex omento quodam, illarum sic satis similes, existere, indicat Observatio, in Anatomica Bibliotheca (d) relata, innumerosum processum qui ex adiposis omenti partibus pollicem crassi, quatuorque, aut quinque digitos longi, & eodem quo cæteræ membranæ adiposæ, concreto nonnihil oleo humore turgidi, propendebant. Sed interioribus hifce tumoribus omisiss, de iis qui sub manus, oculisque cadunt, quemadmodum postulat harum Litterarum propositum, scribere pergamus.

26. Esti vero ordinis alicujus gratia de his qui reliqui sunt tumoribus ita dicemus, ut eorum sedem magis, quam naturam, sequentes, ab iis qui in capite, & collo occurrunt, initio facto, deinceps ad inferiores descendamus; noli tamen expectare, ut quæ ibi, aut alibi venereæ gummatæ se produnt, hic memoremus, quippe aptius ad eam Luem (e) servaturi, multoque minus ut quæ de hydrocephalo alias (f) scripsimus, aut de narium polypis (g) hic repetamus. Linguae autem tumores plures quidem conspeximus; sed nullum dissectandi occasionem habuimus. Quos inter prætermittere hic nolumus minora quædam instar verrucarum tubercula, in superiore illius superficie propius basim a Chirurgis quodam olim in Patavina muliere nobis ostensa, ut qua potissimum ratione tolleretur, consilium darem. Non ignorabamus, Marcellum Donatum (h) ceu raram admodum rem, nec toto vitæ suæ curriculo nisi bis a se conspectam, linguæ verrucas proposuisse. Quo magis attente in exerta lingua, & a Chirurgis satis depressa, quid tandem se visui obiceret, expectabamus. Nihil fieri poterat verrucis ad speciem similis; sed reapse non aliud erant ea tubercula, quam maximæ illæ omnium potestremæ papillæ, ut earum sedes, ac positus continuo indicaret, hoc uno peccantes, quod cum esset ea linguæ pars phlogosi affecta, ipsæ quoque aliquanto crassiores, altioresque factæ, protuberabant. Bono igitur animo esse mulierem, & Chirurgum iussi, nullumque aliud quod quidem ad illas attineret, huic mecum redeunti consilium dedi, nisi

ut anatomicas ostensiones frequentaret; quarum neglectu sæpius accidit quam putas, ut quæ naturalia sunt, ea pro morbis accipiantur non secus ac quando pro ulceribus accepta sunt ea quæ secundum naturam patent in proximis tonsillis foramina. Has vero si præsertim inflammatione, siue a prægressa tumentes in mortuis quidem non semel dissecui. Duras autem factas, & in tumores scirrhosos excrescentes ut ferro sibi eximendas curaret, nemini auctor esse volui, non quod eximi posse ignorarem, sed quod præstare non possem, qua dextertate, & felicitate uti in ea re essent Chirurghi quidam Experientissimi, in primisque Benevolus (i), eadem cæteros esse uturos, præsertim cum certior factus sim, quanto alibi in periculo ob nimiam, & vix tandem cohibitam sanguinis profusionem nonnulli fuerint ex iis qui passi sunt sibi tonsillas eximi. Gavissusque sum, cum prudentem, doctumque, siquis alius, Medicum Franciscum Seræum mihi narrantem audivi, haud aliter se gerere solitum, nimirum hinc felicia, quæ plura vidit, inde periculi, & metus plenissima, quæ pariter non ignorat, hujus curationis exempla consulentibus proponere; cæterum quid facere deberent, nullo proprio judicio interposito, arbitrio ipsorum relinquere. Sed venia tamen ii Chirurghi digniores sunt, qui ubi viam illam quæ ad loquendum, deglutendum, spiritum ducendum est necessaria, scirrhoso utriusque tonsillæ tumore valde angustam jam factam vident, irritifque aliis auxiliis omnibus, in dies angustior fore, metuunt, ut periculum futurum prævertant, in præsens audent ægrotaantem præcipitare, venia, inquam, digniores sunt, quam qui verrucam, aut aliud ejusmodi innoxium tuberculum, congenitum præsertim, & lividum, e facie demendum suscipiunt, non attendentes quæ admonuit Arantius (k), si forte id feliciter cedat, minimam, quippe ex re minima, laudem, magnam vero infamiam sequi, si quod facile, & sæpe contingit, mala gravissima ex facie vel levi irritatione concitentur. Faciei dixi, ut qui, tuberculo istiusmodi, non jam e nasi, aut labiorum, sed e buccæ cute per Chirurgum temere detracto, leve ulcus primum, sed quod ad cicatricem duci non posset in bene alioquin valente Sacerdote, conspexerim denique cum magnum, & cancerosum, & insanabile jam factum totam penitus absumperat buccam, ut tandem per acerbissimos cruciatus occideret. Chirurgus tamen ferro tuberculum exciderat: quod dico, ut minus mireris, si vel multo amplius cancerosum ulcus secutum legeris (l), cum alter Chirurgus faciei verrucam remediis causticis tollendam suscepisset.

27. Quid vero per anatomen in recenti, amplexu tumore viderim, buccam, & quæ infra mentum, & auriculam sunt, occupantem (m), aut in altero minus recenti qui pone aurem increverat (n), aut qualem, & quam in duritiem mora transeuntem materiam in parotide glandula invenerim (o), satis alibi scriptum est. Quid autem in eadem glandula tumorem faciat quem parotidem vocamus, & quem sæpe quidem acuto vigente morbo, ambiguoque hujus eventu oriri, nemo est qui ignoret, nonnunquam tamen in convalescentibus, atque adeo jam extra lectum degentibus, feliciter apparuisse, scimus, cum necdum acciderit, ut dissecaremus, pro certo dicere non possumus; quamquam interdum ex humore fieri posse, qui potius glandulæ communia integumenta, quam ipsam distendat, ex eo fortasse conjicies quem conspectum a nobis releges, illum quem modo memoravimus primo loco, tumorem describentibus; præsertim ubi suppurato, curatoque tumore; glandula, suo munere omnino, ut antea, recte fungatur. Ipsam vero glandulam, febri nulla prævia, sensim intumescere, & duram fieri non secus ac alias in collo subiectas, cum in strumas grandescunt, nimis omnibus notum est quibus magnum plerumque negotium faciunt, Medicis, & Chirurgis. Nonnunquam tamen longe facilius quam sperari posset, resolvuntur. Sic in septenni puella Veneta parotidem memini duram factam, ac valde tumentem, nec sine dolore jam tangendam, omni quæ subsisterat, paulatim quidem, sed penitus discussa materia, ad naturæ modum rediisse, uno, ut vidi, inunctionis ex oleo philosophorum auxilio. De strumis autem Vallisnerium nostrum audivi haud semel testantem, cum rustica mulier filiolam ad ipsum adduxisset strumofam, ipse autem ut paupercula, & puellula, nihil nisi vinum tenue sumendum imperasset in quo insecta quæ afellos vocant, essent

(k) Part. 1. Obs. Med. rar. 3. (l) Eph. N. C. Cent. 5. Obs. 17. (m) Epist. 43. n. 10. (n) Epist. 19. n. 18.
(o) Epist. 68. n. 6. Adde etiam alterum ibid. n. 8. (p) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1704. Obs. Anat. 1.
(q) n. 22. (r) Hist. Steatomat. refect. (s) Hist. Pedis tumid. (t) A. 1741. Hebd. 1. n. 4.
(u) Eph. N. C. Dec. 3. A. 7. & 8. Obs. 183. (x) Dec. ead. A. 3. & 6. Obs. 41. (y) n. 3.

(z) n. 24. (a) Comment. in I. Fen. Avis. Quest. 55. (b) Tract. de Partib. Continent. c. 11. & 15.
(c) Exercit. de Omento, Pingued. & cat. (d) Tom. 1. p. 1. in Adnot. ad cit. Malp. Exercit. (e) Epist. 58.
(f) Epist. 12. (g) Epist. 14. (h) De Medic. Hist. Mirab. l. 3. c. 5. (i) Observaz. 12. (k) De Tumorib. p. n. 6. 23. & 24.
(l) Eph. N. C. Cent. 5. Obs. 25. (m) Epist. 4. n. 24. (n) Ep. 14. n. 3. (o) Ep. 11. n. 15.

essent macerata, mulierque ex iisdem vel plura quam ipse dixerat, in vinum semper injectisset, plurimasque sic urinas movisset, exacto mense cum filia redisset, non sine sui admiratione perfunata. Quae remedia non ideo memoravi quod ignota sint, imo quod notissima, eoque apud quosdam contempta, cum tamen aliquando, in tenera praesertim aetate, neque adeo inveterato morbo, afferre opem queant spe, & expectatione majorem.

28. Fortasse hic quaeres, num recte ab Riolano scripta sint quadam de strumis Anthropographiae libro 2. cap. 15.

Recte quidem illa scripta sunt: nec sine ratione Julius Pollux in Onomastico, circa mesenterium strumas fieri, notavit. De hac re vide Philippum Ingrassiam, libro de Tumoribus pag. 229. Quae autem proxime praecedunt, non recte: nec foras erumpere unquam strumas, nisi Mesenterium strumofum fuerit. Ideoque Guidonem de Causaliaco perite admodum strumarum scaturiginem a Mesenterio repetere. Nam Guido (p), & qui ab ipso laudatur, Arnoldus hoc docent, a strumis exterioribus, si multae sint, ostendi interiores: nec verum est univere quod ait Riolanus, erumpere nunquam strumas, nisi in mesenterio sint aliae: idque merito improbatum est a Thoma Bartholino (q). Adversus quem in hac Sepulchreti Sectione (r) haud satis defenditur Riolanus, quasi non aliud dixisset quam Guido, id est strumas exteriores sint magno numero. Hoc enim Riolanus addidit in Encheiroidio (s), imo ibi quod in Anthropographia univere dixerat, vel magis contraxit, scribens, strumas raro foras emergere magno numero, nisi radices egerint in Mesenterio; Bartholinus autem non Encheiroidium respexit, sed Anthropographiam, ut alii quoque, in iisque Schellhammerus (t), & ante hunc Scultetus. Qui ut ex Sepulchro ipso (u) vides, Riolo universalem illam sententiam tribuit, addiditque: Quod etiam testantur Guido, & Ingrassias. Quorum alter quid docuerit, dixi; Ingrassias autem ne ab Riolano quidem tradidisse id dicitur, sed ut sententiae Pollucis, quae longe alia est, relator, & confirmator, laudatur, nimirum circa mesenterium etiam strumas fieri, quod, inspecto, ut monet Riolanus, Ingrassias libro, cognovissent Schellhammerus, & Scultetus, & qui huius Observationis Scholium in Sepulchro addidit, in quo ceteroquin non est cur diligentiam hanc requiramus, quando nec Sculteti locus accurate describitur, poniturque Riolani caput 5. pro 15. & Sculteti Observatio 39. pro 31. Vidi ego annis superioribus generosum juvenem, cum eo qui a Platero in Sepulchro (x) describitur, exteriorum strumarum numero, earumque multiplici, semperque inutili curatione comparandum, cui tamen, primo saltem anno, nullum erat strumosi mesenterii indicium. Sed neque Platerus, qui poterat, sui aegri ventrem, neque ego mei, hinc procul denique mortui, introspecti. Hoc tamen quod protinus subijciatur, & quod satis est adversus Riolanum in Anthropographia pronunciatum, in alio memini vidisse.

29. ADOLESCENTULUS ob strumas quae collum occupabant, in Nosocomio hoc obierat sub initium Novembris A. 1715. CADAVERIS quasdam alias partes, Anatomes studio ductus, & in iis mesenterium cum dissecare; in eo non modo strumam ullam, sed ne duras quidem glandulas deprehendi: & quamvis paulo quam soleant, sunt visae majores, ab aetate id potius esse (y), quam a morbo, existimari.

30. Ad colli strumas omnino esse referendos tumores glandulae Thyroidae, & perperam bronchocelas vocari, affirmat Joannes Freindius (z), qui harum plurima genera, sed omnia extra eam glandulam, agnoscit, in iisque aliquod aneurysmati simile, cui propterea scapellum non sit adhibendum. Joannes autem Riolanus (a) ante Schellhammerum (b) qui se primum animadvertisse hoc, credebatur, inter bronchocelas, quas longe a strumis differre, censet, glandulam ponit Thyroidaeam productiorem quae sarcoma producit, neque inter eas ullam memorat, quae similis sit aneurysmatibus. Cave enim credas, quod huic Riolani loco exemplum continuo subijciatur in Sepulchro (c) ejusmodi bronchocelas quae aneurysmatis simillima, nisi potius verum aneurysma; fuit, ad eundem, ut ibi dicitur, id est ad Riolanum, aut forte ad Pareum, quorum nempe verba, & Observationes productae modo fuerant, attinere. Quod si quaeras, ad quem igitur illud, &

quae duo proxime sequuntur (d), exempla attineant; Severinum (e) lege, ex eoque tria ista exempla, quamvis negligenter, descripta esse, cognosces: qui ultimum diferte inter aneurysmata ipsa reposuit. Mihi vero forte accidit, ut tot inter quae dissecui, tumentia colla quae bronchocele credebant affecta, vitium omne in Thyroidae glandula semper offenderim, tunc etiam cum erat cavum aneurysmatis simile, certe autem sanguine plenum. Quae meae Observationes varii, & multiplicis in tumente ea glandula vitii cum edita extant Epistola Anatomica IX. (f); non est cur hic repetantur. Porro alias habes in Epistolis quas ad te misi (g), aliasque huc addam, ex quibus magis magisque ut varii sint morbi illius glandulae, intelligas, aut saltem qualia sint ejus morborum initia.

31. MULIERIS in hoc Gymnasio dissecta A. 1741. cujus reliquam historiam mittam, cum de Arthritide agam (h), Thyroidaeam glandulam vidi multo quam aequum esset, crassior, subrotundam, totamque in se conglobatam. Incidendo duram, atque adeo scirrholam reperi, inter substantiam coloris ex carneo fusci alba hic illic interjecta.

32. FEMINAE alterius caput, & collum ibidem, eodemque anno persecantibus cum ea de qua loquimur, glandula animadverta esset ad imum sinistram lobum subdura; utrumque lobum discindens secundum longitudinem, plures, nec parvas albae substantiae portiones utriusque, & praesertim dextero, intermixtas conspexi, in altero autem qua subdura fuisse, dixi, inclusam cystim ex crassa, albaque tunica, qua flavus humor ad spissitudinem vergens continebatur.

33. VIRO cujus ibi eadem Partes per eos dies consecabantur, Thyroidaeam glandulam alter lobus major erat altero, nec paulo altior. Cum attentius inspectam summam lobi illius partem, quae erat durissima; membranam vesicam in ea semisepulam animadverti rotundissimi globi forma: qua pertusa, humor prodit flavus, viscidusque, ut bilem referret.

34. MULIERIS larynx ibidem apparabatur A. 1744. Detracta eadem glandula major quam soleat, ac turgidior, globulos quosdam ex parte aliqua extantes, reliqua intra se conditos ostendebat, forma omnes rotunda, sed alia alios magnitudine. Maximus mediocrem uvae acinum aequabat: ceteri multo erant minores. Horum tunica punctata, humor exsilivit nullo colore, aquae instar. Sed maximus longe alius erat generis; ex firma enim, ut dissecando perspexi, constabat substantia, ejus non ita dissimili ex qua glandulae conglobatae, albo autem colore ex subrubro obsoleto, nisi qua parvis maculis quasi atrii sanguinis hic illic distinguebatur, & exiguis alicubi caveis, nihil continentibus.

35. MULIER altera paulo post illam, sed in Nosocomio, dissecta, in Thyroidaeam glandula ad basin lobi dexteri album corpusculum habebat grani ciceris magnitudine, & quasi forma, nonnihil extra glandulam prominens: quod incidens, osseum potius quam cartilagineum esse, cognovi.

36. JUVENIS ex aetate mortui, cum meliora non suppeterent, collum, & caput ad Anatomem publicum absolvendam A. 1747. in Theatrum illata sunt. In quibus cum cetera tamen sic fati essent intra naturae modum; glandula quam saepius nominavimus, aequo crassior fuit, ad imam autem lobi alterius partem eriam durior. Quo loco dissectam consistere vidi quasi ex vesiculis rotundis, mucis plenis. Substantia reliqua, siexterior inspiceres; glandulam in grandiusculis divisam lobulos; si interior, in minutos, sed magis quam soleant, distinctos, representabat.

37. Ex Observationibus hinc intelligis, Thyroidaeam glandulam tumores, aut tumorum initia crebrius mulieribus, quam nostro sexui, contingere. Quod & in Epistolis Anatomicis (i) indicavi, & tu ex bronchocelas exemplis conjicies quae in Sepulchro relata sunt, primum si omnia quidem inter se conferas, neque enim in hac modo Sectione invenies, sed & libri III. Sect. 8. (k) & libri II. Sect. 2. (l) quae hic juxta consuetudinem suam commemorare Bonetum oblitum miror; deinde si ea seponas quae ad vera aneurysmata potius attineant, quod conferendo cum iis libris unde accepta sunt, facilius intelliges. Conferre autem, ut opinor, non oportebit alte-

alterum eorum quae libro II. proponuntur, ex Moenchio videlicet; tunc enim monerem, ut pro Epid. 77. quemadmodum in Sepulchro editum est, Epist. legeres 87; ad huius enim finem id scripsit ad Bartholinum (m) Moenchius. Nulla autem opus conjectura esset, si qui in bronchocele quae deprehenderint, tradiderunt, quomodo se Thyroidaeam glandula haberet, non omiserint: ad quam tamen saepius illa attinuisse, cum ex nonnullis eorum verbis, tum magis ex meis suspicor ad hoc usque tempus habitis Observationibus. Ceterum illas quoque inspicias velim quas post alteram Sepulchreti editionem Viri Clarissimi vulgaverunt Henricus Albertus Nicolai (n), Phil. Conr. Fabricius (o), Medicus Gallus Lalouette (p), Janus Plancus (q), Albertus Hallerus (r), alique, in his, quod ex Boeclero (s) scio, Lauthius. Alia alios vitia in Thyroidaeam glandula vidisse, leges, ple-rosque autem dura corpora cartilaginea, ossea, lapidea, & nonnunquam ipsam osseam factam, aut lapidecentem. Noli vero propterea quia non unus est qui, urego quoque, hosce interdum, aut alios morbos in altero damtaxat ejus lobo, integro altero, animadvertit, noli, inquam suspicari, unicam haud esse hanc glandulam, sed duas; nisi idem suspicari velis de liene, aut de jecinore, cum altera horum pars, salva altera, morbo quoque correpta est. Multo autem magis cave ubi Disquisitiones quasdam leges super glandula Thyroidaeam, ne facile sollicitationes aliantur de qua initio occurrunt. Sed prius attente perlege quid de ea glandula non modo Epistola Anatomica IX. (t) verum etiam iis quae Epistola eadem indicat, locis I. V. & VI. Adversariorum scriptum est, & tunc demum illas quoque perlege Disquisitiones. Laudabis quidem, me probante, Auctoris voluntatem, conatunque illustrandi, ac promovendi suspicionem illam meam de pluribus, sed tenuissimis in laryngem desinentibus Thyroidaeam glandulae canaliculis. At simul optabis ut hos longe alios ac lymphae ductus, esse conjecisset, horum officii, & structurae memor: in ceteris autem, quae mea sunt, mihi tribuere: quae non sunt, ea vero mihi ne assignare voluisset, ut, exempli gratia, ubi dicor ad inquirendos illius glandulae canaliculos prohibuisse aeris immisionem, aut rejecisse glandulae compressionem. Nonne satis est vel conviventibus oculis unam aut alteram paginam inspicisse Epistolae illius (u) ut appareat num aeris immisionem prohibuerim? nam glandulae compressionem rejecerim? Caute illam ac leniter insitruendam esse, admonui: quod probe intellexit Solers Vir Boeclerus (x), cum diffidentibus Disquisitionum Auctore, se a meis flavere partibus, scripsit; nam non nisi fortiter, inquit, vesicam unam inflando, reliquas, nec omnes elevare potuimus, ut hinc aerem in cellulosa relam, vasa disrumpendo, viam sibi paravisset, sicque totam glandulam intrumississet, credamus. Compressionem autem huius glandulae quoties usus sum, non solum non reticui, sed insuper eorum qui illam inutilem probare vellent, rationem diferte refutavi. Quid ergo est? An ratio ista quam alter apud me, ipsam mox rejicientem, proponit, pro mea forte ab eo qui festinans legeret, accepta fuit? Videtur aliquid huiusmodi facile in errorem traxisse quempiam alium qui in Problematum quodam Anatomico non advertebat, quomodo in disputationibus accipiendum sit quod gratificandi causa quasi per hypothesein seponitur, intereaque tanquam dubium relinquitur, & me contra Cowperum eo loco pugnassem, existimans quo Cowperum tueri ipsum pergebam, cum non modo adversus me defendere, sed exultantis victoris instar hanc subijcere non dubitavit: dicat nunc Morgagnus, quandoque. Quae cum verba Amicus quidam legeret meus, quid, inquit, Morgagnus dicat, nisi quod olim dicentem audivi, cum aliqui Juvenes qui in Doctorum Viros libris perlepe invenerant, Morgagnum certas quasdam res observavisse post Berengarium, Falloppium, Arantium, aliosve Anatomicos, nescirent autem, hos a Morgagnio ipso in illis observationibus nominatim fuisse indicatos, ut fateretur per quos profecisset, & quid tamen addidisset, ostenderet; cum igitur illi Juvenes mirarentur, fugisse ejus oculos, aut memoriam tot laudatorum Auctorum locos; ad vos nolite amplius, inquit, praepropere judicare. Sed de me plus satis; de Thyroidaeam autem glandulae tumoribus satis, si illud addidero, qui vocis inde mutationem adnotarunt, multiplicem id expli-

candi rationem esse habituros five ob prohibitum, aut mutatum in laryngem humoris influxum, five ob additum laryngis musculorum distractionem, pressionemve, five ob impositum ipsi pondus, & urgentem molem: quae in Epistola illa IX. (y) preesse indicavimus. Longe tamen graviora accidere ab nimis aucta pressione possunt, five haec in Jugulares venas cadat, unde soporem, & apoplexiam Illustri videri Hallerus (z), five Asperam arteriam praecipue adstringat, quod idem adnotavit, ita uti spiritus vix possit duci; imo ne vix quidem, sicuti observarunt alii, & praeter ceteris Kerckringius (a), qui miranda foemina suffocatione permotus, reprehendit Medicos qui humorum immixtionem, & diversionem operam dare omiserant, ut tumor lentius faltem crederet, neque praecipiti incremento arteriam Asperam colli vertebrae apprimeret.

38. Jam vero de Jugularium glandularum tumoribus (b), & de iis quae vera in collo sunt, aneurysmatibus (c) cum alias ad te scripserim; age, ad pectus descendamus. Quod ad mammarum tumores attinet, hos quidem tempore lactis obortos negat Fabricius noster ab Aquapendente (d) unquam se non sanatos vidisse. Longa tamen, varia, & permolesta haud raro parit incommoda antequam abscessus in quos abeunt, perficiantur. Quo magis optandum esset, ut puerperis quae lacte abundant, certis autem de causis lactare nequeunt, remedia essent in promptu per quae priusquam in abscessus verteretur, tuto sibi lac abigerent. Medicus erat Bononiae qui hoc praestari a se verabat suspensio inter scapulas siccato pisciculis quem hippocampus, five equulum marinum vocitant, certo praesertim, ut ipse aiebat, tempore capturn, quare cum duplicem haberet, alterum altero, dicebat, esse magis efficacem, eumque libenter iis qui poscerent, commodabat. In his fuit ingenuus Juvenis qui mecum ibi ante huius saeculi initium Medicinae studiis operam dabat, illamque facere jam coeperat: hic autem cum binis in puerperis expertus esset, in utraque respondisse, testabatur. Quo de experimento cum postea per annos triginta, eoque amplius nihil audivissem; in posthumis tandem Vallisnerii nostri Scriptis (e) inveni, saepe ab se periculo eodem facto, ad eundem modum successisse: ad contrarium autem modum, si ab opposita parte, id est inter mammam, mulier augere lac cupiens, suspenderit: quod, a Bononiensi illo Medico pariter affirmatum, Socius ille meus experiendi occasionem non habuerat. Aegre fero, neque a me olim quaesitum, neque a Vallisnerio fuisse adnotatum, num lac sic abactum, mulieribus quidpiam detrimenti attulerit; potuit enim non asserere, si lente, ac sensim abactum fuerit: qua ratione agendo argentum vivum, scriptorio calamo inclusum, sicque inter mammam gestatum, lac discutere sine ulla noxa, saepissime vidit, non modo audivit, Cl. Degnerus (f), ab Amicis pluribus certior factus, multis etiam inter Batavos mulieribus familiariter, tum, ac probatum hoc esse remedium. Certe autem quo dixi tempore cum esset alterum hoc auxilium apud nostrates ignotum, praecipui Bononienses Medici primo illo tam facili remedio non utebantur, five non crederent, five nocere posse, suspicerentur. Itaque Albertinum memini puerperis duabus generosissimis cum mammae ea lactis copia turgerent, ut neque dormire, neque brachia sine dolore movere possent, non aliter opem tulisse, nisi lactis materiam ad intestina divertendo, idque clysmate nil aliud habente quam jus, in eoque solum butyrum, & sacchari quantum solet. Quod ideo memoro, quia mira felicitate utraque inter deiciendum ita levare coepit, ut utraque deinceps decreverit, neutri opus ullo praeerea auxilio fuerit. Quia mihi fange affirmabat Albertinus, ab earum altera materiam esse dejectam multam, quam ipse viderat, lactis omnino similem; ut mihi in mentem veniret illius foeminae, cui praeputum post ablactationem mamma detumuit statim ac pro saliva lac proflire in os coepit: quam tu Observationem, explicationemque ejus, ad hanc Albertini ac commodandam, leges in Nuckii Sialographia. (g) Quo autem modo in epidemica quadam Parisiensium puerperarum, Constitutione de qua scripsit Prael. Malovianus (h), cum tertia, aut quarta a partu die mammae non modo, ut solent, non tumescerent, sed flaccescerent, post mortem quae inter quinque, & septimam diem acci-

(p) Chirurg. tr. 2. doct. 1. c. 4. (q) Anat. quart. renov. l. 1. c. 12. (r) Obs. 6. Schol. ad §. 4. (s) l. 2. c. 18. (t) De hum. corp. Tumorib. §. 2. P. 1. n. 78. (u) Obs. cit. §. 9. (x) Obs. ead. §. 3. (y) Vid. Haller. ad Boer. Prael. §. 128. not. 2. (z) Hist. Medie. ubi de Albucasi. (a) Encheir. Anat. l. 4. c. 7. (b) l. cit. §. 2. P. ead. n. 83. (c) Sect. hac 2. Obs. §. 2. (d) §. 3. & 4. (e) De recond. abscess. nat. l. 4. c. 6. & 7. (f) n. 38. & seq. (g) Epist. 16. n. 38; Ep. 26. n. 21; & Ep. 34. n. 15. (h) Epist. 57. n. 2. (i) Epist. 9. n. 40. (j) Obs. 31. in fine. (k) Obs. 9. §. 1. & 4.

(m) Vid. in Bartholini Cent. 2. Epist. Medie. (n) Dec. Obs. Illustr. Anat. Obs. 4. (o) Idea Anat. Pract. Sect. 4. (p) M. moir. de Math. & de Phys. presentés à l'Acad. R. des Sc. Tom. 1. pag. 168. 169. (q) Epist. de Morbis & cat. cum Tab. 3. Fig. 1. & 2. (r) Opusc. Pathol. Obs. 6. (s) Differt. de Thyroidae, Thymi & cat. Functionibus not. 9. ad §. 18. (t) n. 30. & seq. usque ad 41. (u) n. 36. & 37. (x) Differt. cit. not. f. ad §. 8. (y) n. 40. (z) Obs. cit. 6. (a) Obs. ex Sepulchr. supra cit. §. 1. (b) Epist. 22. n. 19. & Epist. 29. n. 1. (c) Epist. 26. n. 21. (d) De Chirurg. Operat. ubi de Chin. Thoras. (e) Opere Tom. 3. P. 4. Saggio Alfab. d' Ilor. Med. alla voce Ippocampo. (f) Act. N. C. Tom. 5. Obs. 149. (g) c. 2. (h) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1746.

accidebat, lac coagulatum exteriori adhærens intestino-
rum superficiei, deprehendi potuerit, tamen illa vide-
rentur fuisse inflammata, & doloribus cruciata, morbus
autem a diarrhoea, & hac permanente, initium duxit
set, non facilem habet explicatum, nisi forte ex lacteo il-
lo sero quod in sanguine verisimiliter redundans cum ali-
bi in quibusdam, tum in omnibus tunc dissectis in ven-
tris cavo inventum est, crassiores, viscidioresque partes
subfederant, & subjectis intestinis adhæserant.

39. Tumores autem mammarum, qui lactis tem-
pore non oriuntur (quantum & eorum exempla
profert Hildanus (i), & aliquod ipse vidi, qui tunc
orti, in cancerum degenerarunt) et si Fabricius nos-
ter (k) raro vidisse se, scribat, qui canceri naturam non
fuerint emulati; tamen; ut aliis omittis, unum Lu-
dovicum Mercatum (l) inspicias; satis superque in-
telleges, quod alia occurrant in mammis tumorum ge-
nera, quæ cancerum non æmulentur. Sed & præter ea
quæ ipse describit, alia sunt, velut hoc a me in Ve-
netæ Virgine observatum annos nata ad quadraginta.
Ei cum menstrui sanguinis cursus diebus aliquot tar-
dius incipiebat, tumor ovo columbino major, non
inæqualis, nec cutis colore mutans, sed durissimus,
& in proximi brachii motibus dolorem creans, non
raro nasci solebat in altera mamma, eaque sinistra,
ut si totam occupasset, vix quidquam discrepans vide-
ri potuisset ab aliquo eorum qui primo loco a Mer-
cato describuntur. Sed neque erat omnino ejus similis
quem glandulosum vocat, ut qui non modo in parva-
las non sequebatur extuberantias, sed mox prodeuntibus
menstruis, nullo præsidio adhibito, nulloque sui relicto
vestigio, nedum celeriter detumescere, verum penitus
abibat.

40. Sunt vero & tumores qui intra mammam innas-
cuntur, quæ, instante menstrua purgatione, molestis ten-
sionibus obnoxia esse consueverunt. Ii duri, & in quosdam
quasi nodos distincti, aut interdum totam mammam glan-
dulam occupantes, non modo perstant, sed accedenti-
bus postea doloribus, abscirri in canceri naturam dege-
nerare jam videntur. Leges descriptas a Præstantissimo
Trewio (m), & quomodo intra finem anni vertentis
radicatus, at sine ferro, exstirpaverit, ut ne minimum
quidem superesset vestigium, cognosces. Alii vero
aliquando tumores sunt qui tum diutius, imo diutissime
in mammis hærendo, tum notis nonnullis alijs natu-
ram cancerum æmulentur, nec tamen sint. Adejusce-
modi tumores subiecta in primis spectat historia.

41. MONACHA Patavii fuit quæ ante annos trigin-
ta labore primum cepit dissecis intra alteram mam-
mam tuberculis. Hæc demum in unum tumorem con-
jungit vix fuit in mamma inferiore parte, qui ea erat
superficiei inæqualitate, eosque dolores ciebat, ut pro
cancro habitus sit. Novissime auctis doloribus, ipse per se
tumor se aperuit. Tunc vero ex modo quo se aperuerat,
& ex iis quæ prodibant, & apparebant, navus, & so-
lers Chirurgus non esse cancerum, censuit, & mederi in-
stituit. VERUM curatio nunquam ex sententia pro-
cessit donec sub finem anni 1739, e tumore corpus extraxit
tuberosum, mediocris nuci juglandis magnitudine, quod
ad me attulit. Constabat ex frustis offeis pluribus ma-
joribus, minoribusque, nullo certo ordine dispositis, ut
in distracto conspexi. Inter frusta erat interjecta substan-
tia quasi ligamento similis. Hæc exsiccata nigricabat:
offea autem frusta albedinem ostendebant suam. Itaque
mamma sanata est: & quamvis exulceratio redierit, non
ex ea Virgo, sed alio ex morbo, tribus ab illius offei
corporis extractione annis exactis, decessit.

42. Id corpus censui ex tunicis vasculorum, quæ mam-
mæ aut lactis, aut sanguinis gratia attributa sunt, ex
aliisve membranarum, offeis factis, originem habuisse. Un-
de fortasse alterum quoque habuit quod adolescentulus
in eadem cane reperi, in cuius utroque rene, ut scri-
psi ad te alias (n), calculos offendi. Alienum autem
non erit observata in bestiis quoque huc afferre, quan-
do in istam ipsam Sepulchreti Sectionem II. (o) tu-
mores ex vitulo, & cane relati sunt.

43. CANI una inter cæteras mamma paulo magis quam
æquum esset, tumebat. OCCISAM exercitationis
causa cum dissecarem; sub ipsa papilla modicum depre-
hendi corpus subrotundum, & inæquale, ex corpculis plu-

ribus coagmentatum, duritie autem plusquam cartila-
ginea. Sed digitis facile cedebat materia quædam ex
flavo livescens, qua plena erant tubercula duo, lentis
majusculæ forma, & magnitudinis intra Ventriculum
prominentia, quorum cythes inter carneam, interi-
oremque tunicam erant. Sub ipsa autem extrema Pul-
monum membrana quodam loco animadverti quasi gra-
nula huc illuc disjecta tartarea cujusdam materiæ.
Quæ cur hic non omittenda crediderim, continuo di-
cam.

44. Cum enim in eadem cane præter magnum renis
alterius vitium, calculos in utroque, sicuti paulo ante
commemorabam, invenerim; materiam istam in pulmo-
nibus quoque jam tartaream, & in ventriculo pariter
fortasse futuram, mihi diffinulandum non putavi, ut si
suspici forte velis, illud quoque sub papilla corpus ex
eadem potius, quippe abundante adeo in ea cane, quam
ex offea fuisse materiæ; per me possis: quantum neque
in cane, neque in Monacha illa (p) mihi tartarea vi-
sa est, extratque in Sepulchreto (q) alterius Monachæ
exemplum, in qua mammæ, quantum una earum ostendit,
cute excepta, totæ offeæ repertæ sunt. Quoniam tam-
men vel in ipsis arteriis controversum est, ut aliis ad te
Litteris (r) memoravimus, quod offeum videtur, re-
verane offeum sit, an tartareum, neque in propositis casu-
bus examina illa instituta sunt, quæ sic satis indicarent,
utro modo in istis mammis res se haberet; ipsam in me-
dio reliquimus tanto facilius, quod tartareas, lapideæ
ve concrectiones, sive, ut Celsus (s) loquitur, *lapillis
quædam similia* cum alii interdum tumores habent, ut
ipse docet, Sepulchretum autem Sectione hac (t) ostendit;
tum nominatim mammarum tumores; ut in Vidua
de qua narrat Cl. Bassius (u), inclusa iis corpora attritu
& collisione mutua sonitu inflat lapillorum edentem, nol-
que ipsi in viro materiam duratæ instar calcis viderimus.
Nam musculorum quoque mamillæ nonnunquam haud
fecus ac feminarum, in tumores excreverunt, quorum
unum descriptum legi a Bidloo (x), nec sibi ipsi ejusmodi
Observationem deesse, testatur is qui Bidloum lau-
dat, Heisterus (y), aliamque addidit Cl. Jo. Mart.
Wolffius (z); ego vero hunc morbum semel in Auri-
fice inchoatum vidi, cui nihil æque profuit ac diutur-
na brachii ejus lateris quies a me imperata, iterum au-
tem jam perfectum, sed continentem eamquam modo
indicabam, materiam; relique ita se habuit.

45. VIRO docto, & generoso, Matronæ illius filio,
cujus tibi & morbos, & dissectionem descripsi, cum de
Vomitum sermonem haberem (a), annum agent XXXI.
ceperat in superiore parte mamillæ dexteræ parvula
quasi glandula prominere. Hæc sensim aucta, intra an-
num circiter in tumorem excrevit pugni magnitudine,
prædurum, sed cunctis præter naturæ indicia peculiari-
bus carentem. IS TUMOR sub initium A. 1742.
quartodecimo ex quo inceperat, mense, sponte se ape-
ruit, ostenditque intra corticem, ab integumentis fa-
ctum, & fibris carneis, nihil nisi materiam quæ calcem
alibi duram, alibi molliorem referebat.

46. Tunc ipse & vidi, & tetigi intra hiantem tumo-
rem materiam hanc, quippe cum aliis nonnullis Gymnastii
Professoribus consilii causa accessit. Cum pater,
avusque fuissent arthritidi valde obnoxii, æger autem
hic nunquam, nisi quod levem aliquando, brevemque
ad pollicem alterius pedis, dolorem vix animadverterat;
credibile videbatur omnibus, quæ tartarea materia illis
in mucilaginosas articularum glandulas, huic, cum in
eas fortasse firmiores non posset, in mammarias incu-
buisse, idque facilius, quod sternum animadverti, vix
tertia a summo longitudinis parte emensa, repente, &
valde sublidere, quam obrem Mammariis vasis ad sterni
latera ad angulum hic inflexis, motum sanguinis per
mamillas tardior fieri, coniciebam. Ea vero de ar-
thritica illius materiæ natura tanto propterea verisimilior
opinio, quod Preustius (b) *calcosiformem* arthritidis ma-
teriam quæ in artuum extremis articulis deponi amplius
non poterat, per mammæ ulcus exire viderat, plerisque
nostrum feigniores faciebat in consilio dando, verentes
nimirum, ne exciso tumore, ejusque sede perfanata,
materia ad alias se verteret, interiores fortasse, nobiliores-
que Partes, quando nuper Albertini (c) quoque Ob-
servatio ostenderat, prohibitam illam ab artubus inferio-
ribus,

ribus, temere petrolei inunctione corroboratis, quo tur-
bas intus, in ventre præsertim, concivisset donec ita
per intestinorum exiret viam, ut mirum esset qualia,
quamque multa illac prodirent quasi ex calce, aut gypso ve-
rens coagmentato, eique materiæ haud ita dissimilia unde
efficitur podagra. Cum igitur ob ejusmodi causas cunctan-
tium consilia primum non displicerent, & materia pau-
latim e tumore detraheretur; ecce febris oborta, reapse
ad eam que erat reliqua, nova ejusdem generis mate-
ria accedit. Post quæ tamen æger cunctationis pertæ-
sus, strenuo Chirurgo se committit, per quem, ut ipse
omnino voluit, penitus exciso tumore, & vulnere
ad cicatricem non difficile perducto, ita convaleuit, ut
nullo exinde morbo, quod sciam, correptus fuerit.
adeo in Medicina felix nonnunquam est præter ratio-
nem audacia!

47. Quod ad genus tumorum spectarent, vel potius,
si mulier diutius vixisset, spectare potuissent duriores
æquo mammarum partes, quas fusco, viridi, atro hu-
more expresso, satis, ut videbantur, fanas reperi in ea
dissectione quæ tibi descripta est Epistola XXI. n. 47.
non facile dixerim. Etsi enim tumores illos tunc re-
ferre possem ad eum dumtaxat humorem, lactifera vascu-
la distendentem; tamen ejusmodi humorem adeo ab na-
tura norma alienum non aliquos præter indolis tumores
diuturna mora fuisse facturum, quis affirmare pro cer-
to possit? Mulieres quidem legi ab Riverio (d),
& Lanzono (e) visas, quarum e mammis lac viride
exibat, duas autem in Ephemer. Nat. Cur. (f), & in
Commercio Litterario (g) memoratas, quarum altera
lac habebat nigrum, & maxime acidum, altera autem,
quotiescunque vellet, exprimere poterat ex utraque mam-
ma liquidum aliquod spissius, coloris longe nigerimi, quod
luteo exceptum inter horas 24. ad instar æruginis vi-
vide evadebat, simulque, ut videbatur, naturam corrosi-
vam induebat. Sed ut pleræque earum minus fanas
fuisse, video; sic nullus scio qui finis fuerit, & num
mammæ, in primis, si aut lac non efflueret, aut quod
reistabat illiusmodi humoris non exprimeretur, nullo
dolore, & nullo denique malignæ naturæ tumore cor-
reptæ sint. Me jam intelligis de cancro loqui, tumore
qui sæpe adeo, in mammis præsertim nascitur, eodem-
que tam manifestæ pravitatis, quam difficilis curationis:
ut scite Joannes Bapt. Cortesius (*) cum ostendere vel-
let, non sequi semper, quod morbus cognitus, illico cure-
tur, idque præcipue ratione malignitatis suæ; canceri po-
tissimum exemplo usus sit, qui quamvis ab omnibus cognos-
catur, nihilominus raro curatur. Et sane vix nonnun-
quam accidit ut felix undique ea curatio sit. Persæpe
autem ea consecuta esse, vidimus, quæ Celsus (h) præ-
dixit, ut si Chirurgus vel peritissimis excisis, post
inductam cicatricem tamen reverteret in eundem, aut
alium in locum, & causam moris attulerit, sive cum alii
quidam usi essent medicamentis adurentibus, miseraque
feminas diu excruciant, aut pejorem, aut certe non
meliolem denique habuerit exitum. Fuit enim apud nos
quoque priusquam volumen Commentariorum exiret Re-
giæ Scientiarum Academia Parisiensis quod ad A. attinet
dicebatur. Sed si ea Dentellaria Rondeletii, ut ex in-
diciis quibusdam conjecimus; ipse enim, quantum pote-
rat, occultabat; si ve alia erat, cum magnam primum,
ut fit, de se famam concitasset, curationum exitu non re-
spondente desertus est. Qui an feliciter apud Monspelien-
ses respondere perrexerit, ignoramus: apud nos certe
Medici, & Chirurgi magis in ea sententia confirmati
sunt, ut cum videretur agrorum precibus, minime ea quæ
supra (i) sunt dicta, spectantium, suscipere curationem
coguntur, excisionem præferant, quæ si non minus acer-
bo, at longe breviori dolore peragitur, sicque minoris
constat ægris, tamen si postea cancer redeat, si non vi-
ta, at certe vite, interea sine assiduis teterim morbi
cruciatibus, prorogatio. Verum prorogatio hæc ipsa ut
sperari possit, quæ, & quot in ægris requirantur, dicere
superfedeo. Eorum quædam, itemque plura iis adversan-
tia, ex Observatione colliges, quam potissimum, cum
alias possem, hic dabo. Ex eadem enim simul quæ structu-
ratum videbis, *constrictionem*, que in cute nullius momen-
ti esset, eam ut Boerhaavii (k) verbis utar, in glan-
dula conglomerata scirrhum pessimum posse producere;
itemque cancerum curari difficillime in femina melancholi-
ca. Sunt enim & apud nos temperamento hoc quædam;

non omnes: qua in re nescio quis magno illi Viro adeo
impulerit, ut Italos traderet (l) ad annum ætatis deci-
mum octavum viridos & ludibundos esse: post trigessimum
annum tristes omnes, morosos, melancholicos, & hemor-
rhoidarios fieri. Cæterum eam nobiscum Observationem
annis superioribus per litteras communicavit Doctus,
& spectatus Vir Jo. Baptista Charburius, noster olim
dilectissimus Auditor, nunc autem Regius Augustæ
Taurinorum Professor Practicæ Medicinæ Primarius.

48. RUSTICA mulier annos nata circiter quinquaginta
sinistram mammam forte percusserat. In hac post
mensē ferme se prodidit tumor, quem frustra fortibus
resolvi, frustra compressione plumbeis concavæ laminæ
coerceri posse, speratum est. Augescebat enim, ut in-
tra septimum ab ictu mensē a superiore, eademque
externa mammæ parte, ubi multo crassior, durior, magis-
que abnormi figura erat, infra areolam jam descenderet;
cujus papilla intra alias aliquot transversas rugas tota pro-
pemodum latebat. Sub proxima axilla aliæ his similes
rugæ animadvertebantur, dolorque erat ad axillam, cum
attollebatur humerus, & universus ille artus oedemate
tumebat. Quæ res, & præter has adusta & melancholi-
ca mulieris temperatura advertebantur, qui tumoris ex-
cisionem proponebant. Favebant contra, mulieris robu-
stum corpus, intrepidus animus, & ad excisionem paratus,
quam cum alia, tum illud in primis urgebat, quod pun-
gentes dolores, qui ut crescebat tumor, ita ipsi quoque
magis semper increverant, jam ex molestis facti erant
non secus ac vigilie, multo molestissimi. Itaque ad tu-
moris excisionem ventum est, qui ut intus se habuerit,
infra dicitur. Res feliciter, & ex sententia peracta vi-
debatur ad diem usque septimum, quo vulnus tempore
vivido semper colore, & molle fuit. Sed ipsum postea
inflammatio, & corruptio invasit, quæ non modo quid-
quid cellulosi ex mamma supererat, verum etiam sub-
jectam mammæ Pectoralis musculi partem absumpsit, &
quæ Intercoastalium tum Internorum, tum Externorum
respondebat; ut nuda ibi inter costas pleura appareret
ad tractum digitorum circiter quinque, a sterni videli-
cet in transversum. Attamen mundatum denique est ul-
cus, & dies quinque molle fuit, tuncque pus laudabile,
pulsus non nisi ad vespæras frequens, idque ad paucas ho-
ras, & reliqua omnia erant ferme ad naturam modum, si
pertinacem alvi adstrictionem exciperes cui per clysmata
interdum occurrebatur. Post eos autem dies iterum om-
nia in pejus verterunt. Ulcus in quo costæ quartæ
cartilago nigricans, & ab æthero quasi sejuncta conspicie-
batur, arefcebat, reddebatque paucum, & ichorolum pus,
& grave olens: proximi autem artus, qui primis ab
excisione diebus, motum, & propemodum sensum quoque
amiserat, nisi quod in manu tamen uterque peribat,
oedema augebatur: quo artus etiam inferiores tumebant:
crescebant simul frequentia pulsuum, sitis, vigilie. Ad
ea accedebant diarrhoea, ciborum appetitus proflus de-
jectus, virium languor, perpetua somnolentia, diffici-
lis, ac frequens respiratio. Hæc denique exceperunt fe-
briles quatuor accessiones longæ, vehementes, & cum
rigore conjunctæ: quarum alia alii horis interjectis cir-
citer decem, succedebat: eaque mulierem confecerunt.

CADAVER flaccidum ubique, & laxum, infe-
riores tamen artus, vel incisus integumentis, sine ullis
habuit oedematis reliquiis. Venter, si lienem excipias
paulo quam natura ferat, majorem, nigriorem, laxio-
rem, uterum autem contra prædurum, & scapello re-
sistentem, satis bene constituta ostendit reliqua.
Thoracis utrumque cavum aqua fuit ferme plenum, si-
nistrum præsertim: in eoque pulmo qua parte ulceri
respondebat, aridus, & propemodum scirrhusosus, arte-
que ibi ad pleuram adhærens, quæ multo artius ibidem
adhærebat ad costas, & quasi callosa facta erat qua parte
exteriori aeri exposita fuerat. Tunc corde inspecto, cu-
jus cavæ dexteræ aliquid polyposæ concrectionis habue-
runt; ad exteriora reditum est: omnesque Axillares si-
nistre glandulæ inventæ sunt non solum aliquanto cras-
siores, sed & in æcerum mutata scirrhorum tubercu-
lorum, summa firmitudine, colore livido: quæ cellulo-
sa proxima complectebatur membrana, ipsa quoque in
valde firmum quasi steatoma conversa. Ex his autem, pro-
xima vasa, nervosque comprimentibus, causa intelligebatur
tum paralyticus imperfectus, tum doloris ad axillam cum
attollebatur humerus, tum denique periculi instantis, ne
præter indolis tumor alter sub axilla excreceret postea-
quam

(i) Cent. 2. Obs. 78. (k) loco supra ad n. 38. indicato. (l) De Mulier. Affect. l. 1. c. 17.
(m) Commerce. Litter. A. 1742. Hebd. 52. n. 2. (n) Epist. 42. n. 17. (o) l. 4. Obs. 4. §. 3. & in Additam. Obs. 12.
(p) supra, n. 41. (q) l. 3. S. 21. in Additam. Obs. 61. (r) Epist. 27. n. 20. & 199. (s) De Medic. l. 7. c. 6.
(t) Obs. 15. §. 4. & Obs. 17. §. 1. (u) Dec. 2. Obs. 6. (x) Dec. 2. exercit. Anat. Chir. 5.
(y) Instit. Chir. P. 1. l. 4. c. 17. n. 3. (z) Commerce. Litter. A. 1742. Hebd. 44. n. 2. (a) Epist. 30. n. 7.
(b) Eph. N. C. Cent. 3. Obs. 17. (c) Comment. de Bonon. Sc. Acad. Tom. 1. in Opus. ubi de Corusc. Peruv.

(d) Cent. 2. Obs. Medic. 100.
(e) A. 1734. Hebd. 1. n. 1.
(f) Prælect. in Instit. §. 903.
(g) Animadvers. var. ad Medic. & ext. 125.
(h) Nicell. Medic. Epist. 6.
(i) Ibid. ad §. 897.
(j) Dec. 2. A. 4. Append. n. 5. XLIII.
(k) De Medic. l. 5. c. 28. (l) n. 16.

quam prior e mamma fuerat exsectus. Qui cum protinus ab exsectione, dempta quæ adhærebat, pinguedine, inspiceretur, forma inventus est ad ovalem accedente, cuius major axis pollicem cum dimidio circiter æquabat. Cum eo tres, aut quatuor, alius alia magnitudine, sed parvi omnes, continuabantur. Ad horum, & illius centrum dissectio sanguinem ostendit putridum, pallidumque: hunc materia comprehendebat media inter puriformem, & sebaceam.

49. Nonnulla quæ, respirante muliere, in pleura, in costis, & Intercoftalium musculorum parte, cum hæc parerent, diligenter, folerterque observata sunt, prætermisi, non quod non digna essent quæ memorarentur, sed quod minus ad propositum Epistolæ hujus attinerent. Attinet autem cum primis a Cl. Gahrlepio (m) descripta historia, quæ & plura habet cum ea quam modo proposui, conferenda, illudque insuper quod in cadaveris sectione deprehensum est, nempe carcinoma ab ea mamma ex qua excisum fuerat, latenter, ut nemo in viva id esset suspicatus, transverso super osse sterni ad alteram quoque mammam virus suum propagasse. Jam vero ad reliquos & thoracis, & ventris tumores properantibus quem in clavicula conspeximus, videtur commodius ad exostoses de quibus infra erit sermo, differendus (n). Qui vero ad aneurysmata spectant arteriæ Magnæ, thoracis, aut ventris parietes extorsum attollentia, cum a nobis de internis, ad quos attinent, morbis agentibus satis alias (o) propositi fuerint, non vacat Sepulchreti exemplum imitari, & hic repetere. Quin si forte ut in vivente capone arteriæ cuiusdam Intercoftalis aneurysma dignovi ex pulsatione secundum longitudinem quidem in transversum valde producta, sed latitudine intervallum quod inter costas erat duas, nusquam totum æquante, ita illud intervallum in tumore, ut Lancisius (p) vidit, denique attollens vidissem, & in demortuo, ut ter quaterve Ruyschius (q), tam exilem arteriam ad ovi gallinæ magnitudinem exantam offendissem; nescio, an inter cavæ thoracis potius, quam inter hos de quibus hic loquimur, tumores posuissem: quanquam hoc licuisset magis, quam, ut in Sepulchreto, huc referre ipsorum tumores viscerum, abdomen extorsum urgentium: quibus de tumoribus (r), & de abdominis ipsius herniis (s), & de hydrorachitide quoque (t) aliis ad te Litteris scriptum est. Sunt tamen interdum quidam abdominis tumores qui, cum revera ad ipsum dumtaxat pertineant, ad viscera attinere videantur. Qualem in pio, doctoque Sacerdote vidimus instar magni hemisphærii prominentem. Qui cum apertus multam, fœdissimæ odoris materiam effudisset, a Chirurgis demisso specillo animadversus est tantum introsum pertinere, quantum exterius prominuerat; ut plerique non dubitandum crederent, quin ad viscus aliquod spectaret. Verum neque exitus erat ullius quæ id confirmaret, materiæ, neque lesi cuiusquam visceris notæ, & perfectæ denique ægri, feliciter multos exinde annos viventis, sanatio præclare ostendit, quæ in tanto tumore congesta fuerant, musculos quidem abdominis parietes, & peritonæum intra ventris cavum incurvasse; non perforasse tamen, neque ut tumoris cavum cum ventris cavo, nedum cum viscere ejus aliquo, communicaret, effecisset.

50. Testium, & circumjectorum his involucrorum tumores, de quibus aliquanto plura scribere possemus, fuisse a nobis alia Epistola (u) pertractatos, meministi. De iis autem qui ad penem, anum, & naturalia mulierum attinent, etsi plures vidimus; tamen cum dissecandi occasio nunquam fuerit, vix aliquid est quod attingamus. Cancrosum tumorem in quem glans, & magna pars colis proxima excreverat cum amputaret Valsalva, adeam. Quæ duo ne acciderent, verebatur, eorum neutrum accidit. Alterum erat, ne exigua superfutura pars colis introsum forte se continuo retraheret: alterum, ne illa persistente, introsum tamen se retraheret arteriæ. Quas cum in animo haberet, ut fecit, trajectas acutissimum trahente, hoc circumducto, constrictoque obligare; si utrumlibet illorum accideret, maximopere erat adversaturum. Ne alterum accideret, ante providerat: si alterum accidisset, tum necessario id quod volebat, facturus. Cruciatum enim, quo ad ejus facere poterat, iis quos ferro curabat, imminuere studebat. Quamobrem neque igne uti hic voluit, ut Scultetus (x), aut vitiati aliquid,

ut ipse, relinquere, neque arcta adeo penis constrictione, vinculo supra vitiatam partem injecto, ut quidquid infra vinculum esset, brevi emoreretur: quantum enim hic dolorem constrictio illa afferat, XXX. Ruyschii Observatio (y) satis indicat. Nectamen propterea Chirurgos alios Experientissimos, in quibus Heisterus (z) est, & Benevolus (a) non sine gravi ratione constrictiorem hanc prætulisse, credas. Ut enim Valsalva ægrum illum suum perlanaverit; aliquid tamen periculi una ex primis noctibus fuit, sanguine sibi viam referare incipiente, nisi qui proximus, ut Valsalva jussit, paratulus cubabat minister, celerrime, sicuti præmonstratum fuerat, obstitisset. Profecta ætatis erat is æger.

Sed profecta & alter, cujus ex podice per duos depressos pedunculos excreverat propendebat præva naturæ, ad renis magnitudinem formamque accedens. Quam senior alter Chirurgus, me adolescentulo aspiciente, deorsum tractam, incisus pedunculis cum excidisset, imi autem intestini pars ex qua illi excreverat, continuo se; id quod Chirurgus non expectabat; introsum retraxisset, seque ejus oculis, & manibus subduxisset; perturbari primum hominem vidi, quamvis siquis alius, exercitatum, & sua in Arte nobilem, mox tamen cum sanguinis haud multum efflueret, confirmato animo, & mediocri turunda immissa, albumine illata, & pulveribus confecta qui adstringendi vim habent, discessit. Verum exacto vix horæ quadrante, sanguis profluere copia non modica, & quod multo majori intra intestinum influxisset, indicabat, rogare æger, cujus interea pulsus valde subledebat, ut turunda demeretur, quia vehementi alvi evocanda necessitati resistere amplius non posset. Revocatus Chirurgus turundam aufert, quam ingentia concreti sanguinis frusta consequuntur. Tum digito ille immisso, vulnus diutius comprimit, neque remouet donec turunda iisdem ac prior, medicamentis illata, & confecta, sed (qualis a primo immittenda fuerat) crassior parata esset quæ inderetur: ægreque tandem per hæc sanguis compressus est. Sed hæc non aliam ob causam memorata sunt, nisi ut in controversa excidendi penis ratione quid tunc Valsalvæ placuerit, intelligeres, itemque vel multo senioribus, & exercitatis Chirurgis omnia quæ inter operandum accideret possunt, animo esse antea prospicienda. Cæterum quod ad primam curationem attinet, leges inter Veteres Benivenium (b): quod ad alteram, inter Recentiores Heisterum (c); exemplum apud utrumque felicis curationis invenies. Condylomatatum autem muliebris vaginæ cum plures possint esse causæ, tum inter eas quæ a primordiis sunt, quandam interdum esse, suspicor, quæ cuiusmodi sit, ex subjecta apparebit Observatione.

51. VIRGUNCULA annos nata ad quindecim, corporis habitu jam diu cachectico, graviore denique morbo correpta, extremos hujus, & vitæ dies sic in Patavino egit Nosocomio, ut ex pulmonum inflammatione mori videretur sub finem A. 1750. THORACE aperto, hujus quidem hydrops deprehensus est; in pulmonibus autem vix quidquam fuit quod leve eorum inflammationis præberet indicium. Ex Ventre genitalis potissimum partes detractæ sunt. Quarum ego structuram cum studiose Juventuti ostenderem, in omnibus ferme secundum naturam se habentem: pauca hæc quæ aliæna essent, animadverti. Ad alterius Falloppianæ Tubæ extremum foliaceum erat hydatis. Ex urethræ osculo corpusculum prominebat rubellum: quod, ipsa secundum longitudinem incisa, nihil aliud esse, vidi, nisi intima ejus tunicam, quæ cum supra a subjectis vasculis sanguine distentis tota nigricaret, ima parte se extorsum invertens, exstabat: quod & in alia de qua ubi de Claudicatione scribam (d), meministi vidisse, utramque autem cum de Urinæ Difficultate agerem (e) commemorasse, & parvi illius vitii causam quævisse. Aperta denique vagina, quæ albedo crassiusculo humore erat oblita, illud offendi quod mihi hoc loco scribendi hanc Observationem causam attulit. Scilicet propius alterum latus, uno supra hymenem transverso digito, anterior, & posterior vaginæ facies colligatæ erant inter se per breves quasi institam latitudinis, & crassitudinis modicæ, ex eadem profusus ex qua vagina, substantia factam, ad eundemque modum rugosa præditam superficie; ut manifestum esset, præsertim cum prægressa erosione nullum usquam supra, aut infra appareret vestigium, colligationem illam

illam esse ab natura. Quam antequam sectione dissolverem; arduissima ab eo latere vagina erat; illa autem dissoluta, continuo in justam latitudinem se extendit.

52. Quod si hæc Virgo nupisset; facile intelligis, institam illam aut a congreddente viro, aut a prodeunte foru disruptam, excrevere postea in præhumido loco, in condyloma potuisse. Mihi certe cum eam dissecarem, in mentem venit juvenis Matronæ cui post non facilem partum condylomata duo per vaginæ orificium pendere, vidi, hujusce institæ, si in medio disrupta esset, & post disruptionem aliquantum procrevisset, similia ob id etiam quod non majori supra illud orificium intervallo quam hæc instita, oriebantur.

53. Restant Artuum tumores. Qui omnes ferme cum sint utrisque communes, juvat in iis fere subsistere qui in proximis fuerint artubus Inferioribus mole alii immani, alii mediocri. Immani erat qui, abscessus instar, femur adeo distendebat Nobilissimi Viri, ut Valsalva, ad curationem accersitus, aperire veritus sit, felici consilio; nam paucis post diebus per se paulatim evanuit totus, ægerque tam bene convaleuit, ut plures postea annos sanissimus vixerit, Medicis, & Chirurgis a quibus id acciperet, & ægro ipso, qui mihi quem inter Amicos intimos habuit, non semel idem confirmavit, mirantibus quoniam tanta materiæ copia, sub manibus fluctuantis, sine perniciæ recessisset. Valsalvam autem his absteritum fuisse, credebant primum ne quam facile esset tumorem ejusmodi aperire, tam difficile esset perfanare, & occludere, tum ne propter immodium materiæ effluxum æger deficeret siue longo diuturnæ curationis spatio, siue primo ipso incisionis tempore; quasi in ejus manu tunc non fuisset tantum educere quantum ferre ægri vires possent. Quod cum regerem; quæsitum, ut sit in colloquio, ex me esse, meministi, quid causæ sit, quare si forte Chirurgus e non modico tumore quidequid continet effluere statim sinat, ægri animo sæpe linguantur: respondisse autem, placere quibusdam tribuere id sanguinis in vasa ejus partis, per tumoris materiam antea compressa, nunc laxata, repente ea copia irrumpenti, ut minor æquo sit quæ ad cor redeat. Sic autem quid aliis potius, quam quid mihi videretur, respondi primum quia non omnibus tumoribus vasa comprimuntur quæ magna sint, deinde quia magna sunt certe vasa illa proxima quæ novimelri foru distentus uterus comprimit, eaque compressio felicius in partu fere temporis puncto tollitur, neque propterea deliqua ingruunt; ut alia querenda responsio, aut aliud saltem ad illam addendum esse videatur. Sed tumores artuum alii sunt vel isto quæ dixi, longe majores: quos aperire frustra avaris; neque enim quod continent, magna ex parte fluxile est, neque in pus verti potest, quin etiam non raro interjectorum musculorum structura mirum in modum vitata, ac mutata est. Descriptis videbis in Dissertatione (f) Jo. Henseleri, quæ ejusdemmodi tumorum exempla indicantur plura, quorum aliqua non adeo recentia sunt, ut in Sepulchretum referri non potuissent, & ad Wedelianum illud (g) adjungi, quod in ea Dissertatione præteritum est. Plura quoque leges in Dissertatione, quæ antea proderat, Alexandri Camerarii (h), & quædam in Tomo qui ante illarum utramque exierat, Italorum Litterarum Diarii (i); neque enim vel apud nos perrara sunt, eaque mirifica. Ipse etiam aliud, quamvis cum iis minime comparandum, magnam tamen, hic vidi, quo generosissimi Viri crustotum vehementer distendebatur. Quod incassum apertum iri ob hæc quæ modo dicta sunt, pronunciaveram: neque exitus me fecellit, cum æger postmodum nihilominus pungi voluerit. Cæterum non possum adduci ut credam, hujus, aut consimilis generis tumore præturgidum fuisse brachium viri de quo ad Vallisnerium (k) scripsit Sanctassanus, eum primarius Chirurgus ferrum impreffisset, eam vim sanguinis erupisse, ut Chirurgus attonitus hominem jam jam inde morituum timeret: cursu autem sanguinis desinente, ferum multas hebdomadas exiisse, itaque brachium ad justam molem decrevisse, nullo quoad homo vixit; plures autem annos vixit; in eo artu superstitie incommodo. Facit potius is casus, ut in memoriam ejus redeam quem de Rege Lacædemoniæ Agésilao apud Xenophontem (l), & Plutarchum (m) legeris, ut illi ex ascensu incertum quæ vena rupta, sanguis ex corpore sanum in crus deflueret; altero enim erat claudus; cumque tibia nimium quantum Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

intumesceret, ac dolores intolerandi accederent, Medicus quidam Syracusanus ei propter malleolum venam aperuerit, atque, ubi semel coepisset, noctu dieque sanguis profluxerit, & quidquid tentarent, fluxionem hanc inhibere non potuerint, donec Agésilao tandem animo defecit, & tunc sanguis fluere desit, ea valetudine infecuta quæ reliquum ætatis, & totam hyemem Regem lecto affixit. Quem casum, attentione alioquin dignum, non memini, an quis ex eruditis Medicis consideraverit. Incertum pariter, quo ex vase sanguis defluerit ad magnos duos tumores faciendos, a M. Aurelio Severino (n), & a Præcl. Alberto Hallero (o) memoratos. Alter quidem brachium usque ad summum humerum, & anteriorem thoracis partem quæ ad alas spectat, in immanem illam molem distenderat quam adjecta Icon, & dolor quo homo confectus perit, commoitrant. Alter autem subito post maximum dolorem ortus, cedens tractantium manibus, & compressus evanescens, a scapula ad decimam fere costam se extendebat. Sed primus quid contineret, ne suspicari quidem possemus, cum Severinus nihil prætere dixerit, nec dissecuisse videatur; nisi inter abscessus sanguifluos five aneurysmata proposuisset. Alterum vero sanguine refertum fuisse, scimus, qui horis ab incisione non multis profluens, virum occidit, & plurimum, cum postea tumor secaretur, repertus est. Attamen si de utroque tumore illud addi potuisset, initio saltem pulsasse, sicuti de alio, sanguinem continente, & genu universum omnimode operiente, post aliquot demum annorum intervallum sibi ostense, subindicabit Cl. Preussius (p); minus dubitationis relictum esset iis qui de Sanguineis Tumoribus, cum rupto venæ alicujus truncu communicantibus, ea legissent, quæ, ut supra (q) commemoratum est, in Tractatu Valsalvæ de Ane Humana, in meaque Epistola Anatomica XIII. tradita sunt.

54. Tumores contra sunt quos facile fanatos esse, accepimus, quanquam non facili ad explicandum ratione: quæ causa est cur prætermittendos non putemus. Veronenfis Medicus, Vir spectatus, mihi, & qui mecum forte aderant, Doctis Viris narrabat Venetiis A. 1707. cum in ejus Patria, idque nuper, equo nobili crura ambo posteriora ad genu articulum vehementer intumuisse aquoso tumore quidem, sed duro, & cum dolore, nec remedia cætera quidquam proficerent, extitisse Veterinarium qui se hac ratione sanaturum reciperet, ut corio paulo supra tumorem inciso, & vena quæ ibi non tenuis est, resecta, hanc vinculis duobus valide constringeret, interque hæc ipsam dissecaret. Reclamatum esse primum ab omnibus quibus circumitio sanguinis esset nota, tantum auxilio non modo non profuturo, sed plurimum nocituro. Attamen cum ille ejusdemmodi affectus morbo septem, aut octo equos, & in his duos in eadem Urbe, sic ab se perfanatos memoraret, verumque dicere, protinus re inquisita explorataque, constaret; permisum esse, & se qui hæc mihi narrabat, inspectante, ita uti propositum fuerat, esse factum. Itaque tumores inde semper vel primis diebus decrevisse, donec intra vigesimum circiter diem profus evanuerint. Quæ cum forte aliis in quibus erat Vir Ingeniosissimus Dominicus Gulielmus, referrem; hic maluit conicere, simul cum vena fortasse nervum aliquem, ad ægram partem spectantem, fuisse dissectum, eaque ratione sublatum dolorem, qui originem non a tumore habuisset, sed potius tumori ipse præbuisset, itaque ablata vi stimuli, quæ uti fecisset, ita conservaret tumorem, hunc non difficile fuisse solutum. Ut ut est, nolui hanc tibi curationem reticere; neque enim Medicis unquam nocuit quid Veterinarii succedat, novisse, & prius fortasse ab his, ut in brutis animantibus liberum est periclitari, plura tentata, & facta sunt quam ad homines transferrentur. Vides, exempli causa, ut Petrus Crescentius qui ante hos quadringentos annos, cum de Agricultura scriberet, quædam interjecerit ad Chirurgiam Veterinariam spectantia, in ægro bove sanguinem ex incisis venis quæ sub lingua sunt, mittere (r) docuerit, aut quomodo pro elysmate injicienda quodam ventriculo excipere, cujus orificium tubo sit instructum, & per hunc in equi alvum immittere (s), aut qua ratione, si in equi tumente glandula excidenda sanguis ex vena aliqua forte prorumpat, hac continuo arrepta, & ferico filo arcte constricta, sit ille coerendus (t). Num putas hæc ex antiquioribus Veterinariis non hausisse? hos autem non ex aliis longe vetustioribus? ut fortasse antequam Celsus (u), & Galenus

(m) Eph. N. C. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 163. (n) Vid. n. 58. (o) Epist. 26. n. 19 & Epist. 40. n. 26. (p) De Aneurysm. l. 2. c. 3. Propos. 28. cujus, & præcedentis titulo ne fallaris, facit Propos. 25. (q) Theat. Anat. g. n. 5. (r) Epist. 36. & 39. (s) Epist. 34. (t) Epist. 12. (u) 43. (v) Obs. Chir. 60. (w) Cent. Obs. Anat. Chirurg. (x) Instit. Chirurg. P. 2. S. 5. c. 132. (y) Observ. 27. (z) De abdit. morb. & sanati. caus. c. 68. (a) Eph. N. C. Cent. 8. Obs. 67. (b) Epist. 56. n. 21. (c) Epist. 42. n. 42.

(f) Hist. brachii præturgidi §. 14. (g) Sect. hæc 2. Obs. 17. §. 3. (h) Hist. pedis tumidi. (i) Tom. 29. art. 4. (j) Opere Tom. 1. P. 6. (k) Rec. Græci. l. 5. versus fin. (l) in Vita Agésilai. (m) De recond. Abscess. nat. l. 4. in fine Schol. ad c. 7. (n) Opus. Pathol. Obs. 31. Hist. 2. (o) Eph. N. C. Cent. 3. Obs. 19. (p) u. 2. (q) l. 9. c. 65. (r) Ibid. c. 18. (s) Ibid. c. 16. (t) De Medic. l. 5. c. 26. S. 11. (u) Galenus

sunt tam mollia, ut scalpello facillime scinderentur, cum affecta essent spina ventosa: quamobrem sicut existimat a pravis humoribus veneris, scorbuticis, variolosis, rachiticis quoque; nam rachiticis extremorum ossium tumoribus obnoxiosesse, constat; per sanguifera erosa vascula in ossium cava, & cellulas effusis, & oleum medullare vitiantibus; ut existimat, inquam, ab istiusmodi humoribus osses lamellas emolli, sic emollitas, ab eorundem congestione, & pressione extrorsum urgeri, & paulatim expandi, arbitrat. Quam, aut non valde ab similem explicationem quin sequaris in iis praesertim tumoribus quos lamellae ossis molles adhuc comprehendant, vix dubito, in illis potius haesitaturus in quibus cum ea rigida ac dura undique perciperentur, moles tamen augeri pergeret, imo incrementum annis ultimis nancisceretur maximum, puta quantum digitorum illa apud Merym (*), & claviculae in Gedanensi Dissertatione (†); quamquam in his duobus exemplis restat explicandi locus, in hoc quidem propter cartilagineas partes in ambitu hic illic ossis interjectas, in primo autem ob eundem ambitum cariosis ulceribus, pluribus in partibus interruptum. Sed haec hucusque; vel plura enim attigimus quam opus sit, ut cuius esse generis, & unde facta illa exostosis, intelligas, quae a nobis in eo de quo protinus sermo fiet, conspecta est, & per dissectionem perlustrata.

60. VIRI annos nati ad triginta, de quo nihil aliud constabat, nisi apoplexia fuisse sublatum, Artubus in Gymnasium illatis cum ibi Anatomen docerem Januario mense A. 1732. extuberantia in sinistri femoris ossis occurrit, sphaeroidis forma, pomi autem mediocri magnitudine, Exitabat haec aliquo supra inferiora ejus ossis capita intervallo, a facie posteriore. Serra os, ipsamque secundum longitudinem dissecta cum inspicerem, eam quidem ex ossis cellulis constantem vidi, medullari oleo liquido, & flavo scatentibus, ossis autem cavum quod extuberantiae illi respondebat, majori copia repleto olei ejusdemmodi. Cujus utrobique flavedinem, & liquiditatem adnotatione dignam faciebat medulla in ulteriore ossis cavo subrubens, atque concreta; augebatque adnotandi causam tempestas praefrigida, qua cum caetera conglaciarent, pars illa olei ne minimum quidem concrevisset.

61. Mutatio ista medullaris olei in exostosi, & ad exostosis secuta hanc sit, an praecesserit, tibi coniciendum relinquo. Satis enim superque de ossis tumoribus, quantum ad praesens institutum attinet, scripsisse me, sentio, jamque has Litteras ultra eum quem initio putaveram, modum longe excrevisse. Nec tamen attigi tumores cunctos vel ex iis qui in artus inferiores maxime cadunt, quibus in artubus novissime subititi, cujusmodi inter caeteros Varices sunt, Oedemata, & pedum Clavi; tamen viderim, nullos ex his esse in Sepulchreti huc respondente Sectione praetermissos. Sed de Varicibus nihil ferme habebam quod dignum esset adnotatione, nisi forte ad Bidloum (‡) rejicere te vellem, ut immanem quorundam varicum magnitudinem cognosceres; ad quam jam quidem factam intelligendam, tunicarum venarum laxitatem, sive atoniam ponere necesse est, violentiores excitationes, diuturniores stationes, graviorum onerum gestationes, & adversas motui sanguinis constrictiones, compressionesque, aliave id genus consequentem. Ad eam vero quae fieri incipit, dilatationem assequendam non attinere valvularum laxitatem, quis concedat? Imo ad pervulgatum valvularum officium, huc maxime spectans, alterum addendum crediderim eodem pertinens, nimirum ut vinculorum instar, sive ligamentorum, ab uno ad oppositum ductae parietem, venam quo ad ejus facere possunt, firmant; ut minus, cum laxatae sunt, aut laceratae, mirandum sit, dilatationem augeri. Oedemata autem ibi satis proposui, ubi de chronicis viscerum, & de hydropicis affectibus scripsi: ex quorum antea habitis tractationibus accepta sunt in Sepulchreto exempla fere omnia quae hic repeterentur. Nec de Clavis quidquam esset quod adderem, nisi tu de clavo

illo insanabili sententiam nuper quaevisisses meam, cuius clavi radio vitam inedia finire voluisse Virum Consularem, eundemque Poetam non ignobilem Silium Italicum, a Plinio minori (a) scriptum est. Causa mortis, inquit, ei fuit valetudo. Erat illi natus insanabilis clavus. Si plura his scripsisset, qualis ille clavus, aut ubi fuerit, de me non quareris, ut opinor. Vis, divinem igitur. Neque enim cum Celsum (b), Aetiumque (c) perlegeris, ignoras, non modo in pedibus, sed etiam in oculis, nedum alibi, clavos nasci posse, & eorum qui in oculis nascuntur, alium esse qui ab Aetio, ac quia Celsi clavi nomine designatur; ille enim Uveam tunicam extra oculum non parva ex parte prolapsam, & jam duram factam, non secus ac Paulus (d), & Actuarius (e), intelligit; Celsus autem callosa in albo oculi tubercula; qui & clavos alibi extantes, non solum ex contusione, sed ex aliis etiam interdum causis oriri, scribit. Hos tamen omnes sive in pedibus, sive in oculis, sive alibi natos, a figurae similitudine clavos esse dictos, cum scias; praecclare vides, uno hoc nomine quam variae & naturae, & sede, & causis res comprehendantur, nec solum pro his varietatibus, sed & pro asperiore curandi ratione (f) quam facile insanabiles, & radii, atque adeo dolorum pleni esse possint clavi aliqui, ne dicam omnes, in homine praesertim qui annum quinquagesimum exsuperaverit, & delicato sit corpore, qualem Silium fuisse, idem Auctor docuit Plinius (g). Quae omnia etsi ita sint; tamen in tanta rem, ut quique velit, accipiendi facultate, & quod consequitur, veri assequendi difficultate, nemini quidem, aliter existimanti, firmiter adversari me posse, credam; sed non propterea fortasse fiet quin ad veri similitudinem propius accedere tibi videar, si dixeris, non alium hic a Plinio clavam designatum esse, quam pedum. Qui enim oriuntur in oculis, rariores, sunt; caeteros autem nonnumquam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nasci, & Celsus (h), Gracique illi (i), & res ipsa adeo confirmant, ut qui, nulla addita sedis mentione, clavum dicit, is, praesertim si Medicus non sit, pedis clavum potius quam alterius partis, significare videatur: quamquam ne Medicus quidem eam facile mentionem, aliudve adjunctum omittit, si clavi nomine designare aliud velit quod minus frequenter solet eo vocabulo indicari, cujusmodi sunt oculorum clavi, aut furunculorum quoddam genus, quod nonnullos clavum, aut spinam appellare consueverunt, leges apud Ingrassiam (k), aut pedum ipsorum quidam clavi sic accepti, ut ab Auctore Medicarum, quae Galeno adscriptae sunt, Finitionum (l); in iis enim haec legitur, Clavus est ulceris in pedis planta orbiculatum, quod callum contraxit, Cujus definitionis si Medico erudito Lochnero (m) venisset in mentem, cum speciem malignioris cujusdam clavi in pedis eadem parte saepe ab se non sine consecuta morte conspectam describeret; illius mentionem, ut opinor, libentius fecisset, quam morbi, a Priscis gemuriae appellati, ut pote qui, si vel clavi aliqua species fuit, non tamen in planta, sed quod ait Festus (n), sub minimo pedis digito, imo inter digitos pedum nascebatur, ut scripserat major Plinius, pariter ab Lochnero laudatus, libro quidem 26. sed capite 1. de gemuriae loquens, ut de morbo celeriter in Italia restricto jam olim, ut etiam nomen esset obliteratum. Quae omnia exempli causa commemorare volui; non quod minoris Plinii auctor tot clavi significationes fuisse apud Medicos, non modo apud caeteros, credam; ut certe erat apud omnes illa quae propterea ipsum quoque usum esse, conjicio. Ex quo, & ex verbo etiam quo rem enunciat, natus, haud ita omnium, ut hujusmodi morborum, proprio, illud simul intelliges, cur in sententiam non iverim, ut alias facere solitus sum, Medici alterius Doctissimi, qui singulari Epistola, annis superioribus de Silii Clavo edita, fuisse hunc, censet, capitis dolorem illum, quem Clavi nomine tamen vocatum ante Valesium de Taranta, id est ante seculum XIV, se invenire non potuisse pro sua laudabili ingenuitate fateatur. Vale.

E P I.

(*) cit. supra, n. 56. (†) cit. supra, n. 57. (‡) Dec. 1. Exercit. Anat. Chir. 6. (a) l. 3. Epist. 7. (b) De Medic. l. 5. c. 28. S. 14. & l. 7. c. 7. S. 12. (c) Medic. Tetrabibl. 2. S. 3. c. 34. (d) De Re Med. l. 3. c. 22. ubi de prolapsu oculi. (e) Medic. l. 2. c. 7. (f) Vid. exempla plura apud mor. citandam Lochnerum, & in Epistola indicanda. (g) Epist. cit. (h) Sect. 14. cit. (i) Aet. Tetrabibl. 4. Sermon. 2. c. 83. & Paul. l. 3. cit. c. 80. (k) De Tumor. p. n. ubi de Furunculo. (l) Jam propius finem. (m) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obf. 192. (n) De Verbor. Signific. l. 7.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LI.

De Vulneribus, & Ictibus Capitis verba fiunt.

Tot sunt quae ad Vulnera, & Ictus attinent in Valsalva schedis Observationes, ut si unis Litteris complecti velim universas; librum videar ad te mittere, non epistolam. Itaque dividere coactus secundum varias illorum sedes, eas quae ad Caput spectant, nunc mitto, caeteras deinceps missurus. Ab iis autem incipiens in quibus cranium nihil, aut levius fuerat laesum, ad eas progrediar in quibus plane fissum, aut perforatum inventum est.

2. ADOLESCENS annorum sexdecim coniecto lapide percutitur in sinistra fincipitis parte prope futuram Lambdoidem, intervallo duorum circiter digitorum a Sagittali. Nullum consecutum est symptoma notatu dignum, nisi quod vulneribus labra tumere, idque aliquot tantum dies ante undecimum. Quo die se prodidit febris cum frigore, & vomitu, at sine ulla capitis molestia. Subsecuti sunt motus convulsivi, aphonia, surditas, caecitas, & decimo quarto die inerte, mors. CRANIUM erat illatum; & tamen subjecta vulneri Dura meninx tanto ferme spatio, quanto fuerat vulnus, inventa est crassior, laxior, superficie inaequali, colore ad flava vergente: & inter ipsam, & Piam pus concoctum stagnans inter processum Falcatum & huc vicinam partem cerebri superiorem ad anteriorem usque. Caeterum in toto ipso cerebro nulla quae sub sensum caderet, deprehensa est laesio.

3. VIR ad sexagesimum accedens annum, baculi ictum excipit paulo supra extremam frontis, & sinistri temporis partem, nullo tunc, aut proximis diebus apparente symptoma; ut ipse per se quotidie ad Bononiense S. Mariae de Vita Nosocomium veniret, ubi vulnere, cutaneo prorsus, & nullius momenti credito, consueta remedia adhiberentur. Quin etiam per eisdem quatuor, aut quinque dies in foro perstitit castraneas vendens, ut solebat, praefrigida tempestate. Sexto autem circiter die deterius sit vulnus, febrilique cum frigore, & rigore invadit: quae ad eundem modum quotidie recurrens, nullo alio accedente symptoma, quam levi sauciatae partis gangraena, sensum hominem confecit. CADAVER contractum erat a frigida, ut videbatur, aeris constitutione. E vulnere saniei nonnihil inter extremum marginem Temporalis musculi, & os descendenter. Gangraena autem erosiva fuit vulnus ad amplitudinem monet quae scutum Romanum dicitur, dilataverat: ibique os nudum in conspectum veniebat. Exfecto cranium, ne diligentiori quidem instituta perquisitione ullum potuit laesionis indicium in eo esse animadverti. Meninges tamen eo toto spatio quo os ipsum detectum fuerat, & saniosa, & aliquanto crassiores inventae sunt. Subiectum his cerebrum levem quidem, fed tamen evidentem lationem contraxerat. Nam exterius ad parvi cicris magnitudinem corrupta erat ejus substantia, & in medio pertusa foramine perquam exili videbatur. Hoc cum ea corruptione non ultra exiguum altitudinem descendebat.

4. Priusquam alias huc attexam ejusdemmodi historias, nonnulla facile ex me queres; illud primum, quomodo illa offe, laesa tamen subjecta meninges, & purulentae, ac saniosae fuerint; quin cerebrum quoque ipsum in Viro non sine aliqua noxa reperiunt? Berengarius quidem, sicut habes vel in II. ista Sepulchreti Sectione (a), fieri posse, suspicabatur, ut sanies per cranii poros ex vulnere externo transiret, praesertim si ex vulnere liberum exitum non haberet: quod nonnumquam certis quibusdam locis accidere posse non est negandum, ut puta qua vascula sanguifera trajectiuntur, aut qua futurae laxiores sunt. Plerumque tamen satius est cum ipso credere quod Celsi (b) verbis eloquar, offe toto integro manente, intus ex ictu venam aliquam in cerebri membrana ruptam aliquid sanguinis mittere: rumpi autem illam ex violenta cranii concussionione. Ad eundemque modum plures explicabis, allatarum similes, Observationes, ut Maucharti (c) in primis illam in qua ad decimum usque diem signum malum apparuit nullum, & tamen sub cranio undique illaeso quantum noxarum lateret, diffusio ante decimum quartum repente mortui monstravit. Quo autem modo fieri possit, ut in calvariae concussionione vasa intra illius cavum rumpantur, a Petro Simone Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

Rouhaultio (d) fuisse indicatum est. Quod si concussio vix ulla fuerit, & intra minime vitiatum cranium interiora laesa reperiuntur; videlicet qua ratione coniceret Bohnius (e) id accidere potuisse in sua, & aliorum Observationibus; cujus ex scriptis (f) non paucas excerptes quas huic Sepulchreti Sectioni adjungas, Verum ut ad eas quae ex Valsalva proposuimus, redeamus; quares deinde, cur sanguis intra calvariam effusus, non continuo, sed tot denique post diebus inceperit suae effusionis signa dare? Nimirum quia tenui ex vasculo tenuissima guttula sensim lenteque destillantes, non nisi aliquot interjectis diebus, ad eam copiam quae manifeste laderet, simulque ad eam corruptionem pervenire potuerunt quae meninges, cerebrumque vitaret. Utrumque autem citius factum est in eo qui praefrigido aeri se jugiter obiciens, causam praebuit, ut contractis exterioribus vasis, plus sanguinis, ejusque ob cohibitam insensibilem perspirationem minus salubris, ferretur per interiora. Contraria quoque externa causa eosdem potest effectus producere, sanguinem concitando, & servelaciendo, ut in filio Theodori ex levi ad speciem vulnere capitis mortuo, sicuti, nec sine ratione Valsalvus (g) coniecit, cum postquam nona die fuerat in sole versatus, prima accesserit febris decima die. Quod si queras, cur de duobus quorum historias scripsimus; is quem citius febris prehendit, nullo praeter hanc malo; is vero quem tardius, tot aliis gravissimis accedentibus confectus sit; multiplex discriminis hujus causa potest afferi: primum mora ipsa, qua & copia, & pravitas, in pure, quamvis concocto, latens, facile aucta est effusa materia: deinde alia in alio corpore, aliaque aetate humorum, & partium dispositio: denique alia a coniecto lapide, alia a baculo illa violentia. Sic libro Epidemiorum V. (h) qui lapide in caput percussus fuerat a Macedone, vides, ut voce destitutus esset, ut nihil omnino audiret, ut moveretur, id est convulsive, quemadmodum recte interpretatur idem Valsalvus (i), quae ferme ea sunt quae noster passus est Adolefcens; sed tardius, videlicet undecima die, non, ut ille, tertia; neque enim ut ille, ab ictu cecidit, neque calvariam habuit fissam, idque supra tempus dexteriorum, quemadmodum eadem, paulo fufius repetita libro VII. (k) docet historia, minime animadvertente Valsalvo, qui tot alias animadvertente, & quarente propterea, qua parte capitis percussus ille fuerit. Qua ex historia variam & vim percutientis corporis, & sedem praeterea percussus capitis in hujus vulnere discriminibus attendendam esse, intelligis. Sed jam alius subijciamus.

5. JUVENI annorum circiter viginti iam tria duo vulnera castrum insiguntur, alterum in sinistra parte frontis, alterum quasi e directo in occipite. Inanis est ad vomitum irritatio. Moritur circa diem vigesimum quinquiesimum. CAPUT secando, nihil intus, extrave reperiuntur est adnotatu dignum quod ad vulnus occipitis attineret. Vulnus autem frontis primum exterius saniem circa se inter cutem, & cranium ostendit, quae ibi pericranium, & cutis ipsius interioriorem faciem herpetis instar exedentis eroderat, & anteriorem, eandemque superiorem musculi Temporalis partem nonnihil separaverat. Intus vero, quamquam os frontis nihilo magis quam occipitis, laesionem ostenderat; tamen inter illud os, & Crassam meningem sanies erat ad drachmas duas, quae eam meningem eroderat. Quin etiam a dextris sub cranii superiore parte in vasorum sanguiferorum meningis ejusdem interstitis materia inventa est saniei similis; sed densior. Caetera intra cranium secundum naturam se habebant.

6. SENEX annos natus ad sexaginta, epilepsiae valde obnoxius, dum ea correptus in terram cadit, simul thoracis sinistram partem, simul capitis idem latus supra Temporalis musculum offendit. Thoracis ea pars multum dolet: difficilis est respiratio, & principio sanguis vomendi conatu per os ejicitur. Caput imbecille est, obtusum, grave; ut interrogatus, vix respondeat. MORTUI Thorace aperto, sinistra cavea sana; in dextera autem ferum ad fibram circiter invenitur, & pulmo superius ad pleuram adherens, totusque, ut in peripneumonia solet, induratus. Cordis ventriculi concretae polyposae continebant, & dexter quidem majorem. In Capite sinistram musculum Tempo-

Q 3

ralis

(a) l. 4. in Schol. ad Obf. 1. (b) De Medic. l. 8. c. 4. (c) Eph. N. C. Cent. 9. Obf. 40. (d) Traité des Playes de tête ch. 4. & 10. (e) Differt. de Trepanat. difficult. (f) Comm. in l. 7. Epid. ad 39. & in l. 7. ad 97. (g) De Tumor. p. n. ubi de Furunculo. (h) Comm. ad eam historiam, quae ipsi est n. 36. (i) n. 13. (k) n. 13.

talibus confusus aliquantum: cranio autem recluso, interstitium os Petrosi, & Duram meningem concreti sanguinis portio invenitur, arcte adeo eidem menigi adhaerens, ut non nisi vi separari possit. Ceterum Pia ad valorem latera gelatinosa feri concretionem; ventriculi paululum serofi humoris ostenderunt: reliquum cerebrum sanum fuit.

7. VIR quadraginta annos natus ex alto cadens, oculum sinistram contudit: cutis autem supra supercilium ab acuto forsan lapide laceratur. Principio febre corripitur: quae nonnihil postea remissa est. At circa duodecimum diem, post admissum errorem in exacta vivendi norma, vehementior febris supervenit: cui circa decimum quartum convulsio accedit totius sinistrae faciei partis cum saepe in ipso oculi bulbo dolore. Mors tandem circa vigesimum secuta est.

CAPITE perlustrato, conspecta haec sunt, Laceratae supra supercilium cuti is suberat nervus qui ex orbita erumpens, sursum per frontem reflectitur, ut aut confusus, aut alia ratione facile violatus convulsionem clere potuerit. Oculi autem bulbus extrema parte, putrescens, levem erosionem attulerat offi quod orbitae, & cerebro interjicitur, sic tamen, ut hoc eo quidem loco sanum esset. Nam sinistram versus occipitis partem modica cerebri portio a nativo colore ad subfuscum vergebat. Dura autem meninx ei portioni respondens, exterius sanie madaebat leviter.

8. Quamquam in casu ab alto praeter eam quae manifesto confusa est, partem non raro accidit, ut alia quoque minus evidenter contundatur, eoque minus mirandum est, imo offe frontis alliso, noxam, & sanie intus ad occupat reperas esse; tamen in Juvene quoque (1) a sinistris vulnerato, cum sanie similis materia a dextris inventa sit, & in Sene (m) non ea pars thoracis quae humo afflicta fuerat, sed opposita internum vitium ostenderit; infelix (n) de his aliquid adjiciemus: ut de convulsionibus pariter, nervi laciones qui sub supercilio reflectitur, consequentibus. Nec tamen ei nervo dumtaxat, sed & sanie qua meninx Crassior madaebat, & convulsiones, & mortem huius Viri tribuimus: ut Senis morbum, & interitum partim peripneumoniae pulmonis constitutioni, partim sanguini inter cranii basim, illamque meningem concreto, ad eandem modum explicari posse, intelligis, ad quem duae quas ante ipsas legisti, explicatae sunt (p). Neque aliter explanandas quinque censibus, quas continuo subiiciam, cranio quidem exterius laeso, sed intus omnino integro.

9. SENEX annorum circiter septuaginta ex alto in terram cadens, posteriorem dexteram scapulae partem allidit. A casu semitrepidus jacet: & quamvis paulo post stupore discusso, suis se pedibus in Nosocomium conferat, negat tamen, se quidquam de casu scire, ullamve ejus rei memoriam habere. Nuda vulneris primis diebus symptomata comitabantur. Sed vix septimo die superato, gangraena vulnus corripitur: gangraena autem febris adjungitur. Attamen illa paucorum dierum spatio sublata, haec quoque tollitur. Post haec aeger de gravante posteriora capitis dolore queritur, nec tamen vehementi. At circa diem decimum septimum triduo quodam per artus tensiones sentit. Circa vigesimum autem febre corripitur cum rigore, & vomitu. Quae sine vomitu deinceps modo bis, modo ter quotidie revertens, omnibus sensim deficientibus actionibus, aegrum confecit circa trigessimum diem. SINCIPITIS os dexterum prope Sagittalem, & Lambdoidem futuram, exteriorem laminam comminutam habebat: intus vero erat omnino integrum. Inter utramque meningem, & in cerebri ventriculis serum inerat: ut universum uncias ferme quatuor aequare posset. Cerebrum molle erat, & flaccidum: & laxiori spatio intra cranium claudabatur.

10. Quatuor in hunc aegrum convenire videbantur eorum quae cum sunt, magna cerebri credi potest fuisse convulsio: casus ab alto, stupor casum continuo sequens cum ipsius casus oblivione, non perforatum cranium, & majus inter hoc, cerebrumque intervallum. Ludovicus Duretus (q) ad illum Coacaram locum: Quibus convulsus est cerebrum, doluitque percussus, aut lapsus: continuo voce capiti non videtur, nec audiunt, ac se moriuntur, satis indicat, quanto opportunius convulsioni sit cerebrum, si forte priscam amiserit ubertatem quae totam calvariā occupabat. Hanc autem ubertatem Fallopius (r) ut non secus ac Fernellius (s) in plenilunio, quando luna lucet tota nocte, agnoscebat, sic quando non est plenilunium, calvariā non prorsus repleri a cerebro, sed adesse spatium aliquod, & vasa, quae col-

ligant, esse aliquantulum distracta, affirmabat esse verissimum, idque se in dissectionibus observasse. Quod an alii postea Anatomici, non verbis tantum, ut Piccolomus, a me tibi alias (t), cum in hunc eundem incidissem sermonem, nominatus; sed accuratis observationibus confirmant, non memini: tamen ea confirmatio valde congruere cum sententia illorum potuisset qui pro variis lunae phasibus varias morborum vim, capitis praefertim, variumque ex huius vulneribus periculum esse, non dubitabant. Memini tamen, cum apud quosdam, & nominatim apud Joannem Salzmannum (u) in quibusdam subjectis inter anteriores cerebri lobos, & cranium interstitium ad pollicis crassitiem excedens (an accedens) quandoque conspici, legisse; tum mihi quoque non aequale saltem in omnibus repletum cerebro cranium esse visum, ut in Adversariis (x) indicavi: quamquam varietas haec a variis lunae phasibus responderet, neque illi ajunt, neque ego, ut verum fatear, unquam attendi. Non me quidem fugit, ut olim Glissonius (y) scripsit, in vivis animalibus esse tantum potentia, non actu inter ventris viscera cavitates, & vi aequabilis compressionis musculorum abdominis omnes illius partes contiguas esse: ita hodie inter quatuordecim ventris corporis partes nullam usquam a Praetantissimis non paucis Viris intervallum agnosci. Attamen cum immutabile cranium sit; cerebrum autem magis, minusve possit turgere sive ab lunae phasibus, ut ab Doctissimo Meadio (z) traditum est, sive a quacunque causa quae sanguinem augeat, aut expandat; non satis video, cur illud minus, magisque a calvaria distare interdum posse vel in viventibus, pernegemus. Accedit hinc substantia ipsius cerebri contractio ac densitas, quae undecumque adveniat (nam vel ab febre ipse fieri, censebant Veteres, & in his Liebauius (aa)) molem immuat cerebri, & quod consequitur, a calvaria fornice retrahat, necesse est. Littrius (b) certe & qualem dicimus substantiam cerebri, & a cranium non modice distantem offendit in robusto juvene qui vehementissimo cursu caput quanta maxima vi potuit, ad parietem allidens, se puncto temporis interfecerat. Quamvis autem eam cerebri constitutionem ipse pro convulsione effectum habeat; erunt fortasse qui cum Dureto pro causa habere malint convulsiones vehementiores, multo autem plures calvariā minime fractam, ejusque ad corpus durum, & immobile allisionem. Nosti enim quantum utriusque huic causa convulsioni cerebri a Chirurgis recentioribus tribuatur, secundum quidem propterea quod cerebrum ageretur versus corpus durum, & retro pullum per illud, sub uno momento duos motus contrarios; prima vero, quia si cranium non frangitur, totus impetus percussiois dirigitur ad cerebrum, quippe nulla ex parte interceptus a magna fractura, aut ab offe in plura frusta distracto. Cur igitur, inquis, cum in Sene quem modo ex Valsalva descripsi, neque causa deesset haec duae; caput enim ad solum alliserat, craniumque non habebat perforatum, & tot alia esse viderentur, ex quibus magna conjici posset cerebri convulsio; ille tamen non ante trigessimum diem est mortuus, nec gravia adeo passus est mala, neque intra cranium quidquam sanguinis, aut puris ostendit? Credo, quia ex alto quidem, sed fortasse neque ex altissimo loco, neque in fura cecidit, & pars impetus percussiois ab lamina, quae comminuta est, cranii exteriore intercepta fuit. Stupor autem levis, brevifque, & oblivio quae tum acciderat, cum sine ceteris malis acciderint quae ab Hippocrate sunt enumerata, minorem convulsiois violentiam significarunt. Noster enim Petrus de Marchettis, ut in Sepulchreto quoque istuc (c) habes, aliquot ex prolapsu, aut ictu laeso capite, apparente solo hoc symptomate (mentis videlicet alienatione cum privatione sensus, & motus, quae sane graviora sunt quam quae nostri Senis casum continuo exceperunt) vidit sequenti die omnino liberatos. Cum propter haec igitur fuerit convulsio levior, eoque levior, si forte jam tum cerebrum molle erat, & flaccidum, aut ad hanc constitutionem accedens, non mirandum est, quod crassiuscula vasa sanguifera perrupta non sint, sed ea dumtaxat tenuissima unde lentissimo defluxu quatuor illae feri unciae destillarint, quae sensim levas actionibus hominem denique peremere. Quod si forte humorem illum ex ruptis tenuissimis, non sanguinis, sed lymphae vasis, sensim provenisse, malueris, arbitraris, sic facilius intelligi tum horum disruptionem, tum longam effusi illius sine evidenti corruptione moram; habebis, quibus auctoribus id sentias, & in his Rouhauium (d), & ante hunc Bohnius, qui dissectiones, etiam suas, unde hoc conjiceretur (e), produxit, & quod in medio primum reliquerat, in altero Scripto (f) se lymphaductus circa anfractus imprimis cerebri in quodam puero turgidissimos vidisse, confirmavit. Ceterum in cerebri convulsione, vasorum aliquid rumpi,

rumpi, ex creberrimis quidem Observationibus apparet, quibus accensere potes editam a Christiano Vatro (g); tamen in lethali concussione id esse perpetuum, quasi effusi humores semper, cerebri autem convulsio nunquam per se interimeret, ab iis tradi posse non videtur, quibus laudata Littrii historia, itemque altera Cl. Hanelii (h) cognita sit. In neutra enim a gravissima capitis allisione quidquam effusi inventum est. Nec quis dicat, ideo effusionem non esse factam, quod protinus a concussione simul cum vita humorum motus desierit; quidquam proficiet. Nam praeterquam quod ex secunda historia liquet, hominem duodecim circiter horas ab allisione vixisse; certe neutrum effusio, quae nulla erat, occidit. Solagitur per se cerebri convulsio id fecit. Quamobrem vel quando effusio conjuncta sit; dubitare saepe licet, huius, an illius vi major fuerit ad necandum. Quo autem modo vehementius percussus cranii particulae concutiantur, concussaeque vel majorem quam sua est, concussione cerebro afferant, huius autem convulsio propria, non magis inviolabilem, quam teneram, intamam structuram, huius fibras contendendo, laxando, contorquendo, comprimendo, complicando, lacerando, aut quavis alia ratione vitiando, inutilem necessarius muneribus reddat, conjecturas legere Bohnius (i) poteris. Quibus perlectis, supervacuum fortasse credes inquirere, an vitium aliquod ejusdemmodi in nervorum quoque truncis, ubi ex Oblongata jam egrediuntur, medulla, a magna cerebri convulsione inducatur, & num, si indultum sit, ipsum per se solum gravissima illa omnia afferre possit mala quae tum sequuntur. Jam vero, his disquisitionibus sepositis, ad graviores quam in descripto Sene, vulnere capitis effectus, sive consecuta in vivis, sive in mortuis reperta spectemus, proponendos pergamus.

11. MULIER quadraginta amplius annos nata, e scala alta cadens, sinistram scapulae partem laedit paulo supra os temporis. A casu quasi exanimis jacet: tamen paulo post sana, ut antea, esse videtur, neque laeso nisi cutis, apparet. Quae tamen circa decimum quartum diem gangraena, febre comitante, prehenditur; intra dies zamen paucos illa primum, mox haec abigitur. Verum ante trigessimum diem iterum febris ingruit, cum frigore: eique circa trigessimum quartum apoplecticus affectus accedit cum aphonia, & motus privatione in tota dextera parte corporis, sensu superfluit. Attamen quae dicebantur, te intelligere, nutibus significabat: partem autem illam quaedam quasi convulsiones epilepticae, interdum toto corpore excitatae, non minus quam sinistram, movebant. Tandem circa quadragesimum diem est mortua.

CRANII exterior lamina qua parte caput laesum fuerat, in semicirculi formam aperta erat; sed offis interiora erant integra. Pia tamen meningis pars illa quae ei loco subiciebatur, saniosa erat, & cerebrum ad eundem locum subfusco pallido colore infectum. Ventriculi autem ejus sani, ut & tota pars dextera.

12. VIRGO annorum viginti quinque, in terram cadens, peracuto lapide in sinistra frontis parte sauciata est. In Nosocomium excepta, assidua febre torquebatur, quae in dies augebatur. Vulnus corripit gangraena cepit: quae tempestate illa (mensis erat Junius A. 1689.) vulneribus omnibus superveniebat. Aliquo post tempore quasi fatua aegra facta, vix audiebat, non loquebatur, in adstantes oculos defigebat. Accessit denique totius corporis tremor: quo durante mortua est initio diei duodecime.

OS vulnere subiectum parva exteriore fovea, & quasi foramine excavatum erat, circum quod tres conspiciebantur rimae. Sed neque haec, neque foramen ad interiora perveniebant. Meninges tamen qua parte vulnere respondebant, erosae erant ambae, & hinc serosa colluvies prodibat, quae per universam cerebri substantiam diffusa, gravi ipsam odore, & nigricante colore infecerat.

13. Si forte eadem fuisset tempestas qua, ut huius Virgini, sic & Mulieris, & Senis de quibus novissime, & Viri de quo initio ferre (k) dictum est, capitis vulnere gangraena accessit; locus huc forsan attineret ex libro IV. Epidemiorum (l): In Aeno quicumque capite vulnerati, horridi erant, maligni, & suppurati, omnino autem ea quam istuc in Sepulchreto (m) habes, Pigrae Observatio annuum quandam memorantis in quo capitis omnibus vulneribus prope superveniebat gangraena. Quaedam certe prava aut alimentorum praecedentes, aut aeris praesentes, quantumvis interdum sensibus occultae, con-

stitutiones vitium communiter, aut morbum alium addunt morbis eo tempore contingentibus, ut saepe a Medicis adnotatum est, vulneribus praefertim fere cunctis gangraenam, velut annis superioribus Lutetiae Parisiorum (n), itemque in ea ipsa de qua sermo est, Urbe Bononiensi (o).

14. ADOLESCENS annum agens duodevigesimum, gracilis, & subnigri coloris, iacto lapide percussus ad alterum ossum scapulae qua ex ipso Temporalis oritur musculus, biduum transegit sine ullo, si febre excipias; quod adnotatione dignum esset, symptomate. Postea autem in S. Mariae de Vita Nosocomio decubenti vulnus die sexto factum est lividum; quod ex eo prodibat, vehementer foetidum; & febris acuta. His prope octavum soporosa accessit affectio; ut interrogatus memini responderet. Interdum suspiriosas emittebat voces. Facies tota facta erat tumida, & flava. Cum his omnibus ad undecimum pervenit diem, quo cum ingenti superexpiratioe interit. CADAVER universum icterici videbatur. Ex vulnere purulenta materia plures sibi fecerat vias inter cranium, & cutem: quam etiam eroserat. Os autem a lapidis ictu aliquid asperitatis superficie tenus contraxerat: nullamque ab interiore facie lesionem, quae sub sensum caderet, ostendit. Attamen inter os, & Duram meningem in huius vasorum interstitiis materia cinerea animadversa est, non multum puri densato ab illis, ea dumtaxat parte quae ictui subiecta fuerat: eademque dumtaxat parte cerebrum quoque ad duorum digitorum transversorum profunditatem livorem contraxerat. Reliqua intra cranium omnia sana erant. Sana quoque in Thorace omnia. Sanguis autem erat maxime fluidus, si in dextero cordis ventriculo excipias polyposae concretionis inchoamentum.

15. ADOLESCENS alter eadem aetate, sanguineo temperamento, habitu autem subpingui praeditus, Kalendis Novembr. A. 1688. in superiore frontis parte ad laevam sauciatus, continuo cadit cum aliqua capitis perturbatione. Inde ad S. Mariae de Morte Nosocomium adductus, felicem curationis exitum sperare posse videbatur, cum sine febre naturalia munia satis obiret. Ecce autem die undecimo febris ingruit: quae postmodum gravior facta, secunda iterum venae causam praebuit. Vulnus pro concocto pure, serofum & sanguinolentum emittebat humorem: pars frontis vulnere subiecta intumescere: dolores autem capitis, artuum, & dorsii accedebant, qui sub decimi quinti die finem in spasmodicas affectiones degenerarunt. Eodemque tempore, cum illo ineunte die delirare coepisset adeo, ut vinculis coerceri debuerit, vivendi finem fecit. INTEGUMENTIS communibus circa vulnus diffectis, multa huic circumiecta saniosa materia inventa est, quae ubi frons intumuerat, ad oculum usque extendebatur. Os autem a sauciante ferro superficie tenus dumtaxat laesum fuerat. Haec exterius. Intra cranium autem inter Crassam, Tenuesque meningem, qua parte haec vulnere respondebant, saniosae materiae copia reperta est; quamvis nullam in iis membranis, nullam in toto cerebro lesionem animadvertere licuerit, nisi quod sanguifera vasa quae sub pure latebant, a nigerrimo coagulato sanguine quasi varicum instar turguebant. Thoracis viscera, quae aliquando in eiusmodi morbis affici solent, illaesa erant: polyposa tantum concretio in dextero cordis thalamo conspecta est.

16. Ex his quae sub finem huius historiae scripta sunt, intelligis quare in extrema superiore historia adnotatum sit, sana in thorace fuisse omnia. Quas autem interdum Valsalva noxas in thorace eorum vidisset qui capite vulnerati decesserant, proximae quatuor ostendent Observationes. Earum prima confirmare simul poterit quaedam ex iis quae alias (p) scripsi de nervi sub supercilio reflexi lesionibus. Nam pro harum diversa vi, & conditione leves interdum, & in oculo subsistentes, gravissimae autem aliquando, & latius diffusae convulsiones oriuntur. Ad leves illas ex parte aliqua fortasse attinet is quem alias memoravi, Coacaram locum (q), visus obscuratur in vulneribus incussis in supercilio, & paulo altius; ad gravissimas autem, ut puto, Lancisii verba, alias (r) producta, vulnera in locis periculosis solere accidere, eodemque ex parte saltem attinuisse, crediderim, ut convulsionem faciei in Viro cuius vulnus ad superciliū supra (s) descriptum est, ita & multo latius diffusas, vehementissimasque convulsiones quae vulnus eidem inflatum loco in eo de quo protinus dicam, sunt consecutae.

(g) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 167. (h) Commerce. Litter. A. 1741. Hebd. 14. in fin. (i) e. l. cit. (k) n. 3. (l) n. 26. apud Marinell. (m) in Schol. ad §. 6. Obs. 6. (n) Malovin. Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1743. & 1744. (o) Vid. Commerce. Litter. A. 1738. Hebd. 42. n. 1. sed & alius postea annis idem accidit ibidem. (p) Epist. Anat. 18. n. 7. (q) n. 3. apud Marinell. (r) Epist. Anat. 18. n. 7. in fin. (s) n. 7.

(1) n. 5. (m) n. 6. (n) n. 41. & n. 16. (o) Tom. 7. (p) n. 4. (q) Interpret. 13. tr. 2. c. 2. (r) Tract. de Vulner. c. 12. (s) Pathol. 1. 7. c. 8. (t) Epist. 4. n. 31. (u) Dissert. de mira cranii. (v) VI. Animad. 84. (w) Tract. de Partib. Continet. c. 16. n. 21. (x) De Imper. Sol. ac Lun. (y) Schol. ad Boerh. Comm. in Hippocr. Aph. 78. S. 7. (z) Hist. de l'A. ad R. des Sc. A. 1705. Obs. Anat. 12. (aa) Schol. ad Obs. 12. (bb) Tr. cit. supra ad n. 4. & 13. (cc) De Reunione. Vuln. Sect. 2. c. 1. (dd) De Trepan. diffi.

17. JUVENIS annorum viginti sex, lapide ab inimico coniecto, sauciatur ad dexteram supercillii sinistri pariem. Illico quidem cadit; sed continuo surgit, & vegetus hostem insequitur. Postmodum eodem animi vigore ad S. Mariæ de Vita Nosocomium se confert. Ubi, postquam debita applicita remedia fuerant, necesse fuit quasi cogere ut remaneret, quippe qui ejusmodi vulnus parvipendebat. Illo ipso die Quartana febris intermittens, qua tum forte impliciter erat, paroxysmus expectabatur: qui & affuit; sed febris continua facta est cum pulsu magno, & vehementi, capitisque dolore non modico. Febris circa diem septimum se comitem addidit delirium cum motibus convulsivis nonnullis. Prope undecimum una, aut altera febris accessio ingruit cum peculiari rigore. Cessat tandem delirium: & homo soporosis jacet, nisi quod convulsivis motibus concutitur. Quin noctu animadvertisse pluries se, dicebant adstantes, elato capite, & ambabus constrictis manibus, nifu quasi incredibile lecto elevatum: quibus desinentibus motibus, mortui instar jaceret. Manus tamen dextera per duos ante obitum dies paralytica fuit, quod ad motum attingebat; nam quod ad sensum, non erat hoc prorsus distituta; octo autem post horis dexter quoque pes debilius moveri cepit. Sed jam ante hos dies laboriosa facta respiratio, tandem decimo quarto exeunte mortuus est. VULNUS exterius perlustrando, parvus ad latus ejus sinistram abscessus animadvertitur, cujus pars sanie inter musculos, & cutem agram versus proreperat. Sed os, vulnere subiectum, fissum erat, eique respondens Dura meningis leviter lassa; anterior autem pars cranii ab eodem, id est signis, latere pure inter Duram, & Piam meningem conclusa replebatur. Quod pus subiecta cerebri substantia videbatur imbibisse; eodem enim erat colore; sed superficie tenuis. Cætera sana; nisi quod aliquantum feri ad cerebri basin inventum est. Thorace aperto, in pulmonibus varia hic illic tubercula reperta sunt duriuscula, quorum nonnulla incisa, sinceram sanie emittent; reliqua, necdum suppurata, glandulosi corporis firmitudinem referebant.

18. PUER annorum circiter tredecim ictu lapidis vulneratur in dextera fincipitis parte supra musculum Temporalem. Cadit illico cum sensuum interiorum obscuracione; & vomit. Desertur in idem Nosocomium; neque ad diem usque decimum quantum febre corripitur. Hac accedente, per vulnus multum sanie; per os purulentæ materię aliquid, spuendo, ejicit. Circa diem vigesimum supervenit delirium; circa vigesimum quintum mors. A CRANIO cutem separando, circa ipsum, & pericranium parvi sunt abscessi animadverſi: qui nullam, quæ sub sensum quidem caderet, cum vulnere communicationem habebant. Sub vulnere autem os fractum, atque depressum, arcte adharebat. Dura meningi, cui & nonnullas sui acuminatas particulas insigebat. Laceratio tamen ejusdem meningis sub sensum non veniebat, ut neque ulla cerebri læsio, si unam aut alteram feri unciam excipias, quæ, dum cerebrum eximebatur, per Infundibulum prodit. Thorace recluso; pulmones valde rubentes, parvique in his abscessi pure pleni reperti sunt.

19. JUVENIS in fincipitis latere sinistro lapide ictus, concidit. Per se tamen in Nosocomium venit S. Mariæ de Morbo. Nulla erant symptomata. Viginti circiter exactis diebus, cum jam multum sibi in alimentis indulsisset, febris accessit horrida, quæ pluries recurrendo, ægrum torquebat. A qua etsi liberatus est; detecto tamen in vulnere ossi nunquam quoad vixit, induci cicatrix potuit. Post eas febres tussis ingruerat, quæ sicca triu fuit, donec biduo, aut triduo ante mortem sputa eduxit purulenta. Gangræna interim ex longo decubitu nates occupaverat; prætereaque illa quæ obitum præcessit, nocte, abscessus in dorso ingens est animadversus: qui per se disruptus magnam puris copiam effudit. Itaque, sine ulla capitis actionum læsione, secundo superato mense, interiit. CADAVER & ab longo ejusmodi morbo, & a mora, quia non nisi post aliquot a morte dies secare licuit, gravissime olens, diligenter tamen dissectum est. Capitis integumentis amotis, ad superius vulnere latus disjunctio conspecta est Sagittalis futura; es autem fincipitis qua portione semper detectum fuerat, illasum; sed in cæteris partibus hic illic carie erofum, præsertim vero prope futuram Squamosam, ubi totam illius crassitudinem caries perforaverat. Dura tamen, ei ossi subiecta, meningis intacta fuit, nisi quod ad sublividum vergebat colorem, & quasdam osseas particulas sibi ad-

hærentes ostendebat; ab interiore autem facie sub ipso vulnere loco annexum sibi abscessum habebat, in excavata cerebri substantia conditum, parvum tamen, vix ut minorem avellanam continere potuisset: ex quo, dum ea meninx a cerebro divelleretur, pus crassum, & viride prodit. In cerebri dissectione serum, sed paucum, in cranii basi animadversum est. Thorace aperto, pulmones inventi sunt parvis abscissibus multis, ac variis excavati; quorum nonnulli a tuberculi natura ad abscessus conditionem vergentes, nondum perfectam continebant sanie, sed dumtaxat mutari in fluidam saniosam materiam incipiebant. Pericardium multam aquam; cor nullam polyposam concretionem habebat. Inquirere tandem placuit, num ad ingens cavum abscessus illius qui in dorso erat, ullus per muscularum interstitia pateret aditus, per quem materia a capite illuc defluere potuisset. Verum hujus rei indicium nullum repertum est, cum interpositæ partes, externæ præsertim, sana essent. Musculi autem passim in hoc cadavere pallidi, & qui Abdominis vocantur, lividi erant.

20. VIRO annos nato quinquaginta, baculo pars fincipitis sinistra percutitur, nullo vulnus consequente symptomate. Venit per se ad Nosocomium: ubi a peritis Chirurgis nulla esse, nisi externa, læsio censetur: felicitateque usque ad decimum quartum diem, ne uno quidem se prodente symptomate, procedit curatio. Sed eo ipso die febris invadit cum rigore, & ad ventrem dolore. Item insequentibus diebus respirationis difficultas accedit cum sensu ponderis, tussi, & purulenta excreatione. Mors denique circa vigesimum secundum diem. IN CAPITULO cum præter eam quæ exterius apparebat, læsionem, nulla in cranio, nulla in cerebro, nisi quod paululum feri in hujus dissectione emanavit, usquam deprehendi potuisset; reclusus est Thorax. Cujus utrumque cavum pure plenum; pulmones autem, quamvis a costis soluti, pluribus distincti tuberculis inventi sunt, quorum aliqua jam suppurata, sanie incisa emittent. In pericardio vix aquæ vestigium. In cordis ambobus ventriculis polyposæ concretiones, in dextero major, in sinistro autem minor. Ventre denique aperto, in hepatis parte dextera crebra tubercula conspecta sunt, & in his nonnulla quæ jam pervenerant ad suppuracionem.

21. Vides, ut propriis Observationibus adductus Valsalva sit ad scribendum (t), in capitis vulneribus affici aliquando thoracis viscera: quamquam adduci poterat & alienis. Nicolaus enim Massa (u) conspexerat jam A. 1533. præfente Victore Trincavella cum aliis doctissimis Viris, ea quæ cum extare haud videam non modo hic in Sepulchreto, sed neque apud ullos, quod meminim, qui de rebus ejusmodi egerant, Scriptores, preste hic tibi commemorabo. Quidam ex vulnere inflicto dextere capitis parti prope Sagittalem futuram, cum meningum incisione, mortuus erat delirans, & paralyticus; quod ut plurimum, inquit, fieri solet; eo corporis latere quod vulnere opponeretur. In capite duo inventa sunt apostemata quorum pus erat laudabile, alterum in substantia cerebri prope vulnus, alterum in cerebello posteriore. In Thorace autem sanies multa, & mala deprehensa est intra sinistri pulmonis ulcus, cujus cavum majus erat dimidiato cortice ovi gallinæ. Fuit & sanies manifesta in sinistræ cordis auriculæ facie exteriori, quæ tota erat exulcerata. Sed in ventriculo etiam cordis dextero in columina carne apostema erat notabile, ascendens usque ad unam ex valvulis, ipsam quoque tumore notabili, & apostematosum tumentem. Et ne forte credas, hæc thoracis apostemata ante vulnus jam fuisse; testatur Massa, notum sibi fuisse hominem, neque unquam de ullo dolore conquestum, neque tussis vexatum vel postquam vulneratus jacebat, &c. Ad hanc addendæ sunt Marchetti nostri Observationes (x). Quæ cum multo notiores sint, atque adeo in Sepulchreto (y) relatæ; videre ibi poteris, quam sæpe in capitis vulneribus erosos pulmones, & pleuram invenerit, dimidiumque thoracis cavæ pure refertum, arguatque eos qui non a capitis vulnere hoc deducant. Ipse enim ob prævios colli dolores parte præsertim postica, & laterali, materiam purulentam ex vulnere in cavum thoracis descendere, non dubitabat. Quam tamen viam per Valsalvæ in Juvene (z) Observationem vidisti ne ad dorsi quidem abscessum confirmari potuisse.

22. Habes igitur alios præter Valsalvam in capitis vulneribus pus interdum intra thoracem invenerit. Sunt & qui in ventre, ut idem Marchettus (a), qui lienis etiam labem deprehendit, & purulentas pulsulas; ut alii, quantum in Sepulchreto (b) referri video, qui in ven-

tri-

triculum quoque, intestina, & mesenterium translata ajunt apostemata. Sed cum iidem, & Marchettus, & Bohnius (c), qui promiscue pleuram quoque, pulmones, lienem nominat, jecur non omittant; tum plerique alii viscus hoc unum memorant in quod ex faucibus capite pus traducatur. Idque ex historiis omnibus, & Scholiis cognoscere quæ sub Observatione XVI. in Sepulchreto ipso proponuntur. Neque enim officiet tibi operarum incuria (d), Apostema in capite, aut vulneribus Hepatis pro Apostema in hepate, & vulneribus Capitis scribentium. Illud fortasse potius officeret, ut Ballonium crederes quod de abscessu scripsit in concava jecinoris parte observato, id tanquam sibi certum proposuisse; quando inspecta illa unde is locus acceptus est, Appendice ad libellum de Convulsionibus, non ea leguntur quæ in Sepulchreto (e), atque id a plerisque Chirurgis observatum esse, scio; sed hæc, An id fiat, eveniatque, nescio, sed tamen a plerisque Chirurgis id observatum esse, audivi. Sed si fiat, quæ ratione contingat, & an sit verisimile id fieri posse, porro quæstione dignum erit. Cavebis igitur, ne Ballonium inter hujus apostematis Observatores ponas, qui inter Explicatores ponendus est, ut contra a quodam non inter Explicatores, sed inter Observatores referendi erant nonnulli, qui Observationis testes dumtaxat fuerunt. Sed multo magis cavebis, si forte rem explicare aves, ne ponas quidquam cum Observationibus non consentiens, quasi in plerique, aut fere semper, aut, quod ponere Barbetus (f) non dubitat, in solum hepate capite pus transferretur. Vidisti enim qui etiam in cor, pulmones, lienem translatus conspexerint: quod ultimum viscus scribi ab illo miror, non dico in his casibus, sed in universum rarissime in cadaveribus male constitutum deprehendi. Verum ad hæc sæpe cogit major in explicandis, quam in observandis quibusdam rebus sollicitudo. Quo magis inter eos qui de his postea scripserunt, laudandus est Cl. Molinellius (g), qui, ut par est, rem sibi prius accurate observandam, quam explicandam esse, censuit: viditque interdum pus in alias quidem partes, sed non in jecur; in non paucis autem neque in hoc, neque in illas translatus; in aliis vero in jecur utique, sed non fecus a vulnere, aut exulceratis aliis partibus quam a capite. A quo ut magis intelligas non sæpe adeo in jecur traduci; sic habeto necdum accidisse mihi, quod meminim, ut id viderem; Valsalvæ autem in tot dissectionibus vix semel, idque cum in pulmones quoque, plurimumque in ipsas thoracis cavas esset translatus. Fieri tamen potest, ut aliquando ideo non videret, quod non quæviserit, & nominatim in eo Adolescente (h) cujus facies ante mortem facta erat flava, cadaver autem universum idericum videbatur; nam & in Sepulchreto (i) exemplum habes morbi regii cum duritie, & dolore in regione hepatis, hujusque putredine, capitis vulnus consecuti. Sed ob eam ipsam quam Valsalva animadvertit, flavedinem, non facile creditur est, quomodo jecur se haberet, non quævisse, & tamen si in jecur esse transisset ista, aliaque læsi hepatis indicia sint, vulnus autem capitis siccum fiat, aut repente, & præter rationem minus det puris, suspicari licet, plurimum, quas legi, Observationibus confirmantibus, pus in jecur esse transisset; res tamen pro certa non est prædicenda. Subesse enim nonnunquam potest aliqua signorum fallacia, five hæc multa occurrant, five etiam omnia.

23. Nam si Molinellii (k) Observationem legas in Viro cui simul atque sanies manare desiderat & capitis vulnere, tumere coeperat, & intendi abdomen, nec vitium tamen in jecinore erat ullum, sed intestinorum superficiem quadam quasi ulcuscula sedebant cum multa sanie, & quamplurimis disiectis huc illucque tuberculis; facile intelliges, si vitia hæc eam potissimum obsiderent quæ jecur proxime subiecta contingit, intestini Coli partem; futurum fuisse, ut complura traducti in jecur puris, fallacia tamen, convenissent indicia: Quin etiam fieri aliquando potest, ut conveniant universa, & nihilominus fallatur is qui pus in jecinore prædicat inventum iri. Fac enim relegas quas tibi novissime descripsi, Valsalvæ Observationes. Nempe tubercula plerumque invenies five in pulmonibus, five in ipso etiam jecore non omnia fuisse suppurata, quin plura interdum (!) glandulosi corporis firmitudinem adhuc referentia. Quid? si ægro moriente, necdum ulla essent quæ pus habere inciperent. Videtur autem secundum eas Observationes, quibuscumque, ut puto, Molinellii conjungi potest Observatio, pus in viscera aliunde invecum, non puris forma semper depo-

ni, sed haud raro saltem nonnullas ejus particulas cum sanguine permixtas, & prorsus disjunctas, in angustis quibusdam, fortasse glandularum lymphaticarum, hærent, easque, ut in venereorum bubonum productione fit, obstruendo, aut irritando, eoque humores præterituros retinendo distendere, & multo copiosiores quam quod advectum est, puris generationi, a rigoribus illis, & horribus (m) significata, causam præbere. Quæ ratione illud quoque intelligitur, quomodo multo plus puris in visceribus, & caveis corporis sæpe deprehendatur, quam modicum vulnus dare potuisset. Quo autem modo non pauca solum, sed & quamplurima interdum purulentæ particulae non tantum ex capitis, sed & partium aliarum vulneribus, ulceribus, abscissibus alio transeant, ut cum ex pleuriticorum pulmonibus, imo ex artubus suppuratis ad intestinorum, aut renum vias pus nonnunquam tam manifeste traducitur, ut tandiu faeces, & urinae purulentæ sint, cum ex artubus nihil effluit, & vicissim tandiu pura illa excrementa, cum hi pure manant, & sanie, quæ Paræi (n) Observatio fuit; satis hæc circumscriptio sanguinis docet (*), quæ alteram quoque ejusdem (o), atque; ut alias aliorum omittam; præclaram, nuper ab experientissimo Benevolo (p) additam Observationem illustrat. His autem explanationibus non est locus, siquando, fatiscens naturæ viribus, vulnus scaturiat: quod commemoro, ut hujus quoque, inter superiora propositi, indicii fallaciam caveas.

24. Quas novissime produxi Valsalvæ quatuor Observationes; si unam excipias quæ, ut ante illas prolata, nullam offert cranii læsionem ad interiora pertinentem; ipsum aut laxatum, aut depressum, aut fissum, fractum, erosum exhibent. Pergamus igitur alias describere spectantes ad singula ista læsionum genera.

25. MULIER quinquaginta annorum dum in ripa fluminis indusia lavat, baculo ab alia muliere in dextera parte capitis a tergo percussa, in aquam cadit. Cito extracta, quodammodo stupida jacet. Discusso autem stupore, cum symptoma nullum appareret, spesque in dies magis confirmari videretur, ecce circa diem decimum quartum febris ingruit cum rigore: quæ ex febre obiit circa vigesimum secundum. CRANIO integumentis spoliato, animadversum est, pone aurem dexteram, quæ icta fuerat, Lambdoidis futuræ dentes inter se esse disjunctos, ex eorumque interstitiis levi pressione tantillum serosi humoris prodire. Intra cranium autem ad eundem locum paululum sanguinis stagnabat. Cæterum omnino sanum cerebrum fuit.

26. JUVENIS baculo percussus ad Sagittalem futuram prope Coronalem, sex, septemve dies transiit sine ullo symptomate, ut non decumberet, sed per Nosocomium ambularet. Verum circa septimum diem vulnus multum foetet: uno autem die, aut altero interiecto, ore vulnere intumescunt: & quidam ad guttur ardor percipitur. Postmodum febris cum rigore invadit: invadunt & motus convulsivi: mors denique in eunte die decimo tertio. CRANIO intus, extraque inspectum, nullam prorsus læsionem ostendit, nisi quod futura, quæ vulnere subiecta fuerat, flexuosam lineolam, inter suos denticulos intercurrentem, subfusco quodam colore evidentiorem habebat. Ad ipsum autem futuræ latus nonnulla Dura meningis portio cranio peculiari quodam modo adharebat: quæ facile tamen separata, vix aliquid exhibuit indicium sanie, superficie tenuis sibi inhærentis. Pia autem subiecta meningis pallida erat. Præter hæc, nihil adnotatum est: nam cætera, ut totum cerebrum, secundum naturam se habebant.

27. VIR annos amplius triginta natus, contundente ferro ad sinistram superiorem Lambdoidis futuræ partem percussus, dura rure, ubi erat, Bononiam redit, concidit quidem; sed illico surgit, atque iter continuo persequens passum ter millium, in Nosocomium se recipit. Cum ibi decumberet, animadversum est, vulnus haud satis laudabili colore esse, & aliquot interiectis diebus, abscessum ad ejus latus produci: quo postea ex arte aperto, brevique purgato, melius procedere vulnere curatio visa est. Sed multis in cibo admixtis erroribus, jamque aliquot febris accessibus progressis ex improvviso circa undecimum diem gravissima epileptica convulsio ingruit: quæ remissa, non tamen æger loquitur: etsi quæ alii loquuntur, se intelligere, significat. Post hæc in sinistram corporis parte convulsivi adnotantur motus; in dextera autem paralytici; facie risum quasi sardonium interdum repræsentante.

(z) supra, n. 15. in fin. (u) lib. Introd. Anat. c. 28. (x) Obs. Med. Chirurg. 15. (y) Schol. ad §. 2. Obs. 16. (z) supra, n. 19. (a) Schol. cit. (b) Obs. §. 5. 4.

(c) De Renu. Vulp. S. r. (d) §. 1. & 3. (e) §. 4. (f) Schol. ad §. 6. (g) Comment. de Bonon. Sc. Inst. T. 2. P. 1. inter Medica. (h) supra n. 14. (i) Obs. 16. §. 5. (k) loco paulo ante indicato. (l) n. 17. (m) supra n. 17. 19. 20. (n) Oper. l. 16. c. 49. (*) Vid. etiam Epist. 25. n. 20. (o) l. 10. c. 12. (p) Observ. 22.

te. Naturalis interea pulsus erat: quo postea celeri, turgente, & impetuoso facto, paucis post diebus mors secuta est die undevigesimo. A CAPITIS autem detrahendo, sub hac a sinistris, pluribus in locis, quamvis longe etiam a vulnere distitis, pustulans invenitur: quo os temporis superficie tenus erosum fuerat. Porro Lambdoides futura, qua vulnere subiecta erat, dentes inter se disjunctos, dura autem meninx colorem quasi cinereum ostendit, quem a pure contraxerat inter se, Piamque collecto. Pars ejus puris, quasi glutinis crassius instar, Pia meningi adhærebat; reliqua pars fluida erat, quæ vix semunciam æquabat. Huic Pia meningis portio subiecta cerebri portio duorum circiter transversorum digitorum tum longitudine, tum latitudine, unius autem profunditate ad sublividum inclinabat colorem. Cæterum reliquæ totius cerebri partes sanæ fuerunt; si paucum serum excipias, quod & in ventriculis inventum est, & ad initium Spinalis medullæ.

28. SENEX annorum sexaginta ab alto cadens, sub Lambdoidis futuræ angulo caput allidit. Primum semimortuus jacet. Dein tandem ad se rediens, de lævæ partis dolore conqueritur: quo perstante, non tamen decubuit, donec quarto, aut quinto die in S. Mariæ de Vita Nosocomium se contulit. Ibi non modo specilli in vulneris exploratione, sed ne gossypii quidem in detersione contactum ferre sine multo dolore potest. Circa diem septimum paralyti corripitur brachii sinistri: cui vena seclia, motus, sed non omnino, restituitur. Hic æger ad diem usque vixit vicesimum tertium, quo soporosis interit. DUM CALVARIA secabatur circa tempus dexterum, pus ex illius cavo emanavit: quod & in vulneris loco conspectum fuerat, dum caput contretaretur. Quo loco nulla cranii læsio inventa est: præter Lambdoidis futuræ disjunctionem. Cerebrum ibi ad lateris dexterum ulcus habuit duos transversos digitos profundum, a sanie facile sic excavatum. In vicino autem sinistro latere colore erat subpallido. Inter Crassam meningem, & Tenuem, totum anteriorem lobum dexterum contegentes, pus continebatur non multum, cujus colore amba ibidem meninges infectæ erant. In cerebri ventriculis, & ad initium tubi vertebrarum parva limpidi feri portio stagnabat.

29. Repentina futurarum disjunctio, si causam attendas; sine aliqua cerebri concussionem esse non potest: si effectum; non sine violenta Crassæ meningis, illic magis adhærentis, distractione, & annectentium fibrillarum, ac vasculorum laceratione. Accedit huc puri ex vulnere in cranii cavum sic minus difficilis parata via. Non igitur mirandum est in his quatuor, & in alia pariter quæ supra (g) descripta fuerat, Valsalvæ Observationibus, ubi futuræ alicujus disjunctio fuit, ægros interiisse, citius quidem, aut ferius, & levioribus, aut gravioribus affectis malis pro varia tum cujusque dispositione, tum aliarum, quæ notæ omnes esse non possunt, circumstantiarum conditione. De paralyti autem oppositum vulnere, aut læsioni lateris occupante; quoniam ut in duobus ægris ultimis, sic in aliis quoque de quibus infra scribetur, adnotata est; inferius (r) aliqua attingemus. Nunc a laxato cranio ad depressum veniamus.

30. HERBARIUS quidam in fronte prope Coronalem futuram nonnihil ad lævam ferro percutitur ad contundendum aliquanto magis, quam ad incidendum idoneo. Ab ictu leve animi defectionis initium sentit. Cum se in Nosocomium contulisset paulo ante memoratum; ad undecimum usque diem non modo nullum infelicis exitus indicium fuit; sed omnia felicem portendere videbantur. Verum illo ipso die vehemens febris hominem corripit cum rigore, & multæ bilis vomitu, ad vesperam iterato. Quæ ad eundem modum quotidie reverfa est, donec decimo quarto ab ictu die, & ante proximum plenilunium quarto, aere ad austrinam constitutionem vergente, primum quidem est hebes factus, sic tamen ut interrogantibus prompte responderet: paucas autem post horas, dum se a dextero in sinistram converteret lateris, omnibus tum externis, tum internis orbatu sensibus, & difficili pressus est respiratione: quæ licet postea ad naturalem accederet; tamen iterum laboriosa rediit: & sic brevi, eodem quem diximus, die mors ingruit. OS frontis eo qui indicatus est, loco erat leviter depressum, interius autem demissa squama quæ inæquali & acuminato margine ad dextram vergebat, duram meningem a dextris læserat; ut inter ipsam, & Piam pus stagnaret, quod a vertice quasi ad basim usque cerebri, & ad cerebelli fines ab dextero eodem latere inundave-

rat. Pia autem meninx, puri supposita, aliquanto crassior facta, a cerebro facile separabatur: quod ibidem ad cinereum colorem, ejus de quo dictum est, puris non ab similem, inclinabat. Porro cerebrum angustiori intra cranium spatium claudebatur.

31. De arctiori intra cranium spatium, ejusque causis, quas inter esse vidimus qui plenilunium reponant, & quibus austrina constitutio, expandens sanguinem, addenda est, quorum utrumque in historia hac commemoravit Valsalva, scis, a me supra (f) esse scriptum. Quod vero apoplexia, ut tot alios, quemadmodum in Epistolis Anatomicis (t) indicatum est, hominem prehenderit, dum se a dextero in sinistram converteret lateris, hic ea esse causa potuit quod puris copia quæ a dextris erat, sic totum factum sibi subiectum cerebrum tanto periculosius compresserit, quanto jam magis ob angustius spatium intra calvariam compressum erat.

32. VIR annorum quinquaginta calum in scincipite vulneratus, illico vomuit. In idem Nosocomium excipitur, ubi sub vulnere os ita depressum animadvertitur, nulla ut arte retrahi possit. Vulnus principio non dolebat: post dies autem aliquot fornicationis sensu afficiebatur. Ad quem cum motus convulsi toto corpore accessissent; ineunte undecimo die vita cum morte est commutata. OSSIS illa portio quæ ab reliquo, percussione vi recesserat, valide adhærebat duræ meningi, ibi leviter inflammata. Inter hanc, & Piam erat humor crassitie, & colore fero similis. Præter quæ intra cranium nihil adnotatione dignum inventum est.

33. MULIER eadem circiter ætate, contudente quodam corpore vulneratur supra sinistram superciliam. Ab ictu vomit, & stupida fit. Stupor tamen post aliquod tempus discutitur, resque feliciter procedere Chirurgus videtur, donec elapso decimo die, dolore sinistree aures corripitur cum horrore, & frigore, quod calor excipit. Tandem accedentibus totius corporis convulsionibus, intra paucos obit dies. OS ictui subiectum acuminata lamina cerebrum vulneraverat: quod propterea saniosum ibi erat, & corruptum. Sed quamquam vitium altius descenderat; ventriculos tamen non attingebat. Pars sanie ad basim cerebri circa nonnulla nervorum Paria defluerat.

34. MULIER annorum triginta caput pluribus lapidibus percussum fuerat, languore illico, & vomitu per plures dies consequente. Vulnus tamen exitum non infelicem spondere videbatur. Verum circa diem decimum febre cum frigore superveniente, aëris, & pallidum factum est. His accessit delirium, quod in soporosa affectionem sensim degeneravit. Hæc ægram denique sustulit circa diem vigesimum primum. IN CRANII dextera quidem parte fissura deprehensa est digitos quatuor transversos longa, cerebri tamen ea portio quæ fissuræ subiciebatur, nulla erat læsione affecta. A sinistris vero, ubi exterius ingens apparebat contusio, non modo fissum erat cranium fissura ducta in modum circuli, cujus diameter semunciam Bononiensem æquabat; sed etiam nonnihil ibi depressum: quin ab depressa illa portione acuminata lamina introtrusus recesserat, Crassamque meningem sauciaverat. Itaque huic meningi ibidem purulenta adhærebat materia, & subiectum cerebrum morbidum erat ad tres digitos tum in longitudinem, tum in latitudinem, ad duos autem in altitudinem; ut læsio ad ventriculos non perveniret.

35. VIR ætatis consistentis in scincipitis parte dextera contudente instrumento ictus, nullo prorsus affectus symptomate, suis ipse pedibus venit in læpium memoratum Nosocomium, in eoque decubuit. Duabus exactis horis, balbutire cepit: & post alias paucas horas paralyti in tota sinistra corporis parte correptus est.

Sinistram tamen oculum, cum balbutiendo ad interrogata responderet, exacte aperiebat; dexterum semiclausum habebat. Sed & dexteram partem corporis sine peculiari conatu movere non poterat. Duobus, aut tribus ab accepto vulnere exactis diebus, deliravit. Tandem soporosis factus, die quinto obiit. CAPUT hujus quidem hominis Valsalva, gravioribus occupatus negotiis, diffecare ipse non potuit. Tamen quæ ab Amicis qui diffecerant, relata sunt, Petro Molinello, & Joanne Antonio Guicciardino, adnotare non omisit. Fractum erat cranium sic, ut duo magna ejus fragmenta, quasi factio angulo introtrusus contrusa, non parvo illato meningibus vulnere, ipsique cerebro, in hujus substantiam ad duos propemodum transversos digitos penetrassent. Erat in eo cerebri vulnere concretus sanguis, & sanguine,

guine vasa quoque majorem in modum turgabant. Dum cerebrum e cranio eximebatur, aliqua feri portio prodierat.

36. Quod acervatim tot Observationes huc congeram, non tam brevitatis causa facio, cum restent non pauca quas adjiciam, quam ne crebrius easdem repetam animadvertiones. Quæ enim in quavis illarum videbuntur digna quæ magis attendantur, infra suis quoque locis commemorabo. Interea autem non sublitamus. Sed quod in depressi cranii exemplis fecimus, alias porro fracti, fissive Observationes subiciamus.

37. FEMINA quinquaginta annos nata, e scala præceps in terram cadit. Vulnus supra oculum sinistram apparet: tumida est, & pallida facies: livida temporæ: ore sanguis exit. Nihil mulier intelligit, nihil sentit, nihil, si manum dexteram excipias, movet, eamque paulisper dumtaxat, leviter, ac debilitat. Hora moritur a lapsu decima quinta. SINCIPITIS externa rubebant integumenta. In osse, partem orbitæ sinistri oculi superiorem faciente, plures erant fracturæ. A latere dextero arteria quæ per Crassam meningem diducitur, lacerata, sanguinem effuderat: cujus coagulati uncie circiter duæ inter eam meningem, & os Petrosi circumspiciebantur. Is sanguis ita concretus respondentem cerebri partem læserat, ut quasi erosæ instar appareret.

38. SENEX annos sexaginta, ab hircio impetrus, in terram cadens, partem capitis sinistram allidit. Vix loquitur: vomit: ore sanguinem ejicit: nullum sensum internorum præbet indicium, manus convulsivis motibus agitantur: facies rubet: itaque post biduum moritur. CAPITIS læsio circa superiorem marginem Temporalis musculi sinistri videbatur exterius levis. Sed cute sublata, is musculus totus inventus est sanguine suffusus: reclusoque cranio, non parva sanguinis grumosi copia, Crassæ meningi quæ eidem respondebat musculo, adeo tenaciter adherentis, ut ipsi connata videretur. Erat autem ibidem cranii fractura, cum interiorum vasorum disruptione. Verum cum eidem meningi, quæ dextero etiam Temporalis musculo respondebat, copia vel major ejusdemmodi sanguinis adhæreret, neque hic ulla ratione a sinistra parte illuc pervenisse posset, nulla autem cranii fractura a dextris se prodere: valde ea res Valsalvæ animum suspensum tenuit. Nam est postmodum cum ossam interioris aures fabricam, in qua totus erat, examinaturus, in dexteram illam hujus cranii partem scalprim malleo adegisset, fissura ipsi in conspectum se dedit: dubius tamen fuit, malleo hæc, an illi a casu percussio deberetur. Quod reliquum est, totum cerebrum, si paulum excipias feri quod in ventriculis fuit, secundum naturam se habuit.

39. VIR annorum quinquaginta lapide percutitur ad medium ferme superciliam sinistram, qua nervus ex orbita egreditur. Multis ab ictu elapsis horis in Nosocomium sæpius nominatum deferitur, ubi vinculis in lecto retineri necesse fuit ob immanes convulsivos universi corporis motus. Clausi erant oculi: mentis actiones feriabantur. Denique trigesima sexta ab ictu exacta hora, cum harum ultimæ illi conquiescent motus, interiit. CRANII portiones plures supra orbitam fractæ erant: quarum una acuta duram meningem pungebat, ibi propterea inflammata. Quin rima etiam reperta est in opposito, id est dextro latere ea ipsa parte quæ fracta a sinistris respondebat. In cerebro serum est inventum quodammodo saniosum. Cæterum cum alias quoque caput hujus viri fuisset sauciatur: videre ibi licuit unde tum ablata pars cranii fuerat, crassam quandam membranam quæ ossis pensabat vicem. Huic membranz dura meninx valide adhærebat.

40. Præter hoc ultimum, quod cum observatis olim a Berengario (u) apprimè videbis convenire, & præter id quod ad nervum attinet sub supercilio reflexum, cuius læsionem gravibus ipsam quoque excipi convulsionibus, supra (x) indicatum est, habet hæc Observatio duo alia in quibus paulisper sublitamus. Quorum tamen alterum infra (y) commodius attingemus. Alterum autem ad celeberrimam illam controversiam attinet de Contrahitura. A qua agnoscenda plerisque olim ratio abduxit, infirma tamen, quippe ab ea pendens futurarum cranii utilitate, quam duce Galeno (z) statuiebant, quam si creatæ essent ad progressum fracturæ inhibendum: cum æque ac nobis (a), satis omnibus notæ esse possint fissuræ

quæ ab uno calvarie osse in aliud, imo in alia haud rarissime se producant. Obstabat pariter difficultas in re, si verum fieri volumus, non ita plane, & perspicue, ut acquiescere omnes possent, per rationes quasdam, & similitudines explicanda. Verum est secundum prolata essent explanationes quæ nunc in Dissertatione leguntur Georgii Wolsf. Wedelii de Contrahitura (b); non æquum tamen erat aut est quidquam ideo negare, quod ejus non intelligatur causa. Denique illud insuper plerisque morabatur quod præclari Anatomici, & Chirurghi, ex quibus satis est nominare Jacobum Berengarium (c), Gabrielem Falloppium (d), Joannem Baptistam Carcanum (e), Isbrandum Diemerbroeckium (f) in tot fracti cranii curationibus, & post mortem inspectionibus (quod nominatim de Carcano dictum volo, tamen nullam ex ejus Observationibus in Sepulchreto relatum video) nunquam in opposita ictui parte fissam os deprehendissent. Sed hinc raritatem quidem contrahituræ arguere licebat; si modo ab aliis reapse aliquando compertam esse, constaret, negare non licebat. Compertæ vero plures extant tum non recentes, tum etiam recentes Observationes: quarum cum alias istis habes in Sepulchreto sub num. non ut perperam ab operis scriptum est, V; sed XI. (g), alias autem in Stofchii Dissertatione de Responis (h); non hic memorabo. Hoc tamen admonebo, quod Paulus (i) olim indicavit, capite non una in parte percussio, velut in cadendo contingit, fissuram calvarie quæ circa solutionem continuitatis cutis contingit, postea abscissam circa ipsam facta, & hoc scito apparentem, putatam esse juxta oppositam plagam partem esse factam, hoc, inquam, in cujusque Observationis examine caute prudenterque attendi oportere. Quapropter Falloppius (k) est in uno vidit os fractum in latere illi adverso quod equi calce ictum fuerat; tamen cum esset suspicio, ab allusione ad solum fracturam illam esse factam, testari se non posse, censuit, contrahituram vidisse. Non ab similia autem & Berengarius, & Carcanus, & Diemerbroeckius de eadem ab aliis proposita censuerunt: & sæpius certe æger loqui non potest, aut meminisse, quot ictus acceperit, aut in quæ, & qua parte capitis corruerit. Illud præterea attendendum est, num fissura quæ adversa in parte proponitur, ibi tantum sit, an a parte evidenter percussa, aut ab alia huic propiore incipiens, illuc usque producatur. Neque sic continuata, illa proprie Contrahitura est de qua inquiritur; nam ponunt cum Celso (l) non ea parte, qua cutis discissa est, rimam reperiri; sed fissum os fore parte altera. Hæc igitur si animadvertentes; multo pauciora quam putent aliqui, invenies exempla, in quibus Contrahituram agnoscere te posse, credas.

41. Nec vero Contrahitura proprie est, si quando constet, unum idemque ex cranii ossibus uno dumtaxat loco ictum accepisse, neque tamen ibi, sed alibi rimam habere; quod quidem posse fieri, non negabat Carcanus (m), ejusque Præceptor Falloppius (n). Quin hic (o) ad hunc quoque modum intelligi posse Hippocratis (p) verba, demonstravit, quibus alii Contrahituram proprie acceptam designari omnino crediderunt, videlicet os interdum frangi alia capitis parte quam qua vulnus est; nam si oppositam dumtaxat significare voluisset, non erat certe cur magnæ calamitatis loco poneret quod continuo subiecit, tunc Medicum ignorare, quam capitis parte fractura sit; fracturæ enim ex tantibus in universum indicibus tunc constaret, esse in opposita. Non video autem, cur non ab simili ratione interpretari Celsum ad eundem modum noluerit (q). Celsum (r) enim ubi fracti cranii indicia extent, quæ extare, deferre ponit, rima autem sub vulnere non appareat, si qua alia non quæreret partis qua fractum sit cranium, si oppositam dumtaxat partem intellexisset, cum modo scripsit. Solet etiam evenire, ut altera parte fuerit ictus, & os altera fiderit. Cave enim, potius quam Carcano (s), Joanni Baptistæ Cortesio (t) hic quidem credas, facile affirmanti, Latinos elegantiores per alteram partem alicujus rei, semper oppositam intelligere. Qui si, modo a nobis descripta, Celso verba paulisper attendisset, ne illud quidem paulo ante scripsisset, Celsum hoc loco non secundum suam, sed secundum vulgi opinionem loquutum fuisse. Multo autem minus inter Contrahituræ exempla recipienda sunt, ut ab nonnullis factum est, illa in quibus aut effusus sanguis, aut sanies, aut vitium quodcunque aliud quod, osse ibi illaso, contigerit, intra

(a) Tract. de Fract. Calvar. in Document. prope fin. (u) n. 16. (y) n. 48. in fin. (z) De Us. part. I. g. c. 17. (b) Epist. 32. n. 35. 36. (v) Sect. 1. membr. 3. (f) Tract. cit. c. 1. & 2. (d) De Vuln. c. 12. & Expos. in Gal. de Off. c. 13. (c) De Vuln. capit. Serm. 2. Lect. 6. (g) Anat. l. 6. c. 4. (h) Sect. 2. c. 5. 7. 8. 9. (i) De Re Med. l. 6. c. 92. (k) c. 13. cit. (j) De Medic. l. 8. c. 4. (m) Lect. 6. cit. (n) c. 12. cit. (o) Comm. in Hippocr. de Vuln. Cap. c. 14. (p) De Cap. Vuln. n. 10. apud. Maricell. (q) c. 32. cit. (r) c. 4. cit. (s) Lect. 6. cit. (t) Tract. de Vuln. Cap. P. 2.

cranii partem ipsi oppositam inventum sit. Quod etsi Berengarius (u), Fallopius (x), alique in pluribus seprehendisse, testantur, simul tamen negant, se Contrahituram vidisse. Hæc enim non nisi fracto osse unquam est ab illis, & vetustioribus intellecta: vasa autem quomodo sub illa osse in adversa parte rumpi queant, & suo ipsi modo explicarunt, & ex laudata Wedelii Dissertatione (y) conjici potest. Itaque si vel ponas, nullam præter eam quæ manifestius videbatur, percussam fuisse calvariam partem in eo Juvene (z), & in eo Viro (a) in quibus non secus atque in proxima Observatione dicemus, sanie, & noxam apparuisse Valsalvæ superius diximus in opposita, aut etiam in opposita; habebis tamen unde rem explices, ut in Feemina (b) pariter; quoniam in ea plures ictus ponere proclivius est; & in Sene (c), in quibus novissime scripti effusum fuisse sanguinem in adverso, aut in adverso quoque latere. Ex his autem quæ de Contrahiturâ perpendimus proprie, aut minus proprie accepta, facile males, in eodem Sene animadvertam in opposito osse rimam malleo anatomico, conspectam vero in eo (d) quem continuo post illum descripsimus, hostili uni ictui fortasse tribuere, quippe non ut illam in alio, nec continuo, sed in uno eodemque osse deprehensam.

42. VIR annos triginta natus, ex febre acuta multum delirans, per fenestram in terram se dejecit, & capitis fauciat partem sinistram supra musculum Temporalem. Non loquitur: facies rubet: tota corporis sinistra pars immobilis jacet, nisi quod una aut altera, a casu hora, dum vulnus tractaretur, pes leviter se contraxit, & mox extendit. Ad tertium usque diem sic vivens, fato cessit. TEMPORALI sinistro musculo suberat calvaria fissura, cui tamen nulla intus quæ sub sensum caderet, læsio respondebat. Sed in parte huic opposita inter Crassam, Tenuemque meningem effusus erat sanguis ad uncias circiter duas; ut hemiplexiam sinistri lateris ipse faceret; non vulnus ab eodem latere, aut fractura. Cæterum sanum fuit cerebrum totum, nisi quod omnia per Tenuem meningem repentina vasa erant sanguine valde turgida, & proximæ partes quadantenus inflammatae: hæc vero ad delirium fortasse magis, quam ad percussione attinebant.

43. Vides, quam facile decipi potuisset qui, vulneris tantum spectata sede, ausus esset de sede causæ hemiplexiam efficientis judicare. Quod minime faciendum esse, mea illa pariter ostendit, huic similis, Observatio quam in Epistolis Anatomicis (e) leges. Sed ad sedem causæ hujusmodi hemiplexiæ, dissectione quoque, ut par est, quæsitam, præter alias quæ supra descriptæ sunt, illa etiam historia pertinet quæ protinus describitur: quæ uandè reliqua in modo proposita occurrentia sive de san guine in adversa vulneri parte invento, sive de vasis in delirio valde turgidis partem a me paulo ante, partem alias (f), ut memineras, exposita sunt.

44. JUVENIS annum vigesimum agentis, vulnere casum inflicto temporalem musculus sinister in transversum inciditur. Ab ictu, brevi factò itinere, cadit, neque ita multo post loquendi facultatem amittit. Interrogantibus tamen, nutibus, quamvis tarde, respondet. Delatus in idem quod crebrius dixi, Nosocomium, nonnullis exactis diebus, aliquid, sed delirans dumtaxat, loquitur. Interim manum dexteram non movebat amplius: quæ tamen si pungeretur, se dolorem æger sentire, ostendebat. Circa diem obiit decimum quartum.

CRANIO dissecto, repertum est, vulnus, quod non Temporalem tantum musculum, sed & os incidere, alter in cerebrum penetrasse, & ferocem colluviem, quæ ibi occurrebat, cerebrum porro erossisse; ut erosio in sinistram usque ventriculorum perveniret. Cum autem serum, huic non ab simile, dum cerebrum eximebatur, circa Equinam sellam prodierit; veri simile erat, ex eodem ventriculo illuc per Infundibulum defluxisse.

45. JUVENIS duorum circiter & viginti annorum magno ictu casum ad superiorem ejusdem sinistri musculi Temporalem partem fauciat. Concidit illico, nec loquitur, ut vix vivere videatur. Loquendi postea facultas, cæteræque omnes restituntur. Sed circa quartum diem aponia redit: quoniam aliquoties postea, sed raro, nonnulla protulit verba: cum aponia autem convulsivi motus junguntur, in sinistra quidem parte corporis aliquando solum, & leves; in tota autem dextera assidui, ac adeo vehementes, ut corpus interdum

in hoc latu curvari videatur. Inter hæc tamen æger quæ dicantur, intelligere se, nutibus ostendit. Ingravescente autem in dies febre, denique sensim præ virum languore deficientibus convulsivis motibus, & nonnullis ante obitum horis quiescentibus, circa diem interit decimum tertium. VULNUS non modo Temporalem musculum incidere, sed per subiectum os alte in cerebri substantiam descenderat. Dura mening erat circa vulnus multo crassior facta. Circa idem, intraque saniosus occurrit humor, ex cuius forsitan mordaci natura convulsiones fuerant excitatae: certe cum vulnus eo usque pervenire videretur, ut transversum dumtaxat digittum ab sinistro ventriculo distaret, non illuc tamen usque ferrum pervasisse, sed profundiorum excavationem ab succo erodente, in vulnere genito, factam esse, cognoscebatur. In cerebri ventriculis nonnulli stagnantes feri, Cæterum quod in hoc Juvene sinistra cerebri parte læsa, convulsiones in corporis dextera magis faverint, eodem Valsalva referendum censebat quod & paralyticum, in corporis latere opposito cerebri læsioni semper ab se antea animadvertam.

46. Inter eas quæ ex ipso hæcenus descriptæ sunt, Observationes unam (g) habes in qua cum resoluta esset ea pars corporis quæ læsioni cerebri erat opposita, quadam interdum accedentes quasi epilepticæ convulsiones non illam minus, quam non resolutam, agitant. Sed alteram (h) quoque habes in qua cum pariter resoluta esset pars adversa, convulsivi motus in ea quæ resoluta non erat, adnotabantur. Nullam vero habes in qua res contra atque in altera ista, occurrerent: quod sane prolixius convenit cum theoremate illo catholico Saliceti quod Epistola Anatomica XIII. (i) memoravi: ubi tamen neque eorum dogmata reticui (k) qui non modo promiscue in alterutra parte paralyticum, aut convulsionem accidere, sed & plerumque paralyticum quidem respondens vulnere partem corripit, convulsione autem oppositam, tradiderunt. Quibuscum adeo consentiebat Ballonius, ut libello de Convulsionibus hanc potissimum sibi explicandam Questionem sumperit, quam & in ipsa libelli fronte proposuit, cur fauciat dextera capitis parte Convulsio sana (id est opposita vulneri) partem contingat. Id ut ponerent, Majorum dogmata impellebant, præsertim Hippocratis, tot locis idem repetentis, ut Marcellus Donatus (l) cum hos singillatim indicaret, eorum, puto, numero obrutus, illius oblitus sit, memorata Epistola (m) a me producti, in quo tamen vetustissimus ille Præceptor (n) discrete docuit, capite vulneratos impotentes fieri, si in dextris fuerit vulnus, in sinistra parte; si vero in sinistris, in dextera: quo nihil dici luculentius potest; quoniam Donatus scribit, de paralyti opposita partis nullibi Hippocratem, quod meminere, verba fecisse. Quod vero antiquiores illi, & asseclorum haud pauci non hoc, sed illud quod tanto pluribus locis traditum fuerat, accidere ut plurimum, existimarent, hinc magna ex parte factum crediderim, quod mortuorum capita non diffecant, ex vulneris sede quam in capite videbant, sedem quoque arguerent detrimenti cerebro illati, aut si hanc aliquando, cranio ab ictu ipso, aut inter curandum suis fermentis perforato, vulneri subesse conspicerent, majus certe, & præcipuum vitium in opposita cerebri parte esse posse, minime suspicarentur contra atque censendum esse, anatome docuit, ut supra (o) demonstratum est.

47. Cæterum non hæc eo dico quod nesciam, convulsione haud ita raro id latu corporis prehendi quod adversum est cerebri lateri, vitio revera præcipuo laboranti. Quid enim Poupartius ex propria, itemque ex Ghiracci anatomica inspectione Regiæ Scientiarum Parisiensis Academiæ (p) retulerit, præclare memini, nec aliam aliquam ignoro, ut quæ in Sectionem hanc Sepulchreti (q) relata est. Sed eo dico, ut intelligas, cujusmodi hic quoque attendi velim Observationes priusquam a nobis quid ut plurimum fiat, constituatur. Neque enim numerandæ sunt, sed perpendendæ, nec, nisi capitis dissectione accesserit, accipiendæ. Hæc autem accesserat in illa Massa Observatione quæ superius (r) memorata est, non secus atque in tot quæ aut ex Valsalva descriptæ sunt, aut in Sepulchreto leguntur, ut Diemerbroeckii (s), Dodonæi (t), Horstii (u), Reifellii (x), in quibus omnibus vides, illud corporis latu quod læsioni cerebri erat oppositum, non convulsione, sed paralyti

ralysi affectum proponi. Quin eas in quibus alterius lateris convulsio, alterius resolutio adnotantur, hanc quidem in opposito, illam vero in eo quod læsioni subiectum erat, exhibere: quarum Observationum una Salmuthi est (y), qui insuper sic esse consuetum, affirmat, altera autem Ballonii ipsius (z); quoniam, ut de aliis taceam mendis, quinam artus resoluti essent, omisum in Sepulchreto est operum incuria. In quam rescire posse vellem huic contrariam hallucinationem, ut cum Fontani (a) repetita est Observatio, aut cum altera item Bartholini (b), quæ ad propositum attineret, si utrius lateris artus; nam utriusque dicit; prius, magisve resoluti essent, adnotasset.

48. Ex his tamen qui nihil nisi vulneris sedem exterius videntur attendisse, Viri Doctissimi non defuerunt qui magis, minusve ab illo Hippocratis crebrius inculcato dogmate vel ante hæc tempora recesserint. Sic Donatus (c) contrarium quoque accidere, docuit. Sic Cæsalpinus (d) recensitis illis Hippocratis locis, bodie vero, inquit, non solum distinctionem, sed etiam paralyticam eadem ratione, id est in adversa vulneri parte, oriri sepe videmus. Sic Martianus (e) postquam de convulsione in ea parte verba fecit, de resolutione jam loquens, hæc tradidit: experientia quidem nobis indicavit, resolutionem semper in oppositum fieri. Quin etiam ante illos Carcanus (f) discrete hæc scripserat: non pars vulneri correspondens, at opposita semper paralyti corripitur, sicut & Hippocrates verissime dixit, & experientia nos docuit. Verum est, quod dixit Hippocrates, oppositam convulsione, non paralyti teneri; ego autem dico, potius paralyti eam affici: quod Carcani dictum cum tot aliæ, tum insignis illa Observatio confirmat Cl. Danielis Hoffmanni (g), qui in puero cui cerebrum a sinistris quassatum fuerat cum notabili substantiæ deperditione, sinistri pedis convulsivam agitationem vehementissimam, dexteri autem lateris paralyticam quæ immobile prolixius fuerat, adnotavit. Et illi quidem causæ utriusque affectus sedem statuebant in eodem cerebri latere quod convulso, aut resolutio corporis lateri oppositum est, causam autem alterius affectus alteram, ut puta irritationem, aut inflammationem, si convulsio est; compressionem vero, aut disruptionem, si paralyticam. Ad hunc autem, similemve modum accipiendum est quod Valsalva in proposito Juvene (h) convulsiones eodem in universum referendas censebat, quo in cæteris resolutiones. Cur vero hujus, aut illius causæ effectus in adversa corporis parte se prodant; nisi aliquam ponas decussationem, haud facile intelliges. Ponebat & illi, & multo ante eos alii: qua in re quid mihi verissimum videatur, satis alibi (i) indicatum est. Nec quamvis aliqui decussationem illam minus probent, quam vel Hippocrati olim, ipsi quidem ajunt, fuisse probatam, neque originem, & vim nervorum Spinalium a medulla Oblongata, aut altius derivandam esse, censeant; assentiri ipsis possum, nisi prius doceant, quomodo gravem cerebri dumtaxat læsionem universi corporis paralyticam consequatur, aut quomodo liceat propositæ quæstioni aliter satisfacere, siue convulsio, siue resolutio opposito in latere contingat. Porro ex his qui nobiscum hanc ut plurimum in hoc ponunt, sunt qui convulsionem altero in latere fieri, dicunt, quia hinc resolutis musculis illinc oppositi prævalent, sequæ contrahentes, inferiorem maxillam, aut truncum corporis ducunt, aut curvant eam in partem in qua ipsi sunt. Verum ut querere omittam, num hæc contractio jure possit pro convulsione accipi, aut si possit, quid ad eos attineat de quibus hic potissimum agitur, motus convulsivos; certe quod Cæsalpinus (k) ex illis qui vel olim haud multo aliter opinabantur, quærebat, & nos quæremus: quæ læsio oppositorum musculorum excogitari possit, si totum brachium convellitur, aut crur ex vulnere capitis in parte opposita, aut in respondente? neque enim brachii, aut cruris alterius musculi, musculi brachii oppositi, aut cruris sunt antagonistæ, in artubus autem potissimum illæ occurrunt de quibus hic loquimur, convulsiones. Hoc Thomas quoque Bartholinus (l) animadvertit in puero cui ex vulnere temporis dexteri convelluntur sinistram non modo nates, & os, sed etiam brachium. Ille enim, qualiacunque sunt, adscripsit quæ in Sectione hac Sepulchreti extremum Scholium secundum

dum habet ad §. 2. Observationis VIII. quamvis ex quo Auctore sint, ibi quidem non appareat. Certe autem; ut hoc quoque adjungam; ad paralyticis explicandas quæ in adverso contingunt latere, nervorum originum decussationem vel altius quam a medulla Oblongata, repetere cogimur, ut alias (m) ex opposita Retinæ tunica resolutione ostensum est, idque nunc confirmate liceret ex Peyronii (n) Observatione visus in alterius lateris oculo toties amissi, aut restituti, quoties in opposita parte vulnerati cerebri ubi hujus substantia deerat, pus aut retinebatur, & subiectum corpus Callosum premebat, aut inde eximebatur, itemque ex altera Cl. Petzii (o), qui sinistro cerebri hemisphaerio ita fauciat, ut substantiæ magna pars lacerata secederet, non modo utrumque artum dexterum movendi facultate carentem, sed & obscuratum visum, auditum autem vix ullum superstitem ab eadem dextera parte adnotavit. Igitur quam decussationem ad paralyticam in latere opposito explicandam agnoscere debemus, quare ad convulsionem non agnoscimus? Cæterum cur in eo de quo novissime dictum est, Juvene immanes illi assidui, & diuturni convulsivi motus nonnullis ante obitum horis desierint, causam Valsalva indicat, cum ait, sensum illos præ virum languore defecisse. Sic & illi multo vehementissimi qui supra in quodam Viro (p) descripti sunt, ultima vitæ hora conquieverant. Eademque fuisse videtur causa, cur altero in Viro (q), itemque in Muliere (r) delirium tandem in lethalem soporem degeneraverit. Sed alias fissæ calvariæ Observationes accipito.

49. JUVENIS viginti annorum in sinistra occipitii parte casum vulneratur. Nullam ab ictu adnotatur symptomata: & felix initio videtur curatio. Diebus tamen progredientibus partes circa vulnus valde tument. Febris cum rigore, & delirio ingruit ad duodecimum diem: mors autem ad decimum quartum. DUMCADAVER e lecto auferunt, non parva sanguinis copia effluit e vulnere. Sectione autem instituta, tota ea pars capitis quæ intumuerat, sanguine turgida invenitur. Eri vero in exterioris ossis facie ferrum quod vulnus infixerat, levem dumtaxat incisionem reliquerat; ad hujus tamen latu fissura erat, cui respondens Crassa mening purulentam materiam sibi valde adhærentem habebat: huicque subiecta cerebri pars naturalem colorem nonnullum in atrum mutaverat. Præter hoc, nihil adnotatu dignum in toto reliquo cerebro fuit.

50. VIR triginta tres circiter annos natus, ex alto in terram cadit. Non loquitur: sensus omnes interiores amittit. Primum vomit; deinde conatus solum vomendi remanet; convulsivi accedunt motus; facies rubet: pulsus est turgidus: sanguis e naribus, & sinistra aure erumpit: difficulter respirat: intraque viginti quatuor a lapsu horas e vita excedit. CAPITIS sinistram partem musculum Temporalem habebat contusum, arteriæque Temporales ramos laceratos. Illo sublato musculo, duobus transversis supra aurem digitis, cranii fissura inventa est forma arcus: & prope hanc fissuram concretus sanguis ad duas uncias inter cranium, & Crassam meningem; quæ tamen, ut & reliqua cerebrum, sana erat. In Ventre, aere turgente ventriculus, ut etiam in Thorace pulmones, dexter præsertim: qui ambo rubebant, nullo modo parietibus adherentes. Pericardium nihil, aut parum, feri; cordis ventriculi aliquantulum sanguinis spumosi, & fluidi continebant.

51. VIR alter annorum ad quinquaginta a currente effrenato equo percussus, & ad terram afflictus eo impetu est, ut cum ad lapidem occipitium allisit, fracti ossis crepitus audiret. Primum semimortuus jacuit: paulo post, verba nonnulla, sed quæ vix potuerunt intelligi, proferre conatus est. Ex aure dextera, ex naribus, ex ore sanguinem effundebat, cujus in fauces confluxu propemodum suffocari videbatur. Vomitu etiam tentatus est: qui mox ea vehementia rediit, ut animam agere crederetur. Semihora autem a casu exacta, nullum amplius sensus indicium dedit, ut neque motus, nisi quod semel, aut iterum caput quassavit, & quod naturali adhuc respiratione utebatur. Facies interdum vivebat; sed plerumque erat pallida. Denique horis elapsis duodecim, tarde respirare coepit; ut si quod aliis accideret solet, attendere

(u) c. 1. cit. (x) c. 12. 13. 14. cit. (y) Sect. 1. Membr. 3. & 4. (z) n. 5. (a) n. 7. (b) n. 27. (c) n. 38. (d) n. 39. (e) XIII. n. 16. (f) Epist. 7. (g) n. 11. (h) n. 27. (i) n. 14. (j) n. 15. (k) De Hist. Med. Min. l. 5. c. 4. (l) n. 14. (m) Epist. 1. 7. n. 19. apud Marinell. (n) n. 43. (o) Hist. A. 1700. Obs. Anat. 19. (p) Obs. 7. §. 2. (q) n. 21. (r) Obs. 3. §. 2. (s) Obs. 4. §. 10. (t) Obs. 8. §. 9. (u) in Addit. ad hanc 3. Sect. Obs. 14.

(y) Sect. ead. Obs. 3. §. 7. (z) Obs. 17. §. 1. (a) Obs. 5. §. 7. & 8. (b) Obs. 4. §. 6. & 7. conferend. cum l. 1. §. 15. Obs. 27. §. 2. (c) c. 4. cit. (d) l. 2. Quæst. Medic. 10. (e) Annot. ad Hippocr. Epid. l. 7. S. 1. ver. 377. (f) De Vuln. Capitis. Sect. 3. Lect. 5. (g) Dissert. de hac rarissima sanatione. (h) n. 45. (i) Epist. Anat. 13. n. 17. uq. ad 21. (k) Quæst. cit. 19. (l) Cent. 5. Hist. Anat. 2. (m) Epist. indic. n. 18. 19. 21. (n) Commenc. Litter. A. 1735. Hebd. 39. prope fin. (o) & A. 1736. Hebd. 34. n. 2. (p) n. 39. (q) n. 35. (r) n. 34.

deretur, credi posset intra pauca temporis momenta interitus. Ipse tamen duas horas cum ea respiratione vitam trahens, hora obiit a capitis allisione decima quarta.

MEDIUM, sed paulo tamen dexterius, diffusum erat os occipitis ingenti, & lata fissura, quæ per ejus basim ad Magnum foramen producta, hoc oblique fecans, ad Petrosam usque processum perveniebat. Magna autem sanguinis effusi copia sub cerebri basi, & in anteriore quoque ejus parte inter Crassam, Tenuemque meningem reperta est.

52. Qua ratione fieri in hoc potuerit, ut cum fissum esset occiput, copia tamen sanguinis in anteriore quoque capitis parte inter meninges effusa deprehenderetur, ex iis intelliges quæ superius indicavimus (1): quamquam cum multis sanguis esset sub cerebri basi; inde fortasse pars illius potuerat antrorsum quoque pergere inter meninges. Quod si non fuit, vasa non desunt, nec ea tenuia, quæ ab harum altera in alteram trajecta, in magnis ejusmodi concussionibus, si præsertim plurimum distenta sint, non difficile rumpantur. Sed tunc, etiam ipsam calvariam caveam possunt alia distrumpi, unde sanguis per aures, nares, os effluit. Quæ facilius accidunt, si fissura perveniat ad processum Petrosam, ut in hoc Viro, aut si sanguis, ut in superiore, sit prope nova Tympani foramina inter cranium, & Crassam meningem effusus. Per illam enim viam esse in Tympani caveam, ex hac vero per Eustachii Tubam in nares, faucisque, non est cur hic monstrem, qui hac de re, atque adeo de sanguinis e cranio per has vias exitu jam olim alibi (2) satis scripserim.

53. VIR quidam cæsum in anteriore, itemque in posteriore capitis sinistra parte vulneratus, & in sæpius memoratum Nofocomium exceptus, quarto a vulneribus die queri cepit de sævis ad lumbos doloribus, qui intra paucos dies universum corpus jam occupabant. Die decimo sexto aphoniam correptus, tum usu omnium sensuum internum amissio, tandem vigesimo quinto moritur. VULNERUM antea ad initium usque substantiæ cerebri medullaris pervenerat. Posterius vero supra Transversum Crassæ meningis processum, cerebrum usque ad sinistri ventriculi cavum fauciverat. Eo ventriculo non parum feri continebatur, quod lingua impositum, longam mordicationem reliquit; ut ex ejus acrimonia nervoli generis irritatio, indeque universales illi corporis dolores forsitan repetendi videantur.

54. AGRICOLA annorum circiter quadraginta ab alio Agricola ad dexterum ipsum latus mediæ ferme futuræ Sagittalis runcina vulneratur, hujus rostro tam alte adacta, ut intra cerebrum perveniat. Totum ab ictu contremisit corpus, intellectus actiones retardari incipiunt, atque in omnibus sinistri lateris partibus movendi facultas labefacta, donec, circa diem quartum, superstitie sensu, omnino pereat. Facies multum rubet: interiores sensus obscurantur: respiratio gravis, pulsus debilis fiebat. Denique rubicunda materia per os rejecta, die septimo obiit. CRANII fornice exsecto, qui vulnere non modo perforatus erat, sed & ossam squamam e sua sede elevatam habebat, dum Crassa meninx ad cerebrum extrahendum, circa initium medullæ Spinalis inciditur, hic non parva sanguinis effluit copia. Cæterum vulnus Sinum perforans Longitudinale, inde in sinistram usque perveniebat ventriculū, in quo ferum cum grumoso sanguine latebat: in ejusdemque ventriculi basi fordidum ulcus conspiciebatur. In Thorace pulmo sinister multum a stagnante sanguine turgebat.

55. Valsalvæ inter scribendum, ut sit, accidisse, ut pro ventriculo dextero, qui subiectus erat vulnere, sinistram posuerit, ob nullam interjectionem, aut additam animadversionem credibile est. Qui enim cerebri noxam invenire solitus esset in eo latere quod resolutio corporis lateri opponeretur, ut ex compluribus quæ supra (u) descripta sunt, Observationibus, & ex eo quod diserte in 45. adjecit, satis, superque constat, nunc si contrarium in Agricola hoc conspexisset; adnotationem in rem insolitam prætermittere potuisset non videtur. Quod tamen non eo dico, quod vulnus a dextris non potuerit in sinistram, præsertim adeo vicinum, ventriculū levi obliquitate deflectere, aut quod ipse nunquam in cadavera incidit quæ læsionem in eo cerebri hemisphærio haberent quod paraly-

tico responderet corporis lateri. In Epistola enim Anatomica XIII. (x) non aliorum modo aliquot ejusmodi Observationes indicavi; sed & meam proposui: quamquam in earum nonnullis quid desiderari possit, & quomodo reliquas, meamque, salvo Valsalvæ dogmate explicare liceat, non reticui (y). Unde fumere aliquid fortasse poteris, ut hanc quoque explices, nedum si quid in illa quæ supra num. 35. proposita est, in palpebris minus respondere videatur.

56. Finem huic Epistolæ imponere juvat duabus vulneris, punctum pariter inflicti Observationibus, sed tanto majori attentione dignis, quo magis levis in utraque apparebat ictus, & qui ad faciem potius quam ad cerebrum spectare videretur.

57. VIR triginta annos natus, biliosus temperamenti, pungente ferro ad dexterum oculum percussus, triduum sine ulla sensibili actionum læsione transigit. Die quarto venit ipse in crebris indicatum Nofocomium: eodemque die mortuus est, præter Medicorum opinionem, quia nullum usquam apparebat lethale vulnus; sed simplex dumtaxat in eo oculo consilio. CALVARIA autem reclusa, cum parva purulenta materiæ copia inter os frontis, & Crassam meningem inveniretur, & quæreret locus unde illa prodiret, specillo os e directo oculi dexteri perforatum reperit. Itaque externa, internaque vulneris totius via diligenter inquisita fuit, & manifeste compta. Scilicet ferum inter oculum, & orbitam sine illius læsione ulla, ad hujus ossium fornicem pervenerat, quo perforato, substantiam cerebri pervaserat, ut vulneris finis lato dumtaxat digito a parietibus distaret ventriculi dexteri.

Cæterum etsi hyems erat, cadaver autem cito ab interitu dissecabatur; ea fuit viscerum, ac vasorum flacciditas, ut tactum sine læsione non ferrent, tantaque simul totius corporis graveolentia, ut parem ad illud tempus se Valsalva non invenisse, confirmet, hæc omnia in pravam rejiciens, quæ vulnus præcessisse debuerat, humorum dispositionem.

58. Ex omnibus, quas legisse meminerim, cerebri per vulnus orbitæ læsi Observationibus vix ulla mihi, ea quæ inter vulnus, & mortem intercesserunt, spectanti, videtur hac esse mirabilior. Etsi enim alii de quibus scripserunt Horstius (z), Ballonius (a), Fantonus pater (b), & Jo. Phil. Burggrafius (c), non nisi nono, undecimo, decimo quarto, aut vigesimo primo obierint die; alii autem de quibus Petrus Borellus (d), & Schmidius (e), nihil mali suspicantes, aut eo die genio cum sociis indulgentes, ad duas leucas, aut ad quadantem milliarii ambulaverint; hi tamen aut postmodum mortui inventi sunt, aut mox repente exanimati ceciderunt; illi vero aut dolore primum capitis, & gravioribus deinde symptomatibus, vexati, aut his continuo ingruentibus afflicti dies illos omnes traxerunt. Neutris adnumeravi alios quosdam, ut quem Sennertus (f) proposuit, statim apoplecticum factum, & nona circiter inde hora mortuum; quia sine orbitæ læsione acutus ille gladius videtur per nervi Optici foramen, aut, si mavis, per vicinum alterum, quod lacerum appellat, cranii caveam subisse: quod etiam in Diemerbroeckii (g) Observatione, quam hic in Sepulchreto frustra quæsi, potuisse fieri, non negabis, ægro nullis actionibus animalibus privato ad decimum usque diem, tunc autem accedente febre vehementiore, intra biduum extincto. At scilicet globus per orbitam oculi dexteri sic adactus, ut e sinistra occipitis parte emergerit, quemadmodum Cl. Helwichius (h) descripsit, sine orbitæ fractura transire potuisse non videtur, ut si velis casum hunc ad eorum classem referre quos secundo loco memoravi, per me liceat, præsertim cum femina a vulnere exanimis corruerit. Utram vero ad classem attineant, nescio, quos ex vulnere orbitæ peremptos scripserunt Bohnius (i), Ruyschius (k), Jacotius (l), imo Dodonæus (m), cujus nomen, dum in Sepulchreto hæc Observatio describeretur ex Scheenckio (n), prætervisum, perperam ex præcedente acceptum est. Nescio autem, quia ex narratione illorum neutiquam, ut ex aliis, & nominatim Valsalva, constat, quot dies fauciati exegerint nullo se ostendente symptomate, ut puta sopore, quem Dodonæus memorat quidem, sed quo die inceperit, reticet: Bohnius hoc tantum habet, tertia ab ictu die esse mortuum: Ruyschius autem nihil

hil aliud scribit, nisi brevi post acceptum vulnus, quod illis qui curationi præerant, videbatur exigui momenti, mortem ingruisse. Qui, tamen alia, ut intelligere potuisti, jam extabant ejusdemmodi Observationes; adeo raram existimavit hanc suam, ut inter ea quæ Bidloo nunquam occurrere potuisse, credebatur, *Vulnus Orbitæ Oculi lethale* recensuerit (o). Decebat tamen inter cæteras quæ Sepulchreto additæ sunt, hanc Observationem non omittere, nec quæ ad ipsam adjecit Ruyschius, nimirum superiorem partem orbitæ esse adeo tenuem, & fragilem, ut in multis scriptoriæ chartæ non superet tenuitatem, & perforari solo digito possit: ideoque orbitis inflicta vulnera non esse (ut in pluribus accidit eorum quæ commemoravimus) floccifacienda, præsertim si ferro, aut ligno inflicta sint non obtruso, aut vulnerati formolentia, nausea, febre, vertigine, convulsione (adde ex historiis indicatis non levi capitis dolore, sensuum torpore, paralyti, delirio, alio ejusmodi symptomate) corripiantur. Hæc autem animadversio sicuti nonnunquam ad curandum valet terebra ossi frontis tempestive adhibita, quod altera Borelli Observatio (p) ostendit, ita ut plurimum juvat salutem ad prædicendum. Ut plurimum dixi: etsi enim cæteri sunt mortui, hic tamen apud Borellum evasit, & Cl. Fantonus in Scholio ad Parentis Observationem (q), quæ vulneris quidem Striati corporis diserte mentionem non habet, sed eandem esse apparet quæ supra ex Sepulchreto (r) indicata est; militem sibi notum memorat, qui ad internum orbitæ angulum acutissimo ensis fauciat, cum in oculi imbecillitatem, & hemiplexiam incidisset, in hoc valetudinis statu ad multos annos vitam perduxit. Huc addes, opinor, Venatorem illum de quo Elias Camerarius (s), punctum in eodem angulo vulneratum in confinio palpebræ superioris, ex illo illud vulnus paralyti totius oppositi lateris excipiente, proximi oculi amaurosi, & memoriæ non levi immutatione, paralyti tamen, his persistentibus, sensum deinceps valde levata, vivere pergentem, ut mensas jam quatuor ab inflicto vulnere traduxisset, cum Observatio scripta est, & ferme novem, ut videtur, cum Augustam Vindelicorum est missa. Quo felicius fuit Juvenis alter ab Nebelio (t) propositus, qui per sinistram orbitam fauciat, cum statim paralyti ejusdem lateris, motibus autem in opposito convulsivis, aphoniam, & mox delirio, ac oblivione correptus esset, post tertiam hebdomadam pauca sanie ex dextera aure cujus magnus præcesserat dolor, per aliquot dies effluente, integram sanitatem post sex circiter ab acce-

pto vulnere hebdomadas recuperavit. Ne vero forte mireris, hemiplexiam subiectum vulnere lateri, convulsiones oppositum contra ac sæpius fieri solet, ut supra (u) diximus, invasisse; scias oportet, vulnus acuto gladio sub externa oculi sinistri cantio per palpebram inferiorem... punctum, & sursum versus ita inflictum fuisse, ut gladii cuspidis oblique sub bulbo illius oculi per ejus orbitam ossam versus anteriorem cerebri basim penetravit. Adde igitur mecum quod obliquus ille gladii incessus, & magnus dexterae aures dolor, & salutaris saniei per ipsam defluxus indicant, hemisphærii cerebri dexteri: sicque intelliges facile, sinistram corporis lateri, non dexterum, fuisse cerebri læsioni oppositum. Per te autem intelligis, pertinere aliquando ad cerebrum vulnera non modo orbitis, sed & infra orbitas inflicta, quod & Egermeri historia (x) ostenderat, & hæc altera Valsalvæ nostri confirmat.

59. JUVENIS annorum viginti quinque punctum acuto ense circa inferiorem marginem orbitæ oculi sinistri fauciat. A vulnere cadit: cessant omnium interiorum sensuum functiones: non loquitur. Si nonnullos convulsivos motus excipias; vix ullum motus indicium dat; ut cum specillum in vulnus immittitur, aliquem doloris sensum ostendit. In singulas horas respirationis motus augetur. Novissime deficiente pulsu, circa horam ab accepto vulnere decimam moritur. CEREBRO e cranio exempto, specilloque in exterius vulneris orificium indito, compertum est, secundum latus ferme ossis Spongiosi Superioris ensem in cranii caveam perrexisse: quod & fragmenta ossa in hac, & vulnerata ibidem cerebri substantia confirmant. Quoad autem vulnus per cerebrum procederet, frustra specilli ope quæsitum esset, quod ob cerebri mollietatem æque novas facere, quam factam ostendere viam posset. Demptra igitur Dura meningis, & Pia animadversa, quæ in incipiente, inflammatione instar partis, sanguine turgebat, tum ventriculis Lateralibus apertis, in utroque concretus sanguis, qui e valis, facile ipso vulnere ruptis, effluerat, confectus est. Ex iis redundasse in quartum ventriculū, nam in hoc quoque occurrit ejusmodi sanguis; videbatur.

60. Habes Valsalvæ Observationes, hoc etiam magis commendandas, quod in omnibus ferme dies horæve adnotata sunt, quibus aut symptomata, aut mors ingruerit: quod etsi Medicis, Chirurgisque scire perutile est; tamen in aliorum plurimis desiderantur. Notæ vero ne numero quidem sunt cum illius comparandæ. Attamen quia satis prolixa hæc Epistola est, in proximam rejiciuntur. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LII.

De Vulneribus, & Ictibus Capitis Sermo absolvitur.

QUE ad Capitis Vulnera, Ictusque pertinent, historias reliquas his Litteris proposuimus, eundem quem superioribus, ordinem conservabo, initium ab illis ducens in quibus calvaria læso aut nulla, aut certe levissima fuit. Nam etsi Celsus (a) raro, ait, evenire, ut os quidem totum in calvaria integrum maneat, intus vero ex ictu vena aliqua in cerebri membrana rum-patur; frequens tamen cadaverum sectio posteros docuit, integro osse, per sepe aliquid ejusmodi, aut etiam gravius accidere. Quod Valsalvæ, suis dissectionibus edoctum, & ipse dicentem audivi, & tu potuisti ex iisdem, inter primas superioris Epistolæ descriptis, cognoscere. Ad quas addes præter tot alias quas Sepulchretum versans, offendes, has etiam quæ protinus subicientur.

2. MULIER annos nata ad quinquaginta, plurium liberos mater, pinguior aliquanto quam agrestes, qualis ipsa erat, pleræque esse mulieres solent, in fossam cadens, alterum scilicet latus ad præduram glaciem alliserat, medius enim erat mensis December A. 1725. Ab eo ictu allisum os retectum fuerat ad duos tresve digitos. Quod ob vulnus in Nofocomium hoc venit: ibique nulla paralyti, nulla convulsione, nullo graviore prægresso symptomate; vix enim aliquam fenerat vomendi voluntatem; infirmis nec viribus, nec pulsibus, repente arido, ac livido facto vulnere, postmodum, qui undecimus erat ex quo ceciderat, dies, interiit. CADAVER; etsi præfrigida illa tempestate, & viginti quatuor, haud am-

plius, ab obitu horis incidi; grave olebat adeo, ut intra diem unum dissectionem omnem absolvere coactus sim. Plura tamen adnotavi quæ tum ad naturalem, tum ad contrariam attinerent constitutionem. Hæc altera dumtaxat referam. In Ventre contractum omentum, ventriculus oblique dextrorsum inclinatus. Sub eo Colon intestinum non in transversum means, sed dorsum curvatum, idemque ab initio ad curvaturam hanc usque plurimum dilatatum, & livens. Aequo longior lien. Testes non modo albi, duri, inæquales, sed in eorum altero latens ad centrum corpusculum album, subrotundum, ferme & cavum, & cartilagineum. Tubæ amabæ duobus transversis infra majus orificium digitis profus imperviz. Vagina intus nigricans, & ad imam fere anteriorem partem quasi ab acri humore erosa: cujusmodi erosio in altero quoque latere cervicis uteri animadvertetur.

In Thorace pulmones a tergo pernigri. Cor laxum pluresque in ejus ventriculis polyposæ concretiones. Vasa, ut & in reliquo passim cadavere, multo sanguine repleta. In Capite demum, os scilicet quæ allisum fuerat, intus, extraque lividum; nulla tamen rima fissum. Meninges, sub quibus non pus, aut sanguis, sed aqua effusa erat, qua parte respondebant livido ossi, ipsæ quoque ex subviridi livebant. Sic eo tantum loco & cerebrum livore affectum erat, non alius tamen descendente, quam ad digitos duos. Foetor cum aliarum, ut dixi, partium, tum harum præsertim, erat gravis.

(1) n. 41. (2) Epist. Anat. 6. n. 6. & seqq. (3) n. 11. 17. 27. 28. 35. 42. 44. (4) n. 25. (5) Ibid. & n. 26. (6) Sepulchr. l. 1. s. 3. Obs. 38. (7) Ibid. l. 4. s. hac 3. Obs. 17. §. 1. (8) Sect. cad. Obs. 5. §. 10. (9) Act. N. E. Tom. 6. Obs. 146. (10) Sepulchr. Obs. cit. 17. §. 3. (11) Ibid. in Addit. ad hanc Sect. Obs. 9. (12) Obs. cit. 17. §. 4. (13) Anat. l. 3. c. 10. (14) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 120. (15) De Reven. Vuln. Sect. 2. c. 1. (16) Eph. Anat. Chir. 39. (17) Sepulchr. Obs. cit. 17. §. 3. (18) Medie. Obs. 6. 3. (19) Obs. Medie. l. 1. ubi de Vula. Cerebri.

(20) Resp. ad Bidl. Vindie. (21) Eph. N. C. Cent. 3. Obs. 33. (22) In Schol. ad cit. s. 2. Obs. 17. (23) 35. (24) Eph. N. C. Cent. 3. Obs. 33. (25) Earund. Cent. 6. Obs. 14. (26) n. 47. (27) Sepulchr. Sect. hac 3. Obs. 3. §. 43.

tum aliis, ab Italis proposita esse, aut peracta. Sed idem scio, & extrema cogente necessitate esse peracta, nec sine gravi, quod non dissimulant ipsi, periculo, convulsionum præsertim, quas non Hippocrates (1) solum, alique, sed & Marchettus ipse (u) consecutus vidit; ut propterea musculi illius sectionem suadere noluerit; ne dicam, nunquam esse instituendam, diserte scripserit. Sive igitur Chirurghi eo tempore quo apud quasdam Civitates male audire cepit cranii perforatio, hac tutissimo quodam loco, & quatenus li cere crediderunt, peracta, in cæteris illos imitari non sunt ausi, ægrique nihilominus perierunt; sive imitati sunt, & secutis, opinor, convulsionibus, aliisve malis, ægri tanto miserabilius perierunt (querimus enim, non quid necessario acciderit, sed quid accidere poterit, ut auxilium hoc genus defereretur) quem in metum populus, & quam in opinionem ab utrolibet eventu facile adductus fuerit, vides.

13. Sed præter eas quæ dictæ sunt, fieri tunc potuit multis aliis de causis, ut sine utilitate calvaria terebraretur; imo non sine manifesto detrimento, quæ res vel magis averfos fecerit animos ab hoc auxilio: ut si Chirurgus forte ignarus, quam sæpe in cranii interiore facie insculptæ sint foveæ illæ quas alias (x) tibi memoravimus, tubercula, ut olim vocabant, Crassæ meningis haud raro alte adeo excipientes, ut ibi una, eaque tenuior, externa lamina ossibus præsertim sincipitis, interdum & frontis superfit, quarum ignorantie rerum vereor, ne ipsas Observatores quidam pro cranii, & meningis morbis proposuerint; Si ille igitur contra aliquam ex iis foveis casu; nam certæ earum sedes non sunt; terebram demississet; prius utique meningem, & quæ ipsam attollunt, violasset, quam primam laminam totam a se terebratam esse, crederet: aut si alius, resecta ope terebræ eadem meningē, eique pus subesse ratus (subest enim aliquando, ut complures docent Observationes, in iisque etiam duæ a Murryo (y) editæ, quas anatome confirmavit) eam meningem incidisset, itque aut signis deceptus; inter quæ omnium certissimum num esse possit pulsatorii, ab arteriis cerebri illi impressi motus cessatio, alii viderint; ferri aciem non in pus, quod nullum esset, sed in Tenue meningem, cerebrumque immisisset, aut non deceptus, arteriarum ramos, per Crassam meningem repentes, fauciasset. Mitto errores cæteros qui in opere non ita facili, accidere plures potuerint non sine ægrorum noxa, enumerare: & ad reliquas causas redeo, propter quas id opus inutile esse poterit. Quarum ut aliquas tantum commemorarem; certe ut sanguis inter meningem Duram, & cranium, & iis quidem locis esset effusus, quæ perforare nihil veret; tamen si concretus arte adeo, & tenaciter ad eam meningem adhæssisset, ut non sine vi divelli posset, quemadmodum & aliis pluribus, & Valsalvæ ipsi non semel invenire contigit; nihil enim, ut vel supra animadvertere potuisti, comminiscimur, sed omnium fere in superioribus, aut in his Litteris habes exempla; quid cranium perterebrare profuisset? Dices fortasse: at si vel ante mortem sic adhæssisset; perito Chirurgo non defuissent quæ infunderet; ut dissolveret, & reglutarer. Tac, non defuisse. Quid? si pars aliqua ejus sanguinis ibi esset quo adire infusus humor non posset; neque enim ignorans, arte cum cranio meningem illam coherere, & hinc consequi, ut nequeat cum uno in quo a cranio separata sit loco, alter, vel propinquus, in quo pariter separata sit, communicare, aut certe ita expedire, ut opus esset tum ad subeundum, tum ad egrediendum. Nec me præterit, quibus instrumentis Chirurghi possint partem aliquam meningis proximam a calvaria diducere, ægrum autem, spiritu per intervalla cohibito, coherentem materiam urgere, eique faciliorem ex suis recessibus exitum parare. Sed vicissim pericula quoque video, ne forte meningem avellendo, hanc Chirurgus lædat, aut vas aliquod ex iis etiam majusculis violet paulo ante memoratis, quæ per exteriorem illius faciem prominentia, intra calvariam ramosos illos sulcos excipi, nostri neque istos non timeo ægotantis conatus, si modo imperata audire, & facere is possit, neque, ut multi, sine sensu, & motu attonitus jaceat. Cohibito enim spiritu dum homines conituntur, plus sanguinis in capite retineri, vel facie eorum inspecta, eo tempore tumente, & rubente, manifestum est, sive quod undique tunc minus expeditus, otiant videlicet pulmone, est sanguinis reductus, sive etiam ob eam quam

credidit Santorius (z), aut ob aliam aliquam ejusdemmodi causam, capiti peculiarem. Itaque cerebriurgentibus vas, Tenue meninx undique ad Crassam urgetur, & siquid humoris inter hanc, & cranium forte intercedit, id quo minor resistentia est, per apertum in hoc foramen eliditur, siquidem huc non interclusum adiutur habet. Verum & vasorum distantia novæ sanguinis per læsa vasa eruptioni, & nimis violenta, ac nimis sæpe repetita Crassæ meningis compressio hujus inflammationis præbere causam potest. Utrumlibet autem horum minime facere ad ægrum servandum, vides. Est præterea sanguis interdum fluxilis, & qui per illud foramen possit elabi; sed ea copia, ut priusquam educatur, cerebrum adeo presserit, ut ex ea pressione homini moriendum sit, cuiusmodi ferme exemplum habes in una etiam ex nostris Epistolis Anatomis (a). Huc adde, potuisse corruptione sua jam lethale vitium meningibus attollisse. Insuper quæ de sanguine dixi, omnia de pure quoque, sive mavis de sanie, & ichore dicta putato.

Quid vero? si nihil horum sit, concussio autem cerebri tanta fuerit, ut intimam ipsius structuram maxime vitaverit. Relege, quæso, Observationem stulti, ob allisum vehementer caput extincti, quam Epistola ad te VIII. (b) descripsimus, & cum ea confer dammati, quam ex Littorio tunc adnotavimus (c), & ad quam superioribus Litteris (d) commemoratam, aliam ex Hamelio addidimus. In nemine illorum trium sanguis erat effusus; duo tamen primi illico, tertius intra duodecim horas ab ea allisione interierat. Fac, ex illis aliquem diculam, ut si paulo minor fuisset concussio, vivere potuisset; cranium autem attonito quasi exinter-na sanguinis effusione, esse perforatum. Num exire sanguis potuisset, qui effusus non erat? Spectant huc etiam illa Ballonii (e): aliquando illa crania, leviter contusa carne, cerebrum intus esse concussum; & paulo inferius, experientia observatum est, innumeros a morbis cerebri post convulsiones & concussiones interisse, quorum in cerebro per anatomen nil videre contigit quod terrifici symptomatis causa existeret. Et id plerisque sefellit ratos se aliquid ægriore repere posse in cerebro laborantium extinctorum. Adeo occulta sæpe causa convulsionis! Est contra cum in cerebro est magna & conspicua læsio, aut intra calvariam multum sanguinis effusi: nec tamen, ea perforata quidquam ex cerebro educi potest, aut sanguis ex ea inutiliter educitur. Vide primi casus exemplum in Observatione Eliæ Camerarii (f), qui frustra terebratum cranium narrat propterea quia scilicet capitis purgatio consecuta intra cerebrum latebat, exterius undique integrum. Alterius autem casus exempla elicere ex Observationibus eorum potes qui sanguifera vasa, arteriaque in primis, disrupta intra percussam calvariam prehenderunt. Satis est Bohnium (g) inspicias, qui ter vidit. Fac, arterias aut non esse ex grandioribus, aut non prorsus ruptas; neque enim temporis satis esset, ut de terebra cogitaretur. Quid tamen prodesset cranium perforare ad effusum sanguinem educendum, si novus utque & usque ex quantumvis minoribus, nec omni ex parte ruptis arteriis eodem effunderetur? Mitto causas alias, etiam quæ non tam Chirurgorum, quam ægotantium, aut assidentium, incuriæ, erratiæ, non semper in vulgus notis, fuissent imputandæ, & ad eam venio, ob quam sæpius, quam ob cæteras, accidisse puto, ut calvaria terebratio inutilis populo videretur.

14. Nam ut signa sint ex quibus liceat suspicari, sanguinem intra calvariam esse effusum; quis seire pro certo possit, an revera, & si hoc etiam sciret, quam in partem effusus sit, & quod consequitur, ubi sit os perterebrandum? Nemo sæpe adest cum homo cadit ex alto, aut cum ab inimico percussus, ipse autem loqui sæpe non potest: & ista loca modo plura apparent, modo etiam nulla, in quibus oculorum, manuumve iudicio etiam post imposita emollientia emplastra, & resolventes sacculos, rubor aliquis, tumor, aut mollities percipiatur. Quin aliquando in ea capitis sede quæ percussa non fuerat, ultro apparere tumorem, Rouhaulsius (h) vidit, & quæ id ratione fieri possit, indicavit. Neque alia quæ Antiqui, aut Recentes proposuerunt, indicia satis profunt, ut si vel ille qui loqui non potest, nec intelligere, manum subinde ad certam capitis sedem admoveat, vel Medici alterum forte corporis lateris resolutum animadvertentes, in opposito capitis latere noxam esse, coniciant. Nam præter unum qui

qui majorem fortasse exterius dolorem moveat, alia esse possunt loca sub quibus majus revera lateat internum vitium: neque hoc resolutio aliqua semper consequatur, necesse est; aut si consequitur, non propterea tamen ut affectum capitis latus, sic lateris partem noscimus in qua potissimum vitium sit. Hanc autem ipsam cognoscere necesse esset, ut aperiendum foramen ipsi responderet, nec frustra apertum esse, omnes intelligerent. Verum in cognoscenda quam fallaces sæpe sint conjecturæ, vel hinc apparet, quod et si pars ipsa ista ab ægro indicetur, imo ecchymosi, & tumore se ipsam præclare indicet; non raro tamen casus incidunt in quibus alia sit pars contusa, alia in quam effusio facta sit. Quod cum ex quibusdam superiore Epistola descriptis Observationibus, aliisque intellexeris; tum præsertim ex hac cognoscas, quam continuo subicis, Mediæ nostræ historia, eo digniore quæ hic scribatur, quod in ea terebratum cranium est.

15. JUVENIS ægestis robustus ex alto cadens, caput alliserat. Nullum omnino consecutum aut tunc, aut proximis diebus symptoma est. Itaque triduum perrexit, sicut ante, vivere, & rure eadem facere quæ solebat. Postea in eo qui contusus fuerat, loco, is erat ad alterius ossis sincipitis illam partem quæ Lambdoidi futura propior est; tumor manifestus, & addita febris ut in Nosocomium veniret, impulerunt. Ex arte a Medico, Chirurgoque curatus, jam esse videbatur propemodum sanus, præsertim cum toto eo tempore peculiare lateris mali indicium se ostendisset nullum. Circa diem a lapsu decimum septimum, cum famem diutius ferre non posset, plurimum comedere ausus est. Mox febris rediit urgentior, cum dolore caput universum gravante, & vomitu. Ne tum quidem in quo clam omnibus deliquisset, est fassus. Cum remedia cætera frustra essent; mentio injecta est auxilii quod omnes hic renuunt, ipse autem minime formidavit. Igitur quæ caput contabatur fuisse allisum, ibi ab strenuo spectatore Chirurgo os, nihil prorsus vitii ostendens, ea diligentia atque arte perforatum est, ut nocere id non posset, si non juvaret. Nihil tunc, aut postea exivit. Dura meninx sanissima & conspecta, & servata est. Intereaque æger aliquanto melius se habere videbatur: nec quæ in te antea peccasset, amplius occultebat; cum repente pleuritide ad imam sinistram thoracis partem gravissima correptus est, nullisque proficientibus auxiliis, intra paucos dies interit, cum materiam sanguine etiam nonnihil tinctam, sed non multam, rejecisset, neque ullum præter ea quæ dicta sunt, accessisset laborantis capitis indicium.

CADAVER, cuius ex ore sedita exivit materia, infra jugulum sinistram dumtaxat, ad mediocre spatium, livebat, grave autem adeo olebat, ut vel frigidissima illa tempestate; inierat enim Januarii mensis A. 1742; ferri non posset. Itaque nihil, nisi cranium, quod erat crassissimum, apertum est. Nullum prorsus in eo, aut in iis quæ continebat, vitium fuit, si perpaucam flavam quasi gelatinam excipias, quæ sub Dura meningē ad spatium trium quatuorve digitorum quoque versus extensa reperta est, non sub contuso ubi terebratio instituta fuerat, capitis loco; sed magis ad anteriora.

16. Si historiam hanc cum iis quas superius (i) scripsimus, animadvertentibus conferas, facile causam unde huc Juveni pleuritis sit orta, suspicaberis, perpaucam autem quæ sub Dura meningē inventa est, materiam, reliquias fuisse illius quæ ibi aliquanto majori copia prius extitisset, reliqua in thoracem potissimum, sed & in corpus universum, ut fetor ostendebat, translata. Quod si res ad hunc modum se habuit; optandum erat, ut priusquam inde materia dilaberetur, terebrato cranio fuisset educata. Sed quis seire poterat, cranium non sub contuso loco, sed antierius ubi nullum erat peculiare collectæ materiæ signum, terebrari oportere? Verum fac id divinari potuisset: quare exte, quo tempore cranium fuisset terebrandum? Num ante diem decimum septimum: At nullum erat signum effusi humoris. Num postquam signa aliqua se obtuleret? Et si Chirurgus exercitissimus Carcanus (k) diserte inculcaverit, prævis apparentibus symptomatibus, non primis diebus, sed temporis successu, cum tunc ea ex jam facta, vel que fieri incipit, corruptione provenire soleant, de salute infirmi varissime esse sperandum, imo de eo fere semper actum esse; tamen ægotanti, raro hic exemplo anceps hoc remedium malenti, quam nullum, deesse noluerunt; quando ipse Carcanus aliquem servari posse, non negavit, imo nec Falloppii Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

testimonium reticuit, unum ab se circa trigessimum, vel quadragessimum diem perforato cranio, & sanie educata, conservatum esse, affirmantis, non facilem se ad credendum præbente Carcano, sed multo difficiliorem præbituro, si raræ aliæ, sed non minus certæ, hujus generis Observationes prodissent, Sculteti in primis (l) qui post vigessimam octavam a læsione septimanam idem quod Falloppius, se præstitisse, nominato homine, indicatque loco, & tempore, confirmavit. Factum est igitur in hoc Juvene quod fieri potuit. Sed illa ob quam historiam hanc proposui, causa obstitit, ne felix eventus responderet.

17. At utinam una hæc esset historia, nec plures apud alios extarent, hujus non dissimiles. Quæ, & tot insuper, aliæ ob alias causas, inutilem pariter, neque ita raro, usum terebræ ostendentes, fecerunt, ut non solum inter veteres, sed inter recentiores etiam, Medici non ignobiles fuerint, qui illam frustra sæpe, imo sapissime frustraneam esse scripserunt. Verum teruerunt magis qui & olim non modicum ab ea periculum, aut certius esse periculum, & nostro quoque tempore non absque gravi periculo exareri posse terebrationem, asseverarunt. Num vero, inquis, tunc etiam cum ab excellenti Chirurgo exercetur? Certe qui ad Ptolemæum illum Egypti Regem in capite graviter vulneratum, de quo in T. Livii Epitome (m) fit mentio, accessit sunt, non vulgares Medicos fuisse, credibile est. Rex tamen inter curationem, dum ossa Medici terebrare contendunt, expiravit. Quis vero quam præstans Medicus, & Chirurgus Falloppius fuerit, ignorat? Ipse tamen ea simplici erroris confessione quæ summis Viris digna est, ob rem quandam fero ab se in terebrando cranio animadvertam diserte hæc scripsit (n): animadvertatis, quæso: ego fui in causa mortis centum hominum, ignorans causam hanc. Quæ modo dicta sunt, cum essent tot libris tot Scriptorum neque unius temporis, neque unius regionis, mandata, latere omnia non potuerunt, nec possunt. Itaque mirari non oportet, quod inutilibus præsertim, aut noxiis experimentis subinde adjectis renuere coeperint hoc auxilium nostrates, neque in una modo, aut altera Civitate, sed in Italia plerisque, & præter nostrates alii quoque, inter quos tunc etiam cum apud nos illud vigeret, fuisse, indicat Wepterus (o), populares suos, his verbis. Itali, alique locorum calidiorum incolæ protinus trepanum arripendum statuerunt, idemque Exc. D. D. Burgoveneris facturus erat, nisi eger, & adstantes ab auxilio his in locis insulato, & vel solo nomine plerisque terrifico abhorruissent, ipsiusque conatibus obstitissent. Num postea animos addidisse renuentibus, credis gravem apud Lipsienfes Professore Joannem Bohnium Dissertatione edita de Trepanationis difficultatibus? quas antequam singillatim exponat, hand dubitat affirmare, multum sane eandem periculi involvere, aut sæpe frustraneam seu incongruam deprehendi. Earum difficultatum pleraque cum supra satis memoraverim; de illa una potius aliquid addam quæ ex novissime producta Observatione deducebatur, nimirum de ea quæ in tempore definiendo, adhibendæ terebræ opportuno, per sæpe occurrit, difficultate. Quam juvat altero confirmare exemplo, hæc in Civitate a me vivo. Juvenis erat mulier, haud infimo loco nata, gracilis, non robusta, sana tamen, ut quæ nihil nisi convulsiones gravissimas quidem, at semel, annis superioribus toto corpore passa fuerat. Cum bene igitur valeret, federetque humiliori sella, forte accidit, ut improvisa re, & strepitu percussa, caput, ut sit, retrorsum ageret, & ad mammoreum mutulum, qui pone ipsam e pariete prominebat, alterum occipitis latus vehementer allideret. Dies erat Martii penultima A. 1739. Neque tunc, neque primis illis diebus incommodi quidquam sensit. Deinde in loco isto doloris aliquid: cui succcessit in subiecto cervicis latere, nonnihil tumente, quidam musculorum qui ibi sunt, quasi rigor, nec sine dolore. Levia tamen adeo hæc erant omnia, ut mulier quæcumque antea consueverat, domi, forsique perageret. Quis ausus esset cranii perforationem tunc imperare? aut, si forte ausus esset; putasse, cæteros permissores, aut delicatam mulierem fuisse passuram? Nunc reliqua accipe. Cum ad Augustum usque mensē ita uti dixi, se mulier egisset, quippe quæ præter id quod memoratum est, nihil ferme aliud sentiret incommodi; ad illam accersor ejusdem mensis decima sexta. His quæ retuli, ab ejus Medico narratis, addentem audio, a diebus jam aliquot mulierem febricitare, nec leviter, durisque pulsibus, subumidos, rigidos, & dolore

(1) in Coac. juxta Durei interpret. 1. 3. tr. 2. c. 1. n. 1. (u) Syllog. cit. in addit. ad Obs. 15. (x) Epist. 8. n. 3. (y) Quæst. Paris. A. 1736. proposita n. 5. (z) Obs. Anat. 2. 3. in fin. (a) XIII. n. 16. (b) n. 15. (c) n. 18. (d) n. 10. (e) 1. de Convulsionibus. (f) Act. N. C. Tom. 2. Obs. 149. (g) De Remunc. Vult. S. 2. c. 1. (h) Traité des playes de tête ch. 19.

(i) n. 9. & 10. (k) De Vult. Cap. Serm. 3. Lect. 5. (l) Obs. 13. (m) l. 52. (n) Comment. supra ad n. 12. cit. n. 17. (o) Historiar. Apopl. Auctar. in Schol. ad Hist. 6.

lore affectos esse illos cervicis musculos, dolores etiam secundum Spinam dorsum descendere, maxillam inferiorem a superiore non sine difficultate diduci: agram propemodum esse stupidam, lenteque respondere; quin aliquando leviter delirasse; non satis bene vidisse; oculos quasi convulsos visos esse. Sed hæc ultima tunc abesse; cætera ab aliquot jam diebus superesse. Insuper dolorem his diebus ad locum olim percussum rediisse; quamvis tactus, visusque iudicio nihil ibi appareat mali. Nimis vera retulisse, sensi, cum mox agram vidi, nullique jam esse remedio locum, perpexi. Itaque levibus nonnullis in quæ cadere calumnia non posset, consuetudinis dumtaxat causa, propolitis, cum seniori ex affinis dixissem, quam vehementer ægra mihi displiceret, non rediturus, discessi. Reapse duabus illa, aut tribus post horis loqui desisti, & intra duos trefve dies mortua est. Cujus si calvaria interiora examinare licuisset; non dubito, quin, ut Marchettus noster (p) pus supra membranas, & cerebrum in eo deprehendit qui leviter capite vulneratus ut ne os quidem esset detectum, tribus post mensibus febre correptus, ex eaque dolore in istum locum redeunte in quo nihil apparebat mali, mortem obierat, tanto ego magis in hac deprehenderem, quæ non, ut ille, sine ullo vulneris capitis symptomate & in febre, & ante illam, fuisset, sed & quibusdam mensibus jam quatuor, & quod excurreret, tot autem ex quo febris corripuerat, esset vexata. Satis jam, superque intelligit, casus incidere in quibus aut nulla, aut tam levia, inter initia, se offerunt effusi intra cranium sanguinis signa, tot autem, & tam gravia post longum intervallum conferunt ingruant, ut neque primo illo opportuno tempore æger eo timore percilli possit, ut terebram admittat, neque extremo sperare possint Medici, opem se per eam allaturos, cum tam longo spatio, & tam pernicioso indicio extantibus, non illa partium corruptio abesse credenda sit quæ in rarissima ea Sculteti Observatione (g) mirifice abluat.

18. Sed quid, inquis, capite sauciato, aut eorum confanguineo, & cæteros quorum interest, adeo ab hoc auxilio averfos facit tunc quoque cum gravia statim non desunt symptomata? Relege omnia quæ supra (r) sunt scripta de causis propter quas in quibusdam Civitatibus credibile est id remedium fuisse desertum, & ad illas hanc quoque adde quæ ex proxima Mediæviæ historia colligitur.

19. PUERO annos nato ad quatuordecim pertica ictum fuerat alterum sincipitis latus circa medium Quincilem mensis A. 1739. Eodem tempore Seni quoque percussum fuerat caput. Uterque ab ictu ceciderat, vomuerat, & mox febris prehenus erat. Uterque in idem Nosocomium recipitur, & pari tum Medici, tum Chirurgi diligentia curatur. Hactenus similia omnia. Nunc disparem primum Pueri, deinde Senis exitum accipe. Puerum cum febris reliquisset circa diem quartum, undecimo iterum adorta est, torpore semper, nonnumquam delirio stipata, aut convulsionibus, aut sanguinis, cuius jam satis emissum fuerat inter initia, e naribus eruptione. Itaque, nullis proficientibus remediis, intra perpaucos dies interiit. CRANIUM vel præclaraluce opposita inspectum, non modo non fissum, sed nihil fere ostendens discriminis repertum est, si percussam partem cum reliqua comparares. Verum inter percussam partem, Duramque meningem quidpiam mucis simile occurrit, & sub eo meninx illa colore non suo. Inter ipsam vero, & meningem alteram qua totam propemodum hemisphærii illius superiorem faciem convestiebat, pus ex flavo viride, foetens, multum; meningis autem ipsius quantum pure obductum fuerat, tantum erat triplo, aut quadruplo crassius factum, & superficie quasi granosa. Nihil præterea, ne in ventriculis quidem, in quibus aquæ non erat quidquam, est animadversum. Sic Puer. Senex autem omnino incolumis sanique discessit.

20. Nunc si populo dicas: facile poterat ille Puer icto esse perforato, & sanguine qui subitus effusus erat, educto, si admiffum fuisset id auxilium, servari, continuo regeret; at Senex qui iisdem symptomatibus initio pariter correptus fuerat, sine illo auxilio sospes evasit. Non desunt certe quæ hæc dicentibus referas. Sed quid ad populum qui ex felicibus cunctis sine terebra succedentibus gravium capitis ictuum curationibus nova semper argumenta capit ad illam averlandam? Nec apud nos tantum,

sed & alibi, ut opinor; nam alibi quoque exempla sæpe occurrunt ejusmodi curationum. Quæ percusso, aut vulnerato capite, signa essent gravium intra cranium læsionum, quæ terebram postulare viderentur, non pauci tibi ostendent libri, iique in primis qui ad *Commercium Litterarum* (f). Exempla alia ubi querenda sunt, tum Acta indicant Erudit. Lips. (i), tum Jo. Andr. Conradi Dissertatio (u), & alii quos brevitatibus gratia sciens omitto, non secus ac Grimmii (x) Observationem, & Burgouveri (y) duas, quarum altera illa est in qua, nisi obstitissent assidentes, cranium ipse erat terebraturus, ut Chirurgus etiam ille de quo meminit Roubaulcius (z), nisi Meryus dissensisset, Ægri tamen omnes quos indicavimus, sine terebræ ope, nonnulli etiam cito, sunt perfunati. Ut vero plane intelligas, quam veraciter dixerimus, hujusmodi curationibus fieri, ut magis magisque homines terebrationem averfentur, narra- bo tibi quod hic accidit A. 1729. Cum ferocientes quos habenis coercere auriga non posset; e rheda concitissimo cursu raptâ, se ejecit Matrona generosissima, eique idem quod fere cæteris qui idem faciunt, contigit, ut præceps in humum rueret, eamque, ut locus, & anni tempus ferebant, lapidibus, & durissima glacie contestam. Itaque caput vehementer adeo offensus, ut quasi pro mortua domum referretur. Medici cum omnia quæ agi debent, ac solent, diligenter peregrissent, sperabant, quod Marchettus, ut superiore quoque Epistola (a) dictum est, in aliquibus viderat ex prolapsu, aut ictu læso capite in mentis alienationem cum privatione sensus, & motus incidentibus, neque aliis tamen symptomatibus correptos quæ ab Hippocrate memorantur, se pariter sequenti die mulierem omnino liberatam esse visuros. Sed cum ea spes ipsos falleret, ad ægram accerfor. Cujus neque caput quidquam ostendebat signi quæ potissimum parte fuisset allisum, neque sensus, aut vox, quæ nulla erant, nobis id poterant significare. Auctor igitur fui, ut quando cætera peracta erant, quæ ad revellendum, reforescendumque pertinerent, siquid forte sanguinis intra calvariam effusum esset; univervo capiti æ proptinus adhiberentur quæ moderate attenuando, corroborandoque absorptionem illam adjuvarent. Vel ubi fissum manifesto cranium esset, Cornelium Celsum (b) exterioribus remediis multum tribuisse. Quid postea Galenus, pluresque alii olim fecissent, ex Magato (c) intelligi posse, qui ipse quoque inde curationem incepisset. Quid Magato recentiores sentirent, me vel ex ea in qua sæpius versarer, meorum Anatomicorum lætione didicisse, & nominatim Bartholini (d), Wepferi (e), Ruyschii (f). Nos quidem in Italia esse, regione multo quam illorum calidior; sed & Magatum; ut alios omitterem; in hac fuisse: & eo anni tempore magis, quam sæpius aliis apud illos, his frigus urgere, itaque nostram quoque Matronam haud secus ac Ruyschii mulierem, inde læsam esse quod e curru in terram cecidisset gelu induratum. Igitur me quidem eodem illo fomento usurum, quo is non raro usus esset felicissime, neque alieno a cautis Magati monitis, & quadam eorum habente quæ ipse laudaverat. Itum est a Medicis in hanc sententiam: nec ivisse pœnituit, cum ejus remediis continuato usu ægra primum meliuscula facta sit, deinde ad se redierit, & nullo demum superfluo incommodo, sic evaserit, ut donec senectute ipsa confecta est, annos amplius viginti incolumis vixerit. Sed felix hic eventus eo magis homines a crani perforatione averfos reddidit, fomentumque illud ipsum ex eo tempore cum a Medicis laudatum, atque a Chirurgis, tum ab ægris præsertim, aut a consanguineis optatum, frequentissimo in usu hic fuit; ut veritus sim aliquando, ne temere usurpatum, alicui tantum noceret, quantum aliis profuerat. Nam fervidissima apud nos æstas adhibuit etiam videnti, velut in eo casu quem res hæc ad memoriam redigit, nec propter hanc tantum, sed & propter alias quædam animadversiones paucis tibi memorabo.

21. Generosus Comes cum forte non humili scabello insisteret, hoc vacillante retrorsum ceciderat, & ad parietem occiput tanto vehementius alliserat, quod hoc calvarium, ipse autem procerâ statuta est. Nihil tum mali, nisi quod multa scintilla oculis observari vise sunt. Postea vero ad frontem, & ad oculos dolor molestissimus, vigilæ, febris, alvi fluxus. Febris abijt. Mox redit cum iisdem symptomatibus. In consilium vocor. Erant quibus

quibus alvi fluxus potissimum displiceret. Hæc enim legerant apud Marchettum (g): præter signa ab Hippocrate proposita, observandum esse, quod semper alvi fluxus vulneribus capitis accidens, absque aliis aliis symptomatibus, cerebri læsi signum est. Hos vero fere omnes mori, ob læsum cerebrum parte interna, qua in spinalem medullam exporrigitur, ubi nervorum ortus, & in his ventriculo propicientium. Ego vero cum diligenter omnia exquisivissem, atque ut erat mensis Quincilis A. 1739. aquæ; ea enim pro potu præscripta fuerat; plus facile summi intelligerem, quam senis ventriculus ferre posset; omittam, inquam, disquirere, num Marchettus cum symptomata alia abesse, dixit, ea quoque excipere voluerit quæ ab Hippocrate, ait, fuisse proposita, & quæ certe hinc abfunt. Hoc tantum dicam, si æger cibis ac potionibus, præsertim incongruis, referto ventriculo, cecidisset, continuoque illa rejecisset, profecto ea vomitione terrestris non oporere. Nunc igitur quoque, cum alia esse videatur causa cur laxata alvus sit, non est cur id nobis metum incutiat. Paulo minus aqua potetur, eaque nonnulli ita medicata sit, ut laxare nequeat stomachum. Fomentum vero, nam hoc uti audiveram; tempestate hac non dubito & dilutus aliquanto, & moderatius, & pannis nec laneis, nec adeo multiplicibus exceptum a vobis adhiberi. Neque ita multo post, omnia recesserunt symptomata, ægerque convaleuit, vivitque, hæc me scribente, vegetus, quamvis annos natus sex & octoginta. Sed priusquam de fomento illo verba facere desinamus, animadvertas, velim, si non per ipsum, ad certe per valde similia servatos esse fere omnes quos sine terebra, quæ alioquin necessaria videbatur, perfunatos esse, diximus (h), aliosque ejusdemmodi, ut puta quos Slevogius (i) his verbis indicat: talibus remediis hodie a nostris Chirurgis in dies gravissima capitis læsiones corriguntur, quæ olim sectionibus, usionibus, scalpulis, terebrationibus, aliisque horribilibus operationibus opus habebant: & iis remediis interdum solis, ut a Gallo Chirurgo Pinconio (k) sanatus est Rusticus sine voce per decem decumbens dies, & pro desperato habitus, a Grimmio (l) Adolefens, delirio, vomitu, febre, &c. correptus, a Trewoo (m) Puer omnibus sensibus privatus, latere ictui opposito paralyticus, altero perperis convulsivis motibus agitur. Sæpius tamen alia adjuncta sunt auxilia, & in his, cum licuit, antequam ulla adhiberentur, venæ sectiones, ut vena, sanguinis quantitate aliqua detracta, quasi famelicæ redantur, ut Wepferus (n) loquitur, & avidius effusum sanguinem resorbant, quem ea quæ diximus, exterius adhibita, & illuc unde terebratio sæpe educere non potest, sua vi (quicunque modus, & via sit) certe pervadentia, ita disponant, ut vasa sanguifera denuo valeat subintrare. Sic enim & aliorum, & suas explicat Observationes; nam & supra (o) effusi intra calvariam sanguinis per fomen- ta illa congrua dissipationem frequentissime suis in oris feliciter citra typhum usupationem, citra ullam ægri noxam, præstitam, ait, se meminisse. De ista autem reformatione cum alias (p) ea ad te scripserimus observata in cerebro post prægressas olim apoplexias, imo etiam post antiquum, imperforato crano, capitis vulnus, unde illam agnoscamus esse, credamus; nihil amplius addemus. Nihil quoque de altero terebrationis usu, ut possint de- pressa calvaria ossa excitari, pungentia fragmina extrahi, internæ quæ forte fissæ sit, laminæ extantes quasi a- culi excidi, qui quandiu, & quantum nocere possint, præclara inter cæteras Platneri (q) per anatomen Observatio ostendit; nihil, inquam, huc adjicere melius censeo, ne si forte huic etiam alteri utilitati, quam certe remedia alia, & natura ipsa præstare minus valent, aliquid interdum obijci posse, dicerem; viderer magis vulgi timori, quam rationis, & Sapientum dictatis, indulgere.

22. Nunc enim quando de terebranda calvaria tantum supra scriptum est, quantum non modo ad susceptum sermonem absolvendum satis sit, verum etiam; quod molim; ad falsam injustamque suspicionem movendam, me forte cum populo in hoc facere, ab eoque auxilii genere, quod caute, & opportune adhibuit, ultro fa- teor esse utilissimum, atque adeo necessarium, præter modum abhorre: ad dissectiones redeamus. Ex quibus cum duæ Mediæviæ nostri superint; ante meas cæte- ras, illas adscribam. Prima ad eas attinet quæ hæc- nus sunt propositæ, videlicet in quibus crani siquid erat vitium, ad interiora non perveniebat. Altera autem ad eas in quibus pervenerat.

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

(g) in addit. ad Obs. 15. (h) n. 20. (i) Dissert. de Carie Cran. §. 20. (k) Vid. Dan. Hoffmann. Dissert. de sanat. cerebri quæd. (l) Obs. 87. supra ad n. 20. cit. (m) Commer. Litter. A. 1741. ibid. cit. (n) Schol. supra ad n. 17. cit. (o) Exercit. supra ad n. 20. cit. (p) Epist. 2. n. 16. (q) Instit. Chirurg. §. 532. not. d. (r) n. 17. (s) Commer. Litter. A. 1731. Specim. 21. (t) De Renunc. Vuln. Sect. 1. (u) Tr. supra ad n. 14. cit. e. 11. (v) Hili de l' A. 1700. Obs. Anat. 19. & de l' A. 1743. Obs. Anat. 12. (x) §. 8. Obs. 10.

23. VIR quidam in faciem cadens, frontem a dextris circa altitudinis ejus medium alidit. Non vomitus, neque aliud ullum symptoma statim a casu accidit, nisi levis quædam stomachi perturbatio. Mox autem non levi febre, & sopore corripitur. Circa diem quartum, utrumque horum definit. Bene habet. In Nosocomio tamen remanet ad vulneris curationem: quod probo colore cum recto offe erat. Circa diem decimum septimum gravis revertitur febris, gravisque sopor. Fuscus fit vulneris color, & ossis. Hoc raditur, subfusque album invenitur. Homo tamen cum iisdem, haud aliis, symptomatibus moritur circa diem vigesimum, qui fuit pri- die Idus Aprilis A. 1740. CALVARIA dissecta, rima quidem in hac animadversa est quæ paulo supra sub- jectum vulneri supercilium in transversum pene ferebatur. Sed hæc ad interiora non perveniebat. Verum quæ os al- lissum fuerat, ibi inter ipsum, Duramque meningem pau- xillum intercedebat cujusdam quasi gelatine. Cerebri au- tem respondens hemisphærium non ibi tantum, sed ubi- que gravi cum odore ex atro virebat: qui color ad i- psum usque Lateralem ventriculum descendebat, parietes ejus omnes inficiens, basi excepta. Porro ejus ventriculi pars anterior non lacerata quidem erat, sed adeo dila- tata, ut concreti sanguinis tantum contineret, quantum posset pugnum aquare. Ventriculi pars reliqua, ut si- nister quoque, serum cruentum continebat.

24. Deprehensus intra ventriculum sanguis certe effu- sus est ex difrupto vase aliquo five Choroidis plexus, five eorum quæ per parietem ventriculi superficiem feruntur. Sed vas illud num leviter difruptum credemus tunc quan- do allissum est caput, & ab eo tempore sanguinem lente ac paulatim emittere cœpisse? an vero tunc infirmatum dumtaxat, gangrana denique illius hemisphærii acceden- te perruptum, celeriter effudisse? Si hoc alterum mavis; minus facile, opinor, explicabis, cur non fit homo tunc celerius, cum aliisque symptomatibus ferme apoplectici instar mortuus, & quomodo sine ulla substantiæ lace- ratione, ventriculus adeo fuerit dilatatus, ut veri simi- lius sit, sanguini sensim ad illam usque copiam destillan- ti sensim quoque paulatimque cessasse. Nec te illud more- tur, quod homo a quarto ad decimum septimum usque diem sine febre, ulloque symptomate, bene habere vi- sus sit. Nam & ad gangranam tam late diffusam, pra- vam in cerebro dispositionem præcessisse, credibile est, & in vitis ejus vel gravissimis haud ita raro accidit, ut aut levia quædam, aut nulla vel ad multo longius tem- pus animadverterentur eorum indicia. Fac, memineris eo- rum quæ supra (r) ex nostra, aut certe ex Marchetti Ob- servatione scripta sunt. Lege non tam Fantoni patris Ob- servationem IX. quam Cl. Filii Scholium ad XXXV. At- que ut illam Avenionensem (s) omittam longe rarissi- mam, quippe in qua cum crani, meningum, cerebri ea esset læsio quam ostendit curatio, nullum tamen ab initio ad perfectam usque sanationem, id est ad dies sex & septua- ginta, symptoma extitit; est apud Bohnum (t) historia, ex Lamzwerdio, symptomatum binis sincipitis fissuris non nisi die trigesimo sexto supervenientium, suntque aliæ ex Montano apud Rouhaulcium (u) eorumdem non nisi decimo septimo, vigesimo, aut vigesimo primo Antuer- piæ plerisque illorum quibus eo anno caput ictum esset, aggreddientium, omnesque occidentium. Illas insuper le- gito quas Poupartius, & præsertim Vacherius cum Regia Scientiarum Parisiensis Academia (x) communicarunt. Ex his, atque aliis quas sciens omitto, mirari defines siquan- do, ut in modo a nobis proposita, sic in aliis quibus- dam aut hac, aut superiore Epistola traditis, non levia videbis in cerebro vitia dies aliquot sine pravis indicis, in primisque sine febris delituisse. Quamplurima sunt quæ in illo, non tantum secundum naturam, sed & præ- ter naturam se habente, quemadmodum fieri possint, mi- nime assequimur. Hæc Majores quoque jure meritoque fuisse miratos, vel ex iis intelliges quæ in Sectione hac Sepulchreti ad Salmuthi Observationem (y), huc maxi- me pertinentem, adscribuntur ex Berengario, seu ma- vis ex Carpeni, ut a Patria sæpius vocitant: quæ res non animadversa fucum fecit recentiori, haud inerudito alio- quin, Chirurgo, qui cum Berengario, dixisset, cra- nium in futuris ipsis feliciter aliquando perforasse, con- tinuo, quasi de alio loqueretur, idem pariter, ait, fecisse Carpensem. Sed a tarda post ictum morte ad citissimam, ut in altera, quam promissimus, Observatione, veniamus.

25. MULIER rustica, per scalas præceps ruens, caput adeo graviter offensus, ut illico loquendi, sentiendi, & artus,

præsertim inferiores, movendi facultate amissa, sanguinem e naribus, & altera aure effundens, intra horam moriatur. CRANII, quod multum sanguinis effusi continebat, fracta erat basis in transversum, fractura ab uno ad alterum latus ante ossa Petrosa per Sinuum Sphenoidæorum posteriora transeunte, & ossa præterea parte Meatus Auditorii cum Membrana Tympani in aure illa quæ emiserat sanguinem, disrumpit. Laterales quoque rupti erant Sinus Crassæ meningis; & præter alias, cerebellum ipsum nonnihil læsum.

26. Si præter hanc cerebelli qualemunque læsionem, aliæ non fuissent gravissimæ, ut vehemens cerebri confusio, huiusque, & cerebelli tanta compressio, quantum copia effusi cranii sanguinis ex ruptis Lateralibus præsertim Sinibus efficebat; num censet, tam citam futuram fuisse mortem? Equidem non facile ipse crediderim; quamquam cerebelli non leves, & repentinas læsiones longe citius, & certius sciam, quam pares cerebri læsiones plerumque occidere consuevisse, perfectior saltem, ut vocant, & adulta, & ad hominis, quem hic spectamus, structuram propius accedentia animalia. Itaque in hac controversia in quam forte incidimus, & in qua memini te alias de me quævisse quid sentiam, noli cum Doctissimis aliquum Viris non modo infesta, sed neque aves, aut foetus, aut recens nata animalia commemorare. Ipse enim vel olim adnotavit Aristoteles (z), palam in infectis, ut vespis, & apibus hoc accidere, nempe ut ablata ea particula quæ vocatur caput, ... vivant. Dju autem est ex quo mihi adolescentulo affirmabat Valsalva, avibus se cerebellum summo opere vexavisse, neque eas tamen esse confestim mortuas. Quin ipse quid viderim in felibus duobus, ante biduum natis, cum viventium capita inciderem æstivo tempore, narrare possum. Recte enim, in utroque, cerebri altero hemisphærio, & Tenuis meningis utilitate animadversa in cerebro coercendo; nam qua forte aliqua lacerata erat ejus meningis particula, illac particula cerebri se extrudebat, prominensque perstabat; afflatis illud totum hemisphærium ademi, neque propterea movendi, neque sentiendi facultas in respondentibus, aut in oppositis artibus imminui, nedum perire, visa est. Nec vero perit, cum mox alterius felis cerebellum vulnerasset. Perit autem statim ac alterius cerebellum, & initium forte Spinalis medullæ alte incidi, ac dilaceravi; perit, inquam, in artubus, & toto corpore, quantum mihi ante oculos tunc erat; si cor tamen, auriculæque ejus excipias; harum enim, illiusque motus vegeti perstiterunt. Imo cum aliquanto post tempore caput a trunco abscididisset, sic nihilominus, ut si non abscididisset, perstabat. Mox igitur amputatis vasis Magnis, cum ipsis cor abscidit; quod tunc denique cito conquevit; et si mox inter digitos compressam, valido etiam tum nifu conari, fen. si. Vera igitur ab his dici, scio, qui seles potissimum diutius resistere in anatomicis experimentis, scripserunt. Simul tamen etiam intelligi, si quæ in hoc animantium genere, præsertim recens natorum, animadvertimus, multoque magis quæ in avibus, infectisque, & humanis ipsis foetibus, puta qui non modo sine cerebro, & cerebello, sed & sine Oblongata, & Spinali medulla aliquando nascuntur, si hæc, inquam, solum attendamus; fore intelligi, ut multa adversus harum medullarum, & cerebri, nedum adversus cerebelli usum, consequi posse videantur. Nolim quoque hic plurimum tribuas quibusdam cerebelli vitis quæ longiori, aut minus longo quidem tempore, sed certe non repente fiunt. Prioris generis hæc sunt. Ex Maucharto (a), itemque ex Littrio (b) in duobus hydrocephalis pueris cerebellum aut induratum, aut scirrhosum sic tamen, ut in hoc bina, quamvis exigua, superessent loca in quibus cerebellum secundum naturam se habebat, in illo autem lobus alter, ut minus grandis, ita minus quoque esset durus: ex Brissæo (c) durus quoque tumor, sed in medio cerebello enatus; ex Cl. Lieutaudio (d) os non parvum intra alterum ejus lobum: ex Peyronio (e) totum cerebellum in membranam conversum, quæ corpus gallinæ ovi magnitudine involvebat, ex glandulis pluribus, durisque compactum, quod potius in corpus, ut de cerebro olim accidisse videtur, quam in illam membranam, cerebellum esse mutatum, & sub ejus larva delituisse, aliqui fortasse suspicabuntur, non fecus ac quædam cerebelli ipsius partes in quibus deprehendit Harderus (f) globulos tres parvos; nam major in Spinalis medullæ initio fuit; aut Wurfbainius (g) varia corpuscula glandulosa,

cerebello quidem flavo, & scerido, sed non putrefacto; aut Flascus apud Lancisium (h); neque enim Lancisius vidit; corpus ex pluribus globulis compactum. Nec vero ad totum pertinuit cerebellum, ut videntur aliqui indicare, alii autem discrete affirmant, is scirrhosus quem in mendica puella invenit Cel. Hallerus, quando hic ipse (i) cerebelli mediam partem, id est lobum finistram occupasse, scribit; ut facile non æquaret quem ego (minus tamen durum, minusque compactum) sub initium A. 1754. in viri cerebello offendi, quippe præter eundem penitus totum lobum, tenentem mediam quoque partem, & proximam lobi dexteri portionem, quemadmodum ex historia, a me alio loco (k) ad te perhibenda cognoscet. Ad alterum autem attinet in cerebello vitiorum genus; si quam Observationem Peyronius (l), inter nonnullas quoque superiorum, protulit, ut alii etiam postea, ex Fan-tono patre, facile seponas, quando Filius Clarissimus (m) pro cerebello corrupto intelligendam existimat cerebellum dumtaxat mollius, nec nativi coloris; attinent, inquam, primum, quæ Massa (n) est, apostematæ in cerebello post vulnus incipit, & deinde altera ab Amico ad nos scripta A. 1735. lobi cerebelli dexteri, quem totum, viridis, & foetida sanies pervaserat, postquam proximum os temporum hic illic carie affecerat, Duramque meningem corroderat: tum huius, si causam species, non dissimilis nostra, ad te alias (o) missa, sed eo dissimilis quod sanies lobum eundem cerebelli superficie tenus, idque ex aliqua tantum parte vitia-verat: quarta denique Cl. Planci (p) abscessus, duas tertias lobi illius partes occupantis. Nemo quidem ex primo, aut ex altero vitii genere morte repentina illico, & cum sanus videretur, sublati est; sed nec vitium repente est factum; iis autem quæ paulatim fiunt, natura corporis quodammodo adjuvat, & quod deficit, aliunde quo ad ejus facere potest, supplet. Cujus rei in nervis ipsis exemplum proferam. Quid enim causæ fuisse, putas, quamobrem cæcis cui dexterior, finistramque Recurrentem Cl. Emmet (q) dissecuerat, vocem, quam illico perdidit, postmodum recuperare, eamque in dies crescentem? Nervus Recurrens tertius, inquit, ut qui pone Asperam arteriam latens, consecari non poterat. At infolitus is nervus certe etiam pridie fuerat: fuerantque ramuli sculi, opinor, alii, a Vagus nervis supra horum sectionem a Valsalva (*) peractam, aut aliunde exorti qui laryngem peterent in catella que, cum frustra antea conaretur, nono demum latrare poruit die. Scilicet sensum, aut ego fallor, spiritus qui per majores illos dissectos nervos ire amplius non poterant, meatus, antea minus patientes, per minores nervos, alius cum majoribus five extra, five etiam intra cerebrum communicantes, eodemque contententes, sic satis sibi dilataverant. Sic satis, inquam; in hominibus enim ad quos hæc transferes, cerebelli vitis paulatim incrementibus affectos, postquam tandem ipsum totum occupaverint, veri simile vix est, cordis, & pulmonum motum semper ita, ut antea, viguisse; quin diserte in quibusdam eorum, ut in Littrii puero, traditum est, debilem respirationem, pulsam autem perquam exiguum fuisse, & in Observatione quam ad me scriptam dixi, languor adnotatus est, in eaque pariter quam ad te misi, ut vires, pulsusque omnino concidissent, videre potes. Multo difficilior esset objectioni satisfacere quam apud gravem quendam Auctorem legisse memini; neque enim quis fuerit, recordari nunc possum, nempe in fure, cujus infirmissima erat memoria, nullum cerebelli vestigium a Benivenio repertum esse nisi Benivenius (r) hæc tantum scripserit, fuisse in eo fure posteriorem capitis partem, ubi memoria sedes est, adeo brevem, ut tantillam cerebri portionem contineret; ut si quis ob antiquam illam de memoria sede credulitatem, de cerebello potius quam de cerebro, accipere id velit, non tamen omnino defuisse cerebellum, agnoscat. Quæ omnia cum ita sint; hæc seponamus, & illuc unde controversia & nata est, & dirimi facilius potest, redeuntes, non leves, easque repentinas cerebelli læsiones cum cerebri non levibus, imo, si vis, etiam gravius, & repentinis læsionibus, quales a vulneribus sunt, comparemus.

27. Cerebri esse quædam vulnera quæ mortem citissimam afferant, non modo non est negandum; sed mirandum est potius, duas, haud amplius, Observationes in hanc rem indicatas esse a quibusdam Eruditissimis Viris, in quarum neutra mors statim secuta est; cum ex tot Auctorum Præ-

stantif-

stantissimorum experimentis contra ignorare nemo possit, cerebello insidita vulnera vitam plerumque aut illico, aut non multo post adimere consuevisse. At enim eadem celeritate non semper adimunt. Nempe factus sum. Sed quoties tandem, & quam tarde hoc acciderit, quæro. Franciscus Antonius Cattus Anatomæ apud Neapolitanos Professor in Opusculo (f) ibidem recuso A. 1557. experimento facile comprobare se posse id scripsit quod sine cerebelli vulnere non videtur præstitisse. Reliquæ cerebri partes omnes, inquit, licet vulnerentur, non tamen statim mors sequitur; at vulnerato posteriori ventriculo, exempla animala concideret, ac interire conspiciamus. Quod si præter cerebellum, quod tamen non undique, ut cerebrum suos, quartum hunc ventriculum tanquam sui proprium, comprehendit, ipsum tamen complet, proximæque operit; suspicari velles, subjectam quoque Oblongatam medullam convulserat; experimenta (z) non deessent ex quibus intelligeres, non propter hanc convulsionem potissimum, mortem subitam sequi debuisset. Optandum esset, ut Coiterus in iis Anatomicis Observationibus quas sexdecim post Cattum annis vulgavit, attigisset aliquid ad cerebellum spectans, quando & ipse, quod ad cerebrum attinet agnoverit, hædorum, & canum vivendum, Recentiores anteverit, hæc scribens: quod summa admiratione dignum existit, brutorum viventium cerebra detexi, vulnerari, & intactis nervis, eorundemque principio, & ventriculis medullis illæsis, eximi, at nullum vel vocis, vel respirationis, vel sensus, vel motus offensionis signum in iis deprehendi. Aves absque cerebro aliquandiu vivunt, ut quilibet in gallinis vel pullis gallinæ, si rostrum superius cum dimidia capitis parte absciderit, cerebrique majorem exemerit partem, experiri potest. Superiori autem, & hoc faculo Experientes Viri ne cerebellum quidem avium eximere omiserunt. Sic Cl. Zimmermannus (u) cum cerebrum, & cerebellum columbæ detraxisset, hæc subito, & omnino perit: quod ut conjicias unde potissimum acciderit; cum alteri columbæ cerebrum ademisset, hæcque ad aliquod tempus viveret tamen, cerebello exempto, subito perit. Verum ne a perfectioribus, ut supra est propositum, animalibus recedamus; cum has Litteras ad te primum misi, unus inter plurimos aut statim, aut non multo post mortuos memorabatur in hac controversia Chiracii canis qui horas viginti quatuor a sumpto experimento superstes fuerat. Nunc autem video, a Cl. Zinnio in ea Differentia contra pericula ab se facta etiam in cerebello propositum (x), canem produci qui eo viscere perforato, horas totidem vixit, imo alterum quoque cui abscissa a Petito parte finistri lobi cerebelli, vita perstitit dies sex. Verum hæc perrara exempla esse, constat, & omnino pauca, si cum tot aliis canum quos statim obiisse novimus, conferantur, aut quos ipse vix post quantum quinquemve minutum, vel per horam fere, ut duos tresve, vel tribus horis, ut unum, vel summum per 12. horas, ut quendam alium, vitam produxisset, ex suis, aliorumque selectis Observationibus fatetur. Quod si graviorum cerebelli vulnere, nec tamen citissime lethali, in hominibus exempla queramus; vix credo fore duobus plura. Alterum ex Petito produxit Peyronius (y) militis qui horas vixit tres & quadraginta. Alterum in Sepulchreto (z) leges ex Binningero, Helvetii qui, nisi forte in numeris describendis error aliquis irrepit, dies superstit videtur amplius quatuor. Aliud famuli ex Borello (a) huc adici non posse, existimo, neque enim video, quomodo ensis per orbitam pervenire possit ad cerebellum, illa interfecta parte cerebri, quod pro cerebello ibi facile legendum puto; is tamen famulus quoqueque ensis adactus fuerit, postmodum mane inventus est mortuus. Cur autem alia, a me pariter animadversa, exempla non esse referenda putem inter vulnera cerebelli graviora, mox ea commemorans, ostendam. Sed militis illius cerebelli finistram lobum certe trajecerat globus plumbeus: In Helvetio autem finistri cerebelli principium nigrum & corruptum apparuit, & ex ipsius substantie intrinsecis, ossis ex conico acutum cranii forte frustulum extractum est, ab eodemque finistro latere artus fuerant resoluti: quod sic in transitu commemoro, quia in Planci quoque Observatione supra (b) indicata artus non oppositos, sed subiectos vitati cerebelli lobo corripuit hemiplexia; ut dubitatio que Cæsalpino (c), & mihi pariter (d) Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

aliquando suborta erat, tolli posse videatur, si perahas plures harum similes Observationes constanter appareat, sedem causæ, hemiplexiam facientis, aliter in cerebello, quam in cerebro plerumque solet, deprehendi. Tunc autem ubi simul cerebrum, & cerebellum vitata essent, credere quis posset, minus illud valere ad paralytium in adverso latere, quam hoc in subiecto, inducendam, si in aliis quoque idem adnotaretur quod ab Forelto (e) in lethargico puero adnotatum est, cujus latus corporis dexterum cum totum esset sine sensu, & motu profusus resolutum; non intra finistram cranii partem, sed intra dexteram abscissus non in cerebro tantum, verum etiam in cerebello deprehensus fuit. Sed ad susceptum sermonem ut redeam; cum pauca adeo exempla sint vitæ post grave insiditum humano cerebello vulnus vel ad breve tempus protractæ; quis ex adverso doctus, & exercitatus Chirurgus est qui innumera non legerit, nec aliqua ipse viderit vulnera cerebri vel gravia, vita longe diutius producta? Et quando hac de re nulla videtur esse posse dubitatio, omnesque fateantur, necesse est, multo citiorem ab illis, quam ab his vulneribus, mortem afferi consuevisse; videamus, num & citiorem. Profecto mortui sunt omnes illi in quibus vitatum, nedum fauciatum, cerebellum commemoravimus. Sed ut in vulneribus substatimus, quot tandem eorum evasisse leguntur quibus non leviter cerebellum fuerit, sed profunde vulneratum? Certe huc non attinere illum, vides, de quo relatum Platnerio (f) est, curatum fuisse postquam non minima occipitis pars cum notabili corticis cerebelli portione ense ablata fuerat. Nec magis attinere videbis Abissinum illum, a Veslingio nostro (g) sanatum. Quamvis enim aliqui, ut nuper animadverti, sic proponant, hominem etate jam gravem, cujus cerebello vulnus, duorum digitorum latitudine fuerat insiditum; si tamen Veslingium attente perlegas, facile intelliges (mitto 50. majorem annis, sed viridem viro senectam fuisse) occipiti quidem latum vulnus insiditum esse, hoc autem utramque meningem pervadens, cerebellum ad duorum digitorum latitudinem strinxisse, id est superficiem ejus rasisse, quomodo Nonius Marcellus (h) illud Virgilii exponens Æneid. lib. 8. (i) Stringentem ripas, ideoque leviter vulnerasse, ut Servius ad alium Virgilii locum (k) Strinxit, inquit, est significatio levis vulneris. Hic autem memineris, Veslingium ab Riolano (l) fuisse notatum, quasi scripserit compta & eleganti oratione, interdum obscura, quæ terminis & vocibus usitatis inter Medicos non est usus. Quod si illud quoque vulnus animadvertissent ex quo Fallopius noster (m) scripsit, cerebelli primo quantitate grani vicia crassioris egressam esse; secundo cum frustula ossa extraxisset ex substantia ejusdem, adhuc aliam particulam crassioris egressam esse; proclive fuisset respondere hoc insuper vulnus illis superioribus adnumerantibus, non modo hominem, cum ea scripta sunt, non perfunctum, sed dumtaxat jam ferme sanum fuisse, verum etiam, idque præcipue, si profundum fuisset vulnus, & si frustula illa ossa, ut in Helvetio de quo paulo ante dictum est, ex cerebelli substantie intimis fuissent extracta; Auctorem postquam de isto vulnere quod ferme jam sanatum censebat, deque aliis cerebri perfunctis scripserat, non sic fuisse suum sermonem statim conclusurum, quare non omnia cerebri vulnera, sed profunda tantum sunt lethalia. Quæ cum ita sint; recte fecisse Joannem Bohonium (n), existimabis, qui cum multa vidisset ipse, & plurima, si quis alius, de vulneribus scripta legisset, hæc tradidit: si experientiam consulamus, vix unum forsitan observare continget, qui ex lacerato cerebello evaserit, cum plura passim obvia sint illorum exempla, quibus satis ingentia quoque cerebri vulnera coaluisse perhibetur. Quorum fanationis Observationes & ipse indicat (o) bene multas, & Donatus (p) quoque, & Schenkus (q) collegerant, quas inter vel quædam sunt vulnerum in cerebri usque ventriculos pervenientium, Augenio (r), imo & Galeno ipso (s) se vidisse, testantibus; ut mirari subeat quod in quodam Sepulchreti Scholio (t) adnotatum est, vero simile esse, miranda quadam vulnera capitis, cum evidenti cerebri læsione, cujus etiam nunc particula vita superstitie dempta sunt, non lethalia fuisse, quod cortice tenus offensum fuerit, illæsa medullari substantia; quam ubi vitium attingit, satis concedendum

R 4

(z) De Juvent. & Senect. c. 1. (a) Eph. N. C. Dec. 3. A. 4. Obs. 59. (b) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1705. Obs. Anat. 13. (c) auct. Platner. Inst. Chir. adnot. ad §. 538. (d) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1727. Obs. Anat. 8. (e) Mem. de la même Acad. A. 1741. (f) Apian. Obs. 78. (g) Eph. N. C. Dec. 2. A. 9. Obs. 237. (h) De nox. Palud. Eff. 1. 2. Epid. 2. c. 6. (i) Ocul. Pathol. Obs. 1. (k) Eph. N. C. Dec. 2. A. 9. Obs. 237. (l) Schol. in Edit. ult. ad cam Obs. que 9. est. (m) I. Introduct. Anat. c. 28. (n) Eph. 14. a. 3. (o) in Append. ad Epist. de Morbis. (p) Tentam. de Cur. Morb. Cephal. n. 30. (q) Eph. Anat. 13. n. 37. (r) De abdu. agnosc. ag. mirand. morb. & causis c. 89.

(f) Inag. Anat. c. 25. in fin. (g) Vid. apud Teubeler Dissert. de Vulnerib. cerebri non semper lethalis. §. 43. & seqq. (h) Dissert. de Irritabil. §. 27. Exp. 7. & 8. (i) in Schol. ad cam Dissert. partem §. 1. (j) Mem. supra ad n. 26. cit. (k) Sect. hac Obs. 8. §. 8. (l) Cent. 2. Obs. 19. (m) n. 26. (n) l. 2. Quæst. Med. 10. in fin. (o) Sect. hac Obs. 13. n. 28. (p) l. 10. Obs. Med. 11. (q) adnot. supra ad n. 26. cit. (r) Eph. Anat. 13. n. 28. (s) l. 10. Obs. Med. 11. (t) Æneid. l. 10. vers. 498. (u) in ipso initio Animadvers. in Syn. Vesling. (v) De Pronet. Scrm. sub litt. S. (i) vers. 63. (w) De Rerum. Vuln. S. 2. c. 1. (x) S. 1. (y) De Med. Hist. Mirab. l. 5. c. 2. (z) Obs. Med. l. 1. ubi de Cerebri Vuln. (r) l. 9. Epist. 2. que esse debet 3. (f) De Ul. Part. l. 8. c. 10. (g) ad §. 8. Obs. 5. hujus Sect.

dum fuit. Si enim lecta fuissent illae Observationes; ex earum non paucis cognitum esset, non modo num vitium ad medullarem substantiam non pervenisset, verum etiam num corticalis dumtaxat substantiae portio, ut in illo apud Platnerum cerebelli vulnere, detracta esset. Sed tu praeter illas, poteris quasdam alias sane mirificas legere apud Martianum (u), ex quo nemo, quod meminerim, adhuc produxit, aliasque item apud Wepferum (x), & Saltzmanum (y); ut alias modo praeteream. Quorum hic tamen non secus ac Bohnius, post tot recensitas ingentium cerebri vulnerum sanationes, cerebelli vulnera diserte excipit (z), ut pote quae semper, & absolve funesta esse, experientia comprobant; Wepferus autem sic illas absolvit, ut cum globuli plumbei trajectionem in uno per cerebrum, in altero per cerebellum, & cerebrum memoret; illum quidem paulo post, hunc vero protinus extinctum narret. Quanto igitur & citius, & certius cerebelli, quam cerebri vulnera soleant esse lethalia, satis a nobis confirmatum est. Nunc ad nostras fissi, fractive cranii Observationes veniamus.

28. VIRGO annorum septemdecim, pallidi coloris, cum amore quocumque veterat pater, forte loquebatur. Interfuit hic de improvviso, atque ut erat truculentus nec omnino sobrius, crasso arrepto fuisse cum brachium, tum praesertim caput filiae cecidit ea vehementia, ut fustis rumpatur. Sic vulnerata, horis post quatuor deferretur in Bononiense Nosocomium S. Mariae de Morte. Interrogantibus non respondet, pulsusque est humilior adeo, ut sanguinem mittere non audeant. Leve brachii vulnus erat, capitis autem & plura, & gravia, in his gravissimum omnium unum, quod & praecipuo dolore afficere videbatur, pone aurem sinistram, ex qua ipsa postea effluebat sanies; qua non multum madebant vulnera. Intra dies circiter quatuor aegra coepit, interrogata, respondere; sed ut plurimum vix pauca, ut puta negans, aut ajens. Interim vehemens, frequensque fit pulsus, & febris animadvertitur quotidie vespertino tempore augescere. Tum menstrua purgatio tempestive accessit; nec ad mortem usque intermisiit; quae per paucos post diebus sensim, & placide secuta est, postquam febris semel dumtaxat, idque triduo ante obitum, levi, brevique cum frigore ingruerat. CADAVER hujus Virginis mihi A. 1704. in genitalium partium examine plurimum versanti, perutile inter alia & virginum, & mulierum fuit ad ea indaganda quae de hymene, de uterinae cervicis valvulis, de menstrui sanguinis fontibus, aliisque ejusdemmodi in I. postea Adversariis proposui. Is sanguis, etsi fluere, ut dixi, ad mortem usque non intermiserat, tamen, ut multo lentius extremo tempore prodibat, in crassi cylindri formam intra vaginam, uterique cervicem non secus ac solet vitreus vas ex incisa vena exceptus, concreverat, osculumque uteri, & cervicem; nisi forte id tribus naturalibus eo tempore illarum partium laxitati, dilatasse videbatur. Neque in ea sanguinea concretionem pars omnino deerat subalba. Sed paucis adnotare praestat quid in fundo uteri, & testibus peculiare animadvertimus. Illius anterior facies sulculis inaequalis erat tribus aut quatuor secundum longitudinem ductis. Testes autem convecti membrana nonnullas parvulas quasi cicatrices ostendebat: quas inter in teste altero quiddam apparuit ulcus sculo simile inaequali, & colore ex flavo nigrescente. Per foramen quod ipsi inerat manifestum, a me tenue specillum demissum, in cellulam non exiguam, sed inanem, descendit. Vesculae autem quae his in testibus non deerant, sero plenae, cum post coctionem dissecarentur, nihil quidquam mihi ostenderunt concreti humoris, sed intra crassiusculam tunicam omnino vacuum sinum. Verum haec postea omnia conspecta sunt. Caput vero, jam antea perfectum, vulnerum omnium cinereum foedumque colorem ostenderat: & dum ejus detraherentur integumenta, feci alii colores, & inter hos niger, apparuerant. Detectum cranium Lambdoidem futuram habuit laxatam; ad eam autem locum in quo pone aurem vulnus gravissimum fuisse, diximus, magnam fracti ossis partem, ab reliquis adeo sejunctam, ut nullo negotio leviter trahentem secuta sit. Circumsecta, & intus, extraque inspecta calvaria fissuras ostendit duas, utramque tabulam pervadentes, quarum longissima ab eo incipiebat loco ubi magna illa fractura fuit. Cui loco respondens inferior pars sinistri cerebri hemisphaerii tanto spatio corrupta erat, quantum occupasset parvum pomum. Caetera sana deprehendimus, si Duram tantummodo meningem excipias, quae levem quandam quasi ecchymosim habebat qua longiori illi fissura subiecta fuerat.

29. Praeter hanc, aliasque fortasse, illam quoque in eodem Nosocomio sectionem habui huc attinentem quae jam satis in Epistolis Anatomicis descripta est (a). Ex qua cum alia quae his, & superioribus Litteris attigi, tum illud praesertim confirmari videbis, esse aliquando effusum sanguinem non ubi icta, & fissura calvaria est, sed intra oppositam ejus partem. Nunc ad aliquot Patavinas dissectiones transeamus, initio ab ea ducto, in qua baculi pariter ictibus fissam calvariam conspeximus.

30. VIR quidam ex Liguria luscus, & mendicus, ebrius cum aliis ebriis mendicis rixatus, ictus ab horum baculis retulit duos, levem quidem in manu altera, gravem autem ad tempus sinistram; ut ex subiecta aure sanguis exierit. Mox tamen conciliata pace, ibidem cum ipsis ad ignem confidet, multoque iterum se vino, quasi reintegrata amicicia pignore, ingurgitat: nec multo post illa eadem nocte moritur. CADAVER posttridie, quamvis extremo Januario A. 1746. etiam tum calebat, cum ante noctem in Gymnasium illatum est. Ubi cum Anatomen docerem, insequentibus diebus perfectum fuit; idoneum enim ad pleraque erat; tametsi ad imam tibiam sinistram erat exulceratum, scrotoque, quasi ab ecchymosi, ex rubro violaceum, ventremque in primis habebat tumidum. Abdomine enim diducto, tumorem a ventriculo esse, compertum est, quem vinum, & aer distendebant adeo, ut magis in alio non meminisset; cum intestina, Tenuia praesertim, essent ferme inania; ut frustra aliqui, ut in homine non multo post tantam vini ingurgitationem mortuo, chyli fura aliqua vascula per intestina, & mesarum se visuros, speraverint: quamvis initio dum plenus etiam tum ventriculi manus sinistrorū attolleretur, plerique imposuit per ipsum exterius pergens, parallelum gastroepiploicis vas, quasi chyli ferum vasculum; quod tamen statim perfectum est aut nervum, aut aliud ejusmodi esse, cum valvularum nullum haberet indicium, dissectumque, & compressum nihil quidquam humoris daret. Ut abdomen, sic mesarum, & omentum, quod sursum retractum ostendimus, flava pinguedine referta erant. Lien ex maximis quos viderim, secundum quamvis dimensionem, sed praesertim secundum latitudinem, & longitudinem, secundum quam erat a facie quidem sima in se complicatus. Intus dilata fuit pallidaque rubedine; at nusquam durus. Nec durum secur, magnum quidem, sed intra naturam modum; ejusque cystis plena bilis valde flavae, Urinae quoque vesica plena, ut ad tres digitos extaret supra ossa pubis. Urethra sine orificiis quae in oculos incurrerent, canaliculorum nostrorum; ana praegressio olim morbo? nam neque e praepitio glans exeri poterat, nisi ex partialiqua, sine sectione, neque ea pars quae exeri poterat, illa erat in qua extrema hiat urethra. Intra scroto nulli viti fuit. Nec intra Thoracem: in quo nihil erat adnotatione dignum, nisi quod in cordis caveis, & Magnorum vasorum sanguis omni caruit polyposa concretionem, quemadmodum & in cunctis reliquis hujus corporis vasibus. Caput autem plura obtulit quae adnotaremus. Faciei musculos omnes, & interjectas membranas, & glandulas Parotides fuscus quidam ex coccineo rubor infecerat. Ex glandulae magnae erant; an ob eandem, subsistentis videlicet sanguinis, causam? an ob aliam quoque? nam & Thyroidae, & in primis Maxillares Internae erant magnae: num in ejusmodi lurconibus, quippe saepius, magisque agitata, & exercitata, grandescunt? Musculus Temporalis sinister, is videlicet qui ictus fuerat, totus, si partem frontis propiorum excipias, a stagnante sanguine nigricabat, ea copia inter musculi fibras effuso, ut ad cochlearia aliquot, inter incidendum, exciderit. Cranio circumsecto; in quo pro Frontalibus pituitariis Sinibus spongiosa inventa est ossis substantia; inter illud, Crassamque meningem, qua ictui respondebant, sanguinem semiconcretum ostendimus ad duas tresve uncias, extensumque a posterioribus antrorū ad quatuor aut quinque transversos digitos, a basi autem cranii sursum ferme tantundem. Ab ejus sanguinis compressionem meningem illam, & cerebrum evidenter subfederunt tanto spatio, quantum ab illo occupatum fuisse, diximus. Porro sanguifera vasa per eam meningem, magisque per Tenuem sic erant distenta, ut vel minimi ramusculi pulcherrime ruberent ubique, magis tamen a dextris, an quod in id latius, quippe minus dolore affectum, moriens cubilisset? an etiam, quantum ad Crassam meningem attinet, quod hujus vasa ob effusum sanguinem non aequae a sinistris vasa esse possent, atque a dextris? quamquam & ad basim dexteri cerebri hemisphaerii inter ipsum, & Teauem meningem ad ali-

aliquem tractum effusum sanguinem animadvertimus; sed paucum adeo, ut sagillatio potius, quam effusio, videretur. Parem proportionem vasorum plenitudinem ex grandiusculis passim sanguineis punctis in medullari non cerebri modo, sed & cerebelli substantia fuisse, intelleximus; per Lateralium autem ventriculorum parietes ipsa distenta vasa conspeximus; quamquam in paucis, quae iis ventriculis inerant, aqua sub turbida Choroides plenas pallarent. His ita perspectis, oculos convertimus ad exsectum cranium, & in sinistro offe temporum ferme capillarem rimam, sed ab exterioribus ad interiora pervadentem, animadvertimus. Incipiebat haec digitulo transverso supra cum locum ubi secta, ut solet, calvaria fuerat. Pergebat autem ad hujus basim, & ad communes usque superiores fines intimi Meatus Auditorii, & Tympani se extendebat; quamobrem discludens utrumque Membrana disrupa erat, hoc autem sanguine plenum, & ille sanguinolentus. Compertis sic causis quae interna vasa, externaque ruperant, & quod consequitur, sanguinis tum intra cranium, tum ex aere effusi, restabat in homine quem luscum fuisse, diximus, cecus oculis examinandus. Is erat dexter. Cujus Adnata tunica posterioribus sanguiferis vasculis, quadam praesertim in parte, distinguebatur, ad Cornea ambitum pertinentibus. Haec non modo opaca, sed & multo minor quam par est, nec solita figura erat. Tum demptus ex orbita oculus, ipse quoque non paulo apparuit minor, nec sphaeram, ut solet, sed unum ex iis quos nostrates appellant bottoni, quibus videlicet in vestibus pro fibula utimur, apprimere referebat, facie altera depressum, altera in humilis con modum extuberantem. Quarum tamen facierum cum hic illa esset anterior, haec autem posterior, multo longior erat diameter faciei anterioris, quam axis, seu recta linea ab hujus medio ad posterioris medium ducta. Secundum quam lineam cum durum hunc oculum bifariam divisissim, & nihil, nisi humor prodissit, quem, nisi colore fuisset subatro, & aequum vocasses, frustra Crystallini, aut Vitrei humoris reliquias quaesivi; nec vestigium quidem supererat. Verum sub contracta Sclerotica tunica Choroides erat cujus inter fuscum colorem sanguineus hic illic, ut solet, non obscure apparebat, annexaque Choroidi Uvea, at non sicuti haec, integra; ut Iridem, & Cilare corpus inter noscere non liceret. Universae autem Choroidi pro Retina tenuis lamella suberat ossa, quae ab nervi Optici infertione profecta, & undique integra, figuramque oculi quam descripsimus, servans, & aequum de quo dictum est, humorem complectens, ad Cornea usque ambitum se extendebat, ubi arcibus quam usquam, ad Uveam adhaerebat, quemadmodum vel posteaquam dissectum oculum sex dies in aqua macerassim, iterum animadverti. Ejus lamellae, revera ossae, frusta omnia adhuc assero, quorum grandiuscula nonnulla & figura, & adhaerentia Uveae, & Choroidis portione, rei quam rarissimae; si tamen antea ab ullo confecta est; fidem facere iis qui tunc non aderant, praestare possint. Tunc vero cum iis qui aderant omnes & Rei Medicae Doctores, & Studiosi satis superque haec cuncta spectassent, constaretque ex ipsa inspectione, cecitatem fuisse antiquam; quaecumque ejus causa fuerit, quae neque ex mortuo quari, neque ex aliis poterat, quippe mendici alienigenae vitam alibi actam ignorantibus; non est visum praetermittendum, ut quomodo se haberet Opticus ejus oculi nervus, inquirerem, & cum altero qui sinistram, nempe sanum, petebat oculum, compararem. Manifestum igitur continuo omnibus vel sine dissectione inter unum, & alterum nervum discrimen fuit. Hic enim alter ita uti sinisterrimus solet, se habebat. Ille vero depressior, tenuior, & colore carneo obsoleto ab eo loco ubi cum altero intra cranium conjunctus fuerat, ad oculum usque conspicebatur. Quin toto eo tractu quo Crassa meningem erat convellitus, cum in transversum secuissem, quaecumque sectio arteriae cujusdam potius, quam nervi, esse videbatur, quippe in se contracta, & crassior facta illa meningem, & tubuli ab ea efformati cavum mucosum implente substantia illius ejusdem quem modo dixi, coloris. In ipsa autem conjunctione ut res se haberet, quae non potuit, cum ea pars in cerebri dissectione fuisset antea foruito lassa. Sed tamen ab eo loco introrsum ad tractum digitorum duorum nullum prorsus a quoquam adnotari discrimen potuit inter nervum dexterum, & sinistram; neuter enim, ut infra dexter, mollior erat, mucosusque, aut subrubens, aut extenuatus; sed parem uterque firmitudinem, crassitudinem, albedinem ostendebat.

31. Est longior historia haec fuit; non longam tamen satis erit adnotationem attexere. Velim igitur, quae de Optico hujus caeci oculi nervo scripti, cum iis conferas quae Epistola habes XIII. (b) Meas omnes satis inter se convenire harum rerum Observationes, intelliges; hanc autem ultimam, quod ad oculum ipsum attinet, quidpiam multo & spectabilius, & rarius continere, tunicam videlicet Retinam totam ex mollissima, & nervea in duram, ossamque conversam. Id enim ejus raritatis sit, inde poteris existimare; quod cum postea in rem hujus nostrae similem incidisset Anatomicus Eruditissimus Halerus (c); lapillos, inquit, aliquos in lente crystallina repositos fuisse, legi; ejusmodi autem retinæ morbus nescio an visus sit. Non adeo rara sunt; rara tamen sunt in aliis quoque oculi ipsius partibus live in ossam, five in lapideam naturam mutationes. Noli enim facile credere, tot esse conspectas quot in Collectione quadam recensentur; nisi prius in libris invenias qui nimis properanter, ut opinor, sunt in ea designati. Mihi certe quatuor, aut quinque ex iis qui in manibus erant, insipienti, praeter spem accidit, ut vel nihil, vel nihil ad rem in locis reperirem quae indicantur, uno excepto, perperam tamen indicato, quem insuper ad Scleroticam tunicam attinere, animadvertes, non ossam quidem, ut dicitur, inventam, sed ossam habentem squamulam quae ipsi inhaerebat, si Blasmus inspexeris, non L. 6. c. 8; sed P. 6. Obs. Med. 8. cum Tab. 8. Fig. 13. qualem bracteolam se vidisse postea inter choroidae laminae, Gunzius (d) scripsit. Sed Cl. Morandus (e) exemplum protulerat multo antea, ut in ea Collectione omitti non debuisset, rarum praesertim, atque, ut ait, fortasse unicum, ossificationis intra oculi globum. Nam praeter humorem Crystallinum qui, consistentia erat durissimi lapidis, non tenuis inter Choroidem, & Retinam tunicam deprehendit ossiculum, posterius convexum, anterius cavum. Denique, ne de istiusmodi partium oculi indurationibus aliud addamus; quale nos in muliere ossiculum, Crystallini loco, offenderimus, alias (f) ad te scriptum memineris. Caetera quae in historia novissime proposita ad ictum attinent capitis, post ea quae his, & superioribus Litteris saepe attigimus, supervacuum esse, vides, hic iterum explicare. Sanguinis autem per aurem exitum, qua via & ratione in Viro hoc contigit, eadem in aliis quoque contigisse, quos videlicet Epistola haec (g), & Epistola item XIII. (h) proponunt, satis, etiam me tacente, per te memineris.

32. BAJULUS annos natus necum quadraginta, egregio corporis habitu, ebrius cum esset, inter incendendum cecidit, frontemque graviter allisit, unde magna ibi sagillatio. Et tunc quidem vomuit. Sed nullum postea symptomata apparuit praeter unum, idque gravissimum, ut torpidus jaceret, nihil sumens, nihil loquens, nisi quod ubi Chirurgi aliquid agerent quod dolorem afferret, tunc vehementer querebatur, magnumque edebat clamorem. Sic illatus in Nosocomium, intra quartum a casu diem est mortuus, cum ibi ego anatomica studiosis ostenderem sub initium Decembris A. 1741. FRONTIS os qua allisum fuerat, vidi rima bene longa exterius, interiusque diffusum, cui rimae sanguis intra cranium grumosus suberat; sed non multus. Neque aliud praeterea offendi quod ad ictum attineret. Nam ossiculum, quod haud ita procul deprehendi, inter Crassam, Tenuemque hujus Viri meninges conditum, jam diu ante id tempus ibi increvisse, ex ejus descriptione intelliges, quam XXV. ad te Epistolae (i) inferui, neque ullo modo pro squama haberi potuisse, quae ictus vi ab interiore ossis facie decussa, intra meninges se coniecisset, ut in Fabro illo murario, cujus dissectionem habes apud Cl. Fantonum (k), acciderat.

33. In eodem Nosocomio Patavino meis frequentissimis Auditoribus, quos inter ingenio, studio, assiduitate praestabat Vir Nobilis Jacobus de Scopulo, is qui paucis post annis merito inter Publicos Professores relatus, Medicus est Consultissimus, si quis alius, & disertissimus, ibidem, inquam, demonstravi quae fracta essent ex casu ab alto in Viro quodam sub initium Aprilis A. 1740. itemque in Juvene ante Novembris finem A. 1742. Quae tametsi ad thoracem quoque attinent; tamen quia caput gravissime lesum fuerat, huc adscribentur.

34. VIR dum altam vitam putaret, in solum lapidibus stratum praecipit ruit. Loquendi facultatem continuo amisit. Cum semivivo ex liquore nescio quem cardiaco, ut vocitant, aliquid in os ingessissent, evomuit, & quam-

(u) Annot. ad Hippocr. Epid. l. 7. S. 1. vers. 377. prope fin.

(x) Exerc. de loco aff. in Apople.

(y) Dissert. de mira Cran. Fract. §. 10. & seqq.

(z) S. 12.

(a) XIII. n. 16.

(b) n. 7. & seqq. (c) Opusc. Pathol. Obs. 33.

(d) Progr. de Ozena Maxill. prope fin.

(e) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1730.

(f) Epist. 13. n. 10.

(g) n. 25.

(h) n. 16.

(i) n. 8. initio.

(k) de Observ. Med. & Anat. Epist. 1.

quam pulsus qui contracti fuerant, se proderent; tamen ceteris omnibus in pejus tendentibus, alvique, & vesicæ recrementis per se exeuntibus, mors intra quartam a casu horam est consecuta. CADAVER, cujus ex ore, & naribus sanguis prodibat, trigesima a morte hora etiam tum erat omnino rigidum, nec sine vehementiori vi flexile. Sinciput non uno loco fagillatum, sed in maxime ubi communes sunt ejus, & frontis fines. Et sane os frontis mox vidimus intus, extraque, per medium ferme, rima diffusum, quæ a sincipite recta descendens, & per fornicem orbitæ oculi dexteri haud procul ab Ethmoide ossis pergens, postquam sic totum os frontis pervaserat, in eam denique partem ossis Sphenoidis transibat per quam in orbitam sese trajicit nervus Opticus. Ex quo fissura itinere cum intelligas, per Frontalem Sinum pituitarium non ire non potuisse, intelligis quoque sanguinis viam, e naribus, ut dictum est, & per communicationem harum cum faucibus, ex ore etiam prodeuntis. Sub crassa meninge ad anteriora fluidum sanguinem, eumque non multum, nec multum quoque, & pariter fluidum, imo quasi cum aqua aliqua parte commistum in Lateralis utroque ventriculo deprehendimus: qui cum fluidus esset, minus mirandum est, quod etiam in tertio, imo & in Transitu ad quartum ventriculum fuerit, quo videlicet, præsertim dum moveretur cadaver, facile meare potuerat. Thorace recluso, & pulmonibus, qui si partem sinistri summam excipias quæ per tæniolam membranam tenuissimam cum pleura neclebatur, undique soluti erant, mollibus, & coincidentibus in se repertis, & omnino sanis, tamen qua dorsum spectabant, ita ut par est in eo qui supinus mortuus erat, quasi ab inflammatione rubent, cum sublatis essent manibus, tantum sanguinis fluidi in utrumque pariter thoracis cavum, sed tamen aliquanto plus in dexterum effusi, conspeximus, quantum libras sex superasset. In pericardio serum limpidum exigua copia. Arteriæ Pulmonaris, & Magnæ truncos pinguedine, licet homo non esset pinguis, quasi omnino tectos, ut & cor ipsum offendimus, in hujus autem ventriculis nigri, & quadantenus grumosi sanguinis parum, nisi quod ad dexteri orificium venosum mediocris polyposa concretio fuit; unde Studiosi nostri vera esse quæ adversus vulgarem de harum concretionum origine errorem sæpe admonueramus, intelligere potuerunt, cum illa certe in homine, quem, si hydrocele exciperes, sanissimum fuisse, constabat, non nisi post mortem, aut paulo ante mortem, inter fibrillas Tricuspidae valvularum subsistentibus crassioribus & viscidioribus particulis sanguinis, coalescere potuisset. Tum his visceribus ablati, & exhausto sanguine de quo dictum est, cum vasa unde in thoracem effusus esset, perquirere vellemus; Intercoastalia fuisse, cognovimus, quippe utrinque costis aliquot ex superioribus haud procul a Spina ita perfractis, ut inaequalia earum extrema, pertusa pleura, intra thoracem prominenter aliquantulum. Eratque ad ea, & circum ea loca ampla fagillatio a sanguine sub pleura stagnante. Revoluti autem in ventrem cadavere, ablatisque dorsi musculis, non modo sanguinem, qui sub his pariter, imo majori aliquanto copia, stagnaverat, ad costas easdem ostendi, sed & rem in eo qui cadens os frontis fregerat, intellectu non perfacile, nimirum præter costas, sex dorsales vertebrae ex superioribus ita fractas, ut earum non parva frusta ab ipsis penitus essent divisa. Sed de re hac quid coniciamus, infra (1) videbis. Nunc ex vertebrae illarum, & quod consequitur, ex Medullæ inelusa tanta læsione cur excrementa retineri non potuerint, vides. In Ventre nihil humoris effusi, nihilque præter naturam se habens invenimus, si jecinoris particulam aliquam excipias subnigram, itemque in scroto hydrocele geminam: cujus cum tibi alias (m) descriptionem miserim, hic non oportet iterare. Et Vir quidem ita se habuit.

35. JUVENIS autem annos natus viginti quatuor, torosus, arte lanarius, cum ex alto pariter cecidisset, intra horas pariter a casu quatuor interit. Hic tamen cum primum ad lapsum accursum est, interrogantibus potuit pauca respondere: dein continuo loqui desit. CADAVERIS artus erant rigidi duobus a morte exactis diebus; tertio autem exacto, non amplius. Sinciput a sinistris cum musculi Temporalis parte fagillatum. Dum cranium circumferebatur, sanguinis non parum effluxit. Cujus tamen inter illud, & Crassam meningem tantum superesse, mox vidimus, quantum uncias tres æquare, aut quatuor posset. Erat niger, & in grumos con-

cretus, neque alibi quam sinistro in latere infra os sincipitis, & ad craniū basim. Itaque in Lateralibus ventriculis cum serum esset non paucum, nonnihil quidem turbidum, sed nullo modo cruentum vidi. Nec valde rubebant plexus Choroides: vasa tamen erant in meningibus turgidiora. His; neque enim alia erant præter naturam intra cranium; animadversis, cranium ipsum inspicies, fissuram quam in sinistro ossis sincipitis incipientem videram, persectus, conspexi per subjectum os temporum pergentem ad processum usque Petrosi, inde autem eandem, aut si aliam, cum ea conjunctam, per intersectam ossis temporum, & frontis, Sphenoidis partem, hac percursa, in eam produci postremam ossis frontis regionem quæ orbitæ oculi extremum fornicem facit. Erat autem hac tam longa fissura per crassitudinem ossium universam traducta; ut si altera manu anteriorem, altera autem posteriorem eorum quæ diximus, ossium partem prehenderes, & in diversa duceres; manifesto cedere, & dimoveri, perciperes. Thoracis quoque ossis parietes fracturis non carebant. Nam præterquam quod fracta erat clavicula sinistra, cum animadversus esset in dorso livor qui prope Spinam, a sinistris pariter, tractum alibi angustior, alibi latior occupabat; recluso pectore, exhaustoque sanguine qui ad duas trefse uncias effusus in cavum illius ejusdem lateris inventus est, amplam echymosim sub pleura vidimus, in eaque unam saltem ex costis quæ circa medium longitudinis thoracis sunt, quæ a posterioribus antrosum curvari, incipiunt, ita fractam sine ulla dubitatione percipimus, ut adherentia Intercoastalia vasa cum pleura lacerari, & sanguinem fundere intus, extrorsumque deberint. Cæterum pulmones; quod in Lanariis non sæpius vidimus; omnino erant a pleura soluti, nisi quod cum ea per membranam summam dumtaxat anterior pars dexteri colligabatur. In pericardio non multum seri, in corde nulla polyposa concretionem inventa. Abdomine diducto, nihil occurrit vitiosum præter ureteres, non modo alibi, sed vel in ipso in vesicam ingressu æquo latiores; ut minus mirandum esset quod vesica quam aere distendendam curaveramus, parum ferme infumam atque in imo latitudinem ostendisset.

36. Sæpe enim, ut alibi (n) ostensum est, ureterum latitudinem multum, diutiusque cohibitu in vesica locum consequitur, ex quo hanc laxari, laxatæque figuram vitari, non difficile contingit. Verum, ut ad fracta in hoc Juvene ossa redeamus, cum fracturæ omnes a sinistris conspectæ sint; facile in hoc, quod difficultus in Viro (o), intelligitur, quomodo simul capitis, & thoracis ossa sint fracta, Juvenis videlicet corpore in sinistram latus cadente; cum Virum conjicere oporteat in durum aliquot inter cadendum incurrisse, unde fracto anterie capite, & mutata corporis directione, tergum denique alidere ad solum potuerit. Cæterum inter alias fissuras cranii hæc præsertim postrema, ea longitudine, itque in sedibus occurrit, ut cum illis quæ ab Ruyschio (p), a Poupartio (q), a Mauchartio (r), a Schreiberno (s), ab aliisque propositæ sunt, conferri a te possit, ut magis illud semper, magisque appareat, futuras, commissurasque calvariae non ob eum potissimum finem esse institutas, ut fissuræ ossis unius cursum inhibeant, neque in ossa proxima produci sinant. Quod Bononia primum mihi animadversum esse, memini, in cadavere A. 1702. publice dissecto, cujus cranium ab alterius lateris ictu fissuram habuit Coronali futuræ parallelam, sed multo quam ea longiorem, ut quæ pone ipsam per totum ferme cranium, basi excepta, ferebatur, utramque tabulam pervadens. Quam Observationem, si cætera tunc perscrupissem, non eram certe inter superiores prætermisissus.

37. Antequam de calvariae ictibus verba facere definamus, illud non est prætereundum, utraque ejus tabula prorsus illæsa, illasque subjectarum meningum vasis, accidere aliquando ab ictu valido obtusi corporis, ut vascula quæ inter eas tabulas medullæ subserviunt, rumpantur, & sanguinem fundant, qui procedente tempore corruptus, eoque acrior factus, quod succus medullæ, ut animadverit Præcl. Nicolaus Rosén (t), admiscetur, qui tunc mora & calore in pessimam degenerat rancidinem, interiorem tabulam carie afficiat, hominique, jam ictus obliato, & nihil ejusmodi timentis, intro defluens, meninges vitiet, necemque afferat. Cujusmodi casus exemplum non unum & mihi est, & aliis notum, fuitque laudatis a Bohnio (u) Auctoribus, ut Jo. Petro Paserio,

ferio, eique præsertim ex cujus in Hippocratem de Capitis Vulneribus Commentariis nullam calvariae sectionem fuisse, miror, in hanc partem Sepulchreti relatam, Petro Paavio. Fit etiam nonnunquam, ut ambæ inde exedantur tabulæ, quemadmodum præ cæteris vidit, fuisseque ad me scripsit Vir, cum viveret, non minori humanitate, quam doctrina, præditus Pius Nicolaus Garellius Eques, & Archiater Cæsareus. Res digna est quam, saltem in pauca contractam, hic tibi non omittam.

38. MULIER per marmoreas scalas retrosum ruens, occiput vehementer alliserat; sed præter breve, levemque adeo stuporem, ut mox per se redire domum potuerit, modicamque, & quæ cito evanuit, fagillationem, in percussa capitis sede tumor apparuit avellana haud major: qui cum dolore afferret nullum, a muliere neglectus, sensim increvit, ut tertio circiter jam exacto anno, esset magnus: quo tempore a Chirurgo quibuscumque per cystico subcutaneo tumore habitus, ut qui neque cutis colorem mutasset, & sine dolore premi posset, ab ipsis, nisi mulier renuisset, fuisset exactus. Paulo post doloribus ægra torqueri cepit, qui a tumoris fedebat incipientes, per cranium ferme universum ita extendebantur, ut hoc funibus quasi quibuscumque sibi constrinxeretur. Non erant illi quidem assidui, nec semper æque graves, nonnunquam tamen graves adeo, ut mentis perturbationem inducerent: quo autem magis precebat tempus, eo crebriores, & vehementiores fiebant. Per hæc ad annum a casu ventum est sextum. Quo elapso, ecce de improviso apoplexia ingruit, paucalque intra horas mulierem perimit Vindobonæ A. 1735.

TUMORE aperto, ejus cavum sanguine plenum inventum est pene atro, nec concreto solum, sed tam denso, ut arreptus digitis secutus sit universus, tunc denum portione aliqua fluidi sanguinis exeunte. Id vitium, detractis integumentis, incipere compertum est a percussa olim parte, idest superiore ossis occipitis ad latus sinistram, pergere autem per os sincipitis ejusdem lateris usque eo, ut tribus, haud amplius, transversis digitis a Coronali futura distaret. Occupabat insuper dexteri ossis sincipitis partem, ut omnis caries sex digitos in latum, septem, eoque amplius in longum pateret. Quæ ossa non erant omnino pertusa, reticularis ossæ apparebat substantia, e cujus exteriori facie attollebant se passim lamellæ ossæ, perque ut crassiuscula charta tenues, sed durissimæ omnes, & acutissimæ: quæ foliaceos quasi fungos, alios alia amplitudine, per vegetationem quandam ossæ enatos, non ineleganti spectaculo referrent. Dura meninx facta erat crassissima toto eo spatio quo vitato cranio subsiciebatur, hujus autem parti quæ icta olim fuerat, multo artius adhaerebat. Per eandem meningem repentia vasa cum a dextris naturalem fervarent modum, a sinistris valde erant turgida, & dilatata, eorumque in sana, quæ eodem in latere supererat, calvariae parte vestigia spectabantur multo quam a dextris, ampliora, & profundiora. Quod reliquum est, vasa quoque plexus Choroidis sanguine multum distenta, & feri effusi portio aliqua sub cerebri basi reperta est.

39. Cæterum in ea erat opinio Garellius, violatas, compressasque ictuum occasione arteriolas quæ non modo inter cranii tabulas, sed & intra alia sint ossa, dilatari, & in aneurysma distendi, & cariem vel priusquam rumpantur, ut adita ossibus aneurysmata solent, vel rupta parere. In eamque opinionem adductus fuerat a tribus quæ cum descripto cranio observabat, femoris ossibus. Quorum unum tumorem ostendebat in quem dilatatum fuerat ad pugni magnitudinem, carie exesum passim atque pertusum, tresque osses emittentem productiones, quarum maxima digitum longitudine, & crassitudine æquabat; simul autem foramen per quod arteria os subibat, per angustum alias, in eo ossis adeo amplificatum, ut nullo negotio minimum admitteret digitum. Ossa duo reliqua præter fracturam, quæ olim præcesserat, consolidatam, affectum carie habebant tumorem, & pro arteria insculptum ossi foramen pariter dilatatum. Itaque hoc morbi genus necdum quantum mereret, illustratum, explicatumque censebat. Sed hæc ex ejus ad me Litteris habemus. Tumorem autem quem ipse in femina ista vidit, & sede, & diuturnis, gravissimisque doloribus, & inclusio sanguine, & subjecta cranii parte ossis prominentis acutis aspera, conferre quadantenus cum eo poteris qui ex Anglicis Philosophicis Transactionibus commemoratur

in laudata alias, quæ sub Cl. Kulmi præsidio Gedani A. 1732. proposita est, Dissertatione (x): externa vero causa spectata, & tumoris tardo post ictum initio, & nullo diu, postea autem acerbo, quamvis non continuo, dolore, & cranii carie, hiatusque non modico, possis magna ex parte cum eo comparare quem in altera muliere ab Jo. Salzmanno (y) adnotatum habemus.

40. Ad Caput, universe acceptum, cum vulnera illa quoque attineant quæ faciei infliguntur; cursum huc aliqua adjungere visum est de oculorum, nasi, laborum, linguæ vulneribus. Ac de iis quidem quæ non tam oculorum sunt, quam orbitarum, & cerebri, superiore Epistola scriptum est. Quibus & illa adjicias quæ toto orbitæ cavo emenso, per hujus foramina, ultimofque parietes ad cerebrum in hominibus aliquando, semper autem in iis ovibus pervenerunt quas Romæ Wepferus (z) cunctas vidit omni sensu, motuque privatas itatim ac lanio cultrum ad manubrium usque in alterutrum oculum immiserat: quod non nisi carotidibus iuxta insundibulum abscissis, ventriculis omnibus integris permanentibus, factum Wepferus non dubitabat: quamquam, si, quod obvium erat facere, sic maceratum cranium ipse dissecuisset; in quibusdam fortasse convulserat quoque aliquem ex ventriculis deprehendisset. De oculi autem ipsius vulneribus per quæ humores effunduntur, si quidem Aqueus tantummodo effusus sit, nec quidquam punctum, aut incisum, nisi Cornea tunica, bene sperandum esse, jam Aristoteles (a), Celsus (b), Plinius (c) exemplo hirudinum, columbarum, palmarum, lacertarum viridum, mustelarum quoque indicaverant prius quam post Galeni (d) in puero Observationem, Galenietiam affectum in hominibus, tum in aliis animalibus confirmarent. Sed Vitreo humore, & multo magis CrySTALLINO effuso, num recte, ut antea, cerni possit: id vero est quod difficile credant ii qui humores hos per Corneam ejicientes, ut Iris, & Ciliare corpus labefactentur, animadverterint, quorum utriusque integritas ad perfecte videndum est necessaria; ne de Retina quidquam dicamus, sine qua videri non potest, quæ subducto Vitreo humore collabescit, aut certe corrugatur. Fac tamen, Aqueo humore, ut sua in sede, ita in reliquis forte quibusdam Vitrei cellulis rursus collecto, has, & siquæ compressæ intra has latebant, distendi, & Retinam explicare; num CrySTALLINUS humor, per vulnus temere inflictu cum Vitreo elapsus, gignetur iterum? qui posteaquam a dextero Chirurgo depressus est, non reparatur: estque adeo ad optime videndum necessarius, ut illi quibus depressus est, norunt. Et sane de hujus restitutione unanimiter desperasse qui de Vitreo non ambigebat, ex illo Elsæni Scholio (e) apparet: in quo tamen qui expressos oculi humores omnes, & visum pristina integritati ante Burhum restituisse credebatur, commemorat, & Thomæ Bartholini de eodem Burhi experimento quoddam testimonium profert, non prolaturus, si legere tunc potuisset, quid non privatis litteris pressius, sed publico scripto fufus de unius, haud amplius, a se visi hujusmodi experimenti successu, eoque dubio, & imperfecto, testari se posse, scripsit perpaucis post annis idem Bartholinus (f). Nec vero Chirurgus Scrivenerius (g), is qui ad Bartholinum scribens de oculi humoribus, a Burho, & ab se quoque anseri expressis, & restitutis, dubium sibi esse, negabat, idem in aliis omnibus contingere volatilibus, visum perfecte restitutum esse, affirmavit, sed ex parte, & non æque feliciter five in anserem, five in gallinam, que, in quibus periculum fecit. In hac tamen re natum fuisse humorem CrySTALLINUM intra octo hebdomadas, scribit quidem, sed necdum ad justam pervenisse magnitudinem: & quamquam addit, si adhuc per aliquot asservata fuisset hebdomadas, dubium non esse, eum ipsum plane restituendum fuisse; dubios tamen relinquit legentes, quippe cum postea in re tam facili experimentum non iteraverit, ut in longius tempus produceret. Sed & Zambecarius (h) cum olim affirmasset, ut humoris Aquei regeneratio merum (quod fateatur) Natura est opus, sic ejusdem Naturæ opus esse humoris Vitrei, & CrySTALLINI regenerationem & restitutionem; quid autem ex ejusmodi regeneratione accideret, se alia vice esse elocuturum; nunquam deinde, quo sciam, etiam diutissime vixit, ea de re edidit quidquam. Imo scio, Sanctaffano, de eadem per litteras querenti, A. 1724. respondisse, sibi postquam ea scripserat, non fuisse tempus periculum facienti: tamen credere,

(1) n. 36. (m) Epist. 43. n. 25. (n) Epist. 42. n. 23. (o) n. 34. (p) Obs. Anat. Chir. 47. (q) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1700. Obs. Anat. 19. (r) Eph. N. C. Cent. 5. Obs. 22. & Cent. 9. Obs. 39. in Sutore. (s) Nov. Comm. Imp. Acad. Sc. Petropol. Tom. 3. in Physi. Obs. 3. (t) Dissert. de Oculib. Calvar. P. 1. §. 1. not. f. (u) Dissert. de Trepanat. Difficult. prope finem.

(x) De Exost. Stent. Clavic. c. 2. §. 32. (y) Act. N. C. Tom. 2. Obs. 100. (z) Exerc. de loc. Aff. in Apopl. (a) Hist. Animal. l. 6. c. 5. (b) De Medic. l. 6. c. 6. n. 39. (c) Nat. Hist. l. 29. c. ult. (d) De Symp. Caus. l. 1. c. 1. (e) ad Obs. 12. Dec. 1. A. 1. Eph. N. C. (f) Act. Med. Hæst. A. 1672. Obs. 132. (g) Ibid. Obs. 133. (h) Experiment. circa diversa c. vir. exst. Viscera.

re, posse duos illos humores iterum gigni, sed tardius. Aqueo: id autem credere tum quia ex Benevolento conflaret, quibus Crystallinus humor acu fuerat propter opacitatem depressus, ad huius implendum locum Vitreum processisse, tum quia hi duo humores nutriuntur, nutritio autem est generatio, itaque ut nutriantur, sic iterum gigni posse. Quare ideo protuli, ut quid expectari ab illo potuisset, existimes. Denique cum Theodorus Kerckringius (i) diserte asseverasset, se *cuiuslibet oblato animali passim discernere oculos, exprimere omnes humores, eosque spectantibus etiam auferendis tradere, atque exiguo tempore visum in integrum restituere: idque aliquando exercitationis causa ita effecisse, ut uni eisdemque cani unum eundemque oculum tercio discerneret, ac tertio sanaret*; quare exte, si revera omnibus expressis humoribus, visus revera in integrum restituebatur, quare, inquam, ex te, quid causae esse, putes, cur industrii ejus Anatomici cum cetera adhuc memorentur, res ista eximia una adeo a longo jam tempore fileatur, ut ejus quasi intermortua memoria, ne mentio quidem ab Eruditissimis Viris nunc fiat in recensendis aliorum huc spectantibus experimentis?

41. Ad Nasi autem vulnera spectant quaedam etiam ex mirificis illis quae ad cerebrum attinuisse credita sunt, velut quod ad Westphalum (k) scriptum est fuisse Equiti Polono infictum, sagitta ab uno capitis latere ad alterum sic adacta, ut ex aequo existeret utrinque. Cum enim infixa fuerit infra temporum ossa versus prominentiam ossis jugalium utriusque lateris, Eques autem praeter febrem symptomatice, vix alia graviora, quam quae vulneratos communiter comitantur solent, passus sit symptomata; mihi quidem non modo infra cranii basim, sed per Maxillarium Sinuum, & nasi caveas fuisse videtur sagitta via. Ad Sinus quoque, alios quidem, sed pariter ad nasi caveas pertinentes, spectasse, conjicio, vulnus illud quod ex Procopio Freindius (l) refert. Subiens enim supra dextrum oculum iuxta os nasi, sagitta cuspis ferrea, utcumque ampla ac longa, ita alte descendit, ut conspectum effugerit annos plures sine dolore, & molestia; ejusmodi intelligo quae nobiliorem indicaret cuspis sedem. Excepta enim Frontali Sinu, eique proximis Ethmoidaeis, & denique Sphenoidaeo, satis spatii, in magno praestitum capite, habere potuit, ubi sine praestantium partium injuria delitesceret, quamvis longitudine, & ferme etiam crassitudine minimum digitum aequasset. Sic etiam cum scite explicavit Hildanus (m), cur lethale non fuerit vulnus sub oculo incipiens, & in opposita superiore cervicis regione definens, & via ferri partem primam per Maxillarem Sinum posuit; id pariter vulnus pro illa parte ad nasum attinuit. Sed & ipse Bononiae vidi vulnus per se maximum, ad speciem autem multo maximum, ut pote quod simul ad utrumque cum Sinum, simul ad nasum externum, & ad ossa huic subiecta non modo spectabat, sed ita illorum cava referaverat, & sanguine foedaverat, ut ad grandem inficti vulneris hiatus, naturalis eorum cavorum profunditate accedente, horrendum visu spectaculum se se offerret. Fistula enim ferrea, quam archibulo appellant nostrates, cum forte pyrit pulvis nimia copia inclusi, hoc accenso, disiliret, puero nasum, & de Maxillari utroque osse tantum abstulerat, ut Maxillares ambo Sinus simul cum caveis nasi paterent, quae eo quoque apparebant majores, quod ea pars etiam illius utriusque ossis quae naso, atque ori interjicitur, antierius partim absumpta erat, partim fracta deorsum pendebat, ut plumbeum tubum inter eam, & inferiorem maxillam interponere oportuerit, per quem, donec pars fracta consisteret, & penicilla, ac linteola medicamentis illita, de nasi caveis demi possent, puer aleretur, &

spiritum duceret. Servatus est enim Pauli Pielz Medicus, & Chirurgi Experientissimus diligentia. Quem ego, non modo alios qui una adstant, horrore primum percussos, & ab insolito, miserandoque spectaculo se avertebant conspexi, cum statim ab accepto vulnere puero in Nosocomium delato, cruenta ejus facies resecta est; adeo amplum profundumque primo aspectu visum est vulnus, quod mox attentius contuendo, & cum partium naturalium, ex Anatomie nota, structura, & dispositione comparando, gravissimum quidem, & magnum, sed multo reapse minus profundum esse, quam videretur, cognitum est.

42. De vulnerato autem Labro illud memini. Cum alter eadem ferme aetate puer, annorum videlicet, ad duodecim, sed Generosissima Stirpis, inter currendum in faciem cecidisset, fregissetque in transversum ad marmoreum pavementum unum ex superioribus dentibus Incisoris, ab ea dentis parte quae abrupta fuerat, superius labrum transfixum est. Jamque attenta Chirurgorum cura, circumjuncta vulneri labri pars detumuerat, molliorque erat facta: neutrum tamen vulneris orificium ad glutinationem vergebat; imo huic flaccidior humidiorque in vulnere caro pertinaciter repugnabat. Extranei aliquid intus latere, suspicabamur; sed quod reapse latebat, id nemini in mentem venire poterat, cum abruptam dentis partem, ut ea vulneris orificium exterius fecerat, sic illac excidisse, & aeger, & domesticus omnes jam inde ab initio tum pro certo credidissent ipsi, tum mihi Chirurgique affirmassent. Ea tamen ipsa pars dentis intra vulnus condita erat: quae facile detecta, vulnus cito, nulloque negotio ad cicatricem perductum est. Ex quo discas, in ejusmodi examinibus nulla, etiam veri simillima, narratione stare oportere, nisi eorum qui rem suis ipsi oculis se pervidisse, testentur.

43. Atque utinam sicut is Puer feliciter postea adolevit, & nunc inter primarios Inclutae suae Civitatis Patricios floret, ita alter quoque, non inferiore loco natus, cum ex suo vulnere ipse quoque convaluisset, non esset postea multo graviore morbi genere Nobilissima Familiae ereptus. Erat is trimulus, cum lufitans lapsus est, mentumque ad marmoreum gradum allidens, linguam tunc forte exertam, inter dentes ita compressit, ut incidere, & obliquo vulnere, minimum transversum digitum longo, nec minori ferme ab extremo apice intervallo illam anteriorem linguae partem ab reliqua tantum ad tractum prorsus divideret, quantus est ab laterali ora ad lineam medianam. Parentes, & Confanguinei omnes moerentissimi, in primisque Pueri magnus Pater, Triumvir Litterarius, ex me per litteras quaesierunt, non jam quo auxilii genere sanari posset, cum propter aetatem medelae omni constrictis dentibus pertinacissime repugnaret; violenter autem cogi ob febrem, & linguam tumorem, quae ambo accesserant, non liceret; sed illud unum, quod ad solatium pertinebat, an spes ulla esset, fore, ut naturae auxilio relictus, expediret, & recte loqueretur. Rescripti continuo, non esse desperandum, pluribus in eam rem productis exemplis, praestitum casu, ejus simillimo, qui casus extat apud Hildanum (n). Eventus quoque, Dei beneficio, simillimus fuit. Ut enim meis ipse auribus, cum forte Venetiis essem, insequenti anno audivi, nullo modo; ut ipsi Hildani verbis utar, depravata erat loquela, fuitque etiam quoad vixit, donec videlicet perniciosissima variola interemerunt. Et quod miraberis etiam magis, etsi recte, expediteque loqueretur; linguae tamen eae partes quae vulnere disjunctae fuerant, cum suam singulae cicatricem duxissent, non coalescerant inter se: itaque anterior illa non secus ac statim a vulnere, secundae etiam tum, ac pendula conspicebatur. Haecenus de Capitis Vulneribus. Vale.

nulla omnino ordinis ratione habita, a Pectoris Vulneris ad Tibiae Vulneris transitur, & inter Pectoris Vulnera, tum Capitis Vulnera, tum Ventris passim interponuntur. Mihi vero nec iterare quidquam, & ordinem servare in his ad te Epistolis statutum est. Itaque cum de Vulneribus, Ictibusque Capitis novissime scripserim, nunc de proximis Colli, Pectoris, & Dorfi agam. Et quoniam circa haec, Valsalva, & nostrae Observationes non eo numero sunt, ut unis Litteris perscribi nequeant; utraque, ut plerumque facere consuevi, his proponam, & ab ipsius Observationibus initium ducam.

2. MULIER quinquaginta annorum, caesim in collo vulnerata, concidit, nec manus, pedesque movere potest. Post aliquot dies manus iterum, sed non pristino vigore, moventur. Leve accedit delirium: & denique ante septimum diem mors. CADAVERE clam sepulto, dissectione quidem ipsa confirmari judicium non potuit de laesa Spinali medulla. Hoc tamen ex artuum paralyti, ex vulneris loco, & ex parvis quae de ipso prodierant, ossis fragmentis veritadeo simile visum est, ut Observationem hanc prorsus omittebam non censuerim.

3. VIR annos natus triginta quinque, bilioso temperamento, Novembri mense A. 1688. ad medium iterum inter quinque coltam, & sextam cultro fauciat, illico ingenti virium prostratione corripitur, ut, cum pulsus vix perciperetur, Medici brevi interitum putarent. Tribus tamen exactis horis, sensim redire incipiunt vires: itaque in S. Mariae de Vita Nosocomium deferretur. Postridie dira tussis vexari coepit, diarrhoea quoque. Sed haec, crebro quidem, verum pauca vixide materiae excretionem ciens, die sexto desit. At tussis in dies ita augebatur, ut ferri vix posset. A primis etiam diebus sensus erat ingentis in ventre ponderis, qui se progrediente morbo, per totum ventrem extendit; nullus tamen in thorace. Irmis quoque diebus pulsus nonnihil turgidus, mediocriter autem celer, hanc quidem postea celeritatem servavit; sed in dies parvus magis, magisque factus, octavo tandem die sensum cum vita desecit. IN CADAVERE ad primam a dextero sterni latere incisionem, sanguis illico qui eam Thoracis caveam implebat, magno cum impetu profluit. Sublato sterno, & sanguine spongias exhausto, novus iterum per diaphragma, quod faucium erat, ex ventre sanguis in eandem thoracis caveam inflebat. Quamobrem Ventrem quoque aperire continuo oportuit, effusumque intra ipsum sanguinem exhaurire: cuius concreta fibrae, per intestinorum extimam tunicam in retis modum dispositae, sic ei tunicae adhaerebant, ut scalpello dumtaxat separari posset. Itaque omni sanguine amoto, & visceribus in conspectum datis, ad vulneris explorationem reditum est. Mediallinum, primum omnium vulneris respondens, faucium erat, tum pericardium, denique partes dexteri ventriculi cordis, ut rima vulneris intra eum ventriculum perveniret, atque hoc compresso, nonnihil sanguinis ex ipso per rimam prodiret. Proximum autem mediallini vulneri erat diaphragmatis vulnus, per quod sanguis ut supra dictum est, ex una in alteram flebat caveam.

4. Ex quo Galenus (b) tradidit, si ad cordis ventriculum vulnus penetraret, protinus hominem mori necesse esse: si non penetraret, aliquos non solum ea die qua vulnerari sunt, sed sequenti quoque nocte vivere posse, mortuorum dissectiones haud raro fecus accidere, ostenderunt. Quorum plures quidem habes in Sepulchreto; sed non omnes. Extant enim quae addi possint, nec solum e postea editis, ut puta quae in Regiae Scientiarum Academiae Parisiensis non uno Volumine (c) prolatae sunt, verum etiam multo antiquiores, ut quae a Falloppio nostro (d) habita est: unde constat, siue vulnus, ut in hac Falloppii, in cordis parietibus subsistat, siue, ut in illis, in ventriculum perveniat, diutius quam vetustiores opinabantur, vitam aliquando posse produci. Valsalva Observatio si cum ceteris omnibus comparatur, ut ex iis non est in quibus ad longius tempus vita sit tracta, sic neque ex iis est in quibus ad brevius. Habet autem, quod ad conjunctum diaphragmatis vulnus attinet, quaedam adnotatione digna, & unde utilitatis aliquid capere Medici ad dignoscendum possint. Indicis enim extantibus vulnerati cordis, & sanguinis ex eo effusi, si ponderis sensus in thorace nullus sit, in ventre autem non modo sit, sed in dies augeatur, conjecturae locus erit de septo Transverso ita fauciatum, ut sanguinem e thorace transmittat in ventrem, praestitum ubi signum aliquod non desit ex iis quae septum illud vulnerratum esse confirmant: cuiusmodi erat in agro proposito

molestissima illa tussis gravisque adeo, ut ferri vix posset. Quod signum ut a quibuldam omittatur; certe a summo Chirurgo Falloppio (e) non est praeteritum. Noli autem mirari quod in proxima Observatione non adnotetur. Neque enim semper cuiusque morbi universa occurrunt indicia; itaque illa habebit alia quae in hac non leguntur. Praeterea autem saepe ab Observatoribus adnotantur dumtaxat praecipua. Denique pro varia in eadem Parte vulneris aut constitutione, aut fede alia alia signa magis se obijciunt. Quamquam autem in hac, & proxima Observatione quae vulneris sedes fuerit, ex ceteris quae adscribuntur, conjici quadantenus licet; optandum tamen esset, ut in ea, totaque adeo vulneris via describenda nihil a Valsalva praeteritum fuisset quod a quopiam posset deliderari, imo in prima hujus historiae initio diserte id quod voluisse videtur, scripserit, nempe cultrum inter coltam quinquam, & sextam a dextris sic adactum, ut versus sterni medium ascenderet.

5. SENEX annorum septuaginta, a viginti circiter annis caecus, cadens sinistram thoracis partem adeo graviter ad silicem allidit, ut costas frangat. Excipitur in idem Nosocomium. Pulsus erat durus: dolor in lesta parte gravans, & pungens: respiratio difficillima. Quae difficultas etsi circa quartum diem nonnihil remittere visa est; ineunte tamen sexto iterum est facta gravior: unaque delirium accessit. Quibus perstantibus omnibus, circa nonum aeger est mortuus. TRORACIS cavum sinistram sanguinis effusi erat plenum. Costae autem lateris ejusdem legitima, suprema excepta, omnes erant fractae sic, ut septima, aspera, & inequali fractura diaphragma vulnerasset: quod circa id vulnus undique erat inflammatum. Quod ad caecitatem spectat: quemadmodum Crystallinum utrumque humorem Valsalva affectum invenerit, Epistola scripti Anatomica XVIII. (f).

6. En alterum diaphragmatis fauciat, & sanguinis intro effusi exemplum. Nulla hic tussis, nulla in ventre ponderis, sed gravantis in thorace, pungentisque doloris, respirationis difficillima, & delirii mentio. Pone, hic vulnus non ad tendineam septi Transversi partem, sed, ut veri simillimum est, ad carneam, neque in ventrem patens, ut eo transmittere effusum a disruptis una cum costis Intercoastalibus valis, sanguinem possit, sed in lateris, compunctisque identidem a diffracta costa asperitate fasciculis carneis superioribus consistens, ob eandemque causam inflammatum; jam unde extiterint omnia inter hanc, & superiorem Observationem discrimina, intelliges. Quamvis autem in sex fractis sinistris costis, & sanguine, illud thoracis cavum implente, satis causarum sit diffidilis respirationis; tamen si hanc difficiliorem tunc esse factam, animadverteris, cum ad eam accessit delirium, id est secundum veterum Magistrorum sententiam, cum ad vulnus diaphragmatis inflammatio accessit; inter illas causas hoc etiam nomine diaphragmatis quoque lesionem connumerabis. Neque enim semper decepti illi credendi sunt, cum Paraphrenitidem in hujus inflammatione agnoverint, quamquam non necessario has duas conjungi, a me tibi alias (g) ostensum est. Nam neque ex diaphragmatis vulnere semper exoritur sardonius risus: quod cum alia, tum duae commonstrant modo propositae Observationes. Nec tamen falso id proditum a Hippocrate (h) ex Hippocrate (i) potest intelligi, unde illum accepisse, credebat Valsalva (k). Confirmavitque Plinius (l) ex gladiatorum spectaculis, Romae frequentissimis. Cujus ego aliquando inspicies locum, non tam miratus sum, quod Celsum (m) secutus, diaphragma membranam esse, dixerit, cui nulla sit caro, sed nervosa exilitas, quam a Dalechampio festinanter adscriptam, nec relectam, ut opinor, adnotationem, in qua falsum id esse, monstrat Anatomie, inquit, Septi quidem ambitus nervosus & membranosus est, media vero pars carnosa. Sed illuc redeo. Sive istam risus similitudinem in convulsivis diaphragmatis concussionibus spectas, ut Hippocrates videtur fecisse, qui risum hunc dixit tumultuosum, siue etiam in facie, ut plerique solent, & in his Bartholinus (n), rem confirmans exemplo quod apud Saxonem suum indicat, & per Phrenicos nervos explicans minus perspicue quam nuper Subtilissimus Professor Meckelius (o). Cervicium unde illi oriuntur, ramulis per faciem productis, utroque libet igitur modo siue utroque accipias, sicut is risus non propterea quia non in cunctis diaphragmatis vulneribus occurrit, commentitius est; sic neque delirium, licet non omnes diaphragmatis comiteretur inflammatio-

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LIII.

De Vulneribus, & Ictibus Colli, Pectoris, & Dorfi verba fiunt.

ET si in Sectione hac III. (a) qua una Sepulchreti Auctor Ictus, & Vulnera complexi voluit Partium omnium, quaedam interdum repetuntur, ut puta Observationis XX. §. 1. in XXII. §. 1. & XXI. §. 4. in eadem §. 8. & §. 5. inter §. 7. & 8. & quae in Scholio ad §. 1. Observationis XXIV. in Scholio ad ejusdem §. 4. praeterea quae est nonnunquam ubi aliquid in rerum ordine fortasse desideres; tamen in appositis ad hanc Sectionem

Additamentis gravius peccatur. Nam praeterquam quod nihil ad vulnera, aut ictus attinens Observatio huc intruditur XXVI. quae cum Scholiis grandes paginas occupat decem, & praeterquam quod Observatione X. §. 1. & Observatione XX. & XXI. eadem Parai, & Bartholini Historiae rursus producuntur, quae jam supra in Sectione ipsa Observatione XXIII. §. 17. & §. 4. & Observatione XXVI. §. 8. propositae fuerant; praeter haec, inquam, nulla

(i) Spicilieg. Anat. Obs. 100. (k) Exercit. supra ad n. 40. cit. (n) Hist. Medie. ad A. 360. (m) Cent. 4. Obs. Chir. 2. (o) Cent. 1. Obs. Chir. 28. (p) l. 4.

(b) De Loc. aff. l. 5. c. 2. (c) Hist. A. 1735. Obs. Anat. 9. & A. 1744. Obs. Anat. 9. &c. (d) Tracl. de Vulnerib. c. 28.

(e) cod. c. 28. (f) n. 29. (g) Epist. 7. n. 14. (h) De Part. Animal. l. 2. c. 10. (i) Epid. l. 5. n. 34. apud Marinell. (k) Comment. in hunc locum n. 10. (l) Nat. Hist. l. 11. c. 37. (m) De Medic. l. 4. c. 1. (n) Anat. quart. renov. l. 2. c. 3. (o) Hist. de l'Acad. Res. Sc. de Berlin A. 1751.

mes. Quod si nullam habere rationem placet vetustæ observationis; attamen negare non poteris, diaphragma, quo præcipuo utitur ad respirandum instrumento, non vulneratum modo, sed & inflammatum, & suo ex parte ob costæ septimæ fracturam orbatum fulcro, inter causas difficillime istius respirationis esse præcipue connumerandum.

7. VIR annos natus circiter quadraginta, qui Venerea lue diu laboraverat, per sævissimos ad articulos dolores, & spirandi, in ascensu præsertim, difficultatem torquente, cum ex altissimo loco, ad quem videlicet per scalam quadraginta graduum ascendebatur, in terram ruisset: primum quidem auxilium implorabat; sed paulo post loqui amplius non poterat, & celeri morte occupabatur. IN VENTRE, & CAPITIS nihil præter naturam fuit. Sed Thorace aperto omne pericardii cavum inventum est plenum concreto sanguine; qui ex Magna arteria prope cor erupisse videbatur. Nam specillum, extrinsecus illac immisum, intra illius cavum visum est pervenire.

8. Venam ex casu ab alto in ventre disruptam agnovit, ut alias (p) ad te scribam, ipse Valsalva. Curigitur in hoc Viro si ob similem causam vas aliquod ruptum in thorace debuit, non venæ id potius, quam vasi contigiti crassissimis tunicis prædito, quale arteria Magnæ truncus est, prope cor præsertim? Fac cogites, hominem ex Venerea lue obnoxium fuisse spirandi difficultati, arteriam autem Magnam non ruptam esse inventam, sed parvo, & fortasse obliquo, ut videtur, foramine pertusam. Sic tibi, eorum memori quæ de Morbo Repentina scribens ex labe sanguiferorum vasorum (q), arteria illius vitia, tunicas sensim perforantia, & sanguini exitum vel intra pericardium aperientia, propoli, sic tibi, inquam, facile veniet in mentem, quid in hoc homine præcessisse potuerit, unde ibi latus arteria truncus cum sanguinem haud satis propellendo, respirationis difficultatem, tum denique addita ingenti ob ejusmodi casum concussione, quæ reliquum adhuc aliquem in tunica extrema percurreret obicem, effundendo, mortem celeritatem afferret. Quod vitium, si Valsalva interiori arteria faciem inflexisset, non difficile, ut opinor, fuisset animadvertum. Utcunque id est; certe quod in corde offendit senis illius cujus protinus historiam, describam, jam diu antea fuisse, ex vitii ipsius natura manifestum est.

9. SENEX annus agens septuagesimum, ab alto cadit, & thoracis dexteram partem ad terram allidit. In idem illatus Nosocomium quod supra nominavimus, tanta respirandi difficultate, acutaque adeo febre corripitur, ut septimo intereat die. IN THORACIS cavo dextero nonnihil pulmo induruerat, totusque magna inflammatione affectus erat, superius præsertim, quæ ad pleuram arcte adhaerebat, & abscissum contingebat. Pulmo autem sinister rubicundus, sed a tergo magis, ut nonnihil inflammatus videretur, nigra hic illic maculas per suam substantiam disjectas ostendit. Pericardium magnam aquæ copiam, & cor grande adeo continebat, ut bubulum prope æquaret. In cordis ventriculis inerant polypose concretiones subalbæ, & sic satis molles, magnæ in singulis; major tamen quæ in dextero.

10. Non dubito, quin si incommoda quaesita essent, quibus Senex prius quam caderet, esset obnoxius, reperta fuissent aliqua ad tantam istam cordis magnitudinem referenda. Et quamquam in alisione illa satis causæ fuit, cur pulmo dextere inflammationem, & ex hac, in suppurationem transeunte, abscissum contraheret; a veri tamen similitudine alienum non est, eo facilius contraxisse, quod jam antea pulmones a corde illiusmodi tum compressi, tum ob minus expeditam per ipsum, & quod consequitur, per eos quoque sanguinis traductionem laxati, ad hunc retinendum si nova quæpiam causa accederet, dispositi essent, minusque idonei ad ea prohibenda quæ inde secuta sunt.

11. Nunc quando Ictus, & Vulnera quæ ad Collum, ad Pectus, ad Latera spectant, ex Valsalvæ schedis profusimus; quatuor ejus Observationes, ad Dorsum Vulnera attinentes, subjiciamus.

12. VIRO annorum circiter quadraginta quinque, pungenti ferro dorsum vulneratur circa quintam, & sextam costam, intervallo duorum digitorum transversorum a Spina. E vulneris primis diebus non multum sanguinis, postea autem quatuor, aut quinque circiter uncia quotidiè erumpebant. Quæ hæmorrhagia circa diem decimum remediis repressa, vulnus intumuit, multamque emittere famem cepit, cujus in dies augebatur copia. Erat autem viscida, & tenax, ut trahentem longo ductu sequere-

tur. Diuturnam ejusmodi excretionem, lenta cum febre conjunctam, sensim deficiente ægro, mors excepit die ab inflicto vulnere quadragesimo secundo. CADAVERE dissecto, in Thoracis cavum nec vulnus, nec saniem pervenisse, exploratum est, & quamvis hæc multos sibi finis, & cuniculos fecisset, omnem tamen lationem in exterioribus subtrixisset.

13. Quanto satius sit tum cæteras, tum vulnerum quoque hæmorrhagias moderari, quam reprimere, hæc tibi confirmat historia. Neque ex proxima aliud deerit quod colligas.

14. AGRICOLA annos natus circiter triginta, temperamento bilioso, in sinistra scapula cæsim ad secundam usque costam prope vertebra ingenti vulnere fauciatus, in idem quod superius dixi, Nosocomium excipitur. Ibi cum a Paulo Piella Medico, & Chirurgo præstantissimo diligenter curaretur, sputo sanguineo, tussi, difficili respiratione cum pulsu debili ac frequenti crebrique animi deflectionibus correptus, his omnibus invalescentibus, obire circa nonum diem mortem posse videbatur. Sed eo die exacto, & symptomatibus nonnihil remittentibus, vulnus quoque ipsum in melius inclinabat, cum prope decimum septimum repente, quamvis sine inflammatione, vulnus intumuit, febrisque vehemens cum pulsu languido, & diffuso per universum corpus rigore, sensus ponderis in thorace, laboriosus anhelitus, ac purulenta urinæ accesserunt, & post hæc mors denique die ab accepto vulnere vigesimo sexto.

THORACIS dissectio instituitur cum Petro Molinello, & Francisco Guicciardino, ejus Nosocomii Medico Assistente. Cum sterni excandenti causa, culter in dextrum thoracis cavum pervenit; illico multus exiluit humor, lactis fero non valde absimilis, quo in humore pulmo natabat. Illo exhausto, cavea in hoc inventa est sinuosa, purulenta materia plena, hiant ore cum eo communicans thoracis cavo. Alterum autem, idest sinistrum, cavum thoracis, quod vulnere, ut indicatum est, respondebat, nec purulentæ materiæ quidquam, & pulmonem omnino intactum natabat. Illo exhausto, cavea in hoc inventa est sinuosa, purulenta materia plena, hiant ore cum eo communicans thoracis cavo. Alterum autem, idest sinistrum, cavum thoracis, quod vulnere, ut indicatum est, respondebat, nec purulentæ materiæ quidquam, & pulmonem omnino intactum natabat.

15. Symptomata quæ dum ægrotationis historiam legeres, a vulnere esse existimaveris in thoracis cavum perveniente, dissectione perlecta, a pulmonis inflammatione, suppurazione, & hanc secuto empyemate fuisse, intelligis. Itaque ut in cæteris ægrotationibus, sic in vulneratis quoque non omnia semper imputanda sunt primo, evidentique morbo, sed huic posse alium qui ab eo non pendeat, adjungi, cogitandum est, & vel quando symptomata a primo esse videntur, num ab adjuncto aliquo potius sint, suspicandum, & diligenter inquirendum, velut hic ex indicis, quorum fortasse nonnulla erant, inflammationis, non ad sinistrum quæ ex parte erat vulnus, sed ad dextrum pulmonem spectantis.

16. JUVENIS annos natus viginti duos, cultro fauciatur quasi in medio dorso sic tamen, ut vulnus nonnihil vergens ad sinistram, tendat initium versus sextam & septimam costam. Non multo post inflicto vulnus, febris accedit, huic autem, post dies aliquot, levis spirandi difficultas, levis quoque, & irrita tussis, magnus vero circa stomachum dolor, nec modicus totius abdominis tumor. Demum ingravescente respiratione, prope decimum sextum diem æger moritur, apparente toto corpore icterico.

VENTRE aperto, intestina conspiciuntur aere turgida; jecur vero secundum naturam se habens. Thorace inspecto, in imo utroque ejus cavo nonnihil feri invenitur. Cum autem pulmo sinister ad pleuram valide adhereret, membranae productiones per quas cum hujus suprema anteriore parte necessebat, quasi sanie madida visa sunt: itemque peculiaris adhesio illa visa est, qua idem pulmo cum pleura ibi committebatur, ubi vulnere respondebat, ut sine laceratione separari non posset. Vulnus vero etiam inter Spinæ adjacentes musculos ad pleuram ipsam perveniebat; hanc tamen perforasse, non constitit. Ceterum pulmones multis in locis tuberculis scatebant majoribus, minoribusque: quorum plura, jam suppurata, saniem incisa emittebant, alia illas glandulas similitudinem adhuc servabant. In pericardio paululum feri. In singulis cordis ventriculis singulae polypose concretiones, inde in auriculas, annexasque venas productæ; major in dextero, minor in sinistro.

17. Hic Juvenis quoque, nisi accedens ad cæteras noxas, interna fortasse aliqua convulsio, cui circa stomachum dolor, intestinorum ab retento aere distentio, & ictericus

totius

totius corporis color imputentur, citiorem attulisset interitum; facile disruptis pulmonum tuberculis sanguinem, & pus expectorasset, quæ penetranti in thoracem vulnere visa essent adscribenda. Num tamen ex profundo vulnere pus in sanguifera vasa exceptum, quemadmodum ex cerebri vulneribus contingere, nuper (r) scripsimus, in pulmones illatum, tubercula illa excitaverit, an vero ipsa jam ante vulnus inflicto, per se esse coepissent, in medio relinquimus.

18. JUVENIS alter sinistra dorsi parte vulnus accipit, quod dorsum oblique & dextrorsum pergens, vertebra radendo, denique inter sextam & septimam costam dextrum thoracis cavum ingreditur. A vulnere per dies aliquot levem spirandi difficultatem patitur, & dolorem quandam, respondentem in anteriore corporis parte: dolet quoque dum ab uno in alterum latus se convertit. Pruritum etiam quodam modo in hoc, modo in illo loco vexatur. His die quincto accedit tussis cum sputo sanguinis, tum quidam in artubus inferioribus stupor: quem excepit paralysis corporis medio ad pedes extremos utque, ut movendi, sentiendique facultas non nisi in thorace, & superioribus partibus remaneret; simul ingruit abdominis tumor, & renio, lotique, & alvi recrementorum suppressio. Post hujus paralysis adventum, æger melius sibi habere videtur. Animi tamen defectibus aliquoties corripitur: in quarum una, octavo ineunte die, moritur.

CADAVER dum movetur, ingens copia sanguinis erumpit & vulnere. Hoc inter duas quas diximus, costas prope vertebra dextrum thoracis cavum subibat; ut laceratis facile Intercoastalibus vasis, hinc tantum sanguinis exisse videatur. Pulmo dexter quæ parte vulnere respondebat, nihil ibi quod sub sensum caderet, peculiaris læsionis ostendit præterquam in extrema tunica nonnihil erosa. Totus tamen rubens, & tumidus erat. Pericardium feri plenum. E dissecto corde spumofus sanguis, & fluidus erumpebat. In ejusque ventriculo dextero polyposa concretio reperta est.

Ventre aperto, intestina omnia aere turgida, in iisque humor quidam atro colore tinctus. Vesica lotio operta erat. In ventris cavo libræ aliquot feri stagnabant.

19. Ut recte Valsalva sanguinis illam effusionem a laceratis, erosive Intercoastalibus vasis, ita paralyfim a compuncto, aut ab acri sanie irritato eorum socio nervo haud perperam fortasse reperes. Inde enim convulsio, ab hac autem convulsio: unde resolutio, quemadmodum alias (*) explicavimus, fieri tanto amplius potuit, quod cum longissimo illo nervo quem Intercoastalem vocant, Costalis quique colligatur. Compuncti autem nervi Costalis indicium habes ex dolore illo qui in anteriore corporis parte, quo is contendit nervus, respondebat. Sed quamquam his positus, non difficile est historiam istam explicare, tamen si melior tibi ratio occurrat qua rem assequamur, non invitus assentiam.

20. Hactenus Valsalvæ Observationes; jam nostras accipe: quas eodem ordine adscribemus; quamquam de duabus quæ ad fauciatur Collum attinent aliam cum ad te alias (*) missa sit, non est cur iterum nunc mittatur. Altera autem brevissima est.

21. VIRO imum collum transfixum est anterius adeo ut foramen quod ferrum subiens fecerat, ab eo quod fecerat egrediens, vix digitum pollicem transversum distaret. Is cito, suffocati instar, est mortuus. CADAVER, etiam non ob vulnus, sed ut potentibus Amicis multa, & varia ostenderem, ad naturales Partium structuras attinentia, a me Venetis sub initium A. 1707. dissectum est; simul tamen hominem ex suffocatione periisse, confirmavit. Nimirum Asperæ arteriæ annulus ab annulo divisus, aditum sanguini, ex incisio vasis prodeunt, patefecerat, per quem in arteriam illam, pulmoneque irrueret.

22. Super profundis colli vulneribus duo potissimum a me quaesita esse, memini. Primum, fauciato vasorum sanguiferorum trunco aliquo, aut ramo non ex iis minutis quos remediis inditis adstringere satis liceat, quam arte prohiberi Chirurgi sanguinis profluvium possint? Respondi, non una posse, si ad tempus aliquod; nulla ferme, si de ægro diutissime servando agatur. Illud enim, incisa ipsi venæ Jugulari Internæ crusta per candens ferrum induta, consecuti sunt donec crusta excideret, ut est apud Jo. Bohmii (u): ex quo non hæc modo, sed plures addi Sepulchreto poterant Observationes peculiares cadaverum eorum qui ex vulneribus obierunt. Experimenta autem quæ tibi Epistola XIX. recensimus, ostendentia Carotidibus arteriis, aut Internis venis Jugularibus vinculo contractis, non ea cito contigisse quæ

olim metuebantur, addere animum Chirurgo possunt ad alterutram alterutro in latere obligandam, ut ad tempus aliquod sanguinis fluxus cohibeatur. At diutissime cohiberi non modo per ea quæ crutam inducunt, non posse, manifestum est; sed neque post vincula iis trancis injecta, facile sperandum est, non eas citius, tardiusve noxas esse accessuras quæ mortem per se ipsa denique afferant, tamen in vinculis injiciendis nihil a Chirurgo peccatum esset, aut prætermisum. Cum enim trunci illi ambo sint cum Vagis, & Intercoastalibus nervis intra membranæ, vel, si mavis, cellulosa quasi vaginam conclusi; perdifficile est in profundo, & a profluente sanguine aperto loco alterutrum ita contringere, ut non simul aut alter, aut ex iis nervis alteruter una contringatur, aut acu subter trajectory laceratur. Neque, si obliganda arteria sit, vinculo infra vulnus injecto adstringere satis est, ut illa ostendunt, quæ modo commemorabam, experimenta, sed altero supra vulnus opus est. Neque ut in artubus, ita in collo est illi compressioni locus, quæ per fasciam sit, torcular vocatam, ad sanguinis sive in contractam arteriam impetum minuentem, sive profluvium, dum Chirurgus agit, intercipientem. Universo enim collo eam compressionem adhiberi, tum arteria Aspera prohibet, tum vasa cætera non sinunt, quæ minime sunt comprimenda. Inter eam autem fasciam, & certas alias colli partes, eamque præsertim quæ comprimenda est, etiam excogites quæ sic interjicias, ut horum prominentia fasciam ab iis locis arceat quæ minime premenda sunt, tamen is qui maxime premendus est, quam ratione premi poterit quin simul cum premenda arteria, vena quoque, & nervi quos una ferri, diximus, comprimantur? Itaque ex his intelligis summam rei difficultatem. Ex superioribus autem satis perspicis, si difficile est truncum aliquem ita vincire, ne proximæ alteri parti noceas, dum in profundo, & sanguine scatente loco res agitur; satis, inquam, perspicis, quanto difficilior sit ramum aliquem proximum sine eo periculo deligare, cum ad illas difficultates tenuitas quoque accedat, quæ, si nihil aliud, certe pervidendi, quis de ramis vicinis pluribus fauciatus sit, aut ubi fauciatus, facultatem plurimum minuit. Quæ omnia etiam uti dixi, ita esse debere videantur; tamen haud ignarus, nonnunquam succedere posse quæ sperare minus auderes; idcirco responsum meum contraxi, ut nulla ferme arte rem consequi licere, dicerem. Nec me ita respondisse poenituit, cum in curationem postea incidi vulneris, Jugulari Internæ venæ inflicti, a Cel. Schlichtingio (*) propositam, cujus spem ut omnes imitari possunt, sic utinam & felicitatem consequi possent.

23. Sed illa in colloquis. Alterum per litteras quaesitum est A. 1735. Juveni viginti quatuor annos nato, bonoque corporis habitu prædito, inflicto quadrangulato acuto pugione vulnus fuerat, quod a colli sinistro latere tribus infra auriculam transversis digitis, oblique tendebat initium versus Spinalis medullæ. Et si e vulnere nihil ferme prodibat sanguis; tamen illico Juvenis concidit, movendi, & sentiendi facultate in omnibus quæ infra caput sunt, partibus adeo destitutus, ut domum ferendus fuerit, & in lectulo collocandus, ibique cum inter paucas quas ægre respirans, edebat voces, frigere se, diceret, igniario aereo vase temere femoribus, tibis, malleolis admoto, exustiones, quæ in sæda ulcera degenerarunt, nequiquam fenserit. Alvi primum, & vesicæ recrementa non reddebat; post aliquot autem dies lotium infusus, nedum invitatus, emittebat. Cum a Medico, Chirurgoque diligenter curaretur; die exacto decimo faustissimo primum aliquid sentire coepit sinistrum corporis latus, vigesimo autem sinistri utriusque artus digiti nonnihil moveri, inter eum vero, & trigessimam diem sensum utraque facultas magis, magisque augeri in sinistro quidem latere. In dextero autem, id est vulnere oppositum non nisi trigesimo secundo die redire sensus coepit, tum deinde & motus, ad eundemque modum paulatim augescere. Et quamquam sic satis die quadragesimo corpus universum sensus, & motus jam erat compos, sic satis, inquam; nondum enim stare, nedum incedere licebat; imo etiam VII. Kal. Junii, cum vulnus inflicto fuisset posttridie Kal. Februarii; Juvenis vix e cubiculo egrediebatur, & crure utroque extenuato, & quasi arefacto, non secus ac infans qui ingredi addiceret, lente, & pedetentim incedebat; tamen & motu, & sensu infirmiore etiam tum utebatur dextera parte, quam sinistra. Hujus igitur discriminis cum ex me causa quaereretur, ponendam videri in medullaribus illis fibris, indicavi, quæ inter dexterum,

(p) Epist. 54. n. 18. (q) Epist. 26.

(r) Epist. 11. n. 21. & seq. (s) Epist. 11. n. 18. 20. (t) Epist. 44. n. 7.
(u) De Renne. Vuln. S. 2. c. 2. (v) Art. N. C. Tom. 8. Obs. 19.

mine, ventris Partibus interioribus alio loco (z) ponitur. Hic potius juvat quasdam alias, quæ a te Sepulchreto addi possint, historias commemorare, ad thoracis ictus, & compressiones, de quibus agimus, attinentes. Missa igitur suspitione Gahrlepii (a) de ossibus interpleuram, & tunicam pulmonum ad juncturam costarum genitis, quasi prima eorum causa fuisset olim pectoris ad solum vehementissima allisio; lege apud Bohonium (b) de illo Sene adeo violenter ad scammum alliso, ut costis quinque transversim fractis, intra nycthemerum suffocatus obierit. Alterum quoque idem Auctor (c) dissectuit multo citius mortuum, quia præter costas multo plures contraxerat, nonnullasque luxatas, ex disruptis Intercoastalibus vas, & altera ex Internis arteriis Mammariis effusus intra thoracem sanguis suffocationem acceleraverat. Hic autem curru onusti rotis fuerat subactus. Suffocatio pariter, sed inopinata, & die morbi undecimo, hominem sustulit quem prostratum equi pedes calcaverant, rota autem onusti cursus, per dorsum traducta, compresserat. In hoc, præter alia, tres costas fractas, & quarundam cartilagineas plane disruptas conspexit Theodorus Zuingerus (d). Meryus (e) autem Senis, cui pectus rotæ præferant transeuntis redæ, fractas costas invenit duas, emphysematis tumore primum ad fracturæ sedem incipiente, & cum respiratiois difficultate, deinceps per ambitum ferme totum corporis augefcente, donec quarto die mors ingruit; ut mirari non oporteat quod Agricola (f) cujus lateri a fugiente equo tota aratri moles hic incussa fuerat, ut costam frangeret, cum emphysema accessisset, quotiescunque aerem inspirabat, in effractæ costæ regione protuberaret tumor magnitudine ovi gallinæ, mox in expiratione retrocedens. Sed hic, ut robustus, & juvenis, & alio modo curatus, ac Senex ille, servatus est. Pene omiseram historiam mirabiliorem, & ad ea quæ supra de cordis vulneribus scripta sunt, ferme attinentem. Christiani Vateri (g) est qui Fœminæ, a præterlabente curru in pectore graviter percussæ, eoque ipso die extinctæ, cum deprehendisset costas superiores prope sternum, una cum clavicula, a sinistris fractas, est minus erant introrsum flexæ, multoque minus pericardium læserant; tamen intra hoc, integrum, & sanguine effuso distentum, cordis ventriculū invenit dexterum non procul a mucrone ultra longitudinem unguis ruptum. Quam Observationem cum ea conjunges, quæ ex Regio Chirurgo Boirello in Sepulchreto (h) est relata, nempe Viri tertia ad quarta hora mortui postquam glans plumbea, e sclopeto emissa, pectus subierat, quæ est citra pericardium sublitterat, tamen intra hoc, prorsus illæsum, sanguine autem oppletum, cordis vulnus repertum est pariter in ventriculi dexteri parte inferiore. Quibus in historiis duabus minus te esse miraturum, credo, quod vulnus seu ruptio ejus ventriculi tam citam mortem attulerit, si animadverteris, ex illa pericardio minime sanguinem, ut in cæteris cordis vulneribus, exire potuisse, illicque igitur coacturatum consistatque id effecisse quod, propter internam causam in pericardii integri cavum effusus, potest, ut alibi (i) est indicatum, efficere. Quod vero cor, pericardio illa, ruptum sit, causam quidem Boirellus se proxime indicaturum, promiserat, cum suam edidit Observationem (k). Sed num præstiterit invenire non potui. Vaterus autem quid cogitaret, in calce ejus Observationis, videbis. Mihi quidem, aliorum cogitata non improbant, sane ubi de corde, aut arteriis agitur, ab ictu corporis a quo non attingantur, disruptis, addendum videtur id quod Lancisius (l) in arteriis ab simili ictu infirmatis non dubitabat esse attendendum, nimirum an forte percussio eo temporis puncto contigerit, quo dilatabantur; tunc enim ab ictu non recedentes, imo illi occurrentes, & contra nitentes, suæ ipsamet augment læsionis causam. Quanto autem paries, per se tenuis, dexteri cordis ventriculi, cum dilatatur, tenuior sit, tanto erit noxæ a percussione opportuniore. Quod si addas sanguinis in quibusdam corporibus majorem copiam; tanto magis eum parietem & dilatatum intelliges, & extenuatum, & subitæ, vehementissimæque percussione vi non difficillime rumpendum. Nec tamen eam dumtaxat Lancisii animadversionem satis esse, credo, ut rationem assequamur qua factum illud sit, quod a se visum, cum Salsubii esset, Valsalvæ, & mihi asseverabat Jacobus Cicogninus in R. Taurinensi Aula primum Confiliarius, & Medicus, deinde in hoc Gymnasio Collega noster, dum viveret, Ornatiſſimus.

(z) Epist. 54. n. 14. & seqq. (a) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 43. (b) De Renuo. Vuln. Sect. 1. (c) Ibid. (d) Dec. modo cit. 3. A. 5. & 6. Obs. 277. (e) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1713. Obs. 4. (f) Agr. C. N. Tom. 5. Obs. 51. (g) Dec. 3. cit. A. 9. & 10. Obs. 103. (h) Ibid. (i) Ibid. (j) Ibid. (k) Ibid. (l) Ibid. (m) Ibid. (n) Ibid. (o) Ibid. (p) Ibid. (q) Ibid. (r) Ibid. (s) Ibid. (t) Ibid. (u) Ibid. (v) Ibid. (w) Ibid. (x) Ibid. (y) Ibid. (z) Ibid. (aa) Ibid. (ab) Ibid. (ac) Ibid. (ad) Ibid. (ae) Ibid. (af) Ibid. (ag) Ibid. (ah) Ibid. (ai) Ibid. (aj) Ibid. (ak) Ibid. (al) Ibid. (am) Ibid. (an) Ibid. (ao) Ibid. (ap) Ibid. (aq) Ibid. (ar) Ibid. (as) Ibid. (at) Ibid. (au) Ibid. (av) Ibid. (aw) Ibid. (ax) Ibid. (ay) Ibid. (az) Ibid. (ba) Ibid. (bb) Ibid. (bc) Ibid. (bd) Ibid. (be) Ibid. (bf) Ibid. (bg) Ibid. (bh) Ibid. (bi) Ibid. (bj) Ibid. (bk) Ibid. (bl) Ibid. (bm) Ibid. (bn) Ibid. (bo) Ibid. (bp) Ibid. (bq) Ibid. (br) Ibid. (bs) Ibid. (bt) Ibid. (bu) Ibid. (bv) Ibid. (bw) Ibid. (bx) Ibid. (by) Ibid. (bz) Ibid. (ca) Ibid. (cb) Ibid. (cc) Ibid. (cd) Ibid. (ce) Ibid. (cf) Ibid. (cg) Ibid. (ch) Ibid. (ci) Ibid. (cj) Ibid. (ck) Ibid. (cl) Ibid. (cm) Ibid. (cn) Ibid. (co) Ibid. (cp) Ibid. (cq) Ibid. (cr) Ibid. (cs) Ibid. (ct) Ibid. (cu) Ibid. (cv) Ibid. (cw) Ibid. (cx) Ibid. (cy) Ibid. (cz) Ibid. (da) Ibid. (db) Ibid. (dc) Ibid. (dd) Ibid. (de) Ibid. (df) Ibid. (dg) Ibid. (dh) Ibid. (di) Ibid. (dj) Ibid. (dk) Ibid. (dl) Ibid. (dm) Ibid. (dn) Ibid. (do) Ibid. (dp) Ibid. (dq) Ibid. (dr) Ibid. (ds) Ibid. (dt) Ibid. (du) Ibid. (dv) Ibid. (dw) Ibid. (dx) Ibid. (dy) Ibid. (dz) Ibid. (ea) Ibid. (eb) Ibid. (ec) Ibid. (ed) Ibid. (ee) Ibid. (ef) Ibid. (eg) Ibid. (eh) Ibid. (ei) Ibid. (ej) Ibid. (ek) Ibid. (el) Ibid. (em) Ibid. (en) Ibid. (eo) Ibid. (ep) Ibid. (eq) Ibid. (er) Ibid. (es) Ibid. (et) Ibid. (eu) Ibid. (ev) Ibid. (ew) Ibid. (ex) Ibid. (ey) Ibid. (ez) Ibid. (fa) Ibid. (fb) Ibid. (fc) Ibid. (fd) Ibid. (fe) Ibid. (ff) Ibid. (fg) Ibid. (fh) Ibid. (fi) Ibid. (fj) Ibid. (fk) Ibid. (fl) Ibid. (fm) Ibid. (fn) Ibid. (fo) Ibid. (fp) Ibid. (fq) Ibid. (fr) Ibid. (fs) Ibid. (ft) Ibid. (fu) Ibid. (fv) Ibid. (fw) Ibid. (fx) Ibid. (fy) Ibid. (fz) Ibid. (ga) Ibid. (gb) Ibid. (gc) Ibid. (gd) Ibid. (ge) Ibid. (gf) Ibid. (gg) Ibid. (gh) Ibid. (gi) Ibid. (gj) Ibid. (gk) Ibid. (gl) Ibid. (gm) Ibid. (gn) Ibid. (go) Ibid. (gp) Ibid. (gq) Ibid. (gr) Ibid. (gs) Ibid. (gt) Ibid. (gu) Ibid. (gv) Ibid. (gw) Ibid. (gx) Ibid. (gy) Ibid. (gz) Ibid. (ha) Ibid. (hb) Ibid. (hc) Ibid. (hd) Ibid. (he) Ibid. (hf) Ibid. (hg) Ibid. (hh) Ibid. (hi) Ibid. (hj) Ibid. (hk) Ibid. (hl) Ibid. (hm) Ibid. (hn) Ibid. (ho) Ibid. (hp) Ibid. (hq) Ibid. (hr) Ibid. (hs) Ibid. (ht) Ibid. (hu) Ibid. (hv) Ibid. (hw) Ibid. (hx) Ibid. (hy) Ibid. (hz) Ibid. (ia) Ibid. (ib) Ibid. (ic) Ibid. (id) Ibid. (ie) Ibid. (if) Ibid. (ig) Ibid. (ih) Ibid. (ii) Ibid. (ij) Ibid. (ik) Ibid. (il) Ibid. (im) Ibid. (in) Ibid. (io) Ibid. (ip) Ibid. (iq) Ibid. (ir) Ibid. (is) Ibid. (it) Ibid. (iu) Ibid. (iv) Ibid. (iw) Ibid. (ix) Ibid. (iy) Ibid. (iz) Ibid. (ja) Ibid. (jb) Ibid. (jc) Ibid. (jd) Ibid. (je) Ibid. (jf) Ibid. (jg) Ibid. (jh) Ibid. (ji) Ibid. (jj) Ibid. (jk) Ibid. (jl) Ibid. (jm) Ibid. (jn) Ibid. (jo) Ibid. (jp) Ibid. (jq) Ibid. (jr) Ibid. (js) Ibid. (jt) Ibid. (ju) Ibid. (jv) Ibid. (jw) Ibid. (jx) Ibid. (jy) Ibid. (jz) Ibid. (ka) Ibid. (kb) Ibid. (kc) Ibid. (kd) Ibid. (ke) Ibid. (kf) Ibid. (kg) Ibid. (kh) Ibid. (ki) Ibid. (kj) Ibid. (kk) Ibid. (kl) Ibid. (km) Ibid. (kn) Ibid. (ko) Ibid. (kp) Ibid. (kq) Ibid. (kr) Ibid. (ks) Ibid. (kt) Ibid. (ku) Ibid. (kv) Ibid. (kw) Ibid. (kx) Ibid. (ky) Ibid. (kz) Ibid. (la) Ibid. (lb) Ibid. (lc) Ibid. (ld) Ibid. (le) Ibid. (lf) Ibid. (lg) Ibid. (lh) Ibid. (li) Ibid. (lj) Ibid. (lk) Ibid. (ll) Ibid. (lm) Ibid. (ln) Ibid. (lo) Ibid. (lp) Ibid. (lq) Ibid. (lr) Ibid. (ls) Ibid. (lt) Ibid. (lu) Ibid. (lv) Ibid. (lw) Ibid. (lx) Ibid. (ly) Ibid. (lz) Ibid. (ma) Ibid. (mb) Ibid. (mc) Ibid. (md) Ibid. (me) Ibid. (mf) Ibid. (mg) Ibid. (mh) Ibid. (mi) Ibid. (mj) Ibid. (mk) Ibid. (ml) Ibid. (mn) Ibid. (mo) Ibid. (mp) Ibid. (mq) Ibid. (mr) Ibid. (ms) Ibid. (mt) Ibid. (mu) Ibid. (mv) Ibid. (mw) Ibid. (mx) Ibid. (my) Ibid. (mz) Ibid. (na) Ibid. (nb) Ibid. (nc) Ibid. (nd) Ibid. (ne) Ibid. (nf) Ibid. (ng) Ibid. (nh) Ibid. (ni) Ibid. (nj) Ibid. (nk) Ibid. (nl) Ibid. (nm) Ibid. (no) Ibid. (np) Ibid. (nq) Ibid. (nr) Ibid. (ns) Ibid. (nt) Ibid. (nu) Ibid. (nv) Ibid. (nw) Ibid. (nx) Ibid. (ny) Ibid. (nz) Ibid. (oa) Ibid. (ob) Ibid. (oc) Ibid. (od) Ibid. (oe) Ibid. (of) Ibid. (og) Ibid. (oh) Ibid. (oi) Ibid. (oj) Ibid. (ok) Ibid. (ol) Ibid. (om) Ibid. (on) Ibid. (oo) Ibid. (op) Ibid. (oq) Ibid. (or) Ibid. (os) Ibid. (ot) Ibid. (ou) Ibid. (ov) Ibid. (ow) Ibid. (ox) Ibid. (oy) Ibid. (oz) Ibid. (pa) Ibid. (pb) Ibid. (pc) Ibid. (pd) Ibid. (pe) Ibid. (pf) Ibid. (pg) Ibid. (ph) Ibid. (pi) Ibid. (pj) Ibid. (pk) Ibid. (pl) Ibid. (pm) Ibid. (pn) Ibid. (po) Ibid. (pp) Ibid. (pq) Ibid. (pr) Ibid. (ps) Ibid. (pt) Ibid. (pu) Ibid. (pv) Ibid. (pw) Ibid. (px) Ibid. (py) Ibid. (pz) Ibid. (qa) Ibid. (qb) Ibid. (qc) Ibid. (qd) Ibid. (qe) Ibid. (qf) Ibid. (qg) Ibid. (qh) Ibid. (qi) Ibid. (qj) Ibid. (qk) Ibid. (ql) Ibid. (qm) Ibid. (qn) Ibid. (qo) Ibid. (qp) Ibid. (qq) Ibid. (qr) Ibid. (qs) Ibid. (qt) Ibid. (qu) Ibid. (qv) Ibid. (qw) Ibid. (qx) Ibid. (qy) Ibid. (qz) Ibid. (ra) Ibid. (rb) Ibid. (rc) Ibid. (rd) Ibid. (re) Ibid. (rf) Ibid. (rg) Ibid. (rh) Ibid. (ri) Ibid. (rj) Ibid. (rk) Ibid. (rl) Ibid. (rm) Ibid. (rn) Ibid. (ro) Ibid. (rp) Ibid. (rq) Ibid. (rr) Ibid. (rs) Ibid. (rt) Ibid. (ru) Ibid. (rv) Ibid. (rw) Ibid. (rx) Ibid. (ry) Ibid. (rz) Ibid. (sa) Ibid. (sb) Ibid. (sc) Ibid. (sd) Ibid. (se) Ibid. (sf) Ibid. (sg) Ibid. (sh) Ibid. (si) Ibid. (sj) Ibid. (sk) Ibid. (sl) Ibid. (sm) Ibid. (sn) Ibid. (so) Ibid. (sp) Ibid. (sq) Ibid. (sr) Ibid. (ss) Ibid. (st) Ibid. (su) Ibid. (sv) Ibid. (sw) Ibid. (sx) Ibid. (sy) Ibid. (sz) Ibid. (ta) Ibid. (tb) Ibid. (tc) Ibid. (td) Ibid. (te) Ibid. (tf) Ibid. (tg) Ibid. (th) Ibid. (ti) Ibid. (tj) Ibid. (tk) Ibid. (tl) Ibid. (tm) Ibid. (tn) Ibid. (to) Ibid. (tp) Ibid. (tq) Ibid. (tr) Ibid. (ts) Ibid. (tt) Ibid. (tu) Ibid. (tv) Ibid. (tw) Ibid. (tx) Ibid. (ty) Ibid. (tz) Ibid. (ua) Ibid. (ub) Ibid. (uc) Ibid. (ud) Ibid. (ue) Ibid. (uf) Ibid. (ug) Ibid. (uh) Ibid. (ui) Ibid. (uj) Ibid. (uk) Ibid. (ul) Ibid. (um) Ibid. (un) Ibid. (uo) Ibid. (up) Ibid. (uq) Ibid. (ur) Ibid. (us) Ibid. (ut) Ibid. (uu) Ibid. (uv) Ibid. (uw) Ibid. (ux) Ibid. (uy) Ibid. (uz) Ibid. (va) Ibid. (vb) Ibid. (vc) Ibid. (vd) Ibid. (ve) Ibid. (vf) Ibid. (vg) Ibid. (vh) Ibid. (vi) Ibid. (vj) Ibid. (vk) Ibid. (vl) Ibid. (vm) Ibid. (vn) Ibid. (vo) Ibid. (vp) Ibid. (vq) Ibid. (vr) Ibid. (vs) Ibid. (vt) Ibid. (vu) Ibid. (vv) Ibid. (vw) Ibid. (vx) Ibid. (vy) Ibid. (vz) Ibid. (wa) Ibid. (wb) Ibid. (wc) Ibid. (wd) Ibid. (we) Ibid. (wf) Ibid. (wg) Ibid. (wh) Ibid. (wi) Ibid. (wj) Ibid. (wk) Ibid. (wl) Ibid. (wm) Ibid. (wn) Ibid. (wo) Ibid. (wp) Ibid. (wq) Ibid. (wr) Ibid. (ws) Ibid. (wt) Ibid. (wu) Ibid. (wv) Ibid. (ww) Ibid. (wx) Ibid. (wy) Ibid. (wz) Ibid. (xa) Ibid. (xb) Ibid. (xc) Ibid. (xd) Ibid. (xe) Ibid. (xf) Ibid. (xg) Ibid. (xh) Ibid. (xi) Ibid. (xj) Ibid. (xk) Ibid. (xl) Ibid. (xm) Ibid. (xn) Ibid. (xo) Ibid. (xp) Ibid. (xq) Ibid. (xr) Ibid. (xs) Ibid. (xt) Ibid. (xu) Ibid. (xv) Ibid. (xw) Ibid. (xx) Ibid. (xy) Ibid. (xz) Ibid. (ya) Ibid. (yb) Ibid. (yc) Ibid. (yd) Ibid. (ye) Ibid. (yf) Ibid. (yg) Ibid. (yh) Ibid. (yi) Ibid. (yj) Ibid. (yk) Ibid. (yl) Ibid. (ym) Ibid. (yn) Ibid. (yo) Ibid. (yp) Ibid. (yq) Ibid. (yr) Ibid. (ys) Ibid. (yt) Ibid. (yu) Ibid. (yv) Ibid. (yw) Ibid. (yx) Ibid. (yy) Ibid. (yz) Ibid. (za) Ibid. (zb) Ibid. (zc) Ibid. (zd) Ibid. (ze) Ibid. (zf) Ibid. (zg) Ibid. (zh) Ibid. (zi) Ibid. (zj) Ibid. (zk) Ibid. (zl) Ibid. (zm) Ibid. (zn) Ibid. (zo) Ibid. (zp) Ibid. (zq) Ibid. (zr) Ibid. (zs) Ibid. (zt) Ibid. (zu) Ibid. (zv) Ibid. (zw) Ibid. (zx) Ibid. (zy) Ibid. (zz) Ibid.

quæ ad Ventrem attinent, non est hic vulnus omittendum quod simul ad ventrem, simul ad thoracem pertinebat, præsertim cum in thorace de quo hic loquimur, inciperet, in eodemque desineret.

40. SARTOR annos natus viginti, ob fortuitam nullius momenti causam ab alienigena vulneratus est accipit, neque angusto cultro ad imam partem lateris dexteri, æquid sceleri deesset, VIII. Kal. Aprilis A. 1742. quo nimirum die Resurrectio Servatoris nostri celebrabatur. Ab accepto vulnere non cecidit. Sed continuo in Nofocomium quod longiuscule inde aberat, delatus, in via vomuit, alvique, & vesicæ excrementa emisit. Illucque pervenit toto jam corpore frigidus, sine viribus, sine pulsibus, aut his obscurissimis, vix ut paucas pias voces proferre posset. Cum sanguinis exigua copia profueret, vulnusque propterea dilatarent, nihil sentire se, ostendit. Itaque post horam, aut paulo amplius, ab inflicto vulnere, sine spirandi difficultate, ullaque sanguinis per os ejectione, mortuus est.

CADAVER ibidem VI. Kalendas, & sex insequentibus diebus accurate persequimus, quippe nostris aptissimum studiis & magnitudine, & habitu, quem nec pinguem posses dicere, nec macilentum. Hic tantummodo quæ ad vulnus spectant, & si quid aliud occurrit præter expectationem, adnotabimus.

Abdomine, quod neque tumidum, neque tensum erat, & tantam continebat tamen, quantam dicemus, sanguinis copiam, inciso, & ducto, leviter cruenta omnium viscerum superficies apparuit. Quorum animadversis sedibus, & in his omenti, quod a dextris oblique ad ventris medium descenderet, a sinistris fursum retractum erat, & revolutum, ut ventriculū operiret, continuo ad vulnus examen perrexi-mus. Culter nonam inter, & decimam costam imam dextera Thoracis cavæ lateri subierat: mox pertusa, costis illis vicina, diaphragmatis parte carnea, proximum jecoris ipsum lateris transfixerat, ingrediens per faciem convexam aliquo ab infima crepidine intervallo, fissura duos circiter transversos digitos longa, paulo autem minori per cavum faciem egrediens; ut tota cultri per jecur via non longior esset duobus ferme transversis digitis. Egrediens autem transverberaverat renem dexterum aliquo ab summa parte intervallo, a facie anteriore ad posteriorem tranſeundo oblique pariter, ut in jecinore, quasi dimidio minori quam in hoc, fissuræ longitudine. Denique iterum diaphragma pervaserat, & per hujus carnem quæ est pone renem, infimum proflus thoracis cavum adierat, & postquam ad lateris duodecimæ dorsi vertebra Intercoastalis nervi truncum, & venæ sine pari quondam propaginem læserat, subiens musculos proximis qui ad Spinæ lateris feruntur, eosque ad transversum pollicis profunditatem, post tot alias Partes uno ictu trajectas, novissimos omnium convulneraverat. Itaque est neque in musculis Intercoastalibus, neque in diaphragmate, neque in jecinore, neque in rene, neque in Spinæ latere, neque in iis quos postremo indicavi, musculis, vas aliquod majus fauciaverat; tot tamen ex minoribus incidit, ut intra tam breve tempus quo superfluit vita fuit, non minor copia sanguinis effusa videretur, quam si Emulgentia vasa, aut vena Portarum, vel potius ipse Cava truncus, quæ illa invenimus omnia, fuissent vulnerata. Sublatis enim manu intestinis, tantum nigri sanguinis sub ipsis, & multo magis intra pelvim conspectum est, quantum plerisque eorum qui adierant, viginti saltem libras æquare videretur: quanquam cum sic fluidus esset, ut pauci omnino grumi in eo possent animadverti, neque usquam in universi cadaveris confectione polyposi quidquam in vasis, aut corde ipso conspectum sit; veri simile est, post mortem quoque ex incisus vasis defluere perrexisse, & effusi ante mortem, copiam auxisse. Certe elapso quarto ab interitu die, ex ipso vulnere sine quem ad Spinæ lateris descripsimus, sanguinem etiam tum providere, conspeximus. Num autem illinc per transfixum diaphragma in ventrem descenderit, an contra ex ventre in supini cadaveris thoracem pars sanguinis ascenderit, incertum est. Illud certum, cum priusquam thorax aperiretur, ventris visceribus amotis, exhaustoque sanguine, dia-

phragma inspicere, sanguinem ex ultimo hujus vulnere prodixisse, tum manu ad eam diaphragmatis partem appressa, fluctuare aliquid supra eum locum perceptum esse, & rugitum quendam & sonum, qualis a conclusis intra intestina flatibus solet, auditum, & aperto denique thorace aliquam in hoc repertam ab eo latere sanguinis copiam, eumque pulmonem fursum, nec mediocriter, retractum. Erat enim is a pleura undique solutus; cum sinister anterus, & ad latus, præsertim vero posterius, ad illam annexeretur. Præter hæc neque in thorace, neque in ventre quidquam dignum fuit quod hic adnotetur. Frustra enim propter vulnere renem, in vesica quæsitum est, num cruenti aliquid haberet; nam paucillum, quod in ea contracta restabat, lotii incruentum fuit. Quid vero in tunica alterius testis Albuginea animadvertem, alibi (f) indicatum est. Ex iis autem quæ in Capitis dissectione conspexi, hæc minime sunt prætereunda. Vertebralem arteriam dexteram, intra cranium saltem, quadruplo fuisse, quam sinistra, latiore: & in Tenui meninge non exterius solum, sed & qua Laterales cerebri ventriculos convellit, fuisse vasa non minori sanguinis copia distenta, quam si homo ex phrenitide obiiſſet. Sic etiam in iis ventriculis, quorum singuli aquæ limpide cochleari circiter habuere, Choroides plexus ex subatro rubebant. Sic quacunque medullaris incidebatur substantia, sanguineæ passim existebant guttulæ: quas si abstergeres, cerebrumque comprimeres, continuo alia erumperebunt latiores; mirum in tanta sanguinis in ventrem effusione, nisi ob læsum Intercoastalis nervi truncum convulsivam quædam contractiones excitatas esse, putemus quæ sanguini ex cranio reditu intercluderent. Quibus contractionibus vomitum quoque possitribuere; quanquam in rene, & septo Transverso vulneratis caularum fortasse satis habes, unde vomitum extitisse, credas.

41. Sed utcumque hæc fuerint; illud præcipue ex Observatione proposita, aliisque similibus colliges, si qui Chirugi Anatomen forte minus calleant, in gravissimos posse errores prolabi, vulnera quæ inter costas subeant, ad thoracem dumtaxat pertinere, existimantes. Nimirum fornicati diaphragmatis ignoracione decepti, supremamque propterea ventris partem inter costas excipi, nunquam animadverentes, hujus quoque viscera iis vulneribus lædi simul posse, ne suspicantur quidem. Tanto autem magis id augetur periculum, si qua causa in ventre sit quæ fursum magis diaphragma compellat, si hæc sit, ut in obesa muliere (*) commemoravimus, pinguedinis copia, si flatuum, si ve aquæ, si ve etiam moles distenti uteri, aut alterius visceris, ut puta hepatis, a quo vel secundum naturam haud raro altius attolli diaphragmatis partem dexteram, alibi (u) admonuimus. Periculum autem majus est, si non stanti, sed jacenti fuerit vulnus inflictum. Neque ita raro istiusmodi occurrunt vulnera, ut quatuor saltem exemplorum non meminerim, quæ Sepulchreto possis inferere, præter unum Glissonii (x), quod ab iis qui Sepulchretum confecerunt, & adauxerunt, omnino inferi debuisset. Primum est Mauchartii (y), illius quod supra (z) ex Valsalva produxi, in eo simile quod sanguis quantum e thorace exhauriebatur, tantum per diaphragmatis vulnus continuo illuc inflebat ex ventre. Alterum Goetzii (a) est. Tertium Cel. Heisteri (b). Kramerii (c) autem est quartum. Et in his quidem omnibus vulnus e thorace, quem primum subierat, per diaphragma in ventrem descendens, jecur perforaverat. Porro ob eandem quæ dicta est, conformacionem, positionemve diaphragmatis, & in posteriora declivitatem, etiam sit, ut si vulnera supremæ abdominis parti imposita, longius pergant, non ventris solummodo viscera, sed & thoracis simul cum diaphragmate faucientur. Verum ejusmodi vulnera a nobis, qui locum hic unde incipiunt, attendimus, interea quæ ad proximas Litteras attinent, referenda esse, vides. Eas igitur quam primum expectabis, & Valebis.

(f) Epist. 43. n. 30. (g) Epist. 27. n. 2. (h) Epist. Anat. 1. n. 13. (i) Anat. Hep. c. 9. in fin. (j) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (k) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (l) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (m) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (n) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (o) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (p) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (q) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (r) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (s) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (t) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (u) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (v) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (w) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (x) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (y) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (z) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (aa) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ab) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ac) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ad) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ae) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (af) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ag) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ah) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ai) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (aj) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ak) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (al) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (am) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (an) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ao) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ap) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (aq) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ar) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (as) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (at) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (au) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (av) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (aw) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ax) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ay) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (az) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ba) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bb) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bc) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bd) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (be) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bf) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bg) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bh) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bi) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bj) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bk) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bl) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bm) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bn) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bo) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bp) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bq) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (br) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bs) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bt) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bu) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bv) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bw) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bx) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (by) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (bz) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ca) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cb) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cc) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cd) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ce) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cf) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cg) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ch) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ci) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cj) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ck) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cl) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cm) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cn) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (co) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cp) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cq) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cr) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cs) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ct) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cu) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cv) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cw) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cx) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cy) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (cz) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (da) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (db) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dc) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dd) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (de) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (df) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dg) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dh) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (di) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dj) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dk) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dl) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dm) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dn) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (do) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dp) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dq) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dr) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ds) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dt) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (du) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dv) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dw) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dx) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dy) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (dz) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ea) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (eb) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ec) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ed) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ee) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ef) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (eg) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (eh) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ei) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ej) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ek) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (el) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (em) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (en) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (eo) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ep) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (eq) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (er) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (es) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (et) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (eu) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ev) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ew) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ex) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ey) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ez) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fa) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fb) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fc) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fd) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fe) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ff) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fg) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fh) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fi) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fj) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fk) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fl) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fm) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fn) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fo) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fp) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fq) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fr) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fs) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ft) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fu) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fv) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fw) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fx) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fy) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (fz) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ga) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gb) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gc) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gd) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ge) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gf) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gg) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gh) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gi) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gj) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gk) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gl) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gm) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gn) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (go) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gp) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gq) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gr) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gs) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gt) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gu) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gv) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gw) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gx) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gy) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (gz) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (ha) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (hb) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (hc) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (hd) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (he) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (hf) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (hg) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (hi) Eph. N. C. Cent. 1. Obs. 19. (hj)

Agitur de Vulneribus, & Ictibus Ventris, Lumborum, & Artuum.

PECTORIS, & Dorsi Vulneribus, ictibusque propositis, proximum est ut quæ ad Ventrem, Lumbosque attinent, proponamus, additis; ne præter hæc, alia supersint, iis etiam quæ ad Artus spectant tum Superiores, tum Inferiores. Ex Valsalva igitur has primum accipe Observationes.

2. JUVENIS duorum & viginti annorum a vacca impetitur, & cornu alterum inguen fauciatur. Febricitat: sensimque facies, & reliquum corpus tumere incipiunt, tumore tamen ad verum oedema non referendo. Nihil præterea quod memorabile sit, occurrit, nisi tandem circa diem decimum septimum. Tunc enim difficultas spirandi accedit, cum dolore quodam, & impedimento ad fauces, quod ægro boli instar esse videtur, a quo si possit liberari, cætera omnino sanum se fore, affirmat. Tamen aliquoties ab assidentibus tremores universi corporis animadvertuntur, ejusdemque tumor, interea auctus, persistat. Tandem circa diem ab accepto vulnere viginti secundum mors ingruit.

IN CADAVERE vulnus penitus examinatum, incipiebat prope Spermaticorum vasorum per musculos Abdominis transitum, pergebatque inter Rectum musculum, & tendines Obliquorum, ubi concreti sanguinis inventa est copia. Sed in ventris cavum non perveniebat. In hoc multum aere distenta intestina, multumque erat stagnantis feri. Quod pariter & in Thorace stagnebat. Cæterum hujus, & Ventris integerrima erant viscera. Quin passim musculi naturalem suam servabant soliditatem.

3. Si tumor quo istius Juvenis corpus distendebatur, aliquid forte habebat unde ad emphysema spectaret; intelligi hinc posset, emphysema non a vulneribus dumtaxat oriri quæ in thoracis cavum, aut in Asperam arteriam pertineant. Sic etiam Bartholinus, ut in hac habes III. Sectione (a) libri III. Sepulchreti, cum emphysema non faciem solum, sed universum corpus occupasset; vulnus tamen invenire non potuit profundum, nedum quod ullum interius læderet partem. Deditore autem, & impedimento illo ad fauces, ex mineris alias (b) a nobis injectam esse mentionem non modo ex Valsalva, sed ex Wepferi etiam Observationibus: quibus addere alias poteris Eberhardi Gockelii (c), Eliæ Camerarii (d), & Mauritiæ Reverhorstii (e). Eas omnes si inspicias; videbis, id impedimentum a vulneribus præsertim obortum, & sæpe quidem earum partium prope quas iste Juvenis fauciatus fuerat, prænuncium fuisse convulsionum, quas sub tremoribus specie hic quoque vides accessisse. Eodemque fortasse attinuit tum intestinorum distentio, tum per remoratum sanguinis, aut lymphæ motum, feri in ventrem, & in thoracem effusio.

4. VIR annos natus quadraginta, plumbeis & sclopo cominus ejaculatis frustulis ad dexteri ossis ilium marginem vulneratur. Nulla primum apparent symptomata. Nonnulli autem post diebus, febris cum maximo rigore invadit, & quotidie recurrit, donec circa diem decimum quartum, cum triduo ultimo anhelus fuisset, æger moritur, non sine vulneratorum intestinorum suspitione propterea quod ex vulnere materia prodierat ferme similis alvi recrementis. VULNUS tamen in Ventris cavum non pervenerat, hujusque erant omnia illæsa viscera. Scatebat vulnus plumbeis frustulis, quæ marginem ejus quod diximus, ossis minutim perforaverant.

5. Esti Valsalva huic Observationi illud addidit, ex simili vulnere in eadem parte hominem alterum ab se visum esse mortuum, sine ulla alia quæ attendenda esset, læsione, & tu quorum musculorum tendines illinc oriuntur, aut illuc desinant, minime ignoras; netamen existimes, id esse perpetuum, Observatio faciat Meekrenii, quæ vel in Sepulchreti ista Sectione (f) legitur. Spina enim, sive appendice ossium Ilii a globo exploso in varias partes diffracta, homo non modo per XII. ut in Sepulchreto est, sed per 14. septimanas vixit, ne tunc quidem, ut videtur, moriturus, nisi globus alia læsisset, gravisque animi subitus affectus novissime accessisset.

6. JUVENIS annos natus viginti tres abdomen fauciatur intervallo digitorum transversorum quatuor infra umbilicum. Consequitur vomitus. Ex vulnere exit omenti portio, quæ intra aliquot dies adeo colore, & habitu mutata erat, ut compactam carnem referret. Brevi post vulnus infectum tempore accedit diarrhoea. Interea abdomen naturalem servat constitutionem, si partem superio-

rem, ventriculo respondentem, excipias, quæ leviter intumescit. His deinde comites se addunt spirandi difficultas, & tussis creberrima cum purulentæ materiæ expectoratione, & molestissimo in dextera thoracis parte dolore. Quibus excruciat æger tandem moritur.

VEN-TER reclusus nullam primo aspectu ostendit læsionem. Sed mox querendo purulenta invenitur materia, quæ a dextris inter mesenterii, & peritonæi membranas, non secus ac si in folliculo contineretur, stagnabat. Hæc ab imo ventris usque ad diaphragma sub jecinore se extendebat.

Thoracis quoque respondens cavea dextera non idem modo pus habebat, sed ipso adeo replebatur, ut vix cultro, ad sternum excindendum, in eam cavam adactio, pus cum impetu profluerit. Eo in pure contractus erat pulmo, colore ad atrum vergens. Crassior autem sanies erat circa dexteram diaphragmatis appendicem; ut circa hanc pus ex ventre in thoracem, quasi per colum, trajectum esse videretur, cum tanta ejus copia ad hanc regionem superius, atque inferius stagnaret; nullus autem transitus sub sensum caderet manifestus. Eadem effusa materia copia, reteritur cum fœtera conjuncta, cum id diligentius inquirere prohibuit, tum illud quoque, unde tantum provenisset puris, num forte ex laceratis nonnullis mesenterii glandulis, vasisque chyliferis, quando nulla intestinorum, aut alius partis læsio potuerat inveniri.

7. Cum ipse qui viventem Juvenem viderat, & mortuum secuit, Valsalva fieri potuisse, credat, ut vulnus ad mesenterium pervenerit, intestinis videlicet ferri mucronem sua lubricitate declinantibus, ut in nonnullis transverberatis, & sine gravibus symptomatibus brevi felicitate sanatis, quorum aliquem in hoc Nosocomio etiam vidimus, factum fuerit, necesse est; nihil quidem prohibet intelligere, unde primum pus prodire coeperit.

Qua autem via e ventre in thoracem transierit, incertum est. In homine enim etiam supino, nedum ob spirandi additam difficultatem sic cubante, ut thorax altior sit aliquanto saltem, quam venter, pus ex hujus posteriore parte in illum trajici sic posse, ut tantomajori copia ibi, quam in ventre, congeratur, non ita facile est intellectu. Nec magis facile est, si forte exceptum in alveum sanguinis, traduci postea in thoracem, conjicias: cur enim in idem hujus latus quod respondet, proximumque est lateri quod in ventre obidet, potius quam in alterum, vel in utrumque, aut in aliam corporis partem? Ponenda igitur quedam precario sunt. At hoc ipso incertum, ut dixi, rem esse, patet.

Quod vero ad tantam attinet puris copiam; aut inde repetas licet, unde Valsalva, ex multaque mesenterii pinguedine, aut cogites, tanto plus puris a pure ipso fieri, quanto acrius est, ut creberrima ista indicabat tussis, & quanto longiori tempore, ut isto videtur casu, partes afficit, aut irritat, inter quas continetur.

8. VIR quidam paulo post cenam vulnus accipit, acuto instrumento epigastricum pertundens nonnulli ad lævam e regione ejus costæ quæ tertia est ab inferioribus numeranti. Illico vomit; sed omnino incurata: nec paucum e vulnere sanguinem ejicit. Horum utrumque redit eadem nocte. Mane vulnus vehementer dolebat; at ne levem quidem corporis contorsionem ferret sine querela. Postridie diluculo surgit, & quod incassum antea tentaverat, alvum recrementis exonerat, secundum naturam se habentibus. Sed cum lectum repetisset, quodam animi repentino quasi defectu prehenus, vivere desit post horam ab accepto vulnere trigesima sexta. ABDOMEN incidendo; niusculi circum vulnus inventi sunt ad non breve spatium undique sanguine quodammodo imbuti; ventris autem cavea, est abdomen contractum, nullo modo tensum fuerat, effuso sanguine oppleta. Vulnere suberant omentum, & Colon intestinum quæ hoc cum ventriculo colligatur. Levem omentum læsionem; nullam intestinum habebat. Sed ventriculus in medio erat vulnere pertusus, latitudine avellanæ æquante. Quamvis autem magna diligentia quæsitum fuerit, num aliud præterea læsum, num vas aliquod majus incisum esset; nihil præter illa quæ diximus, inventum est.

9. Cur, est plurimum sanguinis in ventris cavum defluxerat; tamen non secus ac si ventriculus vulnere pertusus non esset, nihil sanguinis per vomitum, aut per feculum apparuerit, docebit Scholium quod satis simili Observa-

servationi XXVII. (g) in Sepulchreti ista Sectione subiectum est, aliasque insuper causas addidit ex male ibidem omisso Glissonii (h) casu. Illi vero sanguinis in ventrem magnæ effusioni cita mors potissimum tribuenda est, præsertim quæ animi defectionem exceperit. Cæterum vel sine hac fortasse effusione, intra breve tempus eos ut plurimum mori quibus ventriculi nulla etiam pars sit præter fundum fauciata, cum indicant nervi quibus, nec paucis, neque una ab origine provenientibus, fundus instruitur, tum luculenter Observationes confirmant, illa etiam quæ modo ex Sepulchreto commemorata est, ob adjunctionem thoracis vulnus seposita, eidem videlicet proxima (i), & alia, quæ præter has a Bohnio (k) proferuntur, ad Sepulchretum addenda. Qui tametsi, ut Ettmülleri quoque Filius (l), recenset causas ob quas nonnunquam ventriculo inflicta vulnera lethalia non fuerint; neuter tamen reticet contrarias causas, unde videlicet plerumque mors, aut fortunatæ curationis magna sæpe difficultas sequatur. Videtis tria, quæ pariter Sepulchreto addas, vulnerati ventriculi exempla, quorum duo ex Cowpero indicant Lipshensium Acta Eruditorum (m), tertium habes in Commercio Litterario Norimbergensi (n). Quod vero tanta sanguinis copia subitus effusa, tensum tamen non esset abdomen, id a me quoque in Sartore (o) adnotatum fuisse, memineris.

10. JUVENI annorum viginti quinque duo ense vulnera imposita sunt, alterum digitis circiter quatuor transversis infra xiphoidem cartilagineam, sed a sinistris, videlicet circa quartam & quintam costam, ab inferioribus numerando; alterum paulo infra hypochondrium pariter sinistrum. Per utrumque vulnus erupit omentum. Vulneratus primum domum petit: ubi cum præ langore vix stare possit; inde ad Nosocomium fertur S. Mariæ de Morte. Ibi si decumbere velit, imminere sentit suffocationem; itaque erecta cervix cogitur respirare. Vomit interea. Nihil sumit. Hora decima tertia ab inflicto vulneribus moritur. VENTRE, & Thorace apertis, in utroque effusus sanguis, sed non magna copia, invenitur. Vulnus inferius in cavam quidem ventris ipsum quoque pervenerat, sed nulla attigerat viscera. Vulnus autem superius viscera læserat & thoracis, & ventris. Nam sinistri pulmonis inferiorem extremam partem nonnihil inciderat. Antea autem late pertusum diaphragmate, & superiore ventriculi parte utrinque convulnerata, non modo hujus cavum effuso sanguine impleverat; sed & ipsi ventriculo viam per diaphragma aperuerat; per quam cum omenti portione se intra thoracem coniecerat.

11. De ventriculi vulneribus paulo ante; de vulneribus autem diaphragmatis scriptum est Epistola superiore (p). In qua est vulnus diaphragmatis cum vulneribus aut cordis (q), aut jecinoris, & renis (r) conjunctum vidimus, nedum tamen vidimus, ut hic, junctum cum ventriculi vulnere. Quin erat vulnere illorum initium in thoracis parietibus; hujus autem est in ventris: fecitque is de quo in extrema illa Epistola (s) mentio injecta est, diaphragmatis positus, ut ab hoc initio profectum vulnus, thoracis quoque viscera, quemadmodum ab illo, ventris quoque viscera noxam intulerit. Quoniam autem id peculiare habet proposita Observatio, ut fauciatus ventriculus intra thoracem ascenderet per diaphragmatis vulnus; æquum est, ut super hac re, non rarissima quidem, ut nosti, sed tamen non creberrima, verba faciamus. Diaphragma ex nerva, id est tendinea, & ex carne quæ illam cingit, parte constans, & foramine non uno ab natura pertusum, sic thoraci, & ventri interjectum est, ut fornicis instar in illius cavum se attollat, nusquam magis quam ad posteriora, declivis, tantoque id magis in homine: quamobrem Pechlinus (t) admonuit, in vulnere quod thoracis parietibus inflictum sit longius a posteriore parte diffitis, sanguinis, aut puris effusi exitum, non modo inflexione corporis ad vulnus, sed inspiratione quoque esse adjuvandum, nimirum, ut quanto magis diaphragma, tunc contractum, accedat ad planum, tanto minor declivitas sit ab humoribus superanda qui in declivior, profundiorque illam thoracis posteriorem partem defluerint. Hujus autem ipsius Septi vulnera est ab Hippocrate (u) dicta sunt esse lethalia; ex voce tamen quæ Hippocrates usus est Galenus (x) intelligenda esse, monuit, quæ magna sint, & profunda, non quæ parva, & superficiei tenuis inflicta, ne si Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

in parte quidem septi nervosa sint; in hac enim ipsa non hæc, sed illa, scripsit, non coalescere. Certe autem in parte carnea sanatorum vulnerum plura afferri videbis exempla: ad quæ tria insuper vel ex uno Bosco (y) adjicias licet. In nervosa vero parte multo difficilius est paria exempla reperire. Attamen in historia ab Sennerti Socero adnotata, diaphragmate in nervosa parte transsoffo, illud saltem leges, post bimestrem curationem ægrum satis bene sibi habere fuisse visum menses quinque, si quidem Sennertum ipsum (z), non Sepulchretum (a) inspicias, in quo manca in nonnullis eadem historia descripta est. Cæterum vel carneæ, nedum tendineæ, partis vulnera in septo Transverso plerumque, nec intra longum tempus, lethalia sunt. Non tamen quotiescunque per illos ventriculus, quemadmodum in Sennerti etiam casu, in thoracem trajectus est, id semper contigit per viam a fauciante instrumento apertam. Nam; ut ovem prætermitam, in qua Peyerus (b) per transversum hiatus, palmo majorem, in carne superiore diaphragmatis parte, ab immani distentione ventriculorum disrupa, horum alterum e ventre compulsum intra thoracem invenit; certe loca sunt in diaphragmate, per quæ diductis carneis fibræ, & cedentibus membranis, ventriculus, aut intestini pars aliqua, aut alterius visceris e ventre potest in thoracem transire. Sic (præter œsophagi viam, de qua post dicetur) qua nervus alter Intercostalis traducitur, illac post vehementissimos intestinorum dolores, Colli aliquam, omenti vero, & pancreatis majorem partem transmissam referri video a Platnero (c). Sic etiam antieris inter fibras a xiphoidem cartilagine venientes, & proximas solet intervallum esse, per quod simile quidpiam posse contingere, imo contigisse in Agricola, suspicabar, in quo Romæ vidisse Leprotum, audiveram per mediam anteriorem diaphragmatis partem de Colo intestino tantum in thoracem admittum, quantum, si extenderetur, spithamam æquaret. Sed cum postea ab iis qui secuerant, accepissem, neque illud intestinum, neque foramen, cuius erat diameter duorum pollicum transversorum, per quod subibat illud, & exibat, indicium ullum prægressæ violentiæ, aut morbi ostendisse, & hominem decrepita ætate ex manifesta intra calvariam læsione mortuum; credere malui, sic a primordiis rem se habuisse, non secus ac Chauvetus (d) credit in militaris Tribuni Legato, in cujus sinistro thoracis cavo præter ventriculum, & lienis dimidium, pars quoque memorati intestini inerat, non per idem tamen foramen redeuntis per quod subibat, sed per alterum, quorum foraminum ora cartilagineæ arcæ ad transeuntia per se viscera adhærebant. Neque aliam in aliis duobus sententiam fuisse, videbis, Riverii (e), Bartholini (f), & Clauderi (g), si totum quidem Bartholini locum ab initio usque legeris, quod initium in Sepulchreto præteritum est. De uno eodemque ipse, & Clauderus verba faciunt; sed plura hic de vivente, ille de mortuo commemorat. Summa est, ventriculus, omentum, parum pancreatis, majorem Coli intestini partem in sinistra thoracis cavea detulisse, quæ Coli pars, una cum Duodeno, per idem exibat per quod ingrediebatur, amplum, nerveoque circulo circumscriptum, foramen in subiecto, quod totum erat carnosum, diaphragmate peculiari apertum. Juvenis vero alter, ab Riverio descriptus, ventriculus dumtaxat in thorace habuit, sed a dextris, quæ thoracis pars, cum pulmone careret, sic ab ortu rem fuisse, significabat. Qua autem via per septum Transversum prodiret Duodenum intestinum, Riverius siluit. Illa non siluit, Juvenem toto vitæ decursu spirandi difficultate non fuisse valde oppressum; sic enim in Sepulchreto quoque scribendum fuerat; & vehementissimos a sumpto antimonio vomendi conatus omnino irritos fuisse, impedito, ut Riverius putabat, ventriculo a costarum ambitu. Juvenis autem de quo Clauderus, & Bartholinus, libera semper, si subitaneum, & cito evanescens asthma excipias, usus fuerat respiratione: & inter vomitus propemodum infinitos est mortuus, tametsi ventriculus fortissimis aliquot vinculis ad diaphragma, eamque viciniam alligatus qua committebatur cum gula, parte reliqua sursum conversa ferme ad clavículas perveniebat, totum quasi occupans, cui erat inclusus, thoracis cavum. Quæ symptomata infantem vexarent bimestrem, ab ipso ortu male se habentem, in quo Carolus

S 3 Holtius

(a) Obl. 20. (b) Epist. 15. n. 9. (c) Eph. N. O. Dec. 3. A. 5. Obl. 37. & 38. (d) Ibid. Obl. 41.
(e) Epist. inter Problem. Ruych. 14. (f) in Additam. Obl. 4. cum Schol.

(g) S. 1. (h) Anat. Hepat. c. 9. in Sin. (i) S. 2. (k) De Renue. Vuln. S. 2. c. 4.
(l) in Program. cit. ad n. 33. Epist. 35. (m) A. 1699. M. Febr. in Relat. ejus Anat. ad Tab. 35. (n) A. 1736. Hebdom. 16. n. 4.
(o) Epist. 33. n. 40. (p) n. 4. & 6. (q) n. 3. (r) n. 40. (s) n. 41. (t) Hist. Vuln. Thorac. art. 11.
(u) Med. Pract. l. 2. p. 2. c. 15. (v) Comment. in cit. Aph. (w) De Facult. Anat. Lect. 4.
(x) Disp. de Hydrocel. not. q. ad §. 2. (y) l. 3. S. 8. Obl. 27. §. 1. (z) Eph. N. O. Dec. 2. A. 4. Obl. 100.
(a) Sepulchr. Obl. 27. cit. §. 2. cum Schol. (b) Ibid. §. 3. (c) Obl. 12. in Addit. ad cand. Sect.

Holius intestina ferme omnia cum mesenterio intra thoracem invenit traducta per foramen a natura formatum in diaphragmate a latere sinistro foraminis gula, ex Lips. Actis Eruditorum (b) cognosces. A natura quoque ipsa fissuram diaphragmatis factam esse, crediderim, per quam in fetu ventriculorum, lienem, partemque hepatis, Duodeni intestini, & omenti traductam vidit Cl. Stehelinus (i) in thoracis caveam sinistram; sic, inquam, crediderim, cum sinister pulmo uno dumtaxat ex lobo constaret, dexteroque esset triplo minor. Sciens prætereo quæ viscera ventris in thorace aliorum foetuum, quippe profus monstrorum, fuilli unius, humanorum duorum conspexerint Anonymus quidam (k), Lemeryus (l), Vernoyus (m), & diaphragma fere omnes perforatum. Susceptus enim sermo postulat, ut ad ea corpora quibus non prima conformatio, sed morbi vis, & vulnera præsertim, ventriculorum, aut viscus aliud aliquod traduxerint in thoracem, revertamur.

12. Littrii (n) Observatio difficilem respirationem, & crebros, sed irritos, vomendi conatus in cane fuisse indicat, cujus ventriculus thoracem per idem foramen suberat per quod gula egreditur. Neque enim sic a natura fuisse, docebat duo, alterum gula ipsius longitudo (ab aliis non adnotata) nimirum tanta, ut mox ventriculorum in naturalem sedem reducenti minime obstat: alterum magna fissura in quam fuerat id foramen diaphragmatis ampliatum, per quod gula eadem transire solet, tunc autem Duodenum intestinum transibat, quæ fissura cicatricem a longo, ut videbatur, tempore jam duxerat. Sic autem fissum diaphragma Littrii fuisse, credebatur, a violentissima aliqua fove gula convulsione, ventriculorum fursum trahente, sive contractione diaphragmatis, simul, & musculorum Abdominis, quam ventriculus, tunc forte solidioribus, ut in cane, alimentis plenus, adjuvasset. Ego autem cum ex superioribus plura, tum hæc præsertim ex Littrio censui a me tibi esse commemoranda, ut compertans, intelligere facilius possis, rectene alii alia vomitus instrumenta proponere consueverint, tum ubi ventriculus in thorace sit, a primordiis positus, an vi morbi compulsum fuerit, tum denique, ut alia post attingenda hic omittam; quibus agentibus causis eo compellatur. Nam quod visum est summo ætate hac nostro Viro, quanta vis sit qua musculi Abdominis in expiratione fursum urgeant ventris viscera, hinc posse affirmari quod exiguum septo Transverso infictum vulnus dilatent adeo, ut illac ventriculus in thoracem transeat; nempe intelligis, explicationis Littrii fortasse oblitum, quem effectum partim iis musculis, partim ei septo magna vi deorsum contracto, præsertim dum convulsione, aut conatu aliquo in cohibenda respiratione cum illis simul connititur, tribuere, ni fallor, decebat, si vulnus eo forte incidat, ut foramen amplificet per quod oesophagus trajicitur, evidens est, ad eundem effectum inducendum satis esse minores vires. Eo autem vulnus in milite inciderat in quo Glandorpius (o) per eandem oesophagi viam ascendisse invenit sinistram ventriculi partem cum portione Duodeni, & Coli intestini: is vero ex dolore, & hæmorrhagia, syncope maxima cum respirationis interceptione, & singultu absumptus fuerat. Accidere etiam potest, ut minori vi opus sit nonnunquam, nempe in homine cui per se via illa oesophagi latior sit, quemadmodum fuisse a me visum in Sutor quodam, ad te scripsi (p). Est contra, cum vis requiritur aut diutius repetita, aut validissima, sive illa eadem via, sive alia superanda sit non satis per vulnus aperta. Repetita est dies octo in eo cui Henricus ab Heer (q) per stricissimum diaphragmatis vulnus irrepsisse in thoracem vidit Tenuia intestina, ut qui non nisi nono tandem die symptomata est passus, id ostendit, intra que horas viginti quatuor necantia. Fortasse autem repetita est mensis quinque in Studio illo de quo supra (r) ex Sennerto injecimus mentionem; illis enim exactis mensibus, male habere demum coepit, proximis autem diebus post sæpe iteratos vomitus, & pessima signa mortuus est; ut quamquam indicium sit, non parvam ventriculi partem septem ante mensibus cum vulnus infictum est, sinistram thoracis cavum subisse, & cor in dextrum latus, ubi inventum est, compulsum; ibi enim ipse post acceptum vulnus jubebat observare pulsum cordis; tamen ventriculorum totum, omentumque, & pancreas totum non

nisi postremo illo tempore illuc ascendisse, est aliquis credendi locus. Estque etiam magis in eo militum Ductore, in quo, si Sepulchretum (f) inspicias, paulo ante laudatum Henricum credas; si vero Pareum (t) unde est, legas, Guillelmum scias deprehendisse magnam Coli intestini partem in thoracem compulsum per vulnus, vix minimi digiti capax, carnem diaphragmatis transfodiens. Nam et si intestinum dolor sub vesperam ingruere solebat; tamen octavo solum mense ex quo vulnus acceptum fuerat, ad eam acerbiter incrementum, ut nullo proficiente auxilio, interiret. Quod si forte non idem casus est, quem ex Ballonio in Sepulchretum (u) videbis relatum; ut dolor is non nisi post annum ortus dicitur; sic diuturniore impulsu opus fuisse videtur ad majorem illam Coli partem per diaphragma traducendam, postquam minor sensum, ut Ballonius ipse arbitratur, subierat. Certe autem Vir Cl. Fantonus in Scholio ad paternam Observationem XIII. adolescentis, ante annum fauciat, ventriculorum in thoracis cavum intrusum per diaphragma, qua oesophagus transit, disceptum, non antea censet in illam pervenisse, quam crebris ab inflicto vulneris tempore doloribus, & vehementibus vomitionibus contractus, & in diaphragma adactus, hoc tandem satis disceptare, & sic viam sibi dilatate valuerit. Optat vero id quod nos quoque in pluribus hujus generis Observationibus, ne illa quidem Valsalvæ prius excepta, subinde optavimus, ut quædam insuper adnotata fuissent ad transmissi visceris, ut ad transmittentis Septi conditiones attentia: in hisque nos ipsam ponimus tum visceris, tum vulneris sedem, ut in Clossii historia (x) que partem quidem Coli intestini superiorem, ventriculo proximam, spithamæ longitudine supra diaphragma hæsisse, ostendit; sed qua hoc parte fuerit perfusum, illud vero utro thoracis cavo exceptum, non ostendit. Quoniam autem hominem toto biennio nullam ex suo vulnere in naturalibus, & vitalibus facultatibus sensisse lationem, scribit, donec colica passione prehensus diem obiit; credibile fuisset, intestinis, quæ tanquam sollo inflata reperta sunt, impetum in vulnus facientibus, tum demum majori saltem parte illius Coli portionis transitum patefecisse, nisi consolidatum fuisse reperit. nescio quid dicens, num de vulnerato non nihil Colo, an diaphragmate intelligat, nos dubios relinqueret. Sed de repetita diutius vi satis: nunc validissima exempla adiciamus.

13. Certum est, in prima omnium ventriculi intra thoracem contrusi Observationum, quæ a Pareo (y) habita est in Lato, contrudentem vim fuisse validissimam. Nam per vulnus tendens partis diaphragmatis, vix pollicem latitudine æquans, illic compulsum, triduo postquam illud infictum fuerat, inventus est. Bartholinus (z) autem illic non ventriculorum modo, sed & partem aliorum viscerum, & nominatim lienis, deprehendit Observatione, in perisque ejus simillima quam ex Valsalva propotimus. In utraque enim simul cum diaphragmate vulneratus ventriculus, & pulmo est, & mors contigit tertio die: ut tempore spectato, validissimum fuisse vim, appareat; tamen in neutra sciamus, qua diaphragmatis pars fauciat sit, neque in illa Bartholini angustum, an latum fuerit vulnus; nec, quod consequitur, quanta fuerit in diaphragmate resistentia a contrudentibus viribus superanda. Sed hæc in Schoberi (a) casu minime desideramus, qui eo violentior fuit, quod sine ullo vulnere gravissima cardiacia, creberrimis incredibilis copiae nigricantis materię vomitibus, vomendique conatibus diluculo ortis, proxima nocte confectus Juvenis, intra thoracem ostendit cum omento, & intestino Duodeno, Jejuno, & Ile parte ventriculorum, ea materia, flatibusque adeo distentum, ut cor, & pulmones arcte comprimeret, illuc admissum per idem quo gula emittitur, foramen maxime dilatatum & atonum. Quod, si eorum memores quæ supra (b) cum Littrio, & Fantono attigimus, fieri potuisse, non dubitabis. Inverso enim per evidentes convulsiones fibrarum oesophagi, ventriculi, & intestinorum motu, proclive est intelligere, ventriculorum simul ab oesophago fursum raptum, simul (c) ab nondum valde infirmatis diaphragmatis carneis fascibus, foramen illud intercipientibus, repressa deorsum ex raptu ventriculo materia, inanem hunc fuisse traductum, eademque ratione intestina illa, donec persistente, adactaque vi inverli motus, materia ab inferioribus fursum usque

usque acta, faeces illos vinceret, ventriculorumque distenderet. En tibi viscerum, per septum Transversum in thoracem trajectorum exempla propotimus omnia quæ scribenti quidem hoc tempore erant in manibus, ut possis cum proposita Valsalvæ Observatione comparare: propotimus, inquam, omnia. Nam quod ex Valentino (d) proferre potuissim omenti, per foramen, in canis diaphragmate olim factum, in thoracem illapsi, & levius est, & sine sedis foraminis illius, & symptomatum mentione. Gravior est quidem, & hæc proponit, sed illam silet, quantum ex Actis possum Lips. Eruditorum (e) colligere, Observatio Beckeri in quadrienni puero, cujus ventriculus, lien, & jecur in sinistro erant thoracis cavo, a biennio, ut puto; nam biennium vitæ primum satis commode traduxerat. Nec vero huc attinet, ut quidam videtur credere, Caroli Pisonis de morbo. a sero Sect. 2. part. 2. c. 7. Observatio de immuni renis alterius tumore. Si enim illa est, ut opinor, quæ citato Pisonis cap. VII. sub numero extat XLVI; ab renis tumore Septum quidem proponit fursum compulsum; sed non perforatum. Perforaverat autem erodendo pancreatis ingens canerosus tumor, sui que partem intra sinistram thoracis cavum coniecerat in Hertodi Observatione, alio loco in Sepulchretum (f) relata. Verum, ut suspicionem seponas meam, quam tibi alias (g) super ea Observatione significavi, satis superque in illa habes aliarum causarum, per quas prægressa, & repentina morte explices. Tandem cum Epistolam hanc recenserem, in Dissertationem incidens quæ inter Chirurgicas a Præcl. Hallero collectas est LXIX. in ea ut nulla exempla deesse ex iis quæ commemoravi, sic nonnulla esse, animadverti, quæ aut propter libros quibus carebam, aut propter linguam qua scripti sunt, inspicere non potueram. Tu in ea leges, in primisque illud puellæ Argentoratensis (h) cujus describuntur & symptomata, & vulnus, quo potissimum intra non multas horas confecta est, in tendinea parte septi Transversi, qua lienis, & ventriculi portio thoracem subierat, & cor dextrorsum compulerat. Porro quatuor alia, ut videntur, exempla legi quidem apud Blancardum (i), sciebam. At si cum iis conferas quæ a me supra allata sunt, eadem revera esse, ac totidem ex ipsis, continuo agnosces; quamvis mutatis, non sine stomacho ferenda, transformatione Studio illo apud Sennertum, in Revaliensem dumtaxat quendam (k); Filio D. Rat apud Riverium, in Militem (l); Lato apud Pareum, in Fabri cuiusdam Famulum (m); & Militum Ductore apud eundem, in Famulum cuiusdam Centurionis (n). Quæ duæ novissimæ mutationes cum vel in ipso initio libri sui a Blancardo posita sint; mirum non est, quod multis candidis sincerique Viris, ex se alios priusquam aliter deprehendant, æstimantibus, & propterea nihil tale suspicantibus, in hisque Bohnio (o) fucum fecerint, ut simul cum duabus modo indicatis apud Pareum Observationibus, Blancardi primam, & secundam, quasi non ex illis efficias, laudaverit. Sed a vulneribus abdominis ad alia ipsius ictum, compressionem, concussionem exempla e Valsalvæ schedis exscribenda transeamus.

14. VIRI annorum triginta quinque abdomen equi calce percussus; unde sævis doloribus, & vomitu correptus, in S. Mariæ de Vita Nosocomium excipitur. Ibi perstantibus doloribus cum sensu ingentis ponderis in ventris imo, summaque spirandi difficultate, moritur. CADAVER, a Valsalva, & Petro Molinello dissectum, etiam nullam in Abdominis musculis, percussio loco respondentibus, contusionem ostendit; tamen, Ventre aperto, magnam videndam exhibuit copiam sanguinis effusi, qui corrumpti jam coeperat. Rupta erant sanguifera vasa quæ per omentum ducuntur; huic autem subiectum intestinum ileum quasi in transversum omnino discissum. In Thorace pulmones ingenti affecti inflammatione: & polyposa non mediocri concretio in dextero cordis ventriculo.

15. Salvo abdomine, quod percussioni primum occurrit, conclusus sub ipso. Partes diffumpi, novum non est. Sic Tulpus (p) bis, sic Fontanus (q), sic Crassius (r), sic Raygerus (s) lienem viderunt diffruptum, tres primi a baculi ictu, ultimus ab alisione: quibus historiis, in Sepulchreto propositis, addas licet alias quod Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

que, ut quæ in Commentariis extat Imp. Sc. Petropolitana Academia (t), & quæ apud Cel. Heisterum (u). Utraque enim, illa a pugno, hæc ab equi calce ejusdem visceris disruptionem, eandemque ex eo immanem effusionem sanguinis in ventrem ostendit. Ab simili equi ictu in duobus aliis idem accidisse, ex Commercio Litterario (x) cognosces. Idemque in totidem, sed baculo percussis, compertum retulerat Bohnius (y). Nec desunt alia ejusdemmodi exempla, ab ictibus cujusque modi, & inter hos a lapsu, quæ Jo. Petrus Albrechtus (z), Gorth. Budæus (a), Lucas Schrockius (b), Hieronymus Laubius (c), Joannes Storchius (d) adnotarunt. Quod si alia præterea cupis; duo leges apud Hoffmannum (e), & ubi quæras totidem, laudatum indicabit Commercio (f), ubi vero quædam alia insuper, monstrabit Platnerus (g): quam jure scripsisse, intelligis, ex violenta abdominis compressione inclusa viscera rumpi, laceratque ita, ut effuso omni sanguine, cito mors sequatur. In liene autem hoc frequentius evenire, observationibus compertum esse. Nec mirum, si mollem ejus structuram, tenui conclusam tunica, attendas. Quod si morbi vi mollior fiat, & tardigradi sanguinis copia infra costarum munimentum extendatur, tanto facilius diffumpitur, & tanto plus sanguinis, citiusque effundit, eoque celeritorem affert interitum. Imo in Comite quodam (h) cum tumidus, & quasi pulchellus esset factus; per se ruptum, & repentinæ mortis causam fuisse, constat. Sed in renibus quanto structura compactior, tanto justior admirandi causa est, cum in citata Laubii Observatione legimus, ob externam ex casu ab alto compressionem non modo lienem ad rupturam usque contusum, sed etiam in dorso renis sinistri foramen, duorum digitorum capax, fuisse deprehensum, aut apud Mauchartum (i), baculi reveris, non acuti, validissimam ac pernicissimam impulsionem ad abdomen, citra ullam continui solutionem, sed tamen ex opposito crepantis hinc lethaliter mediis renis fuisse causam. Et quoniam in sermone incidenti de visceribus urinæ interficientibus; fac perlegas Theod. Zuingeri (k) Observationem accurate signa, & anatonem exhibentem Juvenis qui noctu ad arboris prominentem ramum forte hypogastrium allidens, nullum quidem exterius læsionis indicium, at disruptionem vesicæ retulit, urina tunc plenæ.

Verum nequid aliis contingat visceribus, prorsus omittamus; supra laudatus Heisterus (l) præter illam quam ante indicavimus, duas protulit Observationes, alteram ventris viscerum quæ graviter confusa, & lacerata reperta sunt a vehementioribus, quantumvis tenuioribus, baculi ictibus; alteram in qua jecur medium omnino diffruptum a vi extrinsecus illata deprehendit, tamen exterius nulla omnino conspiceretur læsio. Diffrupti quoque jecinoris exemplum tibi indicabit Platnerus (m), alterumque Commercio Litterario (n): unde (o), tertium insuper habebis viri ab equo in regione hepatis graviter percussus, ut costæ imæ frangerentur, & visceris illius pars gibba fissuris funderetur compluribus, non ita profundis, ut opinor, cum venter non sanguine, sed multa lymphæ cruenta repletus fuerit, æger vero non ante quartum interierit diem; ut ad memoriam revocet historiam illam Hippocratis (p): Puer a mulo percussus ventrem, & hepatis, mortuus est quarta die; quamquam hic puer, ut vides, ad ventriculorum quoque percussus fuit, & longe alia habuit symptomata, quæ omnia attendens gravis Interpres Valesius (q), ob acutissimam viscerum illorum inflammationem, non ob disruptionem, sanguinisque effusionem, puerum mortuum esse, censuit. Certe si magna sanguinis fuisset effusio, & ratio, & Lanzoni (r) Observatio ostendunt, citissimam futuram fuisse mortem. Qui enim pugno ad jecur violenter percussus, extravasationem sanguinis in ventre habuit, & rupturam vasorum in hepate, is mox ab ictu in terram prolapsus, misere expiravit. Huc etiam septennis pueri spectaret historia (s), quem supinum adeo presserant equi currum trahentes, ut ex rupto a dextris, & lacerato jecinore sanguis in totam ventris, exterius illæsi, caveam effusus fuerit; nisi mortis quam statim obierat, aliæ simul tum in thorace, tum in cervice deprehensæ essent causæ. Sed ut propius denique ad Valsalvæ Observationem accedamus, quæ ab ictu rupta sanguifera omenti vasa, Ileumque inte-

(b) A. 1702. M. Decemb. (i) Tentam. Medic. th. 3. (k) Zodiac. Medic. Gall. A. 4. M. Febr. Obs. 14.
(l) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1734. (m) Comment. Acad. Sc. Imp. Petropol. Tom. 3.
(n) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1706. Obs. Anat. 10. (o) Sepulchr. S. hac 3. Obs. 21. §. 9. (p) Epist. 37. n. 30.
(q) Sep. Obs. cit. §. 3. (r) n. 11. (s) Obs. cit. §. 4. (t) Oper. 1. 9. c. 30.
(u) l. 3. S. 14. Obs. §. 8. (x) Sepulchr. cit. Obs. §. 10. (y) Sep. l. 4. S. hac 3. Obs. 21. §. 7.
(z) Ibid. Obs. 20. §. 2. (a) Eph. N. C. Gent. 3. & 4. Append. n. 12. c. 4. (b) n. 12. (c) 6. 2. §. 18.

(d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 2. Obs. 124. (e) A. 1706. M. April. (f) l. 3. S. 22. Obs. 40. (g) Epist. 40. n. 27.
(h) l. 4. (i) Anat. Pract. Ration. (k) Cent. 2. Obs. 9. (l) Cent. 1. Obs. 70. (m) Ibid. Obs. 2. (n) Ibid. Obs. 1.
(o) De Renne. Vult. S. 2. c. 4. (p) Sepulchr. S. hac 3. Obs. 29. §. 9. vel potius 8. (q) Ibid. §. 11.
(r) Ibid. in Addit. Obs. 31. (s) Ibid. Obs. 30. (t) Tom. 1. in Obs. Anat. (u) Ibid. Chir. P. 1. l. 1. c. 15. not. ad n. 6.
(v) A. 1736. Hebd. 16. n. 4. & A. 1740. Hebd. 21. n. 1. (y) De Renne. Vult. S. 2. c. 4. (z) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. Obs. 6.
(a) Eranud. Cent. 1. & 2. Obs. 108. (b) in Schol. ad eand. Obs. (c) Aft. N. C. Tom. 2. Obs. 21.
(d) Commercio. Litter. A. 1731. Specim. 36. n. 2. (e) Medic. Rat. Tom. 3. S. 1. c. 7. §. 34.
(f) A. 1738. Hebd. 32. n. 1. ad Part. 4. & 5. (g) Inst. Chir. §. 717. not. a. (h) Aft. N. C. Tom. 5. Obs. 125.
(i) Differt. de Mydriasi §. 32. (k) Eph. N. C. Cent. 7. Obs. 36. (l) not. cit. (m) not. cit.
(n) A. 1738. Hebd. 32. n. 1. ad Part. 4. (o) A. 1734. Hebd. 35. n. 2. (p) Epist. 1. 5. n. 17.
(q) Comment. in hanc hist. quæ ipsi 38. (r) Aft. N. C. Tom. 2. Obs. 6. (s) Commercio. Litter. A. 1740. Hebd. 32. n. 3.

stinum propofuit; eadem vafa in fœmina, a milite percuffa, & poftquam totus venter fanguine effuso repletus erat, fubito mortua, eadem, inquam, vafa difrupta indicarunt fanguinei grumuli inter omenti folia conclufi, quemadmodum in Commentariis leges Petropolitani, paulo ante laudatis (1), ubi quidem in rariffima hac lefione illud forte in confiderationem trabendum effe dicitur, quod præter naturæ inftitutum, omentum fundo uteri connatum effet; id tamen Valfalvæ Obfervatio minime neceffarium effe, oftendit. Quod vero ad inteftinum attinet equi calce perruptum, conferre cum hac poteris Obfervationem Kramerii (u) in rhedario ab eadem caufa, fed neque eodem tempore, neque ab eadem tantum interna lefione mortuo; nifi forte llei inteftini ruptionem tribuendam potius gangranæ inteftinorum, fufpiceris, quemadmodum cum Helwichio (x) tribuendus ille certe eft Coli, & llei Sphacelo jam affectorum, hiatu in adolescente animadverfus diebus non ita paucis extincto poftquam herus ventrem baculo graviter percufferat, Sed vel fine his, habes in Sepulchreto (y) non modo inteftinum Jejunum a violentiffimis pedum infultibus in lumbos, dorſumque proſtrati hominis difruptum, fed & Ileum, & Colon ob vehementiffimam abdominis arboris truncum alliffionem in altero (z), quamvis integro in utroque abdomine, non uno loco perforata. Noli autem mirari, quod mulieris, aliis a me Litteris (a) tibi deſcriptæ, cum fuiſſet baculo abdomen percuffum, & ſymptomatibus infeſcutis graviffimis, ipſa de huius dolore tantummodo quereretur, nihil tamen leſum; nedum ruptum, in ejus ventre deprehenſum fuerit. Neque enim omnes icſus eadem vehementia inſurgunt, neque omnibus inteſtina æque difruptioni opportuna ſunt tum a natura, quemadmodum cervos Ariſtoteles quidem ſcripſit (b) inteſtinum tam tenue, imbecille habere, ut etiamſi leviter percufferis, poſſit rumpi, cute adhuc integra; tum a repletionem. Et certe utrique eorum quorum modo hiftorias ex Sepulchreto indicavimus, ſumme tunc repleta, & diſtenta præter ſolitum fuiſſe inteſtina a nimio potu, ex earum, & Scholii inſuper ad primam additi leſione cognoſces. Tu igitur ſiquando præter icſum abdominis vehementiam, inteſtinorum a quacunque cauſa diſtentionem fuiſſe tunc, ſcias, graviffima autem, & peculiaria accedant ſymptomata, quid intruſi fieri poterit, etiamſi nullam in cute leſionem videas, ſufpicias, & ſi nihil aliud poteris, ad certe ſufpicionem tuam iis quorum intererit, caute indicabis. Imo etſi neque illa diſtentione fuerit, neque ſtatim adſint illa ſymptomata, noli ſine omni timore effe, ne quidpiam forte latentis mali ſenſim creſcat, ejuſque indicia de improviſo univerſa erumpant. Sapienter Plancus ad M. Tullium (c): non poſſum non exhorreſcere, ſi quid intra cutem ſubeſt vulneris, quod prius nocere poteſt, quam ſciri, curarique poſſit. Leges Obſervationem Loſpichleri (d), & vera a me dici, intelliges. Viro enim qui ante annos plurimos cum equo corruens, vehementem paſſus erat ephippii in ſtomachum compreſſionem, eamque neglexerat, quid tandem lethalis morbi circa ventriculi fundum obortum ſit, videbis. Ab ejuſmodi autem icſibus etiam in aliis viſceribus ſcirrhus naſci, neque ita raro, ſcite monuit Platnerus (e), mala, ut noſti, quæ ſenſim oriuntur, & creſcunt, quanquam ab initio ipſo nonnunquam accidit, ut indicia acceptæ leſionis ſe prodant, nec ad finem uſque, lente quantumvis, pergere deſinant, ut Juveni contigit quem Ill. deſcripſit Hallerus (f), ab ebruſi compotoribus calce ad abdomen percuffo.

16. PUERO novenni, ſub curru cadenti, rota ſuper ventrem acta, mortem in hunc modum attulit. Dolor quidem ventris non magnus erat; ſed pulſus vix percipiebatur, extrema valde frigeant, æger vix unquam quieſcebat, alterno fere motu ex uno ſe in alterum latus convertens. Denique hora una, aut altera ab rotæ preſſione exacta, convulſivis ingruentibus motibus, intra horæ quadrantem deceſſit. ABDOMINE, quod valde tenſum erat, diſſecto, effuſus in ventrem fluidus ſanguis, & inteſtina aere turgentia conſpiciuntur. Jecinoris pars dextera qua coſtas ſpectat, ad trium unciarum Bononiensium tractum alte recte lacerata. In Thorace pulmones ab omni undique nexu liberi, ſanique inventi ſunt, niſi quod a tergo erant leviter inflammati. Ventriculi cordis fluidum, ſpumofumque ſanguinem continebant.

17. Duas, Sepulchretum verſans, Obſervationes reperies, quarum altera (g) vacuæ quadrigæ, altera autem (h) rhedæ bene onuſtæ traductas rotas ſuper ventrem pro-

ponit. Et eſt quidem pondus varium prementis corporis attendendum; at ſimul varia preſſi hominis, ſive ætatem ſpectes, ſive compreſſam ventris ſedem, reſiſtentia: Erat illorum qui ibi deſcribuntur, primus annos natus circiter triginta, alter aliquanto plures. Primi hypogaſtrium paulo ſupra pubem, alterius hypochondrium dextrum preſſum fuerat. Illius, intra horas mortui triginta ſex, nec ſine motibus convulſivis, ſub integra cute, cæteriſque abdominis integumentis perforatum inventum eſt Ileum inteſtinum, idque eo facilius, quod, ut in ebruſo, fuerit diſtentum. Alterius vero qui diutius vitam traxit, ſub integris coſtis ſpuris integrum jecur deprehenderunt, & nihil eorum quæ in cavea ventris ſunt, ruptum; ſed magnum tantummodo abſceſſum inter Abdominis mufculos, & peritonæum. Novennis autem erat puer in quo laceratum jecur Valfalva invenit, & pueri quoque tres illi erant, quorum ſupra (i) ex Cl. Heiſtero mentionem facientes, viſcus aliquod, & in tertio jecur ipſum medium omnino difruptum a vi extrinſecus abdominali illata, cute quantumvis integra, fuiſſe, diximus. Et puer adhuc erat iſi qui ebruſus e plaufro delapſus, axique, & rota poſteriore curruſ everſi, & tranſeuntis graviter preſſus, & decima poſt hora mortuus, præter inteſtina hic illic valde conuſa, & livida, pylorum, hepar, venam Portarum, & renem dextrum, lienemque præterea habuit per medium proſus rupta, mirante Preuſſio (k), qui fieri potuiſſet, ut poſt tot, tantaſque leſiones, & immanem mox ſanguinis, quo ventrem plenum invenit, effuſionem, tot horas viveret, tum illud etiam, nuſquam cutem, ne in abdomine quidem, fuiſſe ruptam, niſi hanc quippe mollem, & quæ facile extendi poſſit, & mollia ſubjecta viſcera habentem, forte dicamus, cedere ita potuiſſe, ut illaſa permaneret; viſcera autem illa in poſteriorem ventris parietem qua maxima ex parte eſt oſſeus, & ad firmiſſimum ſubjectum ſolum violentius adaſta, & compulſa, cum cedere propterea non poſſent, neceſſario eſſe ſiſſa. Et videtur ſane corporis integumentis naturalibus illud interdum accedere quod veſtibus, ab icſu nonnunquam illaſis, cum ſubjectum ipſis corpus ſauciatur. Sic a ſpectatæ fidei Collega audivi, mulieris uterum gerentis abdomen cum a bove cornu impetum eſſet, quamvis veſtimentis nec perforatis, nec ruptis, ita fuiſſe diſciſſum, ut conſpici poſſet uterus, ibique hernia poſt curationem, ſedulo abſe adhibita, remaneret. Ipſe autem in altero Collega noſtro, Cœnobii huius celeberrimi S. Juſtinæ Abbate, dum viveret, meritiffimo, vulnus vidi ſuper poſteriore ſiniſtri oſſis ſincipitis parte recens ad cicatricem perductum, quod ante quindecim illos dies caſu inſiſſum fuerat ab decidente angulato bilibli lapide, neque pileum, neque cucullum, neque intimum ex laneo panno pileolum, quibus omnibus opertum erat caput, ſcindente, aut perforante, naturalia autem, iis ſubjecta, integumenta ſic vulnerata, ut multus continuo ſanguis efflueret. Atque hæc de icſibus, aut compreſſionibus ventris ſcripta ſunt. Quorum alterutris, an utriſque, an etiam concuſſionis vehementiſſimæ tribuendum ſit quod in proxima reſertur hiftoria, ipſe exiſtimabis. Eam Valfalva & narravit mihi, & in Schedis reliquit.

18. STRUCTOR annorum circiter ſex & triginta, ex alto ædificio in ſumum cadens, ſtupidiſſe remanet. Nulla exterior læſio apparet. Abdomen paulo poſt tumet, ac tenditur. Pulſus adeo eſt exiguus, ut vix percipiatur. Intra duodecimam horam interit. VENTRE aperto, cauſa unde tumeret, inventa eſt, ſanguis effuſus. In nonnullis ejus caveæ membranis fugillatio animadvertebatur. Quo tamen ex rupto vaſe effluſiſſet ſanguis, difficile erat deprehendere. Verum conſpicere licebat ex ramo venæ Cavæ propterea quod hæc omnino erat inanita.

19. Et ſane in altero qui lapſus ex alto fuerat, ſanguinem multum in ventris caveam ex fracta vena Cavæ effuſum Jacobus Sylviuſ, ut in Sepulchreto quoque (l) habes, olim conſpexit. Quid vero in Virginis ventre, quæ ab alto ceciderat, Valfalva invenit, alias (m) a me tibi ſcriptum eſt. Nunc quæ ad lumbos, eamque viciniam vulnera, icſuſve deſcripta reliquerit, videamus.

20. VIR anno proximus quadrageſimo, duobus ſclopæti globis ad hunc modum tranſverberatur. Ingreſſi ſunt globi ad latus dextrum ſecundæ, & tertie lumborum vertebræ, uno dumtaxat ſibi aperto foramine: exierunt duplicato foramine, majori uno, minori altero, ex abdominis medio, duobus circiter tranſverſis digitis ſupra umbilicum

cum. Vulneratus ad locum non longe diſſitum ſe conſert, ubi a Chirurgo remedia adhibentur. Hinc de vehementi dolore queritur: ereſta cervice, nec ſine anhelitu, ſpirare cogitur: non ſemel vomit: lotium, ſed incaſſum, reddere conatur: pulſus ſit ſenſim parvus, & debilis: tandem loquens adhuc, & ſana mente, cum aërem hianti ore aliquoties attraxiſſet; qui certus vicina mortis eſt prodromus; nona ab accepto vulnere hora deſedit.

CADAVERIS univerſum dorſum aliquot poſt mortem horis livere incipit. Poſtridie mane non modo livor creverat; ſed inſuper totum caput deforme factum erat, oculiſque dexter valde intumuerat. Vulneris labra ad putredinem utraque ex parte inclinabant. In Ventre ſtagnabat effuſus ſanguis. Ileum inteſtinum tribus in locis omnino erat laceratum; Colon autem ubi ventriculo ſubjunctum, dimidia ex parte ſuæ latitudinis vulneratum, omnia inteſtina rubebant. Cum vulnus paulo infra Emulgentem venam dextram ventris cavum ſubiret prope ſedem ureteris; dubitatum eſt, hunc fuiſſe laceratum. Sed cum intolerandus feſtor properare cogeret; res ſatis non potuit explorari. Dubitatum quoque eſt, ſclopæti globos veneno infeſtos fuiſſe.

21. Hic quæri inter cætera a te poſſet, quomodo cum duo eſſent globi, tribus locis ileum inteſtinum lacerarent? niſi animadverteres, gyros huius inteſtini eſſe ejuſmodi, ut parte ejus aliqua parti alteri antepoſita, inteſtinum bis occurreret in via quam globorum alter tenuit.

22. VIR annorum quadrageſima, plumbeis fragmentis inæqualibus, ſclopæto emiſſis in eo corporis poſitu ſauciatus eſt, ut ad natem ſiniſtram, qua fragmenta illa ingreſſa erant, tria eſſent foramina, qua fragmenta autem regionem, qua prope infimam coſtam egreſſa fuerant, duo foramina conſpicerentur. Circa quintum diem urina ſupprimitur: nec ſemel æger queritur de ſpasmotico ad ſupremum marginem oſſis ilium dolore adeo ut ex improviſo totum corpus concutitur: præ dolore externum Chirurgi medentis tactum ferre vix poteſt. Augetur dolor in dies, ut vehementior, & continua fiat convulſio, præſertim circa guttur, & os. Mens tamen eſt ſana. Tandem die obit decimo tertio. VULNERE per diſſectionem perluſtrato, nullum plumbeum fragmentum ad interiora perveniſſe, ſit maniſeſtum. Unum tamen, diverſo ab aliis, itinere, comminutum ierat ſupremum marginem oſſis ilium, qua muſculorum tendines annexi ſunt. Cæterum in Ventre læſa nulla, ſi quandam excipias quaſi fugillationem inteſtinorum, & omenti præſertim. Cerebrum vero ſanum omnino fuit: ut ne ſeri quidem ullum veſtigium oſtenderit.

23. Hic, opinor, vir ille alter fuit quem ſupra (n) viſum eſſe a Valfalva, adnotavi, ex comminutione mortuum marginis oſſis ilium, cum ex ea abſumptum alterum propoſuiſſem vulnere ejuſdem generis, ſed fruſtrali plumbeis non ſic a tergo jaculatis. Propius ad eam quam modo exſcripſi, Harderi accedit Obſervatio, quæ utinam diſſectionem haberet adjuncatam. Extat in Sepulchreto (o), exhibetque hominem ſclopæti globulo pone nates icſum, ſuperiora verſus inter mufculos & tendines qui ad dorſum pertinent, progrediente: quo ex vulnere ortam denique ſtranguriam primum videbis, mox convulſionem ad guttur, & os, quæ deinde ad artus, & univerſum tandem corpus propagata, ægram fuſtulit.

24. Poſt vulnera icſus ſequuntur, lumbis, & interjeſta his Spina excepti. Quibus de icſibus hæc duas accipe Valfalvæ Obſervationes.

25. VIR quinquaginta annos natus, dum pronus forte ambulat, ligno ex alto cadente graviffime percuitur ad tres inferiores lumborum vertebras. Semianimis conſidit: & in S. Mariæ de Vita Noſocomium illatus, quarta ab icſu hora interit. LUMBI, & ſpecialiter muſculorum Longiſſimi dorſi, & Sacrolumbi communia principia a contuſione ſanguine coagulato infarta reperiuntur. Intra icſas vertebras erat ſanguinis grumoli non multum; incluſa tamen Medulla omnino illaſa videbatur. Illaſa quoque omnia viſcera. In arteriis dumtaxat; quæ in denatis alioquin ſolent parum ſanguinis continere, tantum huius, & coagulati quidem inventum eſt, ut eo proſus repleta eſſent, præſertim ad præcordia, ubi ſi multo magis concreverat.

26. VIR alter, annum jam agens quadrageſimum ſextum, cadente ligno a tergo percuitur. Inde in cruribus movendi facultas omnino perit, ſentiendi remanet. Alvi recrementa præter voluntatem, lotium catheteris dumtaxat ope redditur, quod ſub morbi finem, naturali exuto colore, aquam referebat in qua caro recens lota eſt.

In percuffa lumborum parte vix dolor percipiebatur. Ita paulatim deficientem mors fuſtulit die decimo quarto. CADAVERIS externa membra laxa erant, & facile mobilia. Ventre aperto, inteſtina plurimis in locis non levi inſecta nigredine reperta ſunt, qua læſas partes ſpectabant. Namque eadem nigredo per totam iliacam, & lumbarem regionem extendebatur, ut ſanguis in earum partium interitiis concretus quodammodo appareret. Lien quoque dimidia ex parte præter modum livebat. Denique, ut morbi ſigna præmoſtraverant, fracta vertebra lumbaris inventa eſt, nonnullis oſſeis fragmentis ex ea conſpiciis. In Thorace pulmones maculis quibuſdam nigris diſtincti, a tergo autem, ſiniſter præſertim in parte inferiore, nonnihil inflammati. Uterque cordis ventriculus polypoſam habuit concretionem; ſed dexter majorem: hæc Pulmonarem ſubibat arteriam.

Cæterum ſanguis in omni fere parte fluidus fuit.

27. Hæc duas hiftorias ſi conſeras inter ſe, facile miraberis, illum cujus vertebræ fuiſſe fractas non dicuntur, intra horas quatuor; hunc vero cujus una certe vertebra fracta dicitur, non niſi decimo quarto die eſſe mortuum. An quia vertebra hæc non modo una fuit, ſed fortaſſe omnium infima; illa vero tres erant? At illæ quoque tres erant inferiores: corpus autem ipſum medullæ Spinalis ad tertiam lumborum vertebram ſcis proſecto non pervenire; non videtur autem a paulo pluribus concuſſis Equina, ut vocitant, Caudæ nervis, quorum certe nullus ſuperioribus proſpicit partibus, tantum diſcrimen repetendum. Ideoque dicam, ſi diſcrimen forte inde repetas quod intra vertebras illas tres aliquid erat effuſi ſanguinis, cujus nulla intra hanc unam ſit mentio. Equidem eorum quæ læſas vertebras, Spinalemque ipſam medullam conſequuntur, diſcrimina ſæpe video non faciles habere explicatus. Mitto quas in Sepulchreto habes, Rumleri (p), & Fontani (q) in caſu ab alto Obſervationes. Nam etſi illa familia, imo graviora proſert quam ſecunda Valfalvæ, ſymptomata, mortemque die ſeptimo; non conſtat tamen, quæ, & quot vertebræ, & quatenus læſæ fuerint: Fontani autem Obſervatio cum vertebras quinque dorſi luxatas proponat, nec ſolum ſymptomata ejuſmodi non commemoret, ſed vitam ad longum tempus productam indicet; dubitationibus eorum obnoxia eſt qui vertebrarum luxationes, ut alias (r) indicabimus, non agnoſcunt. Meeckrenii igitur hiftoriam ibidem (ſ) relegere in qua ſclopæti globus inter duas lumborum vertebras perveniens, his vertebris fractis, & Spinalem medullam premendo nec ea quæ diximus, ſymptomata, nec mortem attulit, niſi poſt hebdomadam duodecimam, imo, ut apud Auctorem eſt, decimam quartam. Et ne forte dicas cum Hornio (t), globum ad extremum adhæſiſſe integumentum Spinalis medullæ, ut ipſam premere non potuerit; huc adde Bohnii (u) Obſervationem, qui globulo perforatam in Centurione non ſolum vidit lumborum Spinam, ſed & ſimul ſinis medullaris medietatem ſiniſtram, ita tamen ut nec dextra omnino intacta maneret, gravibus quidem conſectis ſymptomatibus, at vita nihilominus ad octavam, an nonum diem producta. Verum ne poſtea forte dicas, inter ſecundam & tertiam (& multo minus, ut in Meeckrenii hiftoria, tertiam inter & quartam) lumborum vertebram ſubeuntem globulum, non ipſam Medullæ corpus, ſed Equinam dumtaxat Caudam vulnerare potuiſſe; utraque hac hiftoria ſepoſita, lege potius, quæ alibi in Sepulchreto (x) extat, Plateri Obſervationem. Hac Virgo proponitur, cui intra vertebram dorſi octavam, aut nonam ſclopæti globus Spinalem medullam diſruperat, & movendi, ſentiendique facultatem a medio deorſum ſtatim ademerat, ad vigefimum tamen uſque diem vita protracta. Quin perpende in Reg. Sc. Academiæ Pariſienſis Hiftoria (y) quid Cuvillierius de milite referat, cujus duodecimam dorſi vertebram, incluſumque ipſum Medullæ corpus enſis mucro, duos pollices longus, non modo trajecerat, ſed ibidem ſemper hæſerat, cum tamen dolores quidem acerbos, ſed nullam uſquam reſolutionem quoad vixit; vixit autem ad menſes, attulerit. Cum his nunc confer quam in Sepulchreto (z) habes, Marcelli Lucii Obſervationem. Hominem leges intra horas circiter triginta mortuum, cui ſclopæti globus a dextra parte, quatuor digitis ſub regione renum ingreſſus, tranſibat per medium Spinalis medullæ, per ſiniſtram partem egrediens. Certe hic globus non Medullæ corpus, ſed Equinam Caudam trajecerat. Qua igitur ratione tanto citius quam in illis, quibus ipſum Medullæ corpus trajeſtum fuerat, mortem attulit, eandemque tamen multo tardior quam primo illi Valfalvæ Vi-

(1) Tom. cit. Ibid. (u) Commerce. cit. A. 1740. Hebd. 26. n. 2. (x) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obſ. 120.
(y) in Addit. ad hæc S. Obſ. 25. (z) l. 3. S. 14. Obſ. 47. (a) Eph. 49. n. 6. (b) Hiſt. Animal. l. 6. c. 29. in fin.
(c) Inter Epiſt. ad Familiar. l. 2. Epiſt. 18. (d) Eph. N. C. Cent. 1. & 2. Obſ. 151.
(e) Inſtit. cit. S. 718. (f) Opus. Pathol. Obſ. 25. (g) Additum. ad hæc S. Obſ. 27. cum Schol. (h) l. 3. S. 17. Obſ. 19.
(i) n. 15. (k) Eph. N. C. Dec. 3. A. 5. & 16. Obſ. 228. (l) Sect. hæc 3. Obſ. 28. S. 6. (m) Epiſt. 40. n. 9.

(n) n. 5. (o) in Additum. ad S. hæc 3. Obſ. 32. (p) Sect. hæc 3. Obſ. 29. S. 7. (q) Ibid. Obſ. 28. S. 1. (r) Epiſt. 75. n. 35.
(ſ) in Additum. Obſ. 4. cum Schol. (t) in Schol. modo cit. (u) De Renunc. Vula. S. l. prope fin. (x) l. 1. S. 13. Obſ. 26.
(y) ad A. 1743. in Obſ. Anat. 11. (z) Sect. hæc 3. Obſ. 26. S. 2.

Viro, in quo illa ipsa Cauda non solum non trajecta erat, sed illa omnino videbatur? Nimirum difficile, ut dixi, hac possunt discrimina explicari. Si tamen conjecturis, non undique fortasse improbandis, est locus; duas videri posse fuisse causas, cur eum Valsalvæ Virum tam cito mors abripuerit. Ut enim pronus incedebat cum ruens ab alto lignum tres eas vertebrae percussit; tanto has vehementius concussas crediderim, quanto idem minus ex obliquo exceperet, proptereaque disruptis sanguiferis vasibus plus sanguinis fortasse, quam ibi apparuit, effluxisse, inde videlicet in concidente ac supino homine mox in ceteras vertebrae dilapsam ad Medullæ corpus, non aliter propemodum atque a Verneyo (a) fieri creditum est in quibusdam quasi apoplexiæ generibus postquam in horum alioquo profluere sanguinem vidit non e cranio, sed ex vertebrarum tubo. Compressa enim ea parte, unde nervi oriuntur plurimi, qui nervi Intercoastales ramis præbent originem, partium interiorum morum cessasse, existimavit. Cessasse autem in nostro casu tanto facilius putaverim, quanto magis sanguis (quæ altera meæ conjecturæ causa est) promoventibus ipsum organis resistebat ea crassitie, sive ea æquo minoris fluiditate ob quam adeo concretus in arteriis, multoque etiam magis circa præcordia repertus est.

28. Ad Artuum tandem Ictus attinet Valsalvæ insequens Observatio: quæ simul quanti sint faciendæ extremorum læsiones ostendit, simul a faucium convulsionem instantes toto corpore lethales convulsiones sæpe in vulneribus indicari, confirmat.

29. VIRO annorum triginta quinque prægrandi lapide extremum percussum est pedis sinistri. Pars conculsa, nisi tangeretur, non dolebat. E medio autem præcipue digiti pollicis, ubi tangendo vehemens dolor excitabatur, nullam purulentam emittebat materiam, nec ullo pacto, laceratas tendinum fibras separabat. Homo in omnibus se bene habebat, idque ferebatur, & sua munia alacriter obibat. Verum sexto die ex improviso tenivis doloribus, diraque ad fauces convulsione prehenditur. Sequitur postea ingens toto corpore convulsivus motus, & hunc mors octavo die. CAPITIS dissecto, nihil præter naturam deprehenditur; si paululum ferossæ materiæ excipias stagnantis in cerebri ventriculis.

30. Nunc aliquot nostras Vulnerum, aut Ictuum earundem quæ hæcenus dictæ sunt, Partium Observationes, eodem servato ordine, subiiciamus.

31. VIR ab insilio in hypogastrium vulnere ad latus dexterum Lineæ Albæ, vomitionibus confictus, humilibus, infirmisque pulsibus, nec sine quibusdam convulsivis motibus, nulla tamen animi defectione, obiit intra diem tertium in hoc Nosocomio ante extremum Novembrem A. 1742. ABDOMINE, quod tumidum non erat, diducto, sanguinem effusum concretum, Ileum autem intestinum qua vulneri respondebat, transverberatum offendimus.

32. Etsi in iudicio de vulnerum, intestinis vel Tenibus insiliatorum, lethalitate cautus prudensque Medicus negligere illa non debeat quæ doctæ, & sapienter super argumento hoc scripsit Abrahamus Vaterus (b); tamen nimis verum esse plerumque experimur quod post Hippocratem (c) tradidit Celsus (d), servari non posse cui aut jejuni, aut tenuis intestinum vulneratum sit. Huc Fabricius nosse ab Aquapendente (e) hæc addidit: sic vulneratos observari habere pulsus admodum exiles, & frequentissimos, morique primo aut altero die, unde fatales videritis pulsus, semper dubitare de tenuibus intestinis vulneratis. Quantum mihi in quodam observare contigit, cui vulnus in umbilicali regione impositum sua ipsum felle Jejunum intestinum fauciatum esse, indicabat; verum de pulsibus, & verum item de mortis die Fabricius scripsit: quanquam cum secare non licuerit, tribuendumne id esset intestini illius dumtaxat, an mesenterii quoque, & vasorum vulneri, unde sanguis effluxisset, pro certo scire non potui. Nempe dissectionibus standum est. Hæc autem ut quæ fauciatæ intestina fuerint, pro certo ostendunt, sic faciunt, ut alium in aliis, neque ita raro, vitæ inde terminum fuisse, nimirum pro varia corporum dispositione, variisque adjunctis, intelligamus. Si in hac III. Sepulchreti Sectione Observationem perlegeris XXV. exempla huc spectantia pleraque complectentem; videbis, Ilei intestini vulnera modo intra horas duodeviginti (f), modo intra dies tres (g), modo intra quatuor (h) mortem attulisse; Coli vero alias intra dies

totidem (i), alias intra horas quatuor (k); imo cuiusdam intestina tum Craffa, tum Tenuia multis vulneribus confossa, vitam abulasse die quinto (l). Huc adde ex Hoyero (m) Duodeni intestini vulnus die quarto; ex Bohnio (n) Jejuni paucis post horis; ex eodem (o), ex Usenbenzio (p), ex Hallero (q) Ilei octavo die, quarto die, primo die fuisse lethale. Mihi vero ex ejusdem intestini vulnere haud aliud ac in proposito Viro tempus mortis jam ante contigerat adnotare, ut ex proxima cognosces historia.

33. VIR alter mortuus ibidem erat convulsus tertio die ex quo vulnus circa imam Epiploicam regionem dexteram cultro acceperat paulo ante finem Decembris A. 1726. CADAVERIS hujus quoddam partes, & nominatim renes, quorum alter binis instructus erat ureteribus, toto itinere, ipsoque intra vesicam sine divisis, cum diligentius examinarem; quæ ad vulnus attinebant, adnotare non neglexi. Mesenterium haud procul a fine Ilei intestini pertusum fuerat, nullo quidem læso ejusmodi vase unde sanguinis copia effundi potuisset; ut neque effusa erat; peculiari attentione digna. Sed & illud intestinum fauciatum erat.

34. Hoc intestini vulnus obstitit quo minus eo in viro, in quo sanguinis effusio me dubium facere non poterat, Observationes confirmarem Frederici Ruyfchii. Qui postquam in Thesauris Anatomicis (r) admonuerat, per mesenterium nervos visibiles existere satis numerosos, quibus læsis graviora producuntur symptomata, doloreque immenses, asseveravit in Adversariis (s), sepe numero se vidisse homines post assiduos intolerabiles ventris cruciatus intra duos trefve dies mortuos, quorum nullam præter ipsum mesenterium alicujus momenti partem vulnere læsam, re accuratissime examinata, potuit invenire; tametsi mesenterii vulnera lethalia non pronuntiaverint Auctores qui super his ad id tempus scripserant. Propius aliquanto ad Ruyfchii Observationes accedit quæ ab inspectæ fidei Chirurgo sub initium A. 1724. paucis, postquam ipse habuerat, diebus ad hunc modum narrata est.

35. ALIENIGENÆ Viro, jam diu hic moranti, proindeque omnibus noto, vulnus insiliatum fuerat acuto, acipiti, & tenui ferro, oblique a sinistris abdomen sub ipsis costis perforante. Angustia, & obliquitas vulneris erant ejusmodi, ut non modo ex vulnere nihil exire; sed ne specillum quidem ulla ejus Chirurgi, aut Maserii ipsius diligentia admitti sinerent in ventris cavum; quo tamen ferrum pervenisse, hæc indicabant. Ab accepto vulnere ad quintum usque diem, quo pulsibus deficientibus obiit; semper, si intervallum excipias horarum quinque, idque semel, vomitu rejecit assumpta, & bilem. Ventris doloribus torquebatur. Alvus, nisi clysteribus soluta, nunquam reddidit quidquam. Sanguis autem etsi ter fuerat detractus, neque in his quæ post clysteres, aut cum illis quæ per vomitum exibat, apparuerat unquam; novissime tamen ante mortem ex ore, at simul naribus, prodit. ABDOMINE dissecto, sub intestinis, aere turgidis, non multum sanguinis effusi conspectum est, idque ad ventris inferiora. Vulnus autem Coli intestinum quatuor circiter linea sinem digitis inciderat quidem, fide superficie tenuis. Inde vero, nullo alio læso intestino, ad mesenterium pervenerat. Quod propterea non modo faucium, sed & tumidum inventum est.

36. Etsi præter mesenterium, facies quoque exterior intestini hic erat fauciatæ; facile tamen intelliges, hanc propius abfuisse ab Ruyfchii Observationibus, nisi quod paulo diutius vita producta est, ubi cum Boerhaavio (t) animadvertitis, intestinum quoque superficiem anteriorem venosissimum mesenterium esse. Cæterum cum a fauciatæ mesenterio mors accidit, neque hujus causam in majuscula quæpiam illius incisæ vasa, ut in Cive oppidano quem Bohnius (u) secuit, conferre licet; in compunctos ejus nervos cum Ruyfchio conferre poteris, majusculos tamen & ipsos: si enim minimorum quoque compunctio lethalis esset; nulla, opinor, extaret felix, brevisque, & sine gravibus symptomatibus transverberati ventris curatio, quam & nobis visam antea (x) scripsimus, & alii, inter quos Waldschmiedius (y) viderunt. Sed nos ense, Mauchartus (z) vero cum ventrem plumbeo globulo transverberatum conspexisset, vulnerato quindæ ferme post hora intereunte, mortis autem citæ adeo causam inquireret, deprehenderetque globulum, fundo ventriculi transfixo, hinc per mesenterium inter colon, & ileum, utroque illo, nec ruptis vasibus mesentericis, transisse: parum autem esse, animadvertent, quod

quod ex contentis ventriculi in abdomen descenderat, & nulla usquam esse gangræna vel incipientis indicia, aut ullam hæmorrhagiam lethalem; potuisset a laceratis majusculis mesenterii nervis tam citi obitus causam repetere, nisi certior factus esset, nullas convulsiones ante mortem, vomitus autem frequentes fuisse: quanquam intimæ viscerum convulsiones fortasse adstantes latuerunt. Certe etsi vulnere fundo ventriculi insiliata intra breve tempus plerumque occidere, supra (a) a nobis, productis, indicatque præsertim Observationibus, confirmatum vidisti, tam exiguo tamen spatio robustum, ac sanum virum interemisse, neque Mauchartus, ut apparet, credidit, neque alios facillime credituros esse, arbitramur. Verum ad ea quæ ipsemet vidi, redeamus.

37. MOLITORI famulo unum supra viginti annos nato, sano, robusto, optimoque corporis habitu prædito, id accidit quod juvenibus audacibus, minacibusque, qualis ipse erat, sæpius solet, ut lethale vulnus acciperet. Insiliatum hoc fuerat lanionis cultro in Epiploicam regionem sinistram. Ut tunc erat prima noctis vigilia, domum per se rediit. Mane in Nosocomium illatus, & a Medico, Chirurgoque curari coëptus est. Eo die levis febris fuit. Sed nocte proxima & vomit, & ex convulsivis subtilibus semper tremuit. Sicque tremens posttridie mane quadragesima circiter hora ab accepto vulnere mortuus est.

CADAVER proximo die qui fuit XI. Kal. Februarii A. 1738. multique insequentes, nobis ad Anatomen quam in Gymnasio docere coeperamus, continuandam ex usu fuit. Abdominis musculi Obliqui, & Transversi in ea quam indicavi, regione pertulerant vulnere duos ferme digitos admittente: interque illos aer subierat, ut initium jam esset factum quasi emphysematis. Is aer e vulnerato, ut mox dicitur, Colo intestino in cavum ventris egressus, hunc distenderat. Neque aer solum ex illo prodierat intestino, verum etiam recrementa; ut cum in ventre humor esset effusus ad libras duas; pars hujus maxima ex recrementis esset, minima ex sanguine; nullum enim insigne vas læsum fuerat. Scilicet culter, abdomine, ut dicebam, transfixo, oblique sursum, introfumoque perrexit, & primum quidem ejus quod memoravi, intestini respondentem partem sic inciderat, ut simul anterior, & posterior ejus facies, & quæ a latere vertebrae spectat, discissæ, aeris, & recrementis exitum in ventrem darent. Inde autem rene, & diaphragmatis appendice illatis, Quadratum lumborum musculum transfixerat, ultraque hunc in commune illud Sacrolumbi, & Longissimi dorsi initium sic penetraverat, ut de tendinibus ex hoc initio ad transversos lumborum vertebrae processum oblique ascendentes unum haud otinuino, sed, quod multo pejus haberi nostri, ex parte dumtaxat esset incisus. Hinc igitur causam perierat fortasse præcipuam deduxissent quare convulsivis subtilibus conspectus esset, præsertim cum fauciatum intestinum ne haberet quidem, aut liveret ad eam ipsam partem qua vulnus habebat. Ventriculi fundus, ab anteriore facie inspectus, tenuia vascula hic illic ad aliquod spatium ostendebat sanguine distenta. Cæterum jecur magnum erat, & intraversum prælongum, ut in totum propemodum hypochondrium sinistrum se extenderet. Lien quoque longior, & æquo major; ejus autem arteria non tenuior modo pro ea præsertim visceris magnitudine, sed & minimum tortuosa. Nam minus tenuitatem miratus sum, cum arteriæ Magnæ truncum ibi animadvertentem, ut in thorace quoque, angustioris proportionem non ad corpus tantummodo, verum etiam ad venam ipsam Cavam, cujus in septo Transverso foramen erat omnium maximum quæ videre meminissim. Thorace aperto, pulmones undique, id quod minus frequens in adultis hominibus esse, non ignoras, solutos quidem conspexi; sed Bronchialibus glandulis instructos justo majoribus, ut una compressam nucem mediocrem ferme æquaret. In pericardio aqua erat flavescens, nec paucissima. Cor potius magnum, in eoque sanguis, ut alibi, niger; ibi vero etiam ex parte aliqua grumulosus. Magna arteria ultra curvaturam sulcos quasi quosdam interiores facie ostendit secundum longitudinem ductos. Cætera quæ in hoc cadavere adnotavi, huc non attinent.

38. Etsi de Ventriculi, & Intestinum, & plerumque aliorum viscerum quæ in ventre sunt, Vulneribus plura ex Valsalvæ, & nobis, & aliis Observatoribus hac Epistola accepisti; tamen alias ex his ultimis indicabi-

mus historias, quas Sepulchreto, si velis, inferas. Itaque ad Crafforum intestinum vulnera, Coli videlicet, ac Recti, Observationes spectant Harderi (b), & Bantzmanni (c). In hac est simul quod ad Diaphragma, in illa quod ad chyli, si recte intelligo, Receptaculum, certe autem quod ad Renem convulsum pertineat. Cujus de vulnere Epistola quoque superiore (d) mentio facta est. Nunc Laubii (e) addetur Observatio, eo spectabilior, quod culter per medium lienem ad renem sinistram pervenerat. Lienis autem erit altera ex Bernero (f).

Porro ad Jecoris vulnera, præter exempla illa quæ extremis superioribus Litteris (g) indicata sunt, alia Bohnius (h) dabit, ad has vel magis attinentia. Nullius autem ex ventris visceribus profunda vulnera certius, aut citius quam hujus, sunt lethalia propter vasorum tum multipliciter, tum quo magis ad diaphragma accedunt, crassitudinem. Quamobrem scite Homerus (i) de Eurypylo lanceam jaculante, pervasit, inquit, hepar subter præcordia: statim autem genua solvit, & alibi (k) de Patroclo, percussit ubi mentes fingunt circa prudens cor: cecidit autem: quem ad locum ob verbum fingunt commentarii intar erit quod in libro habemus de Morbo Sacro (l). Et ne hinc forte arbitreris ad Poetam præter Majorum consuetudinem digredi; vide quæ ad illum de Ulyssæ, & Cyclope Homeri locum (m), ubi mentes hepar habent, Galenus (n) adnotaverit. Vulneratam hanc venam, Cavam nimirum, qua jecur, in cujus substantia defixa est, ad diaphragma alligat, aut dirulsam, inquit, acuta adeo sequitur mors, ut cum Cyclopi, quamquam longe maximo, sapientissimum Ulyssæm Poeta scriberet insidiari, mortemque machinari, non in aliam corporis partem easem impulsurum fuisse, finxerit, quam qua hepar pervenes continent: adeo certe huc loco confidebat, ut si vulnere affectus esset, ne temporis quidem momentum vivere ipsi esset permittitur. Sed & Riolanus (o) Galenum laudat, quod hoc Homeri testimonium protulerit: quanquam memoria lapsus, quod uterque facturum fuisse Ulyssæm, ajunt, reapse fecisse, dicit. A fauciatæ autem fellis Vesicula num æque celer, ac repentinus obitus necessarius sit expectandus, satis a me II. Epistola Anatomica (p) ostensum est, cum omnia quæ ad id usque tempus producta dicebantur, non modo a vulnere, sed a quacunque causa illius ruptionis exempla perpendi. Unum dumtaxat, aut alterum ab illo tempore additum legisse memini, quorum alterum inspicere poteris apud Ampliff. Swietenium (q). Vesiculæ quidem vulneri, bilisque in ventris cavum effusioni quæ statim, & quæ deinde successerint non levia, videbis; attamen non ante diei septimi initium mortem obtigisse. Hac autem in altero exemplo quod protulit Cl. Tacconus (r), minime accidit; sed mulier cui abscissus hepatis, cum peritonæo connatus, cystim ruperat, prorsus convuluit. Quin Bohnio (s) aditulari in eo video Cl. Kalschmidtium (t), quod sine cystis bile vita possit diutius protrahi: imo quod, eam bilem, intra abdomen effusam, præsentaneum per se non asserere periculum. Contra nulli dubitationi obnoxium est, si Vesica altera, id est urinaria, ita vulneretur, ut lotium intra ventris cavum ejiciatur; gravissimas (ut etiam cum fauciatæ sunt ureteres) lethalesque demum hinc esse noxas. Neque enim semper urina omnis per vulnus exit, ut in Ruyfchii (u), Bohnii (x) Martini (y) Observationibus, donec incipiat per urethram excerni, per quam primo tempore nulla poterat. Sane interdum vulnus non ex adverso, se a tergo vesicæ insiligit, ut in tertia quæ ab laudato Bohnio (z) producit, historia, in qua pertusum erat vesicæ latus, itemque ut in ea ancilla de qua Alex. Camerarius (a), trajecto per mediam uteri substantiam, indeque pervescam pariter mediam plumbeo globulo. Itaque ad Uterum tandem pervenimus, cujus fauciatæ, præter hoc ipsum exemplum, alia reperies, in gravidis præsertim, in quibus certe quanto facilius vulneribus patet, tanto periculosius vulneratur. Est inter Disputationes Chirurgicas ab Hallero collectas CXXXI. in qua (b) nonnullas huc spectantes legere poteris Observationes. Quodcunque autem viscus fauciatum est, etsi indicia habeat sua, illudque in primis quod ex Anatome suppetit, propriæ sedis; cavendum est tamen, nequendo ab hoc ipso decipiamur, immemores varietatum quæ non raro occurrunt, velut in utero in alterum latus inclinato, aut in Colo præsertim intestino a transversa illa fide quam

supra-

(a) apud du Hamel Hist. R. Sc. Acad. 1. 3. S. 5. c. 2. n. 1. (b) Diss. infer. Vulnerum in Intest. Lethalitas. (c) S. 6. Aph. 18. (d) De Medie. 1. 3. c. 26. S. 2. (e) Pentateuch. 1. 2. c. 34. in fin. (f) S. 9. (g) S. 15. (h) S. 14. (i) Iliad. 1. 11. (k) Iliad. 1. 16. (l) Iliad. 1. 16. (m) Odys. 1. 9. (n) De Usu Part. 1. 4. c. 14. (o) Anthropol. 1. 1. c. 2. (p) N. 66. (q) Comm. in Boerh. Aph. 3. 312. (r) De rarioribus, Hepat. &c. Observ. (s) c. 4. cit. (t) Differt. de Vuln. Hepat. 6. 28. (u) Cent. Obs. Anat. Chir. 75. (x) c. 4. cit. (y) Commerce. Litt. A. 1731. Spec. 47. n. 3. (z) c. 4. cit. (a) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 160. vers. fin. (b) c. 1. §. 15.

(a) n. 9. (b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 62. (c) Ibid. Obs. 234. (d) n. 40. (e) Eph. N. C. Cent. 10. Obs. 8. (f) Act. N. C. Tom. 2. Obs. 69. (g) n. 41. (h) c. 4. supra ad n. 36. cit. (i) Iliad. 1. 11. (k) Iliad. 1. 16. (l) Iliad. 1. 16. (m) Odys. 1. 9. (n) De Usu Part. 1. 4. c. 14. (o) Anthropol. 1. 1. c. 2. (p) N. 66. (q) Comm. in Boerh. Aph. 3. 312. (r) De rarioribus, Hepat. &c. Observ. (s) c. 4. cit. (t) Differt. de Vuln. Hepat. 6. 28. (u) Cent. Obs. Anat. Chir. 75. (x) c. 4. cit. (y) Commerce. Litt. A. 1731. Spec. 47. n. 3. (z) c. 4. cit. (a) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 160. vers. fin. (b) c. 1. §. 15.

superius habere solet, deorsum magis, minusve inflexo, aut in jecinore, de quo si non his ad te Epistolis, at in I. Anatomicarum (c) quid aliter in aliis viderim, indicavi, ut in Adversariis etiam II. (d) ubi & de ventriculo quid in quibusdam suspicari oporteat, non reticui. Sed ut viscera singula eisdem semper fines servarent; nonne ut altius expirationis tempore diaphragma est, humilior cum inspiramus, ita jecur præsertim, & ventriculus illud sequuntur, eoque magis descendunt, cum valentius inspiramus, cum flamus, cum ab inedia ut inania sunt viscera jecur suffulciant, ita huic fulcrum quasi deest, ejus descensui obstat, sicut alia ad te Epistola (e) scripsimus, de non unius tum Veterum, tum Recentiorum sententia: quibus addas insuper Cel. Viros Winslowium (f), & Swietenium (g), qui Cl. Garengotii Observatione id confirmari, non dubitat, in jecinore hominis, cum ita se haberet, inferius vulnerato. Hæc igitur omnia, aliæque ejusmodi attendere oportet: tum si qua dubitatio est; cum frequentioris sedis notitia, alia ex actione, & munere cujusque visceris, & eorum quæ continent, natura deprompta indicia sunt conjungenda.

Ad eundem modum sanguifera vulnerata vasa suo se produnt sanguine, multo, si majora sunt, neque exitui ventris quidquam obstat, profuso, si maximo, si maxima, ut puta si Aorta, aut vena Cava: quamquam citius vita definit, quam spatium satis detur ad dignoscendum. Majoris arteriæ, id est Splenicæ, diffusæ Observationem habes ex Helwichio (h); Aortæ vero, illæsi antepositis intestinis, perforatæ ad ipsam in Iliacis divisionem ex Dillenio (i). Sauciata autem venæ Cavæ ex Hildano (k), & Pavaio (l) legere exempla potes in Sepulchreto, huic autem ex Bohnio (m) exemplum addere venæ Iliacæ Internæ, quo ipse intelligit, quid nonnunquam ob stare ad tempus sanguini possit, non ex ventre solum, ut modo dicebam, sed ex ipsa vulnerata vena effluxu.

Nunc ut ad meas redeam Observationes ad Ventris Vulnera attinentes, cum earum ultima fuerit quam in juvene Molitoris famulo habui; jam quasdam accipe quæ ad Ictus, & Compressiones spectant ejusdem Ventris.

39. MOLITOR alter, sed hic senex, in lapidem cadens, ipsum latus offenderat Epicolicæ regionis dexteræ. Quam ob causam, & quod tunc sanguinem, quamvis paucum, rufissimè expectorabat, in Nosocomium venerat. Quindecim amplius elapsis diebus, nulla interim ferme de re conquestus, & quasi ob paupertatem, & infirmas etiam vires, ibi subsistens, interrogatus, sibi alvum adstrictum esse, dixit. Cum ea quæ ad solvendam per clysterem immissa erant, nihilque præterea, reddidisset, dolores autem in ventre jam esse, & hunc turgidum, & quasi ut tympaniticum tensum nuper factum esse diceret; medicamentum quod Diartarum vocant, mane datum est uncia pondere. Nihil egit, nisi quod nocte proxima senex inciscus quid alvo ejecisset, sanguinem in lectulo multum deiecit, & vomitu simul ea rejecit quæ cæcæ loco data fuerant. Mox animi deliquio, mox deinde morte correptus est, eadem nocte paulo ante extremum Novembrem A. 1743.

ABDOMEN ut triduum circiter ante obitum, sic trigesima ab hoc hora tumidum fuit; sed insuper exterius jam virens. Nisi incisio, multa intus aqua, tamen in pedibus nullum cedematis esset initium, deprehensa est. Hæc exhausta, reliqua ob teterrimi odoris gravitatem sic relicta sunt horas aliquot. Quibus elapsis, ipsa quoque interior peritonæi facies jam viridis erat facta. Tunc quæ antea in oculis incurrerant, diligentius recognoscens, omentum vidi totum ad ventriculæ retractum, & hunc quidem non distentum, distenta autem valde intestina Tenuia, Ileum præsertim, idque in ultimis spiris, ab incluso, ut videbatur, aere. Ejusdem Ileii finis, & Coli initium colore erant coccineo ad fuscum vergente, cum proximum Cæcum, & Vermiformis Appendicula, & Coli reliquum colore essent naturali; & tota hujus sinistra pars, Rectumque intestinum valde contracta. Ea vero musculorum Abdominis portio quæ Coli initio vicina fuerat, fugillata apparebat a facie interiore. Sed neque hæc, neque ea intestinorum pars quam colore fuisse, dixi, præter naturam, duri aliquid aut tumidi habebant. Interiorem faciem intestinorum examinare gravissimus odor prohibuit. Jecur pallidum, lien æquo major, mesaræ glandulæ non minutæ adeo fuerunt, ut pinguedinem diducere opus esset, ut in conspectum venirent. Thoracis utroque in cavo non mini-

ma copia inerat aquæ rubicundæ; in pericardio plus quam solet, sed neque multæ adeo, neque ita rubentis. Pulmo finitè aliqua ex parte nexus erat cum pleura, ipse tamen, & dexter sani. Cranio secto, & Crassiore meningē amota, sub Tenui nonnullis in locis animadversæ sunt aeræ paucae bullulæ, tum species illa cujusdam quasi gelatinæ Vasa quæ per hanc meningem repunt, pleraque sanguine distenta; sed illa magis quæ per latera Septi Lucidi: quin etiam e medullari cerebri substantia inter secundum guttæ sanguinis exitebant. Quæ tanto magis attendi, quanto minorem sanguinis copiam in ventris, & thoracis valis majoribus animadverteram. Nihil aquæ in cerebri ventriculis, ipsumque satis firmum, cerebellum autem valde laxum, laxissimam Pinealem glandulam deprehendi, cum hæc, atque alia quæ hic memorare necesse non est, non ferius inciderem quam ipso quarto a morte die.

40. Et hic quidem tardius ab ictu abdominis est mortuus, citissime autem alter in hac ipsa Urbe, sed circa annum, opinor, 1670. cum hic studiorum causa tunc esset Jacobus Sandri, quem Bononiæ inter meos Præceptores fuisse, alias tibi memoravi. Quod mihi in narrabat, totidem verbis accipe.

41. QUIDAM equi calce in umbilico ictus, illico, apoplectici instar, concidit mortuus. DISSECTUS nihil aliud præter naturam ostendit, nisi fugillationem, & nigredinem intestinorum, percussio loco respondentem.

42. Audienti hæc mihi adolescenti in mentem venit Hildani (n) Observatio, Juvenis a rescisso lumbicali jecinoris vinculo mox cadentis, & citissime morientis. Postea vero cum ejus vinculi lationibus neque rationem, neque plerosque Auctores multum tribuere, animadverterem; ea cogitatione seposita, in alteram incidi, ad quam Bohnii (o), & aliorum quos ipse laudat, Observationes, & quedam præterea Benivenii (p), videbantur excitare, ictum videlicet abdominis homines prostrantem, & subito etiam extinguentem propter vehementissimam diaphragmatis, ut ille existimat, concussionem, & convolutionem, unde suffocatio, & asphyxia contingant. Attamen cum ictus de quibus ipse loquitur, non ad umbilicum, sed ad epigastrium spectent; ob hanc rem, aliasque nonnullas ego quidem assensum sustineo: arbitrium autem tuum esto.

43. Ad violentas abdominis Compressiones illa præceteris attineret quam Cistarius perculit ab rheda rota, per ventrem acta, unde gravissima incommoda, & maximum omnium quæ vidi, arteriæ Magnæ aneurysma provenire; nisi eam historiam Epistola ad te XL. (q) descripsissem.

De Vulneribus autem, Ichibusve Lumborum, quo Observationes spectant Cl. Virorem Verdrieli (r), & Quelmaltzii (s), cum in præsentia nulla mihi ex meis in promptu sit, non una autem earum sit quæ ad Vulnera, Compressionesve Artuum spectant; ad has transibo.

44. VIR rusticus, non malo corporis habitu præditus, dum circa lignum operatur, plura ex hoc fragmenta palmæ dexteræ alte infigit, vulnere interstitio illi ferme respondente quod est inter metacarpi ossa, indicio, medioque digito subiecta: nec nisi postquam convulsivis totius ejus artus motibus correptus est, Medico, Chirurgove se ostendit. Itaque octavo circiter ex quo vulnus sibi infixerat, die huc denique in Nosocomium deferitur. Sanguis tunc primum e sinistro brachio mittitur, oleum e dulcibus amygdalis recens expressum datur, oleum resing terebinthinæ in vulnus infunditur, dexter artus, & Spina linimentis quæ adversus nervorum distentiones faciunt inunguntur, fragmenta ligni quædam e vulnere educuntur; sed incautum tum propter id quod mox dicitur, tum etiam quia mali tandiu prorsus neglecti vis altiores radices egerat, totumque ille artus creberrimis convulsivis motibus sursum manifestissime retrahatur. Igitur intra horam ex quo illuc delatus fuerat, quadragesimam vivendi finem fecit, cum ibi Discipulis structuram humani corporis in cadaveribus alius ostenderem; ad extremum enim spectabat mensis November A. 1742; itaque hoc quoque usus sum. Nunc cætera, ut consuevi facere, prætermittam: ea quæ dumtaxat quæ ad vulnus, aut ad alia attinent minus secundum naturæ modum se habentia, commemorabo.

MANUS, & brachium non valde erant tumida. Vulnus orificium erat angustum, & ad circuli formam accedente; adeo autem profundum, ut

ut per illud offium quæ dixi, interstitium, ad manus dorsum propemodum perveniret, palmari tendinæ expansione, & huic subiecto Adductore pollicem musculo, & Interosseis pertusis, nedum Lumbricali; tendinibus autem Flecentium secundum, & tertium digitorum illorum articulos, tum nervo secundum vulneris latus, ut vidi, pergente, facile, ut ex iis intelliges quæ continuo dicentur, insuper latis. Dum enim vulnus ea libertate quæ Chirurgis in vivo permilla non fuisset, penitus examinebamus; ligni fragmentum parallelopipediforme, tenue quidem, sed longius transverso apice minimi digiti, dimidio autem minus latum, alte adeo additum, atque ita intrusum, infixumque deprehendimus, ut non nisi vi illata iis quos diximus, Flecentium musculorum tendinibus, eximi sine difficultate puerit. Eo igitur fragmento, dum subit, illos tendines male habitos fuisse, intelligis, postea autem quam subierat, pus quod paucum, & ichoris fere simile e vulnere exibat, coercendo, acris ob moram reddidisse, eoque aptius ad illos tendines, aut certe ad illud nervum, dum sensim, sensimque extillaret, vellicandum. Erant venæ passim tum internæ, tum externæ fluidæ, atroque sanguine distentæ, quod Thoracem, & Collum, & Caput dissecantibus facile fui animadvertere, indeque etiam proclivius fuit cognoscere, Cephalicam venam in sinistro artu non modo infra, verum etiam supra cubitum defuisse, nisi quod supra, levissimam, tenuissimamque ejus adumbratio vix per accuratam attentamque dissectionem reperta est.

Capite a vertebra abscisso, nihil aquæ ex harum tubo defluxit, nihilque item de ea fuit in cerebri ventriculis, in quibus Choroides plexus ex fusco ruberrimis confixi, ut sanguifera passim quam plurima vascula in medullaris Cerebri substantia dissectione. Ipsum autem, & Cerebellum, & Medulla, & nervi iusta erant firmitudine.

45. Dum has tibi describerem gravissimas, lethalesque convulsiones, quæ profundo manus vulnere successerant, earum venit in mentem quæ post leve vulnus successerant, advenirent digiti indicis, per se quidem non ita graves, sed graviores quam erant, vix tum ob ea quæ adjuncta habebant, tum propter animalculum, a cuius morfu nihil ejusmodi expectabatur. Generosa inter Veroneses Virgo, annos sexdecim nata, cum haud secus ac illa civis sui Catulli (*) Lesbia, passerulum aleret quicum lustraret, dum ex humero dextero, in quem forte insiluerat, auferre vellet sinistra manu, improba bestiola nostri ictu vehementiore digito indicem simul momordit, & fauciat in ipsa articuli primi, & secundi junctura a parte exteriori. Præter communia integumenta, nervi aliquid tum fuisse laceratum, idem indicavit digitus, qui continuo se flexit, ampliusque extendi, aut moveri non potuit: eoque minus mobilis factus est, cum mox in vulnere pus fieret, dolore aucto, & manu quoque contracta, & intumescere. Huc febricula accessit dierum aliquot. Quæ tamen, & omnia quæ dixi, cum manus, tum digiti mala celeri, & felici, ut videbatur, curatione sublata sunt. Sed vix hæc erant consecuti, cum ecce tibi ipso quatuordecimo ex quo digitus fauciat fuit, die repentinus tremor a pedibus, mox a manibus coortus, indeque sensim per universum corpus propagatus, Virginem corripit, periculosam, longamque syncopem afferens: qua soluta, non propterea tremores quieverunt, sed cum gemitu, & aliquo interdum ululatu conjuncti, plures perstitit horas, donec apertis tandem oculis; & laxata quæ ad superiorem adstricta erat, inferiore maxilla ad se rediret, omnium quæ sibi contigissent, prorsus ignara. Brevi autem interjecta quiete, rursus eodem ordine omnia reverterunt, levius quidem, & multo brevius, sed crebro adeo vexantia, ut quotidie sexdecim, aut duodeviginti insulsus numerarentur. Jamque sex dies ad hunc modum res perstitit, cum per litteras, quæ hæc narrabant, consulti sumus pridie Kal. Sextiles A. 1743.

Non perplacuit quidem nobis, Aphorismos Hippocratis (†) recolentibus, febrem eo in casu per corticem Peruvianum fuisse abactam, vulnusculum autem tam cito ad cicatricem perductum, recordantibus, Celso (u) visum esse secundum sectionem quam alias (x) retinendam ostendimus, omnem fere morsum habere quoddam virus, idemque ob gravissima symptomata quæ anferis quoque, & galli morfus exceperet, Matthiam Tilingium (y), Jo. Georgium Sommerum (z), & ante hos Joannem Schenckium (a), hunc ex Bacci, illos ex propriis Observationibus censuisse. Attamen cum hos omnes morfus aut manibus, aut digito, quemadmodum in proposito

casu, illatos fuisse, animadverteremus, partibus quæ aut quia tot tendinibus instructæ sunt, aut quæcunque alia sit verior causa, certe vel sine ulla virulenta infectione laceratæ, & confusæ magnis sæpe, & vehementibus malis obnoxia sunt; ea respondimus, quæ five insultu a citius occluso vulnere, five hujus tantummodo occasione non aliam quam in hysteris, originem habuissent, quippe in Virgine sanguineo temperamento ad melancholicum inclinante, & succi plena, neque tamen pro humorum copia satis per uterum sanguinis singulis mensibus excernente, ea, inquam, respondimus quæ opportuna esse posse, credidimus. Sive autem eorum ope, five ætatis, ac naturæ viribus ea omnia conquieverint, certe nullam postea iis de rebus querelam accepimus.

46. LANARIUS cum Lanario, patruo, an avunculo, certe consanguineo, rixabatur. Multo mero epoto uterque calebat, ut III. Idus Novembris plerique plebejorum hic solent; erat enim dies, A. 1745. Noctū denique a verbis ad arma ventum est. Primus forte cadit, quippe claudus artu dextero. Alter jacentis femur finitrum cultro vulnerat, atque adeo transverberat. Cultri enim mucro paulo supra genu a latere anteriore interno subiens, latere posteriore externo prodierat. Ingens continuo per utrumque vulneris orificium fit sanguinis effusio, quæ, ut nox erat intempesta, ab iis qui aderant, non modo inhiberi non potuit, sed ne retardari quidem tantisper, ut intra sex septemve horas virum, denique in Nosocomium illatum, non absumeret.

CA-DAVER macrum, sed intra sanitatis modum, rudis erat nostris opportunum, tempus autem anni haud importunum. Itaque Idibus, & diebus insequentibus diligenter persequimus. Sed alia quæ adnotavimus, in alia Scripta, ipsius autem claudicationis perfectam causam in alias Litteras (b) rejicimus. Nunc cætera adscribemus. Et primum accurate ad aperto vulnere, tantæ sanguinis effusionis causa in conspectum se dedit. Cruralem enim arteriam, ad popitem contententem, sociamque ejus venam, magna ex parte in transversum incisas deprehendimus.

In Ventre porro omentum moderate pingue, a dextris erat sinistrisque ad ventriculum retractum: hic vix plenus; nullum tamen chyloferum vasculum per menterium, aut per intestina repens usquam occurrit. Ex quibus Tenuia, uno excepto Duodeno, ex cinereo fusca: Coli pars quæ in transversum ducitur, tota, & partium utrinque proximarum portio, ferme ad digiti pollicis tenuitatem contracta. Felle vesicula quoque contracta erat; idque non solum pauca, quæ inerat, bilis ostendebat, sed & fovea ad illam excipiendam in jecinore excavata, quæ, cum respondere latitudine debuisset, multo erat quam ipsa, latior. Renes grandiores, Lien parvus, & insolita quadam figura, nec minus tamen quam illi, sanus; nisi quod mihi inter dissecandum paulo firmiter visus est, quam deberet.

In Thorace pulmones, cætera sani, adeo in se concidentes, vix ut ullos minori volumine vidisse meminerim; sed dexter magis, ut qui summa tantum parte per laxam, nec valde latam membranam alligatus erat ad pleuram, cum sinistri latus magna ex parte esset ad illam artius annexum. Quod feli concidisset, & colore tamen essent; si posteriorem faciem, ut par est, excipias; ex cinereo albicante, causa erat exigua omnino copia sanguinis, quam in valis quidem majoribus tum ventris, tum etiam thoracis superfuisset, animadverterimus; nam pulcherrimo aliquoquin erant colore musculi. Sed & cor prorsus erat sanguine vacuum, vix ut in auricula dextera parvulus esset grumus. Hic ad polyposam concretionem vergebat; cum quidquid alibi restabat sanguinis, esset fluidum.

47. Si ab imposito vulnere peritus Chirurgus statim adesse potuisset, & vinculo quod torcular vocitant, femur supra vulnus adstringere; tandiu saltem hominem servasset, ut liceret de artu amputando cogitare. Nam transversa cum arteriæ, tum venæ magna ex parte incisis rationes curandi alias inutiles reddidisset, quæ prudenter a Cel. Heistero (c) non solum propositæ, sed & feliciter in usum tractæ sunt, cum fere ibidem arteria hæc, at secundum longitudinem, esset vulnerata. Neque ejusmodi incisio cum tanta sanguinis fluiditate conjuncta, poterat vel miseram illam spem præbere, ut grumosus sanguis, quemadmodum in ejusmodi casu ex Sepulchreto (d) intelliges vidisse Bartholinum, vulnus ad aliquot dies obturaret. Cæterum quo ad vulnera vasorum attinet, in utrislibet artibus curationem aut nullam, aut sine amputatione admittentia, legis plures Obser-

(c) n. 2. 31. & seqq. (d) Animad. 2. (e) 26. n. 25. (f) Exposit. Anat. tr. du bas Ventre n. 267. & seq. (g) Comm. in §. cit. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 120. sub A. 1698. (i) Dec. ead. A. 7. & 8. Obs. 166. (j) Sect. hac 3. Obs. 25. §. 18. (k) Ibid. §. 19. (l) De Renuc. Vuln. Sect. 1. (m) Cent. 1. Obs. 53. (n) De Renuc. Vuln. S. 1. & 2. c. 3. (o) De abdit. & c. morbor. causis c. 110. in fin. (p) n. 26. (q) Aft. N. C. Tom. 1. Obs. 86. (r) Dissert. de Pinguet. §. 17. in fin.

(*) Carm. 2. & 3. (†) S. II. 26. & IV. 57. (u) De Medic. l. 5. c. 27. (x) in Cel. Epist. 1. (y) Eph. N. C. Dec. 2. A. 2. Obs. 75. (z) Dec. ead. A. 10. Obs. 82. (a) Obs. Medic. l. 7. S. 1. Obs. 13. in fin. (b) Epist. 56. n. 14. (c) Dissert. de Arter. Crural. Vuln. n. 6. & seqq. (d) Sect. hac 3. Obs. 26. §. 8.

variationes in libro de *Renunciatione Vulnerum Lethalium* (e) ab Joanne Bohno productas: quem eximium sane Virum a me saepe adeo in his Litteris esse laudatum, non miraberis, ubi vel exemplorum quæ proposui, numerum, vel de his perpetuum in Sepulchreto silentium animadverteris, vel demum noveris quid ejus memoriam debeam, qui mihi, præter cætera, suis cum libris aliis, hunc ipsum quoque senex adolescenti benigne miserit.

48. Ad violentas Artus Inferioris Compressiones casus videtur attinere cujusdam Adolescentuli, qui in Nosocomio decessit S. Mariæ de Morte, dissectusque est, cum ego Bononia forte transirem inter initia mensis Junii A. 1709.

49. ADOLESCENTI annos nato ad duodeviginti plausit rota super imum fere sinistram calcaneum ducta, nullam aliam attulisse noxam videbatur, nisi quod communia vulserat integumenta. Dum levis ad speciem noxæ curatio feliciter procederet; ecce post dies aliquot collum, & dorsum rigida fiunt; ut quali tetani quodam genere correptus, artus quidem movere posset, collum autem, dorsumque non posset. Huc illud accessit, ut per intervalla vehementissimis totius corporis tremoribus concuteretur. Quibus omnibus ad viginti, & amplius dies ad hunc modum, sana semper mente, persistentibus, cum lumbricum teretem vomuisset, crescente sensim iteriore vivere desit. PES, sub vesperam inspectus diei ejusdem quo erat mortuus, calcaneum ferme jam sanatum ostendit. Abdomine, quod turgidum erat, ducto, confecta est pauca aqua effusa, intestina autem omnia, & ventriculus sana quidem, sed valde aere distenta. Intra Colon, propter Appendiculam Vermiformem, lumbricus teres mortuus. Thorax quoque in sinistro cavo paucam habuit aquam effusam, illius autem pulmonis posteriorem partem duram, & ex substantia hepatica simili. Concretiones polyposæ erant in vasis Magnis, & cordis ventriculis, in quorum dextero sanguis quoque cum aëre bullulis. Cranio resecto, in Laterali Sinu dextero Crassioris meningis sanguis concretus, in altero fluidus conspectus est, nec sine bullis etiam majusculis. Bullæ quoque plurimæ sub Teni meningis, præsertim ad sinistram cerebri anteriorem lobum. Aqua præterea sub eadem; cujus aquæ sapor nonnemini qui gustare voluit, visus esse nullus, aut certe vix levissimè salus. In ventriculis cerebri aqua non pauca. Nec

pauca effluxit e vertebrarum tubo, præsertim cum lumbricis, & os Sacrum attolli iussissem. Laxum cerebellum, firmum cerebrum: & quæ per hujus ventriculos repabant vasa sanguifera, plexusque Choroides minime albicabant.

50. Quod censuit Vallesius (f) super illo Hippocratis Adolescente qui cucurrerat per viam asperam, indeque doluit calcaneum maxime inferna parte, qua, & vicinia nigra facta, dies omnino a cursu vixit viginti, & quod item Augenus (g), cum de pluribus loqueretur, qui levi ex vulnere perierant, & nominatim de M. Sobrinatorio ex plaga in calcaneo admodum exigua inflicta, præter omnium spem decimaquarta mortuo, nimirum ab levibus exterioribus ejusmodi causis nihil, nisi occasionem, a malo autem corporis apparatu, succorumque malignitate gravia symptomata, ipsamque adeo mortem oriri; idem facile videbitur tibi in hoc casu statuendum: idque eo magis, quod lumbrici, & tam cito aerarum bullarum ex sanguine, & humoribus evolutio accipi pro indicis possunt præter horum dispositionis, five, ut Majores loquebantur, putredinis. Equidem indicia ejusmodi non contemno, ab Hippocrate ipso (h) deducta, ubi mori homines ab omni generis vulneribus, scripsit, & nulla re gravibus; tamen neque hæc admirari oportere illud expendendo, quod corpora hominum plurimum differunt. Præterea nec illud Valerii ignorare me, nolui, qui tibi alias (i) commemoraverim: sine vitæ nostræ variis & oculis causis exposito, interdum immerentia supremi fati titulum occupare; cum magis in tempus mortis incidant, quam ipsa mortem accersant. Denique in his ipsis Litteris (k) cum de vulnere scriberem Virginis illius Veronenis quod gravia sunt consecuta symptomata, quantum istiusmodi indicis tribuam, videre potuisti. Attamen si quis forte in hoc, illoque casu tum naturam partis spectet quam externa læsit injuria, tum genus symptomatum perpendat quæ accesserant, convulsionem videlicet, unde esse potuerunt pleraque omnia non modo quæ in illa Virgine, sed etiam quæ in hoc Adolescente acciderunt; constrictis enim hic illic vasis, & lymphæ, ac sanguinis motu diutius retardato, tum syncope, tum aquæ effusiones, tum pulmonis inflammatio facile fiunt; si quis, inquam, hæc spectans, malit ab extrinsecus accedente causa aliquanto plus quam horum occasionem reperi-tere; non pertinaciter refragabor. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LV.

Sermo est de Ulceribus, & Sphacelo.

SEctionis quæ sic inscribitur, & libro hoc IV. Sepulchreti Quarta est, cum initium ducatur ab Achoribus, & Tinea; non satis apparet, cur non eadem comprehendantur illæ quoque Observationes Lepre, & Pioræ, & Tinea ipsius, quarum alias demum invenies principio Sectionis XI. unam autem prope finem Sectionis XII. (a). Causa autem certe non fuit, ne prolixior æquo foret Sectio hac IV; siquidem & illæ quæ alio rejiciuntur, Observationes paucae sunt, & brevis hac Sectio est, præsertim si Scholia demas, & de Observationibus tredecim quæ sub numero X. proponuntur, decemalibi jam antea productas, ex iisque unam (b) bis positam hic fuisse, animadvertas. Quæ idcirco memorare volui, ne forte mireris, vix aliquas superesse nobis, nullam repetere volentibus, quas hac Epistola scribamus.

2. Ut enim ab Achoribus nos quoque, & a Scabie capiamus initium: si forte scire ayes, quænam a Valsalva, aut a nobis reperta sint in corporibus quæ his fuerant vitis infecta; in Epistolis X. (c) XVI. (d) XXXVIII. (e) XLI. (f) in aliisque facile invenies. Quæ relegendis, velim animadvertas, iis ulcusculis aut per se, aut per inunctiones quasdam siccatis, Infantem ex convulsionibus, Virginem ex hydropse thoracis, & pericardii, Mulierem ex acuta febre, & tympanite, Juvenem ex urinae suppressione periisse; mortis autem causam ex occlusionem ulcusculorum extitisse, quæ cum manantia, morbos arcerent, aut, quod in Infante, & Muliere manifestum erat, etiam tollerent; siccata, stimulant quæ per ipsa

antea ejiciebantur, particulas, noxiumque humorem in sanguine cohibebant, effusum mox in omnibus ferme aut inter maninges, aut in ventrem, aut in thoracem, quem subcærulea aqua plenum in Virgine deprehendi. Incides etiam initio Epistolæ XVIII. (g) in Suturem cujus erat corpus minuta scabie scedum. Ibi autem fac tecum reputes, si quis hanc inunctionem abigere forte voluisset, quanto magis, sic cohibitis erodentibus corpusculis, aucturus fuisset vitia laxata, extenuatque parietis ventriculi cordis sinistri, & Magnæ, huic annexæ, luride intus, & inæqualis arteriæ: idque eo facilius credes, si quid ex represso herpete Trombellio (h) acciderit, nunc veniet in mentem. Porro cum Observationibus illis Valsalvæ, & nostris convenire videbis quæ initio IV. hujus Sepulchreti Sectionis proponuntur, altera (i) in bimulo Principe, cui cum achoris prorsus evanuiscent, cruenta aqua, pro illo corpusculo non pauca, inventa sub crania est, altera (k) in scæmina quæ tinea lotionibus sanata, cerebri hemisphaerium habuit putridum, & ichore citrino refertum. Ad quas, si velis, aliæ non deerunt quas addas, duæ præsertim, altera ex Schulzio (l), ostendens, quot, & quantæ viscera labes exceperint gravem, humidam, diuturnam scabiem, remedio externo retropulsam, altera ex Lanzono (m), quæ monstrat vitia in cerebro, diaphragmate, jecinore inventa, cum acris tinea, & fœda scabies per inunctionem sublata essent.

3. Sed vel sine cadaverum dissectione quorvis quisque Medicus est qui ex retropulsa scabie, aut achoribus interna,

na, externave mala sepe extitisse, non viderit? Meministi, Valsalvam (n) pro tumore consultum esse, qui seu vera ad genu exostosis esset, five eam mentiretur, illi certe de qua loquimur, causâ successerat. Ab eademque causâ quos externos, internove morbos Gerbezius (o) viderit, in hisque malignas febres, quas, nec semel, Lanzonus (p), & lethales quidem, adnotavit, itemque ut asthma observaverit Dethardingius (q), Cummius (r) autem, ab ipso indicatus, apoplexiam, eorum inspectis Observationibus cognosces. Quamplurimas addere facillimum esset, si aut opus foret, aut non essem alias infra (s) commemoraturus. Quamobrem cum ipse quoque meas hic producere non paucas possem; duas, haud amplius, proferam, ambas uno mense Februario A. 1710. in Viris duobus, meis Generosis Civibus, habitas. Alteri manantia capitis ulcuscula, eorum prorsus similia quæ achoris in infantibus vocamus, a frigido nocturni aeris injuriis siccata erant, cum octo vix diebus exaretis, maligna febre correptus est, vomitionibus, & denique singultu stipata, in qua etsi pulsus valde infirmi erant, & præterea quæ dixi, prava alia non deerant symptomata, ipse tamen bene semper sibi habere videbatur: ex eaque, frustra seniore ejus Medico, & me quoque diebus novissimis accessit, quæ opportuna viderentur, præstantibus, nono morbi interit die. Alter persimili, si cutis erosionem, & crustas spectares, affectione laborans, quæ brachia primum, mox crura quoque, denique & partes nonnullas alias cruciabat, cum de consilio nescio cujus indufusus esset, suffusione sulphuris medicato, cutis quidem morbum omnem propemodum abegerat, simul vero rheumaticis universi corporis doloribus prehensus fuerat cum febre conjunctis, qui non modo noctu quiescere, sed & interdiu se de latere in latius convertere prohibebant, quin vel linguam ipsam, & gulam afficere incipiebant. Occursum est a nobis cito, & diligenter. Sed tamen, nisi natura adjuvasset, retropulsam materiam partim ad cutem, partim ad intestina quo per se vergebat, expellendo, neque intra mensem solutos dolores, neque intra ver proximum perfanatam cutem facile vidissemus, neque ægrum deinde fospitem ad extremam usque senectutem provectum. Verum nemini Medicorum, ut dixi, ejusmodi casus non occurrerint ex illo usque tempore quo primus omnium Hippocrates (x) Atheniensem illum memoravit, qui pruriginis toto corpore vehementissime cruciatus, eaque cutis crassitudine, & aspectu, ut lepram referret, cum balneis calidis quæ in Melo sunt, usus esset, a pruritu quidem, & cutis crassitudine liberatus est, verum hydropicus factus, mortuus est. Earum autem balnearum aquas fuisse sulphureas, Martianus (y) censet, & certe Plinius (z) sulphur nobilissimum in Melo insula, Dioscorides (y) autem plurimum gigni tradiderunt.

4. Hæc, atque ea præsertim quæ de morbis commemoravi scabiem consecutis inunctionibus abactam, eo te facile adducunt, ut ex me quæras, quid igitur sentiam de minutissimis animalculis, quæ ætate nostra cum animadvertissent perindustrii Viri, & unicam scabiei causam esse, docuissent, docuerunt quoque, prætermissa interna curatione, quocunque anni tempore, sulphureis, aliisque quæ ipsa interimant, exterius adhibitis esse exterminanda; sic enim sublata causa, cito, & tuto scabiem evanescere, nullo incommodo, nedum morbo, insequente. Ego vero; ut ingenue, quemadmodum solitus sum, tecum loquar: primum admonebo, ne eruditus Viris plus tribuas, quam sibi sumunt. Nam quod ad inventum attinet, nihil facilius est, quam ostendere, animalcula illa vel multo antiquioribus, quam ipsi agnoscunt, fuisse jam nota. Non iis Scriptoribus dico quos ab nonemine objectos esse video ex Daniele Sennerto (z), ubi de Vermibus Dorsæ verba facit, & multo minus iis qui Venam, ut vocant, Medinensem olim memorarunt, post Veschiū (a) a Wespero quoque confirmatam, ut ex superiore III. Sepulchreti Sectione (b) intellexeris. Sed iis dico qui longe minora, & certe breviora animalcula, ejusmodi verbis memoraverunt quibus Abinzoar apud Joannem Lanzonium (c). Sunt enim Syrones, inquit Abinzoar, pedecelli, Arabibus assoabat dicti, qui subter cutem & ad manus, & crura serpunt: pustulas quoque aqua plenas sub cute, ubi delitescunt, excitant: quæ dissecta, prorepunt animalcula tam parva, ut vix visui, quamvis perspicaci, ægre deprehendi possint. Formam quoque ipsorum aliis

antea fuisse microscopii auxilio non incognitam, cum Borelli Observationes indicant a Velschio (d) commemoratæ, secundum quas Syrones testudinis effigies representant, tum præsertim Ettmülleri illa confirmat Syronum Observatio quæ Lipsiæ L. Actor. Erudit. Volumine (e) proposita, præterquam alios nominat qui prius viderint, animalcula ipsa sic descripta exhibet, & delineata, ut descriptio, & pictura perfectiores quidem paucis post annis reddi potuerint, sed tanquam novæ prorsus in medium proferri non potuerint. Potuerunt quoque præclaris explanationibus plura illustrari quæ ad scabiei originem, multiplicationem, facilemque tum per contactum communicationem, tum per certa, exterius adhibita, remedia curationem, ad aliaque attinent de hoc genere. Sed dum curatio ista exterior, interiore omissa, commendatur, videtur his doctis Viris idem accidisse quod Helmontio (f) illam pariter laudanti, hanc improbant. Helmontius enim etsi præter scabiem ab tactu, eam quoque agnosceret quæ sponte oriretur (g); tamen utriusque ut eandem indolem, sic idem semen, live fermentum in cute dumtaxat statuebat. In qua una tanto magis hi hæere morbum omnem, constituunt, quod in illa una ista nidulant animalcula, quæ si nulla in mundo essent, nullam quoque scabiem fore, asseverant, ut quæ nunquam corripit quenquam, nisi aliunde nactum ista animalcula. Igitur ex istiusmodi dogmatibus quid utrorumque Auditoribus partim veri, & utilis, partim minus veri, minusque tuti in curatione docere contigerit, videamus.

5. Medicus prudentissimus, idemque doctissimus Ballonius (h) cum super cutis affectionibus in dogmata quorundam incidisset cum illis contentientia de quibus modo dicebamus; ratione, experientia, & Hippocratis doctrina fretus, tria cutis affectionum genera caute inter se ita distinguenda esse, censuit, ut aliæ sint tanquam cutis ipsius morbi, aliæ tanquam interiorum partium abscessus, aliæ tanquam inter utraque ambigentes. Neque signa per quæ singulas internoscamus, prætermisit: neque dubitavit, ubi cutis tantummodo morbi sint, tunc in externum illud vitium incumbere oportere, non laceffitis per medicamenta purgantia partibus intestinis. Quin huc facile pertinere, indicavit, latas illas Simonis pustulas, quem Hippocrates (i), ubi ad ignem inungeretur, aut calida lavaretur, opem sensisse, scripsit; vomitum autem non profuisse. In primis vero ad propositum facit quod ad verba illa Ballonii adnotatum leges (k): Dum quis cum scabioso concubuit, & cutis infecta, malum hoc vere cuticem est, & superficialia curatio esse debet. Vides igitur, quid veri, & utilis sit in una illa externa curatione, interna prorsus omissa, cum sanus aliquis a scabioso, aut linteorum ejus, vestiumve tactu scabiem paulo ante contraxit. Sed vides simul, quid minus veri, minusque tuti ista eadem haberet curandi doctrina, si scabies non cutis unius morbus esset, sed aut abscessus, aut abscessus simul, & cutis morbus. Neque enim facile assentiendum est, cum scabies nunquam, nisi a scabioso tactu, ab ejusve animalculis nasci dicitur. Num ab illuvie? Num a pravis cibis, potionibusve nunquam nascitur? Certe alter plerisque videtur Medicis, & in his Sennerto, quem Epistola in Samonico II. laudavi, ipseque Samonico (l), si quod ibi ostendere, & explicare studui, revera scripsit, Illorū sudor, vel copia inutilis escit.

Sæpe gravi scabie correptos asperat artus. Num a morbis non oritur quibusdam gravibus, diuturnisve, crisis instat? Num; ut cæteras omitam causas; ab lanarum contrectatione morbidarum ovium? Sane quod Venetiæ olim, aut proximæ huic regioni acciderat, de ejusmodi velleribus loquens, narrabat Virgilius (m),

... invisos si quis tentarat amictus:
Ardentes papule, atque immundus olentia sudor
Membra sequebatur.

Sed non fuit illa proprie scabies. Fateor. Cutanea tamen erat infectio. Quo autem modo illa gravissima communicabatur; cur non & levior possit? Quin Cl. Werthofius (n), variis Observationibus adductus, se libenter crediturum, scribit, scabiem humanam veram ex lana ovium, quibus parum ab simile malum per pasturæ vitia ubivis frequentissima est, primario subnasci; cum enim laneis indumentis fere omnes, & diu utamur; forsitan vix pauca esse quibus non ab impuriore ovibus, aut imperfecte sanatis aliquid immixtum sit: & fortassis opifices lanificis occupatos

(a) Sect. 1. (f) Comment. in l. 5. Epidem. n. 47. (g) Tom. 1. l. 9. Epist. Medic. 2. vel potius 3.
(b) Prædict. l. 2. n. 19. & 20. apud Marinell. (f) Epist. 26. n. 14. (k) n. 45.
(c) in Additam. Obs. 6. (h) §. 6. & 8. (c) n. 9. (d) n. 34. (e) n. 35. (f) n. 4.
(g) n. 2. (h) Epist. 26. n. 39. (i) Obs. l. 5. 1. (k) Ibid. §. 2. (l) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 231.
(m) Eph. eorund. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 113.

(n) Epist. 50. n. 13. (o) Eph. cit. Dec. 3. A. 2. Obs. 167. (p) Ejusd. Dec. A. 9. & 10. Obs. cit. 113. & Obs. 16.
(q) Append. ad Dec. 3. A. 5. & 6. n. 8. in Obs. Parallel. ad Obs. 58. (r) Dec. 1. A. 1. Obs. 38. (s) n. 7.
(t) Epist. l. 5. n. 3. apud Marinell. (u) Annot. ad hunc Hippocr. locum. (v) Nat. Hist. l. 35. c. 15.
(w) De Medic. Mat. l. 5. c. 83. (x) Medic. Pract. l. 2. P. 2. c. 24. (y) Exercit. de Vena Medin. (z) ad Obs. 26. Schol. n. V.
(a) l. 2. Epist. Medic. 22. (b) Medic. Pract. l. 2. P. 2. c. 24. (c) A. 1682. M. Septembr. (f) Tract. 45. inscripto Scabies & cæc.
(g) Ibid. n. 11. (h) Epist. & Ephem. l. 1. Contit. Hyem. A. 1574. (i) Epist. l. 6. S. 2. (k) n. 10.
(l) De Medic. Præcept. c. 6. (m) Georg. l. 3. in fig. (n) Diquis. de Variol. c. 4. adnot. 54. in fin.

patos ideo maxime his malis laborare. Ettmüllerus autem filius Programma ediderat Lipsiæ A. 1731, de scabie ejusque ortu ab impura lana (a), quo eadem scripsit, opinor, quæ anno eodem supra eodem argumento edenda misit ad Cæsaream Nat. Curios. Academiæ (p), pustulofam cujusdam puellæ scabiem ab lana repetens, quæ pro stragulis se noctu obtegebat, cujus lanæ pars esset scabiosis ovibus tonsa. Ibidem Cosciziū laudat, qui ob laneorum pannorum tractionem factores præ aliis hoc morbo inquinari, dixerat. Neque Eliani verba reticet, quod qui lanam ovis a lupis dilaniata pexerit, atque ex ea vestem confecerit, scabiem provocaturus sit ei quæ illa vestitur, an quia ejusmodi ovis ob graviores scabiem infirmior, aut cæteras sequi impotens, aut a cæteris, ne has quoque inficiat, abacta, sic in lupos facile incidat? Nec quia in hac Civitate, in qua tot homines lanificio operam dant, rarius aliquis, vel ex iis ipsis, occurrat scabiosus; ideo Cl. Virorum conjecturæ spernendæ sunt. Alia enim aliis in regionibus pabula sunt, alia aquæ, & alia fortasse in feligendis, purgandisque lanis rationes; & nunc certe in Venetiâ siqua gravior ovium cutem prehendit insectio, non modo earum lanæ rejiciuntur; sed nequis facere fraudem posset, ipsarum cadavera suis cum lanis humo tegere, ut Virgilius (q) ait, ac foveis abscondere, consilium fuit quod Supremo Venetiarum Magistratui, præfecto publicæ salutis, obtulimus, cum super hac re hujus Eximii Medicorum Collegii nomine A. 1724. responderemus.

6. Sed quid, inquis, si ovium scabies ipsa quoque ab animalculis esset quæ per lanas in homines traduceretur? Nolo quærere, num post tot lanarum expurgationes, quæ ab earum insectoribus etiam adduntur, vivere illa possint, cum certe pereant humana in scabiosorum linteis per lotrices expurgatis. Malo te vicissim rogare, ut ad ea respondeas quæ ex Hoffmanni (r), & Junckeri (s) certis quibusdam Observationibus consequuntur. Scribit ille, ortam esse scabiem ex intempestivo acidularum aquarum usu. Docet alter, succum betule majore quantitate haustum, itemque thermas Wolckensteinenses, hasque corporibus in primis floridis, scabiem inducere solere. Nunc quæro ex te, putefne, in his thermis provenire, aut in eo succo, illisque acidulis inesse ista de quibus loquimur, animalcula quæ cuti adhæreant, aut quæ ex interioribus corporis cutem petant? Rursus ille prior (t), sciendum est, inquit, semper facilius esse sanationis scabiem per contagium communicatam, quam illam, quæ ex indigena sanguinis, & humorum dyscrasia, id est sine ulla contagii suspitione, originem sumit. Probat quoque (u) Lanzoni (x), Amici, dum viveret, nostri, Observationem scabiei, primis novæ Lunæ tribus aut quatuor diebus sic in milite crescentis, ut eos dies in lecto traducere cogeretur singulis quoad scabiæ laboravit, mensibus; laboravit autem menses septemdecim. Cui Observationi ex parte non abimiles afferre complures possem, a me olim adnotatas, iisque addere tum quod in scabiosis non semel vidi, ut vigente febre, pruritus cessaret; declinante autem, rediret, tum quod Sacra Virgini accidisse, certo scio, ut quotiescumque sanguis mitteretur; mittere autem non semel necesse fuit; scabies, quæ iam levior facta erat, mirum in modum semper cresceret. Hæc igitur omnia, atque alia, quæ sciens prætermitto, phænomena quæro ex te, ut candidè mihi dicas, faciliusne tibi explicari possent videantur, si scabiem ponas ab animalculis, quam si a sanguine originem ducere. Illud denique scire velim, si cui exterior causa aliqua molestiorem cutis pruritum inducat, ut puta culicum, aliarumve ejusmodi bestiarum injuriæ, is autem pruritus indulgens, cutem usque & usque scalpat sic ut in scabiei similitudinem ulcuscula nascantur; scire, inquam, velim, cur eidem, aut aliis nequeat ex interiore causa is pruritus fieri qui ad scalpendum adigat, & ad cutem unguibus non secus atque cum ab animalculis iis vellicatur, lacerandam?

7. Verum ne forte credas, me plus quam verum, & æquum ferat, istis animalculis adversari; primum fatebor, non modo sæpius ab illis scabiei originem esse agnoscendam, sed & ubi minus illa esse, crederes, nonnumquam revera existere adeo facile ob suam exiguitatem latere possunt, cum ab uno in aliud corpus transferuntur! Sic memini, cum in Patria medicinam facerem illustri

Matronæ, eaque ab longo, vario, & perdifficili morbo tandem convalesceret, ad alias quæ præceperant, crises accedere scabiem visam esse, quæ repente orta, cito cutem propemodum universam occupavit, sed palmas præsertim, ut præ molestissimo pruritu dormire non posset. Cum vesiculas in iis cernerem minutæ aquæ plenas, cujusmodi eas solent esse in quibus ista animalcula nidulantur, ancillas jussi earum unam aut alteram acicula aperire in præclara luce, & siquid globosi, expressa aqua, educere possent, mihi ostendere, exquisitis, quæ forte in promptu erant, vitris instructo oculo, examinaturo. Quid quæris? Oblatum examinare diutius non opus fuit. Vivens erat animalculum, ea ipsa forma quam Recentiores delineaverant. Tum aliud, atque aliud ademere, viventia omnia, & forma eadem. Cum mulierum quæ dominæ infervierant, nulla prorsus esset scabiæ affecta; Medicus qui ante Redium, & Malpighium vixisset, e putredine orta esse illa animalcula, non dubitasset: contra autem mihi minime dubium fuit, quin ancillarum aliqua alicunde aliquod, vestibus adhærens, inscia domum, ad heramque attulisset, idque alia, & hæc cætera, ut fecundissima sunt, brevi tempore peperissent. Neque hoc tantummodo fateor. Sed si forte velis, quod huc Matronæ accidit, idem omnibus qui scabiæ corripiuntur, accidere, unamque hanc semper, cum scabies oritur, causam esse; equidem ipse non facile credam, a te autem tantisper credi, sinam, dum nihilominus ostendam, minime tutum esse, vel sic ortam scabiem, nisi forte in corpore, ut supra dictum est, sano antea, & nuperrime per contagium infecto, neglecta interna curatione, externa tantummodo sanare. Quid enim, obsecro, est scabies, undecunque tandem orta sit, quam ulcuscula, quæ si in unum juncta essent, per sepe ulcus longe amplissimum æquarent? Quis autem Medicus ulcus, non dico amplissimum, sed modicum, per se natum, aut etiam cauterio, aliave exteriori causa inductum, si diutius apertum manserit, non curato prius corpore, occludat? Quid ita? nempe quia per illa emissaria corpus, si quid pravi, aut certe redundantis habebat humoris, jam diu ejicere consueverat. Cur vero non idem in scabiei non recentis ulcusculis sine mora occludendis attendamus? quæ universa cum ulceri amplissimo respondeant, tanto minus sine prævia interna curatione persanare tutum est, quanto plus humoris pravi folebant extra corpus amandare, ejusdemque, in ipsis ulcusculis tum mora, tum ab externo aere vel magis depravati, intra corpus remittere. Scite enim, ut solet, Eximius Archiater Senacius (y), quod pus ab ulceribus exterioribus in sanguinem refluens, non modo pariter, sed violentius aliquando vitæ organis noceat, quam refluens ab ulceribus interioribus, inde esse, docet, quod non huic, sed illi cum aere commercium fuerit. Nunquam tamen vitæ organis vehementius nocuisse crediderim, quam cum scabiosi pueri internam pericardii faciem, externam vero cordis, & ferme omnium quæ pericardio concluduntur, scabiosam effecerit; revera, inquam, scabiosam; nam diligens rarissima Observationis Auctor Buddeus (z) oculis cum inermibus, tum insuper vitro instructis, ejusdemmodi prorsus esse quæ ibi, & quæ in cute erant, pustulas, suo & omnium qui aderant, iudicio comperit. Et tamen corporis ambitus erat totus scabiæ cooperatus: quid, si fuisset retropulsa? Vides igitur, quanti intersit non retropellere: nec vana dicere qui negant, scabiem semper esse unius dumtaxat cutis morbum, & quod consequitur, huic uni adhibenda esse remedia, neglecta reliqui corporis curatione: quæ non modo si negligatur, sed si ita instituat, ut naturæ motus ad cutem vergentis perturbetur; nonnumquam mors, alias alia ingruant mala. Legebis in VI. Ad. Nat. Cur. Volumine totam, quæ Cl. Carlii est, XVI. Observationem. Hæc autem a me dici, putato, ut intelligas, quanta prudentia in Medicis requiratur, scabiosi corporis evidentia alia vitia sive primarum viarum, sive obstructorum viscerum, sive humorum copia, aliterve peccantium recte, atque ordine curaturis. Quæ inter postrema vitia, illius oblivisci nunquam oportet, quod, donec subsistit, scabiæ, quasi chronica quadam crisi, indiget. Exempla dabit laudata Carlii Observatio (a) tum in viro qui cum a nucha scabiosam, sæpe recurrentem, efflorescentiam linimento quodam abegisset, in epilepticas convulsiones incidit; has autem illa re. vertens efflorescentiam sustulit, tum in viro altero, & quodam femi-

femina quibus ejusdemmodi efflorescentia, a longo jam tempore manum sedans, cum exiccabatur, imminet febrem prænuñciabat; febris vero finem, cum redibat. Et tamen parvam occupabat corporis partem, neque in his duobus ab remedio externo repulsa fuerat. Quid ergo? ubi scabies universum tenet corporis ambitum, & non modo per se evanescit, ut in viro ex quo natus erat, semper scabioso, de quo Lanzonus (b); sed unguine sulphurato, aut alio ejusmodi abacta, ut in illo de quo Apinus (c), in iisque juvenibus de quibus scripsit Jo. Sebast. Albrechtus (d)? mirandumne erit, si cito maligna febris, aut gravior alia mala, asthma præsertim, accesserint, quæ non nisi scabiæ aut per se iterum, aut remediorum auxilio revera, vincantur? Sic causam morbi ipsa indicat sanatio, facti videlicet a prava illa materia, quæ ut intus retenta noceat, ita rursus egressa liberat. Pertinent huc Ramazzini nostri (e) in multis habitæ Observationes, qui scabiæ involutionibus retropulsa, postmodum febre correpti, illico urinas nigras & fuliginosas reddebant, iidemque, cum scabies remediorum ope ad cutem pellentium redisset, urinas sanorum similes excrebant; iterum autem retropulsa scabiæ, aut denuo erumpente, hanc reciprocā in urinis mutationem ostendebant. Quo magis Medicus ille cautiissimus quæ supra attuli, Hippocratis exempla, & Ballonii consilia diserte secutus, scabiem non omni tempore unius cutis morbum esse, intelligebat, ideoque solis topicis illam semper, & sine discrimine abigere, opus periculosa plenum alacritate censebat (f). Ramazzino Medicum alterum adde experientissimum, Hoffmannum (g), remedia hujusmodi morbi externa in postremis collocantem, prius autem sanguinis & humorum massam viscidam, acrem, corruptam debitis internis corrigentem. Scilicet missum in ejusmodi morbis sanguinem tam viscidum, & in coagulum quasi densatum deprehendere consueverat, ut vix posset separari.

8. At enim, inquis, neque retropulsa scabiæ semper nigrum lotium, neque in scabiosis omnibus istiusmodi sanguinem videmus, meaque mihi objicis, alias (h) ad te scriptas, Observationes: quasi vero optimum ipse in scabiosis sanguinem observassem, neque aliter in aliis peccantem, aut quasi in variis, ut varia est scabies, variæ esse non possent sanguinis noxæ, variæ noxarum gradus, aut, quod potissimum attendas, velim, quasi aliud se neglecta interna curatione, scabiem non recentem externa dumtaxat abigere. Certe autem cum in pluribus scabiosis, sicuti aliorum, meique ipsius Observationes testantur, non omne vitium in cute sit; quomodo tutum esse possit in omnibus promiscue cutem sanare, interiora negligere? quorum expurgatio si non in omnibus, at in iis saltem quorum naturalia emissaria non æque patent, per exulceratam cutem ex parte fiebat, aut fieri certe poterat. Quid dici ad hæc potest? Illud, opinor, non deesse Medicos qui contra tælentur, quod non tutum esse, negamus, id sibi promiscue in scabioso quolibet, feliciter semper, & sine ullo quod infecutum sit, detrimento successisse. Verum ut nos eorum Observationes in dubium non vocamus: ita æquum esse, credimus, ut ipsi nostras, & tot aliorum Medicorum, quas supra (i) indicavimus, in dubium ne vocent. Ad quas addes Hoffmanni (k) alias, & aliorum qui ab ipso laudantur (l). Quibus, & aliis quas sciens omitto, quot, & quam gravia mala sic abactam scabiem secuta sint, manifestum sit, & quod consequitur, de ea curatione quam alias alium habuisse exitum, constat, quid tutissimum sit constituere.

9. Quoniam autem adversus scabiem sulphur inter cætera in usu est; de eo peculiariter nonnulla addemus, Exterius quidem in unguentis, lotionibus, & indusiis etiam adhibetur, sive ejus suspitione, ut supra (m) commemoravi, sive potius decoctione ita ut posita ad solem, ut ignem exciccetur, medicatus, quem, ut faciliorem, & multo elegantiorē, modum laudat Willisius (n); quamquam an sine malo odore, ut ait, prorsus sit, dubito. Interius autem aliter a Medicis, aliter a vulgo in usum trahitur. Et de usu quidem externo alias probando, alias improbando satis hæcenus dictum est. Nunc accipe, quomodo vulgus in hac quidem Civitate interius adversus scabiem sulphure utatur, & quæ inde nonnumquam accidunt molestiæ, & noxæ. Sulphur, in pulverem comminutum, in vinum conjiciunt non rubrum, simulque cum vino potant. Adolescentulam autem ego novi, quæ cum sumpisset, mox tantam capitis turbationem sensit, ut sibi Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

tunc quasi stulta facta esse videretur, ventriculi, opinor, irritatione ad cerebrum continuo propagata haud aliter ac opii vim Boerhaavius (o) non dubitabat agere dum in ventriculo etiam tum est, neque egere longa illa per chylicos ductus via; nam canem qui ex devorato opio jam fere convellebatur, cum incidisset, opium adhuc in ventriculo invenerat. Utinamque id est; sulphur in ventriculo ipsum agere, si non ex utraque, continuo huc adscribenda, Observatione, at certe ex altera cognosces, aut suspicaberis.

10. MULIER annos nata ad quadraginta, vino, & tabacco magis dedita, quam mulierem decere, & diu quidem bajulo nupta, robusto viro, sed quæ pepererat nunquam, cum ad scabiem quam contraxerat, abigendam sulphur in vino non semel bibisset, novissime autem majori copia; mox cepit male habere, nec semel vomuit, citoque Nofocomium adiit jam febricitans, pulsu duro, & contracto, & de magna querens respirationis angustia. Quamobrem datum oleum ex dulcibus amygdalis recens expressum, & sanguis est missus. Postridie cum vel major esset angustia respirationis, missus est iterum: fuitque, ut hesternus, firmo denique crassamento, nulla tamen crusta obducto, Lactis quoque, audita morbi causa, cyathi dati sunt duo. Sed crescente illa spirandi difficultate, & manifestis urgentibus artuum convulsionibus, languidiore facto pulsu, mortua est ita ut tota intra quadri-duum circiter inchoatus, & finitus sit morbus. CA-

DAVERIS sectio, non ut mortis causam tantummodo inquirerem, sed ut Anatomæ studiosos etiam erudirem; erat enim extremus ferme November A. 1744; ibidem trigesima a morte hora instituta est. Bono habitu erat corpus; sed cutis hic illic minuta scabiæ foeda. Abdomen autem tumidum; neque id a nimia pinguedine; hæc enim ut conditione erat optima, sic & copia erat iusta; neque item ab aquæ multitudine in ventris cavum effusa: quæ etsi non paucissima erat; extra pelvim tamen non apparebat. Verum & ventriculus, & Tenuia intestina, & Colon ad magnos tractus; alibi enim aut naturalis latitudinem servabat, aut, quod finitius prope ventriculum animadvertimus, contractum plurimum erat; distenta ipsa aere, abdomen distenderant. Omentum nulla intestina tegebat, quippe sursum rejectum, an retractum; ipsum enim, & superior illa mesocoli pars quæ transversum Coli tractum sustentat, rigidi erant, & rubentibus maculis hic illic, a tergo præsertim, distincta. In exteriori ventriculi facie vasa sanguifera paulo erant turgidiora. Facies autem interior qua fundus jam propius ad pylori Antrum accedebat, aream ostendit circuli forma, cujus diameter digitorum erat circiter quatuor transversorum. Eam aream ab reliqua ventriculi superfacie hæc distinguebant quod minus lævis erat, minusque nitida, magis autem albida, & vasculis sanguiferis, quasi ab injectione nigricantibus, prædita, cum alibi lævor, nitor, minus albus color ubique conspiciebatur, vascula autem fere nulla, nedum non sic expressa aut nigricantia; ut evidens esset omnibus, quantum area illa tota patebat, tantum de intima lamella ventriculi fuisse erosum. Nec præter hoc, ne in proximo quidem œsophago, aut intestinis, quidquam animadvertere potui quod erosionem, aut inflammationem significaret. Erat hic ventriculus ut æquo amplior, ita sine rugis ullis, parietibus autem valde tenuibus; & annuli pylori vix indicium aliquod retinebat.

Quorum hoc, si non a primordiis, at ab alia aliqua antiquiore læsione fuerit; cætera illa crebris, ut in bibaci muliere, distentionibus, & nuperæ etiam ab incluso aere debebantur. Quæ in ventre adnotavi reliqua, huc redeunt. Jecinoris vesicula subdens paucam continebat bilem. Renes laxi erant. Arteria Magna angustior. Tum muliebris, ut in femina infecunda, diligentius inspe-xi atque incidi. Testes erant vel magis quam ea soleant ætate, parvi & strigosi. Ex sinistro hydatis, acini vix mediocri magnitudine, tota extabat. Uterus dextrorsum inclinatus, & fundo potius parvo; quo magis adnotatione digna erat cervicis, ad inum præsertim, major quam convenit, crassitudo, & coronæ ipsius quæ cingitur uteri osculum, parvum hic, ut in virginibus, & circuli forma. Ex hoc stillabat humor colore lacti similis, neque eo fluidior, nec foetens, copia non prorsus exigua; ut mulier fluore uteri laborasse videretur. Cujus scaturiginem fuisse altiorē ima cervicis, hujus dissectio indicavit. Ibi enim cervicis vesiculæ mucum fortasse liquidiorē, nec tamen lacteum, continebat.

Supere-

(a) apud Haller. in Access. ad P. 9. Meth. Stud. Med. Boerh; imo nunc ab eod. exhibit. inter Disput. ad Morbor. Hist. sub n. CXCLIII.
(b) Ab. Tom. 3. Obs. 30. (c) loc. cit. (d) Med. Rat. T. 4. P. 3. c. 3. Obs. 3.
(e) Cons. Medic. Theor. Pract. Tab. 99. in Cautel. n. 19. (f) c. cit. Theor. Pathol. §. 24.
(g) Ibid. §. 21. (h) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 205. (i) Traité du Coeur. l. 4. ch. 3. n. 6.
(k) Commere. Litterar. A. 1745. Hebd. 42. n. 1. (l) in fine.

(b) Eph. N. C. Dec. 3. A. 3. Obs. 31. (c) Dec. rad. A. 5. & 6. Obs. 117. (d) Commere. Litterar. A. 1742. Hebd. 5. n. 1. M. Mart. & A. 1743. Hebd. 14. n. 1. M. Febr.
(e) Cons. Medic. Theor. Pract. Tab. 99. in Cautel. n. 19. (f) Ibid. n. 28. (g) c. 3. supra ad n. 6. cit. in meth.
(h) in thes. pathol. ibid. cit. §. 18. (i) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. Obs. 205. (j) n. 2. §. 7. (k) §. 15. supra ad n. 7. cit.
(l) in thes. pathol. ibid. cit. §. 18. (m) n. 3. (n) Pharmac. Rat. S. 3. c. 6. (o) Prælect. ad Indit. §. 857.

Superius nullæ vel diffecanti apparebant. Circa medium longitudinis cervicis, duobus locis alte intra parietum crassitudinem conditam, diffecando, inveni cellulam inamem, subrotundam, parvi phaeoli capatam, sine ullis aut ibi, aut alibi erosionis indicis. Thorace aperto, id quod ex lumborum vertebra præferentem leviter finistrorsum se flectere incipientibus, manifestius cognovi, gibbam fuisse mulierem; thoracis enim vertebra multo magis se flectebant dextrorsum. Quod si contra res se habuisset; aut si uterus, quem dextrorsum inclinatum fuisse, dixi, fuisset, ut lumborum vertebra, inclinatus finistrorsum; hanc ad eas feminas adjicerem, quas, de uteri inclinatione scribens, tibialias (p) commemoravi. Sed levissima hic erat imæ Spinæ inclinatio, necquam Innomina ossa, ut in illis, facile sequerentur. Cæterum non ut in ventre, sic in thorace, aut pericardio effusam aquam offendi. Pulmones antierius, & ad latera cum pleura arctissime connexi erant; tumidi præterea, finistrorsum præsertim; sed ab aere dumtaxat, & admisso humore, nulloque duris, nec magis quam æquum esset, ruentes. Cordis ventriculi concretum sanguinem habuerunt, eundemque atrum, qualis & alibi fuit. Cranio secto, quæ intra ipsum erant, omnia laxiora visafunt, quam octavo, haud amplius, ab obitu die; tot enim accurata cæterarum partium diffectio abstulerat; esse debuissent. Vasa per Tenuem meningem repentina, sanguine turgida; in Choroidibus autem plexibus vesiculas aquæ plenas, plurimas, nec minutas, animadverti. Denique omnibus, quæ intra cranium erant, detractis, Perrosi utriusque processus ea facies qua alter alterum spectat, illaque vicinia non levis, sed inæqualis conspicua est.

11. **BAJULUS** mulieris de qua modo dictum est, maritus, vir procerus, & quamvis subpalida facie, & corporis habitu ad macilentum inclinante, tamen robustus, eadem fermeatque illa, ætate, & pariter bibax, eadem qua illa, scabie correptus, eodemque cum illa remedio sed non pari, quod sciam, copia usas; posteaquam illa mortem obit, sex propemodum menses satis commode valuisse visus erat, cum circa medium Majum levi ad speciem febris prehensus esset, sed reipsa adeo extiali, ut non ultra biduum in Nofocomio decubuerit. Primo die pulsus, cæteraque non ita mala, nisi ob anxietatem quandam, & inquietudinem essent suspecta. Eo die idem quod plerique alius initio solet, datum est leve medicamentum quod blande ventriculum, & intestina expiaret. Postridie autem jam ea omnia quæ dicam aderant mala, ut uxoris memores, lac dederint. Vornebat enim: angustia illa eadem respiratoris, qua uxor olim, premebatur: toto corpore convellebatur, delirabat insuper vehementissime, & inter delirandum, sibi ventriculum vivi, clamabat. Per hæc ante diem a decubitu tertium vivendi finem fecit. Quam ob morbi brevitate facile id accidit quod ægre tuli, ut prius diffectum esse cadaver, scirem, quam hominem agrotasse. Diffecit tamen Auditor meus, attentus, & intelligens, nunc merito Feltriensium Medicus Antonius Guilermius: ex quo hæc accepi. **VENTRE** aperto, in omento, & pinguibus intestini Coli appendiculis, iisque præsertim quæ propius lienem erant, sicuti etiam in Adiposa, ut appellant, renis sinistri membrana pinguedo, quæ non multa erat, fusca, & sublivida animadversa est. Colon autem ipsum ab incluso aere triplo quam soleat, latius. Ventriculus contractus, exterius subsuscus, interius autem, sine ulla quidem erosione, inflammatus ad palmæ amplitudinem qui lienem respiciebat. Ima ora jecinoris livida, & nigrescens, nec tamen profunde. Thorace recluso, non minus quam diaphragma ab utralibet facie inspectum, pulmones, & cor reperta sunt secundum naturam se habentia. In cordis ventriculis mediocres polypose concretiones. Caput diffectum non est.

12. Quævis, nam cutis scabiei quidquam retinisset, item nam postquam cum uxore vinum illud sumperat, homo iterum sumpsisset. Utrumque negatum est. Illud vero additum, vinum quo ambo usi fuerant, in vase æreo servasse. Quæ cum audissem, ut perniciosissimum hunc morbum febrem fuisse inflammatoriam, non dubitavi, sic dubitari posse, vidi, an scabies depulsa quidem, sed corpore non bene curato, ea in sanguine reliquisset, quæ causa ex parte aliqua fuisset perneciei hujus tantæ, itemque cum inflammationis hujus sedes

ventriculus fuerit, an ideo facilis fuerit quod jam inde ab illius vini potione nonnihil esset infirmatus. Uxoris certe ventriculus quid ab illo detrimenti acceperit, supra legisti, sive ab æreo vase noxi aliquid traxerat, sive ob admistum sulphur dumtaxat nocuit. Quantum enim nocere sulphur possit, jam olim noverrant antiqui Medici, ex quibus accepit Plinius (q) lac afininum usui esse contra gypsum, & cerussam, & sulphur, & argentum vivum, frustra verente Dalecham-pio (r), ne cum illi scripsissent fortasse spior, id est solanum manicon, perperam Plinius legerit spior, id est sulphur; neque enim inter ista quæ memorat ad minerale regnum, ut loquuntur, attentissima, vegetabile fuisse interjectum in eo quem Plinius descripsit, loco, veri simile est, neque tam leve est scripturæ discrimen, ut facile adeo inter describendum fallere oculos possit. Sed & Galenus (s) sulphur inter ea posuit quæ ulcus faciunt quibus diutius adhaerent, & Haly Abbas, quem laudat, & sequitur Ardoynus (t), ei qui sulphur biberit, ardorem fieri in stomacho, scripsit & incisionem, torsionemque, & intestinis ulcera. Nolim tamen credas, me cuiusque sulphuris generi, & cuiusque aut doxi, aut præparationi, aut militari vires hæc noxias tribuere, qui minime ignorem, sulphur a Medicis non modo recentibus, & contra scabiem quidem, sed & antiquis interdum dari consuevisse. Sed mulierem de qua dixi, ex vino, in vase æreo asservato, & nimia copia sumpsisse, constat; purum autem, & impurum sumperit, minime constat. Incipias autem velim qui in fodinis ipsis quæ admisceri possint, admonere, aut saltem quæ presse indicavit Waltherus (u), cum explorandum, scripsit, an sudina, quæ sulphur vivum præbet, mineras quoque aliter nocivas una cum sulphure ferant: maximeque arsenicum jungi, in plurimis sulphuris speciebus metui: ita se novisse, a scrupulo sulphuris crudi sumto, vomitum, & tormina, & tensum fuisse excitata: quin etiam si aqua sapiens coctum sulphur fuerit, & blando igne fluxerit, tamen in multis non tam alvi dejectiones, quam tormina inde secuta esse. Id vero quocum arsenicum junctum sit, ne exterius quidem scabiosorum ulcusculis esse adhibendum, cobaltum monstrat, quod ut ejusdem cum arsenico indolis esse, jure affirmat Cl. Jo. Adr. Sproegelius (x), ita narrat, inspersum scabioso puellæ capiti miserimam mortem intra paucas horas attulisse, idemque tum scabioso cani a cobalto, tum aliis tribus, quibus cutem leniter inciderat, ab insperso arsenico accidisse: addiditque viscerum labe per diffec-tionem vel majores inventas, quam si tantum arsenici devorandum præbuisse. Cæterum ad puellæ illius casum, addes similem in altera puella, phthiriasi capitis affecta, Harderi Observationem (y); ad experimenta autem exempla illa quæ ex Fabricio Hildano, Jano Antonio Saraceno, Amato Lusitano, aliisque protulit Ettmüllerus filius (z), mortis videlicet, aut gravissimorum symptomatum ab adhibito ulceribus, imo scabiei ipsi unguento quocum arsenicum junctum esset. Quo fortasse etiam pertinet vetustior Bacci (a) Observatio inspersi arsenici buboni exedenti, cui insperioni post triduum mors successit per vomitus æruginosi humoris graves adeo, ut suspicio oriretur dari clam mercurii sublimati. Certe autem pertinent recentiores Goulardi (b) Chirurgi Experientissimi Observationes, cum aliis quas ex Morando indicat, congruentes, nimirum acris erodentium, quæ excrecenti ulcerum carni imponuntur, medicamentorum tenues particulas in sanguinem ita permeare, ut æger veneno affectus moriatur, de vera interim mortis causa nemine suspicante. Quæ omnia si perpendere volueris; inde etiam colliges, quam facile & scabiosorum ulcusculis propriæ erodentis materiæ particulae in sanguinem traduntur. Verum antequam de scabie scribendi finem faciam, quæres fortasse, cur nunquam de Sebaceis cutis glandulis, secretæque ab his materia mentionem fecerim? Ego vero cum de Sironibus sermo esset (c), supervacuum esse credidi admonere, non esse cum ipsis quandam vermiculorum similitudinem, ut olim fiebat, confundendam; quando in hac Anatomie luce, ad quam nonnihil augendam pro meo modulo allaboravi, vel ab Junioribus video diserte scribi, vermes, qui puerorum cutem infestant, specie fallere, & filamenta esse folliculorum cutis sebaceis expressa, exploratum satis esse. Quin etiam accepi, cum endemius sit in Finlandia morbus quem vocant Breft, magnas infantium itra-

strages edens, isque in perminutis consistat universæ cutis tuberculis, in quosdam quasi vermiculos se extenuantibus, nunc, inquam, accepi, illum a Viris doctis ex obstruptione ductuum repeti glandularum sebacearum, an quod secreta ab his materia crassior, & tenacior sit, proptereaque, dum vix lentius prodit, & ferme subleat, in filamenta formetur, non ejus solum quæ porro excerni deberet, sed & compressis ab hac proximis ubique sanguiferis vasculis, materiæ insensibilis perspirationis necessarium adeo egressum morantia? Vides igitur, cur de Sironibus verba faciens, supervacuum censuerim amplius materiam sebaceam commemorare. Potius fortassis id a me fieri aliis locis potuisset. Cum enim secretio oleosa illius materiæ cum propter alia, tum præsertim ad mollem cutem, flexilemque servandam, & adversus erodentia corpuscula munendam instituta esse videatur; consequitur ubi illa secretio aut sublata sit, aut depravata, fore ut ea facile oriantur vitia quæ in cutaneis infectionibus animadvertuntur. Sic in elephantiasi, ut quidam hoc nomen accipiunt, inflexilis, rigidaque fit cutis: quanquam etiam sine elephantiasi interdum, velut in muliere quam olim intra hebdomadas tres sanavit, ut est apud Scalpartium (d), Jo. Fred. Helvetius, in aliaque ab Diemerbroechio (e) descripta; aliam enim, cum descriptionis inter se confecto, esse arbitror, & denique in Neapolitana illa cuius & morbus, & curatio propostia sunt, ut nosti, a Carolo Curtio (f). Quod vero ad erosionem attinet, hanc in iis multo facilius contingere, credibile est quibus non contagio scabies oritur, sed ex erodentibus, quæ in sanguine adeo redundunt, corpusculis, ut vel ipsam insensibilem materiam sebaceam, non modo ineptam ad munendam inunctione sua adversus irritantes sudoris sales, sed contra ad irritandum, & erodendum aptissimam reddant. Cur igitur, inquit, hæc supra non attigisti? Nimirum non attigi, ne Cl. nonnullos Viros aut minoris facere, quam æquum sit, aut laceßere viderer, si ea aut propter negligenter, aut discutienda susciperem quæ ante aliquot annos illi de sebaceis glandulis, secretæque ab his materia propostæ sunt. Cui discussioni insuper non est hic opportunus locus, quippe quæ & longum sermonem & tibi, nedum mihi, ingraturum propter necessariam sæpe eorum quæ alias satis superque tradidi, repetitionem flagitare. Quorum utrumque ex paucis quæ presse indicabo, facile conjicies. Glandulæ sebaceæ sunt, inquit, in trachea, canali alimentorum &c. At tu lege Advers. IV. Animad. 13. Glandulæ sebaceæ passim per cutem disjectas nunquam invenire ipsis licuit. Tu vero inspicias Epist. Anat. III. n. 3. & 4. Viderunt tamen in cute faciei, pectoris, & brachiorum quorundam hominum punctula nigra, ex iisque locis non modo ea punctula, sed unguinolam quoque, teretem vermiculum mentientem, extrinxi materiam: esse igitur in cute cava quedam minima, quæ orificio majora deprehenduntur; sed hæc quæ viderunt, in statu sano non adesse, contendunt. A te autem iterum quæ indicavi, aliaque meorum scriptorum loca, vel potius nati alæ in viris plerisque, & quidem fanis, sunt inspicende. Quid igitur esse, ajunt, cava ista? Vaginam quæ antea pili, nunc destructi, radicem complectebatur. Hic tibi Advers. I. n. 12. (g) & Advers. IV. Animad. 33. (h) legenda sunt, in illis enim ego primum ex pilorum conceptaculis adversus glandulas sebaceas dubitationem indicavi, in utrisque autem quædam ipsi adversantia, aut certe ipsam limitantia non reticui: quibus nunc addas, non futura ista cava in nasi alis majora, ubi videlicet minimi erant pili. Vagina autem ista sub cute in pinguedine defixa est; Columbi enim sententiam veritate nitentur, omnes scilicet pilos radicem suam in pinguedine collocare. Columbus vero neque omnes scripsit, neque ego scripsi, cum ejus primum quoque sententiam protuli, ut ex Advers. II. Animad. 5. cognoscas. Ego enim non modo sciebam, esse pilos a quibus totam cutis crassitudinem pervadi, ostendere non possumus; sed & Columbum ipsum videbam inter cæteros qui pinguedini affiguntur, eos diserte excepisse qui in scroto sunt: his autem adiciendos esse alios, ut puta qui ex proximis colis integumentis, & qui tenuissimi ex auriculari pinna, & ex lacrymali caruncula existunt. Noli tamen credere, vaginas istas pilorum quæ pro sebaceis glandulis substituantur, ideo in pinguedine defixas poni, ut ex hac oleosam accipiant materiam. Prodiere quidem ex iis vaginis materia dicitur quæ sebacea vocatur; sed oleosa tamen non esse, quia lintea materia Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

hac copiose imbuta, flammis satis diu resistent; quasi vero præter illam nihil indulsit, aliisve linteis adhaereret ex sudoris, & insensibilis perspirationis materia, aut illam quidquam præter purum oleum esse, negassemus: quorum neutrum cadere in animum poterat quotidie videntium, quam facile cutis fordes aqua abluantur. Non modo igitur per exterius, sed per interius etiam admista illam sic fati saponacea indolis esse, credimus, nec tamen ut omnes humores corporis nostri, sed peculiari quodam modo, & hinc fieri, ut si statim atque in corpore sano secreta est, inspiciatur, & contrectetur, ejusque effectus spectentur, quantum a cæteris humoribus differat, intelligatur. Hæc vero ad illam quoque materiam sebaceam transferas, velim, quæ circa oculos a tarforum glandulis, & proximæ carunculae separatur; nam & ea cum lacrymali, jugiter secreto, humore permiscetur. Quibus in glandulis, & qua in caruncula, in eaque vicinia quid olim meus quoque labor præstiterit, possem ego quibuscum aliis dicere, qui in illis ante hos duodeviginti annos describendis Anatomies historiam aut se nescire, aut si sciunt, nimis aperte dissimulare, ostenderunt. Sed nec tanti id facio, & jam tibi oblitus fortasse videor, hic, ut supra dixi, opportunum discussionibus ejusmodi non esse locum.

13. Igitur a scabie, id est a minoribus ulcusculis ad cætera ulcera transeamus. Ampliora quam in rustico Viro nos vidisse, non meminimus. Quem nudum, prolucendi sudoris causa, in gurgustio inclusimus, Chirurgi primum impericia nimio ignis calore admoto, tum pertinacia neglectis rusticis querelis se comburi clamantis, pessumdedit. Neque enim ante eduxit, quam toto esset corporis ambitu semiustulatus. Quamobrem et si cutis dumtaxat exulcerata erat; exulcerationis tamen ipsa amplitudo hominem intra biduum, aut triduum in Bononiensi Incurabiliu Nofocomio, quo mox detulerant, ad mortem per afflictores incredibilemque cruciatus perduxit. Huic haud ita absumilem casum ab Ledelio (i) propositum leges: sed juvenilis ætas, promptissima curatio, nec par in omnibus, ut dolores ostendebant, cutis partibus exulceratio, dispares quoque rei exitum permisit. Antiquorum autem ulcerum vel sæpius quam scabiei facta a nobis in missis ad te Observationibus mentio est. Ex iis duæ (k), quæ de expurgatione diximus per scabiem facta (l), peculiariter confirmant. Cum enim ulcus simul, & scabies vexaret; hac evanescente, quamvis non humida, sed sicca esset, illud multo acris cruciatus cepit. Et vicissim, cum ulcera, id quod cicatrices in tibiis docebant, evanuisset, sedæ pustulæ cutem ferme universam occupaverant. Quod autem de scabie dictum est, non nisi cum recens, & aliunde contracta fuerit, per exteriora tantummodo auxilia abigenda, propterea quia si aliter, exitus sic intercluderetur noxiis humoribus tum qui per eam ejici, tum qui ab ea introrsum ferri consueverant, idem merito de ulceribus quoque cæteris statui, reliquæ nostræ satis ostendunt Observationes. Diuturna enim ulcera sive per se, sive ab arte arsenicæ, aut ocellæ, videbis qui morbi gravissimi consecuti sint, cerebri præsertim, & nonnunquam cordis, itemque & tunc, & cum ulcera, quamvis necdum ocella, diu tamen vexassent; animadvertere poteris, serum propemodum semper intra cranium, interdum quoque intra vertebrae, aut intra thoracem, & ventrem fuisse. Quas Observationes ne hic repetamus, Epistolas malumus in quibus pleræque relegas, indicare, nimirum IV. (m), V. (n), XII. (o), XXV. (p), XXVII. (q) XLVII. (r) LII. (s).

14. Sed præter hæc quæ ad tibias attinent, alia quoque alio spectantia ulcera nostris sæpe Observationibus proposuimus, nunc ad abscessuum sinus, & subiectam cariem, nunc ad exulceratos tumores, & gangrenam pertinentibus. Quorum non vacat Observationum loca omnia hic singillatim indicare. Juvat potius nonnulla quæ ad duo modo memorata capita referuntur, subjicere, prætermisiss cæteris quæ minus opportune referri huc, video, ut cum in Sectione hac Sepulchreti (t) inter ulcera producit casus fetus septimestris cerebro carentis, quem cum iis conferre poteris quos sic editos, ex nostris, & aliorum Observationibus, loco, ut putamus, ad id aptiore (u) memoravimus. Quod igitur primum ad primum attinet de duobus illis capitibus, nempe ad abscessuum sinus, de meis eorum curationibus unius potissimum venit in mentem, quam eo libentius hic referam, quod per id præsidium peracta est, cujus vim adversus vel minuta ulcuscula peculiarem, id est adversus scabiem de qua supra dictum est,

T 2

(p) Epist. 48. n. 33. (q) Nat. Hist. 1. 28. c. 9. (r) in Adnot. ad eum locum.
(s) De compos. medic. 1. 6. c. 2. (t) De Venen. 1. 2. c. 15.
(u) Expositio. circa varia venena &c. §. 28. & Exp. 36. (v) Sepulch. in Adnot. ad Sect. 11. l. hujus 4. Obs. 13. Hist. 13.
(w) Eph. N. C. Cent. 3. & 4. Obs. 127. in Schol. (x) De Venen. &c. ubi de Venen. quæ extrinsecus &c.
(y) Memoire sur les Maladies de l'Uterus. (z) u. 4.

(d) Cent. Post. P. 1. Obs. 43. (e) Anat. 1. 8. c. 1. (f) Discuss. d'un raro morbo cutaneo. (g) versus finem. (h) in fine.
(i) Epist. N. C. Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 51. (k) Epist. 51. n. 30. & Epist. 4. n. 35. (l) supra, n. 8.
(m) n. 7. 13. 30. (n) n. 15. (o) n. 2. (p) n. 32. (q) n. 8. (r) n. 4. 33.
(s) n. 30. (t) Obs. 1. §. 3. (u) Epist. 12. n. 5. & seqq. & Epist. 48. n. 48. & seqq.

est, in dubium nunc trahi ab nonnullis video, in primis que a Medico aliquo Experientissimo, Senem æque generosum, ac pium Forolivienſis Eccleſiæ Archidiaconum, Ludovicum Albertinum, vere A. 1711, dyſuria quadam vexare cœperat: quam cum demulcentibus lenire ſtuderet, cras ſiniſtrum dolor primum, deinde abſceſſus corripuit. Ex hoc aperto cum puſea copia quotidie exire diutius pergeret quæ hominem undeſoginta annos natum quam facillime poſſet abſumere; Medicus, & Chirurgus occurrendum cenſere, ille dato lignorum, ut vocant, decocto, hic iis abſceſſui adhibitis quæ ad perſanandum attinerent, Jamque hujus oriſcium ipſum claudi videbatur: cum gravis repente febris exorta eſt, perturbans caput, delirium afferre incipiens. Tum ex altero pede ſanguis mittitur, abſceſſus rursus aperitur: & ſic febris quidem illa abigitur; ſed ex hoc iterum tanta puris copia prodit, & prodire pergit, ut de ægro deſperent, nec ſine ratione. Namque, ut tunc primum accerſitus vidi, æger qui bono antea fuerat habitu, & pro illa ætate robustus, oſſa atque pellis totus erat, & inſimiſſimis viribus, febricula nunquam carebat, acerbisſimis ſubinde cruris doloribus torquebatur, ex eoque tantum eſciebat puris, quantum facile non credidiſſem. Apparebat omnibus, ſervari hominem non poſſe, niſi cras convaleſceret. Sed hoc quam difficile eſſet, inutiles hæcenus omnes Medicorum, & Chirurgi curæ, ac labores ostendebant, ad hæc graviſſima ætas, fervidiſſimum, quod interea advenerat, mediæ ætatis tempus, & præter ea quæ dicta ſunt, ſtomachus remedium pertæſus. Duo tamen ex his ſupererant, quorum alterum, juſ videlicet terreſtris teſtudinis, ſenior ejus Medicus laudabat, alterum, nempe viperinum pulverem, ſenex alter Medicus, quem aliunde ſuperioribus diebus advocaverant, antequam diſcederet, propoſuerat. Cum ſuper utroque conſulerer, primum, ſi ſtomachus ferret, non improbabam; ſed ut facilius ferretur, majoremque præberet utilitatem, plus de altero, ea tamen qua dicturus eſſem, ratione, addendum ajebam, ipſique maxime conſidendum. Scilicet quod in viperino reſteſt pulvere, non tam proſuturum videri, quam ipſam recentem viperam, ſi hujus dimidium carnum cum pari carnis teſtudinis pondere in tenui jure vitulino decoqueretur, eademque viperæ carnes quæ decoctæ eſſent, mox cum ſaccharo, ut vocant, roſato vetere ſubactæ, quotidie mane ederentur, & poſt eas juſ de quo modo dictum eſt, biberetur: huc addi poſſe inter prandium, & cœnulam emulſionem, ut appellat, ex recentibus amygdalis, adjecto paucis ſaccharo quocum miſta coralina eſſent in pulverem tenuiſſimum contrita. Medico non modo hæc non diſplicuerunt; ſed, ut affecta erat ætas, & valetudine, a me ſimul cum ægro, ægrique Conſanguineis petiit, ut ipſe quemadmodum cenſueram, ita facerem. Fecei igitur, Superſique bene juvantibus cœperunt ſenſim cruris dolores, & puſi minui ita, uti quadrageſimo die ex quo hæc curatio inchoata erat, abſceſſus jam ferme ad cicatricem ſpectaret. Quamquam autem febricula jam ante abierat, & virium inſirmitas, maciesque decreverant; tamen ut bona hæc augerem, & confirmarem, ægro ultro optante, non modo annuente, decem præterea dies eadem ſum curandi ratione uſus. Quo tempore exacto, iſ qui ab extremo Aprilis ad medium circiter uſque Septembris magiſque in dies convaleſcens, non modo priſtinum recuperavit corporis habitum; ſed illud ipſum cras unde tandiu tanta puris copia, torque cum hac alba membranarum oblonga fruſta exierant, nihil quidquam nutritione, cum forte obvium haberem Decembris ineunte: poſteaſque incolumis vixit annos aliquot, donec, me jam Patavii degente, extrema ſenectute conſectus eſt.

15. Ut ſuſe hanc tibi curationem deſcriberem, non una me impulit cauſa. Alii enim ſunt qui ea viperis tribuant quæ non habent, ut vim calefaciendi, & ſiccandi tantam, ut ſitim faciant inextinguibilem, & paucos qui ſenibus ſuperſunt, ſpiritus diſſipent: quapropter prohiberi a ſenili ætate, admonebat Claudinus (x), & tempore præſertim æſtivo, & regione calida. Redius (y) quidem vel multo largiori viperarum uſu nullam eſſe motam ſitim in ſene, juveniſſimæ, quamvis æſtas interdum eſſet adnotavit. Ego ut a viperarum uſu nunquam, ſic etiam in decrepito hoc ſene anni tempore calidiſſimo, & in regione potius calida neque ſitim ullam, neque ſpiritus diſſipa-

tionem, imo horum inſtaurationem animadverti, nec ſiccari quidquam, niſi eum quem ſiccari volebam, abſceſſum; reliquum autem interea corpus non modo non ſiccari, ſed reſſici. Contra alii non plus a viperis expectandum ajunt, quam a reliquis omnium animantium partibus ſiccatis, gelatinosa quidam, blanda ſulphureo & vaporoso ſucco præditiſ. Inrelligis, hæc in iis regionibus ſcripta eſſe, in quibus copia non eſt recentium viperarum. Quamobrem non miror, quod ibi in atrophia, in phthiſi, in ſcabie, in aliſque hujus generis malis varia ex viperis conſecta medicamenta nihil præſtiterint, aut quod nihil certe ſolidi quod operæ pretium faciat auxilii ab iſdem in impuritatibus ſanguinis corrigendis peti & expectari poſſe, dicatur. Mihi vero non de ſiccatis viperis, paratiſve ſic medicamentis hic ſermo eſt, ſed de recentibus; illis enim hæc ut prætulim, vidiſti, quippe in abſceſſu qui eatenus ſanari non potuerat, vetuſtorem quam quos ipſi laudant, illuſtremque Auctorem ſecutus, Antonium Muſam, qui ut in Italia degebat Auguſti Medicus, cum incidisset in inſanabilia ulcera, viperas edendas dabat, miraque celeritate perſanabat, ſicuti memoria tradidit Plinius (z). Nam quod illi addunt, ſi quid boni per ea medicamenta præſtitum ſuit, id potius aliis admixtis ingredientibus, & conjunctim datis medicamentis in acceptis reſſeri debuſſe, ut de ſuis illis præparatis verum fuerit, de viperis certe quas Muſa edendas dabat, nec, quod ſecum, remediis aliis commiſtas, ne ſuſpicaturum quidem eſſe te, arbitror, ut neque de illis piſcis in modum paratis, quibus veſci miſerum ſervum, ea ratione ab ſe curatum, juſſerat magnus inter Græcos Medicus Cræteſus, a quo Muſam id præſidi didiciſſe, conſicit Erudiſſimus Meadus (a), nec quas eximius alter Medicus Aretæus (b) in cœna obſonio dabat & ipſe coctas & conditas perindo, ac piſces, id eſt ſale, & oleo, ut proclive eſt ex Cælio Aureliano (c) intelligere. Galenus quoque (d) juſſit viperarum venatorem iſdem uti præparatis in olla, anguillarum in modum. At enim, inquit, non his ſolis venatorem ſanare, conſtat: fatetur enim, quid antea fecerit. Verum de duobus illis prioribus Medicis idem non conſtat. Neque ſi ſanguinis miſſio, atræque bilis per pharmacum detractio venatorem ſanarent; poſt illa viperas Galenus dediſſet, nec his ſanationem acceptam reſtiteret. Idemque a me credito reſponſum iri, ſi forte idem objicias curationibus per viperas, aut per earum partes feliciter peractis, laudatiſſique ſive a Græcis, ſive ab Arabibus Galeni aſſecſis, ſive a Medicis qui prioribus ſæculis extiterunt: qui tot ſunt, ut ſingulos hic nominare tum longum eſſet, tum ſupervacuum, cum videre poſſis apud M. Aurelium Severinum (e). Ex quibus etſi quædam ſunt quæ non facile accipias; tamen non credo, te omnia qualiſ ſabellas, & circulatorias fraudes reſecturum, quando harum accerrimus, ſi quis alius, hoſtis Redius (f) viperæ carnes alexipharmacas eſſe, & remedium multorum morborum, diſerte ſcripſit, ejusque ſagax imitator Valliſnerius (g) quid ſentiret, aperte oſtendit cum longe efficaciore in morborum curationibus Euganeas, noſtras viperas, quam Ferrarienſis agri, & Mantuani, ſimiliumque humidorum, & paluſtrium locorum eſſe, affirmavit, in Conſiliis autem Medicis & quoties mecum ægris commendaverit, memini, & tu in iis quæ edita ſunt, quam ſæpe præſcripſit, videre potes. Quin etiam in iis regionibus ubi minus eſt notum id remedium, putaffes, ex uſu & ſuiſſe, & eſſe, comperies. Sic, exempli cauſa, Emmullerus; filium dico; quamquam & patrem (h), & vetuſtiores, Germaniæ Medicos laudare poſſem; diſerte reſert (i), in proxima Sileſia decoctum viperarum in jure gallinaceo ad hæſticam curandam, & impuritates ſanguinis lymphæque corrigendas tantum non ubique inter ditiores adhiberi. Sic Hoffmannus ipſe (k); ipſe, inquam, neque enim ſemper in hoc ſibi conſtitit; ubi curationem examinat, quæ illuſtri in Viro, aſthmate ſpaſmodico, & hydrope laborante cujus quoque diſſectionem proponit, perperam fuerat inſtituta, minus opportunum quidem non laudat tempus quo viperarum & pulvis, & juſcula data fuerant: ipſa autem dilaudat; namque crebra conſtat experientia, inquit, viperæ & in pulvere, & decocto datas, virtutem poſſidere antiſpaſmodicam, acres humores attenuare, tranſpirationem promovere, ideoque maſſam ſanguineam ab omnibus purgare ſordibus. Sic Adolphus (l) militem proponit qui a moleſtiſſimo, & adverſus auxilia alia omnia pertinaci malo, continuoſo remedium, viperinarum præſertim, uſu liberatus eſt. Sic denique, ne illa omittam quæ dum hæc

hæc ſcribo, inter eorundem Germanos edita ſunt; a me alias tibi laudatus Medicus Jo. Bapt. Molinari (m) commendans e viperis ipſis conſecta decocta; experimentis enim pluribus cum doctorem hominum, tum meis, inquit, comprobata ſunt. Non eſt opus de cultis aliis Nationibus dicere, cum de Indis ipſis ex docto Medico qui Bengalæ annos complures moratus erat, Meadius (n) acceperit, conſtantem ibi morem eſſe medentibus imperare dieteticum uſum viperæ ejus regionis illis quos longi morbi exhauiſſent. Sed barbari illi, eoque non ita ſolertes. Quid igitur de Meadio ipſo dices, quem neque ſcientia, neque peritia, neque judicio, neque auctoritate ulli ex præſantiſſimis Medicis facile poſtponas? Certe illi (o) de viperarum jure, gelatina, carnis, ſale volatili præclare ſenſit, nihilque aliud reprehendit, niſi Anglorum Medicorum nimiam paritimoniam in remedio hoc præſcribendo apto nato ad optimos ſcopos, & cum ipſe pulchram efficaciam videret in obſtinatis leproſis. Num dicemus, efficaciam hanc non viperis, ſed admixtis remediis aliis tribuere debuſſe? Ipſe vero nihil admixuerat, vino tantum uſus in quo duodeſſe dies viperas, modico adjecto calore, maceraverat. Neque; ut tandem ad ægrum a me propoſitum redeam; te opinor, facile crediturum, cum cætera quæ illi dedi, omnia a me tibi conſulto memorata, perpendiſſis, illis potius quam viperis, eam ſanationem acceptam eſſe referendam. Quod ſi tibi forte dubitationis quicquam reſtat; alia mihi in promptu ſunt ſelicium curationum exempla in quibus præter viperas nihil aut dedi, aut dare coactus ſum. Cum enim plerumque, ut ſimpliciter medicinam quoad poſſum, amo, viperarum carnes dumtaxat, & juſ præbeam ſpectatiſſimæ adverſus pertinacem ſcabiem, quam aliis irritis, hæc ratione ſic abegi, ut mundi, nitidique ægri, & pinguioreſ etiam fierent, tum nonnunquam accidit, ut res mihi eſſet cum quibuldam remedia fere omnia, nedom viperas, pertinaciſſime averſantibus, quibus cum auxiliari neceſſe eſſet ejusmodi præſidiis quæ ſentire ipſi, & animadvertere nequaquam poſſent; viperis in juſculis quibus utebantur, incoctis, ſalubri fraude ſalutem attuli. In iis præſertim fuit ſelicium ſenator Venetus, cujus caſus in plerique erat cum propoſito Archidiaconi caſu (p) comparandus. Nam ipſe quoque cum eſſet perſenex, æſtivo tempore, ex diuturno cruris abſceſſu laborabat A. 1732. Nullo autem alio interno auxilio, niſi eo quo dixi, conſecutus ſum, ut homo id ætatis par eſſet ferendo tam longum morbum eaſque puris altitudines effluſiones, humores autem vitiatos in melius adeo mutaret, ut ſic perſanato abſceſſu, ad priſtinas totius corporis, illuſque cruris vires, & nutritionem multo quam ſperari poſſet, citius rediret, ſexque; tot enim poſtea vixit; annos Medicine ope non indigeret. Num vituli, aut pullæ juſ in quo, ſicuti pro cæteris illis, ita pro ipſo ſimul incoqui dimidiarum viperam jubebam, ea vi eſſe quis dixerit, ut quidquid inde boni ſecutum eſt, illi potius quam viperæ, ſit tribuendum? Quærent potius aliqui, cur igitur quod mihi; mihi autem? imo quod plerique omnis temporis, omniumque propemodum Nationum Medicis ſuccedit, non idem omnibus ſuccedat? quaſi vero præter hoc unum, remedia cætera omnibus, ſemperque reſponderent. Aliis nimirum non reſponderet ob id ipſum quod cum aliis, atque aliis remediis commiſtum dederint. Aliis quod dederint non ſatis diu. Aliis quod in viperarum ſelectione decepti fuerint, non in iis captarum ubi credebant, regionibus, & locis, neque eo quo oportebat, anni tempore. Aliis quod in ejusmodi ægros, in eamque morbi aut cauſam, aut vim, aut vetuſtatem incidere, ut nulli, aut certe huic auxilio non eſſet locus. Alia id genus, quantum vis, adde, modo ne in ſcientiam, & fidem eorum cadant, quibus tamen hæc in re non id ſatis fuit quod nunc, utinam ne nimis ſæpe, & plus æquo, uſitatum eſt, a Majoribus diſſentire, niſi eorundem inſuper circumſtantiæ vanitatis, ſi ſuperis placet, arguerent.

16. Senatoris illius præſantiſſimi modo facta mentio rem in memoriam redigit, ad abſceſſus pertinentem. Docuit quidem Hippocrates (q), dum puſ conſicitur, dolores ac febres accidere magis, quam jam conſecto. Id tamen ut quæ in pluribus quoque aliis Aphoriſmīs, plerumque eſſe verum, non ſemper, vel ipſe Epidemiorum libro IV. (r) ſignificavit, ſi non ubi maturos in morbis abſceſſus quodam, ſcripti, ſine febre, & facile ferri; hoc enim Morgagni de Sed. & Cauſ. Morb. Tom. II.

Martianus (ſ) de ſuppuratis, non, ut Vallæſius (t) de iis qui ſuppurantur, accipiendum eſſe, contendit; at mox certe, utroque eorum conſentiente, ubi Leambio poſt dyſenteriam humerum & ſedem exulcerata eſſe, ait, citra febrim. Nos quoque in eo Senatore cum tibi ab non recenti cedemate, & ab levi nupera contuſione, quam exiguum ibi eryſipelas, & modica febris conſecuta fuerant, jam tumentem, mox quidem magis magiſque intumefcere, videremus, nullam autem peculiarem febrim, nullos rigores, nullum doloris, caloris, pulſationis ſenſum æger, aut nos animadverteremus; puſ tamen interea conſici, ſuſpicari cœpimus, nec falſo, ut paulo poſt materia, ſub manibus fluctuantis, non obſcura perceptio confirmavit. Num igitur in ſenibus, num etiam in membris, cedemate affectis, puſ ſit ſine ullis, aut cum paucioribus, levioribusque quæ puſ fieri ſignificet, notis? Utrumque interdum ab experientibus Chirurgis audi, & ubi rationem conſulo, utrumque intelligi poſſe, video; ſecundum tamen magis. Neque enim ſenes omnes ſunt laxiſſimis fibris, aut lentis, inertibusque humoribus. Itaque in Archidiacono de quo ſupra (u) dictum eſt, puſ non conſiciebatur ſine doloribus, & in illo ipſo de quo loquimur, Senatore cum forte eodem tempore quo prior abſceſſus apertus fuerat, multo minor alter inciperet ad imum ſemur, ubi cedema erat nullum; mox indicia quæ ſolent, dum puſ conſiceretur, animadvertis. Poſſe tamen in illis etiam qui floreant, aut firma ſunt ætate, puſ interdum fieri ſine febre, idque in partibus cedemate non tumentibus, Obſervationes aliorum oſtendunt, in primis que Clariffimi, meique amiffimi Collegæ Pujati (x), qui, ut in Leambio Hippocrates, abſceſſus citra febrim conſectos vidit primum quidem in Anu, ſed poſtea etiam in Adoleſcentula: quam ne forte dicas inertioribus fuiſſe humoribus, ut quæ poſt menſes aliquot hydropica obierit; in robuſto pariter Viro conſepit.

17. Age nunc aliqua etiam de carie, abſceſſibus, ulceribus ſubjecta, attingamus. Habes inter initia Epiſtolæ XIV. (y) Obſervationes ad ejusmodi cariem attinentes. Præcipue autem hæc ſubſt in eo morbi genere cui nomen fecerunt Arabes *Ventoſitatis Spina*: quamquam non ſemper apparet maniſeſtiſſima caries, ſed oſſium tumor dumtaxat, & molitudo, velut in duobus que poſt mortem examinavit Mauchartus (z). Eo igitur verbo cum pariter liceat in Tumoribus, atque in Ulceribus verba facere; propterea de illis agentes Epiſtola L. (a) cum de Exſtoſibus quibuldam eſſet injecta mentio, nonnulla de carie, ejusque origine commemoravimus. Sed in Sepulchreto quoque invenies utrobique ad eundem morbum ſpectantia, quorum pleraque fuerunt Patavii obſervata, Sectione quidem II. (b) quæ libro hoc IV. inſcripta eſt de Tumoribus, & Sectione hac IV. de Ulceribus (c). Neutri tamen Pandolphinus qui ea de *Ventoſitate* Tractatum edidit, aut Merclinus, qui hunc tot auxit Adnotationibus, & Obſervationibus, nominatur, aut quidquam ex Schelhammero (d) additur, qui preſſe quidem, ſed doctè & erudite, rem tractat, Obſervationes quoque proferens (e) quarum nonnullas in Sepulchreto non video, & in hiſteriam ſuam, tum præclare Hornium (f), a Tulpio (g) diſcrepantem, adverſus Merclini (h) reſponſionem defendens (i), contendit, Corn. Ceſſum in loco (k) quem indicaverat Tulpus, cancri vocabulo oſſis deſignare morbum ſatis cum *ſpina ventoſitate* convenientem. Certe autem loci ejus lectio cancrum non de oſſe dici oſtendit, ut rectè aſſerit Shelhammerus: quod non vididiſſe Tulpium, & Merclinum, ego quidem non tam miror, quam hunc quod eo in loco non eſt, vididiſſe, id eſt *cancrum oſſis*. Ait enim, atque adeo inculcat, Ceſſum hoc oſſis vitium non cancrum ſimpliciter, ſed *cancrum oſſis vocare*; ut hunc locum Ceſſi non inſpexiſſe videatur.

18. Sed illi in nominibus; Chirurgi autem aliquando, etiam ſeniores, & valde exercitati, in re ipſa, id eſt in carie quæ neque oculis neque ſpecillis pateat, dignoſcenda falluntur. Verum quidem eſt, cariem tunc indicari, ſi ſulca, vel ſubatra ſit quæ ex ulcere prodit materia. Non tamen ſi iſto colore infecta non prodeat; continuo cariem ſuſeſſe, negandum eſt. Nam ſi hæc parvam oſſis non craſſi partem occupet, carni autem ſubſit multa, & amplis ulceris ſinibus excavata; vel hæc una efficiere cauſa poteſt, ne ſulca exeat per ulceris oriſcium materia, quippe cum pauxillum quod ex oſſe eſt, plurima pure

(x) Append. ad Tract. de Ingreſſ. ad Inſirm. Sect. 6. (y) Oſſervaz. int. alla Viperæ. (z) Nat. Hiſt. l. 30. c. 13. (a) De Venen. Tenam. 1. (b) De Curat. tardar. ægritud. l. 2. c. 13. (c) Morb. Chron. l. 4. c. 1. verſ. ſin. (d) De ſimpl. medicam. facult. l. 11. c. 1. (e) Viper. Pyth. P. 3. c. 7. & alibi. (f) Opere Tom. 4. Lettera A N N. che comincia *La Viperæ*. (g) Opere Tom. 3. nel Saggio d'itor. Med. alla parola *Viperæ*. (h) Schröder, dilucid. de Animal. Cl. 1. ubi de Viperæ, & alibi. (i) Conſult. & Reſp. Medic. Cent. 1. Caf. 93. (j) Act. N. C. Tom. 2. Obſ. 138.

(m) Specim. de Apopl. P. 2. S. 4. n. 180. (n) Tentam. i. cit. (o) Ibid. (p) n. 14. (q) S. 2. Aph. 47. (r) n. 22. apud Marſieſ. (s) Annot. ad hunc locum. (t) Comm. ad eund. locum qui ipſi eſt n. 95. (u) n. 14. (v) Dec. Obſ. 7. n. 1. (w) n. 3. & ſeqq. (x) Eph. N. C. Cent. 9. Obſ. 33. & 34. (y) n. 57. 59. (z) Obſ. 40. & in Addit. (a) Obſ. 1. c. 13. (b) De hum. corp. Tumorib. S. 2. P. 1. n. 94. & ſeqq. (c) n. 98. 99. (d) De Medicina l. 8. c. 10. Edit. Amſterd. P. 512. l. 15. & ſeqq. (e) P. 1. cit. n. 109. (f) Microſc. S. 2. P. 1.

pure quod ex carne effluit, permixto diluatur, & sic fuscus illius color occulteretur. Quod in Veneta juniore Matrona A. 1736. accidisse, certo scio, cui magnus in alterius clunis latere innatus abscessus, nec nisi sero apertus, internis, externisque auxiliis incassum jam diu curabatur. Itaque puris colore minime fusco tandiu Chirurgi ne cariem suspicerentur, decepti sunt, donec per eam respondentis ossis illum partem quæ circa ejus medium, in fecminis præsertim, hisque junioribus, præ tenuitate pellucet, jam carie exesam, specillum nullo negotio in ventris cavum transire, animadvertunt. Nec dubito, quin ossæ illius partis tenuitas, ut in ea optima, & meliori forte digna Matrona faciliorem puris transitum in ventris cavum reddidit, sic in aliis quibus profunda vulnera punctim ad eum locum insigantur, non difficile enis mucronem ad intestina lædenda admittat. Contra haud raro accidit, ut specilli quo in ulcerum exploratione usi sunt, colore inspecto, Chirurgi plures malum prænunciare non dubitent, haud attendentes videlicet, ab Hippocrate (1) scriptum esse, quibus a pure coloratur specillum, tanquam ab igne, maximam quidem illos partem interire; non omnes, ibique de empyicis sermonem haberi, nec de quocunque specilli colore, sed de eo ut pro candido & argenteo, velut plumbeum & igne perustum extrahatur, indicia puris feriat accerrimi, ut eximii Interpretis Duret (m) verbis utar. Denique inter cætera cariei genera, illa esset peculiari non modo commemoratione, sed & examine perquam digna, sub qua, cranium exedente, Slevogtii armato oculo innumerorum vermiculorum, lento humori implicatorum, congeries apparuit, quorum multi, aquæ repide infecti, motatione sua vitalitatis indicia edebant. Sed cum ipse qui ut in mortuo hæc vidit, sic in agro nonnulla huc spectantia animadvertere poterat, ætiologiam cariei istius verminose in aliud tempus rejecerit (o); minus hic miraberis, si nos divinare nolumus.

19. Jam vero quæ ad alterum de capitibus duobus propostis (p) id est ad tumores exulceratos, & gangrænas spectant, subjiciamus. Præter eas quæ ad te alias missæ sunt, Observationes, ad tumores illos attinentes, una hæc superest, a Mediavia nostro habita extremo Septembris A. 1739.

20. JUVENI in altero cervicis latere tumor erat exulceratus. Quo in ulcere quidpiam arcani illius pulveris ope quem Philippus Materius Corrosivum Magistralem appellare, & ipse felicissime, sed cautissime quoque, adhibere consueverat, cum visum esset Chirurgus absumendum; ex eo & febris, & dolor capitis, quæ antea jam erant, aucta sunt adeo, ut neque repetita sanguinis missione, in quo crustula polyposa non deerat, neque diluentibus, cæterisque tum datis, tum adhibitis remediis decesserent. Nam etsi dolor in ipso ulcere est imminutus; in fronte tamen, ubi acerbior erat, nunquam remisit. Itaque delirans, & convulsus æger obiit. TUMOR subiectum musculum nequaquam læserat. Is erat quem Levatorem Scapulæ vocitant, illa videlicet parte qua communibus subest integumentis. Glandulæ ejus lateris Jugulares tumidæ erant, & duræ. Cerebri vasa omnia sanguine distenta; medullaris substantia, ubicunque incideres, sanguineis punctis distincta, & ipsa quidem longe mollior, quam æquum esset; cum corticalis secundum naturam se haberet. In lateribus ventriculis multa aqua limpidissima.

21. Etsi caro ex ulceribus excrefcens quanto periculo in extremis corporis partibus remediis tentetur erodentibus, præclare in primis ostendit fidelis Scriptoris Benefici Observatio (7); tamen vel aliis in locis usus ad eundem finem ejusmodi remedium non sine periculo est, ubi dispositio prava sit, quemadmodum in proposito juvene fuisse, indicabat febris jam præsens, cum dolore capitis conjuncta. Sed ab hoc exulcerato tumore ad eum morbum descendamus, qui Tumores inter ab Rei Chirurgicæ refertur Auctoribus, idemque cum maxima corruptione junctus est, ad gangrænam videlicet, initium ducentes a quibusdam Valsalvæ Observationibus.

22. ADOLESCENS annum agens duodeviginti, mediocri statura, & habitu, colore pallido, & subflavo, ex alto adificio in peracutum lapidem cadens, simul ferri cervicem frangit, simul ibidem a lapide vulneratur. Cum in S. Mariæ de Morte Nôocomio ex arte curaretur, non solum de pectoris pondere cum difficultate spirandi querebatur, etsi nihil sanguinei exspuebat, nullamque habebat in exterioribus thoracis partibus, quæ sub sen-

sum caderet, contusionem; verum insuper quarto die delirare cepit, & de dolore vulneris queri, & de quibusdam ad illam partem motibus convulsivis. Insequenti nocte eandem partem immanis invasit gangræna, quæ circa horam proximi diei decimam quartam adeo increverat, ut a finibus abdominis e regione vulneris ad totum pedem se extenderet. Femoris cuticula multis locis, non secus ac si vesicatoria adhibita essent medicamenta, a ferroso humore attollebatur, qui & multis locis acredine sua illam eroderat; ut magna aquæ emanaret copia. Sic æger quincto die interit. CADAVER totum paucis ab interitu horis summa nigredine infectum est, quasi universalis gangræna correptum; mox autem adeo intumuit, ut triplo crassius videretur.

23. Historiam hanc prætermittendam non censui, quæ multo pessimam humorum dispositionem, & celerimum gangrænae progressum ostendit; tamen Valsalva cadaveris dissectionem non addidit, credo, quia insituere non licuerit. Neque enim, modo licuisset, omisissum fuisse, indicant cum alia quæ in ejus Vita narravi, tum præsertim id quod nisi ipse huc adscripisset, non eram facile crediturus. Serum quod gangrænam fovet, tam acre est, inquit, ut cum illud alias gustaverim, non modo summam acredinem perceperim; sed hæc lingue papillas per solidum quasi diem mordicaverit. Vide quo usque hominem impulerit sciendi, experiendique cupiditas!

Cæterum gangræna universalis exemplum habes apud Tulpium (r); sed in fene ejus infirmissime a longo jam tempore erant vires. Habebis quoque apud Warrenium (s), sed in febre flava, pestis genere. Interna autem gangrænarum causa non semper in solo humorum vitio consistit. Illæ enim aliquando crura corripunt, quia Magna arteria ab feirrhoso tumore in ventre comprimitur (t); quo spectat ista quam in Sectione hac IV. Sepulchreti (u) legeris, Hildani Observatio; quamquam in ea non Aorta solum, sed & proxima vena Cava premebatur; facile enim in adeo proximis truncis id est. Nec tamen contra, quidquid potest venam aliquam satis comprimere, idem ad proximam arteriam aque comprimendam valet; ut Cel. Swietenii (x) conjectura quantum cum veri similitudine, tantum cum ratione consentiat, ubi sinistri pedis tumorem, imminetque gangrænam repetit ab illa ca ejus lateris vena, quam unam extremum Colon intestinum, flatibus perquam distentum, pressisset. Sanguinis autem in membra importatio prohibetur, aut minuitur ab his quæ arteriæ imposita hanc premunt; verum ab aliis insuper causis: quas inter perrara est carnea tunica arteriæ ipsius gangræna, quamvis sanæ sint circumjectæ partes, ut in Casu, Hale edito A. 1742. de amputatione femoris non crevata. Minus rara est quæ eundem in amputatione parit effectum, tunicarum arteriæ in osseam naturam degeneratio quæ & illarum flexilitatem tollit, & viam sanguini coarctat. Itaque Kalmus (y) censet, ab hac esse causam, cur ætate præsertim procecti nonnunquam sphacelo pedum absque ulla prægressa causa externa corripiantur. Certe autem inde fuit in Nobili fene, cujus historiam apud laudatum Swietenium (z) relatam invenies.

24. Porro est quoddam gangrænae, imo sphaceli genus apud nostrates rarius occurrens, ut nec Valsalvæ unquam visum etiamtum esset, cum adolescenti mihi ex relatione aliorum narrabat, exsiccationem a pedis pollice incipientem, & sensim ad femur usque productam, ut pes, & crus totum, velut in mumia, sine fetore, arida essent, mortem cuidam mulieri antissuperioribus attulisset. Vidit autem postea, & ego cum ipso, cum Bononia needum discessissem, in Nôocomio Incurabilem. Quin etiam inter ejus Consilia unum legi pro Monacho scriptum ex morbo ejusmodi laborante. Erat is duos supra quadraginta annos natus, obesus, humoribus ad scorbuticam dylerasiam vergentibus, impetigini, & podagra antea obnoxius, tum etiam, idque a longo tempore, crebris digiti pollicis alterius pedis suppuratibus, unde fuscum semper colorem is digitus retinebat, donec exsiccatione corripit inciperet, lentissime per totum denique eum digitum, postea autem per totum pariter proximum digitum propagata. Qui non secus ac pollex; quem frustra amputaverant; ex quo prehensus hoc morbo fuerat, aridus semper sicque permanerat, nisi quod nuper circa extremitatem ejus digiti tendinem aliquod incipientis puris indicium fuerat animadvertum. Et quamquam ut plurimum in metatarso obscura quedam inflammatio esse videbatur; erat tamen hæc

hæc sine ullo subsistentis humoris vestigio, mediocri autem cum dolore. Febris quoque non semel quidem accesserat, circa vesperinum præsertim tempus exacerbata; sed nullo unquam prævio horrore, nullo valde acuto comitante symptomate. Quæ hic tibi volui diligenter describere, ut cum his mox possis quæ apud Auctores postea legi, ut propostis mihi fuerant, exemplis comparare. Creberrima, sicuti alibi, in quibusdam Gallia regionibus extiterit. Neque enim solum circa A. 1710. sicca ista gangræna adnotata est, sed & circa A. 1676. ut in Historia Regiæ illius Scientiarum Academiæ (a) indicatur, imò & A. 1706. ut fulius ab Rudolpho Jacobo Camerario (b) videre poteris commemoratum, & rursus A. 1747. ut Commentaria versans laudatæ Academiæ (c) reperies. Semper autem ibi culpa rejecta est in vitata fecalis grana, quippe in caritate annonæ a pauperibus, præter quos neminem is corripiebat morbus, in paranda farina cum integris prohibique grani relicta: quæ alibi quoque, nimirum cum sylvæ hercinia incolas idem vexaret morbus, sunt apud Brunnerum (d) accusata. Ipsa tamen sine certa corporum dispositione tantum potuisse, non crediderim, tunc saltem, cum mares solum, non feminas, si paucas excipias puellulas, in istis pagis eadem invaderet gangræna. Cæterum plerumque alias utrumque fecum infestabat: & alibi alio tempore aliquanto aliter, ut alios quoque occuparet artus, partesque alias, ut plurimum autem a digitis pedum inciperet; reliqua discrimina, libros, & Auctores quos nominavi, inspiciens, per te videbis. Ego enim ad eos casus redeo, in quibus ea grana accusari non poterant. Et Benivenius quidem (e) ubi de infelici exitu loquitur gangrænarum a digito pedis, præsertim in senibus, incipientium, aliquid huc attinens videtur indicare, cum incipere carnem, ait, paulatim nigrescere, vel livorem fieri: quin & aridam interitum atque siccam. At certius, ac apertius Hildanus (f) in septuaginta annorum viro, podagra obnoxio, gangrænam describit post molestum frigoris sensum, & ituporem, a digitis pedis sursum paulatim serpente sic ut pes, & crus carbonis instar nigra fierent, frigida, & supra modum sicca & extenuata sine ullo unquam dolore, pulsu autem vix nonnihil mutato, & appetitu vix depravato. Idem Smetii Observationem profert (g), pedis videlicet in muliere, ejusdemmodi sphacelo correpti, ut aridus, nigerque linguam bovillam referret fumo induratum. Huc quæ Barbettus (h) de gangræna tradit scorbutica, ex parte accedunt, nimirum quod a pollice soleat initium sumere, in crustam siccam degeneret, nullo fetore sit, & dolore aliquando nullo. Nunc quæ mihi per litteras descripta sit, accipe, cum Matthæus Tornierius, spectatus dum viveret, inter Vicetinos Medicus pro Comite Generosissimo me consuleret extremo Februario mense A. 1720.

25. Is gracili habitu, egregio colore, alacer, promptus, vegetus, robustus adhuc erat cum annum quartum supra octogesium exegisset, nullo unquam in tam longa vita correptus morbo qui adnotatione dignus esset. Sub Januarii finem insolito frigoris sensu, post triduum autem tanto frigore prehensus est, ut lectum petere cogeretur, ibique nihilominus horas aliquot frigeret, donec calidis sæpius admotis linteis, corpus tandem reliquum caleficeret; sed pedis sinistri omnes digiti, & metatarsi frigidissimi permanerent, nihil sentirent, vixque Flæctentium musculorum vi, quorum videlicet carnem in ipsis digitis non esse, nosti, nonnihil flecterentur; & quod multo deterius erat, lividulus posttridie color jam a pollice in metatarsum pergens animadvertetur. Occursum est interitis, externisque remediis. Sed quamquam in metatarso livor, & frigus nonnihil remittere visa sunt; circa finem tamen Februarii extrema digitorum, jam cute erant nigra, sicca, & mumia instar dura, neque in ipso metatarso initia deerant futuri morbi, cute jam duobus locis in ejus dorso nigricante, imo in altero eorum locorum jam dura. Duriuscula quoque erat ad tarsum certo, ubi nigricabat, loco. Ipse autem tarsus novissime factus erat nonnihil tumidus, & si digito premeres, vestigium servans, & dolens. Quin etiam plura planta se extulerat parva albaque vesicula, vix pauxillum aquæ continens. Ad malleolos idem ferme qui in tarso, tumor. Crus reliquum nonnihil potius extenuatum. Inter hæc æger, etsi febris, levis quidem, a morbi tamen die septimo, quo primum coeperat, jugiter perstabat; pristinam alacritatem, consuetum pulsu robur, & appetitus vigorem retinebat, ut videli quod ad servandas vires homini præsertim haud ita pauca edere solito, non tenuis permittebatur, libenter uti-

retur. Quæ cum perlegissem, nec spem aliam reliquam esse, intelligerem, nisi ut ægri vita quoad ejus fieri posset, diutius produceretur, ea continuo rescripti, quæ hic necesse non est omnia commemorare. Fusc enim quid de præsidio tum quæ adhibebantur, tum quæ addi possent, mihi videretur, ingenue, ut par est, & consuevi facere, exposui. In hisce alteris cum quæ improbarem, aut suspecta haberem, significassem; diserte inter cætera laudavi cum Hildano (i) succum lumbricorum terrestrium ita, ut Wierus solebat, paratum, exterius, ut exsiccationis tardaretur progressus, parti adhuc sanæ adhibendum. Nec tamen reticui, nisi anni tempus præfrigidis aeri ægrum pedem sæpius exponere prohiberet, perpendi illud etiam posse, utrum hoc in casu imitatione digna esset ratio quæ in eundem finem haud infelicitate cessaret Ha-genli Medico Samueli Cabiau (k), qui pedem, & crus ferme totum sphacelo emortuum penicillo majori, optimo terebinthina spiritu intincto attingere, vel quasi pingere cum imperasset assiduissime; consecutus est, ut torridum, imo Mumia quasi Egyptiæ instar, parti adhuc incolumi, sphacelo minime progrediente, adhereret, sicque Anum nonaginta duorum ferme annorum menses propemodum sex in vivis servavit. Cum cætera facta essent quæ probaveram, aut addideram; æger, si non tandiu quam illa, at certe diutius vixit quam ii qui aderant, sperare se, ostenderant. Nam sub Maii finem rursus per litteras consultus sum, quibus narrabat Tornierius, etiam tum alacrem, ut antea, pulsu non debili, suoque propemodum roseo naturali colore ægrum esse, appetitu vigere, non sitire, lotium iusta copia reddere, idque colore, & substantia secundum naturam, dura autem alvi recrementum non nisi quincto, aut sexto quoque die, ut sanus consueverat. Et morbum quidem intra eos tres menses progressum esse; at paulatim adeo, & lente, ut in quinquaginta circiter dies transacti essent priusquam digiti, & metatarsus, & ad malleolos usque tarsus nigri, duri, & plane mumie similes fierent. Deinde vero cum prope malleolos nigra, & dura cutis se extulisset, sub ea forficibus ablata, ulcus inter malleolos retectum fuisse: quod esset, cum scriberet, manus latitudine, colore ad superiorem ambitum vivide rubro, nec sine dolore cum medebantur, sed malleolum externum, & tibie partem nigricare; ad inferiorem autem ulceris ambitum frigidam esse, & putridam carnem, & nonnihil fetentem, quæ ubi paulatim, sicuti faciebant, adempta esset, ut erat illa eo loco quo tarsi ariditas, duritiesque definebant, visuri erant, num putridi aliquid subesset, an quidquid molliis in tarso fuerat, revera in mumiam, ut videbatur, esset conversum. Quod ad crus attineret, antierius quidem secundum naturam propemodum, fura vero nonnihil esse subtumidum: crure compresso, aliquam in ulcus exprimi puris guttam, nunc albicantis, nunc rubro colore infecti; tamen ejus cutem naturalem calorem, coloremque servare. Ulceris pus esse variegatum: illiusque parti qua putridum esset, ea quæ putredini adversantur, imponi; quæ autem vivide rubrum, lumbricorum terrestrium succum adhiberi, ut quem ibi quoque valde proficuum experirentur. Quod reliquum esset, lentam illam febriculam nunquam abiisse, imo aliquando etiam intendi: noctes aliquas inquiete traduci ob pruritum in corporis ambitu, nonnunquam ob motus spasmodicos sani cruris, denique cute quantumvis etiamtum molli; ægrum tamen ad extremam maciem esse redactum.

Cum alia, tum hoc præsertim postremum vehementer displicuit, ut quod vitæ diutius protrahenda spem valde minueret. Attamen ne Seni Generosissimo, & Medico Humanissimo prorsus deessem, quorum uterque ob ea quæ antea scripseram, plus mihi quam ipse agnoscerem, tribuebant; cum ad cætera respondissem, ea potissimum laudavi quæ adversus reliqua convenirent quidem, sed in primis adversus maciem. Itaque de duobus remediis quæ illo anni tempore valent plurimum, vipera, & lacte adjiciens, ut siquid utilis ex Hildano superiore consilio proposuisse me, crederent, hoc etiam ex eodem Auctore (l) acciperent, adversus istud ipsum morbi genus laudante non solum miliebre lac, sed, si hoc desit, asinum: a quo si ferretur, facilis postea esset transitus ad vaccinum. De his remediis duobus utrum maluerint, nescio: hoc scio, ægri vitam ad ætatis initium, protrahi non potuisse.

26. Habes fusc, ut de morbo non ita apud nos frequent, quid ad me scriptum fuerit, & quid ipse responderim.

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

(1) Coac. Prænot. apud Duret. l. 2. c. 16. n. 48. (m) ad eum locum. (n) Dissert. de Carie Cran. in Historia sine. (o) §. 26. (p) n. 14. (q) 30. (r) Obs. Medic. l. 3. c. 46. (s) Vid. Haller in Addend. ad pag. 662. fust. Accession. ad Boerh. Meth. Stud. Med. (t) Vid. Acta Erud. Lips. A. 1693. M. Nov. in Relat. Chirurg. Barbet. (u) Obs. 10. §. 21. (v) Comment. in Boerh. Aphor. 422. ad B. (y) Disput. de Tendi. Achill. disrupto &c. in ipso sine. (z) Comment. cit. §. 424.

(a) A. 1710. Botanica. (b) Eph. N. C. Cent. 6. Obs. 82. (c) A. 1748. (d) Eph. cit. Dec. 3. A. 2. Obs. 223. (e) De aditus nonnullis &c. morbor. causis c. 71. (f) Cent. 4. Obs. Chir. 92. (g) de Gangr. & Sphacel. c. 7. in fin. (h) Chirurg. P. 2. l. 1. c. 14. (i) l. supra ad n. 24. cit. c. 13. (k) Eph. N. C. Dec. 8. A. 5. & 6. Obs. 215. (l) c. 13. cit.

Num vero in hoc etiam gangræne genere locus esset proponendi interius quidem corticem Peruvianum, exterius autem aquam tepidam, cogitasset forsitan, si de illo tum exitissent Observationes, quamvis alias aliter respondentes, cum ab aliis Solertissimis Viris habitæ, tum Bononiæ præsertim ab Experientissimis illis Academicis (m) repetitæ; de tepida autem innotuisset felix Cl. Benevoli consuetudo ex Observatione in primis illa (n) quæ sic gangrænas vicit, non modo nigram, sed & duram cutem efficientes. Et quod ad Peruvianum quidem corticem spectat, etsi in gangræna sicca ut laudatum scio a Cl. Chirurgo Guisardo (o), ita ab altero ejus vim in dubium tractam esse, intelligo (p); tamen quemadmodum inter cætera quæ corticis utilitatem adversus gangrænas alias ostenderunt, experimentum illud in primis attendendum videtur in quo omnia in melius vergebant dum cortex fumeretur, pejus autem dum omitteretur, & denique rursus melius, dum rursus in usum traheretur; sic non leve pondus ad eandem in sicca etiam gangræna utilitatem monstrandam simili Observationi inesse, crediderim, quæ in Historia extat Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis (q): quæ enim in pede inceperat, gangræna sicca pro altera corticis exhibitione, & intermissione, alterne melius, pejusque habebat donec sub ejus haud amplius interrupto usu pervicta esset. Veruntamen repetitum sæpius experimentum, neque in gangræna incipiente solum, sed jam perfecta, optandum hic esse, vides; nec Benevoli consuetudini, ut ad remedia exteriora transeam: tunc esse locum, quando id quod durum est, non detrudere, sed vel magis siccum reddere statutum sit, ut æger diutius fervetur: ad quod ea quæ emortuam partem, quasi cadaver quoddam, condire possent, sunt adhibenda. Contra etiam, atque etiam videndum est, ne facile in similibus gangrænis ad ea quæ pus moveant, descendamus, Medicorum illorum memores, qui per suppurationem id quod erat in pollice pedis mortuum a vivo separare sperantes, gangrænam quam Boerhaavius (r) ibi sex menses coercuerat, ad femur usque tridui

spatio promoverunt. Quin etiam in persimili casu optima jam esset suppuratio; æger tamen servari non potuisse, refert Cl. Dieter. Sproegelius (s), monetque, in morbis ejusmodi ne optatis quidem, & succedentibus ex sententia suppurationibus adeo facile esse fidendum. Quæ res vel una eorum spem retardare posset, qui in istiusmodi senum gangrænis emortui membri amputationem laudarent. Sed alia insuper accedunt, ut puta si quod Kulmus (t) censebat, & certe aliquando est, ab offe factis, arctatisque superius arteriis nata esset gangræna, aut si in sanguine, ut creberrime accidit, inexpugnabilis esset gangræna causa, unde factum est plerumque, ut persisteret aut ejusdem membri, aut alterius partem mox idem morbus invaderet, sive a Chirurgo amputatione peracta, ut in Hildani (u), & Tulpii (x), & aliorum Observationibus, sive facta ab natura ipsa separatione, ut in epidemics, quas supra (y) indicavimus, gangrænis a vitiatas fecalis granis videre licet. Hæ igitur causæ, præter decrepitam ætatem, in Ægro a me descripto cogitare de amputando pede non permiserunt. Sed etsi extremum illud auxilii genus ferre homo persenex potuisset, neque alio idem malum paulo post redisset; tamen difficile factu erat, ne mox novo alio aliquo de tot quibus illa ultima ætas patet, se exerente absumeretur. Ut enim morbi dumtaxat unius exemplo utar, eoque ad hujus Epistolæ propositum attinente; inter magis provectos Auditores meos est Medicus qui tres, neque ita longo temporis intervallo senes hic vidit, calcanei omnes alium ulcere, alios gangræna correptos, feliciterque perfanatos, quorum omnium sanationem arenarum miclus excepit, & hunc vesicæ inflammatio, hanc autem mors. Itaque ut in ætatibus firmioribus, heroicis, quas vocant, curationibus est locus; periculum enim spes opponitur longæ felicitis vitæ, sic in extrema senectute cum quod opponas magno periculo vix esse possit, senioresque tuta etiam & miti curatione fanati, mox nihilominus iatereant; ab hac secunda eos curandi ratione non videtur temere esse recedendum. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LVI.

Sermo habetur de Ossium Fracturis, Luxationibus, aliisque vitis motui officientibus.

Etsi propositos morbos Sepulchretum divisos exhibet in proximis Sectiones duas V. & VI. hæ tamen sunt breves adeo, ut Observationes utriusque, & Scholia universa foliis duobus comprehendantur: neque hæc impleverit, nisi aliqua jam supra posita repeterentur: quod vel ipso initio Sectionis V. factum deprehendes, si Observationis I. §. 1. eique subiecta duo prima Scholii capita cum II. Sectionis Observatione XV. §. quidem 3. & appposito ad hunc Scholium comparaveris. Nobis vero qui de Vulneribus Istibusque agentes, sæpe ossa fracta memoravimus, potius quam eadem hic iterare, placet quidquid in Valsalvæ, aut nostris schedis superest quod ad propositos attineat morbos his unis Litteris complecti, initio ducto ab eo offe circa quod præcipue nostræ sunt Observationes versatæ, cum fractum, an luxatum esset, inquireremus. Quæ res coget, ut promiscue de utroque morbi genere, non separatim, verba faciamus.

2. Veteres ut cæterorum ossium, ita etiam ossis femoris caput e sua sede excidere non dubitabant, eoque minus quod etsi difficile prolapsi repositionem, difficiliorem autem repositi conservationem esse, sciebant, tamen utramque egregie aliquando præstitam esse, ex Hippocratis, & Dioclis, & Philotimi, & Nilei, & Tarentini Heraclidis testimonio non ignorabant. Hi enim clari admodum auctores ex toto se restituisse, ut Celsus (a) ait, memorie prodiderunt, & ille quidem Heraclides non semel, quod ejus locus ostendit, nobis a Galeno (b) conservatus, qui se quoque femoris luxationem bis jam ita curavisse, ut in reliquum tempus non amplius exciderit, idemque post Heraclidem alios multos recentiores præstitisse, confirmavit. Sed quod Heraclides, & Galenus adnotaverant, id tunc succedere cum relaxatum, non cum disruptum est, teres, ut vocant, per quod femur cum acetabulo conjungitur, vinculum, propterea quia per medicamenta fieri potest

ut absumpso laxante humore, laxatum vinculum rursus contrahatur, non ut disruptum coalescat, Medicos ut in parte verum docuit, sic in parte a vero assequendo magis, magisque abduxit. Verum enim est, laxato vinculo, prolapsi ex suo acetabulo femoris caput; sed non æque est verum, idem caput sæpe prolapsi, quia disruptum sit illud vinculum. Itaque ut luxatio femoris a causa interna qua videlicet laxetur vinculum, negari non potest; sic ejusdem luxatio a causa externa, a violentia nimirum quæ disruptat vinculum, non erat tam facile inter frequentissimas ponenda. Nec posita esset, si hinc difficultas in rumpendo vinculo validissimo, inde vero facilitas in capite femoris ab sua cervice avellendo, sive in hac frangenda fuissent inter se comparatæ. Intellectum enim esset, vires quæ possint illud vinculum disruptum, multo citius hoc caput posse a cervice avellere, sive hanc frangere, sique, nisi quid forte peculiare hic habeant nonnulla corpora (c), femur ob capitis avulsionem, aut ob cervicis fracturam, non ob luxationem, prolapsi. Hæc autem, aliaque ejusmodi vix tandem animadverti cæpta sunt postquam instituta in mortuis dissectione manifestissime ostendit, quæ capitis femoris luxatio ab externa violentia credebatur, eam ferme semper fuisse capitis avulsionem, sive cervicis fracturam. Neque enim ex quo Pareus (d) ingenue fassus est, & cautis Chirurgis aliquando, & sibi in matronæ curatione accidisse, ut illi capitis femoris avulsionem, ipse cervicis fracturam pro luxatione acciperent, statim de rei causis cogitatum est. Deceptus autem Pareus fuerat a majori femoris trochantere quod supra ischion tangens, femoris caput esse, crediderat, donec posttridie dum iterum in acetabulum os compellere nitentur, a strepitu subaudito collisi ossis de fractura admonitus est, primisque omnium, quod sciamus, fallaciam hanc quanto graviores, tanto ob signorum

rum communiter, & similitudinem, faciliorem in femore quidem detexit. Nam generatim, sed in pueris dumtaxat, indicaverat Columbus noster (e), cum posteaquam docuerat, si hædi, aut agni, vel alterius animalis nuper nati ossicula decoxerimus, in eorum extremitatibus partes quasdam, id est appendices, sive epiphytes, divelli ac concidere, esse conspiciendos, tum, plurimis interjectis, admonuit, si tenella puerorum ossa validius imperiti medici manu fuerint attrita, ligamenta eo usque extendi, ut secum una appendices divellant. Divulsionem autem, & dem redire, & propterea a me promiscue accipi hic posse, facile intelliges, ubi animadvertitis, sive caput femoris a cervice avellatur, sive cervix a femore, in adultis utique non posse hæc sine fractura contingere, haud fecus ac si cervix ipsa in medio frangatur. Sed neque in pueris, si rei effectum, & signa attendas, magni adeo referre, putabis, si avulsionem a fractura non separe; nisi forte signum illud quod a sano capite collisum inter se ossium, in hac magis, in illa minus habere locum, existimes: quanquam in pueris fere avulsio accidit, non fractura, neque in adultis ipsis quantum momenti in signo illo est, cum adest, tantum quoque est, cum abest. Fractæ enim cervicis extrema rarius respondent inter se, nec semper alterum ad alterum a Chirurgo admovei licet, ut satis collidi inter se possint: nec semper potest sonus, qui levis fere, & obscurus est, satis audiri: quamobrem accidit aliquando, ut non nisi posttridie, si curi de Pareo diximus, imo ut non nisi pluribus interjectis diebus, discussaque inflammatione, tandem audiretur.

3. Ex quo Pareus rem detexerat, non statim rei causas esse quasitas, sed dissectiones quæ rem evidenter ostenderent, expectatas esse, supra diximus. Multo autem diutius expectatum esset, si primum illa a Verneyo, ut nonnulli credunt, aut ab Ruyschio, ut alii, aut etiam ab Rolsincio essent institutæ. Quin Rolsincius ipse (f) indicavit qui triginta ante se annis illud fecisset, Casparum videlicet Hoffmannum, qui Commentariis A. 1625. editis in libros Galeni de Usu Partium, cum monuisset (g), fieri aliquando, ut fractura sit, cum putetur luxatio esse, cum videlicet femur vel in summitate, quæ appendix est, frangitur, vel in ipsa cervice; illud, inquit, de appendicibus omnibus monet Columbus l. 1. c. 2.; hoc ego vidi in femore felis: subjecitque suam felis Observationem, ex quo junior a vi externa semper claudicaret, credita luxationem passæ, in qua tamen dissecta, non luxatum femur, sed femoris cervicem fractam invenit, cervicis capite in suo acetabulo etiam tum hærente. Et continuo causas addidit, cur humerus facile luxetur, femur difficulter; quarum prima est, quia ille quidem caret hoc ligamento terete, hoc autem habet: altera, quia hujus acetabulum strictius est, & profundius, tertia quia ejusdem junctura firmioribus musculis cingitur, atque instruitur. Quæ omnes causæ nunc etiam proferri solent: quanquam Rolsincius Hoffmanni Observationem descripsit; eas omisit: id quod etiam ex Sepulchreto (h) intelliges, omnia quæ Rolsincius hac de re habet exhibente, nisi quod hæc tamen verba prætermittit, inter Scholium, & Hoffmanni Observationem interjicienda: Multoties erratum ingens hic observavimus, & simile adnotatum ab Hoffmanno. Num autem mortuos secundo, observaverit, an vivos tangendo, ut in altera Scholii parte Diemerbroeckius, ipse existimabis. Certe Parei in matrona illa animadvertionem, & monitum horum memoravit. Aliud enim est quod nescio ex quo Parei capite produxit Rolsincius, qui dum infantibus hanc epiphysem nutricum culpa, & junioribus levi de causa, ut ex ossium probatatione, disjungi, inculcat, se per Columbum magis, quam per Pareum, profecisse, ostendit. Sed Hoffmannus in Posthumo Opere (i) univèrse confirmavit quod olim ex illa junioris felis Observatione docuerat, statuitque, maxime verum esse, fracturam potius in cervice femoris contingere, quam luxationem capitis femoris, ob ligamentum imprimis teres, quod in ipso acetabulo est: quanquam A. 1641. ad ipsum referens Veslingius (k) non nihil rem contrahere videbatur, specians videlicet, cum id contingit, non modo ligamenti robur, sed & fragilitatem ossium quibusdam naturis insignem. Hæc paulo fufius ad te scribenda putavi de iis qui ante nostram ætatem de re proposita mentionem iniecerunt, ut quid cuique tribu-

endum sit, appareret, sive in præeundo, sive in agnoscendo, sive in demonstrando, sive in rei ipsius causis inquirendis. A quorum Observationibus antiquior illa fortasse non discrepat Jacobi Sylvii (l) in latomo lapso ex alto qui crus fregerat ad caput coxæ; cruris autem nomine quid intelligeret, cum saepe alibi, tum ibi præsertim manifestum est, ubi (m) ligamentum illud teres quod sæpius memoravimus supra, ab acetabuli fundo ortum, describens, in medium, inquit, cruris caput inseritur.

4. Eorum autem qui nostra scripserunt ætate Observationes, non omnes tamen hic quidem, easque strictim indicabimus tum quia crebrius hæ sunt in omnium manibus, tum quia præcipue extant in Salzmanni Dissertatione (n) anno edita 1723. qua copiose, & accurate, siquis alius, causas exposuit ob quas difficilior luxatio femoris ab ejus colli fractura internoscatur, & facilius tamen hæc, & quod consequitur, sæpius quam illa, ab externa violentia contingat. Sunt illæ Observationes in iis habitæ quorum claudicatio a luxatione, non a fractura esse credebatur, aliæ autem ad Ruyschium, aliæ ad Cheseldenum, aliæ ad Erndlium pertinent, accedentibus cum Ravii approbatione aliis Borltii Observationibus, qui cum octo pariter claudicantes secuisset, nunquam luxationem, sed fracturam semper, ut illi, cervicis femoris deprehenderat. Ruyschius autem, cujus potissimum, auctoritate res confirmari nostris temporibus cepta est, & rei causas (o) simul cum Observationibus protulit, & in harum quibusdam peculiare aliquid adnotavit, nimirum cervicis olim ruptæ, & comminutæ, non solum non superstitis reliquias fuisse, sed ejus loco aliquando (p) plura ligamenta comperta esse dura, crassa, teretia, quæ non exterius, sed interius ducta, femoris caput cum suprema ejus parte connecterent; aliquando autem (q) cum hac illud rursus conglutinatum, ferruminatumque fuisse repertum. Ad quas duas peculiare adnotationes nonnulla sunt quæ adjicias. Ad primam, Salzmannum in Dissertatione alia (r), quinquennio ante eam quam laudavi, emissa, indicasse, ligamenta illa dura, & crassa quæ inter caput, & femur Ruyschius viderat, & ab natura in cervicis locum substituta esse, non dubitaverat, ex periostio facta esse, quod a fractura laceratum, ibi non raro durius, & crassius fieri solet, ac ligamenti vicem præstare, cuius rei exemplum in fractura quadam ulnæ, & radii jam olim in Erndlium Aëtis Lipsiensibus (s) propositum fuerat. Sed tamen hoc saltem attendas velim, Ruyschiana ista ligamenta non ad exteriores fracturæ ossium parietes, ut periostium, ubi est, solet, sed ad eorum partem anteriorem pertinuisse. Ad alteram, id est adnotatam ferruminationem, sive conglutinationem fracti femoris cum suo capite, quod alioquin sejunctum in acetabulo inveniri solet, adjiciendum est, cum ea accidit conglutinatio; accidisse autem non semel novimus; id deligationibus acceptum esse referendum, per quas femur ad caput appressum diutius servatum est, ægrique constantia in quiescendo, omnemque motum vitando. Neque tamen non clauda illa anus erat, in qua ejusmodi conglutinationem invenit Ruyschius. Etsi enim deficiente femoris collo, os totum minus extrorsum obliquum sit, eoque artus minus brevis, quam futurus fuisset; tamen sic femur femori proprius est, & musculorum ipsius, & cruris momentum directiones mutantur. Sed & illa claudicabat femina de qua in Erndlii indicata Observatione sermo est, tamen ipsa fracta cervix per callum, digiti pollicis latitudine sub capite extantem, coaluerat, ut non deesse cervix videri posset, nullaque in ligamentis, vicinisque tendinibus læsio, aut præter naturam constitutio apparebat; adeo facilis est post fracturam claudicatio! Quanto autem amplior, & firmior est tota illa pars summi femoris quæ cum cervix sua basi cohæret, quam cervix ipsa, tanto is coalitus de quo primum diximus, minus quam hic alter, difficilis est; cujus augeat difficultatem eadem quæ faciliem fracturam facit, obliqua cervicis protensio. Impulsus enim quem homine, exempli causa, ab alto in pedes cadente, recta crurum, & femorum ossa impune sæpius excipiunt, ferre vix unquam potest cervix in transversum protensa, adeo præsertim fragilis, & a capite cujus ascensui acetabulum obstat, motum femoris, sursum propulsi, sequi prohibita. Hæc autem eadem causæ, cum muscoli femur sursum trahunt, fractæ cervicis partes, rursus inter se contingentes, & coalescere incipientes, disjungunt, atque reglutinant. Et cervicis

(m) Comment. de Bonon. Sc. Acad. Tom. 2. P. 1. inter Medica. (n) 16. (o) Vid. apud Haller. in Access. ad Boerh. Meth. Stud. Med. P. 13. c. 4. (p) Vid. Aët. Erud. Lips. A. 1751. M. Jul. (q) A. 1748. (r) Vid. apud Swieten. in Comment. ad illius Aphor. §. 324. (s) Obs. Select. §. 37. (t) Vid. supra, n. 23. (u) Cent. 4. Obs. 92. (x) Obs. Med. l. 3. c. 42. (y) n. 24. (z) De Medic. l. 8. c. 20. (a) In Hippocr. de Artic. Comment. l. 9. n. 42. (b) Vid. infra, n. 5. in fine. (c) Oper. l. 24. c. 21. (d) 16. (e) De Anat. l. 1. c. 2. (f) Dissert. Anat. l. 2. c. 42. (g) Vid. l. 3. in fin. (h) Sect. hac 6. Obs. 2. cum Sched. (i) Arolog. pro Galeno l. 2. c. 81. (j) Epist. 25. (k) Observ. post Iagor. (l) Iagor. l. 1. c. 3. (m) De Luxat. off. femor. & c. 4. (n) Theat. Anat. 8. n. 103. (o) Theat. 9. n. 74. (p) Ibid. n. 44. (q) De Articul. Analog. & c. 2. §. 1. & c. 3. §. 2. (r) A. 1685. M. Nov.

cervicis quidem hunc positum Auctores vetustissimi non ignorarunt: itaque Hippocrates (1) discrete scripsit, *caput femoris, & cervicem articuli natura obliquam esse*. Aristoteles autem (u) cum femur biceps esse, dixit, non id quod Niphus (x) interpretatus est, voluit, *alterum videlicet femur esse a dextris, alterum a sinistris*; modo enim hoc satis indicaverat; sed hinc maiorem trochanterem, inde cervicem in supremam femoris parte spectans, ipsum biceps esse, docuit. Cur autem ita divisum sit, & cervicem habeat pene in transversum protensam, longe manifestius est, quam cur cervici fragilis adeo structura contingerit. Nam & aliis quibusdam ossibus commune, non huius dumtaxat, ut Docti quidam Viri ajunt, est peculiare, ut partes emittant quasdam, cum ipsis angulum intercipientes, ut puta scapula, & inferior maxilla. Sed emissæ ab his partes longe firmiori structura sunt, si suis cum ossibus conferantur, quam cervix femoris cum hoc comparata. Neque ipsa osse cui additur, est tanto crassior, ut de ea pariter dici possit quod de extremis longiorum ossium partibus, sua crassitudine, si non structura, fractioni resistentibus.

5. Quid vero in plerisque accidit quibus cervix fracta est; ob eas enim quas diximus, causas rari omnino sunt quibus coalescat; mox videbimus, ad Salzmanni illam aliam Dissertationem transeuntes, simulque eas quas in memorata hæcenus referre non potuit, indicantes; non omnes tamen; plures enim apud alios extare, novimus; sed unius solum, & alterius mentionem facientes, quæ, cum hæc scriberemus, erant in manibus. Igitur ut illi quos omittimus, ita etiam experiens, industriusque Chirurgus Gregorius Barbetus, sicut in Apologia (y) est quam ad nos humaniter misit, idem, in dissectione a se femina vidit octoginta circiter annos nata, cui tamen ad quartumdecimum usque ex quo ceciderat, diem non brevior sano artu alter fuerat, cervix tamen femoris fracta erat, an, ut suspicatur, quia cum initio esset non prorsus fracta, tandiu musculus femur moventibus restitisset? Idem tamen alteram proferit Observationem hominis qui a vehementi calcis ictu ad eundem femoris articulum diu claudicaverat. In eo luxatum femur deprehendit, ut capite dorsum ossis ilium contingeret, nullo tamen ligamento vestigio superflite, orbiculari autem deformato, & acetabulo quasi deleta. Ipse autem Salzmannus qui duorum quæ singula in singulis suis illis Dissertationibus egregie constituit, neutrum ingenue fassus erat sibi etiam tum contigisse, ut per dissectiones conficeret; quinquennio post, utrumque interea ita ab se compertum affirmare potuit (z), ut quod ad primum attinet, fracturam femoris frequentius quam luxationem deprehendere sibi licuisse, asseveraret: quod vero ad alterum, duo femoris luxationum exempla proferret, in quorum uno femoris caput, cervicem non fracta, in altero (aa) cervix, a capite, quod absumpturn erat, abrupta, ossis illi sedi externa paulo supra acetabulum insisteret, & citò attritu a longo tempore facto cavitatem quandam & sicut velut superficiei efformaverat, unde, pede breviori læter existente, utrumque subiectum, quamvis non expediret, gressus firmare, & progredi utrumque poterat. Nec vero exemplum de duobus his primum, aut Observationem quam ex Actis Berolinensibus ipse in Dissertatione (bb) produxerat, & siquæ aliæ non frequentes, ut vere ait, istiusmodi Observationes ejus similes quam paulo ante secundo loco ex Barbetto commemoravi, sententiæ adversantur suæ, quæ ex ipso Dissertationis ejusdem titulo satis apparet *De Luxatione ossis femoris rariore, frequentiore colli Fractura*. Cum plura enim hujus extent, quam illius, exempla in adultis quidem, & a causa externa, ut Ruyschius (c) raro, Ravius (d) rarissime luxationem accidere, confirmant; exempla quædam contraria non officiant cautæ prudentique Salzmanni sententiæ; imo, si hæc nulla essent, stare ejus sententia non posset, quæ rariorem esse, luxationem affirmat. Quin, cum enumerat (e) causas, propter quas hæc interdum contingat, ut pervulgatam ligamentorum laxitatem ab arthritide, circumjectionum musculorum, tendinumque paralyfim, majorem æquo a primordiis acetabuli amplitudinem, aut capitis femoris parvitatem, item in margine acetabuli fracturam aliquam, aut defectum, aut tumores denique intra acetabulum subortos; proclive est nobis intelligere,

ubi aliqua ex his causa sit non tanta quidem, ut per se adhuc possit femoris caput ex acetabulo extrudere; tunc si forte externa aliqua vis accedat, non difficile fore, ut luxatio fiat, sicut in iis pariter quibus a natura laxiora aliquanto obtigerint ligamenta, aut teres (quæ rara Nicolai (f) Observatio est) prorsus nullum.

6. Nunc quando nonnullæ sunt Observationes commemoratæ quibus ostenditur quid in illis acciderit quorum femur aut fractum, aut integrum ex sua sede prolapsum, restitui in eandem non potuit; subjiciendæ sunt aliæ eodem attinentes. Et Joannes quidem Salzmannus in Dissertatione illa de qua supra indicatum est, inscripta *De Articulationibus Analogis, quæ fracturis ossium superveniunt*, cum hoc argumentum generatim pertractet, plura habet quæ libenter inspicias, & huc transferas; sed Observationes proferet quarum pleræque cum ad alia attinent ossa, tum præsertim, in viventibus tactu dumtaxat judice, non in dissectionis cadaveribus judice etiam visu, habitæ sunt: itaque ex iis quas potissimum hic quaerimus, habet nullam; nisi forte attinere huc velis Ruyschianam illam qua cervicis loco crassa quadam vincula caput cum summo femore committebant; nam quæ ex Diemerbroeckio sunt, illæ, ut supra (g) animadvertimus, ad anatomicam inspectionem non pertinent. Pertinet autem duplex in una muliere Observatio quam in Dissertatione legi Osteologica (h) sub præsidio Celeberr. Gaubii edita, ab eodemque benigne ad me missa. Femur utrumque ex suo acetabulo exciderat. Dexteræ autem caput erat integrum; sinistri carie plane consumptum. Itaque cum singula nova acetabula, in singulis ilium ossibus, singulis illis capitibus respondentia spectarentur; acetabulum sinistrum leviter, dexterum profundius erat excavatum; vetera autem acetabula ferme deleta; ut facile posset existimari, vetera hæc orbata capitibus, quæ sua mole, & pressione, & motu ipsa conservarent, suum cavum ferme amisisse, nova autem illa sic inæqualiter esse excavata, quod capite sinistro antea exelo quam satis apprimi potuisset, corpus a dextero suffultum, eoque integro, magis magisque os ilium dexterum ad ipsum apprimendo, ut ab eo excavaretur, efficeret. Neque ab illa olim vidisse Pareum, animadverti ex quodam ejus loco (i), quem opera pretium est hic tibi describere. Non ita raro, inquit, excrementis humores in Ischiade tanta vi in hujus dearticulationis cavitatem quasi impetu quodam incurunt, ut relaxatis ligamentis... caput ossis femoris hinc facile depellant, nunquam restituendum, si paulo diutius absuerit: quia interim in illam cavitatem ilaplus humor, mora velut in lapideum quasi concrevit, femoris vero ille articulus in vicino osse novam sibi cavitatem attrivit, vere vero cavitatis labra, quæ cartilaginea sunt, strictiora & depressiora evaserunt. Porro hæc, & siquæ sunt aliæ, cum femur aut integrum, aut fractum in exteriorem incubuit partem, excavati interdum in ilium osse novi acetabuli Observationes sine cadaverum dissectionibus posterius non minus ignorassent, quam Hippocrates in eo libri de Articulis loco (k), quem si proferam secundum eam versionem quam plerique post Cornarium secuti sunt, minus facile intelligas, ut opinor, quam si ex Feliciani versione, conjuncta cum Galeni interpretatione produxero. Sic igitur Hippocrates, de femoris luxati capite verba faciens. *Cum tamen in carne, in quam prolapsus est, articulus moram invenit: & caro lentorem contrahit: dolore vacans temporis processu evadit. Cum vero dolore vacat, absque baculo, si aliqui voluerint, possunt ambulare: possuntque corpus læso crure sustentare*. Sic autem hæc interpretatur Galenus (l): *Per translationem moram. i. tripiçov dixit a locis a viatoribus diuturna immoratione attritis, atque assuescitis. Eiusmodi autem oratio ejus hæc est. Cum caput femoris e propria sede elapsum in exteriorem partem, in carne firmatum fuerit: inter initia qui id patiuntur, ex compressione dolore afficiuntur: postea vero temporis processu caro ibi, non secus ac fossorum manus, occalescit. Quod cum fit, locus dearticulationis similis evadit: cum mora illa quemadmodum antea acetabulo coxæ, caput femoris utatur. Postea vero quam dixit quomodo post inflammationem humor ibi quidam lentus ac mucosus relinquatur; id, inquit, ad motionem capiti femoris commodissimum est. Ob hanc enim humiditatem mora illa ram-*

quam

quam articulo utuntur. Quid igitur in re hæc Veteres illi conjicerent, & quid insuper morborum cada-verum dissectiones ostenderint, ex eorum comparatione præclare intelligis. Hæc autem omnia in ipso Epistolæ hujus initio longa oratione præfatus sum, ut paucis dilucide possum quæ singulæ attineant, & quas confirmant mox producendæ Observationes, significare. Earum prima ex Valsalva est.

7. MULIERI sexaginta annorum, difficili respiratione cum rufi laboranti, casu os femoris luxatur. Tunc assidua accedit febris: quæ, aucta spirandi difficultate, mulierem undecimo die interimit. VENTRE patefacto, jecur invenitur durum, in ejusque vasis plures calculi. Thorace recluso, pulmones appaerunt magnis extra, intusque nigris maculis variegati. A dextris una circiter aquæ libra; a sinistris paucillum thoraci inerat. Concretio polyposa dilatata cordis auriculam dexteram implebat: altera in sinistro erat ventriculo, indeque se producebat in vasa. Tandem quod ad femur attinebat, revera luxatum inventum est, laxato videlicet eo ligamento quod femoris caput intra Innominati ossis acetabulum alligatur.

8. Quæ luxationem præcesserat, difficilis respiratio, & rufis ab dilatata auricula, aqua in thorace deprehensa, & duro jecinore possunt repeti. Quæ vero luxationi successit, febris, ab dolore, & vexatione quæ luxatio attulerit vicinis partibus: a febrili autem sanguinis motu, pulmones, aliæque viscera afficiente, aucta difficultas spirandi, & mors. Sed quod luxatio sine fractura cervicis contigerit, id teretis, ut vocant, ligamenti laxitati tribuendum est, minus fortasse a natura, aut a progressu quapiam causæ firmo, & robusto, eoque ut magis a casu laxaretur, facileque cederet, jam disposito. Neque hæc Observatio adversatur sententiæ Ruyschii, ut qui raro quidem, ut supra (m) dixi, id contingere, affirmavit; non, quod aliqui ipsi affingunt, nunquam accidere, negavit. Fracturæ autem cervicis Observationes has duas accipe, quarum prima ab exercitatione apud me Discipulis, altera a me ipso habita est.

9. VIR rusticus ex arbore delapsus, femur luxasse credebatur. Quod cum in suam sedem reponere frustra Chirurgi conati essent tanto majori sedulitate, quod elapsum femoris caput manu percipere sibi videbantur; forte accidit, ut Juvenes illi qui me non semel audivissent docerent, quanto facilius a vi externa cervicis fracturæ, quam femoris luxatio, contingat, & quomodo trochanter major Pareo ipsi (n) pro femoris capite impuisset, hæc minime reticerent, nec tamen seniores illos Chirurgos a præjudicata opinione abducerent. Itaque quibus circiter exactis mensibus cum Thoracis moribus hominem qui e lechulo necdum surrexerat, corripuisset, & catarrho quasi suffocante confecerat ante finem A. 1727. per dissectionem cognoscere voluerunt, ipsi, an Chirurgi deceperint. FEMORIS summo osse, ejusque acetabulo relictis, omnibus qui aderant, Anatomes, & Chirurgiæ studiosis ostenderunt, perfectam in medio fuisse cervicem, dimidio hujus altero ad caput, quod acetabulo inhærebat firmius, altero ad os femoris prope trochanterem, qui in vivo homine si cum fecerat, adhærente. Ex eodem autem corpore, quod iæctericum nequaquam fuerat, quot qualesque calculos, in fellis vesicula inventos, ad me attulerint, & quæ ego de iis experimenta ceperim, cum ad Schroëckium scripserim, & ipse ediderit (o), non est hoc loco repetendum.

10. FEMINA annos nata circiter quadraginta, pinguis, a sinistris clauda, dorso nuper ad imas costas vehementer contuso febril correpta, & intra dies quindecim assumpta fuerat A. 1742. quo tempore cum Anatomem in Gymnasio docerem, ex Nosocomio cadaver illuc translatus est. Ubi quod ad exteriorem illam contusionem attinebat, nihil peculiare adnotavi. Adnotavi autem alia, in primis quæ ad claudicationis causam spectabant. Eaque post nonnulla in Thorace, & ventre animadverti, hic tibi, quemadmodum plurimis qui tum aderant, monstravi, diligenter describam.

CORDIS auricula dextera, & Cava Inferior vena concretiones, non sine multa alba substantia, polyposæ habuere: quales uterque etiam ventriculus, sed multo crassiores sinister. Ex Aortæ arcu non tres, sed quatuor nascebantur arteriæ: Vertebralis enim sinistra non ex Subclavia, sed inter ipsam, & Carotidem ejus lateris oriebatur. In Ventre genitalia, & renes, & vasa sanguifera hæc quæ

adnotarem, obulere. Testis alterius superficies maxime erat inæqualis. Uteri osculum nulla cinctum corona; ut nihil intra vaginam protuberaret. Renes autem pro mediocri mulieris statura ambo æquo longiores: sinistèr ad extremum inferius facie exteriore nonnihil excavatus a cicatrice, cujus ambitus ad circuli formam accedebat, diametèr transversum digitum æquabat, vestigio, ut credidi, hydatidis in rene olim ex parte conditæ, reliqua extantis. Magnæ arteriæ truncus æquo tenuior, non ipse Spermaticam emittebat dexteram, quæ ab Emulgente proveniebat: neque eodem quo solet, modo Lumbares, neque Iliacam sinistram pari ac dexteram longitudine, sed tertia parte brevior. Quod fac attendas, jam enim ad ea accedimus quæ ad claudicationis tum effectus, tum causas pertinebant. A sinistris enim, ut dixi, mulier claudicaverat, isque artus erat digitis quatuor brevior, quam dexter, & calcaneum ad exteriora conversum habebat, non minus tamen, quam dexter, pinguis, imo crassior, sed ab œdemate, Iliacæ igitur vena dextera æquo erat latior; at sinistra, ejusque rami tenues adeo, & pallentes, ut rem nunquam antea a me visam miratus, Cavæ inum truncum aperuerim. Quo facto, vel magis miratus sum. Nam pro Iliacæ ejus venæ ostio lineam inveni, ipsius coalitum indicantem, qua in linea duo, aut tria parva erant oscula, cum Iliacæ vena communicantia. Quam cum secundum longitudinem incidissem, & præter filamenta polyposa, quendam fibrarum quasi fasciculum introrsum extantem conspexissem; mox facile animadverti venæ parietes ab uno latere inter se coaluisse, siquæ enim fasciculum mentiri, cujus species, manu utraque parietes distrahendo; neque enim difficilis erat se junctio; prorsus evanescebat. Tum vero Cruralibus arteriis, & venis a ventre usque ad poplitem utroque in femore detectis, nullum in arteriis discrimen se obtulit; vena autem, sinistra arteriæ sociæ, tertia saltem parte angustior apparuit, quam dextera: & quamvis complicatas, & coalescere incipientes parietes non haberet; habebat tamen inter tunicas nigrum quasi sanguinem, & sanguinem fortassis, sed a longo, ut videbatur, tempore concrevit. His ita perspectis, claudicationis causam, resecto sinistri femoris cum Innominato osse articulo, quævisi: occurritque os femoris cervicis, & capite orbatur. Et caput quidem in suo acetabulo hærebat affixum, cartilagine tamen qua horum utrumque in crustatum fuerat, hic illic exela: quin ossæ capitis ipsius substantia tum qua sinistram acetabuli spectabat parietem, tum qua cum cervice olim cohæserat, non erat integra. Cervicis autem vestigium supererat nullum, si ossæ quædam fragmenta exciperes, ligamenti adnata valde crassis, & duris, in quæ capsulæ quod vocant ligamentum abiisse videbatur; hæc certe a margine acetabuli ad eam partem summi ossis femoris ex qua olim incipiebat cervix, producebantur, femurque ad eum marginem alligabant. In cavo autem quod cervicis loco intercipiebant, crassiuscula inerat materia carneo colore, sed fusco, & obsoleto, non fetida tamen, nec multa. Præter hæc, os Innominatum sinistram antrorsum magis prominebat, quam dexterum; ut proclive esset suspicari, quæ exterior violentia huic feminæ, cum tenella, aut junior esset, femoris cervicem frigerat, eandem os quoque Innominatum luxasse.

11. Si Observationes has duas inter se comparaveris, in eam opinionem facile venies, ut quod Ruyschius (p) de fracta cervice superesse nihil deprehenderit, id longo tempore tribuas, diutiusque repetitis agitationibus, & frictionibus inter se fragilium cervicis disruptæ extremorum, prætereaque exedenti vi aerium particularum, & lassis, vellicatisque membranis destillantium, & cariem mora afferentium. Quod vero de laceratis a fractura periostii commemoravi (q), non raro videlicet duriore, & crassiora fieri, id ligamenti quoque interdum accidere, ex secunda intelligis Observatione. Ex eadem quod de extenuatis habet Iliacis venis, læso artui respondentibus, confersas velim cum dissectione, alias (r) ad te scripta, claudæ alterius femina. Reperies enim, tenuiora fuisse Iliacæ vasa ad claudum artum spectantia. Venam autem non modo per femur adeo extenuatam, sed in ventre coalescentibus ab uno latere inter se parietibus contractam, ad ostium autem per quod in Cavam influit, propemodum occisatam non reperies. Perrara enim est res, nec intellectu facilis, artu ex quo redibat, œdemate quidem laborante, sed tamen vivente; etiam si a tempore non longo rem eorundem ponamus. Cæterum in hac muliere os femoris ob alligantia vincula longe

(1) l. de Articul. n. 63. apud Marinell. (u) De Hist. Animal. l. 1. c. 12. (x) in Expos. ejus loci.
(2) Apologia di due Cure. (z) Vid. in Comment. Imp. Acad. Petropol. Tom. 3. Obs. Anat. (aa) Vid. etiam Act. N. C. Tom. 2. Obs. 101.
(3) c. 2. §. 7. (c) Theat. Anat. n. 103. §. 2. (d) Vid. Dissert. Salzmann. modo cit. c. 4. §. 2. (e) Ibid. c. 3. §. 5.
(f) Diss. illustr. Anat. Obs. 7. (g) n. 3. (h) De modo quo ossa se vicinis accommodant partib. §. 42.
(i) Oper. l. 17. c. 23. (k) n. 63. apud Marinell. (l) in l. Hippocr. de Artic. Comment. l. 3. n. 39.

(m) n. 5. (n) supra, n. 2. (o) Act. N. C. Tom. 2. Obs. 167. (p) supra, n. 4. (q) supra, n. 4. (r) Epist. 46. n. 17.

longe ab acetabulo recedere non poterat. Vir autem de quo ante ipsam dictum est, cum semper cubuisset, eo osse utendi, eique insistenti occasionem non habuit. Nunc igitur in altera muliere, itemque in altero viro, qui elapso, nec reposito femoris capite usi sunt, diutius eidem insistentes, quid deprehenderimus, exponamus.

12. ANUS clauda, jam octogesimo anno erat proxima, cum apoplexia correpta, haud multo post non tam ex ea, quam ex ejus minus animadverso effectu mortua est. Nam cum, resoluta vesica vi qua lotium tum retinebat, tum extruderet, assidentes mulieres stillicidio deceptae, tantum lotii exire, quantum jugiter in vesicam descenderet, arbitrantur, anus autem immanem hujus distentionem aut sentire, aut significare non posset; eidem quod & aliis (/) ob eandem fallaciam accidit, ut citius moreretur.

CADAVERE enim in Theatrum delato, ut Anatomen tradere inciperem Januario mense A. 1733. ea mortis causa inter initia in conspectum venit, doctrinaeque ordinem turbavit. Scilicet aperto Ventre, se se obulit vesica lotio adeo distenta, ut ad umbilicum perveniret, & ilium utrumque occuparet, intestinis sursum ita compulsis, ut hinc jecur, & diaphragma altissime urgerent, inde vero lienem, & ventriculum adigerent medium versus epigastrium. Virebant autem, & grave olebant viscera pleraque; ut omnia eximi statim e ventre jussim, & in sepulchrum inferri. Quae igitur in Thorace, & Collo, & Artubus animadverterem praeter naturae modum se habentia, huc addam; nam, meliora interea corpora nacti, Caput non attingimus. Pericardium cum anteriore Magnorum vasorum, & cordis ipsius facie connexum erat, cum illa quidem per filamenta, cum hac vero per se ipsum quantum duo transversi digiti tum in longitudinem, tum in latitudinem spatii obduxissent. Quae res fecit, ut ab eo qui apoplectica Medicus fuerat, quaererem, num forte pulsus singulari aliquo modo, & praesertim intermittendo peccassent: quod ille contituit, diserteque negavit. Arteria Magna interiore facie modico supra valvas intervallo incipiebat aspera fieri, quasi fibræ secundum longitudinem ductæ, hic illic inter se disjunctæ, prominere: ea asperitas ad duos transversos in longitudinem digitos, in latitudinem paulo minus extendebatur. Thyroidea glandula praeterquam magna erat, etiam quibusdam quasi globis anteriorem faciem habebat nonnullis locis prominentem. Inferiorum artuum sinister, quod in latum mulier claudicaverat, genu interiora, calce exteriora, spectabat: dextero brevior, & si dorsum pedis exciperes, qua parte crassior videbatur, valde extenuatus, amplaque praeterea cicatrice, tamquam a magno ulcere exteriori secundum longitudinem fibula deformis, cum dextero pulchre esset, atque egregie nutritus, venisque tam latis praeditus, ut latiores in nullo artu inferiore unquam vididissem, meminimus. Quod ut indicio erat tanto majoris copiae sanguinis in eum artum influentis, quanto minor in oppositum infuebat; sic, ut aegrius ferrem, efficiebat, humatis jam inde ab initio visceribus ventris, & vasis, non licere amplius, quomodo Iliaca sinistra vena prope Cavam se haberet, inspicere. Denique superiore sinistri ossis femoris junctura recta, ejus ossis caput non ita ut solet, globosum, sed quasi complanatum, & nonnihil amplificatum invenimus, nulloque, per quod neceretur, vinculo terete instructum. Excipiebatur acetabulo minus cavo, quam secundum naturam, cartilagine tamen incrustato. Erat autem ad hujus acetabuli oram anteriorem cavum alterum, multo quam ipsum, minus: cujusmodi cavum ante acetabulum femoris dexteri nusquam erat. Porro acetabulum sinistri, quamvis, si ad os ilium suum, id est sui lateris referres, neque humilior, neque altius, neque posterius esse videretur, quam dexteri, si hoc quoque cum suo osse ilium comparares; plus tamen a commissura ossium pubis distabat, quam acetabulum dexteri. Nam & os ilium sinistram multo plus ab eadem commissura distabat, quam dexterrum.

13. Quae ad cordis, & pericardii nexum attinent, nulla cum pulsum intermissione conjunctum, eo referes ubi (2) de ejusmodi connexionibus, earumque effectibus alias a nobis actum est. Quod vero ad acetabulum spectat quo femoris caput excipiebatur, non dubito, quin supra (u) commemoratis Cl. Virorum Observationibus cum hac nostra comparatis, facile agnoscas, excavatum illud fuisse a femoris capite, olim extra acetabulum naturale prolapsa, cujus etiam vestigium in illo antieris proximo, multoque minori cavo supererat. Quod enim

acetabulum novum minus esset profundum, quam secundum naturam, caput autem femoris a globoso ad planum vergeret, ex his indicis satis intelligis, dum os contra os sive pondere apprimeretur, sive agutatum musculis ageret, alterum ab altero vicissim esse detritum, atque depressum, sicque excavatum esse acetabulum, quod si natura ipsa parasset, tum profundius, & commissuræ ossium pubis propius, & alligatum habens, per vinculum tere, globosum femoris caput effecisset. Nam quod cartilagine incrustatum esset; ibi fortasse cartilaginea natura, cum excavatio incepta est, necdum in osseam mutata erat; ut non induta posita sit, sed tantum servata. Quod vero cavum illud alterum, commissuræ ossium pubis propius, vetus acetabulum esset, a natura ipsa olim paratum, & sedes ipsa indicat, nec parvitas illius repugnat, si ve cum inter initia eo munere fingeretur, majus esse non debuit, sive etiam, ut in alveolis dentium saepe videmus, dempto osse quod antea insertum erat, circumjecta ossea substantia crescit, & sinum implet, aut fere implet: id quod etiam in claudro viro cuius historiam promisi hic esse me absolutorum, perpexi.

14. LANARIUS igitur ille cuius alibi (x) mortiferum vulnus descripsi, in latere dextero, ut ibi dictum est, claudicabat. Hunc aequali utroque inferiore artu in lucem editum (de noto enim viro, quod de aliis saepenumero frustra optavi, quae inquirerebam, scire potui) cum mater tenellum adhuc, atque adeo primis vitae mensibus e cunis eximeret, dolere artu illo dextero, animadvertit, sive eum dolorem externa aliqua, ipsi ignota, causa forte induxerat, sive interna. Post quem dolorem jam tum is artus factus est brevior, ut nemini posita, cum ingredi puer coepit, mirum fuerit quod claudicaret. Usu autem consecutus est, ut claudicaret quidem, sed prompto gressu atque expedito.

JUNCTURÆ vitium, ex quo alterius, quantumvis modici, occasio extiterat, ut opinor, nimirum dum homo corporis pondus in firmiorem sinistram artum inclinare nitebatur, thoracis Spinam in latum illud nonnihil incurvaverat; junctura, inquam, vitium dexteri artus ad hunc modum se habebat. Acetabulum quod solita Sede a primordiis natura paraverat, ex dimidia tantum parte supererat, eaque anteriore: in cuius fundo substantia erat quadam subrubente, sed lurida, colore, ut morbidum videretur, quam si tangeres, non ligamentum, sed glandula quodammodo natura esse, crederes. Dimidia autem altera pars acetabuli ossea implebatur substantia, praeterea operiebatur osse quadantenus terete, in quod superficies proxima exercebat ossis Innominati. Supra hoc vetus acetabulum, erat in facie externa ossis ilium quasi acetabulum alterum ex substantia constructum alba, firma, & ejus ex qua ligamenta construuntur, simillima, addito insuper limbo in quem non solum ab anteriore, sed ab superiore etiam parte prominebat, media inter cartilaginem, ligamentumque natura. Lævis erat hujus acetabuli facies, si inferiorem quandam in ea locum exciperes, quem rubella non exigua tenebat substantia, pro mucilaginosâ glandula facile agnita. Exceptum in hoc acetabulum erat femoris caput, nullo terete vinculo instructum, neque solita magnitudine, forma, levitate praeditum. Namque ubi a cervice exsistere incipiebat, ibi quidem nulla harum deerat. Sed postquam sic aliquantum processerat, deprimebatur, & nudatam cartilagine substantiam osseam ostendebat: quae mox in summo firma quidem, & dura, & albida, sed granosa haud secus apparebat, ac in multis vesicæ urinae calculis superficiem videmus.

15. Si mirum forte videbatur, in Anu de qua paulo ante (y) dictum est, novum acetabulum cartilaginea crusta non caruisse; mirum videbitur magis, quod in hoc viro mucilaginosâ glandula non caruerit nedum limbo, sive, ut vocant, supercilio, quali naturale acetabulum instructum est. Scilicet multa sunt quorum perobscurus quo sunt, modus, & ratio est. Neque illud admiratione caret, quod tam longo tempore vetus acetabulum, si non omnino deletum, at magis tamen repletum non sit, itemque cum tenera essent ossa, novum acetabulum non ipsum fuerit in ossa excavatum, imo ex substantia factum sit quae cum Hippocratis & Galeni sententia (z) magis quam cum posteriorum Observationibus, videri potest convenire. Sed mea partes sunt ea quae ipse, & quicunque aderant, oculis, manibusque percepimus, sive admirationem habeant, sive non habeant, summa fide proponere; tuæ autem animadvertere, non uno modo ab natura usum membrorum amissum reparari, & quamvis modum a posteris

a posteris deprehensus in aliis corporibus verus sit, non ideo in aliis alterum quem vetustiores indicaverant, esse non posse. Quod si forte alia cupis analogæ, ut vocant, articulationis exempla, sive ut cum iis conferas quae a nobis proposita sunt, sive ut saltem plura habeas quae Sepulchreto adjungas; supra laudatas, Salzmanni praesertim Dissertationes eruditissimas attente lege, aliasque aliorum, ipsiusque etiam, quas praeterea indicavimus, Observationes: quibuscum junge quae in Scriptis extant Cl. Virorum Gutermanni (a), Schlichtingii (b), Ludwigi (c), & in artu quoque superiore novum articulum ex luxatione factum aves cognoscere, Henrici Alberti Nicolai (d). Et ne ab inferiore de quo loquimur, artu recedamus, apud secundum, & tertium illorum, itemque apud Platerum (e), aliosque plura invenies ad supremi femoris aut fracturam, aut luxationem pertinentia, & hanc, ut nonnunquam, a vi externa, ut alias autem a vinculo erosiōne, vel ut saepius, laxitate. Ab erosiōne quidem ut in Casu Hale edito A. 1742. (f), & in aliis antea a Mauchartio (g), & ab Schulzio (h) propositis; ab laxitate vero, ut in Cl. Boettcheri (i) exemplo, quo rarius facile non offendes; erant enim a pestilenti ischiade vincula de quibus sermo est, adeo relaxata, ut pedes ambos ad mensuram usque pithami longiores, quam in statu fuerant naturali, reddiderint: quod mirabile quidem est, sed illud mirabilius, quod perlanata agra sit, ut deinceps absque ulla incommoda libertate incedere possent. Denique & luxationem illam huc addes, quae a Petito Chirurgo (k) indicata est, non tam a causa externa, quam ab lésione per hanc mucilaginosâ acetabuli glandulosâ illata, ut uberius secreta mucilago teres ligamentum sensim laxando, aut abruptendo, caput femoris non statim, sed post longum tempus extrudat.

16. Haecenus quae graviora in summo femoris articulo offendimus, vitia accepisti. Nec leve illud erat quod, in clauda muliere animadversum, in proximis Litteras differimus quibus de Arthritide verba fient (l). Sunt & leviora quadam, de quibus, cum in claudicantibus conspecta sint, qualiacunque fuerint, non est hoc loco reticendum.

17. VETULA Etrusca a contusione coxendicis ita claudicabat, ut diu cubare cogeretur. Accessit universi corporis dolor, & ex longo decubitu gangraena ad nates. Itaque paulatim deficiens sub initium Martii in Nosocomio mortua est A. 1744. CADAVER est ad alia quae secundum naturam erant, & quae huc non attinent, recognoscenda, & Discipulis demonstranda non inutile mihi fuit; tamen hoc dum agerem, quadam adnotavi huc magis pertinentia. In Ventre dexteri jecinis lobus summa convexa facie erat a posterioribus ad anteriorem sulco excavatus adeo profundo, ut digitum posset excipere, neque alii deerant sulci hoc dextiores; cujusmodi sulci si in mulieribus tantummodo occurrerent, suspicio posset esse locus, an arthritibus, dum juniores sunt, imi rigidique quo uti solent, thoracis contusionibus deberentur. Jecur ipsum intus extraque totum ex minimis albis corpusculis factum videbatur, quae interstitiis fuscis ex subrubro flavis tenuissimis interpererent. Lienis gibba facies quasi a crassa quadam crusta albica, firma nigra erat, Testes frigidissimi, & in tenuem quasi laminam depressi. Uteri osculum amplum, & quodammodo triangulare, nulla circum protuberante corona ornabatur. Fundi universa interior facies nigra, & granosa. Thoracem costae a dextris quidem duodecim, a sinistris undecim cingebant. Prima enim harum, & secunda ex uno tantum osse multo maximam partem constabant. Scilicet suo singula capitulo a vertebra profecta, vix digiti spatio emenso, unum os latum fiebat, in quo nullum divisiōis quae unquam fuisset, vestigium. Id os ubi eo pervenerat, ut trium ferme digitorum intervallo a sterno distaret ex superna ora teretem oblongam cartilaginem vix dimidii latitudinis minimi digiti aequantem in sternum immittebat; reliqua autem ex parte contrarium, sic tamen ut latitudinem retineret non ea minore quae in prima dextera costa erat, modicoque spatio inter se, & teretem illam cartilaginem relicto, per cartilaginem alteram propriam cum sterno committebatur. In pericardio aquae copia aliqua. Dextera cordis auricula sanguine distenta. Cor ipsum vel pinguedine qua instruebatur, detracta, aequo multo majus, nec flos alio latius veniculos, sinistram praesertim, sed etiam ob multo crassiora

res hujus patientes. Alterius valvula Mitralis pars erat ossea facta, aut certe officulum subnexum habebat, quasi ex pluribus factum, eoque inaequale, subrotundum, magnitudine ferme aequans apicem minimi digiti. In corde polypose aliqua concretiones, & plurimus sanguis ater, qualis, sed fluidior, passim e dissectis majoribus venis effluebat. Femoris denique claudicantis supremam juncturam inspicies, teres, saepius memoratum, in ea ligamentum offendi minus crassum, & firmum, quam aequum sit, luraque rubedine infectum pene totum.

18. ANUS altera ab aetate jam curva, & quae ita incedere solebat quasi claudicaret, nuper erat noctu per scalas prolapsa, caputque alliserat. Hinc mortis causa. Cum a nobis ibidem secaretur ante vernum tempus A. 1749. nonnulla sunt quae huc spectant, animadversa. IN THORACE Magni vasorum trunci erant adeo a sinistris; quamquam mulier curva quidem, ut dictum est, sed gibba non erat; ut venam sine pari nunquam viderimus longius sinistram inflexam, ut se immittere posset in Cavam. In Ventre exterior renum facies non proflus secundum naturam: quin alter parvas quasdam insuper ostendebat hydatides, ex se nonnihil exstantes. Genitalia inspicies, nympham sinistram neque esse, neque unquam fuisse, animadveriti; dextera autem erat parva. Hypogastricas arterias latiores, quam solent, & duras, imo alteram earum non sine osse qua Umbilicalem emittebat. Proximas unde illae oriuntur, cum simul inspicerebamus Iliacas, nec dexteram sive latitudinem, sive tunicarum crassitudine viderem quidquam a naturali constitutione discrepare; sinistram miras sum cum minus latam, tum praesertim tenuibus adeo parietibus, ut vena propemodum esse videretur ab eo loco unde Hypogastricam dabat, ad illum usque ubi prodibat e ventre. Quae res ad memoriam redigebat quae in duabus aliis claudis mulieribus (m) conspexeram: quamquam in illis non arteriae, sed venae angustiores erant, nec in femore quo claudicaret, angustiae esse definebant. Hujus autem arteria cum e ventre exierat, justam latitudinem, & parietum crassitudinem, ut cum dextera comparando perpexi, protinus recuperabat. Ceterum in sinistri femoris junctura animadvertere nihil potui unde levem illam claudicationem repeterem, nisi forte attinere huc credas parvas, & leves duas, inter se vicinas, subfusas quasi contusiones quae in cartilagine, ejus femoris caput convellente, cernebantur.

19. Fuerunt & mulieres aliae duae claudicantes (n) mihi enim accidit, ut in iis saepius hoc vitium offenderem, quam in viris, an casu? an quod propter minus robustam structuram corporis illi magis feminae obnoxiae sint? quas cum secarem, manifestiorem ejus vitii causam me deprehendisse, arbitratus sum; postea autem num deceptus essem, dubitavi. Ut usit, Observationem utramque; nam & alia continent quae indubia sunt, & a me tibi fuerunt inter has quae ad claudicationem spectant, alias promissa; hic primum exponam, tum deinde mea dubitationis causam non reticebo.

20. FEMINAM claudam, necdum senescentem, hydrops confecerat circa medium Decembrem A. 1746. Ex ea Anatomes studiosis cerebrum, muliebria, & sinistram, quo claudicaverat, artum in Nosocomio monstrans, haec dumtaxat quae hic locum habeant, adnotavi. CEREBRUM eximendo, animadveriti in Crassa meningis, basim cranii convellente, paulo ante, sed nonnihil ab externo latere, paulo, inquam, ante foramen in quod nervus Opticus sinisterr se conjicit, aliquid restare quod, si colori crederem, particula corticalis substantiae videretur. Sed molle non erat, neque meninx Tenuis quae e loco respondebat, lacera, imo integra, & levis conspicebatur. Tum diligentius attendens, globulum esse, vidi, parvi vix acini magnitudine, subdum, solidum, qui nulla, id quod labor ostendebat, nisi intra parte, quoquam adhererat, hac autem erat firmissime affixus Crassae dumtaxat meningi, non ossi, quod subjiciebatur; ut censuerim, ejusdem meningis excrecentiam esse, generis, sicut ejus substantiae modus ostendebat, quasi glandulosi, initium tumoris, multum, si increvisset, non solum proximis nervis Optico, & Olfactorio, sed & cerebro obfuturi. Ex Uteri supremo exteriori fundo dexterius prominebat tuberculum figura, & magnitudine eadem quae in excrecentia illa Crassae meningis modo indicata est, solidum pariter, sed album. Huic alterum intus respondebat mollius atque humilior.

(f) Vid. Epist. 42. n. 23. ubi & haec historia promittitur.

(g) Epist. 59. n. 46.

(h) n. 12.

(i) Supra, n. 6.

(j) Epist. 23. n. 18.

(k) n. 5. & 6.

(l) n. 5. & 6.

(m) n. 5. & 6.

(a) Act. N. C. Tom. 3. Obf. 195. in fin.

(b) Comm. Litter. A. 1741. Hebd. 1. n. 2.

(c) Dec. Obf. illustr. Anat. Obf. 6.

(d) Eph. N. C. Cent. 9. Obf. 34.

(e) Eph. N. C. Tom. 1. Obf. 235.

(f) Eph. N. C. Tom. 1. Obf. 235.

(g) Eph. N. C. Tom. 1. Obf. 235.

(h) Eph. N. C. Tom. 1. Obf. 235.

(i) Eph. N. C. Tom. 1. Obf. 235.

(j) Eph. N. C. Tom. 1. Obf. 235.

(k) Eph. N. C. Tom. 1. Obf. 235.

(l) Eph. N. C. Tom. 1. Obf. 235.

(m) Eph. N. C. Tom. 1. Obf. 235.

(n) Supra, n. 10. & 12.

(o) Supra, n. 10. & 12.

(p) Supra, n. 10. & 12.

(q) Supra, n. 10. & 12.

(r) Supra, n. 10. & 12.

(s) Supra, n. 10. & 12.

(t) Supra, n. 10. & 12.

(u) Supra, n. 10. & 12.

(v) Supra, n. 10. & 12.

(w) Supra, n. 10. & 12.

(x) Supra, n. 10. & 12.

(y) Supra, n. 10. & 12.

(z) Supra, n. 10. & 12.

humilius, manifesto ex aggerie factum ejusmodi vesicularum, ac in uteri cervice videre soliti sumus; eodem enim quo haec, limpidum muco replebantur; quod tuberculum Epistola XLVII. (n) hic a me proponendum esse, promiseram. Utrique huic tuberculo interjecta substantia uteri sanissima erat. Ceterae autem quae ad genitalia attinent, Partes; si testes excipias, quorum alter erat altero minor, ambo tamen strigosi, & inaequali superficie, & intus, extraque albi; non modo erant sanæ; sed infimæ omnium haud aliter ferme ac in virginibus, se habebant. Tensa enim erat quæ dicitur Furcula, angustum vaginæ orificium, & hymene instructum, nisi quod hic contra ac videre consuevimus, tanto minus propemodum latus fiebat, quanto magis ab urethræ orificio distabat, sicut alias diligentius describam. Attamen hæc femina viri notitiam habuisse non videbatur. Denique sinistram artum inferiorem spectantibus manifestum erat, sic esse positum, ut digiti pedis alterum pedem respicerent, nec facile erant manibus in naturalem situm adducere; & mulier ea metatarsi parte quæ digiti proxima est, insidendo, ambulasse dicebatur. Verum cum pes, crus, genu, femur, quantum exterius inspicendo judicari poterat, vitio carere, & iusta longitudine singula esse viderentur; recte superioris femoris articulo, ejus cervix brevior visa est, quæ mediocri illius, femine staturæ conveniret.

21. ANICULA decrepita, & clauda, viginti circiter post illam diebus ex brachii, si recte memini, abscessu mortua est. Itaque ibidem, easdem, aliasque Partes iterum dissecantes; quæ ab naturæ modo aliena essent, hæc deprehendimus. CRANIO exentum cerebrum, inferumque cum inspectare, Carotidis utriusque arteriæ truncos, majoresque horum ramos animadverti firmiores apparere, invenire, eorum parietes revera crassiores esse factos. Contra, cum essent nervi ceteri, & præsertim quartii, & quinti Paris, pulcherrimi, firmi, & magis quam soleant, crassi, Opticos cinereo colore, angustos, & in tenuis intitæ modum depresso videbam, & medullarem illam quæ, ubi inter se accedunt, ipsis interjicitur, partem satis quidem latam, sed colore, & tenuitate nihil ab ipsis discrepantem. Ipsi vero intra orbitas progressi, et colore erant albo, crassitudine autem quasi mediocri; incisi tamen ostenderunt, albedinem illam, nec parvam crassitudinis illius partem meningibus debere suis, crassioribus factis, intra quas, tanquam intra tubum quandam firmiusculum, substantia concludebatur, in altero præsertim nervo, sanguinolenta. Cum oculus ad quem is nervus tendebat, non secus ac alter, nihil, si exterius aspiceres, vitii monstraret; ne interius quidem, cum diligenter a me secaretur, vitii ostendit quidquam; ut præclare intelligerem, hunc a me alias (o) tibi descriptum, Opticorum nervorum morbum non semper a vitiat, cæcisque prorsus oculis (hanc enim Vetulam; quod permirum est, nisi forte altero oculo nonnihil videbat; cæcam fuisse, negabant) occasionem, & originem habere ut neque a cerebro, sed in nervis ipsis aliquando primum oriri (p). Hic certe cum cerebrum, intra quod hos nervos ob eorum tenuitatem vix potui persequi, accurate dissecissem, nihil in eorum via, nihil in eorum thalamis vitiatum offendi. Et quanquam hippocampus ad imam extremamque sui partem nequaquam, ut solent, se dilatantes animadverti; nullum tamen vel minimum extabat indicium, quin sic a primordiis ipsos fuisse, judicarem. Nec præter hoc, insoliti, non modo morbidi quidquam in cerebro toto fuit, nisi quod in quarto ventriculo pro medullaribus illis fibris quæ utrinque occurrunt ut plurimum, ad nervos Acusticos pertinentes, vix uno in latere una fuit, eaque exilis, & inferius quam soleat, orta, & locata. In Maxilla inferiore nonnulla animadverti, in hac præsertim Epistola qua de Luxationibus agimus, & Fracturis ossium, non omittenda. Sinistram enim illius capitulum ab uno supremæ suæ faciei latere excrecebat sursum quasi ex novo additamento, ut in partibus interioribus cranii ejusdem anus alias (q) a me visum scripsi; nam hæc quoque ossæ excrecentia erat alba, & firma, præterea autem, ut reliquum illud capitulum, tenui, levissimaque cartilagine incrustata. Quod additamentum si magis magisque crescendo se extulisset, non est dubium, quin capitulum ex suo sinu fuisset ejecturum, aut certe maxillæ motibus valde incommodaturum. Imo hoc facere jam

aliqua ex parte cœpisse, illud fortasse indicio erat, quod interjecta inter capitulum, & sinum mobilis cartilago in medio apparuit quasi cultro incisa duobus locis, altero secundum longitudinem, altero oblique in transversum. Dixi autem fortasse, etiam quia huic respondens in dextero articulo cartilago parvulo erat foramine pertusa ellipsis forma, nulla membranula occlusa (quo majus olim interdum visum esse, scimus (r)) quod etsi in medio, sed propius alterum extremum, & secundum longitudinem positum erat; tamen neutram cartilaginem hic quoque ex duabus constituisse, evidenter demonstravimus. Quoniam vero præter Incisores dentes, nullus anicula huic restabat, cum totam eam maxillæ hujus partem quæ cæteris olim dentibus instructa fuerat, utrinque ostenderem non modo omni alveolorum vestigio, sed & ea sui carere portione in qua alveoli quondam fuerant, ut foramina per quæ nervi egrediuntur (Mentalia vocant) jam in summo ferme essent exteriore maxillæ margine, itaque ejus ossis altitudinem humillimam esse factam quemadmodum præclare ab Ruyschio (s) animadvertum, pictumque est; addidi, hinc consequi, ut quibus hujus ossis corpus post dentium lapsum ita decrevit; in iis, nisi forte ob ætatem major ossis durities obstat, multo citius, atque facilius ibi ipsum totum aut a carie interdum in nascente exedatur, aut a graviore icu aliquo perfringatur.

Thorace aperto, quatuor ex Aortæ arcu nascentes arterias ostendi; neque enim ex Subclavia sinistra, quæ multo quam dextera, tenuior erat, sed inter illam, & sinistram Carotidem, illi tamen propior, Vertebralis ejusdem lateris exitebat, quæ res cum mihi in femina quoque altera de qua supra (t) dictum est, & in aliis pariter (u) interdum occurreret, non videtur inter rariores esse ponenda. Magna autem arteria inter cor, & Subclaviam dexteram manifeste erat dilatata; cumque ad septum usque Transversum fuisset incisa, hic illic passim majora, minorave spatia intus ostendit nonnihil prominentia, & albidia, in quibus raris compacta arteriæ substantia in ossam postea duritiem fuisset mutata. Genitalia membra in summo testem alterum habuere intra quem hydatidis erat non parva, ut se ad partem superficiem testis faciendam extenderet; in imo autem, urethræ orificium ex quo interior illius tunica, non secus atque illa vaginæ, aut Recti intestini aliquando solet, parva sui portione quadam inversa extorsum ab altero latere prodebat: quod alias (x) in alia vidisse me, dixi, ut de hac his Litteris esse dicturum.

Artus postremo, quo claudicaret, dexter sinistram brevior, & sicuti in priore femina introitus conversus, eandem vitii hujus causam quam in illa, habere visus est, nempe cervicis femoris brevitate.

22. Et sic mihi eo quidem tempore visum est; nec fortasse omnino deceptum sum. Verum postea dissecuit cervicem claudi femoris cum sani cervicis non comparasse: quæ ratio una maxime demonstrasset, recte, an secus fuisse, illam esse brevior. Forsitan enim videri brevior potuit quæ in non magna staturæ corpore iusta esset longitudine: & tot sunt tum supra acetabulum, tum in acetabulo, tum infra acetabulum claudicandi causæ, ut cum plures abesse, viderim, omnes tamen abesse, satis fortasse videre non potuerim. Juvat hic plerisque ex quibus modo indicatus est, ordine commemorare. Supra acetabulum est pravus quicunque situs ossis Innominati, cujusmodi situs ad cætera vitia accedebat in claudis illis duabus quas supra (y) ante alias descripsimus, in primaque præsertim. Plura autem Sacri ossis ab illo offe distalis exempla in claudicantibus pueris præfert Cl. Bassius (z), rationes addens ob quas illa infantibus facile accidit, signa per quæ internoscatur, & causas quare difficile curari possit, ideoque in omnem ætatem fere permaneat, ut in Veneto adolescentulo quem ad me consilii causa adduxerant, permansisse a pueritia, vidi, consensuque, semper esse mansuram. Quæ si perpenderit; ubi artum artu longiorem esse, aut brevior videris, hujusque inaequalitatis causa non sit in artu ipso manifesta; primum omnium num forte inaequalis sedes sit Innominatorum ossium indagabis; eam enim acetabulum, quippe in ipsis excavatum, sequitur, hoc autem artus, ne forte illa aequalem habere sedem, ponens, quam a natura, aut a vi morbi non habeant, mox in judicando, ut artus revera ipse longior, aut brevior sit, decipiaris.

23. In ipso autem acetabulo & capacitas, & figura, & tere ligamentum, & caput femoris ut multifariam peccare possint

possint ex iis quæ non semel supra dicta sunt, intelligi. Huc addendi sunt tumores, sive in ligamento incrementum, ut Fallopius noster (a) indicat, sive in alia intra acetabulum parte, ut generatim loquitur Veslingius item noster (b), ubi se cum Sala sæpius visasse, ait, Patricium Venetum, cui suborto intra coxendicis acetabulum tumore, caput femoris evidenter extrorsum vergebat. Valsalva autem in Consilio, quod pro Nobili Puero scripsit, cui factus longior erat sinister artus, Mucilaginosam acetabuli glandulam sensim intumuisse, suspicabatur tum quia in puero cætera sano ligamenta laxata esse, verisimile non credebatur, tum quia facile in glandulis vitium est ut intumescant, tum quia novissime post diuturnum ab acuto morbo decubitu is artus vel multo longior quam antea deprehendebatur, quod ipse a glandulæ incrementum, tandiu a femoris capite non compressæ, repetebat; quamobrem auctor erat inter cætera, ut sub dextero pedem, cui stans puer plerumque & firmius solebat insistere, tanto altior calcus esset, ut artu utroque aequali facto, sinistram quoque jam insisteret, glandulamque comprimeret. Re vero ipsa in milite de quo Casus extat Halæ editus, & a nobis supra (c) laudatus, substantia quadam spongiosa comperta est, quæ acetabuli plus quam dimidium replendo, inde femoris caput expulerat.

24. Denique sub ipso acetabulo longe plures sunt causæ claudicationis. Namque; ut fracturam de qua dictum est, cervicis femoris, & vitia Capsularis, quod vocant, ligamenti prætermittam, musculi primum qui femur suum in sede conservant, sive resoluti sunt, nihil obstant quo minus ipsum pondus totius artus femoris ligamenta extendant, ipsique caput deorsum ducat, sive dolore, tumore, convulsione contracti, tanto altius in acetabulo idem caput conditum appressumque servant, ut artus paulo brevior videatur. Quanta autem vi idem musculi vel naturali voluntatis imperio interdum contenduntur, casus in primis demonstrat, ab Ingrassia (d) descriptus, minoris trochanteris per nonnullos dumtaxat eorum quos generosus Juvenis in hastiludo præter modum contendat, a femore avulsi: quem casum minus incredibilem faciunt Ruyschii præ cæteris Icones (e) quibus eundem trochanterem ostendit qui coctione in Juvenæ femoris offe recesserat. Femoris autem ipsius quæcunque fractura adeo raro sine consequente claudicatione curatur, ut Celsus (f) discrete scripserit, ignorari non oportere, si femur fractum est, fieri brevius; quia nunquam in antiquum statum revertitur: summique digitis postea cruris ejus insit. Brevius autem sit ut quia inter fracturæ extrema pars aliqua amissa est quæ in fragmenta abierit, aut quia extrema illa perdifficile ita coaptentur, ut naturalis ossis figura, & positus serventur, velut in eo præsertim femore cuius Icon a Grutzmackero (g) edita est, aut quia vel probe coaptata, nisi postea musculorum dimoverentur, quod in obliquo atque oblonga fractura facilius accidit, cum in transversa extremum extremo obnuitur, sique alterum ab altero in restitutum positi conservetur. Ad has, aliasque ejusdemmodi causas Valsalva hanc addebat, in oblongis illis oblique fracturis, magna violentia atque impetu factis, posse aliquando inter duas fracti ossis partes quasdam ex musculis proximis fibras intercepti, quæ exactam coaptationem, & coactum impediunt, aut hunc etiam diu remouentur. Sed ut nihil horum quæ dicta sunt, accidat, aut non eo accideret modo quem hic intelligimus, ut brevius inde os femoris fiat; claudicatio tamen vitari non poterit, si musculi, tendines, nervi a vi frangente, aut a consecutis incommodis valde infirmati, aut femur, aut subiectas femori iusto robore aut modo nequeant movere.

25. Ipsas quoque subiectas femori partes & plerisque horum quæ dicta sunt, obnoxias esse, & claudum hominem facere, manifestum est. Itaque multo pauciora de singulis me scribere satis erit, a proximo, quod tamen ad femur ex parte attinet, genu incipientem.

26. MULIER cuius mentio Epistola LII. (h) injecta est, historia autem in hanc propterea dilata quod flectere alterum genu non poterat; cum gravem fronte accepisset idem, quem, signa statim mali ominis suat concubata, his obliteratis, in Nosocomio levi adeo cum febre eubatur, ut die septimo victum posceret minus tenuem. Sed decimo quarto ecce gravior febris cum frigore ingruit, nullo unquam antea, mors autem decimo septimo, nullo unquam antea, inter valde ultimis diebus, aut illis prioribus thoracis affectu indicio, nullaque de hoc querela. Mensis jam erat December A. 1745. quo tempore cum

ibi essent. Discipulis more institutoque meo plura præmonstranda quæ sicuti thoracis, ventris, & artuum dissectionem requirebant, sic capitis incidendi spatium non dabant; hoc minime apertum est. In illorum autem sectione hæc sunt præter naturam animadverta.

THORACIS alterum cavum libras habuit ad quatuor aquæ colore inter viridem, & flavum medio, alterum multo minus, illas tamen in utraque pulmonibus. In pericardio humor qualis solet, nec plus eo fuit: cor autem laxum, in hujusque auricula dextera polyposa concretio alba, crassa, compacta. In Ventre vix aliud adnotatum est, quam uteri in alterum latus inclinatio.

Artum denique illum cuius crus, genu, ut videbatur non permittente, ne nostris quidem manibus flecti poterat, postquam cum sano comparaveram, neque aliud exterius discrimen, nisi quod rotula magis promineret, oculis poteram internoscere; experiri primum placuit, num forte Extensores curis musculi, quæcunque esset rei causa, sic contenderent, ut hoc propter adversantem illorum contentione flecti non posset. Iis igitur musculis non magno supra genu intervallo in transversum dissectis, crus illico flecti potuit. Neque tamen genu, ut rotula prominentia vel tum perseverans, demonstrabat, omni vitio carebat. Prominebat enim rotula, quia externus femoris condylus, ut erat a posterioribus ad anteriora longior, quod ejusdem cum externo alterius femoris condylo instituta comparatio manifestissime comprobabat, sic antrosum vel magis quam aliquo solet, prominebat. Contra autem, Laterale externum genu ligamentum multo crassius ad alterum, quam ad hoc genu, fuisse, comparando pariter comprobatum est.

27. Unde aqua illa in parte, sedasque ejus color in thoracem traduci potuerit, cum sit eam paulo ante designavi, Epistola indicatum, cætera autem in proposita Observatione satis per se dilucida sint; de genuum contrario incommodo, & de quibusdam earum morbis quædam alia commemorabo. Genu de quo modo dictum est, flecti non poterat. Illustis autem Hallerus (i) cum in aliud incidisset quod extendi non poterat, aulam invenit causam præter duram & pene tendineam cellulositatem, ab ea parte, opinor, aut certe magis ab ea parte quæ in artu posterior erat.

Rotulam in transversum, ut sæpius solet, frangi a violentis ictibus mirum non est; illud mirum, quod a violenta & subita musculorum crus Extendentium seu contractione, seu resistentia nonnullam aut ipsa frangatur, aut validi eorumdem musculorum tendines supra ipsam disrumpantur. Cujusmodi exemplum disrptionis apud Cl. Bassium (k) leges, & ante illum duo apud Ruyschium (l); apud quem (m), & Palsinium (n); ne alios nominem quam qui hæc scribenti erant in manibus, illiusmodi fracturæ Observationes invenies. Semilunares quoque cartilagine quæ inter femur, & tibiæ in genu articulo interjiciuntur, ab affluxu humorum excrecere nonnullam posse, & claudicationem asserere, laudatus Bassius (o) observavit. De Valgis denique ut omittam ea quæ Severinus (p) fuisse scripsit; Ruyschius (q) in valgo adulto summæ tibiæ caveas, iis cartilaginibus subiectas, ad femoris condylos excipiendo non æque depreffas, & quod consequitur, utrumque illud os aliter ac secundum naturam, positum deprehendit: quas res melius Icon (r) monstrabit, quam descriptio. Hæc enim ideo memoravi, ut ex eorum quos laudavi, libris plenius cognoscas, indeque ea quibus internoscas, signa, & quando, & quomodo curationem suscipias, quando contra jam præteritum sit tempus quo auxiliari possis, intelligas. Attamen in nonnullis eorum quæ dicta sunt, & nominatim in rotulæ fractura, & tendinum crus extendentium disrptione quantum auxilii, præter spem, & expectationem, temporis spatium interdum afferat, contigit mihi ut annis superioribus in duobus viderem. Procerus, & lacertosus vir erat alter qui ante annos aliquot e rheda deficiens cum rotulam dexteram in transversum fregisset, Chirurgorum opera frustra usus erat donec Præstantissimus in hoc Gymnasio Chirurgiæ Professor Hieronymus Vandellius, vigesimo secundo a fractura die accersitus, superiorem partem rotulæ ad inferiorem adduxit quantum potuit, ut altera ab altera multo minori quam antea, intervallo distaret, fasciarumque ope ibi consistere coegit. Erat id intervallum transversum digiti: in illo autem natura ipsa aliquid sensim procreavit per

(a) n. 10. (o) Epist. 13. n. 7. & seqq. & Epist. 32. n. 30. (p) Vid. Epist. 63. n. 8. in fin. (q) Epist. 27. n. 2. (r) Vid. Stephan. cit. in Advers. II. Animad. 28. (s) Obs. Anat. Chir. 82. & Fig. 65. 66. (t) n. 10. (u) Vid. Epist. 3. n. 20. & Epist. 15. n. 25. (x) Epist. 50. n. 51. Vid. & Epist. 70. n. 10. (y) n. 10. & 12. (z) Dec. 4. Obs. Anat. Chir. 2.

(a) Præfat. in Tract. de luxat. & fract. Ossium. (b) Epist. 25. (c) n. 15. (d) in Gal. I. de Ossib. c. 20. Comm. 4. (e) Theat. Anat. 5. Tab. 2. Fig. 2. & 3. (f) De Medic. I. 8. c. 10. Sect. 5. (g) Dissert. de Oss. Medullis. (h) n. 2. (i) Opusc. Pathol. Obs. 50. (k) Dec. 3. Obs. Anat. Chir. 6. (l) Adv. Anat. 2. c. 2. (m) Obs. Anat. Chir. 3. (n) Anat. du corps hum. II. 5. ch. 17. (o) Dec. 2. Obs. 5. (p) De recond. Abscess. nat. I. 6. P. 2. (q) Advers. 2. cit. c. 6. (r) Ibid. Tab. 1. Fig. 2.

vit Per quod rotula partes firmiter alligarentur inter se. Itaque homo eo artu jam libere utebatur, cum forte Venetiis in pontis cuiusdam gradibus ita lapsus est, ut eo crure valde & violenter flexo, crepitum audiret quasi rei alicujus in genu disruptæ: & sane ea flexionis violentia ruptum est quiddam illud erat quod rotula partes inter se connexas servabat. Quas cum Chirurgi frustra conati, sic adducere ut paulo antea erant, non possent, denique operam dederunt, ut instrumento ad genu apposito juncturam quoad ejusliceret, firmarent, lutiisque Euganeis corroborarent. Longo autem interjecto spatio temporis homo qui ab utroque lapsu magnos dolores pertulerat, nec illo artu uti potuerat, tantum confectus est, ut eodem, omni jam abjecto instrumento, absque ulla molestia utatur, sive staret, sive genua flectat, sive incedat, quod expeditissime facit, vix leviter in id latus claudicans. Quod ego genu cum diligenter contrectarem, rotulae partes quæ inter se ferme æquales erant, alteram ab altera non exiguo intervallo disjunctam offendi, eoque multo majori cum genu flectebatur: ubi enim rotula esse debuisset, tunc ibi cavum apparebat duos circiter digitos pollices amplum in longitudinem, nec minus in latitudinem, profundum autem ad digitum transversum, ut imi femoris condylus, & supremam tibiæ oram tactu percipere liceret. Sed hunc, ut quæ dixi, inspicere, ad me adduxerat Professor laudatus: qui consilia in quodam famulo pariter, si vellem, Patavii cernere me posse, ajebat. Vir autem alter quem consilii causa, ad genu videlicet magis roborandum, cum eodem invisit, Patricius Venetus fuit. Hic post duos lapsus, a quorum primo fracta in transversum rotula, dein artis ope coaluisse dicebatur, ab secundo certe tota fursum retracta erat, jam expeditæ, & recte, ut ceteri homines, sine ullo fulcro per plana quidem incedebat: in scalarum autem ascensu necdum profecerat satis; scandeat enim, sed non pariter expedit. Huic quoque, cum stabat, in ipsa rotulae sede, inde fursum, ut dixi, retractæ, fovea in oculos incurrebat. Cujus foveæ extantia latera, ut in priore etiam Viro, non dubitavi, quin laterales essent partes amplissimæ illius aponeurosis per quam musculi cruris extendentes in hoc inferuntur: inque partibus quiddam uterque sine rotula præstaret, videretur acceptum esse referendum. Scilicet utrique acciderat, ut pars intermedia aponeurosis, illas laterales, distumperetur, priori quidem ubi rotulam cum firmissime adhaeret, complectitur, alteri autem, quantum ego vidi, inter rotulam, & quod in tibia exstat, tuber. Neque enim ut minus facile inferior hæc pars rumpatur, quam alios quoque, nec semel, ruptam vidisse, scio, facere credo ligamentum quod plerique sub ipsa ponunt, a rotula ad illud tuber pertinens. Certe mihi vel diligenter, & sæpius in cadaveribus quærenti, oculato esse adeo non licuit, ut quiddam discrepans a tendinea fibrarum ipsius aponeurosis natura, quod proprie ligamentum vocari posset, satis perspicue viderem. Quamobrem cum Vesalio (f) adhuc facio, diserte scribente, *patellam neque femori, neque tibiæ alteri quam tendinum beneficio committi: hocque privatim patellam sibi vindicare, quod alteri ossi ligamentorum ope non alligetur*. Quem summum Anatomicum, ut se quoque hic sequi, professus est Weitbrechtus (t), utinam constantius secutus esset. Verum non est hic locus quædam in eximio alioquin *Syndesmologie* libro examinandi, sæpius ad nimiam in ligamentis ponendis facilitatem, alias ad minime necessarios diffensus, nonnunquam ad minus iustum silentium spectantia. Nunc in proposito perstemus.

28. Cruris quoque ossa quantum ambulationi possint officere, & quomodo hominem claudum facere, ignorat nemo, scilicet ubi utriusque fracturæ non congrua adhibeatur curatio, & illius præsertim quod de duobus præcipuum est, tibiæ nimirum, a cuius vitio etiam valgos homines fieri, paulo ante dicebamus. Quamvis autem ob naturalem horum ossium rectitudinem facilius sit eorum, quam curvi, & inclinati ossis, ut femur est, fracturam ita sanare, ut artus neque figura, neque longitudine dissimilis alterius fiat; tamen si fractura obliqua sit, per facile accidit, ut is artus brevior evadat, nonnunquam & distortus. Quamobrem ex nostratibus quidam hac memoria pati maluerunt quod olim plures (u), ut sibi rursus frangerentur ossa, & dirigerentur: idque feliciter cessisse nonnullis, scio; sed contra, novi hic Medicum haud ineratitum qui cum sibi cruris ossa,

confervere jam incipientia, disjungi a Chirurgo, permisisset; inde gravissima symptomata, & mortem accersivit. Quares fortasse, quo tempore confervere incipiant fracta ossa, & quo ad perfectum inter se coalitum perveniant? Res, opinor, ejusmodi est, ut si rationem spectemus, pro certo nequeat in universum definiri. Neque enim; ut gravidas seponamus, in quibus consolidata fracturæ ibi vix unum exemplum legimus, ubi non consolidata plura habemus (x); neque, inquam, consolidatio tam cito incipit, aut perficitur in ægris corporibus, quam in sanis, neque item ex sanis pari celeritate in senibus, ac in junioribus, aut in iis omnibus quibus aut non eadem fractura sit, aut non eadem adhibeatur curandi ratio. Nec vero aliter experientia docet, si pericula quæ Cl. Hamelius (y) fecit in brutis animalibus quindecim a fractura die callum, non, ut in aliis pari a fractura intervallo perfectum invenit, sed æque imperfectum ac in altero, decimo die; erant autem juniores columbi, & os idem, ad eundemque modum & fractum fuerat, & repositum, & obligatum: quibus enim artius obligatum est, illis aut gangrena quam Celsus (z) ex nimia adstrictione prænunciat, mortem attulit priusquam apparere posset cartilaginea calli firmitudo, ut quæ ante quartum diem in cæteris animalibus non est, aut (a) ne octavo quidem die, quo in aliis esse ossis callus incipit, ullum profusum calli initium fuit, sed ita se habebant cuncta, ut si tunc fractum os fuisset.

29. Hæc autem omnia, ut alia bene multa, explicat Vir Experimentissimus, callum repetens, non, ut alii, ab ossis fibris se producentibus, aut ab osseo qui ab his quidem fibris destillet, succo, aut ab effuso, & adhærente fractis ossibus sanguine; sed juxta proprias Observationes ex intumescente, & crassiore facto ad fracturas externo, internove periostio, laminaeque suas in cartilagineam primum, deinde in osseam firmitudinem mutante. Sed de hac calli firmitudine sive ipsam juxta laudatas Hamelii, sive malis secundum minime negligendas Solertis Viri Dehtleesii (b) Observationes explicare; haud aliter sentiendum esse, non dubitabis, ac de calli initio, & complemento dictum est, nempe pro variis, quæ memoratæ sunt, aliisque ejusmodi conditionibus, quibus longius quoque, aut brevius ex quo completus fuerit, tempus addendum est, magis, minusve compactum, aut certe durum, firmumque esse posse. Et hæc ego ratione puto, adversas inter se Clarissimorum complurium Virorum sententias esse conciliandas. Sunt enim qui scribant, pari firmitudine esse callum ac quævis pars ossis, imo, si diametro sit, ut sepe, quam os, majori, pro diametri augmento tanto esse robustiorem, idque sapienter esse prævisum, quia fracta ossa cum rarissime secundum pristinam directionem reponantur, ibi alioquin novæ fracturæ magis essent obnoxia, ibidemque difficile iterum possent coalescere propterea quia callus structura caret vasculari. Quæ ut seponamus tum quia secundum Hamelii quidem Observationes non ex osse, neque ex callo, sed ex periostio, ut diximus, callus videtur repetendus, tum quia non ignobilis Chirurgus affirmat, fracto priore callo, alterum citius quam prior, formari, illudque unum hic attendamus, callum dici non minus saltem quam os ipsum, resistentem, & firmum; sunt certe alii & graves, & plures Viri qui cum hæc re minime consentientia proponunt. Vide enim, ut Celsus (c) ad nimium qui ossibus recte inter se glutinatis supervenerit, callum extenuandum ea artui exterius adhibeat quæ, si ossa duritie esset callus, opitulari nihil possent, ut leones ex oleo, sale, & nitro, longasque friciones, multa ex calida salsa aqua fomenta, malagma quod digerat, & adstrictiorem alligationem. Aut si hæc profuisse non putas; Hamelium (d) leges scribentem, aquæ stillicidium non modo ad id sæpenumero utile fuisse, verum etiam ubi nimius fuit ipsius usus, nonnunquam callum adeo molivisse, ut duo quæ inter se coaluerant, ossis extrema per se iterum sejuncta sint. Sed fuerint ejusmodi calli aut non ita magnæ diametri, aut nimis recentes, ut bimestris ille, & parum emens in crure junioris agni, qui callus ex interrupta intra paulo acrius lixivium ebullitione reglutinatus est apud eundem Hamelium (e); insigni certe, & monstruosa eminentia erant illi duo, minime, ut videtur, recentes, quos ex Rolfincio Sepulchretum (f) proponit in femoribus cuiusdam cadaveris, quo post anatomen cocto ad seleti structuram, uterque ab invicem

invicem abscedebat callus. Præter cæteras autem digna est quæ hic memoretur, Observatio, a spectato Chirurgo cum Salzmanno (g) communicata. Militi fractura tibiæ callo tam firmo sanata fuerat, ut huic pariter ac alteri insitens, sine ullo incommodo ambularet, cum forte octavo post mense acuta febris correptus, in idemque in quo prius cubuerat, Nosocomium delatus, dum confectis adversus febrem remediis curatur, animadversum est, quasi callo a febrili calore sensim absumpto, extrema ossis per se iterum sejuncta esse: quæ perstante febris, cum conglutinare non licuisset, mox, sublata febris, a natura ipsa sine magno vel medicamentorum, vel fasciarum apparatu, tibia in integrum restituta est. Denique calli ipsius compages in demortuis inspecta, aliquando ejusmodi est, ut quamvis diametro multo amplior, tamen longe fragilior quam os cui accrevit, invenitur. Neque enim ex duro osse, sed ex spongiosa, qualis inter duas cranii laminas, substantia est. Cujusmodi callum in gallinæ, & anatis ala describens, pingensque Ruyschius (h), id aliquoties in homine quoque observasse se, dicit: ita ut haud nimis fidendum sit iis qui autumant, fracturarum callum semper tantæ esse firmitatis, ut ossa olim fracta, & ferruminata, citius (i) si de novo fracturam patientur) in loco vicino, quam in dicto callo frangantur: quin etiam inde esse non dubitat, quod aliqui post ossium fracturam ferruminationem facillimum negotio, imo incidendo, in recidivam incidunt. Cæterum si plura exempla cupis observare callosorum structure, & miræ interdum longitudinis; vix, credo, majori numero apud alios invenies, quam apud Erudit. Jo. Beniam. Boehmerum (j). Quem numerum, puto, augere poteris, quod ad structuram attinet, Observatione Cl. Viri Alexandri Camerarii (k) in pueri femore; quod vero ad longitudinem, exemplo proposito ab Jo. Jacobo Bajoro (l) in molitoris maxilla inferiore a mento usque ad medium trium circiter unciarum amplitudine.

30. Nunc ut ab iis quæ fractis ossibus non cruris tantum, sed & aliis accidunt, ad peculiare eorum fracturas redeam: unam, sed rarum quiddam præterea continentem, Observationem subiiciam.

31. SENEX rusticus pinguior, dum vitem putaret, ex arbore in pedes ceciderat, & crus dexterum ita frebus longius quoque, aut brevius ex quo completus fuerit, tempus addendum est, magis, minusve compactum, aut certe durum, firmumque esse posse. Et hæc ego ratione puto, adversas inter se Clarissimorum complurium Virorum sententias esse conciliandas. Sunt enim qui scribant, pari firmitudine esse callum ac quævis pars ossis, imo, si diametro sit, ut sepe, quam os, majori, pro diametri augmento tanto esse robustiorem, idque sapienter esse prævisum, quia fracta ossa cum rarissime secundum pristinam directionem reponantur, ibi alioquin novæ fracturæ magis essent obnoxia, ibidemque difficile iterum possent coalescere propterea quia callus structura caret vasculari. Quæ ut seponamus tum quia secundum Hamelii quidem Observationes non ex osse, neque ex callo, sed ex periostio, ut diximus, callus videtur repetendus, tum quia non ignobilis Chirurgus affirmat, fracto priore callo, alterum citius quam prior, formari, illudque unum hic attendamus, callum dici non minus saltem quam os ipsum, resistentem, & firmum; sunt certe alii & graves, & plures Viri qui cum hæc re minime consentientia proponunt. Vide enim, ut Celsus (c) ad nimium qui ossibus recte inter se glutinatis supervenerit, callum extenuandum ea artui exterius adhibeat quæ, si ossa duritie esset callus, opitulari nihil possent, ut leones ex oleo, sale, & nitro, longasque friciones, multa ex calida salsa aqua fomenta, malagma quod digerat, & adstrictiorem alligationem. Aut si hæc profuisse non putas; Hamelium (d) leges scribentem, aquæ stillicidium non modo ad id sæpenumero utile fuisse, verum etiam ubi nimius fuit ipsius usus, nonnunquam callum adeo molivisse, ut duo quæ inter se coaluerant, ossis extrema per se iterum sejuncta sint. Sed fuerint ejusmodi calli aut non ita magnæ diametri, aut nimis recentes, ut bimestris ille, & parum emens in crure junioris agni, qui callus ex interrupta intra paulo acrius lixivium ebullitione reglutinatus est apud eundem Hamelium (e); insigni certe, & monstruosa eminentia erant illi duo, minime, ut videtur, recentes, quos ex Rolfincio Sepulchretum (f) proponit in femoribus cuiusdam cadaveris, quo post anatomen cocto ad seleti structuram, uterque ab invicem

molliora facta, eandem semper firmitudinem retinuerunt. Addere hæc ad illa poteris quæ olim de felleis calculis ad Schroeckium scripseram (m). Nunc autem id accipe quod rarius esse, dixi; ego cerce nisi in hoc corpore nunquam vidi. Venæ Cavæ Inferioris truncus ubi ex Iliacarum confluxu coalescebat, non dexterum, ut semper, sed sinistrum per lumbares vertebrae tenebat latus, pergebatque ad levam arteriæ Magnæ donec per hujus anteriorem faciem statim sub Mesenterica Superiore oblique dextrorsum se inflectens, debitam sibi dexteram peteret sedem. Quæ ex inflexione fiebat, ut quamvis sinistra Emulgens vena ad duos tresve digitos inferius quam dextera, si Cavam in rectum extenderes, in hanc influeret; ren tamen sinister non multo inferiorem sedem obtineret. Hunc ego per Aortæ faciem venæ Cavæ transitum cum in quocunque corpore miraturus fuissim; non satis mirari poteram in ejus corpore qui inter assiduos gravesque agrestis vitæ labores consenuisset. Cæterum Aorta duri aliquid habuit ad suam in Iliacas divisionem, itemque ad ostium Mesentericæ Superioris. Thorace autem aperto, etiam pulmones ubicunque pleura five pectus, five latera, five dorsum, five diaphragma convelliebatur, cum ea arte cohererent; sani tamen sunt visi: neque in propinquo corde vitii quiddam adnotatum est. Novissime Crus fractum inspexi. Non tumebat plurimum. Tibia, & fibula paulo supra eum locum ubi cum pede committuntur, fractæ erant ambæ, fractura in longitudinem, sed non recta, pergente. Sanguinis ibi circum effusi non plurimum: nec malus adhuc erat odor, aut color.

32. Hanc autem fracturam inspexi, non quod in homine, eoque sene quiddam tam cito me visum sperarem quod ad calli initium conspicuum attineret; sed ut alia potius, in hisque illud, an si fragmentum quoddam esset ab ossibus sejunctum, id mucoso quodam involutum esset humore, sicut in Valsalvæ schedis ab eo inventum esse, legeram. Hoc quoque in ipsius quadam Epistola est quod huc spectet: ubi fractura cum vulnerere est, sanguinem effluere esse sinendum; sic enim & ossa, & carnes facilius junctum iri: itaque in casu sibi proposito fracti femoris, & tibiæ, ideo illud citius quam hanc, conferuisse, quod illius fractura cum vulnerere per quod sanguis effluerat, conjuncta erat; hujus non erat.

Nec quando adnotare hæc cœpi, illam omitam quæ mihi non vulgaris Chirurgus de se narrabat. Crure fracto, ossibusque recte & repositis, & locatis, id primum animadvertisse, auctum sibi dolorem hora una exacta postquam crus deligaverant: quod cum a deligatione quæ archior interea facta esset, posse repeti, negassent id explorantes Chirurgi; intellexit a stupa esse quam circumposuerant, conqussato ovi albumine imbutam, quod dum resiccaretur, fragmenta aliqua ossæ ad proximas sentientes partes apprimeret. Deinde illud alterum, a levissimo quoque, dum qui sibi aderant, ambularent, tabulati, & lectuli tremore, semper dolore augeri, timoremque simul, ne is tremor ossium conglutinationi officeret. Denique cum perlanatus jam esset, diuturnam valde sibi, alioquin tunc juveni, & recte valenti, reliquam fuisse in calcaneo, cum vellet incedere, molestiam, & difficultatem propterea quia satis cautum non fuerat, toto illo tam longo quo immotum crus servaverat, tempore, ne calcaneo niteretur: ex quo etiam illud intelliges, quare navi, attentique Chirurgi velint fracti artus calcaneum apto foramine exceptum quod circumjecta stupa, aut linteam molle, in annuli formam convolutum, relinquat, ita quiescere, ut æger calcaneo ipso non nitatur.

33. Luxari aliquando juxta pedem ambo ossa cruris, jam olim ab Hippocrate (n) scriptum est: eaque luxatio brevior utique artum faceret, si quando ita disjungerentur, ut altragulus ascenderet inter utrumque: quod tamen fieri non posse, nisi præter symptomata longe gravissima, pes ad externum cruris latus evidenter tractus, appareat, satis est in Responso quodam meo demonstratum: quod si legeris apud Clariss. qui edidit, Medicum; rem, opinor, ita perspicuam esse, cognoscas, ut de ea nihil hic censeas esse adjiciendum.

34. Hactenus de Inferiore artu tam multa scripsimus, ut nisi longissimi esse velimus, pauca dumtaxat de Superiore, & de Vertebrae sunt attingenda. Quorum pars tamen ad Inferiorem quoque artum spectabit, ut partem eorum quæ scripta sunt, ad alia etiam ossa transferri posse, intelligis. Ex iis enim illud quoque est quod ex Columbo memoravimus (o), in pueris facit.

(f) De crur. hum. fabr. l. 1. c. 37. (g) Syndesmologie. S. 5. c. 13. cum notula m. (h) Vid. Celsum de Medis. l. 8. c. 10. prope fin. (i) Eph. N. C. Dec. 1. A. 1. Obs. 25. cum Scholio. (j) Memoir. de l'Acad. R. des Sc. A. 1741. Mem. 1. (k) c. 10. cit. S. 1. (l) Mem. 2. (m) Differt. exhib. ossium calli generationem &c. (n) in fine c. 10. paulo ante cit. (o) Mem. 3. cit. (p) Ibid. (q) Sect. hac 5. Obs. 1. §. 8.

(g) Differt. de Artic. analog. &c. c. 2. §. 7. (h) Theat. Anat. 8. n. 49. & Tab. 3. Fig. 5. & Catalog. Rarior. Thesca B. Regoli. 2. n. 2. (i) Differt. de Ossium Callo. (k) Act. N. C. Tom. 1. Obs. 53. verif. fin. (l) Eph. N. C. Cent. 7. Obs. 4. (m) Act. N. C. Tom. 2. Obs. 107. (n) l. de Fractur. n. 14. apud Marinell. (o) supra, n. 2.

unquam artus examini permittantur; hinc est, ut Observationes quæ ad arthritidem proprie attineant, longe sint, quam tot aliorum morborum, in Professorum libris pauciores. Itaque & paucæ in Sepulchreti VIII. Sectionem, quæ de Arthritide est, referri potuerunt: quæ Sectio propterea multo maxima ex parte constat e Scholiis: & de paucis illis quas habet, Observationibus aliquæ jam libris superioribus productæ fuerant; quin ultimam, quæ addita est, eam a Boneto ipso in ista eadem Sectione paulo ante, atque adeo proxima superiore pagina totidem verbis fuisse propositam, deprehendes, si cum Observatione XI. ejusque Scholio contuleris. Mihi vero stat nullam repetere historiam, cum plures ex Valsalva possem, & aliquam etiam ex meis. Cum quidpiam inde opus erit ad memoriam redigere; Epistolas in quibus relegas, indicabo. Hic quam paucissimas, sed quas necdum miseram, habebis.

2. MULIEREM ischiadici dolores sæpe torquebant ad juncturam femoris dexteram, quam in partem & claudicabat, & nonnihil gibbosa erat. Novissime paralytis primam, deinde apoplexia corripuit, atque interfecit ante finem Januarii A. 1741. dum in Gymnasio Rem Anatomicam tradebam: quo cadaver e Nosocomio translatum est. VENTRE aperto, omentum ex obtulit propemodum ad pubem usque protensum. Quod cum revolvère fursum vellemus, una Colon intestinum ad inferiora curvatum, & omento arcu adhærens, revolvebamus. Scilicet sedes erat ejus intestini alia ac solet. Nam præterquam quod ut Cæcum, ita ejus initium inferius erat quam consuevit; ubi ab eo initio ferme ad jecur usque confcenderat, inde in arcum modum fere deorsum in hypogastrium summum curvabat, & hinc sursum curvatura omnino simili in sinistram hypochondrium altius scandeat: toto autem hoc arcu firmiter, ut dictum est, ad omentum alligabatur. Tuba utraque ad uterum clausa. Hujus osculum a tergo nulla proflus corona erat cinctum. Vagina brevis. Breve quoque, & vix digiti intervallum a clitoridis glande ad urethra orificium. Arteriæ Magnæ truncus qui in ventre est, majorem Cœliacæ Superiore Meſentericæ emittit: albiditque intus maculis passim distinguebatur. Cætera viscera, & vasa, cum meliora interim ex aliis corporibus suppetere, & ne Caput quidem inspicere facultatem darent angustia temporis, non perlustravimus.

Colli, & reliqui trunci, & Artuum musculos demonstrantes, in illo qualem Thyroideam glandulam invenimus, ad te alias (a) scriptum est; qualem vero femoris dexteri cum acetabulo juncturam, nunc, ut Epistola superiore (b) promissimus, est scribendum; si modo illud prius indicaverimus, finem osseum quo scapula dextera caput ossis humeri excipiebat, oram habuisse manifeste didicimus ubi latere anteriore accedere debuisset ad summum. Dexteræ autem femoris caput non in globi formam rotundabatur, sed depressum erat, nec lævi, albaque, sed lurida cartilagine obiectum: quin hæc in posteriore parte capitis omnino deerat, ut nudum ibi os appareret, in plures subrotundas protuberantes particulas conformatum. Acetabuli intima facies erat sanguinolenta: ejus autem quod vocant supercilium intra naturalem ex cartilagine, & ligamento substantiam conditas ossæ lamina habebat duas, non parvas, easque inter se vicinas.

3. Fernelius (c) quidem censebat, arthriticum humorem nunquam, aut admodum raro penetrare in articulum cavum, sed in circumjacentibus dumtaxat vinctis, membranis, tendinibusque subsistere, hoc inter cætera argumento usus, quod in tophacea podagra, aut chiragra humor in calculum jam concretus, aperta ruptave cute, eruitur plerumque e digitorum articulis, capsulari vinculo integro atque illeso. Verum alii postea, ut ex Sepulchreto (d) cognosces, aliquid plus quam Fernelius, moliri voluisse videntur, cum vel tendinum, articulis infertorum, nullum, aut obscurum sensum esse, contendunt, gypseamque illam materiam tandem ob causas alias accedentes juxta articulos quidem congeri, sed non semper, cum & aliis vicinis in locis se offerat. Nos autem in proposita muliere, quam ischiadici dolores adeo torquebant, nihil juxta articulum vitii, sed omne intra articulum offendimus. Nec vero negamus, tartaream illam materiam juxta articulos etiam concreſcere, quemadmodum in Sacerdote illo statim sub cute Valsalva (e) invenit in membrana, digitorum tendines obvelante. Nec

repugnabimus, si forte sic velint accipere verba Aretæi (f); in articulis quoque tophacea quædam coalescunt: ab initio quidem velut abscessus occupant: postquam vero magis spissantur, etiam concreto humore difficilis sunt inflexiones: denum topi solidi albi consistunt. Quin etiam Sanctorii nostri (g) Observationes indicabimus. Ego, inquit, aliquando vidi in quadam antiquam gonagra pblegma gypsum molle, liquide calci simile, defluxisse ad cutem, qua perforata, ita liquidum egressum fuit: quo experimento excitatus, semel in quadam gonagra, ex gypsea pilita, utens stillicidio aquarum lanarum non ablutarum, in quibus malvarum, malva, & nasturtium ebullierunt, post longum aliquod intervallum aliquam portionem illius pituitæ gypsea sub cute existentis liquidam & mollem feci, indeque illam (secta cute) evacuari: quod curationis tentamen omittere hic nolui; quamvis me non fugeret (h) calcariam podagricorum materiam ab Recentioribus sola aqua calida fuisse resolutam, exemptam quidem, ut opinor, indeque spem esse conceptam, fore, ut largo crebroque haultu aquæ oſtracodermatum, cui sapo additus sit, in arthriticorum ipsis juncturis resolvatur: quam utinam spem, justiore futuram, si quantum illius aquæ in vesicam, tantundem in juncturas ferretur, successus comprobaret. Damus igitur illis quos ex Sepulchreto indicavimus, juxta articulos quoque, neque id raro, tophaceam congeri materiam. Immo insuper addimus, vel longe ab articulis, ut in mamilla tumore vidimus (i) generosi Viri, cujus avum, & patrem arthritide male habuerat, nec ipsi omnino pepercerat. Sed non propterea illud quoque probare possumus quod scribunt: cum ligamenta capsularia occludant articulum cavæ, cumque nulla ad has pateat via, neque vena aliqua hæc loca subeat, non posse humorem arthriticum intra hæc perferri. Nam viæ hæc eadem sunt quæ mucilagini, cava articulorum lubricanti: cujus glandulas suis esse arteriis præditas, non ratio solum, aut injectiones, sed oculi ipsi inermes commonstrant, rubellæ illas tenuisque earum lacinias conspicientes. Quare ubi sanguis tartareis resertus corpulculis fuerit, ut per alias arterias circa aditos articulis tendines, atque membranas, sic per istas eadem poterit simul cum mucilagine in articulum cavis deponere. Quæ in tophos, & lapillos concreſcentia, diductis sensim ossibus, & dissolutis vinctis frangunt articulos, ut de lapidosa chiragra loquitur Persius (k), five ut de arthritide hisce lapidibus ait Cælius Aurelianus (l) articulos solvunt, & autem dissolvunt, atque erumpendo prominent, & chirurgia detrahuntur: quæ vidi omnia, præsertim in digitorum manuum articulis Patricii Veneti. Neque erit cur dubites, num revera intra ipsa articulorum cava concreſcant, ubi ea legere quæ ab Hardero (m), Schneidero (n) Dobrzenskyo (o) observata in Sepulchreto recentur.

4. Nec tamen semper necesse est, tartarea corpulcula cum mucilagine subire cava articulorum, ut arthritice ibi affectiones existant. Satis est, si Boerhaavium (p) audias, ipsa mucilago, si attritu congruo non attenuata, eoque non resorpta, in juncturis stagnare diutius, & mora ipsa acris fiat. Sic enim dolores facit vehementissimos; & sæpe tanta mala a solo vitæ genere sedentario oriuntur. Huc vero addenda sunt alia quæ nos inter causas referimus aut minoris attritus, aut difficilioris resorptionis aut utriusque, nempe frigus humidum, naturalem tonum valde lædens articulorum eo facilius quod cartilagines, & ligamenta ex quibus constituuntur, & tendines quibus plerique operiuntur, sanguiferis vasculis neque ita multis, si cum plerique comparentur Partibus, & certe per minutis prædita sunt, quo fit, ut frigori magis obnoxia sint, in iisque præsertim juncturis quæ frigoris injuriis sunt maxime expositæ, ut in pedibus: pressio, ut puta a strictioribus calceis, unde revehenti vasculorum plura aut nimis angusta fiunt, ut proflus obcæcantur, tantoque id facilius, quod ad duriores ex quibus articulos constare, dixi, partes apprimuntur; distantia a corde, unde languidior in propellendos humores impulsus: acclivis ad perpendicularum via per quam iidem sunt evehendi: ipsa dolore affectarum partium quies in qua delicati vel diutius permanent quam opus sit: lentior & viciſſidior mucilago five a morbidis causis, & ingluvie in primis, baccho, venere, five a parentibus, a quibus revehenti quoque vasculorum angustia, aut propellentium fibrarum imbecillitas: alia ejusmodi. Quorum ideo complura enumeravi, quia animadverti, quod

dam ex Hoffmanno (q), apud quem fere omnia hæc sunt, nulla facta ejus mentione, describentes, aliqua prætermisſisse, minime omittenda, five nihil aliud quam quod Hoffmannus, explicandum fumamus, nimirum cur pedes crebrius quam alias partes, corripiat arthritide, five etiam cur, & vel ab initio interdum, quampiam aliam. Re enim vera, uti scriptum est a Cælio Aureliano (r); aliquando a pedibus sumens arthriticus dolor exordium, ceteros articulos implicavit, aliquando in aliis incipiens, pedes invasit. Qui autem articuli non modo præ aliis sunt in frequentissimo motu, sed & simul paucioribus causis obnoxii sunt ex iis quas enumeravimus, illi vix unquam, aut nunquam arthritide corripiuntur, neque enim legisse, aut audivisse meminimus, illos unquam articulos correptos esse quorum obsoletam memoriam restituunt, nihil in iis ob parvitatem deesse ostendimus; quæ sunt in magnis; nam & capsulari membranae vinctulo, & glandula mucilaginosæ lacinia, & mucilagine evidentem præditos minimos illos propositimus (s) qui inter Cricoideum, & Arytenoides cartilagines intercedunt. Sed a morbidis causis adventitiis quas nominamus, causis subjecti, pedis videlicet articuli: quamobrem cum Veteres Auctores (t) arthritidem epidemicam viderunt, ut eunuchi quoque, mulieres, pueri, puellæ, itemque caprarum greges ea tentarentur; podagra illa fuit quæ promiscue per viginti annos loci incolæ invasit. Minus autem mirabile fuit, notos fuisse Brasavolo (u) illustres duos adolescentulos qui annos quindecim nati, ex ea laborare cœperunt; cum ipse pueros viderim qui, infantia vix peracta, acerbis articulorum doloribus prehenſi, decumbebant; sed eorum ego & parentem, & avum, & proavum noveram arthritidi obnoxios.

5. Quam vero acris interdum fiat stagnans in juncturarum cavis mucilago, sanguinolentum propositæ femina (x) acetabulum, & erosum femoris caput fatis ostendunt. Ubi autem ad eum usque gradum acrimonia pervenerit, ut hæc faciat, num ullo putas interno, externove auxilio posse ischiadem perſanari? Ego certe non puto, ne si ultimo quidem utaris, & in veteribus quoque morbis efficacissimo; sic enim Celsi (y) verba legenda credo; vixit aut quatuor locis super coxam cavitatem candidibus fœveramentis exulcerando, nedum alia quæ præterea Hippocrati (z) in ulserant, mitioribus ultionum generibus, qualia, & multo plura, a Cælio Aureliano (a) memorantur, inter quæ illud quoque, Hippocrati pariter usitatum, quod præ cæteris videtur Indorum moxæ respondiſſe apponendo videlicet fungum quandam, huncque a summa parte accendendo: cujusmodi ultionem etſi leni penetratione moderatam Cælius agnoscat; omnes tamen aliis postpositi remediis, quippe cura plurima vexatione conjunctas, & eorum utam prohibentes, cum partes ulceratæ appoſita tolerare non possint. Verum ultioni ad laxatas partes contrahendas, corroborandasque suis est locus; & cutis exulcerationi ad noxiæ materia portionem aliquam ab intus locis arcendam, & extra corpus amandandam: itaque mitius, & tempestive adhibitam non omnino in quibusdam rejiciendam censibus, præsertim ubi non veterum modo, sed etiam non ita antiquarum quæ feliciter ejus ope absolute sunt, curationum veniat in mentem. Neque aliter de aliis quibusdam auxiliis existimabis. Tanta est, inquit Arantius (b) in ischiadico dolore, præsertim incipiente, enematum facultas, ut ipse nullo præter clyſteres adhibito medicamento, plures graviter affectos, in pristinam sanitatem perduxerim. Et prima quidem, quæ proponit, enemata facile probabis, ab iis quæ laudat Cælius (c) sæpe a nobis memoratis, non adeo discrepantia, quibus pariter nota atque vaporata interiora laxamento consentiant. Sed ubi prima illa non satis fecerint, Arantius aliud præscribit, idque purgans, quod & ipse agnoscat, validum. Num irrationes veritus, omnino rejicies? Imo ubi ex sint causæ, eaque corpora quæ ipse ponit, si non illo, at alio aliquo clyſtere uteris quo idem consequaris. Certe autem præter Arantii testimonium, si vultuſtoris, aut recentiores ipſo Medicos legas; invenies multos cum eo consentientes. Sic Montagnana (d) Dolores ischiadici, inquit, sapientum omnium concordia clyſteribus acutis sanantur. Riverius (e) autem ita post frequentes alios clyſteres, etiam acres denique proponit, ut manifestissime cum Arantio facere, intelligas. Porro Ettmüllerus Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

(f); ut alios præteream; non solum clyſteres in primis repetitos, ait, convenire; sed hoc addit, & quidem acres necesse est sint ipsi. Quis ausit credere, tot experientissimis Professoribus id non respondiſſe quod adeo commendant? Igitur & huic remedio suus est aliquando locus. Alias autem illis clyſtinatibus quæ probabat Cælius, aut aliis aliud agentibus, in quibus profuisse interdum, scio quæ ex aqua parata erant in qua pernæ os incoctum fuerat, vel magis quam confecta ex elaboratis pharmacis, nedum ex rebus itidem vilibus. Crediderim autem, fuisse quædam ex iis composita quæ utilia essent nervis, Recto intestino proximis, quos pone ischium os descendentes aliqui tanquam ischiadis fedem spectabant, præsertim ex quo Coiterus (g) scripserat, spatium inter infimam Spinæ medullam, & Crassam hujus meningem per quod nervi illi traducuntur, & se in arthriticis, ischiadicis, & podagricis multoties tenuisſero, interim pituita viscosa refertum deprehendiſſe. Quam Observationem vix Arantius verbis, eam commemorantissimè fuisse in Sepulchreto (h) relatum, minus ægre fero, quod ejusmodi humor in iis etiam reperitur, qui ex eo morbi genere non laborant.

6. Quod de clyſteribus cenſui, idem quoque de exhibitis purgantibus pharmacis, & de sanguinis missione cenſeam, necesse est. Nam quod ad hanc attinet: ut nihil de opinione eorum dicam qui ischiadem ab irritato naturæ conatu esse, credunt, superfluum sanguinem per hæmorrhoides expellere nitentis; certe eorundem Observationibus Majores præluxerunt, in quibus Joannes Zecchi (i) qui ratione, & experientia fretus, sanguinem ex illis venis evocatum mirum in modum ischiadicis opitulari, scripsit. Mirabilia idem narrat de celerimo ejusdem morbi abitu, si vena ad respondentem malleolum exteriori fecetur, confirmante haud ita dissimili Riverii (k) Observatione. Vidisse hos quæ ajunt, quis inficietur? Num tamen in exſanguis, & infirmissimo homine id tentes quod in robusto, & sanguinis pleno, aut a suppressis hæmorrhoidibus ischiadico facto, bene illis successeſſe, credibile est? Purgantia quoque pharmaca scio te arthriticis illis non daturum, quorum corpus exſuccum, viresque imbecilles, nervi facile in consensum trahendi, ventriculus denique is fit qui inde capere detrimentum possit. Sed non propterea illorum quodcumque a te credi omnibus, & semper nocturum, existimo. Id enim si esset; arthritidem nunquam, ne incipientem quidem, abegissent, aut arceſſent Medici plerique vetustiores, ut qui purgatione in primis usos utrumque se præstitisse, testantur. Ne singulos nominem, facit eorum affecta Demetrius Pepagomenus, Michaelis Palæologi Archiater, qui, hoc jubente, libellum de Podagra scripsit, tanquam incerti Auctoris, nec seorsum a magnis voluminibus parabilem, Patavinis typis nostra memoria excusum, quando; ut de antiquiore editione ſileam; Lutetia Parisiorum seorsum exierat A. 1558. nec sine veri Auctoris nomine, quemadmodum & Audomari A. 1619. edente Joanne Bergesio, qui haud puto, eum sibi laborem ſumpliſſet, ut e gallica Jamoſi versione latinum faceret, si græce, & latine Lutetia prodiſſe, eleganterque a Marco Mufuro latine redditum, non ignorasset. Eum igitur libellum si vel ſeltinanter verſes; quantum in arthritide & sananda, & arcenda purgationi tribuerit Græcus Archiater, Græcos illos veteres Medicos ſecutus, continuo intelliges. Sed ne forte putes, in terra dumtaxat Græcia id feliciter ceſſiſſe, mihiſque obſicias magni noſtro tempore nominis Medicum, aſſeverantem, cathartim omnem vel per lenientia, nedum per validiora medicamenta, arthriticis plurimum nocere, five præſenti mederi, five etiam venturo paroxyſmo velis occurrere, immo ſe, tam in ſe ipſo, quam in aliis facto periculo, compertum habere, illam parum adeo votis reſponſiſſe, ut malum, quod debuerat averruncare, atque avertere, acceſſeret; ne igitur hæc mihi obſicias; duos ex noſtratibus præclaros, cum viderent, Medicos tibi opponam, ipſos quoque arthriticos, & in ſe ipſis purgationem expertos, Marcum Gattinariam, & Petrum Bayrum. Quorum ille (l) cum ſingulis per biennium menſibus ſemel evacuatione, ſingulis autem hebdomadis bis minoratione uſus eſſet, ſic curatus fui, inquit, & pro certo nunquam paſſus ſum podagræ dolores. Bayrus autem (m) cum octies jam, aut decies vehementiſſimis laboraſſet cruciatibus omnium articulo-

(a) Epiſt. 50. n. 31. (b) Epiſt. 56. n. 16. (c) Patholog. I. 6. c. 18. (d) Sect. hæc 8. in Schol. ad Obſ. 1. (e) Epiſt. 40. n. 2. (f) De ſign. & cauſ. diuturn. morb. I. 2. c. 12. (g) Comment. in 1. F. I. l. Can. Avic. D. 4. c. 1. t. 1. (h) Vid. §. 11. Diſſert. cit. Epiſt. 41. n. 19. (i) Epiſt. 50. n. 45. 46. (k) Sat. 5. v. 59. (l) Morb. Chron. I. 5. c. 2. (m) Sect. hæc 8. poſt Obſ. 2. (n) Obſ. 3. (o) Obſ. 5. (p) Prælect. ad Inſt. §. 248.

(q) Medic. Rat. Tom. 4. P. 2. S. 2. c. 11. Theſ. Pathol. §. 16. (r) c. 2. paulo ante cit. (s) Adverſ. Anat. I. n. 15. (t) Vid. apud Donat. de Medic. Hiſt. Mir. I. 1. c. 8. (u) Vid. ibid. (x) n. 2. (y) De Medic. I. 4. c. 22. Viſ. Epiſt. 6. noſtram in Cels. (z) Vid. apud le Clerc Hiſt. de la Médec. P. I. l. 3. c. 28. (a) l. cit. §. c. 1. (b) l. de Tumor. p. n. cap. 63. (c) c. 1. cit. (d) Conſil. 257. (e) Præf. Medic. I. 16. c. 2. (f) Præf. I. 2. S. 2. c. 3. art. 8. (g) Obſerv. Anat. (h) Sect. hæc 8. Obſ. 6. (i) Conſult. Med. 43. (k) Cent. 2. Obſ. Med. 25. (l) Vid. apud Donat. c. 8. ſupra ad n. 4. cit. (m) De medend. hum. corp. malis Eueh. Diſt. 19. tr. 1. c. 1.

culorum, ut solam linguam movere posset, iisdemque rursus affligeretur. sumpto electuario suo caryocostino, ambulare potuit eodem die, postmodum autem jam liber erat: quod etiam postea bis pari felicitate expertus est. Quindenique posteaquam eodem pharmaco ter quaterve singulis annis cum plenitudinis indicia perciperet, uti cepisset, sunt modo plusquam viginti sex anni, inquit, quibus nullo modo a dictis doloribus fui molestatus: idque non solum in me ipso, sed in innumeris hominibus probavi experimento; hoc autem est illud idem electuarium quod Capiavaccius noster (n) maxime commendandum esse dicebat, in arthritide, sicut experimento fuit sapissime probatum. Quia fufius de Bayro memoravi, ne Gatina-riæ, dices, purgationes feliciter cessasset, quia tunc podagra vexari incipiebat, prætereque toto illo bien- nio nihil, aut parum de vino bibit: quamquam non vi ego litteratum Virum, qui diu multumque, non se- cius ac frater, arthritide vexatus, omniaque alia exper- tus, in hisque annuum pro vino aquæ potum, nihil ta- men proficiebat, imo debilis, macerque fiebat, donec ante suam parcam cenam quotidie una uti cepit ex melano- gogis pilulis Langelotti, unde mucosa fere, nec ita mul- ta, deiecit. Sic enim melius habere incipiens, domo prodit: vidique ego postea sine scipione incedentem firmo gressu, atque expedito, pristinoque corporis ha- bitu, paucis, bene valentem, quo tempore non nisi quin- cto quoque die unam ex iis pilulis fumebat. Neque du- bium est, quin recentissimi Medicinæ Scriptores, nisi his similia nota haberent exempla, ipsi quoque omnem arthriticis omnibus purgationem vetarent: ipsi vero pharmaca quidem vehementiora, præsertim in paroxys- mo, non probant; mitiora autem vel eo instante, at- que adeo incipiente, nedum ad alios prohibendos pa- roxyfmos, commendat.

7. De dieta quoque, ut vocant, lactea certum est etiam atque etiam esse cogitandum priusquam arthriti- cis imperetur; ne forte impuriore corpori, aut hypo- chondriacis affectionibus obnoxio, aut languido ventri- culo magis plus detrimenti afferat, quam utilitatis. Quia etiam utilitatem hanc brevem esse, & fugacem vel in iis qui lac bene ferant, scripserunt Medici no- bilissimi, & quamprimum, eo omisso, ad sanorum vi- dum, quantumvis lenem, mitemque redierint, arthri- tidem reverti, longæque pejus, quam antea, vexare, aut ejus loco internos gravissimos oriri morbos, quos mors haud multo post consequatur. Veruntamen neque omne lac, nec quacunque ratione sumptum, hæc post se relinquat incommoda, necesse est, ut puta si iis qui- bus conveniat, non ipsum plures haud aliter ac sepe aliis in morbis fit, eodem tempore præbeantur. Certe ex Ob- servationibus quas Daniel Puerarius, opinor, Thesau- ro addidit Thomæ Burneti (o), una est Excell. Comit- tis, qui, cum ventriculo ulteriores lactis usum non ferret, putacis ipse vicens, cum saccharo, & lacte paratis, & gallinaceis pullis, pane lacte imbuto nutritis, paula- timque ad pristinum victum reversus, levioribus tantum, & facile abigendis articulo- rum doloribus, non primis il- lis, vivebat obnoxio. Alii autem non pauci arthritici cum biennium circiter lac sumpsissent, innoxie postea vino, computationibusque indulserunt. Hæc ille. Cornelius autem Celsus (p) olim memorat litterarum mandavit, ar- thriticis quosdam, cum asinino lacte potu ex toto se eluif- sent, in perpetuum hoc malum evasisse. Confirmavitque Plinius (q), esse inter exempla, qui asinum lac bibendo, liberati sint podagra, chiragraque. Quem locum in Anno- tationibus ad Ballonii Consilia (r) relatum video, non sine animadversione, quam facile, quamque idoneum ad acrimoniam feri arthritici emendam remedium ejusmo- di a Medicis illius temporis omittetur. Iis autem qui postea Hippocraticum lactis usum adversus hunc mor- bum renovarunt, cum alii aliquando alia objicerent; exitit denique Senex optimus, nostrumque amicissimus Ludovicus Testius, qui minus obnoxiam difficultatibus utendi lacte rationem excogitavit, saccharo, ut vocabat, lactis invento. Cujus non infelices effectus est pluribus fuerint tum apud nostrates, tum apud externos Observa- tionibus comprobati; Auctore tamen extincto nescio quomodo ipsius inventi usus paulatim decreverit visus sit.

8. Noli expectare, ut de hydrargyro pariter verba fa-

ciam, quem inter cetera adversus difficile hoc malum præsidia quibus auctoribus referre possimus, excitata qui- dem salivatione, monstrabit Ettmüllerus (s), alia autem ratione, alii, in quibus Cl. Pujatus (t). Non de auxi- lio hoc magis, quam de diaphoreticis, aut de amariori- bus, & calefacientibus herbis sermonem hoc loco institui- ram ne longior sim, tum quia ut de ceteris remediis, ita de his quoque nihil aliud dicturus essem, nisi suum posse aliquando his omnibus esse locum; alias pro cor- porum conditione fore inutilia, imo etiam, vehemen- tiora præsertim, noxia. Itaque memini, cum Medicus mihi quidam narraret, podagricis quos lues insuper venerea corripuerat, se hydrargyro dato, atque uberi salivatio- ne promota, lues quidem abegisset, podagræ autem cau- sam nihil minuisse, cum ab ea non levius quam antea, invadi pergerent; memini, inquam, respondisse, imo fa- tis est, quod non gravius. Quamquam autem in hoc etiam morbo; ne dicam in hoc magis, paucioribus, le- vioribusque, quo ad licet, remediis utendum est, & nos uli fumus; tamen si quando peculiare causæ aliæ præsi- dium quod alias fugeremus, requirant, Boerhaavio (u) credendum est, de Arthritide scribenti, maximum cuique remedium esse quod oppositum illi causæ, unde originem du- xerat morbus, præsertim ubi illud cum ejus corporis cui medemur, constitutione videtur congruere. Atque hinc est quod nonnulla aliquando auxilia, pluribus Medicis suspecta, in hoc morbo attulerint utilitatem. Sic; ut de externis quoque medicamentis aliqua attingamus; oleum radicibus arboris cinnamomi quam utile fuerit abigendis, arcendisque articulo- rum doloribus, apparet ex Transactionibus, ut vocant, Regiæ Angl. Societatis (x). Sic Medicorum Scripta versantibus quam multa, quam varia occurrunt quæ adhibita levamen attulerint! Ude pinguedine dymtaxat dicam; ranarum, erinacei, anseris, vervecis, canis laudari, memini. Asinam quoque ab Albertino vidi nonnunquam præscribi, quam a Pauli- no (y) memoratam, nec tamen in hunc usum, invenies. Num propterea quod ex his aliqua nonnullis interdum profuerit, omnes omnibus, semper convenire, existima- bis? Certe Albertinus in ischiadico quodam asinam adhibuit, quem neque acerbissimus dolor, neque inflam- matio torquebat. Alias autem ad demulcendum, quo ad ejus licebat, articulo- rum cruciatu, haud aliis utebatur, quam quibus plerique confuevimus, in singulis tamen eo potissimum quo quisque solebat levare, ut puta frusto bubulæ recentis carnis, bis quotidie mutato, vel ut nuf- quam a me quidem lectum, sed Bononiensi Senatori ubi- tum, nec sine levamine, commemorem; linteolo imbu- to succo, ex foliis sambuci expresso, leviterque tepesa- to, Flores quidem sambuci, aut colicos teneros, aut ipsa folia, sed cum aliis conjuncta, ad podagræ dolore leniendis a Græcis (z), Latinisque (a) Scriptoribus proponi, scio, simplicem autem foliorum succum non memini.

9. Cæterum externa hæc, itemque interna de quibus diximus, auxilia, aliaque ab Auctoribus laudata seu ju- verint aliquem ob eam causam quæ paulo ante indicata est, seu quod casu abhibita fuerint prope declinationem, quæ aliquando multo citius quam solet, per se adventit, sive etiam (id quod præsertim de præservantibus, quæ vocant, medicamentis dictum puta) quæ sanitas horum usui tributa est, verius fuerit exactæ victus rationi, quæ diu simul servanda injungitur, est tribuenda (quorum utrumque Cælius quoque Aurelianus (b) est suspicatus, alterum autem vel per se solum securitatem totius vite attulisse, Celsus (c), aliique testantur) illud certum est, pleraque plerosque aut nihil, aut parum adjuviffe: quæ- dam autem in gravissimum discrimen conjecisse, aut mortis causam attulisse. Itaque si quæ commemoravimus omnia cum illius femine (d) morbo contuleris a quo com- memorandi occasionem habuimus, facile intelliges, quam pauca levamen fortasse aliquod ferre potuissent; nam per- fectam quidem sanitatem, exeso in parte, & deformato offe, sperare non licebat; & contra, quam multa quanto futura detrimentum procul dubio fuissent. In quibus & il- la pones quæ necdum nominavi, sed modo designabam, videlicet quæ arthriticam materiam circa articulos aut jam depositam, aut deponendamque aut tunc, aut in posterum repellunt, deponendamque aut tunc, aut in posterum arcent, adstringendo quæ ferunt ad articulos vascula, fibræque improvide corroborando. Inde enim exclusa quid

quid damni afferat, vel ex utilitate intelligi potest, quam sepius præstat, cum admittitur. Videtis, ut auditus vitia, quæ ceteris auxiliis irritis, Virum generosum vexabant, ad- veniens podagra omnino tollere consueverat, qua abeunte, revertebantur, sicut adnotavit Reusnerus (e), utque Ger- bezii (f) Uxor diu, atque acerbæ & ventriculo, & pe- ctore torqueri solet, donec erumpens arthritidis extemplo liberaret. Sed quid ego ex his, aliisque, unde possem, Scri- ptoribus ejus utilitatis exempla quero quam in me ipso expertus sum? Cum enim illa de qua alias (g) mentionem injeci, utriusque oculi inflammatione, & jam propemodum chemosi conficlarer, cæterisque incassum remediis usus, & sentirem ipse, & Amici confirmarent, non esse amplius differendam sanguinis missionem, animum subiit experiri antea quam mihi vena feceretur; neque enim unquam secta fuerat, ut neque ad hoc tempus quo unde octogesimo annu aggo, secta est; experiri, inquam, an pediluvium, cum lenibus pedum frictionibus junctum, satis levamen afferret. Quæ cum secunda fierent vespere, ecce dolor ad ipsam pollicis dexteri cum metatar- so juncturam adventare podagræ, significat: quæ no- ctu leviter increfcens, oculorum inflammationem statim minuit, & diebus insequentibus fuit. Mirissima fuit illa arthritidis, ut in homine qui nunquam antea, neque parentes, majoresque ceteri, morbo hujusmo- di obnoxio fuerat; nec postea nisi quinto post anno, sed vel multo levius, in sinistro genu se prodidit, ut similis quidem pediluvii effectus fuerit in podagra ad- duenda, sed longe dissimilis in ejus vehementia, atque in Juvene fuisse, video cujus in Commercio Litterario (h) historiam leges; nec mirum, cum ille; ut cetera omitam; non tepido, ut ego, sed calidiori usui esset pediluvio. Verum arthritidis quantum utilitatis afferat, si ei pateant opportune articuli; tantum noxæ reliquis in- vehit partibus, si illi non amplius pateant. Quod cum liceat innumeris Observationibus comprobare, quarum multas inspicere, si vis, potes in Cæsareæ Academiæ Vo- luminibus, & præsertim Dec. 3. A. 5. & 6. Obs. 55. indica- tas; unam mihi satis erit commemorare ejus quem merito sepius laudo, Hippol. Franc. Albertini (i). Cum enim Au- rixes, podagra quotannis laborare solitus, petroleo, nec fe- mel, imminente jam morbo, pedes inunxisset, hunc qui- dem arcuit; sed in multo graviores alios incidit qui abigi non potuerunt, nisi quamplurima ex alvo egesta materia, quæ, ut podagricam fuisse, facile agnoscas, quasi ex calce erat aut gypso recens coagmentata. Ea igitur corroboratis articulis exclusa, in partes haud raro incumbit quæ aut abdomine, aut thorace, aut cranio concluduntur, præ- sens periculum, & sæpe interitum afferens. Eademque accidit ubi causa aliqua interna, & potissimum infir- ma vires obstant, ne ad articulos feratur. Quod cum potueris ex duabus, alias (k) ad te missis, Observatio- nibus arguere, tum evidentius ex hac cognosces.

10. GEORGIUS CORNELIUS S. R. E. Cardina- lis, Episcopus Patavinus, jam olim non artuum modo, sed & renum doloribus valde obnoxio, cum ab his, nul- lis amplius se ostendentibus calculis, jam vacaret, im- minuta plurimum urinæ excretionem, hydropicus fieri vi- sus est, fiebatque fortasse, nisi valentissimo diuretico re- medio dato, magna lotii vis prodidisset. Ne illo quidem tempore calculus confectus est ullus, neque postea be- ne multis annis quodcumque renum laborantium indicium fuit; tamen mutatis ad celeritatem equis rheda vehe- retur longa etiam, & aspera via, velut A. 1721. cum hinc Romam iret, indeque Patavium repeteret. Verum non ut nephritici, sic arthritici quoque dolores semper illis annis quieverit; imo subinde redeunt, eo crebrius, graviusque cruciabant, quod propter obesum corporis habitum, inferiorum artuum robur infirmum, & auge- scentem ætatem, minus jam, minusque in dies uti po- terat exercitatione. Huc accedebat assidua jam a longo tempore alvi adstrictio, capitis deinde, & auditus gra- vitas, & ad somnum proclivitas, nec rara denique ani- mi deliquia. Per hæc cum annum vix exegisset sexa- gesimum quartum, nulla primum ciborum appetentia, tum arthriticus ingruit paroxysmus: jamque manus dextera, & genu sinistrum tumere coeperant, cum tri- stissimum accepit nuncium de lethali morbo Serenissimi Fratris, quem unice amabat, Joannis Venetorum Ducis. Unde magno alioqui animo Virum incredibilis moesti- tia cepit, moxque arthritica materia non modo ad ar- ticulos expelli desit, verum etiam quæ expulsa erat, in Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

venas rediit, & præcordiorum angustiam, spirandi dif- ficultatem, & super hæc repentinum quendam insultum attulit, in quo cerebri simul, & cordis officiis prope- modum deficientibus, mors instare credita est. Tunc senior ejus Medicus, & qui aderat aut sanguine, aut intima familiaritate conjuncti, me in consilium prope- re acceperunt. Invenio ægrum nonnihil interea recrea- tum; sed animo, nedum corpore, adeo dissimilem fui, ut id continuo me perculerit, recordantem Hippocraticæ prænotionis (l): præter consuetudinem quid facere malum est. Qui enim antea in difficillimis rebus nun- quam sibi, aliisque defuerat, omnem omnino spem vi- tæ abjecisse, ex ejus verbis intelligebam, quibus ne fru- stra opem sibi ferre conaremur, monebat, præcipiebat, rogabat, idque a me præsertim, quem singulari, & as- sidua fuerat benignitate complexus, interea dum tange- bam pulsus, majorem in modum etiam atque petebat. Erant ii, ut tum, & postea tangendo cognovi, sane pessimi, quippe imbecilli, & post istos sæpe duos, sem- per autem perpaucos, intermittentes. Manifestum erat, nisi peccans materia ad articulos revocaretur, servari non posse. Nec minus tamen evidens erat difficultas summa revocandi in ea virum infirmitate, & in eo qui omnia incassum fieri, pro certo haberet. Itaque in extremo discrimine versari, iis quibus debebam, seorsum dixi: idque per cursum, dictatis a me continuo litteris, significandum Amplissimis Viris, Fratribus Filiis, curavi. Attramen ex iis quæ inito consilio fa- cienda esse, statueramus, nihil interea, aut postea o- missum est, quantum quidem per ægri vires licuit, ab eoque precibus obtinere potuimus. Jamque genu tume- re iterum incipiebat, quo die pulsus quoque aliquanto meliores factos animadvertimus. Sed mox natura fati- scente, rursus omnia in pejus ruere, & nequicquam no- bis contra nitentibus, respirationis difficultas augeri, sopore caput gravari, convulsionibus non interiora modo, sed & artus corripere. Per quæ sensim intra perpaucos dies Cardina- lis Præstantissimus, Pontifex optimus, Litterarum Fautor summus eodem fere tempore, quo Serenissimus Frater, o- ptimus ipse quoque Princeps, & arthritidi pariter obnoxio, bonis omnibus merentibus, ereptus est IV. Idus Augusti A. 1722. CADAVER, ut iusta more majorum fieri possent, cum esset balsamo insequenti nocte condiendum; Discipu- lum mihi, a me exercitatum, qui viscera eximeret, & singu- la attente perlustraret; neque enim animus tulit, ut ipse adesset. Ab eo, & a Medico de quo antea dictum est, mox diligenter quævisi omnia. Quæ autem ambo re- tulerunt, huc redeunt. Venter præpinguis omentum, mesenterium, intestina etiam Tenia habuit multa pin- guedine onusta: amplum ventriculum; sed tunicis ma- xime extenuatis: jecur ipsum quidem recte constitutum; ejus autem vesiculam parvulam, tunicisque adeo tenui- bus, & flaccidis, ut attritu rumpentur, exidente ro- tundo calculo, pro vesiculæ parvitate non parvo, quem unum hæc sine ulla bile continebat. Renes erant æquo majores, sed dexter maximus, ut simul cum pinguedine qua obtegebatur, capitis magnitudinem ferme æquaret. In eo lapides ad undecim, magni plerique, & ramoli. In sinistro unus, & is quoque ramulosus, nec parvus. Suo colore, & ramis nihil magis hi calculi, quam ni- gram corallum referebant; ad me enim attulerunt spe- ctandos; ab iis autem non esse visos, oportet, qui eo- rum similes fuisse, indicant quos Tabula III. deli- neavit Alghisius (m). Cæterum illa quæ proxime, ar- tæque ipsos complectebatur, renum substantia dura es- rat, & callosa. Thorace recluso, nihil in pulmonibus repertum est quod esset præter naturam; sed Aspe- ræ arteriæ truncus cartilagines habuit præduras, nec facile constringenti manui cedentes. Quod vitii genus in arteriis quoque Iliacis, & proximo, unde oriuntur, Aortæ trunco animadversum fuerat. Neque intra tho- racem deerat; sed ibi quo magis a corde recedebat A- orta, eo fiebat manifestius. Eratque hæc intra thora- cem multo latior, quam iustum esset. In corde nulla polyposa concretio, & vix pauca sanguinis portio, e- jusque spumosi. Sed neque toto corpore multum san- guinis fuit; si capitis integumenta excipias, quæ dum inciderentur, sanguis non ita paucus effluxit. Cra- nio aperto, præter serum quod inerat animadversa est cerebri substantia tota majorem in modum laxa.

11. Nimis & multa, & gravia præter ea quæ manife- sta erant, latebant in hoc corpore, quæ naturæ, & arti ob- starent

(n) Consil. Medic. a Scholz. edit. 232. (o) Theat. Med. Pract. l. 1. s. 40. in fin. (p) De Medic. l. 4. c. 24. (q) Nat. Hist. l. 28. c. 9. (r) l. 2. Conf. 3. Annot. 4. (s) Prax. art. 8. supra ad n. 5. cit. (t) Saggio delle Transf. &c. Tom. 4. (u) Dissert. de Hydrarg. n. 51. & 129. & in fin. (v) Aphor. de cogn. & curand. morb. 1880. (x) Saggio delle Transf. &c. Tom. 4. (y) l. de Afino s. 4. c. 3. s. 12. (z) Dioscorid. de Med. Mat. c. 168. (a) Scribon. Camp. Medic. 160. Samonic. de Medic. c. 42. Marcell. de Medicam. c. 36. (b) c. 2. Inpra ad n. 3. cit. (c) c. 24. supra ad n. 3. cit. (d) supra n. 3.

(e) Eph. N. C. Cent. 5. Obs. 8. (f) Eardn. Cent. 8. Obs. 6. (g) Epist. 13. n. 24. (h) A. 1741. Hebd. 25. n. 1. proprius fin. (i) Comment. de Bonon. Sc. Inst. Tom. 1. in Opus. de Cort. Peruv. haud ita procul a fin. (k) Epist. 25. n. 40. & Epist. 30. n. 2. (l) in Cons. n. 1. apud Mirrell. (m) Litotomia.

flarent in arthritica materia ad articulos revocanda. Laxius enim cerebrum præcedentes quidem capitis, & auditus gravitas, & ad somnum proclivitas indicabant. Sed laxum adeo factum putares ut suo præcipuo muneri ineptum fere jam esset, aptissimum vero excipiendæ arthritici feri copiam, unde externæ, internæque illæ convulsiones, quibus præcordiorum angustia, & summa illæsis alioquin pulmonibus (intra quos nec Joerdensius (u) in casu haud absimili quidquam adnotavit morbosum) spirandi angustia debebatur. Magna autem arteria tum æquo latior, tum præduris tunicis, ut illi quoque ramis, instructa, qua vi poterat in superiores, inferioresque artus peccantem materiam impellere? Sane multo aptior erat ad sanguinis motum subinde remorandum, unde & deliqua, & novissimus ille insultus, & pulsuum intermissio repetenda, præsertim cum infirmæ essent cordis vires, ut pulsuum imbecillitas ostendebat, nec sine causa, quippe cum illæ ab ejusmodi cerebro conservari non possent. Huc illud accedebat, quod cum imbecillum cor, curaque arteriæ vel optimo, & vivido sanguini circumagendo minime par robur haberent; erat illis circumagendus effectus sanguis, & impurus, qualem hunc fuisse comonstrant præter vitam, novissime sine corporis agitante exercitatione ductam, tot illa quæ præter naturam in ventre deprehenderunt. Nam primum ventriculus adeo laxus, tunicis adeo extenuatis probe conficere alimenta non poterat. Tum deinde nec intestina poterant chylum perficere, in quæ nulla jam bilis e cystis influeret, a tempore autem longo nec bona, & pauca influxisset, quorum illud non parvus felleus calculus, hoc autem cystis parvitas, & diuturna alvi adstrictio significant: quæ ipsa adstrictio repurgando illa ex parte sanguini quam adversaretur, intelligis. Denique purgatio, qua si ullus, sanguis certe ejusmodi maxime indigebat, cum per cutem potissimum, & per renes fiat; per cutem hic, quiescente corpore, minus fiebat; per renes autem gravatos adeo, & ex parte callosos quis satis bene esse factam, putet? Nec me fugit, qui rei causam quandam alibi (o) memoraverim, & in obelis præsertim confirmaverim; nec me, inquam, fugit, ut sæpe renum calculi cum arthritide conjungantur; imo ob hos quoque arthriticorum sanguinem minus expurgari, & sic arthritidis materiam augeri. Neque tamen hinc inferas, velim, in iis omnibus hanc minus posse ad articulos propelli, aut si forte ab his intro cesserit, non posse ad articulos revocari. Quin memini, Senatori illi Bononiensi de quo supra (p) indicatum est, calculis quoque renum, præter arthritidem, exercito, cum forte ab hac genua, & manus intumescerent, repente autem mox tumor, & dolor sine manifesta causa pene ex toto evanescerent, & terreret omnes insequens spirandi difficultas; memini, inquam, per eadem tamen quibus hic nos frustra uli sumus, peccantem materiam ab Albertino fuisse ad articulos revocantem. Scilicet neque ætas eadem, neque moror, neque cerebri, neque Magnæ arteriæ vitia illic erant; & quamquam calculi qui subinde exercebantur, non deerant; non erant tamen cum his quibus loquimur, comparandi.

12. Nam primum corallii formam hi referebant. Quod attendendum a te est non tam ut mireris, quam ut eorum causam, effectumque cognoscas. Leges enim in Sepulchreto, esse deprehensos in rene calculos qui muris imaginem (q), nedum qui corallii (r) repræsentarent. Eustachius autem qui primam fere omnium coralliformis calculi Observationem proposuit, satis ejusmodi figuræ causam indicavit (s). Secundum quam Piccolhomini (t) postea muris quoque formam in calculo explicavit ab se descripto. Cujus historiam si ex ipso Auctore in Sepulchreto fuisse relata; lectores post quæ symptomata repertus esset, non ignorarent. Igitur ut calculorum materia in pelvi, initioque ureteris subsistit; sic in eam figuram conformatur quæ corpus, & caput muris, aut quæ caudicem corallii refert: ut vero simul in tubulis qui in pelvim conflunt, ita caudam muris, & tibias, aut ramos corallii repræsentat. Obfessis autem ab ejusmodi calculo plerisque, aut omnibus quas nominavimus, urinæ viis, compressisque minimis artibus instrumentis per quæ ipsa a sanguine separatur, sane intelligis, ut ejus secretio, atque excretio minui debeant, aut hæc etiam omnino intercepti, & nisi ab natura, aut ab arte, aut ab utraque feratur auxilium, incipere hydrops fieri, aut magna alia oriri noxa. Vides igitur,

unde nasci hydrops cœpisset in proposito Eminentiſſimo Viro, cum ars remediis prævalido lotum urgens, partim obfessas vias nonnihil expedit, partim vero, idque potissimum, necdum obfessas præter modum dilatavit, ut urina, & tum copiose, & postea sic satis efflueret, adjuvante natura quæ materiam, novos ramos calculis addituram, sæpius deinde, & majori copia ad articulos amandavit. Sed ut tubuli aliquot & patuli, & latiores servati sint; plures tamen inutiles omnino restabant calculorum ramis plenis, atque impediti; & quod magis attendendum est, inutilis quoque restabat proxime ipsis circumjecta renum substantia, dura cum ipsis, & callosa ab assidua compressione reddita. Quæ res efficiebat, ut ne a maxima quidem corporis concussione molestia ulla perciperetur in renibus, præsertim cum archissima tubulorum ad ramos calculorum adhæſio ne hi agitantur, præstaret, ut in aliis præstittis ex Sepulchreto (u) cognoscas, cum magni lapides, corallii similes, clavi infra impaſſi, & immobiles renibus inhærent. Verum tot partibus substantiæ renum callosis factis, eoque inutilibus, num horum viscerum munus detrimenti nihil cepisset, existimabimus? Erant præterea hi calculi & plures, & magni, ut reliquam non induratum renum substantiam partim prægravari, partim distrahi necesse esset. Prægravata autem, & distracta non poterat sane suo officio perfecte fungi in particulis quas alias solet, inutilibus, & noxiis a sanguine separandis. Denique erant hi calculi in renibus ejus corporis in cuius fellea cysti alter continebatur, & quod consequitur, in eo corpore quod egebat magis separatione illarum particularum, velut supra (x) indicatum est. Nec sum quidem nescius, facile posse in iisdem corporibus quæ obnoxia sunt renum calculis, felleæ quoque cystis calculos produci; imo id alia olim Epistola (y) fassus sum, quæ repertos in Cardinali hoc Amplissimo commemoravi, nec mihi proclivius quidquam est quam non paucas proferre eorum Observationes qui utroque simul in loco deprehenderint. Nam præter tot alias quas invenies a me tibi alibi (z) commemoratas, & præter insignem illam quæ a Ch. Pohllo (a) indicatur, & Sepulchreto addi posset, in Sepulchreto ipso sex memini legisse, easque omnes libro III. (b): quas inter Grembii una est, hoc etiam cum propoſita hic a nobis conveniens, quod intra vesiculam nihil fellei repertum est. Sed horum nemo, quod sciam, arthritide vexabatur, & si qui vexatus etiam esset, non tot alias tamen, neque tam graves vasorum, & viscerum habebat læſiones.

13. Sunt alia etiam vitia quæ aliquando in articulis se ostendunt, velut id quod in muliere conspexi, cujus diffectio non una de causa digna est quæ hic tibi describatur.

14. ANUS, complurium liberorum parens, ante menses circiter tres apoplexia correpta fuerat. Hanc resolutione exceperat artus utriusque dexteri sic tamen, ut salva sentiendi facultate, moveri nonnihil possent. Novissime autem cum quidam accessisset quali sopor, minorque ad loquendum promptitudo, in Nosocomium illata, ibi sensim, e vita exceſſerat post initium Decembris A. 1746. De multis quæ pluribus diebus secundo, in ejus corpore animadverti, hæc sunt potissimum quæ huc attinent. IN VENTRE uterus adeo brevi longitudine, ut vel exterius ab osculo ad summum fundum vix duos transversos æquaret digitos. Sed erat totus in se contractus, & conglobatus, ut parvulæ pilæ referret speciem nonnihil a fronte, & a tergo depreſſæ, partibus proportionem craſſioribus: quorum substantiam, cum fecarem, lividam conspexi, nec sanam judicavi. Alterius tubæ majus extremum non modo impervium erat, sed cum testiculo proſus connatum, qui, ut compar, durus, & superficie quodammodo tessellata. In Thorace, grandes cor habuit polypofas concrectiones. In Calvariæ integumentis qua tempus sinistram operiebant, magna exterius, interiusque apparuit fugillatio; tametsi nulla capitis allisio aut percussio, quantum perquirendo sciri potuit, nuper præceſſerat mortem, aut hanc erat mox subſecuta. In toto cerebri hemisphærio sinistro contra ac hemiplexia indicaverat, nihil quidquam vitii offendimus. In dextero autem primum animadverti vasa quæ per Tenuem meningem feruntur, præsertim qua capitis vertici respondebant, sanguine turgidiora: per eandemque meningem transpiri quasi

quasi aquam cum acris particulis mistam; quæ revera suberat, sed adeo pauca, ut ea meninx non facile sequeretur trahentis digitos. Deinde vero singulare, nec leve, offendi ipsius substantiæ cerebri vitium, idque circa verticem ad trium, aut quatuor digitorum spatium secundum capitis longitudinem, & ad totidem secundum latitudinem ubi quidem vitium erat latissimum; nam erat alicubi multo angustius. Incipiebat autem a suprema illa hemisphærii ora qua sinistro propius est, indeque in latitudinem se extendebat. A superficie cerebri quam tenebat, introrsum plus digito non descendebat. Tota igitur quæ designata est, sede utraque cerebri substantia colore erat sanguineo fusco obſoleto, mollitie autem non minori, quam si diu, multumque crebris gravis cultri ictibus concisa fuisset, ac subacta, ut propemodum diffuere. Neutiquam tamen ferebat. Reliquum autem cerebrum, nisi quod si cum cerebello, & Oblongata medulla conferres, laxius erat; nihil diligentius quærenti obſult quod secundum naturam non esset; ut ne in ventriculis quidem effusum serum deprehenderim, etſi Piruitariam glandulam valde contractam, & subsidentem animadverti. In Genu denique sinistro, ad interiora vincula, cartilagineæ, & glandulas frequentissimas, qui & superiora omnia viderant, Spectatoribus demonstranda, incisio cum mucilaginis nihil quidquam conspicerem; attentius inspicere cepi omnia, quæ tamen sic satis erant lubrica, vidique cartilagineam rotulæ crustam qua parte externo femoris condylo respondebat, quasi attritam, & levibus parallelis fulculis haud aliter exaratum, quam si quis scalpri aciem, ab summo ad imum sæpius ducendo, appressisset: crustam autem condyli quem modo dicebam, quæ eidem rotulæ parti obvertebatur, adeo extenuatam, ut lividula, ob transpectum per ipsam os, appareret. Præ his autem multo observatione digniores globuli plurimi occurrebant, quorum maximi quinque pares erant ferme omnes mediocribus ovarum acinis, reliqui, plures viginti, alii aliquot, alii multo illis minores. Alibi erant omnes, & lævi superficie, omnesque inter se disjuncti, intra articuli cavum prominebant, exigua sui parte adherentes, imo continuati, minores quidem Capsulari ligamento circa hujus latera inferiora se ut aliqua in oblongam seriem disponentur, majores autem cartilagineæ crustæ, seu potius fimbriæ glandulæ alicujus mucilaginosæ, cartilagineam crustam arte operientis in recessibus quibusdam offum ad cavum articuli pertinentium. Alii autem omnino erant offei, alii sub cartilagineo cortice offeum nucleum continebant. Cum in altero quoque genu vellem quærere, si forte inessent, meliusque originem ostenderent suam; ægre tuli, jam cum plerisque aliis partibus fuisse humanum.

15. Cæterum unde unde extiterint; illud certum est, five ex mucilaginosæ excreverant glandulis, secretionem mucilaginis imminuendo, nocere articulo potuisse; five aliunde erant, si hæcenus haud multum nocuerant (neque enim id scire pro certo licuit) plurimum, augescendo, fuisse nocituros. Quin si quis forte diceret, ex iis offeis globulis minimum quæpiam, genu se agitante, e sua avulsam sede, atque inter condylum, & rotulam interjectum, utriusque cartilagini ea vitia attulisse quæ indicata sunt; non is loqueretur a veri similitudine omnino abhorrentia: quamquam memini, cum inſequenti anno ibidem nescio cujus hominis genu perlustrarem, crustam ejusdem condyli cartilagineam eadem illa parte qua rotulam tangit, nonnihil quasi corroſam invenisse non majori spatio quam quod unguis digiti minimi operire potuiſſet, exiguisque aliis in ea vicinia spariolis; tametsi nec in rotula quidquam vitii, neque alibi in toto articulo appareret; nedum globuli extarent nulli. Quorum descriptionem eo minus cenſui prætermittendam, quod iſtiſmodi in genu morbi qui mentionem fecerit, neminem vider legiſſe (c). In alio tamen articulo sic satis similis, cum hæc recensere, prodiit Observatio Illustris Halleri (d). Scilicet in deſcepta muliere, cujus arteriæ plures, & aliquæ cordis valvulæ offeis squamis, aut harum inchoamentis non carebant, dum inferioris maxillæ cum offibus temporum articulos introſpiceret, horum alterum animadvertit nudatum crusta cartilaginea, & mensuram pene dimidium consummum & perforatum. Crustam quam vitius deleverat, idem vitius in globulos fere viginti mutaverat, semioſſeos, &

in capsula carnea libere collectos. In altero articulo mirum hoc spectaculum non erat, sed omnia secundum naturam. Plura, si plura addidiſſet, describerem tibi, ut omnia cum mea poſſes Observatione conferre. Verum nec ipsi pro certo reſciſcere licuit, ut videtur, quid inde; quantumve incommodi cepiſſet femina. Sed neque ita multos legi qui id genus memoraverint corruptionis substantiæ cerebri, quod ut ferme in paucis aliis (e), ſic in propoſita Anu deprehendi. Porro nec ita frequens est reſolutio in eo corporis latere quod ſubjectum; non adverſum; ſit cerebri læſioni. Itaque hanc ad paucas illas addere poteris Observationes quas alibi (f) inter oppoſitas longe plurimas, quaſi exceptionum quarundam loco, indicavi: niſi forte læſionem hic dicas aut non repentinam, aut nimis ab iis cerebri partibus fuiſſe remotam, nempe ventriculis, & qua in his ſunt, protuberantiis, quibus potissimum paribus repente læſis, hemiplexia ſolet in adverſo latere obſervari. Quæ tamen an dici poſſint de Observatione illa quam a Medico Neapolitano Curtio propoſitam alias (g) indicaviſſus, forteſſe non ita facile eſt conſtituere. Dexter enim lateri ob apoplexiæ reſolutio, haud ita diſſimilem ejus de qua modo loquebamur, ſubſtantia cerebri corruptionem, non in ſiniſtra vidit reſpondere, ſed in dextero hemisphærio, eoque toto, ut vel meninges in mucosam eſſent ſubſtantiam converſæ: quamquam cum de Oblongata medullæ cruribus quæ in protuberantias illas excreſcunt, nihil ajat, dubitandi locus aliquis ſupereſſe videri poſſit.

16. Arthritis de qua præcipue his Litteris ſcriptum eſt, & Rheumatismi tanta in multis quidem eſt ſimilitudo, ut Medici hunc ab illa ſero diſtinxerint; quamquam non adeo ſero, ut circa medium ſuperioris ſæculi id primum fecerint, quod ajunt aliqui Ballonii (h) obſiti. Rheumatismi autem nulla peculiaris in Sepulchreto mentio ſit, nec eo quidem loco ubi maxime conveniſſet, nempe ſub ſinem XI. Sectionis libri hujus IV. quæ ea pertinet ad Dolores Externarum Partium. Nec miror tamen, cum vix meminerim in aliam rheumatici diſſectionem incidiſſe quam in illam ex Drelincurtio auditam, & in Osteologia ſua (i) ab Haverſio memoratam, qua diſſectione Drelincurtiſ inveniſſe gelatinam concretam in ſuperficie muſculorum, duos aut tres Ducatos denſitate adequantem. Quæ Obſervatio ad eam addi poterat Sectionis quam dixi, Sepulchreti particulam, quæ & perbrevis eſt, & in parte conſtat ex productis alibi hiſtoriis, imo & in quandam deſinit, una illa eademque pagina jam propoſitam (k). Ego qui ſpēſtantiam ad cæteras Sectionis ejusdem partes alibi tractavi, ne hanc ultimam proſus omiſſiſſe particulam vider, Obſervationes huc adiciam duas Mediaviæ noſtræ, quarum prima ad Externarum Partium Dolores attinet; altera, niſi diſſectio verum detexiſſet, ad eandem attinuſſe videretur.

17. JUVENIS aurificis lumbum dexterum cruciaverat dolor nulli remedio cedens. Anno ſic exacto, finiſtrum quoque lumbum jam cœperat dolor invadere, nec dolores in cervicibus deerant, qui videbantur rheumatici; cum acceſſit crura movendi impotentia, hydrops tympanites, & mors denique circa medium Aprilis A. 1753. CADAVERIS eas tantum exteriores partes incidere permiſſum eſt quæ ſedes fuerant perſtinaciſſimi lumborum cruciatus. Itaque ab ipsis detracta cute, & Adipoſa membrana, in cujus cellulis aliquid aquæ conſpicietur, ſublatoque amplo illo tendine unde oritur Latiffimus dorſi muſculus, neutroque in latere ulla in eo tendine adnotata labe, cum ad craſſum illud carneum corpus ventum eſt quod commune initium præbet Sacrolumbo, & Longiſſimo dorſi muſculis, ecce in eo corpore inſolitus apparet color, qualem in vetuſtis ex nucis arbore conſtructis armariis videmus, nec tamen in toto eo corpore, ſed ad ſpatium dumtaxat quinque circiter tranſverſorum digitorum ſecundum longitudinem pariter & latitudinem: idque a ſuperficie introrſum adeo pertinebat, ut in ſubjectis quoque muſculis Sacro, & Quadrato lumborum ſpectaretur. Erant autem fibræ toto eo quod indicaviſſus, ſpatio mirum in modum laxæ, & cedentes, crebrisque interjectis ſanguineis grumulis diſjunctæ. Et hæc quæ diximus, vitia omnia eo apparebant magis, quo muſculi erant Spinæ propiores: ſed extra illud in lumbis ſpatium nec color, nec quidquam aliud quod præter naturam eſſet, in muſculis eſt animadverſum. Quin gravior odor ne ibi quidem erat, ubi illa erant vitia.

Quæ

(c) Aſt. N. C. Tom. 4. Append. n. 5. in fine §. 5. (d) Epist. 40. n. 3. & 5. (e) p. n. 8. in fin. (f) l. 1. §. 12. Obſ. 26. §. 6. (g) Ibid. Obſ. 21. §. 4. & ſeq. & §. 25. Obſ. 20. & §. 28. Obſ. 26. (h) Ibid. §. 4. cit. (i) l. 2. Anat. Prælect. 23. (j) cit. Obſ. 20. & 26. (k) n. 11. (l) Epist. Anat. 1. n. 48. (m) Epist. 37. n. 43. (n) Differ. de Proſt. calcul. affect. §. 7. (o) S. 22. Obſ. 17. §. 23. Obſ. 4. §. 10; S. 24. Obſ. 2. §. 12; Obſ. 6. §. 4. Obſ. 10. ſecunda §. 4; & S. 25. Obſ. 9. §. 5.

(c) Vid. Epist. 69. n. 13. (d) Progr. de indur. corp. hum. partib. §. 5. (e) Epist. 5. n. 6. & Epist. 9. n. 16. 18. (f) Epist. Anat. 13. n. 25. (g) Epist. 9. n. 19. (h) Vid. ejus librum de Rheumatismo, & Quell. Medic. illi adjectam. (i) Diſc. 4. ubi de Rheumatismo. (k) Obſ. 7. §. 11. & 7.

Quæ in utroque lumbis omnia deprehensa sunt: sed in sinistro multo leviora.

18. Hic te duo ex me querere posse, video, alterum, unde illa esset movendi crura impotentia? alterum, unde in cervicibus dolores? Et horum quidem causam non difficile conicies, si mearum, quas in sequentibus etiam annis confirmavi, Observationum (1) memor, Longissimos quorum initia vitata hic erant, musculos a dorso per cervicem in omnibus in quibus id quævisi, perrexisse, non ignoraveris. Impotentiam autem illam inde fortasse natam esse suspicari nihil verat, quod vitia in Quadratis etiam lumborum musculis, eoque graviora, quo propius vertebrae, animadvertita, pervenire demum potuerint ad eos nervos ex quibus Crurales coalescunt, nedum ad musculos ipsos Psoas, ut vitia illa ab exterioribus ad interiora pergebant: neque enim ab interioribus ad exteriora processisse, illud, etsi ventrem introspicere non licuit, indicio est, quod nullæ de renibus querelæ, nullaque horum læsionis signa memorabantur, nec crura, incipiente, sed diu progressa jam morbo, sunt infirmata.

19. Nunc alteram accipe Observationem, quæ contra, cum ad Externos Dolores videretur spectare, re tamen vera ad interiora spectare inventa est, eoque dignior est quæ minime prætermittatur.

20. MONACHUS Patavinus, annos natus minimum septuaginta, post febrem quandam, frigore stipatam, la-

borare cœperat doloribus, quos a defluxionibus, ut vocant, esse, credebatur. Hi musculi qui circa os alterum Innominatum, & paulo supra antierius sunt, & qui per subiectum femur extenduntur, insidere videbantur, nunc molestiores, alias minus, ut incedere non prohiberent. Quos dolores cum duos tresve annos pertulisset, tandem iis ingravescens, confectus est circa medium Quindilem A. 1737. apparente pridie quam obiret, ad inguen lateris illius tumore in quo fluctuans materia percipiebatur. ABDOMINE illico inciso, ut unde materia illa extitisset, inquireretur, præter omnem opinionem ingens vis puris inter peritonæum, & os Innominatum, ibi iis obiectum quos mox nominabo, musculis, reperta est.

21. Observationem hanc tanto magis a Medicis esse attendendam, censebis, quanto facilius possunt per speciem defluxionum imponere morbi interni, & in abscessu ejusmodi degenerare, & quanto fortasse crebrius quam opinantur, sub ejusmodi larva iidem morbi deliteant. Hoc certe unus Chirurgus ter vidit, nempe Cl. Benevolus (m), qui pariter a Quercio idem conspectum esse, addit, sciteque explicat, cujus generis tumores musculis additi quos Psoas, aut quos Iliacos Internos vocamus, tum causa esse possint contractionum quæ semioribus molestæ sint, tum denique suppurati pus queant in summa femora demittere. Sed hæc apud ipsum fulius videbis. Interea Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LVIII.

Agitur de Lue Venerea.

EPISTOLIS hæcenus ad te missis Observationes bene multas communicavi quæ ad Veneream attinent Lueni. Itaque non est cur mireris, si vix aliquam superesse, dixeris, quam his Litteris describam. Verum si Litteras illas inspicias quas protinus indicabo, satis esse tibi factum, videbis, cum, aliorum morborum occasione, qui aut ab hoc erant, aut cum hoc conjungebantur, me non omisisse ejus mentionem, aut siquæ intus ab eo esse viderentur læsiones, neque has fuisse prætermittas, comperies.

2. Namque Epistola ipsa I. (a) cum de atrocibus capitis doloribus verba facerem, quid vitii esset in meningibus, cerebro, & cerebello, proposui: & quid in cerebro, & cranio, cum scriberem Epistola IX. (b) de epilepsia. In Epistolis autem XLII. (c) & XLIV. (d) læsiones occurrunt aut in epiglottide tantum, aut in aliis etiam laryngis cartilaginibus, arteriaque Aspera adnotata: in iisdemque Epistolis (e) (f) noxæ intimæ arteriæ Magnæ: ut minus, iis positis mirandum sit Epistola XVIII. (g) dilatari ipsam in aneurysma, aut Epistolis XL. (h) XXVII. (i) & LIII. (k) aneurysma insuper, aut ipsam disrumpi potuisse. Purulentum pulmonem Epistola ostendit XVIII. (l) præsertim vero XXII. (m) Purulentos autem, aliterve læsos renes, aliaque urinarias partes Epistolæ IV. (n) XLII. (o) XLIV. (p) & XLVIII. (q) Porro in utero excrecentiam Epistola exhibet XLVII. (r) eademque cicatricem in vagina infima prope urethram. Virilis autem urethræ insolitum madorem, & ruborem Epistola XLIV. (f) eademque (t) & XLII. (u) angustam urethram quibusdam locis, atque contractam: duæque hæc Epistolæ (x) (y) & IV. (z) & XL. (a) urethræ excrecentias, aut excrecentiarum reliquias. Epistolæ autem; ut LII. (b) omittam; VIII. (c) XXVII. (d) XLII. (e) & XLIV. (f) majores illos canaliculos aut omnes, aut ex parte deletos, & denique Epistola hæc ultima aut alia urethræ læsionum vestigia (g) aut ipsam qua cingitur Littrei glandula, inflammata (h), aut Cowperi alteram glandulam indurata (i), aut strigosam (k) aut ductum utriusque oscula non recte se habentia (l), aut obcæcata illorum oscula qui semen invehunt (m), aut Seminales tandem vesiculas strigosas, & exsuccas (n).

3. Nec vero horum quæ dixi, vitiorum Observationes tantummodo ad te misi, verum etiam iis præsertim duabus quas modo sæpius memorabam, Epistolis

XLII. & XLIV. fufius quædam perferutus sum quæ Lueni Veneream comitantur, aut subsequuntur, gonorrhœam videlicet, & urethræ quas appellant carunculas. De his enim quid alii senserint, aut viderint, & quid mihi videre contigerit in illa XLII. Epistola (o) non omisi. De gonorrhœa autem cum Epistola sit tota XLIV; quid de singulis illius sedibus, cæteris, mihi que conspectum fuerit, ordine proposui, nec quædam alia quæ ad ipsam attinerent, prætermisi. Nihil igitur eorum repetere volenti reliquum est, ut tres, aut quatuor, quæ forte supersunt, Observationes hic proferam ad Lueni illam spectantes. Quarum duæ primæ sunt ex Valsalva.

4. MULIERI quæ annum exegerat quinquagesimum, dolor obortus est ad maxillam inferiorem, cum multi interdum sanguinis fluxu adeo ut candenti ferro admoto hunc compescere cogitaret, ni per se tandem desisset. Brevi post tempore dolores ad ossa vexare mulierem cœperunt: quos cum diu pertulisset, incepit, quotiescunque movebatur, queri, omnia sibi ossa frangi; & sane qui aderant, tunc crepitum ad articulos audiebant. Ad hæc illud postea accessit, ut inferiorum artuum ossa flecti cœperint, quasi essent cæca, & ad levem etiam motum dolere. MORTUÆ demum inventa sunt ossa Innominata, femoris, tibiarum, & quæ cranii fornicem efficiunt, non secus ac si ex crassiore papero essent, flexibilia: superficie autem spongiosa erant; ad medullarium vero quibusdam locis cariola.

5. Unde sanguis ille multus proflueret, cujus initio historiæ sit mentio, Valsalva scribere prætermisit. Accepi autem ego ab iis qui cum ipso olim mulierem & viventem, & mortuam viderant, abscissum huic fuisse ad alterum colli latus, ut ex illo fluxisset, conjiçiam. Addiderunt iidem, alia quoque ossa quædam, in quibus & costæ nonnullæ, & pedum ossa flexilia in mortua fuisset, & tanquam cartilagineas, cultum admisisse: quæcunque autem ossa flectentibus, aut comprimentibus cederent, ea, dum hæc fierent, humorem quandam, diluti, instar sanguinis, emisisse. Vidi postea & ego illa ossa, nam Valsalva asservaverat, oblonga quidem in arcus modum curvata, ex iis autem quæ fecerant cranii fornicem in planum depresso, fædo omnia, etiam quia intus purgari non potuerant colore, & odore, & contractantur manus ungentia. Sed cum a longo jam tempore asservata essent; nonnulla quæ in recentibus atque adeo in cadavere ipso quævissem, videre non potui: quæ inter illud

illud fuisset, quomodo eorum capita in articulis se haberent, id est minus, an magis essent mucilagine innuncta, ob crepitum illum videlicet qui ad articulos, cum hos ægra moveret, ab assidentibus exaudiebatur; multo autem magis, quomodo se haberent genitales partes in femina quam lue venerea infectam adeo fuisse, dicebant, ut inde vitium hoc tantum ossium extitisse, non dubitarent.

6. Vetusissima supplerent mollium factorum humanorum ossium exempla, si quod Sachusius (p) videtur cum Petro a Castro existimare, hunc morbum Arabibus vocatum esse *Alachad* & *Alzemenia*, & curatum ab *Avicenna*, constaret; ut constat ex Andrea Bellunenſis, quæ cum Avicenna edita est, latina arabicorum nominum adaucta interpretatione (q), *alzemenia*, vel *zemenia* esse quando æger propter mollificationem, seu *paralysim pedum*, aut manuum impeditur a motu illorum membrorum; ut inscriptio illa Observationis Petri a Castro de membrorum & ossium mollificatione, membrorum quidem resolutioni, sive, ut Avicenna Interpretes loquuntur, *mollificationi* (r); non ossium; convenire videatur. Satis tamen antiqua exempla sunt quæ olim Fernelius (s), & quem ipse laudat, Ruellius litteris mandarunt, felicitetiam addita per balneæ aluminofas curatione, quam ex Sachusio (t) intelligis alios quoque esse secutos. Sed quam sic emolliorum ossium structura, naturæ per anatomem reperta esset, ut illis ex casibus, quippe restituta similitudine, scire non licuit, sic neque ex aliis qui enumerari solent, ut puta ab Jacobo Hollerio (u), a Guiljelmo Fabricio Hildano (x), a Petro Borello (y), a Thoma Bartholino (z), ab Daniele Prottenio (a) memoratis, id, uti sperabam, didici. Quin illa etiam mitto quæ ad peculiarem potius certi alicujus ossis labem, quam ad eam spectant quæ sit plerisque simul communis, in illisque pono quod ex nominato Bartholino in Ephemerides relatum est Casarea N. C. Academiæ (b). Itaque ad eos descendens qui memoria nostra floruerunt, primum ex Italis Gabrielium (c) inveniri, qui superioris sæculi anno, haud ferius, duodecimo (Gagliardus (d) enim anno insequenti eandem Observationem præfatus describens, secum *nuperime communicatam* esse, dixit) eo igitur circiter anno Matronæ ossa dissecans, quorum nulla pristina duritiem retinuerant, oblongiora autem fere omnia facta erant in omnem partem flexilia, hæc deprehendit in carnem non fibrosam quidem, sed rubicundam, conversâ. Post hanc, non abfimilem in femina altera legi Observationem Courtialis (e); imo, ut ossa omnia, dentibus exceptis, quos Gabrielius non memoravit, ei flecti poterant, ita omnia fungosas, mollesque carnes, sanguinolento fero imbutas, referebant. Quamquam autem non alterius generis esse, video, Observationes quasdam Chirurgi celeberrimi Petiti (f), quippe quæ ossa mutata exhibent in substantiam carni similem, salvis, quod ipse adnotavit proximis, aut interjectis cartilaginibus, sic ut ad memoriam mihi redegerint crassa illa cartilaginea ligamenta, quæ interposita vertebrarum corporibus, cum hæc aliter ab aneurysmate vitata essent, ipsa quidem illæ deprehendi (g); tamen cum Petiti illæ Observationes cum morbum nunquam in pluribus simul Partibus, semper autem cum tumore conjunctum proferant, a me quidem nequeunt ad eam quæ de loquimur, speciem referri. Sed neque alia plures, ut puta quæ ex Maucharto (h) est in summis ossis femoris partibus amplificatis, & adeo mollibus, ut scalpelli manubrio, imo digitis cederent, & pressæ, cruentam quandam medullam emitterent ejus similem quæ in minutis est ossium cellulis, aut quæ bis edita est ex Nebelio (i) in multo majori ejusdem ossis parte, in amplam massam albicantem, spongiosamque conversa, nisi quod minimæ, & quamplurimæ lamellæ intra hanc divisæ supererant, & medullarium systema semilacerum & exinanitum, completente omnia membrana alba, duriuscula, imo fere cartilaginea, quæ periosium credita est. Cujusmodi membranam ab Alexandro Camerario (k) quoque conspectam videbis, tumores cingentem, sub quibus in rhachitico pueri ossium humeri, & femoris certæ partes sic absumptæ fuerant, ut in materiam abierint fluidam, minime fec-

tidam, albam, grumoso lacti non abfimilem, quem propterea morbum *albam ossium* cariem ipse nominabat. Si Platneri Dissertationem habes quæ inscripta est *de Thoracibus*; videre poteris, num forte, & quatenus, huc attineant illa quæ de ea Dissertatione in Act. Eruditorum (l) legi: *ossa in etate provecioribus aliquando præter naturam ita molliori, & cerea ac fragilia fieri, ut, quasi liquata, diffuant; quod propria quidem experientia, in ossæ dextro innominato viri cujusdam compertum est*. Denique, ut a diffluentibus ad fissilia ossa redeam, Ill. Halleri (m) Observatio extat in fibula, quæ periosio non mutato, carnea omnino, aut molli cartilagini similis, casæ fere solidioris modo scissilis facta erat, tumentisque, intus fæcido ulcere erosa. Quæ omnia etsi non magis quam Petiti Observationes, ob alterutram, aut ob utramque de qua supra dictum est, causam ad propositam attinent; prætermittere tamen nolui, minime dubitans, quin aliquid ex iis quæ in singulis comperta sunt partibus, aliquando possis ad ea quæ in pluribus simul, aut fere omnibus occurrunt, intelligenda transferre. Nunc autem ut ad eam quam hic spectandam suscepimus, morbi speciem referamus supra memoratas Gabrielii, & Courtialis Observationes, ejus quæ ex Valsalva proposita est, in eo quoque consimiles, quod emolliorem ossium dolores toto corpore antecesserant; mirum certe est, post tantam, dum tres illæ mulieres viverent, morbi similitudinem, tantam in mortuorum ossibus dissimilitudinem esse repertam, ut cum in duabus carnem referrent, in una spongiosa quidem, & cariola facta, sed ossa tamen permanerent. Multo autem major dissimilitudo (nisi forte hanc, aliaque ejus similes malis ab nimis progressu morbo repetere) in exemplo illo occurrit quod a Boerhaavio (n) commemoratum est. Nam qui emolliis ossibus, nec sine acerbissimis doloribus, vixerat, mortuus ossa habuit *pulvis similia*, qualis ex ossibus paratur in *Papiniana* machina. Quæ cum ita sint; probe intelligis, siquidem ejusmodi morbi recurrant, cautum esse Medicum oportere in prædicanda ossium constitutione, cum post illos, in quatuor cadaveribus triplex, adeo inter se discrepans, constitutio deprehensa sit.

7. De his autem tribus ista quæ a Valsalva reperta est, ne ad illam quidem constitutionem referri potest, quam interdum, præsertim vero alie Venereæ, Medici animadvertunt, cariem videlicet usque adeo progressam, ut ossa nullo negotio in cadavere, aut quocunque viventis adhuc hominis motu frangerentur: cujusmodi exempla; ne longius te abducam, quæ Blawius (o), alique ediderunt, indicando; habes in Sepulchreti hac IX. Sectione (p), & in V. (q) hujus ipsius libri IV. In proposita enim Valsalvæ muliere ossa erant quidem in superficie spongiosa, & ad medullarium quibusdam tantum locis cariola; sed locis cæteris ad medullarium, & tota parte inter hoc, & superficiem interjecta sine carie erant. Itaque non frangebantur; sed flectebantur, sicque non exelas multo maxima ex parte fibras, sed emolliatas esse, ostendebant. Unde autem hæc emolliatio? Nam si carnea, aut pultacea essent facta; non deessent quos sequeris, Ingeniosissimi Viri, conicientes, in locum ossærum particularum, quas vel in fanis dederit, atque abradi ab ossibus, credunt, novas ejusdem ut par erat, generis non fuisse suffectas, sed longe alias, nunquam in duritiem ossæam coituras. Igitur si tibi quoque lubeat conjecturis indulgere; excogitandus hic humor est, qui in ossa illatus, ipsa possit emollire. Namque extra corpus, id est cum ossa multo rigidiora sunt, non deesse qui id possit, monstravit Ruyschius (r), cum ab liquo in quo costas servaverat, acidioris factæ, illas adeo mollitas fuisse, scripsit, ut funiculi instar contorqueri in spiræ modum potuerint: quod postea, alias in liquore acido macerando, confirmavit; redigere enim potuit (s) in formam litterarum C, & P. In Adversariis autem II. (t) ab diuturna eadem maceratione non costas solum, sed generatim ossa humana molliæ, & flexilia fieri, asseveravit: quin diserte hæc addidit: *an non & inde ratio liquet memorabilis morbi, quo affecta virgo, in Galliis, omnia habuit corporis ossa paucæ ad instar molliæ*? Sed quoniam in suis illis experi-

(1) Advers. Anat. 2. Animad. 15. in fin. (m) Due Relax. Chir. Vid. I. (n) n. 14. (o) n. 23. (p) n. 39. 40.
(d) n. 15. (e) n. 39. (f) n. 3. (g) n. 25. (h) n. 28. (i) n. 7. (j) n. 25. (k) n. 10. 11. 15.
(n) n. 19. (o) n. 2. 40. (p) n. 15. 27. (q) n. 32. (r) n. 28. (s) n. 3. 5. 7. (t) n. 10. (u) n. 39. 40.
(x) n. 7. 10. 28. (y) n. 19. (z) n. 29. (a) n. 30. (b) n. 30. (c) n. 6.
(d) n. 28. (e) n. 39. 40. (f) n. 7. 9. 12. (g) n. 9. 14. (h) n. 25. (i) n. 3. (k) n. 12.
(l) Ibid. (m) n. 7. (n) Ibid. (o) n. 38. & seqq.

(p) in Schol. ad Obs. 37. A. 1. Dec. 1. Eph. N. C. (q) ad vocem *Alachad*. (r) Vid. c. 2. Fem. 2. l. 3. Can. Avicenn.
(s) De abdit. rer. Caus. 1. 2. c. 9. (t) Schol. cit. (u) in adjectis l. 1. de Morb. Int. Paris quibud. n. 7.
(v) Cent. 1. Obs. Chir. 45. & Cent. 6. Obs. 74. (w) in fin. Epilog. additi ad Cent. 4. Hist. & Obs. Med. Phys.
(x) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1700. Obs. 2. (y) in fin. Epilog. additi ad Cent. 4. Hist. & Obs. Med. Phys.
(z) Obs. 37. supra cit. (a) in Act. Med. Hafn. Vol. 3. Obs. 24.
(b) Eph. N. C. Cent. 3. A. 2. Obs. 3. (c) Anat. Off. c. 3. Obs. 3.
(d) Eph. N. C. Cent. 3. A. 2. Obs. 3. (e) Mem. de la même Acad. 4. 1723. (f) Eph. 40. n. 26. & 29.
(g) A. 1751. M. Sept. 2. ex ejus Dissertationum pag. 139. (h) Eph. 15. & Tom. 4. Obs. 111. (i) Tom. eod. 1. Obs. 53.
(j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 7. & 8. Obs. 151. (k) Obs. 1. 5. 13. 14. (l) Obs. 1. 5. 13. 14. (m) Opuscul. Pathol. Obs. 54. (n) Praefect. ad. Instit. 5. 401.
(o) Thef. Max. n. 164. & Thef. Nov. n. 159. (p) Eph. 1. 5. 13. 14. (q) Obs. 1. 5. 13. 14. (r) Thef. Anat. 6. n. 13.

mentis costas memoravit infantum dumtaxat, & hic, eadem respiciens, ossa puerorum; huc illa addere ossa poteris ab Hunauldio ostensa Regia Scientiarum Academia Parisiensis (u), quæ macerata in aceto, sic fuerant emollita: & quia ossa illa quibus ex corporibus accepta fuerint, non apparet, cum his coniungere quæ de duobus eburneis cochlearibus eidem Academia a Cl. Viris Fauchyo, & Geoffroyo relata sunt (x), quorum alterum in lacte diu, & quod consequitur, in lacte acido factum, ex oblivione relictum, flexile, ut corium, inventum est, alterum autem quod parvum erat, & ab Academia ipsa visum, cornu instar flexibile, & pellucidum factum fuerat, cum remansisset longo tempore in emacinate quod *mollarda* vocatur. Hoc etiam; ut ad acetum ipsum redeam; attendas velim, cum per acetum mollita fuissent illa ossa quæ ostendit Hunauldus; macerando in aqua, pristinam duritiem recuperasse, in aceto autem, iterum amississe: ex hisce autem omnibus, & ex eo quod supra (y) commemoratum est de balneis aluminosis quæ firmitudinem amissam viventium hominum ossibus reddiderunt, novum argumentum capias multiplicis, & variæ tum causæ, tum labis per quam ossa flexilia fiant, certe enim si carnea, aut pultacea fuissent, nulli remedio esse potuisset locus. Quod si inter omnes constaret, ossa in rachitidis pueris, cerea esse flexilitate, nec Mayowius, ut in Sepulchreto (z) etiam habes, esse potius firmiora, quam in aliis, contenderet; quædam hic externa remedia quæ ipsis profuisse dicuntur, commemorassem, & cum Hunauldii experimento contulissem. Verum cum ad ossium curvaturas, quæ in pueris illis sunt, explicandas apta quidem, sed non prorsus necessaria mihi videatur cerea ista mollities ossium, quæ satis est, multo minus quam in adultis, sicut illa ætas requirit, esse dura, ut a prævalente musculorum vi, ad unam aliquam ossium faciem attinentium, in eam torqueantur partem, quemadmodum alibi (a) indicatum est, ubi etiam de proposito, explicatoque a Meryo (b) adolescentulæ fœculo locutus sum; idem neque ejus adolescentulæ curvata adeo artuum ossa, & humilem inde etiam ituram, licet similia his acciderint in illis quorum ossa carnea, aut pultacea facta esse, dixi, neque pumilionum, five nanorum ob intorta a rachitide ossa brevitate huc pertinere, existimavi: quanquam non cunctos qui nati sunt, rachiticos esse, scio. Possent enim brevissimo corpore quosdam nasci, & parum crescere, ossibus rectis, membrisque omnibus inter se proportionem respondentibus, si forte dubitas; vel novissimo isto exemplo convinci potes, quod in laudatæ Academiae Historia (c) leges, huiusmodi pueri jam jam quinquennii, neque tamen pollicibus duobus & viginti longioris. Nunc proutquam ad alia transimus; ad eas de quibus supra dictum est, ossium flexilitatis, & fragilitatis causas, juvat has quoque adicere. Dominicus Gagliardus (d) mollia, & quod consequitur, fragilia ossa iis in corporibus fieri, censuit, quibus minus dura obtigeret; neque enim in omnibus eadem esse duritie, sed pro vario ossi succi coagulationis, & consolidationis gradu, aliis magis, aliis minus esse dura: quod ex eo forsitan confirmare potuisset, quod in feminis multo sæpius, quam in maribus, mollia sunt: emolliri autem illud osseum, ut vocabat, gypsum, quippe *alcalicum*, ab acidis quæ in ossium vasa irruant, indeque esse, quod *rheumaticis ac arthriticis cruciatibus, præsertim gallicis*, obnoxii, obnoxii quoque sint ossium emolitioni. Et sic quidem prævit iis qui postea, ut paulo ante dicebam; per acidis liquores emolliri ossa, confirmantur. Et Rheumaticis quidem, atque Arthriticis non semel contigisse ut flexilia ossa fierent, docent Observationes, quibus & illam addes Cl. Targionii (e) in muliere, cui articularium dolorum vehementia humeros, ulnas, & radios in arcus modum contorserat. In iis autem quas Gagliardus nominavit, affectionibus esse humores acidis particulis infectos; id vero cum ab omnibus probari non possit; tu ex illo tantum accipies quantum placuerit, cætera in medio relinques. Porro quod ad ossium fragilitatem spectat, hanc non semper a carie induci, Cl. Lovisius (f) ostendit. Cum enim femina cadaver incidere, quæ levi nisu os humeri, mox femoris quoque frangeret; ossa non cariosa, sed *sicca, & fragilia, medullam itidem siccam, friabilem, a*

pavetibus caritatum ossarium liberatam deprehendit. Et erat quidem ea mulier sexaginta annos nata, sed pinguiori corporis habitu, sana præterea, & vegeta, nisi quod mammarum cancro jam ab aliquo tempore laboraverat. Nunc alteram accipe, quam promissimus, Valsalva historiam.

8. BONONIENSEM Virum dolores ex lue Venerea male habebant, quotidie certa periodo revertentes. Hi ad diaphylum tibiae simul, & ad ejus malleolum, sed ad hunc præsertim, sæviebant, ubi parvus, & submollis tumor oculis, & digitis percipiebatur. Internis externisque auxiliis frustra adhibitis, Valsalva scalpello opem tulit. Nam diductis communibus integumentis, cum luteam *gelatinam* non multam, quæ inter illa & subiectos tendines interposita, tumorem efficiebat, dempsisset; postmodum dolor ad malleolum non rediit. Attamen cum æger, si vicini tendines premerentur quibusdam quali aculeis compungi se, diceret; intellectum est facile, sub ipsis partem aliquam *gelatinæ* illius latere: quæ dum tota dextere, paulatimque ad os usque, salvis tendinibus, detracta, is quoque acicularum sensus evanuit. Restabat præter opinionem dolor ad tibiam; fieri enim per consensum creditus fuerat. Itaque scalpello periotium resectum est, neque prorsus secundum naturam inventum; ut ejus ab osse, sano aliquo, fuerit procuranda separatio. Quo facto, nullo amplius dolore superstitite, facile ad cicatricem perductis vulneribus, incolumis æger dimissus est.

9. Cum hanc mihi Valsalva narraret Observationem; neque enim scriptam reliquit; addidisse memini, alios quoque non dissimiles Venereos tumores simili ratione se feliciter sustulisse sic ut postea neque ipsi, neque dolores redierint. Referebat autem inter gummata, ut appellant, Venerea, minime necessarij rati, ut omnia sub periotio oriantur, aut peculiari tunica comprehendantur. Nihil similis propositæ Observationi, quam alias quoque a nobis commemorata, Fabricii ab Aquapendente (g), nisi quod non ad malleolum, sed ad carpum erat tumor, quotidie statim quibusdam horis acerbos dolores afferens, factus, sicuti scalpello deprehendit, a concreta pauca, ut tunc loquebantur, pituita vitrea, tendines internos contingente. Ejusdemmodi autem materiam designasse, credo, Nicolaum Masam, cum in eorum qui viventes morbo Venereo confecti fuerant, cadaveribus; plura autem securat; scripsit, quemadmodum habes in Sepulchreto (h), *loca dolorosa madentia invenisse materia pituitosa*: quam Fracastorius (i) quoque ubi dolorum ex eadem lue noctu affligentium causam *factis dissectionibus* compertam proposuit, *lentioris cujusdam*, super tendines, musculosque conspecti, vocabulo indicavit: *gummositates autem concreto phlegmate consistisse*, diserte tradidit. Nec refert quod Fabricius tumorem illum quem exsecuit, venereum esse, non dixerit; nam gummata sæpe, non semper, ab ea causa esse, agnoscebat (k). Caterum num duo Anatomici, iidem, quæ Chirurghi præstantissimi Fabricius, & Valsalva ipsi quoque tum forte decepti sint, tendines uterque, hic etiam periotium illis cruciata doloribus fuisse, non dubitantes, malim per te existimes, quam ipse dicere. Gummata autem sedem non semper inter periotium, & os habere; etsi non discedas ab Sepulchreti hac Sectione; facile intelliges non solum ex Rhodio (l) qui in Theatro hoc nostro *tria gummata candida*, recluso cranio, ostendi vidit ab Antonio Molinetto, quæ *inherebant Durae membranae*, verum etiam ex Guarinonio (m) scribente, se *vidisse Gummata dicta in cerebro concreta*. Quam potissimum sedem memoro, quia hæc adscribuntur ad ejusdem Observationem in qua *tria corpuscula tanquam gummata viventia* in viri cerebro conspecta leguntur, qui ex lue de qua loquimur, epilepsia, & convulsionibus obnoxius, denique gravissimo sopore confectus est. Quæ causa, & qui morbi cum in historia pariter legantur, alias (n) ad te percripta; poteris utramque inter se conferre, & quod de parvo & subrotundo illo intra cerebrum abscessu tunc in medio (o) reliquimus, iterum, si vis, perpendere, an videlicet ad gummata pertinerit. Quod dum facies, simul capitis gummata, ut plerumque solent, sub capitis integumentis initium habentia, & cranium, nisi mature propiciatur, exedentia, ut historia eadem ostendit, ad memoriam rediges, quando in

do in Sepulchreto huiusmodi Observationes hic desiderantur, quibus propterea alias augendum esset, in iisque illa quam una cum cadaveris dissectione produxit Cel. Heisterus (p). 10. Propolis quæ supererat, duabus Valsalva Observationibus, toridem, quæ ex meis sunt reliquæ, subijciam, ab illa incipiens, quam potissimum requirit inchoatus de carie sermo, cranium exedente. Ut enim hæc late progrediatur, nisi tempestive occurras, vel sine cadaveris sectione & ipse conspexi, & tu intelliges.

11. VETULA decubebat in Bononiensi Incurabili Nosophorio, cui Venerea caries tantum de sinistro osse scincipitis, & proximo frontis absumperat, ut per foramen digitorum transversorum quoquo versus trium cerebri pateret, liceretque perspicere, ubi arteriam ad carpum tangeres, eodem temporis puncto hanc, & cerebri tumi se se attollere, tum subidere. Quod; ne forte dubites; vidi sæpius anno illo, si recte memini, 1700; neque enim brevi tempore ibi mulier vixit; tamen erodens virus necdum penitus infra cranium esset, neque exulceratio quæ circum oras foraminis exterius erat, cicatricem duceret. Ipsius autem membrana cerebri nitida, & pura conspicebatur.

12. Non me fugit, ad longè amplius spatium, si caries pergat, calvariam absumi, qui; ut alios omittam; Falloppium nostrum (q) legerim scribentem, *aliquando corruptum totum scincipit, & aliquando etiam partem occipitis, & totam interdum calvariam corrumpi, & auferri*. Hoc ego vidi, inquit, primo in mea matertera, quæ a marito accepterat morbum gallicum; & ego ei absuli totam calvariam, & membrana recta est quadam pellicula, & semper percipiebatur motus pulsantis meningis. Additque, se habere & plurima alia exempla & hic, & alibi. In Verula autem illa non erat manifesta pellicula quæ meningibus obtegeret; imo sic res apparebat quasi ubi, Dura detracta, cerebrum Tenui dumtaxat operum aspicimus rubella, nitida, humidaque superficie. Itaque satis mirari non poteram, quomodo humor qui os exedere potuisset, membranam illam nullo modo violasset, nec mulier convulsionem, paralyti, aut alio læsi cerebri, ejusve meningum indicio laboraret: quanquam num antea laborasset, ignoro. Neque minus olim mirabatur Hildanus (r), abfuisse læsæ medullæ Spinalis signa in eo qui hanc *plane denudatam*, & non nisi membrana sua cooperatam habebat, cum tria vertebra thoracis corpora abtulisset caries. Et sane mirabiliora hæc sunt, quam impositos musculos, aut integumenta aliquando ab humore non offendi qui subiecta ossa extra, intusque perdidit, nulla exterius five tumore, five colore prodente se noxa: quæ res incautos amatores misere decipit, sub corporis pulchritudine, nusquam ne leviter quidem deformata, cariem vel gravissimam latere posse, ignorantes: cujusmodi exemplum legere est in primo apud Novesium (s), unde in Sepulchreto, probante etiam Gulielmino (t) referri posset. A carie, sed alterius, ut credibile est, generis os frontis ferme totum consumptum sine ullo exterius conspicuo indicio cum quondam proponeret Benivenius (u), fulminis exemplo usus est, quod aurum illæsis oculis, interdum liquat, aut alia ejusdemmodi facit quæ Benivenii Observationem referens, addit Marcellus Donatus (x). Alii autem malunt similitudine uti aquæ stygiæ, quæ ferrum videlicet rodit, sedum non attingit. Tu vel aliud aliquid comminiscaris oportet, vel hos sequaris. Usus enim erit non in propolis solum casibus, sed in aliis quoque. Sic Fabricius noster (y) in pueri, sic Matthæus Blavius (z) in viro, sic Jo. Jacobus Scheuchzerus (a) in muliere calvariam viderunt non uno in loco ab exedente carie omnino pertusam, Dura tamen meningē illæsa, ut evidens esset, acrem illum, & corrodentem humorem, ut Fabricii verbis utamur, fuisse *contrarium naturæ ossis capitis, nequaquam ejusdem membranae subiectæ*. Quod tamen ne in crani omni carie putes accidere, plures admonere poterunt Observationes, in his Laubii duæ, altera in muliere (b), altera in viro (c), quorum utriusque cranium magna ad spatia ita erat carie absumptum, aut perforatum, ut respondentes non meningum modo, sed & cerebri ipsius partes puri aditum darent ad Lateralem usque ventriculum, dexterum in utroque, tamen in muliere accessit tandem subiecti lateris paralytis, quæ in viro jam diu fuerat, ut plerumque tum solet, a sinistris. De quo discrimine cum satis alibi verba fecerim; tu de discrimine altero, quod huc attinet, videbis, cur videlicet erodens

cariei ichor aliorum quidem meningis vitiet, aliorum vero illas relinquit? num quod in his apertum extrorsum habeat exitum; in illis non habeat? num quia in illis venerea sit virulentia infectus; in his non sit? Sed cum utrilibet explanationi casus non desint qui repugnent, & ut primæ qui a Blawio in viro, ut secundæ qui a me in muliere propolis fuit; sane alias a certa quadam ichoris, aut corporum natura, & dispositione ipse repetas, necesse est. Ego ad meam alteram, qualis ea cunque est, Observationem propero.

13. LANIO annos natus ad quadraginta, Venerea infectus lue, sæpe autem ebrius, factus jam pridem obnoxius fuerat thoracis morbis, ob eosque alias hoc in Nosophorio decubuerat. Novissime in idem reversus, præter acutam febrem, ob quam missus bis sanguis fuit nec primum, nec iterum crusta carens polyposa, tussi confestabatur assidua, quæ ter quaterve singulis horis adeo ingravescerebat, ut ex conatu lividus fieret: purulenta expectorabat; pulsus habebat vibratos. Hæc cum dies perulisset circiter quindecim; postremo viribus sensim intra unum diem magis, magisque decreverant, vivendi finem fecit sub Januarii finem A. 1747. CADAVER; si quidam ex thorace partes excipias; eo tempore perulstrare non potui, quippe in aliis occupatus quæ ad tradendam publice Anatomem ex usu erant. Pulmones fracidi fuerant, & grave olentes. Cor laxum. In una ex arteriæ Magnæ valvulis Arantii corpusculum multo majus, quam æquum esset. Sub eoque in ea facie quæ valvula valvulas spectabat, membranae laminæ ex quibus illa fiebat, ad modicum tractum ita sejunctæ, ut qua hiabant, specillum immittere inter utramque potuerim. Ipse autem proximus arteriæ truncus albidus intus maculis passim distinctus, nec satis lævis, imo nonnihil inæqualis. Mox autem ad curvaturam in aneurysina distensus; ut quæ in illa valvula animadverti, minus, sicut alibi (d) dixi, mirarer.

14. Etsi ob eam quæ modo memorata est, causam non satis potui hanc Observationem perficere; prætermittere tamen nolui, ut coniungere cum aliis possis, initio hujus Epistolæ (e) indicatis, quibus non raro in lue Venerea lædi pulmones, lædi arteriam Magnam, & in aneurysina dilatari, ostendimus. Fortasse renes quoque in viro isto offendimus vitatos. Hæc enim quatuor, pulmo, aorta, & renes cum suis appendicibus sæpius aliquanto occurrerunt nobis labefacta in iis qui lue hac diu graviterque laboraverant, quam ex plerorumque librorum lectione facile existimes. Viscus autem illud quod doctissimi olim Viri præ cæteris læsum atque adeo luis hujus sedem esse, tradiderant, ut ex Sepulchreto (f) vides, non assentientibus tamen aliis, quod indidem (g) cognoscas, jecur dico, mihi unquam in iisdem corporibus vitiatum apparuisse, in præsentia non memini. Nec tamen propterea inficias ivero, quæ rarius, aut nunquam mihi, ea sæpius aliis, & quæ sæpius mihi, ea rarius aliis occurrere potuisse; neque enim aliud hic volo, nisi quæ mihi frequentius invenire contigerit, tibi indicare, probe conficiis, hanc lue, ut sub cuiuscunque morbi larva interdum delitescere, ita quodcumque viscus posse vitari. Quæ autem revera crebrius, quæ minus crebro afficiat, non facile ante statuas, quam multæ multorum Observationes in unum conferantur. Sed mirari subit, cum infecti hoc morbo tot mortui sint, totque moriantur, dissectiones quæ adhuc extant, minime eorum numero respondere. Et certe in hanc Sepulchreti Sectionem relatas videbis non ita multas. Itaque Sectio brevis est, eoque brevior, quod neque tota de Lue Venerea est, sed de Plicæ etiam Polonica, & qua de illa est; magnam partem ex Scholiis constat, quorum aliquod ne suo quidem loco legitur, ut puta quod tertium apponitur ad §. 1. Observationis I. In quo nihil de tumetibus & suppuratis ossibus; cum pertineat, quantum iudico, ad §. 11. tribus ab illo distant paginis: fere omnia autem Scholia a Sylvio sunt, acidam veneni hujus naturam adstruere conante, ex quibus omitti quædam poterant, nonnulla autem pro illis substitui, ut puta cum (b) bubones in glandulis Inguinalibus oriri, conjecit, quia *vasis spermaticis sunt viciniores*. Melius olim qui cum Brasavolo (i) per penem, aiebant, *pravam quandam qualitatem ad emunctoria ascendere, & ad adenosas inguinum partes, ibique bubones excitare*. Etsi enim viam non indicabant quæ in eas glandulas duceret; non eam tamen proponebant quæ non duceret. Quæ possit ducere, indica-

(u) Hist. A. 1742. Obs. de Phys. & c. 7. (x) Ibid. & Hist. A. 1743. Obs. de Phys. & c. 13. (y) n. 6. (z) l. 2. S. 12. in fin. (a) Epist. 27. n. 33. 34. (b) Mem. de l'Acad. R. des Sci. A. 1706. (c) A. 1746. Obs. Anat. 8. (d) Obs. 3. supra ad n. 6. cit. (e) Prima Raccolta d' Osservaz. Med. nella Deteriz. d'un Tumore Follicul. (f) Vil. Ad. Encl. A. 1751. M. Jun. P. 1. ubi de ejus Observationib. (g) De Chirur. Oper. ubi de Arterior. Ul. (h) Sect. hac IX. Obs. 1. §. 1. (i) De Morb. Contag. l. 2. c. 12. (k) l. cit. ubi de Gummatis. (l) Obs. l. §. 9. (m) in Schol. ult. ad Additam. (n) Epist. 99. n. 230. (o) n. 24.

(p) Dissert. de Oss. Tumorib. n. 15. (q) Traité de Ulcer. c. 47. (r) Cent. 5. Obs. Chir. 56. (s) Lettre 6. (t) Réponse 6. (u) De abdit. & Morbor. causis. 18. (v) Medic. Hist. Mirab. l. 5. c. 1. (w) De Chirur. Oper. ubi de Gummatis in fin. (x) Eph. N. C. Dec. 3. A. 7. Obs. 151. (y) Ad. N. C. Tom. 7. Obs. 47. (z) Eph. cit. Cent. 8. Obs. 21. (a) Eand. Cent. 9. Obs. 14. (b) Epist. 27. n. 7. (c) n. 2. (d) Obs. 2. §. 1. 2. 3. (e) Ibid. §. 4. 5. & Obs. 4. (f) Schol. ult. ad §. 4. Obs. 1. (g) l. de Morbo Gall. ubi de Caus.

dicavit denique sex annis ante quam Sepulchretum cum Additamentis, in quibus id fuerat ponendum, prodiret, Gulielmus Cowperus, sicuti in Adversariis nostris (k) legisti, ubi ad mulieres quoque eandem conjecturam transulimus: eaque in Consiliis ex illo tempore usi sumus, cum bubones propoliti sunt qui præputii, & glandis erosionibus succederant, in profunda ulcera cancræ, ut non semel vidimus, degenerantes. Nec tamen istis in Scholiis desunt quæ dissectionibus debere videantur, velut illud (l) de venerea infectione a femineis loculis usque ad uteri cornua assurgente, illaque corruptente, & ulcera ibidem excitante: quod perbelle convenit cum Vallisnerii nostri (m) Observatione in muliere, cuius ab eadem lue non modo loculi omnes, sed & dextera tuba tota erat exulcerata. His quæ a Vallisnerio in femineis, a Genselio (n) autem, a Saltzmanno (o), a Casparto (p), a Petichio (q) ab aliis in virilibus etiam visceribus, in aliisve eorum partibus qui post hunc morbum interierant, conspecta sunt, tu numerum, ut dixi, non ita magnum augere poteris Observationum quæ Sectione hac Sepulchreti continentur.

15. Non me præterit, librum ætate nostra exiisse, de Pudentiorum Morbis & Lue Venerea inscriptum, quo plures ad hanc spectantes etiam in cadaveribus Observationes proponuntur. Num vero æque possint hæc, ac modo indicata, in Sepulchretum referri, non satis scio. Neque hoc eo dico, quod Auctoris fidei, sed quod eius oculis, & diligentia quatenus interdum fidendum sit, nesciam. Alia enim sunt quæ in aliis Scriptis se vidisse, affirmavit, quæ cæteri visum esse videre credunt, cum videre ipsi nunquam potuerint. Qualia neque in hoc Scripto desunt, ut puta cum ait, *interpositum esse utrum inter Rectum intestinum, & Vaginæ lacunas: peritonæum eminere superextensum glandulis Inguinalibus ab exteriori parte, id est inter ipsas, & cutem: lympham per lymphaticam Mesentericam derivari ad Peyeri glandulas, id est acinos Intestinales: Asellii pancreas humano quoque inesse mesenterio; ait enim in mortuis ex lue Venerea esse Asellianum Pancreas ad nihilum redactum: & alia, quæ sciens prætereo, ejusdemmodi. Interea autem dum ipse ista videt quæ cæteri non vident, contra non videt, aut nescit quæ cæteri vident, & sciunt, velut ubi scribit, *nil anfractuosum in vesiculis Seminalibus contineri, cuius ratione semini mora aliqua præstendi possit*, aut ubi de Mucosa inter cuticulam, & cutem corpore nullam, inquit, apud Auctores Anatomicos, exceptis Monspeliensibus, mentionem facillam fuisse, invenio: huic porro cutis colores, in primis vero nigredinem Æthiopum primis tribuit Possenus. Sed qui Malpighium (r), aliosque ex eo hæc antea docentes legisse non videtur, multus est in pluribus producendis Scriptoribus tum Medicis, tum etiam non Medicis, ut consutata ex multo pluribus, multoque gravioribus opinione persuadeat, lue Venereæ antiquissimum esse morbum, nec alium denique ac elephantiasim. Quæ nunquam, opinor, conatus esset, si tum Medicum Doctissimum atque Eruditissimum legere potuisset a quo penitus convulsa hæc sunt, Joannem Astrucium (s): quamquam nihilominus illud mirum est, qui non ignoraret, quanta olim, & quam immoderata, dum Cæsares potentia vigeret, in Romanis lupanaribus esset Nationum commistio, credidisse, eandem vel eo tempore fuisse lue, sed a Medicis plures in morbos divisam, non antea pro uno morbo esse agnitam, quam eorum omnium morborum collectio in castris ad Neapolim animadversa est; quasi vero iis in castris major fuisset Nationum commistio, quam Romæ quondam cum uno idemque sortum (id quod ipse fatetur Martialis (t) verbis) pateret Cattis, Germanis, Dacis, Cilicibus, Cappadocibus, Indis, Judæis, &c. Una tum Romæ deerat Natio, Americana: quæ cum qui commercium per se, aut per alios saltem habuissent, in castris illis non deerant; ut unde nova non morborum collectio, sed lue in Europam venerit, intelligatur. Verum non modo in his, sed & in facili alioquin annorum ab eo tempore numeratione, & meliorum Medicorum inde ad nostrum usque ævum lectione parem negligentiam animadvertas, ubi mox scriptum est, lue Venereæ jam ultra 300. annos sub tali titulo duravisse, nihilque etiam de atrocitate sua remississe; quando inter omnes constat, Neapolitanum illud bellum non cepisse ante annum 1494. & ab eo quem paulo ante laudavi, Astrucio (u) tot Auctores producuntur, in iisque plures qui, ut celebres Medici fuere, ita in omnium fere sunt mani-*

bus, quorum testimonio planum sit, hunc morbum fædum esse leviores. Post hæc, & post alia quæ brevitate gratia omitto, in hisque proximum illum aphorismum prognosticum, *Febris Lue Venereæ superveniens morbum solvit*, ipse existimes velim, num istius oculis & diligentia tantum tribuere possimus, ut omnes ejus Observationes nihil usquam dubitantes, hæsitantesque accipiamus.

16. Caves credas, hæc a me ulla alia causa, quam veri studio, de Auctore dicta esse neque injuria mihi, neque beneficio, dum viveret, cognito, & cuius libro sua quoque bona inesse, haud nego. Noli quærere, num in ratione illa pariter qua morbum hunc esse vincendum, docebat? Ex quo enim hic Medicis morbus innouit, aliis aliam placuisse medendi rationem, & quæ olim placuerat, postea iisdem in locis esse desertam, & quæ displicuerat, substitutam, siquo in alio, in hoc certe morbo, neminem credo posse ignorare; ut siquid nunc magis probes, aut improbes, timendum sit, ne alii contra improbent, aut probent non modo ex posteris, verum etiam ex iis qui nunc vivunt, in tanta sententiarum mutabilitate, & diversitate. De duobus enim celebratissimis adversus hanc lue auxiliis, decocto, ut vocant lignorum, & hydrargyro quot vigent adhuc diffensiones? nec solum utrum utri sit præferendum, sed cum alterutrum prætuleris, qua hoc ratione sit adhibendum. Constat autem, inter ipsa hujus morbi initia mercuriales, quas dicunt, inunctiones in usum tractas fuisse: deinde vero iis prælata lignorum decocta: postea mercurium fumendum datum; nec propterea lignorum decocta ita exolevisse, ut in quibusdam præsertim Civitatibus non retinerentur; imo, rejecto prorsus utroque mercurii usu, ipsa dumtaxat servata erant, donec tandem ad alterutrum mercurii adhibendi rationem, ubi lue gravior decoctis non cederet, in iisdem Civitatibus reditum esse. Memini, cum ego adolescentulus Bononiam petii, usque adeo jam desertum utrumque mercurii usum, ut annis octo quos ibi Medicinæ studio tribui, ne unum quidem audiverim Medicum, nedum viderim, alterutra ratione utentem; mirum in ea Civitate in qua olim floruisse Jacobus Berengarius Carpenis, a mercuriali inunctione clarus, quam inter primos excogitavit: certe si annis aliquot erat natus ante A. 1467. quod ejus locus, a me alibi (x) productus, indicare videtur; ea erat ætate cum lue Venereæ primum in Europa cognita est, ut vel inter illa prima initia id institueret potuerit. Quanto autem antea quam ipse Bononiam irem, mercurius & suspectus esse, & perraro ibi adhiberi cepisset; ut vetustiores quosdam ex Bononiensibus Scriptoribus prætermittam, satis ostendit Claudius Empiricus Rationalis (y), ubi de hydrargyri utroque usu, non modo de pernicioso sæpius, ideoque hic a me nomen nominatis quidem, ex eo sufficit verba sunt. Quibus igitur Præstantissimos illos Medicos vidisti, inquis, remediis utentes contra Veneream lue? Nimirum decoctis sive per vulgata, idque ut plurimum, ratione datis, sive alia quam Valsalvæ, nec raro, in usu fuisse, vidi. Cum enim quosdam animadvertisset magnam decocti illius vim feliciter ingurgitantes quod Aquam Stibiatam, sive Aquam Corsi vocitant; in mentem sibi venisse, aiebat, eadem uti haud aliter ac thermalibus aquis solemus. Itaque dedisse primum ad duas, tresve libras, animadvertendo, an facile, & per vesicam, non per intestina, aut cutem, ut aliquando, redderetur. Nam si non facile, aut si per has duas exiret vias; destitisse. Sin facile, & tantum per urinæ iter prodiret; postredie pondus, & sic magis, magisque in dies auxisse donec perveniret ad libras decem. Sic autem multum, citoque profecisse; ut aliquando intra tres, haud amplius, dies vetusta ulcera sanari, gummata deprimi, ut in Equite quem mihi nominavit, conspexisset. Et certe ea medendi ratione vidi ipse perfanatam mulierem quæ jam biennium venerea ulcera pertulerat, magnum unum in altero genu, tria autem, an quatuor in palato, parva quidem, sed per quæ tamen alimenta ex ore in nares gravi cum incommodo transirent, itemque generosum Virum, civem meum cui ex eadem causa hypogastrium, & femora late erant, fædeque exulcerata. Quæ cum intra ipsos potationis dies contingerent; illos adesse voluissim, qui propter celerem magnæ thermalium aquarum copiam per vesicam excretionem, vias

quas-

quasdam commenti sunt, per quas illæ, minime cum sanguine circumeuntes, in vesicam descenderent; neque enim, nisi hoc decoctum, cum sanguine circumvectum, partes omnes corporis adiret, tam cito quæ exulcerata, aut aliter vitata erant, perfanare potuisset. Cæterum quod Valsalvæ in mentem venit de ejusmodi usu aquæ stibiatæ, de ipso quajaci decocto olim venerat Joanni Manardo (z), qui inter varios hujus ligni usus, ego, inquit, eum magis probo, in quo ejus decoctum, instar medicatarum aquarum, imo feri a Dioscoride scripti, bibitur. Ab eo enim modus bibendi aquas medicatas venit, qui in communi usu apud Italos est, heminis videlicet quinis per intervalla epotis. Quæ decocti exhibendi ratio a Massaria nostro (a) adeo probata est, ut miraretur, quomodo nemo ad suum usque tempus fecutus esset tam præclarum tam illustre viri institutum: se vero hoc non semel ulum esse, testabatur, summa cum facilitate, & felicitate ita ut ægri sine multo labore, & paucis diebus id consecuti essent quod alii vix magna molestia, & longo tempore solent consequi: nec ipsi tamen, ut locum perlegendum intelligis, quæcunque de tribus quæ paulo ante dictæ sunt, excretiones sequerentur, quidquam referre videbatur. Sed; ut illuc redeam; ab eo quo ipse Bononiæ degebam, ad hoc tempus, spatio videlicet annorum necdum quatuor & quinquaginta, mercurius quoque inter prælata antivenerea illic denuo relatus est.

17. Non multo minori temporis spatio in hac Civitate non tantum quidem, sed aliorum tamen, in iisdem præsidii vicissitudinem animadverti. Ut enim inter Medicos cæteroquin Peritissimos nunquam hic aliquid defuerit validiorum potius, quam tutorum, remedium amantes, sic postpositam quidem plerumque decoctis, nunquam tamen prorsus desertam fuisse, accepi, quamlibet propemodum mercurio utendi rationem. Itaque ex quo huc veni, præter suffitus quorum mentionem audivisse, non memini, plerisque alios modos in usum vocatos esse, scio, in hisque mercurium vel deglutendum exhibendi, huncque aut cum iis conjunctum quæ per alvum ducerent, aut ita paratum, ut salivationem, aut etiam ut diaphoresim moveret, vel cum pinguedine cuti illinendi. Verum ultimis hic modis rari, minus rari priores tres; creberrima autem erant decocta lignorum, ut plurimum exoticorum, nonnumquam, ut pro pauperibus, plantarum nostratium, quo in loco non est tibi reticendum, cum Vallisnerio, qui id mihi testatus est, ejusmodi homini quem diuturna Venerea lue pessime habebat, decoctum præscripsisset bardanæ radicem, marrubii, & viridium putaminum juglandium nucum, ingentibus obortis sudoribus hominem esse perfanatum. Porro sensim, paulatimque res adeo mutatas vidi, ut nisi levior morbus sit, perraro decocta ad sudorem, creberrime autem mercurius detur ad salivationem ciendam, inunctionibus pene desertis, causantibus Medicis, in his minus scire se posse quantum hydrargyri corpus subeat, minuique propterea quomodo gerere se te oporteat. Atque utinam præfens quoque medendi ratio nunquam hic detrimenta illa gravia, & interdum funesta attulisset, quæ laudatores nescio qui inter commentarios quasdam positiones suas, & exaggeratas narrationes, diffimulant, effectque propterea cæteris perpetuo anteferenda. Sed quæ superioribus temporibus acciderunt, & quæ nunc alibi fiunt, & hic iterum fieri incipiunt, spectantes, novas hic quoque vicissitudines iterum non expectare non possunt. Non modo hydrargyri deglutendi usus, sed & vis quarundam illius proprietatum adversus hunc morbum non ignota olim Patavinis Professoribus, si forte e minus doctorum memoria exciderant, certe excidere rursus poterunt, ubi ratio alia & medendi, & explicandi apud plerosque invaluerit. Non puto autem, esse te quasi-turum, qui Professores illi fuerint, cum Falloppium (b), Tomitanum (c), Saxoniam (d); ne alios nominem; legisse, te, sciam: quorum ultimus non uno modo exhibitum describit mercurium, id est cum cathartici, & sine his, ut quibusdam spiritum copiosum excitaret, huncque narrat tunc Patavi in usu fuisse Professori, & Medico Celeberrimo Albertino Bottono. Nec dubium est, quin ii qui deinceps in hoc Gymnasio succedere, ut præcipit illo, quo Bottonus, mercurio non uterentur, sublimatum hunc, quo vi-

ventes utuntur, rite dulcificatum aut in usum traherent ipsi, aut certe ex pluribus pervulgatis libris satis superque jam noscent, a Claris Medicis proponi ad salivationem concitandam. Vim autem proprietatum quarundam mercurii adversus hanc lue non prorsus ignorarunt duo saltem ex nostris veteribus Professoribus Hieronymus Fracastorius, & Benedictus Victorius; hunc enim, a Papadopolo prætermittam, ante medium sæculum XVI. hic docuisse, ostendit Tomafinus (e); illum vero, omittam a Tomafino, Patavinum Professore rem ineunte eodem sæculo fuisse, probat Papadopulus (f). Igitur de argento vivo sic Fracastorius (g):

Quodque est condensum, humores dissolvit, agitque Fortius; &c.

Victorius autem (h) sic: *sui gravitate cutem corporis penetrat, quodammodo a calore corporis actuat: & mox etiam, ubi corpus subit, gravitatis mentio fit.*

18. Prætereo quæ tanquam ex aliis, de tenuissimis, minimis, exiguis, ex quibus mercurius constat, particulis noster memorabat Tomitanus (i), ut observationem, consiliumque Trincavellii (k) pariter nostri, subijciam, simul ad morbum quo de agitur, simul ad has Aponi Thermas attinentia. Pro nobili Matrona consultus, quæ ad plures alios morbos lue hanc adjunctam habebat, postquam alia proposuisset, & ad duo quæ præcipue utilia esse posse videbantur, pervenisset, decoctum ligni guajaci, & aquas thermalium, illudque adversus & lue, & morbos alios profuturum, respondisset; ubi ad aquas, & multiplicem earum usum bibendo, lavando, & excipiendo ex altiore loco stillantes descendit, cæteros quidem affectus, & eorum causas sperare, inquit, possumus quod sint penitus superaturæ: quatenus autem ad veneream, vel gallicam lue pertinet, illi crediderim vel nihil, vel parum admodum posse prodesse: imo, si verum fateri velim, visus sum observasse, quod illis, qui hoc morbo detinentur, potius obesse, quam prodesse solent. En observationem, modeste propositam. Consilium sequitur: *Sed ut tandem quid in hac re sentiam, tibi aperiam: ego utroque auxilio uter: & primum ligni decoctum experirer; postea etiam vellem, Patavium ad balneas illam duci.* Sic igitur jam tum anno 1561. Patavini Professores observabant. Sic consulentibus respondebant. Nec si aliqui, minus in eorum monumentis verati, id forte ignorant; idcirco tenebras offundunt Antecessorum gloriæ, quasi nulla id, tam facili præsertim, observatione confirmassent. Quin etiam ista quæ ex Guarinonii Consultationibus Sectioni huic Sepulchreti addita est observatio non videtur ab iis discrepare quæ adnotaverat Trincavellius. Certe autem non discrepant quæ Andreas Baccius (l) Scriptor de Thermis Celeberrimus tradidit. Cum enim haud omnes in hoc morbo esse noxias censeat (quod & ejus & aliorum, recentium quoque, Clarissimorum Hominum experientia procul omni dubitatione credendum est) Aponenses nocere, discrete affirmat; imo idem, inquit, ad Aponi balnea accidisse cuidam illustri Principi novimus, nimirum ut immemor jam præteriti veneris contagii, vetustus sibi ex balneo conscriberet dolores. Nec fortasse a veri similitudine aliena cogitares, si ad cæteras causas ob quas ille tantus ab antiquis usque temporibus ad Euganeas Thermas agrorum concursus decrevit, hanc quoque adderes, quod eo pluribus, non ut olim prodesse, imo etiam obesse debuerint quo magis, magisque auctus est numerus hominum, inter cæteros morbos Venereum insuper sive apertum, sive occultum foventium. Quod si hic morbus, ut in Europam importatus est, sic tandem aliquando, uti sperabat Fracastorius (m), prorsus excederet, nec Medici eo tempore deessent qui magnis, sed iustis, laudibus ornari possent; vix dubito, quin Aponensium Thermalium celebritas, imminuta quidem ob alias causas, sed ob earum admirabiles facultates nunquam sublata, longe alia iterum fieret, ac sæculo hoc videmus, & diu fortasse visuri quoque sunt posteris, nisi duorum, quos nostri, Amicorum singularis in horum fontium natura perquirenda solertia, in effectibus autem accurate observandis, pervulgandisque diligentia, felicia exempla ante omnium oculos proponendo, quasi nova quadam invitatione multo maximum agrorum numerum ad salutem hic sibi quærendam alliciat.

19. Nunc quando me veri studium impulit, ut veteribus

(k) IV. Animad. 22. & 27. (l) ad §. 4. cit. Schol. 1. (m) Ist. della Generaz. P. 2. c. 5. n. 21.
(n) Eph. N. C. Cent. 6. Obs. 84. (o) Act. N. C. Tom. 2. Obs. 99.
(p) Differt. de Exanth. cran. §. 8. ubi num Aortæ aneurysma? (q) Syllog. Anat. Obs. §. 87.
(r) De Ext. Tract. Organo. (s) De Morb. Vener. l. 1. c. 1. & segg. (t) l. 7. Epigr. 29. (u) l. cit. 1. c. 14.
(x) Epist. Anat. 6. n. 2. in fin. (y) l. 6. S. 2. tr. 1. c. 3.

(z) l. 24. Epist. Medic. 4. (a) Pract. Medic. l. 6. (b) Tract. de Morbo Gall. c. 79. (c) De Morbo Gall. l. 1. c. 25.
(d) Tract. de Lue Vener. c. 22. (e) Gymn. Patav. l. 3. c. 8. ad A. 1532. (f) Hist. Gymn. Patav. l. 3. S. 2. c. 11. n. 55.
(g) Syphil. l. 2. (h) l. de Morbo Gall. c. 7. (i) c. 15. paulo ante cit. (k) l. 2. Consil. Medic. 63.
(l) De Therm. l. 3. c. 2. in fin. (m) De Morb. Contag. l. 2. c. 11.

teribus huius Gymnasii Doctoribus quæ restituenda essent, ostenderem, nec illud silebo quod ad controversiam attinet, supra (n) indicatam, de Luis Venereæ novitate idem illos quod plerique doctorum, sensisse, & Hippocrati, Galeno, Avicennæ fuisse cognitam, negasse eo graviore auctoritate, quo magis erant in eorum libris perlegendis versati, quam successorum nonnulli quibus aliter visum est, in hisque Eruditissimo aliquin Viro Carolo Patino. Hic enim, ut initio anni scholastici 1687. per hoc paradoxum; utor ejus verbo (o); proluderet, Orationem habuit, ediditque, inscriptam *Luem Veneream non esse morbum novum*. In qua tamen nihil offendisset quod rejectum satis ab se non esset, aut facile rejici ad eundem modum non posset, Cel. Astrucius: qui (p) nunquam illam extitisse Orationem, ideo arbitrabatur, quod nullam ejus mentionem in nostri Gymnasii Historia fecisset Papadopolus, ubi de Patino satis fuisse locutus (q), Opera ejusdem singillatim recensuit. Papadopolus vero, Doctissimus Vir, & de hoc Gymnasio egregie meritus, cum pro materiæ multiplicitate, & amplitudine non satis temporis ad scribendum habuerit; non mirum est, si quædam invitus omisit in Professorum quoque, Alumnorumque cum vita, tum lucubrationibus præsertim recensendis, quarum se qualem qualem, ut deprehenderetur, Catalogum nominibus singulis adjecisse, in Præfatione admonuit. Et nos quidem, quod ad Artium Doctores in primis attinet, ut se occasio dederit, supplere aliqua ex parte ejus Scripta non omitemus, tanto autem de Patino facilius, quod inter nostros sunt libros volumina duo in quibus sua ipse Opuscula disposuit eo fere ordine quo prodiere, pleraque sua manu sic emendata, & aucta, quemadmodum a typographo iterum describi volebat. Quæ igitur omisit Papadopolus, in primo quidem volumine hæc sunt, *Quod Medico-Chirurgus liceat absque artis dedecore bestiis etiam mederi*. Oratio. --- *De Phœnice in numismate Imp. Antonini Cavacalle expressa*. Epistola. --- *Oratio de liberata Civitate Vienna*: quæ duæ Filiarum nomine scriptæ sunt. --- *Medicinam Practicam non satis æstimari*. Oratio. --- *Quod Medicus debeat esse ΠΟΛΥΜΑΘΗΣ*. Oratio. --- *Commentarius in tres Inscriptiones græcas Smyrnæ nuper allatas*. --- ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ, de Medico. --- *Theoremata Philosophico-Medica de Vita & Morte*. --- *Circulationem sanguinis a Veteribus cognitam fuisse*: Oratio. --- *Flores Medicinæ Theoreticæ*. --- *Exercitationes Publicæ de Febrilibus*, videlicet non Oratione, quam indicare voluit Papadopolus, sed Prælectio-

num habendarum Synopsis. Ex altero autem volumine præterita hæc sunt: *Theses Politicæ de Libertate, & Servitute*. --- *Opiniones Medicæ de Febrilibus*. --- *Idea Capitis humani*. Oratio. --- *Oratio habita Venetiis in Academia Dodonea*. --- *Flores Medicinæ Practicæ*. --- *Luem Veneream non esse morbum novum*. Oratio. --- *Exercitationes Publicæ de Morbis particularibus Thoracis, & Abdominis*. --- *Commentarius in antiquum monumentum Marcellinæ e Græcia nuper allatum*. --- *In Febrilibus medendis inspicendum esse lotium*. Oratio. --- *Commentarius in antiquum cenotaphium Marci Artorii Medici Cæsaris Augusti*. --- *Exercitationes Publicæ de Morbis Capitis*. --- *Oratio de Remediis Specificis*. --- *Flores Medico-Chirurgicæ*. Cur his duobus ultimis Scriptis non interjecerit Patinus, ut editionis ordo postulabat, Orationem quæ seorsum apud me extat, sic inscriptam, *Vanum esse Astrologiam Medico plane indignam*, quam A. 1690. hic habuerat, typique descriptam vulgaverat, non magis scio, quam cur duo de quibus dixi, Opusculorum volumina neglecta adeo reliquerit, ut nisi in manus venissent meas, facile excidere & perire potuissent chartulæ quas, nullo annexas glutine, hic illic magno numero interjecerat, nonnulla in Opusculis ipsis emendans, plurima autem præclare illustrans, multumque augens. Quæ nunc chartulæ diligenter a me perlectæ, & collatæ, singulæ ad singula agglutinatæ sunt loca ad quæ pertinebant, ut facile aut per me, siquando minus occupatus fuero, aut per alios ea Scripta jam possint iterata editione sic proferri, quemadmodum pereruditio eorum Auctori placuerat. Hæc autem chartulæ spectant ad Commentarios quos memoravi, nonnulla in cenotaphium M. Artorii, longe plures in primam, & secundam ex tribus Smyrnenibus Inscriptionibus, plurima autem in monumentum Marcellinæ. Ad quas ultimas accedit autographa, nec ita brevis, epistola a famigerato Viro Gisberto Cupero ad Patinum missa, siquid ego judico, utroque digna. Nec dubito, quin hæc quoque, ut una cum chartulis interjecerat, editurus fuisset Patinus, nisi arteriæ Magnæ aneurysma, a quo potius quam a concreto, ut sit, intra ipsum polypo, peremptum censeo (n), ejus proposito obstitisset. Quo perfectio, ostendisset magis Vir Doctissimus, quanto plus in antiquis numismatibus, & monumentis declarandis valeret, quam in medico illo paradoxo vetustatis Luis Venereæ Hippocratis quoque si Superis placet, Galeni, Avicennæ, aliorumque locis confirmando, Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LIX.

Verba fiunt de Morbis a Veneno inductis.

SESſio quæ in Sepulchreto succedit, X. partim ad Morbos spectat Occultos, & Chronicos, partim ad eos qui a Veneno inducuntur. Plus autem affert utilitatis in his, quam in illis hic proponendis. Illi enim aut nullis cum signis, aut cum quibusdam, quam quisque Observatore traditi sunt: si nullis cum signis; vix aliquid fructus est quod capias ex apposita diffinitione: si habent signum quoddam adjunctum, ut puta febrem, vomitum, difficilem respirationem, alia ejusmodi; sane multo utilius in eas Sectiones relati essent, in quibus singula sunt ea signa peculiariter spectata. Quod ut de quibusdam factum est, in Sectione hac indicatis, sic etiam de aliis faciendum fuerat, de quibus quidem licebat. Vides igitur, cur hac in parte Sepulchretum non sequare, imo nec sequi possim, cum huius generis Observationes suo quaque loco in alias Epistolæ conjecerim.

2. In altera autem parte quæ ad Venena attinet, libenter secuturus, perpaucam a me (nam a Valsalva nulla habeo) aut a Mediavia nostro adnotata exemplam tecum protinus communicabo. Ejus est hoc primum.

3. MULIER annos nata ad sexaginta, jam præsa, pastillos quosdam ex amygdalis, in superiore ædium parte sepositos, clam domino, qui seposuerat, devoravit. Exacta vix hora, molesto quodam ventriculi sen-

su corripit cœpit, quasi statibus vexaretur. Quo diutius perstante, & dein magis magisque ingravescente, plura & vomit, & deiecit: sicque levare visa est. Sed mox graviore molestia, nec sine deliquiis, redeunte, tandem aliquando quid comedisset, fastidit; serius tamen, quam oportuisset. Illi enim pastilli ad interficiendos mures parati, arsenicum admixtum habebant. Itaque intra horam ab eorum usu duodecimam virium potius lapsu, quam acrioribus doloribus, aut manifestis convulsionibus affecta, morte sua miserrima anus puerilis gula poenas luit.

CADAVER publico jussu postridie inspectum, fœdumque est, qui dies fuit circiter Nonas Maji A. 1727. Facies corporis posterior, ne furis quidem, & calcibus exceptis, tota erat nigra. Corpus ipsum non rigidum. Venter non tumidus: quo, & ventriculo adaptato, hujus interior facies hic illic erosa, præsertim ad antrum pylori, conspecta est, adhærente erosio partibus, inter membrana frusta, arsenico ipso. Nec Duodenum intestinum erosionibus carebat. In Thorace nigricantes pulmones: in corde polyposæ duæ concretiones digiti forma, & longitudine; cum cæteris fluidis in omnibus vasis, & coccineus sanguis occurreret.

4. Ut in cæteris, sic etiam in morbis qui a veneno fiunt, neque signa, neque effecta eadem omnino in omnibus sunt expectanda. Aliæ in aliis corporibus tum fluidarum, tum firmarum partium quæ ad ventriculum

triculum præsertim attinent, constitutiones, ejusque præterea inanitas, aut plenitudo, hæcque ab unius, aut alterius generis alimentis, facere nimirum possunt, ut venena, etiam si eadem, eodemque pondere revera sint (eadem enim possunt esse nomine; sed aliter præparata) non iidem tamen signis, affectibusque se prodant. Arsenicum, quæ voce illud potissimum intelligitur quod album est, & crystallini adjuncti sepe numero designatur, ipsum quoque, discrete confirmantibus Doctissimis Viris Meadio (a), & Boerhaavio (b), factitium est, itaque aliter ab aliis potest esse paratum, ut cum apud Meadium legas, totum aqua solvi, legere apud alios possis, non modo ejus particulas, ut in proposita Muliere, in ventriculo fuisse animadvertas, sed etiam inde fuisse agnoscere arsenicum, quod sub aqua calida restitissent ejus frustula instar alborum lapillorum, ut in illa habes Wepferi historia, quæ inter Additamenta ad Sectionem hanc Sepulchreti, prima est in Observatione XIII. Exhibet ea historia puellum biennem a prægressis febrilibus maceratum, adultioresque puellas duas bene valentes, quorum ille vix duo cochlearia, hæc reliquum sumperant de pulicula, arsenico infecta, vacuo ille ventriculo, hæc cibus pleno: ille non vomuit, hæc statim, & postea, arte etiam adjuncta, multum, & sæpius vomuerunt. Discrimina hæc diversus exitus est consecutus. Puella exasperant. Puellus autem, cujus nulla convulsiones inter cætera signa adnotantur, viribus magis magisque deficientibus perit, ventriculo intus exulcerato, pulmone ex atro hivescente. Proferri ibidem videbis puerorum exempla alia, qui a devorato arsenico cum statim, aut non pluribus post horis vomuissent, & remediis adjunctis essent, convalescerent. Inter symptomata arcuum tremor in uno (c) memoratur. Qui autem arsenicale pigmentum, sandaracham, delinxerat puer (d), isque undecimætris, nec nisi post quartum diem medicamentis usus, non sine convulsionibus peritisse narratur. Nec puella (e) quæ serius vomuit ab assumpto, ut suspicabantur, veneno erodente, convulsiones terribiles omittuntur, quæ mortem antecessere. Evaserunt qui citius vomuere quadriennii puer (f), & supergressa annum sororcula, cujus, non illius, convulsiones adnotantur. Sed horum quoque venenum, erodens alioquin, ut videtur, ignotum fuit; ut etiam aliud non attendas, nisi cruorem ore rejecisse, videri possit a sublimato mercurio mortua, quando non solum Ardoynus (g) vomitum aliquando sanguineum inter illius indicia proposuit, sed & Wepferus proxima Observatione XIV. (i) inde vidit & vomitus, & dejectiones (quas nec Ardoynus prætermisit) eruentas in cane, quem nunquam convulsam, nec a morte rigidis artibus fuisse, discrete admonuit, inflammata autem, ut ex parte foemina illa, intestina, & ventriculum intus, extraque habuisse, sanguinem autem neque in corde, neque ullis in vasibusquam concretum. Quæ attingi non ignaras, quantum Cl. Meadio (k), qui globulos mercurialium instar in arsenico pervidit, hoc cum sublimato mercurio in modo inferenda necis convenire videatur. Sed ad ea quæ de arsenico ipso porro adjiciuntur in Observatione, antea memorata, XIII. redeamus. Quid a devorato arsenico canibus duobus (l) acciderit, vix præter mortem indicatur. In mortuis tamen quatenus inflammatus utriusque ventriculus, hujusque tunice in altero extenuata, intestina autem perforata, & perforata, in eodemque niger, & grumofus sanguis fuerit, non omittitur. Denique ut circulatoribus pleno ciborum pinguium & oleosorum ventriculo, arsenicum impune devorent, mox tamen clam omnibus per vomitum rejicientes; vomitum autem præter morem differre coacti, pereant, (m) non reticetur. Sed hæc omnia pessime habentem, vomitu concitato per tabacici frustulum cum cibo intrusum, vivam manifeste. In Sectione autem ipsa est illa potissimum attendenda Observatio (n), quæ modo dicta confirmat. Scilicet cum in quo in edulio pro farina arsenicum mistum fuerat, ex quo convivis qui hæcenus minimum comederant, bibenter triculum cibo, potuque distenderant, ii vomitu sunt curati sic tamen, ut in eorum cadaveribus, multis post annis decedentium, erosio, quæ lata, & profunda Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

nihilominus fuerant, apparuerint notæ. Quod si quæ ex Pareo proxime (p) sequuntur, perlegas, id fortasse quod paulo ante de femina illa conjiciebam, non improbabis. Sunt præterea in Sepulchreto Observationes quæ ad venena attineant, alia; tamen contra ac sæpe alibi factum est, in Sectione hac non indicantur. Reperies in Sectionibus VII. & VIII. libri III. in illa quidem sectionem, vel potius sex; quæ enim Observatione XVII. secundo loco proponitur, evidenter adeo eadem est ac quæ III. de Professore illo Patavino producta jam fuerat, ut mirum sit, non fuisse id animadvertum; in Sectione autem altera quinque, an sex, quarum prima, quæ V. est, ad arsenicum nominatum spectat, cujus frustula circiter duodecim inventa sunt ventriculi tunice tam arcte inherentes, vix ut avelli possent, tunicis iidem, ut in cane diximus, extenuatis, eroso præterea, inflammatoque ejusdem vitæ fundo, & cadaverem a tergo plane livente. Sed præter vomitiones, dejectionesque, nulla commemorantur symptomata. Observationes autem cæteræ quæ in utraque Sectione enumeravimus, aut ad alia, aut ad ignota venena attinent. Quorum effectus in mortuis spectati, fere ventriculi, & intestinorum inflammatio, & erositio fuerunt; in viventibus autem alia signa; sed nullum vomitu frequentius, pro quo siquando fuit, aut mox successit inanitus vomendi conatus, ægri tum pejus se habere, & citius interire, quam ii in quibus reliqua paria esse viderentur. Quod vomitus signum cum iis quoque eadem modum commune sit qui arsenicum devorant; si forte queris, quoniam præterea in iis ipsis crebrius adnotatum sit; virium languorem, aut quæ hunc denotent, fuisse invenies, videlicet extremorum, aut totius corporis frigus, sudores frigidos, pallorem, ipsamque interdum syncopem. Hunc virium languorem, ab affecto stomacho pendente, qui per nervos cor in consensum trahat, molestissima, ut opinor, præcedit, & comitatur anxietas potius, quam lancinans dolor. In iis certe quorum descripta habemus symptomata, pueris, aut canibus, clamores fuisse, non legimus, anxietatem quam vix exprimere pueri sciunt, in duobus legimus. Cæterum in uno terminum indicia, & singulas, in uno abdominis tumor, in quibusdam sitis, in aliis lingua tumens, aut aphtha in ore, aut deglutitio impedita, aut ætus, & ardoris sensus adnotatur. In quibus autem manifesta fuerint, aut non fuerint convulsiones, supra indicatum est. Sed horum omnium symptomatum alia nonnunquam, alia haud raro ab aliis quoque venenis erodentibus contingere. Quia ubi a Sepulchreto discesseris, quo uno circa arsenici effectus, & sublimati mercurii spectato, ea quæ de clamoribus, doloribusque modo dicebam, & quæ supra de cruentis excretionibus attigi, dici posse videbantur; non dubito, quin continuo aliter, & merito, sentias.

5. Igitur ut historias quas in Sepulchreto non habemus, attentius ipse perlegere, & conferre possis; bene multas protinus indicabo, omnes pariter ad mineralia venena spectantes. A vitro antiimonii quod aurige perperam datum fuerat, inter cætera, dejectiones cruentas, motus spasmodicos, & mortem denique adnotavit Cl. Baëumlinus (q), abrasum vero intus ventriculum, & rubra, prope pylorum, macula tinctum. Quamvis autem canis ab eodem vitro quod Jo. Adr. Sproegelius (r) intruserat, nihil nisi validas convulsiones passus sit, dum vomere vellet, nec propter contractum vinculo os, posset; admonuit tamen Experiens Vir (s), brutorum naturam multo fortiores, & plerumque a nostra diversissimas, pervincere ea venena posse, quæ nostra non potest. Quin Observationes (t) extant quæ in alio cane ostendant quæ a vitro illo paralytes, convulsionesque cum ejulatibus conjunctæ, & quæ ventriculi sede manifesta inflammatio orta sit, ut nisi vivens adhuc diffusus esset, graviora fortasse contingere potuissent: tum etiam mulierem proponant ab eodem ingestio vitro per enormes vomitus, mortuæ instar, humistratam, rigidam, convulsam, & pedis alterius acerbissimo dolore, mox gangrana, & sphacelo correptam, ut quemadmodum aurige illi, sic & ipsi non proximam quidem mortis causam, sed causam tamen, & occasionem id pharmacum attulerit. Tartarum vero Emeticum Viralter Experiens Jacobus Foelix (u) cum dedisset cani, & vomentem adhuc aperuisset, maximam ad pylorum inflammationem per aliquot pollicum spatium vidit. Non

(n) n. 15. (o) pag. penult. (p) De Morb. Vener. l. 2. c. 17. ad A. 1687. (q) S. 2. supra ad n. 37. cit. c. 35. n. 159. (r) Vid. Pass. Epist. de Cordis polypo in dub. revoc. n. 5.

(a) Exposit. mechan. Venenar. Tent. 4. (b) Element. Chem. Tom. 2. p. 2. ubi de Sulph. (c) Hist. 2. (d) Hist. 8. (e) Hist. 9. (f) Hist. 10. (g) De Venen. l. 2. c. 5. (h) Hist. 2. (i) Tentam. cit. (j) Hist. 125. (k) Vid. etiam Schol. ad Obs. 3. (l) in cod. Schol. (m) S. 5. in Obs. 4. (n) Ibid. §. 6. (o) Commerce. Liter. A. 1739. Hebd. 16. n. 1. (p) Experim. circa varia venena &c. Exper. 41. (q) Ibid. §. 50. (r) In Additum ad Sect. hanc Sepulchr. Obs. 12. H. A. 2. & 3. (s) Experim. 11. inter ea quæ addidit Dissert. de Mor. perist. intestin.

me fugit, Clarissimos esse Viros (x) qui arsenicales veras particulas in antimonio necdum fuisse demonstratas, contendunt: neque ego propterea exempla hæc attuli, multoque minus ex Præcl. Henckelio (y) illud butyri antimonii asseram per errorem exhibitum, statim consecutis faucium, & stomachi constrictione, & ardore immensi, deinde vero per menses, annosque iis ventriculi affectionibus, ut planum fuerit, nisi lac illico & largiter datum (id quod ab auriga illo nimis fero, eoque frustra factum est) non tam vomitum adjuvando, quam acerrimum erodens venenum in caseosa coagula, quæ plurima egesta sunt, illigando, opem attulisset, hominem miserrima morte fuisse peritum. Vis autem adeo erodens in eo veneno non esset, nisi pararent cum mercurio sublimato. Sed huius tamen effectus ut cum effectibus butyri illius possis comparare, Kramerii (z) curationem lege, non lacte solum, sed & admisto oleo tartari per deliquium, ut loquuntur, ad rectificandum mercurium, aliusque feliciter peractam. Oris, gulæ, & ventriculi eas erosiones fuisse, intelliges, antequam remedia præberentur, unde multum sanguinis tum per vomitus, tum per dejectiones, idque sæpius, ejiceretur cum angoribus, torminibus, deliquiis, convulsionibus, aliis ejusmodi. Baccius (a) autem ab eodem sublimato mercurio, sed minori, ut videtur, pondere, & certe cum aliis sumpto, æstum ventriculi, sæva tormina, violentus vomitus adnotavit, per quos denique ichor purulentus ac *combustus*, simulque anima post triduum egesta est. Quidam per dejectionem, si quidem est habita, compertum sit, reticet. Sproegelius (b) vero cum sublimatum mercurium feli, & cuniculo ingessisset, illam intra quinque horæ minuta prima, hunc vix ingesto, mortuam refert, nullis prægressis symptomatibus, nisi in illa convulsionibus levissimis, in hoc vomitu: additque, in illa intumescit ventriculi tunicam ubivis, sed magis in fundo, inflammata fuisse; in hoc nusquam, sed nec potuisse, prohibente brassica antea devorata; mortem autem adeo celeriter ingruisse, quod cum aqua datum venenum, ab hac solum, vim suam statim in nervos exercuisset. Verum cani (c) cum pariter dedisset, sed inani ventriculo; huius villosam tunicam ubique spiculis veneni repletam, eoque partim rubram, partim sublividam offendit, ut os quoque totum vidit, imo ventriculum, in primisque orificium ejus supremum, valde inflammatum, nigrum, & gangranolam, tametsi vivens adhuc animal secuit postquam per horam, & amplius magnos vomendi conatus, cum inquietudine, & ejulatibus conjunctos, animadverterat. In nulla trium harum belstiarum, si primam excipias, sanguinem in corde nigrum, & coactum memoravit. Jacobi autem Foelcis (d) unum modo video intrusi ejusdem veneni experimentum, sed cum pari simul arsenici pondere, sed in cane quem vix iis intrusis bis vomentem continuo secuit, & tamen vehementem reperit ventriculi inflammationem. Quam in alterius quoque canis (e) ventriculo, præsertim pylorum versus, vehementissimam autem in proximis intestinis deprehendit, sed eo leviolem, quo propius accedebat ad Crassā. Hunc vero canem viventem quidem, sed non nisi postquam novies evomuerat, incidit, cum præter arsenicum nihil dedisset quod venenatum esset. Quo de veneno quoniam hic, ut proposita a nobis requirit historia (f), potissimum quærimus; experimenta aut per ipsum, aut per ejusdem generis alia a Sproegelio habita (g) non omitemus. Feli, & cani arsenicum *album crudum* ingessit. Vomendi, aut vomituriendi conatibus, anxietatis signis, & convulsionibus, aut concussionibus animadversis, utrumque animal priusquam interiret, dissectum est; ostenditque in ventriculo, aut circa pylorum, aut ubique valde inflammato, sanguinis grumos inter rugas, aut inter villos effusi, & coagulati, qui in cane arsenicum circumdabat. Cobaltum, quod arsenici *minera* est, cum unus, & alter canis impune vomuissent; alteri (h), ne vomeretur, obligato ore, vehementissimi vomendi conatus, anxietas, convulsiones, debilitas obvenere, & intra perpaucas horas mors. Huic ventriculus nonnullis locis sublividus, ubique multum inflammatus fuit, inflammata quoque intestina omnia, sed tanto minus, quanto a ventriculo magis distabant. Nec defuit in humanis corporibus fu-

nestorum sumpti cobalti effectum Observationes; ut una Cl. Kundmanni (i) trium saltem mortem, inde secutam intra horas non multas, complectatur, cum omnes confestim vehementissima tormina corripuissent, enormes vomitus, & frigidi sudores, dorso cadaverum livido, valde inflammato ventriculo, & ex hujus erosione valis sanguinolento humore effluente. Eadem Observatio obitum quoque proponit mulieris, post ejusmodi & tormina, & vomitus, intra paucas horas succedentem deglutito arsenico rubro. Arsenicum autem citrinum; auripigmentum vocant; quem ardoris, & erosionis sensum, & quot vomitiones, dejectionesque, & quantas permoverit, Gerbezius (k) docebit, utque totam familiam, ex qua aliqui sanguinem ex ore, & intestinis ejecere, pene interfecerit, puellam autem plane occiderit; ut minus mirum sit quod leges apud Heydium (l), elicitas ex auripigmento crystallas, gallinæ præbitas, hanc alvi fluxu confecisse. Et quamvis non ad arsenicum, sed ad plumbum spectet lithargyrium; digna tamen sunt quæ a te legantur tum ejus, aceto soluti, & cocti factum in cane a Brunnero periculum, canisque dissectio, tum ejusdem, cum bolo cocti, & acidi vini dolis injecti, Jo. Jac. Franc. Vicarii (m) habitas in iis qui biberant, Observationes. Nec minus lectu dignæ sunt alie, ut Cl. Jo. Mat. Mulleri (n) una, & Cl. Just. David. Hemmeri (o) altera. Ex torminibus enim, vomitibus, dejectionibus, anxietatibus, deliquiis, siti, quæ in prima, & ex siti, æstu, sanguineis dejectionibus, quæ in secunda leguntur, tum ex cita morte quæ in utraque; itemque ex cutis universæ maculis, totius alimentorum canalibus rubentibus stigmatibus, omniumque ejus tunicarum subtili hic illic perforatione, quæ in prima, & ex cadaveris atro posterior colore, ventriculi, & intestinorum omnium magna exterior inflammatione, interior erosione, quæ in secunda proponuntur, satis constat, venenum utrobique corrosivum cuncta effecisse, tametsi quodnam id fuerit, pro certo non liqueat. Certe autem a sumpto arsenico fuere & symptomata, & viscerum labe in historiis quas pressius indicabo. Preussius (p) faucium, & pectoris constrictionem, sitim, ardores, rosiones, tormina, immanes vomitus, & dejectiones memorat. Laudatus Mullerus (q) præter hæc, & dolores ventris, huius quoque statim intumescitiam, & anxietates. Mauricius Hoffmannus (r) celerem pariter, sed multo maximam ventris intumescitiam, faciei livorem, oculorum, & cervicis contorfiones. Cl. Heimreichius (s) continuos per horas 24. vomitus cum horrendis clamoribus, artuum tremorem, pedum paralysem. Cl. Jo. Phil. Wolffius (t) atrocissimos ventriculi, & ventris reliqui dolores, cum Cholera morbo conjunctos. Quem supra laudavi, Hammerus (u), & Præstantiss. Quæmalzius (x) ille vehementes vomitiones, virium infirmitatem, & artuum contractions, hic autem insuper anxietates, cardiacas, intumescitiam oculorum, & totius capitis, ventriculi, & intestinorum lancinantes, erodentesque cruciatibus, ardores, aliaque adnotantur.

Sed quoniam arsenicum in his tantum non omnibus calibus vomitiones ipsæ magna ex parte ejecere, illius vero quidquid erat reliqui, ab ipsoque inchoatas noxas blanda oleosa, lac autem præsertim, cohibere; Observationes alias, in iis qui servari non potuerunt, dum viverent, & post mortem habitas, indicabimus. Ettmüllerus filius (y) de puella refert, quæ a sumpto arsenico cum multa viscida liquamina prima nocte rejecisset, mane inventa mortua est: nec tamen cadaver, præter externum quendam lividum, & coeruleum tractum, quidquam mox ostendit in visceribus quod veneno imputare posses. nihil usquam putridi, nihil foetidi in intestinis, nulla in his, aut in ventriculo inflammatio, aut erosio, quamquam hic inter cætera, album pulverem continebat, qui prunis injectus fumum dedit *arsenicum spinantem*, eidemque similis pulvis, in ædibus inventus; catello, & feli ingessit, hanc post sequi horam, illum plurimis excitatis vomitionibus, tertia post hora interemit, ventriculo felis parva ex parte, catelli autem ex magna inflammato, ut & proximo Duodeno intestino, prope quod enormis fuit erosio. Sed ab his puellæ ventriculum & multa viscida materia, & ci-

& cibis quem ante sumperat, videntur defendisse, non item ab irritatione tunica illius intimæ, nervorumque ipsi infervientium. Producentur autem exempla arsenici vel exterius admoti, vim suam exerentis live ubique sunt ulcera, quæ de re, quippe minus huc attinent, rejicimus te ad ea quæ alias (z) scripsimus, sive ubi illa est integra, cujusmodi exemplis addi illud in primis potest de quo est Heimreichii Observatio paulo ante citata, seu celeritatem species qua nocuit, seu gravitatem, & pertinaciam nocuenti, cum arsenicum pro cyprio, quem vocant, pulvere capillis inspersum est, ne dicam cum olfaciendo internoſci voluit. Verum quia in proposita puellæ ventriculo neque pustula, neque tumor, neque rubor conspectus est; idcirco, opinor, exempla non omittuntur nozarum alterius generis, summi autem periculi, quæ cum a sumpto arsenico oriri soleant, sunt etiam ab ejus vaporibus, nec raro, alata. Cæterum ut ut res in puella se habuerit; quomodo tres, aut quatuor alios, quorum hic attingam historias, nonnullas infra (a) additurus, arsenicum interemerit, disquirere non erit opus. Nam a Tyſone (b) diffectus foramen neque exiguum, neque regulare habuit in ventriculo. Hujus autem visceris fundus in ventula, a Mauricio Hoffmanno (c) inspecta, quasi exulceratus, sphacelosus, & nigricans fuit. Sic etiam in altera femina, ab laudato Wolffio (d) descripta, inventus est plane erosus, nec sine gravissima sphacelosa ad pylorum inflammatione. Et in viro quem Cl. Henckelius (e) incidit, macula fuerunt, nec parvæ, aut ex flavo fusca, aut rubicundæ pylorum versus, se extendentes, & duo insuper angulosa foramina villosa tunica, alterum eodem versus, alterum versus œsophagum. Virum hunc consecrant brevissimo tempore vehementissimæ cardiacæ, ardores, cruciatus, lipothymia, vomitiones. Mulier autem illa magnis præcordiorum anxietatibus correpta, & vehementibus simul ac assiduis vomitibus, & dejectionibus, denique convulsivis motibus, artus misere distorquentibus, inter acerbissimos cruciatus obierat intra horas vix decem. Et nedubitare posses, unde hæc omnia, & in utriusque ventriculo arsenicum deprehensum est.

6. Hactenus quæ ex historiis sive in Sepulchreto extantibus, sive eidem, si volueris, adjiciendis, colligere licuit devorati præsertim arsenici signa, multo prolixius fortasse quam velles, haud inutiliter tamen, commemoravi. Nunc quæ ipse bis vidi, semel in uno, item in tribus, recensito: quos omnes, cum bene pensitarem cuncta quæ postea vestigando scire potui, eo veneno affectos fuisse, conjeci. Primus vir fuit robustus, & magno corpore, habituque plenior quem correptum febri curabam, jam remissa adeo, ut e lecto nonnunquam surgeret. Is vix semihora post cenulam in qua nihil nisi concisum panem sumperat in jure coctum, improvviso vomitu prehenſus est permolesco, eoque magis quod sæpius redibat. Venit ad me intempeſta nocte ex ejus domesticis unus rem narrans, & quid agendum, quærens. Ratus, molestiam inde augeri, quod inani jam ventriculo, æger vomere cogeretur, jus dari, & si nihilominus moleſta vomitio esse pergeret, enema ad averendum impero. Quæ cum frustra essent, redit ille; ego autem alia, & in his denique laudanti opiat granum unum præberi, jubeo, si non prodesset, ipse venturus. Laudano quoque post horæ quadrantem rejecto, furgo, & cum eo domestico ad ægrum eo. Inter eundem, miratus, vomitum sine manifesta causa tam pertinacem, tamque gravem subito extitisse, quæro, num forte aliquid æger peccaverit, & plus, aut aliud quam diſum esset, in cœna sumperit. Negans domesticus, imo, inquit, nihil præter panem illum sumpsit in jure coctum, & pulvere quo tu jufferas, ab N. conspersum. Ego vero qui nullum pulverem insperſi juſſiſſem, & quo esse posset animo is qui insperſerat, non ignorarem; tacitus, quid mihi protinus faciendum, quid silendum, quid in posterum, & quomodo cavendum esset, cogitabam. Jamque ad ægrum veneram angore ad cordis, ut vocant, ferobiculum misere querentem, & opem quamprimum implorantem. Nul-la ibi, aut in reliqua ventriculi regione tenſio, nullus dolor. At singultus cum ructibus sæpe, & sæpe quædam respirations difficultas moleſta erat. Pulsus valde frequens; sed parvus potius, & debilis. Bono animo Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

esto, inquam: quantum pravi humoris ejeceris, vides (& plurimum sane erat, viscido quo ipse abundabat, phlegmate supernatante; in imo autem erat panis quem sumperat, nec primis vomitibus, sed aliquot post horis reddiderat) nunc optimo humore es reficiendus: & continuo petum ex proximo magnum vaccini lactis cyathum præbui. Quo epoto, statim a me vitam sibi esse redditam, clamavit. Et profecto meliora omnia facta sunt; ut pulsus ante duas horas ad naturalem magnitudinem, & rubor redierit, angor remiserit, vomitus, ne arte quidem provocando, amplius reverſus sit. Lacte autem iterum, majori quam antea copia dato, ut vel ore, si res ita ferret, rejiceretur, vel intestina perliniret, atque perlueret, hoc alterum consecutus sum alvo soluta, simulque pulsus minus frequenti factus, spirandi autem difficultate, & singultu, quorum utrumque jam rarius accidebat, sublati, ut vix diebus infrequentibus, semel, aut iterum sint animadverſa. Pulſes quoque ex hordeo, aut oryza cum lacte parabantur. Seri autem quantum vellet bibendum dabatur; namque ut alvus fluere, sitis, & æſtus invaleſcebant, quæ duo e-poti feri copia levabat. Serum quoque, aut lac injectum ardoris sensum quo laborare cœperat podex, mulcebat. Ne longum faciam; intra duos, tresve dies profusus ablacta erant omnia quæ venenatum illum pulverem consecuta fuerant, nec quod homo vixit; vixit autem postea complures annos; ullum noxæ in ventriculo, aut intestinis relicta vestigium ostendit. Sic viscido quibus, ut dixi, abundabat, humores, & cita, ac sæpius repetita vomitio, & lac denique, ac serum, quorum copia quidquid veneni, aut ejus effectum in ventriculo, & intestinis restabat, irretiendo, diluendo, abstergendo, & per alvum educendo, sublatum est, hominem servavit. Quæ autem ratione caverim, ne pulvis ille, quem album fuisse, intellexi postea, tunc iterum, ægrotanti daretur, aperte scribere nunc possem; diu enim est ex quo illi mortui sunt; simulque ostendere, quanto in periculo aliquando sit Medicus, ni se intelligere quædam, dissimulet, & in quanto æger, sive quadam donec ægrotat, a Medico audiat, sive non audiat, & quem tamen ad modum tum ab ægro novas inſidias, tum a me ipſo scelerati hominis, si per me se impediri sentiret, ultionem averterim. Verum ad ea quæ in tribus aliis vidi, in quibus eadem conjectura, sed non eadem dissimulatione opus fuit, transire jam præstat.

7. Infrequentis anni, qui fuit 1711. Majo mense a sacra peregrinatione domum redibat optimus Sacerdos Franciscus Balduccius, cum Cæſenæ tantisper subſtitit, dum ipſe, & tres qui simul erant, ætate, viribus, prospera valetudine non minus quam ipſe, videntes, frugaliter, & sine cunctatione pranderent. Erant ii fratris uxor, vir alter, & altera mulier. Mox a prandio e diverſorio exeunt, & in viam ſedant. Non multum proceſſerant, cum Sacerdotem tantus ventris corripuit dolor, ut ex equo deponi neceſſe fuerit. Depositus est multa, & sæpius tum vomeret, tum deſiceret; ille tamen dolor, cum inexplicabili angore conjunctus, increvit adeo, ut animam agere videretur. Cæſenam reveſtus, a Medico creditur colico dumtaxat dolore torqueri propterea quia cruciatuum ſedes in regione erat epiploica dextera. Itaque totum illum diem, & magnam noctis partem tot enervata, fotus, potiones, bolos tum anodynos, tum purgantes adhibet, quot Medicus alter vix intra plures adhibuiſſet dies; incaſſum omnia. Nec tametsi mulierum alteram vomitibus inereat, & dejectionibus, & gravibus insuper animi deliquis correptam videret, virum autem querentem audiret de ventriculi æſtu, & pondere; quidquam de veneno ſuſpicabatur, credo, quia ſcæmina altera quæ eodem prandio uſa erat, nihil prorsus mali perceperat, & caupo quoque nil in eo prandio eſſe potuiſſe quod noceret, conſtantiffime aſſeverabat, & vir qui ſuaſpe ſponte the-riacam ſumere voluerat, auctum inde æſtum ventriculi ſenſerat. Ipſe ei quæ male habebat, mulieri anodynam imperat emulſionem. Sed hanc, & Sacerdotem morbus ipſe adjuvit, cujus vi e ventriculo, & intestinis multa ejicere perrexerunt. Quibus excretionibus denique ſub auroras conquieſcentibus, ſimul omnes Forum Livii convehuntur, meque conſectim accerſunt, & quæ ſibi acciderint, docent. Ego vero ſtatim quæſivi, fuiſſetne in prandio edulium aliquod de quo mulier quæ nil mali ſenſerat, nil comediſſet: cumque audi-

(x) Commenc. Litt. A. cit. Hebd. 24. n. 1. (y) Act. N. C. Tom. 5. Obſ. 95. (z) Commenc. Litt. A. 1735. Hebd. 30. n. 3.
(a) De Venenis &c. ubi an venenum nutriat &c. n. 6. (b) Exper. cit. Exp. 26. & 29. (c) Exp. 28.
(d) addit. ad Diſſert. cit. Exp. 10. (e) Exp. 9. (f) n. 3. (g) Exper. cit. Exp. 30. & 31.
(h) Exp. 35. (i) Act. N. C. Tom. 5. Obſ. 102. (k) Eph. N. C. Dec. 3. A. 5 & 6. Obſ. 137.
(l) Obſ. Med. 49. (m) Dec. modo. cit. A. 4. Obſ. 100. (n) Eph. N. C. Cent. 5. Obſ. 51. in Schol.
(o) Commenc. Litt. A. 1738. Hebd. 10. n. 3. (p) Eph. N. C. Cent. 3. Obſ. 15.
(q) Obſ. paulo ante cit. & Schol. (r) Eph. N. C. Cent. 5. & 10. Append. n. 1. Obſ. 38.
(s) Act. N. C. Tom. 2. Obſ. 10. circa medium. (t) Eorund. Tom. 5. Obſ. 29. in fin.
(u) Commenc. Litt. A. cit. Hebd. 27. n. 2.
(x) Commenc. ejusd. A. 1737. Hebd. 28. n. 2. (y) Eph. N. C. Cent. 3. & 4. Obſ. 126. cum Schol.

(z) Epist. 55. n. 12. (a) n. 9. & 21. (b) Act. Liſp. Supplem. Tom. 3. S. 4.
(c) in cit. Append. Obſ. 35. (d) cit. Obſ. 29. (e) Act. N. C. Tom. 2. Obſ. 155.

rem, fuisse, pultem nimirum ex oryza, quæ primum omnium in magna patina allata esset, fuisseque igitur in ea pulte venenum, dicerem; & nos crederemus, inquit, si qui de ea plus ederunt, gravius; qui minus, levius detrimentum retulissent: contra autem res se habet; nam Sacerdos hic, qui minimum, ut reliquorum eduliorum, sic & illius comedit, gravissime; mulier quæ aliquanto plus, minus graviter; vir qui plurimum, levissime omnium laboravit, & laborat. Sed num, inquam, non forte contritus caseus super, ut solet, erat inspersus? Cum fuisse, dicerent, & Sacerdotem, quippe fastidientem, nihil ferme, nisi de illo, fumpisse; mulierem autem multo plus de oryza, quam de caseo; virum denique vix de hoc aliquid, plurimum autem de illa vorasse; vos ipsi, inquam, vel me silentio, jam intelligitis, in caseo fuisse erodens venenum, ut mures necarent, fortasse admixtum, eo autem caseo minime, ut oportebat, seposito, infusum aliquem, dum in diversorio prandium instantibus vobis appropinquaret, pulti inspersisse. Vera tum dicere visus sum, multo autem magis, cum longo post tempore caupo, qui hos audiret evasisse, minus sibi jam timens, mutire aliquid non dubitavit. Tunc nihilominus dux restare dubitationes videbantur, altera, quod inter edendum odorem quidem minus gratum quendam, puto ex pravo caseo, nullum autem insolitum saporem, nullum vel postea in lingua, aut faucibus erosionis sensum perceperant; altera, quod et si venenum erodens fuisse, conjicerem, quodnam tamen ex erodentibus fuisset, ut peculiare opponi antidotum posset, non constabat. Verum in superiore quoque casu (f) eadem esse potuissent dubitationes. Neque enim, ut ex silentio meo tute argueris, ullum in lingua, aut faucibus erosionis fuit indicium, neque peculiariter quodnam venenum datum esset, sciebam: & meam tamen erodentis veneni conjecturam lace, & ferum tanta cum utilitate præbita confirmantur, simulque ostenderunt, ubi veneni species ignota est, nec proprio ejus licet remedio uti; at eo saltem utendum esse quod illius, quippe minus ignoto, generi adversatur. Necissemque adeo in casu hoc altero quod in priore, nisi multo plures jam prægressæ, nunc autem prorsus sublata vomitiones, dejectionesque, nullusque superstes angor, nulla tormina ejectionum jam venenum visa essent significare. Tamen si quid forte adhuc restaret, ut occurrerem, simulque ut scitis, & febris, quæ tantam evacuationum copiam, tantamque erant commotionem secuta, rationem haberem; feri plurimum bibendum dedi Sacerdoti quidem, & mulieri. Nam viro, qui neque sitiret, neque fabricaret, neque aliud a me peteret, nisi ut ponderis sensum, ventriculum gravantis, auferrem, facile annui oleo dato amygdalino ea mente, ut vomitum potius, quam dejectionem, moverem eo remedio quod liquid forte erodentium particularum reliquum esset, simul irretiendo, obliniendoque prodesse posset. Verum cum vomitus ne digitis quidem penitus in os insertis consequeretur; alvus soluta esset, sensusque ponderis omnino sublatus. Cui deinde optime habenti, nihil nisi pultes ex oryza, & lacte commendavi. Quas & reliquis duobus dedi cæne loco, cum jam a largo feri potu febrim, sitimque levissimas factas esse, animadverterem. Nox optima fuit, ut postredie mulier sine febre, aliove omni incommodo jam esset; Sacerdoti autem, decrecente magis magisque & febre, & siti, nihil præterea restaret de quo querebatur; nam & sensus in mingendo ardoris qui pridie fuerat, jam nullus erat. Quibus etsi toto eo die, & proxima nocte, & infrequentis diei magna parte omnia in melius ire pergebant, & alvus lubrica sine ullo ardoris sensu respondebat, non ego tamen eadem dare intermissi quæ biduo dederam.

8. Ecce autem ineunte quarto die ex quo immanis ille dolor Sacerdotem prehenderat, eadem pomeridiana hora, nulla prævia manifesta causa, ad eundem modum prehendit. Pedes initio frigebant, pulsus nonnihil contrahantur. Præter dolorem, molestissimus erat quidam toto ventre inexplicabilis angor, a quo spiritum sibi intercepti æger maximopere querebatur, eoque potissimum se cogi, aiebat, ut modo huc, modo illuc misere se contorqueret, nonnunquam surgeret, atque ambularet. Sed dolor tenebat regionem epiploicam dexteram, & proximam lumbi partem, inde aliquando in transversum per hypogastrium, alias in dexterum scroti latus, interdum in propinquum femem se extendens; ut nephriticus videri posset. Verum neque obnoxius homo unquam

fuerat dolori nephritico, & præterea, si vomitus, & dejectiones excipias, simillimum qui ante quatuor dies ingruerat, nephriticum non fuisse, tum illa quam supra exposuimus, proxime præcedens causa, tum graves ab hac in fociis eodem tempore effectus satis ostendebant: denique urinæ nihil mutata, & sanorum omnino similes contra atque in nephriticis solent; non ejus generis dolorem esse, confirmabant. Attamen cum neque eorum quæ exterius adhiberi jufferam, quidquam prodesset; enigmata autem negaret æger se posse admittere propterea quod simul hæmorrhoidum tumor, & cum tenesmo tantus dolor accesserat, ut si ab immixta fistula magis exacerbaretur, par ferendo esse non posset; me necessitas urgens lexandi, & nephritici doloris similitudo ad auxilium tentandum impulit in hoc proficuum, nimirum tepidum emolliens balneum. Nec me spes fecellit. Vix enim in balneo confederat æger, cum angor primum, & paulo post dolor remiserunt. Sed e balneo egressum cum uterque rursus vexaret; conciliare paulisper somnum, & sic reficere coactus sum. Itaque grano uno sumpto laudani opiat, horam unam dormivit. Expectato, & dolore aliquanto minus laboranti, ut capere aliquid cibi jam posset, pristinam dedi ex jure pingui, qua accepta, reliquam noctem dormivit. Postredie febrecitanti, sed nullo jam cum ventris dolore, amygdalinum oleum præbui, certa autem hora clystia ex lacte, & mucilaginibus imperavi, cui ne dolor, quamvis minor factus, hæmorrhoidum obstaret, exigua turunda profuit, quippe ex Amici Medici observatione ad dolores venarum illarum mulcendos idonea; turunda autem exempta, siphonis fistula, ut minus molesta esset, inverso pulli tenuiore intestino obducta, sicque sensum, sensimque immixta. Iniecta cum horam, eoque amplius retenta ejecisset, levamen inde retulit angoris alicuius, etiam tum in ventre superstitis, & sitis. Adversus quam, & oris amarorem multa epota Nucérina aqua profuit. Exinde omnia magis semper in melius verterunt. Atque iidem fere mulier quoque adjecta est, cum flavæ dejectiones, utiles quidem, sed sitim, & leves quodam ac vagantes ventris dolores, & tenesmus cum ardoris sensu afferentes, subinde molestæ essent. Nec Sacerdos flavis dejectionibus caruit, sed minus fluidis, nullumque, nisi hæmorrhoidum, dolorem moventibus. In his muci erant, qui semel in globum compacti, cum hunc attentius inspicerem, quasi indigestum adipem, quocum tendinea permixta esset substantia, referre videbantur. Is globus prodiit quarto a recidiva die cum solidiscrementis, sanguine tinctis, non admixto, sed superficie tenui asperso, ut ex hæmorrhoidibus esse, intelligeres. Sicque hi quoque duo intra undecimum a prandio illo diem convalescentes, multos annos postea sine ullo relicto in ventriculo, aut intestinis læsionis indicio, vixerunt. Quin Sacerdos nullo alio morbo, nisi Aorta intra thoracem aneurysmate, quod, sexennio post inchoatum, diu pertulit, ad extremum confectus est.

9. Nunc ut ab his ultimis incipientes, ad cætera quoque in propositis quatuor ægrotantibus observata, aliquid adnotemus; si forte in Sectione hac X. Sepulchreti (g) Paavium credentem animadverterem, exhiberi venenæ signa fuisse immanem ventriculi cordis dexteri, & proximæ venæ Cavæ dilatationem, & sanguinem in corde, venisque omnibus vi, ut putabat, frigidissimi veneni in vivente corpore concretum, quasi septima a morte hora cadaver non secuisset; noli ad ejus confirmandam opinionem, Sacerdotis nostri aneurysma referendum putare. Nam dilatationes ejusmodi non cito adeo fiunt, ut videtur ille arbitrari, nec certe in nostro aneurysmate incipientis signa, nisi post plures, ut dixi, annos ostenderunt; ut si vel a constrictionibus quæ doloris, & angoris tempore contigerint, primam habuisse originem, suspiceris; pro veneni tamen indicio accipiendum id contendere non possis quod a tot aliis causis tam longo temporis intervallo factum esse, cæteri queant existimare. Quod vero ad sanguinem attinet tum in venis, tum in corde ipso concretum; non raro id tibi in cadaveribus eorum inventum retulimus quos causa longe alia ac venenum, interemerat; ut si a concreto intus sanguine, quemadmodum in subiecto Scholio conjicitur, factum esset, ne cor Germanici (h) combureretur; complurium quoque aliorum corda in quibus nulla esse veneni suspicio posset, igne absumi nequissent. Quid? si huc illud addas quod Solertissimo Meadio (i) placet, venena in nervos præcipue, non in sanguinem,

nem, agere, a qua sententia non abhorruisse videtur Har-derus (k): nec sane de quibuscumque venenis negari id potest, ut puta quæ illico interimunt, quales Vibulenus Agrippa (l) in ipsa Curia (non ex amulo, ut Baccius (m) scribit, tunc alios quosdam, ut opinor (n), in mente habens) sed de promptu sinu venenum hausit, prolapsusque ac moribundus, ne festinatis quidem sistorum manibus prius in carcerem rapti potuit, quam fauces jam exanimis laqueo vexarentur, aut quale Neronis iussu velocissimum ac præsentaneum paravit Locusta (o), quo & porcellus statim exanimatus est, & Britannicus ad primum gustum concidit; virus enim (p) ita cunctos ejus avus pervasit, ut vox pariter & spiritus raperentur. Ipsi autem Meadio (q) nullum ad suam sententiam confirmandam aptius vitium est, quam venenum illud quod, ex Nicholii experimentis, memorat canem in ipso pergituram transitu non integro dimidio temporis minuto necare, imo injectum in extremum intestinum momento idem facere, nullis inflammationis, vel corrosionis signis extantibus; ut minus mirari oporteat quæ de cuniculo ex Sproegelio, aut de puella ex Ettmülleri filio supra (r) adnotavimus, utroque propterea ad eundem modum rem explicante. Quoniam tamen dum venena afficiunt nervos, motum sanguinis variatum fieri, vel intercepti, ut Wepferi (s) utar verbis, live ejus circulationem nunc impeditam, nunc confusissimam esse, contingit; contingit quoque, sanguinem aliter in aliis constitutum deprehendi. Itaque Meadius (t) fieri, censet, ut si universali paralyti a veneno indulta, subito circulo circumfusus, sanguis in vasis perfectè fluidus periret, alias autem (u) ut circulatione turbata, secretionibus interruptis, minimis vasculis stagnatione impeditis, quæ omnia ob affectos nervos contingunt, sanguis ipse varie mutetur, ut pote qui cum fit humor ex diversis permixtis compolitus, mutationibus quibuscumque obnoxius est solo mutato motu. Mutationes autem hæc sanguinis, præterquam quod neque primus, neque proprius effectus devorati veneni sunt, pro varia non modo nervorum affectione, sed & sanguinis ipsius dispositione longe alie in aliis corporibus esse possunt. Itaque, ne ab arsenico recedamus; mortua ob illud mulier fluidum, ut supra (x) legisti, sanguinem habuit, atque coactum; mortuus autem ob idem causam, quemadmodum retulimus supra (y), grumolum habuit, & nigrum. Et ipse memini, cum mixtos ab Amico mures novem ex majoribus arsenico enechos dissecarem, vidisse in cunctis auricularibus cordis nigro sanguine diftentis, sed neque coagulato, neque, ut in viventibus, valde fluidum. Verum quia non ut veneni effectus, sed ut alia atque alia, ad naturales quasdam structuras attinentia, perspicere, illas bestiarum habeo, nisi in omnibus valde plenum fuisse ventriculum, nec, quantum exterius apparebat, in ullo inflammationem, multoque minus pertulit, quorum utrumque de intestinis quoque dictum putato. Nec Heydus (z) in duobus qui idem venenum voraverant, maribus relictum limo, & pane ventriculum inflammationem, aut erosum fuisse, ait. Illud vero ait, cum alterum mortuum dissecaret; nam alterum vivente incidit; nihil e vasis effluxisse sanguinis, imo e cordis ventriculis, e jus vasa abscisso, ne gustum cruoris stillaret, an quod alia in vasa secessisset, an quod concretus esset, cum verbum hanc de re non addat, incertum. Contra certum est ex Præstantissimi Elleri (a) experimentis, cum sanguini recens educto tertiam, aut quartam partem solutionis arsenici admiscuisset, illico sanguinem esse spissatum, ejus tamen globulis, si per microscopium inspiceret, maxime extenuatis, dissolutis, & quali in motum actis: quos inter hic illic peripicue apparebant parvæ crystalli triangulares, scindentesque mucrones sagittarum referentes; ut ex his omnibus intelligeret, erosiva ejusmodi validissima venena agere destruendo non tam fluidas, quam firmas partes nostri corporis. Sed neque ille ignorabat, devoratum quidem arsenicum non ita immediate sciri non posse, vides. Præstat igitur, ut ab extracto sanguine ad vivos corpus, & a canibus, & muribus ad homines redeam, & quæ in his ab devorato arsenico dissecans Raychius (b) invenit, proferam. Aliquoties Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

ille ejusmodi cadavera inspexit: & contra atque ii qui in tali casu, solummodo sanguinem coagulati autumant, nunquam ipse coagulatum reperit, sed ventriculum exulceratum, si satis quidem temporis ad id fuisset, ut in femina cujus ventriculi magnam partem in liquore servabat, in cujus tunica intima, variis locis ulceribus affecta, arsenicum album hærebatur. Quod sicutus interruissent; tum puncta sanguinea hic illic vidit per ventriculum disjecta.

10. Ex his Raychii Observationibus cum iis quæ supra (c) memorata sunt, junctis, præclare intelligitur, primum, ac proprium devorati arsenici, & ejusmodi corroderentium venenorum effectum edi in ipsas intimas canalis alimentorum tunicas, ventriculi præsertim, in quo primum moratur, irritatis earum nervis, ipsique tunicis compunctis, & si tempus detur, inflammatis, exulceratis, perforatis. Itaque in ejusmodi infortuniis nihil accidere felicius potest, quam ut ventriculus id quod ingessit, rejiciat illico, aut certe quam citissime: unde præcipue factum est, ut qui curati sunt a nobis (d), evaserint. Quin multo felicius generoso cuidam Viro accidit, ut cum pro cremore tartari binas tartari emetici drachmas sumpisset, mox aliquot non sine præcordiorum angustis, infectis vomitionibus, ab omni ventriculi incommodo solutus sit, censente Cl. Dethardingio (e), vix nonnullis pharmaci moleculis dissolutis, & ad vomendum stimulantibus, non datum esse tempus dissolutioni reliquarum, sed omnes, quæ certe hominem tanta illa copia peremissent, fuisse rejectas. At sunt qui natura minus ad vomendum sunt prompti. Sunt etiam quibus ejusmodi in casibus contendunt adeo fibræ pristinæ sinistri ventriculi, & gulæ, ut fibræ resiliant se in reliquo ventriculo contrahentibus; nec semper succedunt, resistentes illæ fibræ, ut Wepferus (f) docet, laxentur; sunt enim casus in quibus homo tunc deglutit, & tamen inani vomendi desiderio laceffitur (g). Illi etiam qui cito non vomunt, minus aliquando periclitantur, ut si, ventriculo pleno, venenum vorent. Itaque Baccius (h), cum suspectum convivium non potest vitari, consilium dat, ut nec sitibundi, neque famelici accedant, sed præsumpto lacte, & saturi crassius ac pinguis cibis. Viderat enim (i), ex eodem parvo alimentato quo omnis familia usa fuerat, dominum dumtaxat mori illo ipso die; nam ventre vacuo comederat; servatis cæteris qui pleno. Quæ res etsi non semper a veneno defendit, hujus saltem haud raro vim perniciosam retardat, ut in muliere vidisti a cujus casu hæc Epistola inchoata est, & Capuanis quoque Senatoribus ferme duodeviginti ideo ferus mors accidit, quia impleti cibus, vinoque cum venenum sumpissent, sic minus efficacem in maturanda morte vim veneni fecerant, ut Livius (k) memoria historiarum mandavit. Quod si inani ventriculo veneni paucillulum, fed multo cum cibo, deglutitur; mirum non est, si levius periculum fiat. Sic enim venenum aut accetur a ventriculi tunicis, aut multis admixtis retunditur. Secundum hæc, pleraque eorum quæ supra a nobis scripta sunt, explicare licet. Pleraque dixi; nam quædam sunt profecto difficiliora, illud in primis, cur Sacerdotem (l) dolores non in ventriculi regione, sed in epiploica dextera corripuerint. Quod si quarto dumtaxat die accidisset; conjici tum posset, quasdam veneni particulas, in primis illis Coli intestini cellulis retentas, pupugisse. Mox autem a veneno sumpto; nisi ventriculum; ut in quibusdam corporibus, aut, quoniam id rarissimum est, duodenam intestinum aliquanto dexterius fuisset, aut aliud ejusmodi comminiscaris; non facile intelligas.

11. Quod vero in curatione, theriaca, aliive ejusmodi antidotis uti, mihi ne venerit quidem in mentem, nihil mirarum te, scio. Cur enim, cum erodens venenum esse, censerem; oleum camino adderem, illudque magis commoverem, aut certe ejus effectus augerem? Et sane videbam de quatuor quos curavi, cura unus theriacam sua sponte sumpisset (m), illi æstum ventriculi esse auctum: quo minus miror, puerum in Sepulchreto (n) commemoratum, cui theriaca bis data est, intra quartam horam a comesto arsenico interiisse; & si Jo. Faber (o) juveni qui risagali pulvere pro cinnamomo

(f) n. 6. (g) Obf. 4. §. 1. (h) Sueton. de duodec. Cæsarib. l. 4. c. 1. (i) Tract. de Venen. passim.

(k) Sepulchr. S. cit. in Schol. ad Obf. 17. Additam. (l) Tacit. Annal. l. 5. (m) De Venenis ubi de venenor. ingess. levitatis. (n) Vid. Plin. Nat. Hist. l. 23. c. 1. & Annot. Dalcamp. (o) Sueton. l. 6. c. 33. (p) Tacit. Annal. l. 13. (q) Tract. cit. in Append. Totam. 5. (r) n. 5. (s) Sepulchr. ibid. in Schol. ad Obf. 3. (t) Append. cit. (u) Introduc. in fin. (v) n. 3. (w) n. 4. (x) Obf. Medic. 48. (y) Hist. de l'Acad. R. des Sc. de Berlin A. 1752. Class. Philol. Experiment. (z) Theat. Anat. 8. n. 70. (a) n. 3. (b) n. 3. 4. 5. (c) Eph. N. C. Cent. 9. Obf. 74. cujus scilicet. (d) Scholio cit. supra ad n. 9. (e) Sect. hæc Sepulchr. Obf. 4. §. 6. (f) De Venen. ubi de Particulari Practic. n. 2. (g) Ibid. ubi Venena quibus modis fieri possint irrita. n. 10. (h) Historiar. l. 26. (i) supra, n. 7. §. (m) n. 7. (n) Sect. hæc in Addit. Obf. 13. Hist. 7. (o) Ibid. Hist. 12.

usus erat, nihil nisi mithridatum, præbuisse; certe non servasset. Servavit autem, quia simul iuscula pingua, & lac copiose exhibuit. Sic etiam ab Jo. Jod. Cyfatio (p) puerum, & puellas duas, ingesto arsenico periclitantes, servari potuisse, credo, non quod Elest. Orpimentum, sed quod antea lac crebro dedisset, natura autem hos omnes citis vomitionibus antea adjuvisset. Neque enim illiusmodi alexipharmaca possunt erodentes particulas irritare, aut sic obstruere, ne pungendo inflamment, & exulcerent, aut exulceratas partes lenire, & abstergere; sed illis motum, & vim addere, his vero calorem, & irritamenta. Contra autem, lac, oleum, viscidula alia, tum serum, atque adeo ipsa aqua, alia irriteri, alia diluendo, liniendo, abstergendo quantum possint, manifestum est, si ea quidem copia dentur qua vomitiones adjuvent, & siquid post has reliqui sit, diluant adeo, ut noxiam ejus vim obruant. Et Veteres quidem, tametsi nonnulla quoque minus convenientia proponerent; ea tamen quæ modo laudabamus, quanti facerent, satis Ardoynus (q) ostendit. Recentiores autem, inutibilibus, noxiisque omissis, cætera, cum occasio tulit, suis alii scriptis, alii aliorum etiam collectis Observationibus comprobant. Sic de lacte, præter illas quas supra (y) indicavimus, plurimæ extant alie, in quibus ea præfertim est quam ex Hoffmanno descripsisse se, ait Henricus Doerlichodius (f), decem videlicet juvenum a iusculo avenaceo cui arsenici plus ferme quam uncia duæ cum facchari totidem admixtum fuerat, brevi mase habentium, servatorum tamen per lac tandiu exhibitum donec omnis vomendi conatus cessaret: tanta autem copia exhibendum fuit, ut singulis vix decem mensuris lactis sufficerent. Sic de oleo (i) & oleum seneam-galinalium us quoque, ut aliis pluribus, datum est) quid Recentiores, non secus ac Veteres, censuerint, a Viro Cl. Joanne Gentili (r) propositum leges. De aquis autem, in quibus serum, & aqua ipsa est, apud Ettmüllerum Disputationem inspicito quæ inscripta est *Parva magnorum morborum Initia*. Habebis in ea (u) exemplum hominis qui hausta per errorem aqua, ut vocant, forti, epota mox aquæ magnæ vi ab omni noxia immunis est redditus. Ad quod adde alterum ex Sydenhamio (x), qui hoc uno remedio copiose & dato, & per sedem injecto, eum servavit qui heud modicam mercurii sublimati corrosivi quantitatem deglutiverat. Et Boerhaavius (y) ubi ea proponit quæ adhibenda sunt, cum sumpti veneni species ignoratur, non modo eam Sydenhamii curationem, sed & pleraque eorum laudat quæ paulo ante dicebamus, & in agris illis adhibuimus, ne balneo quidem, & opio denique, prætermisissis, quod etiam ostendit quatenus utile esse possit. Cætera in eo quem modo indicavimus, loco apud Ettmüllerum non omittuntur: quæ ut profuerint cum venenum minus esset notum, Secreta in Sepulchreto (z) Observatio monstrat. Cum vero ejus species cognita est, quanto præstet remediis uti, ipsi peculiariter adversantibus, duæ primum haud dissimiles, exitu autem dissimillimo docebunt historici, altera ibidem (a), altera apud Cel. Meadum (b), si inter se conferre volueris. Cæterum ab uno, eodemque veneno quam varia in tribus illis quos simul curavi (c), sint orta symptomata, nisi per te animadvertere potuisses, hic admonerem. Sed satis de mineralibus, cum etiam quæ a sumpto sulphure detrimenta viderim, alias (d) acceperis. Nunc quædam de vegetabilibus venenis attemamus.

12. PAUPERCULA nata annos circiter sexaginta, quæ se; quæcunque ejus rei causa esset; alias voluerat in flumen decedere, novissime cum ex rhododaphne, quem fruticem nostrates vocant *oleandro*, magnam fohorum vim decerpisset, ex iisque contulis expressum succum, admixto vino, bibisset; tribus fere post horis a mulieribus quæ in proximis erant Zotheculis, audita est vomere vehementer. Accurrunt: quid fecerit, intelligunt: & sitienti aquæ cyathum præbent, post vomitum ratæ nihil mali relictum iri. Verum cum mox pessime habere cernerent; Sacerdotes primum, tum deinde & nostrum, qui forte haud proculerat, Mediaviam accersunt quincta circiter ex quo mulier succum illum bibere, hora. In respiratione nihil animadvertit quod magnopere esset adnotatu dignum, neque in facie, si fuscula, & inferius præsertim, excipias; nam cætera aut

naturali erant colore, aut vix ad pallidum nonnihil vergebant: nec frigidum corpus erat, sed dumtaxat paulo minus quam tepidum. Cum femine quæ adstant, dicerent, jam nullam superesse loquendi facultatem; inclamavit in aurem agræ, quæ sopitæ intar jacebat, brachium porrigeret, Illa vero facile ad sedendum se erexit, & cum mulieres interea brachium alterum protraxissent, ipsa mox alterum præbuit. Pulsus erant parvi, debiles, subduri. Interroganti respondere conata, inconditam quidem vocem; sed nullum distinctum edidit verbum, digito humorem quem vomuerat, nec ita paucum, humi indicans. Et præscripsit ille quidem quæ continuo potanda daret. Sed frustra. Illa enim, al' ferme accipiens, quarta exinde hora mortua est; ut ab epoto succo horas vixerit haud amplius novem. CADAVER postredie, qui dies fuit XIV. Kal. Decembres A. 1745, cum Judicis rerum capitalium iussu secandum esset, eique sectioni idem præfessit Mediavia, a quo mihi hæc omnia insequenti die sunt diligenter narrata; primum omnium animadversum est, nusquam in supino corpore livorem ullum, aut ullum tumorem, ne ventris quidem, apparere; in prono autem omnia a capite ad calcas colore esse violaceo.

Abdomine mox, & Pectore apertis, intus calor etiamnum aliquis perceptus est; tametsi hora esset ab obitu decima septima. Intra illud omnia secundum naturam se habentia, & posita occurrerunt; ut nec ventriculus, nec ullum intestinum tumeret; nam quod Colon in medio transversum illius fuit sub ventriculo tractus ad tres quatuorve digitos deorsum se inflecteret, indeque sursum rediret, res est quæ, sicuti ex nostris Epistolis intelligere potuisti, non rarissime vel in illis ostenditur, in quibus a natura potius, quam a morbo, sic esse videatur. Sed cum oculis attentius desigerent; venas quæ per ventriculorum, omentum, & intestinorum partem, mesenterio annexæ, feruntur, valde esse distentas, animadverterunt. Dissecto ventriculo, viridem in eo humorem mediocri copia viderunt; quo abjecto, nihil usquam læsionis in deterio ventriculo reperiunt, nisi quod rugæ quæ per fundum prope antrum pylori secundum longitudinem ducebantur, æquo duriores fuere. Neque præter consuetudinem quidquam in Duodeno, quod aperuerant, intestino deprehensum est, etsi non sine eodem viridi humore fuit, quem in ventriculo conspexerant, an a bile; quanquam hujus vesicula moderate plena occurrit; illuc effusa, cum acidis fuccis permissa; nam is quem hauserat mulier, nigrum potius ab admixto vino colorem retinisset. In Thorace, dexter pulmo ad pleuram annexus, & valde a tergo rubens, aliquid intus quasi concreti sanguinis habere visus est. At sinister non modo undique solutus; sed ita in se condens, ut si intus nihil ferme aeris esset reliquum, vix autem a tergo nonnihil rubens. In cordis ventriculis nihil prorsus erat five fluidi sanguinis, five concreti. Cujus, cum majora vasa dissecarentur, magna copia, sed neque in grumos coacti, neque iusto fluidioris, profuxit. Caput non attigere.

13. Eo libentius hæc Observationem scriptis mandavi, quod hoc veneno intersectorum anatomen apud quem legisse non memini; sumpti autem signa ab Recentiorum ullo observata. Majores vero non omnes hominibus nocere, imo aliqui prodesse, scripserunt. Rhododendros, inquit Plinius (e) ne nomen quidem apud nos invenit Latinum: rhododaphnen vocant, aut nerium: Mirum, solia ejus quadrupedum venenum esse, homini vero contra serpentes præsidium, ruta addita & vino pota. Potus enim, & capre, si aquam biberint, in qua solia ea maduerint, mori dicuntur. Quibus satis similia scripsisse videbis Dioscoridem (f): neque Apulejum (g), neque adeo quem tunc fere describebat, Lucianum (h) hinc nisi bestiarum perniciem memorasse. Certe ille fruticis hujus flores, quos vulgus rosas Laureas appellaret, venenum quidem rosarium dixit, sed quia cuncto pecori cibus earum letalis sit. Quin Lucianus ne cunctis quidem illis animalibus, sed afinis dumtaxat, & equis perniciem esse, scripserat. Fideliter enim latine sic rediderunt: *Malus est is obus asino omni, & equo: nam cum qui ex eo comederit, e vestigio mori, dicunt*. Contra; ut Scribonium (i) præteream non ita obscure indicantem, ab eo qui rhododaphnes solia ad dentium deglutire mandere voluerit, salivam non esse deglutendam;

dam; Galenus certe (k) hominibus quoque, non modo plerique pecudibus, perniciosum esse hunc fruticem, diserte docuit. Quem secuti Arabes Medici quoque præcipui, quos singulos ab Ardoyno (l) productos invenies, præsidia adversus id venenum proposuere. Signa autem ejus sumpti, tum ab eodem Auctore (m), tum a Matthiolo (n) collecta, huc ferme redeunt, ut vehementis oritur angustia, intumescat venter, & doleat, & fluat, inflammatio creetur, æstusque universi corporis, alienatio mentis, syncope, & mors subsequatur; hæc autem quia rhododaphne præter modum calefaciat, itemque incidat, mordeat, exulceret, resolvat. Quorum si gnorum, atque effectuum cum in descripta agræ, ejusque cadavere vix ullum facile agnoscas, contra autem alia, atque alia fuisse, videas; te credo idem quodego, optaturum, ut quotiescumque hoc veneno aliquis læsus est five præcis temporibus, five postea, eorum quæ ipsi acciderunt, scriptas haberemus historias potius, quam plurium Auctorum, quorum alii sæpenuero alios describunt, diagnoses, hypothesibus interdum fortasse magis, quam Observationibus, respondentes. Atque, utinam, sicut tot aliis & vegetabilibus venenis periculum in canibus a Wepfero, ab aliisque factum est, & viventium symptomata, mortuorumque læsa viscera adnotata sunt; ita etiam in hoc factum esset, aut nobis faciendi tempus nunc esset; nihil libentius quam inter se ejusmodi omnes Observationes conferremus, ut quid discernimus ab alia aut specie, aut temperatura, aut ætate, aut regione, aut plantæ parte, aut hujus constitutione, aut admixto denique humore existeret, liceret discipere.

14. Nunc si unam hæc spectemus Observationem; veri simile putabimus, egisse venenum hoc in ventriculum, ejusque nervos, & quod consequitur, in alios cum iis coherentes. Quid enim duriores illæ ventriculi rugæ, quid vomitus, quid expressa, ut videtur, bilis, quidamissa loquendi facultas, quid ille quidem quasi sopor, quid alia quæ nunc prætereo, nisi quarundam internarum convulsionum, contractionumque nobis conjecturam suadeant, a quibus cohiberi quoque potuit sanguis, & externas illas ventriculi, & intestinorum venas distendere? Nec vero dicas, si ventriculo interius vellicato, illa omnia contingere; multo ipsam magis anteriorem ventriculi faciem distentis valculis inflammata apparere debuisset. Namque ita vellicari ventriculum, ut ejus nervi irritentur, ad ea quæ diximus, explicanda satis est; inflammari autem, id vero minime necessarium est. Ut enim habitum in ipso homine Observationem primum commemorare; profecto Coriaria, sive planta illa quæ *Rhus Myrtifolia* Monspeliaca C. B. vocabatur, quam cito, quam repetitam, quam horrendam, quam brevi lethalem epilepsiam exciter, Clarissimus Vir Sauvages (o) ostendit. Idem tamen in viri cadavere, a comestis illius baccis admodum quidem interfecit, nullam cerebri, nullam aliusque partis læsionem potuit deprehendere, & nominatim ventriculi ipsius, in quo Coriaria etiamnum bæcæ erant quinque, cum cæteræ, emetico dato, fuissent rejectæ. Atque ut ad plura, & pluribus in bestiis observata transamus; certe nec pauca, nec levia passus est canis, itemque passa feles est, quorum illum datis nucibus duabus vomitibus Heydius (p), hanc napelli ingesta drachma Sproegelius (q) peremit. Canis tamen stomachus, & oesophagus, & intestinum naturali constitutione gaudebant: & felis ventriculus naturali erat similis, nihilque erosione simile visum est, villosaque tunica nitidissima, intestina cum visceribus reliquis sanissima. Itaque ut Heydius ex sua Observatione patere censuerat, veneno illo potissimum infectum fuisse fluidum, cerebri, nervosque irrigans; ita Sproegelius ex sua hoc conclusit (r): cum nullum, inquit, nec erosione, nec inflammationis in animali, hoc veneno interempto, signum viderim, vim suam potissimum in nervos exegisse oportet, vellicando nervos ventriculi membranam. Quin experimenta etiam inspicie Wepferi, Bruneri, Nicholii in iis animalibus habita, quibus vegetabile aliquod venenum, & nonnullis eadem quæ Sproegelius, & Heydius, præbuerant. Gravia in omnibus symptomata, nec multo post devoratum venenum ingruentia, nec omnium tamen inflammationum ventriculi fuisse, leges. In aliquo enim (s) interna ventriculi superficies alba erat, nec ullibi vel minimam inflammationis signum apparuit. In alio (t) anfractus ventriculi albicabant, & si alicubi paululum magis quam Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

alias observatur, rubebant, non tamen manifeste inflammationis signa observari potuerunt, tametsi anfractuum superficies minus alba erat, ac alias conspicitur. In alio (x) denique ventriculi, & Duodeni intestini superficies interna prorsus albicans, & omnis inflammationis expertus fuit. In nullo autem ex iis quæ dissecuit Nichollius (y) ulla intus membranarum inflammatio conspicienda erat; sed fluído, qualis & in fele Sproegelii fuit, fluído, inquam, sanguine distentæ venæ: quod adnoto, quia neque in quatuor modo commemoratis ex Sepulchreto animalibus ullus in sanguine grumus fuit; quin eorum alicui (z) pariter ac in propolita muliere (a), in cordis ventriculis nihil omnino sanguinis supererat. Cæterum non eadem in omnibus quibus idem ac quatuor illis, venenum præbitum fuerat, inventa sunt: imo in pluribus ventriculi inflammationis, ut minus tibi esse mirum debeat, si eandem in proximis saltem intestinis, aut in his simul, & in ventriculo extitisse ab alio aliquo ex vegetabilibus veneno, productis quibus historiis recentibus ostendamus. Solani quem furiosum vocitant, bæcæ cum perniciosos alias effectus, tum maxime in puellulo ediderunt: quem intra horas non multas miserandis modis peremptum, cum Vir Cl. Schreckius (b) incidere, vidit, inter cætera, Jejunum, & Colon intestina valde inflammata. Fungi autem, & nominatim ex ea specie quam Vaillantius sic designavit *Fungus medice magnitudinis totus albus*, annis superioribus prope Lutetiam Parisiorum id propemodum fecerunt quod Romæ, dum scriberet Plinius (c) fecerant, ut familiam interimerent; nisi natura, auxilio adjuva Experientis Medici Monnierii (d), qui symptomata omnia diligenter, & ordine describit, de sex qui comederant, quinque servasset. Idem Virginis quæ una omnium servari non potuit, cadaver perlustrans, inter alia plura quæ apud ipsum videbis, in ventriculo circa pylorum quædam inflammationis indicia, Duodenum autem intestinum valis tunicarum omnino sanguine refertis, interius, præter leves aliquot excoiationes, purpureis maculis distinctum, in summa inflammatum deprehendit. Ego vero & intestinorum, & ventriculi inflammationem a vegetabili medicamento, sed acriori, eoque interdum perneciem haud secus ac venenum, afferente, elleboro nigro inducam conspexi. Ita autem res se habuit.

15. VIR, cujus anni, si ex facie æstimares, necdum quinquaginta esse videbantur, corpore bene conformato, subpinguis, colore laudabili, quamvis ad fuscum vergente, capillis autem, & barba nigris, ob delirium quoddam melancholicum in Nosocomio curatus, propediem erat discessurus, cum extractum sumpsit, quod vocant, ellebori nigri. Unde alvo soluta, plura dejecit. Sed cum mali nihil expectaretur; prima nocte, id est septima, an octava ex quo id sumperat, hora, vomitus, & ventris dolores ingruerunt. Quæ mox, calido hausto iusculo, visa sunt conquescere circa horam noctis secundam. Quincta iterum extiterunt; iterumque minui visa sunt ita ut ante sextam lectum peteret: vomitu autem nihil rejecerat, nisi materiam ex viridi quasi nigrescentis quantum duo, aut tria cochlearia continere potuissent. Cubans quiescere visus est; certe nullam vocem indicem doloris edidit, quam in proximis lectulis cubantes ægri audierint. Hora tantum octava sonus quidam, ex ejus ore emissus, a ministris auditus est: ad quem accurrentes, hominem jam mortuum invenerunt. Quæ mihi, iis forte diebus, nempe circa medium Decembrem A. 1747. in Nosocomio Anatomen docenti, cum essent relata; quæsi primum, quale ellebori extractum, quantumque sumpsisset. Comperi autem idem quod aliis dari ibi solitum esset, videlicet, recens evulsis, contusisque radicibus simplicis aqua paratum; pondere autem semidrachmæ sumplisse, cum persape quidem ad scrupuli pondus, interdum tamen iis quorum alvus non facile solvitur, ultra semidrachmam sine ulla noxa exhiberetur. Tunc autem querenti, num aliud præterea quod nocere posset, homo autem querenti, responsum est, imo in eo peccasse quod non accepisset omnia quæ debebat. Nimirum quibus id extractum darent, eos, hoc sumpto, serum bibere: non bibisse autem hunc, post ejus mortem esse cognitum, ibi videlicet reposito fero, ubi positum fuerat, ut hauriret. His ita perceptis, duodequadragesima a morte hora sectionem aggressi sumus. CADAVERIS artubus minime rigidis animadversis, Venter apertus est. Ventriculus, & intestina vel

(p) Ibid. Hist. 2. & seq. (q) De Venen. 1. 2. c. 1. 2. 3. ubi de Curat. (r) n. 5. (s) Differt. de Lacte in Corollar. (t) Annotaz. alla pag. 64. v. 5. della Lett. Filof. (u) S. 47. (v) Epist. Respons. I. vers. fin. (w) Hist. 10. in cit. Obs. 13. (x) Hist. 13. (y) Ibid. Infir. S. 129. & Prælect. ad eund. S. (z) Hist. 10. in cit. Obs. 13. (a) Hist. 13. (b) Traët. de Venen. Tentam. 4. in fin. (c) n. 7. 8. (d) Epist. 57. n. 9. & seq. (e) Nat. Hist. I. 22. c. 11. (f) De Med. Mat. 1. 4. c. 77. (g) Metamorph. 1. 4. prope initium. (h) in Lucio, sive Alio. (i) Compos. Med. 55. cum Rhodii Not. (k) De Simpl. Med. facult. 1. 8. (l) De Venen. 1. 3. c. 21. (m) Ibid. (n) Comment. in c. 12. l. 6. Dioscorid. (o) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1730. (p) Obs. Medic. 50. (q) Experim. circa venena Exp. 21. (r) S. 5. (s) in Additam. ad Sect. hanc Sepulchret. Obs. 5. Hist. 1. (t) Ibid. Obs. 6. Hist. 1. (u) Ibid. Obs. 7. Hist. 1. (v) Obs. ead. Hist. 1. (w) Ibid. Obs. 8. Hist. 1. (x) Obs. 5. cit. Hist. 1. (y) n. 12. (z) Commenc. Litter. A. 1743. Hebd. 8. n. 4. (a) Nat. Hist. I. 22. c. 13. (b) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1749.

exterior hic illic inflammata conspeximus; ut cum Ileum intestinum alibi iusta esset, alibi iusto majori, aut minori latitudine; ubi æquo angustius erat, ibi pertennes tunicae, & sine ullo rubore, alibi autem rubicundis striis distinctae spectarentur. Tum ventriculo, & intestinis omnibus aqua immissa ablatis, & adaptis, illum cum annexa gulæ particula magna ex parte inflammatum, a sinistris tamen, non a dextris, invenimus; intestina autem hic illic, sic tamen ut minus levis in Tenuibus, quam in Crassis esset inflammatio, si Rectum excipias, in quo spatia quadam æque manifesto, ac ventriculus, erant inflammata. Nusquam tamen in cadavere hoc toto vehementer apparuit inflammatio. Lien æquo paulo major, & sima qua videlicet tangebatur ventriculum, facie roseo colore, totus autem adeo laxus, ut dissecti interiora pene diffunderent. In jecinore nihil adnotatione dignum, nisi forte bilis color, qui, ut per vesiculæ tunicas transpicebatur, ex viridi pallidus apparebat. Thorace aperto, pulmones sani, & undique soluti: neque cor, aut vasa Magna quidquam habuere quod adnotarem, nisi quod in his parum sanguinis, in illo vix aliquid fuit levis concretionis polyposæ. Cranium cum secaretur, paucum sanguinolentum serum defluxit: paucumque mox sanguis in Crassæ meningis Sinibus, & majoribus per Tenuem ramis est animadversus. Cerebrum, quod in eo qui melancholico delirio laborasset a primo miratus sum, laxum adeo, ut cum dextere exemptum esset, in mensaque anatomica depositum, continuo ipsam hemisphæriorum, extrorsum collabentium, pondus distaxerit partem posteriorem Callosi Corporis, nec tamen ab obitu dies tum erat sextus. Ea distractio non prohibuit in reliqua superiore, quæ integra erat, ejusdem Corporis facie illum peripicere fasciculum qui per medium secundum longitudinem extat, nihil ab eo quod solet, discrepantem. Mox perfecando cerebrum, neque in vasculis quæ per medullarem substantiam ducuntur, neque in Choroidibus plexibus defuisse sanguinem, vidi; sed eandem ubique laxitatem animadverto, ut in cerebello quoque, & Oblongata medulla, & in Pineali ipsa glandula, quæ major potius, & globosior apparuit, quam consuevit. In tanta autem cæterarum partium laxitate mirabile fuit, lacunar quod dexterum, finistrumque ventriculi tertii parietem inter se conjungit, minime fuisse distractum.

16. Ex postrema historia hujus parte haberes quod exceptionis loco ad illa adderes, quæ de cerebro etiam melancholice delirantium alias (e) ad te scripsimus; nisi homo ante obitum jam sanus esse videretur. Ex reliqua autem habes quid a nigro elleboro aliquando accidat, & in ventriculo, intestinisque inveniatur. Scriptum est quidem ab nonnullis, & nominatim a Guillelmo Fabricio (f) non modo quod legerat, Virum Principem pharmacopæ, ex elleboro nigro parato, interemptum fuisse, verum etiam quod ipse meminerat, Matronam corpore satis validam intra sex horas mortuam esse ex quo devoraverat pilulas capitales, quibus nonnihil extracti ejusdem ellebori admixtum fuerat; tamen vix vomitum, & dejectionem bis moverant: quam utramque mortem non ipsi elleboro, aut ejus extracto, quo felicissime in se ipso, nedum in aliis, usus erat, sed præparantium negligentia, aut imperitiæ acceptam esse referendam jure debebat. Verum quæ symptomata eas præcesserint mortis, aut quæ noxa in mortuorum interioribus reperta sit, neque apud ipsum, neque apud alios legisse, nunc memini. Nam quod Ardoynus (g) symptomata ab hoc veratro enumerat immanem alvi fluxum, adustionem linguæ, eructationem plurimam & inflationem, præter alia aliis quibusdam, & in his elleboro albo communia, in quibus sunt præfocatio, syncope, virium defectio, sudor frigidus, & spasmus ab inactione, si ex propolita Observatione judicium ferendum est, magis fortasse pleraque hæc symptomata elleboro conveniunt albo, quam nigro. Certe in descripto viro non apparuerunt. At eorum quadam cum vehementi vomitione, quam recte ille albo adscribit, in iis adnotata sunt qui ab albo sumpto perierunt, ut in muliere, quæ, ut refert Joannes de Muraltio (h), post creberrimos vomitus, horrendis agitata convulsionibus occubuit, utque in tenero catello de quo Wepferus (i), mortuo ad eundem modum; quamquam canis de quo Courtenius (k), quadruplo ex eodem elleboro devorato passus quidem

est vomitus, dejectiones, singultus, suffocationes, dolores etiam, ut videbatur; sed evasit tamen. Ut ut est; quæ in hoc viro acciderint ab nigro elleboro, accepisti, ut illa pariter quæ in ejus visceribus sint deprehensa. Ab albo enim elleboro ventriculus rubentem, imo etiam interne corrosum, & nigricantem repertum esse, ex catelli, & mulieris de quibus modo indicatum est, vulgaris sectionibus scire poteris. Ab nigro autem quid humanus ventriculus, & intestina detrimenti ceperint, fortasse, nisi ex nostra descriptione, pro certo cognoscere non potuisses. Quod si illud ex eo, ut videtur, revera acciderit, quod is vir post devoratum extractum, larga, ut cæteri, portione feri, ab Hippocrate (l) etiam post veratrum nigrum imperata, non sit usus; hinc quoque illa quæ supra (m) diximus, de feri in iis qui acre venenum sumpserint, utilitate, confirmantur. Fuisse autem virum ad inflammationem per se dispositum, nec copia, nec constitutio sanguinis ostendunt, quippe cum paucis, & fluidis fuerit. Neque enim in quibusdam negaverim, veneni effectus a corporis dispositione augeri, cum facile agnoscam, a prava ipsa corporis dispositione internum aliquando posse venenum signi.

17. Et sane veteres quoque Medici (n) eisdem fieri affectus, agnoscebant, & a lethali veneni portione, & a corruptione quæ a corpore ortum habeat, videlicet posse hanc esse adeo vehementem, ut veneni tum qualitatem, tum vires æquet. Neque ex posteris plerique deinceps alieni fuerunt ab hac sententia. Quam nescio an ulla confirmare evidentiis possit, quam hæc Observatio, necum olim communicata ab Joanne Francisco Cicognino Foroliviensi, spectato, dum viveret, experientique Chirurgo, qui at Florentiæ didicerat, sic Redii more periculum fecit.

18. FILIOLUS Francisci Ridolfi Picioris Foroliviensis, Tertiana febre maceratus, extenuatusque, novissime diris convulsionibus ingruentibus confectus fuerat. ABDOMINE inciso, apparuerunt intestina ad contractum mesenterium retracta, eorum tunica subrigida, & quasi exsiccatas. Quæ, ut ventriculus quoque, multam continebant æruginosam bilem, cujus attractu scalpellus violaceo colore inficiebatur. Eundem scalpellum, eadem bile stillantem, in carnem unius, & alterius columbi cum leviter impreffissent sic quidem, ut bilis intra vulnus remaneret; haud multo post uterque tremens, & convulsus periit. Quin etiam mica panis, illa admixta bile, a gallo devorata, hic quoque parem habuit exitum.

19. Et si eximius olim inter Patavinos Professores Medicus Jo. Dominicus Sala (o) asseverabat, interna venena raro generari in corporibus aliquoquin boni habitus, & nullis commissis erroribus; variis ita repente, ut ex aliis partibus, aut aliis accidentibus eger non prævideat; tamen hoc ipso quod raro, aut rarissime contingere id posse, non negabat, ab iis de quibus supra (p) indicatum est, discrepabat Medicis, qui (q) extantibus aliquo in homine veneni signis, minime dubitabant, facile discerni posse eos qui venenum sumpserint, ab iis qui aliunde, nempe intus genito veneno, affecti sunt. Qui enim suapte natura probis humoribus abundarent, ac sanorum more se gessissent, eos venenum sumpserint, aiebant. Est certe aliquid in eo proferendo judicio, sanus, an non is homo esset quo de agitur. Nam in Severino Falckio; ut petitis e Sepulchreto (r) exemplis utar; neque omnium quæ fumeret, vomitus, nec ventriculus intus rubicundus, & tantum non excoriatus veneni, novissime præsertim dati, suspicionem movere poterant, cum scorbutus, vagæ febres, dein appetitus deiectionis, & sævissimi stomachi dolores jam diu vexassent. Contra in Juvene de quo Sala quarebatur sententia, præter cætera exhibit veneni indicia, illud quod boni esset habitus, & bene valeret, tantum apud Salam poterat, ut cum in Relatione altera fuisse is Juvenis scriberetur valetudinarius, & mali habitus, ille suam suspicionem primam moliret. Tamen ut sapiens vir erat, neque primo fuisse, neque secundo non fuisse venenum exhibitum, pro certo voluit respondere. Et sane ut abundet corpus bonis humoribus; ista ipsa abundantia facit, ut homo suspecta habere bona sua debeat, nimirum ne retro, quasi ruina quadam, revolvantur: quæ Celsi (s), Hippocratis (t) monitum secuti, sunt verba. Nefarios autem veneficos, ut nulla suo de scelere suspicio sit, affecta valetudinis occa-

sionem haud raro aucupari, novimus: quod & una monstrat ex superioribus nostris Observationibus (u), & alias alibi factum esse antiquis etiam temporibus, animadvertimus. Sic verisimilissima femina, & filio magis, quam genitoribus, digna, Agrippina (x), cum maritum veneno tollere statuisset, isque valetudine adversa correptus esset, hanc sibi oblatam occasionem non omittendam putavit, eademque ad facinus occultandum aliis insuper non insolitis veneficorum fallaciis usa est. Ideo enim, ut opinor, venenum delectabili cibo boletorum insudit viro avidissimo ciborum talium (y), ut multum ex iis comedendo, noxam tum ex nimia copia, tum ex pernicioso fungo aliquo, boletis quasi per coqui errorem interjecto, contraxisse videretur, five, ut accidit, excruciantem dolores, five visus vomendi, five soluta alvus, five etiam febris magis exercebant; hanc enim & plures annos cum ipso vixisse, & cum illo in cælum venis- se, L. Annaeus Seneca (z) indicavit. Hos, & alios ejusmodi casus si mecum animadverteris; simul scelestorum hominum dolos, qui Medicis sæpenumero imponunt, in quibusdam agris facilius poteris interno- scere, aut saltem, atque utinam in tempore, suspicari, simul non ratione solum, sed ex Observationibus etiam intelliges, certa quadam symptomata, ut sitim, & certos quosdam morbos, ut febrem, quæ ab nonnullis adesse dicuntur, si venenum ingenitum sit, adesse etiam posse, cum venenum præbuitum est, imo quoque præcessisse. Itaque laudatus Sala, est venenum generari sine febre, negabat; non tamen propterea in secunda Respon- sione huic signo tantum tribuit, ut mortuum esse illum Juvenem ab ingenito veneno, affirmaret. Nec vero ut idem affirmemus, cogit quod nullus insolitus odor, aut sapor, nullusve in deglutendo, aut post deglutitionem dolor in ore, aut faucibus perceptus sit. Ut enim improbi Regis Persei (a) pollicitationem præteream veneni quod nec in dando, nec datum ullo signo deprehendi possit, & hic quoque alia quæ dici possent, omittam, ex meis supra (b) narratis Observationibus satis intelligis, vel sine iis indicibus deglutitum esse venenum. Neque contra ex eo quod animal quodpiam ab iis quæ vomitu rejecta sunt, devoratis male habeat, inferendum esse cum aliis, vomitum illum non ab interno, sed ab assumpto esse veneno, proposita novissime Observatio (c) satis indicat.

20. Sed & ea quæ in ventriculo mortuorum apparent, ut imponere aliquando possint, docet id quod de Falckio paulo ante (d) commemoravi. Eodemque addes quod ex Ballonio (e), itemque ex Riolo (f) in Sepulchreto retulerunt, in toxicis dati suspensione cum ventriculus exanthematis obitus repertus esset, parum abusi- fere, nisi admoniti fuissent, ea exanthemata a morbil- lis esse, qui cum erumpere in cute quidem coepissent, sed ob virum infirmatam non perrexissent, ventricu- lum occupaverant: eandemque suspensionem in multis subito extinctis falso inde esse ortam, quod fundi ventriculi potissimum pars sinistra intus, extraque nigresceret; cum id non veneno, sed sanguini esset tribuendum, ibi intra ve- nulas resistenti quæ ad ramum pertinent, vas olim bre- ve nuncupatum. Sed neque e contrario quævis in ven- triculo animadversa macula contemnenda sunt. Verum inter oculos, & lucem expendendus apertus ventriculus est. Sic enim qui maculis dumtaxat quibusdam aspersus vi- debatur, eundem, referente Ballonio (g), minimis for- minibus pertusum deprehenderunt, veneni indicia: quan- quam tunc quoque discipiendum ex indicibus aliis credide- rim, externi, an interni. Quin aliquando non manife- stum modo, sed & magnum ulcus in ventriculo reperi- ri potest, cujus originis prima signa toxici deglutitionem consecuta esse videantur, neque res tamen sine dubitatione esse. Sic in Juvene de quo Fabricius Hildanus (h) post lautum convivium primus stomachi dolor inceperat, ex quo paulatim aucto, & acerbissimo facto cum obisset, magnamque ulcus inventum esset, a superiore ventriculi orificio in hunc deorsum se extendens, Parentes quidem id ab exhibit veneno repetebant; ipse autem Fabricius veri similis censebat, ab officulo aliquo acutissimo ul- cus incepsisse, infixio in rugam aliquam illius orificii: nam si a veneno sumpto facta esset exulceratio; ea, in- quit, potius in ipso fundo, quam in ore ventriculi, exti- nisset. Attamen qui dissentire a Fabricio vellent, objicere

possent duas puellas non sine veneficii suspitione mor- tuas, in quarum altera Joannes de Muraltio (i) juxta idem orificium atra quinque stigmata inusta reperit, in altera Petrus Paawius (k) illud ipsum orificium duobus locis erosum deprehendit: atque ut virum filerent ab eodem Paawio (l) ob eandem suspensionem apertum (nam præter orificii illius erosam substantiam, erosam quoque ha- buit reliquam internam ventriculi faciem) canem tamen producerent, de quo in Historiis a Wepfero (m) edi- tis, qui cum arsenicum devorasset, postmodum mortuus, atque incisus, circa stomachum in ventriculo superficiem rubram & inflammatam ostendit; in fundo autem ventri- culi & circa pylorum nullum inflammationis vestigium. De- nique ut melius appareat, quam difficile in hac materia judicium sit, videri aliquando potest in hujusmodi suspi- cionibus venenum ipsum in ventriculo esse deprehensum, ut in Marrona de qua Bened. Silvaticus (n), pulvi- sculus ille coloris cinericii ulcerate ventriculi parti adhe- rescens pro luculentissimo præbiti veneni indicio acceptus, vel ut in Muraltio puella paulo ante memorata, pulvisculus ille alter arenosus, qui ex humoribus in ventriculo inventis, & mundo vase exceptis sublebat. Verum nisi deprehensus pulvis ea copia sit, ut a peritis probe examinari, & pro veneno agnosci queat, aut nisi illius particula, erosus ventriculi tunica adherentes, ejusmodi sint, ut per se facile se prodant, ut gilla illa quam iis adherentem Heerius (o) invenit, five ut arsenici albi frustula, quæ iisdem inhaerentia vident, & vix evulsi Salmuthus (p), & in muliere quoque de qua est prima hujus Epistolæ Observatio (q), facile agnoverunt; nihil inde pro cer- to licebit pronunciari.

21. Quæ omnia, atque alia quæ Etmüllerus, filium dico; in Programme perpendit Liplia edito A. 1729. erudite, & prudenter ostendens, quam arduum, & peri- culosum sit certi aliquid in ejusmodi questionibus con- stituere; quæ, inquam, omnia quotiescunque mecum ipse confidero, toties sentio, jure meritoque esse a me factum, cum in quibusdam dissectionibus quas hic proponere potuis- sem, alibi autem ad te scripsi (r), venenum ingenitum, an ingestum esset, nolui pronunciare. In ea tamen in qua non ventriculum modo, & Duodenum intestinum, sed & oesophagum erosum deprehendi (s), magis audere po- tuissem, si pro certo notum fuisset, nullas exitisse vo- mitiones per quas rejectum venenum, fortasse ingenitum, ex parte aliqua restitutum, oesophagum forte læsisset. Non leve igitur veneni devorati indicium erunt ventriculi ero- siones, si nulla quidem cum vomitione, & cum oesophagi tamen sint erosione conjunctæ, præsertim si in eo repe- riantur, qui cum sanus hæcenus fuerit, nihilque in victus ratione peccaverit, repente post ingestum quidpiam, in- soliti potissimum saporis, aut odoris, stomachi doloribus, aut angoribus, aliisque sumpti veneni signis correptus, intra perbreve tempus obierit. Non levis, inquam, ex hisce omnibus, aut plerisque in unum junctis conjectu- ra ducetur. Sed res certa erit, ubi in ventriculo, aut pro- ximis intestinis venenum ipsum reperietur facile agnoscen- dum. Videbis Hoffmanni quoque (t) indicia super historiis aliquot, dignis quæ in Sepulchreto referantur: ita & symptomata, & dissectiones proponunt, minime o- missis rationibus unde inter notas præbiti veneni, & no- minatim arsenici, pluribus communes, huic non fuisse, illis fuisse datum venenum, intelligamus. Sed præcipuum illud dati veneni testimonium, ejus portio in visceribus reperta cum pro varia venenorum conditione, exigua copia, cum aliisque rebus mixtione non sæpe occurrat; idcirco indicia aliunde quærenda sunt, quorum alia cum ad Judices rerum capitalium attineant, a) prætermittuntur, aliud autem, ad Medicos spectans, non est reti- cendum, quamvis per se obvium, & a me nonnullis iterumque animadversum. Nam præter id quod A. 1711. a me visum, & supra (u) adnotatum est, cum videlicet tres qui ex eadem pulte comedissent, omnes brevi post sumptum ve- neni symptomatibus laborarant, jam antea autumno A. 1709. acciderat, ut me plures meorum civium intra pau- cos dies advocarent, quos cum scirem familiariter inter se versari, & convivari nonnunquam solitos: commu- nem aliquam eorum in unum tempus incidentium ægrotationum causam suspicatas, interrogando compe- ri, ex quo novissime simul omnes epulati essent, pri- mum minus bene se habuisse, mox autem ægrotare co- pisse.

(e) Epist. 8. n. 14. (f) Resp. ad Dorius. (g) De Venenis l. 3. c. 13. (h) Sepulchr. l. 3. S. 8. Obf. 6. (i) l. 4. S. hac 10. in Addit. Obf. 8. (k) Saggio delle Tranz. trad. dal Dierham T. 3. c. 9. S. 6. (l) De Intern. Affect. n. 46. apud Marinell. (m) n. 11. (n) Vid. Gal. l. 6. de loc. aff. c. 5. (o) Vid. Sepulchr. l. 3. S. 7. in Schol. ad Obf. 1. & 2. (p) n. 17. (q) Galen. c. 5. ibid. cit. (r) Obf. 1. & 2. modo cit. (s) De Medic. l. 2. c. 2. (t) Sect. 1. Art. 3.

(u) n. 6. (x) Vid. Tacit. Annal. l. 12. (y) Vid. Sueton. de duodec. Cæsarib. l. 5. c. 44. (z) Apocolocynt. (a) Vid. Liv. Hist. l. 42. (b) n. 18. (c) n. 19. (d) n. 19. (e) Sect. hac 10. Obf. 4. S. 10. (f) l. 3. S. 7. in Schol. ad Obf. 10. (g) Sect. ead. Obf. 17. S. 1. (h) Ibid. Obf. 1. cum Schol. (i) l. eod. 3. Sepulchr. S. 8. Obf. 7. (k) l. 4. Sepulchr. S. hac 10. Obf. 4. S. 7. (l) Ibid. S. 8. (m) Ibid. in Addit. Obf. 13. Hist. 12. (n) Ead. S. 10. Obf. 5. (o) Ibid. Obf. 5. (p) n. 3. (q) Epist. 29. n. 18. & seqq. (r) Ibid. n. 20. (s) Medic. Rat. Tom. 4. P. 3. S. 2. c. 8. in Enarrat. Morb. Obf. 2. 3. 4. (u) n. 7. & seqq.

pisse. Quævis, an præter ipsos alii in eo convivio fuissent. Cum & fuisset, & quotquot fuerant, jam omnes, ne uno quidem excepto, ex morbo decumbere, accepissem, nec ququam tamen aut plus æquo, aut quidpiam minus salubre fumpisse, autumno autem illo raros in civitate ægros esse, animadverterem, vix dubitandum esse, intellexi, quin pravi aliquid, & veneno simile ex errore fortuito aliquo sive epulas, sive potiones, quibus in eo prandio usi fuerant, infecisset. Verum quam facile erat hoc generatim conjicere, tamen erat difficile sive ex ægotantium symptomatibus, sive ex accurata, & sæpe repetita perquisitione quidnam illud fuisset, assequi. Symptomata enim pro alia aliorum ætate, dispositione, & temperata alia in aliis erant; quamquam in pluribus, inter cætera, alvi fluxus erant, & tormina, in aliquo, sine torminibus, sinceri sanguinis dejectiones. Perquirendi autem verum ut optimam occasionem haberem, eo libentius præter eum qui prandium dederat, ancillam etiam quæ coxerat, & reliquias comederat, liberaliter eugandam suscepi; uterque enim graviter, ancilla autem gravissime ægotabat. Huic igitur non semel ostendens, quanto minus difficilis curatio esse posset, si mihi uni diceret quid per errorem admisisset, aut ab aliquo admisum esse, conjiceret; nunquam exprimere aliud potui, nisi hoc unum, quo cogitare magis, eo magis id se ignorare. Quæ cum ita essent, necessario coactus sum unicuique sic mederi, ut singulos hæc, vel illa symptomata gravius, aut levius urgebant. Quidam brevi, & facili; sed reliqui longa, & difficili curatione servati sunt; ut in quibusdam bimeltris fuerit, in eo qui sanguinem deiecerat, quadrimeltris. Unus ex omnibus qui morbum diutius contemserat, undevigesima ex quo cubare tandem cœperat, die febris, cum singultu, convulsivis tremoribus, aliisque malignis symptomatibus juncta, frustra me, & seniore ejus Medico, quæcunque poterat, opem ferentibus, confectus est.

22. Quæ una fuisset reliqua, ignota illarum tot ægotationum quærendi via, anatome videlicet, eam plures, varique rationes prohibuerant. Quarum aliqua alterius quoque sectionem veterant, quem non levis conjectura erat, ex opio, per Pharmacopolæ errorem minus parce præbuto, decessisse. Cujus diffectio eo nunc mihi gratior esset, quod in brutis animantibus, post datum largius opium incisis observata ab Experimentistis. Sprogelio (x) minus convenire, video, cum iis quæ incane adnotaverat Cel. Meadii (y). Cæterum de abusu opii detestabili apud veneficos nullum a me verbum expectes in scriptis quidem. Res enim ejusmodi, a Medicis aliquoquin non ignorandas, utinam secretis dumtaxat inter se colloquiis agitaissent; chartis autem non commississent, ne quod ad curationem excogitandam scire necesse esset, id a nefariis hominibus ad latentem, & impune occidendum esset detortum. Quamobrem Galenus (z) Orpheum cognomento theologum, Horum Mendesium juniorem, Heliodorum Atheniensem, aliosque librorum de iis compositionibus Auctores usque adeo reprehendit, ut ne illud quidem concedat, earum notitiam Medicis saltem esse necessariam, ut iis qui sumperint, possint succurrere. Utinque id est; sane de venenis etiam aliis sapientius quædam posteriores magni ceteroquin Medici pressissent; non epistolis, atque adeo libris editis vulgassent.

23. Eorum autem qui a morfu, aut ictu venenosæ bestię interierint, nullas memini aut a me, aut ab Amicis institutas esse diffeciones, si illas excipias quæ ad mortem attinent rabiosi canis, a me tecum alias (a) communicatas. Scilicet Italia, frigidioresque regiones hac quoque parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt, quam æstuosa; ut veris Celsi (b) verbis utar. Nec fere aliter se res habet in venenatis bestiolis, quæ sunt anguibus minores; certe autem de iis in quibus ego versatus sum, minus æstuosis Italiae partibus non vera illi Boerhaavio (c) retulerunt, qui hæc narravit: in Italia, ubi magna vis scorpionum est, neminem subire diversorium quin hospes ei lagenam oleo scorpionum plenam indicet; quod vulnere, si quod ei bestiola inflixerit, continuo imungat, sic mortis evitatur periculum. Sed neque tam raros esse, Exterorum quis credat in terra Italia, quam Plinius (d) videtur scripsisse. Sæpe, inquit, Pylly, qui reliquarum venena terrarum invehentes,

questus sui causa peregrinis malis implevere Italiam, hos quoque (scorpiones) importare conati sunt: sed vivere intra Siculi celi regionem non potuerunt. Visuntur tamen aliquando in Italia, sed innocui. Si ea linearent quæ de vulgariis scorpionibus sequuntur; non de his, sed de vulgariis Africae scorpionibus de quibus novissime dixerat, Plinium multo libentius propterea quæ paulo ante scripserat, interpretarer. Cum vero non finant; deesse aliquid suspicor: certe ii qui Romæ ante Plinium scripserunt, Lucilius, & Cicero, raram bestiolam exempli loco non sic memorassent, ille quidem (e) ut scorpionis cauda sublata, hic vero (f) serpere anguiculos, nare anaticulas, evolare merulas, cornibus uti videmus boves, nepas aculeis; sed potius vespas aculeis scripserunt, ut imperiti olim ediderant, aut quod nepa, quid esset, ignorarent, aut certe quod Nonium (g) nescirent ita uti descripsimus, duo postrema Ciceronis verba produxisse, neque aliter, ut illius scribendi ordo, & sententia postulant, producere potuisset. Quod quis tamen credat, Plinium in Italia scorpiones innocuos esse, dicere; id vero ut plurimum ita est, nec memini, in Civitatibus ubi vitam egi, vel frequentissimis, Medicum unquam, aut Chirurgum fuisse advocatum, ut vulnere, a scorpione infecto, mederetur; nedum ex eo vulnere quæquam mortuum, ut in cadavere veneni effecta posset inquiri. Quin etiam ab nostris Falloppio, & Vallisnerio idem confirmari, videris. Hic enim (h) venenum quasi innocuum ab nostris scorpionibus aculeo prodire, scripsit; Falloppius autem (i), in nostra regione, ubi scorpiones sunt minus venenosi, non oriri tumorem in loco ab ipsis icto, ut in regionibus calidis, sed tantum pustulas, ac tubercula parva variolis similia. Atque ut Medicorum auctoritate qui in Italia vel temporibus, vel locis, vel utrisque magis quam duo illi, distent a nobis, idem comprobemus, num Scribonium putas, si noxios in Italia vidisset scorpiones, ad hunc modum fuisse scripturum (k). In Africa; aut scubi scorpiones sunt noxii; Cornelium autem Celsum (l) inter peregrina, & aliquantulum magis pestifera, quam nostratia, scorpionis venenum positurum fuisse? Possuisse autem, non quod scorpio, sed quod perniciosus scorpio esset peregrinus mihi quidem illa ejus verba post varia recensita remedia satis videntur indicare (*): Cognovi tamen Medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt. Loco autem, non tempore, a nobis distabat Redius, distatque Gentilis, Medici ambo Etrusci. Quorum primus (m) idem quod Plinius, affirmabat propterea quod centies viderat scorpionum venditores nudas manus in sacculis inferere iisdem plenos, & sæpe ictus ab iis referre, neque unquam, tametsi fervente canicula hæc fierent, cum allo vel minimo consequente veneni indicio. Alter (n) a scorpionum ictibus funesta mala fere non oriri, nisi in Africa. Ab Italis enim scorpiones ictos aliquos esse quidem mortuos; sed pauca admodum abrerum naturæ Scriptoris ejusmodi referri exempla.

24. Duo Vir ille Eruditus producit, alterum ex Ferrario, ex Lanzono alterum. In utroque vomitus, imo in altero ipse volutus intra horas aliquot lethalis. Juvat exempla alia addere, quotquot inter scribendum succurrunt, funesta fortasse futura, nisi obstitissent remedia. Proferam autem eo libentius quod Patavii pleraque acciderunt. Cortusius noster civem hic suum, a magno scorpione vulneratum, jam animi deliquio detentum, brevi admodum tempore revocavit ad vitam externo pulveris auxilio quem a Matthiolo (o) acceperat. Benivenius (p) famulum a simili ictu, quamplurimo statim frigidissimo spore perfusum, theriaca ex generoso vino exhibita, illico liberavit. Clari Veronæ Medici Petri a Castro indicem digitum pupugerat scorpis, dolore, & frigore mox totum brachium invadente, cum ipse, parum proficientibus remediis cæteris, eo liberatus esset quod Amicus ejus Rhodius (q) memoria tradidit, hoc quoque adiciens, anno tamen insequente rediisse dolore eodem tempore cum tumore digiti phlegmonode. Sed & se quoddam Patavii scorpionum ictus tumore ac dolore graves animadvertisse. Quin ipse quoque Vallisnerius, qui, ut supra (r) dixi, illorum venenum apud nos quasi innocuum esse, agnovit, denique, mutata quadantenus sententia, in Specimine Alphabetico, quod imperfectum reliquit, Histo-

Historia Medica, & Naturalis (s) hyeme quidem illud esse innocuum, sed æstate vel in nostratibus affirmavit esse mortiferum. Cujus tamen rei unum, haud amplius, exemplum protulit, nimirum adolescentulæ cui sub canicula ardoribus in collo ictæ paulatim membra fiebant gelida, neque ex multis auxilium aliud profuit, quam oleum, contriveleni dictum, Magni Etruriae Ducis, interius, exteriusque usurpatum. Verum illud primum meminisse te, velim, non fuisse hæc denique funesta exempla: deinde quid pauca adeo ad innumera alia, omnino discrepantia? quid hoc ipsum ultimum ad tot illa quæ indicavimus (t). Redii eodem fervidissimo anni tempore? Quo tametsi fatear, & venenum hoc acris fieri, & hominum corpora ipsius noxis magis opportuna; tamen Octobri mense casus accidit Petri a Castro, & circa Junii finem is qui a Lanzono (u) verbis Medici qui affuerat, descriptus est. Qui, & Ferrarii quoque alter si funesti, & per vomitiones quidem rueret; at in hoc scorpis intra os dormientis pueri irreperat, idque faucibus, in illo autem femina, chlorosi laborantis, extremum, dum in latrina alvum exoneraret, intestinum feriat. Quanti autem referat ad augendam, accelerandamque veneni noxam, si non modo ictum corpus teneris, imbecillis, ægrumque sit, sed & pars icta sit ipsa mollior, & exquisitor sensu prædita, cum per te intelligere satis potes, tum nisi hoc ponatur, aliquanto minus facile est assequi, cur non æque omnibus graves accidant non apud nos tantum, sed & apud alios; si Africanam, & alia æstuosa loca excipias; scorpionum ictus.

25. Ubi enim attendo illa quæ apud Monspelienfes habita sunt, experimenta, facile adducor, ut credam, non secus ac apud nos, ibi quoque scorpionum ictus ut plurimum esse innocuos. Nec vero experimenta illa dumtaxat dico quæ ibi a Courtenio (x) A. 1679, sunt instituta. Nam quod a pluribus scorpionibus lingua catelli compuncta fuerit, ejusdemque abdominis cutem nonnihil diducta, musculi ipsi ab illis non semel icti, arte etiam altius appresso aculeo, venenæque & subiecta vesicula in vulnera expresso, canis tamen nihil detrimenti cepit, ut neque columbus, sæpe ad eundem modum a scorpione faucibus: contra autem quod talpa, cujus latus scorpis pupugerat, continuo mortem convulsa obierit; discriminis causam asserere hæc posset, quod catellus, & columbus ab inertibus, infirmisque scorpionis, quippe ineunte Januarii mense, talpa autem a valido, acrisque, ut pote circa medium Quincilem, fauciatæ fuerit. Pericula igitur illa potissimum specto quæ ibidem quinquaginta, opinor, post annis fecit Vir Cel. Maupertuisius (y). De novem canibus, tribus parvis pullis, & uno mure quos scorpis percussus fuerat, hora post sæpe iteratas vomitiones convulsus, mortuus est; animalia duodecim reliqua nihil omnino læsionis retulere. His tamen per eosdem, ut videtur, dies, certe autem a scorpis ejusdem generis, ad eundemque modum validis, acrisque, ferocientibus eadem loca icta fuerant; ut hinc nulla repeti possit discriminis causa, cur unus, haud amplius, canis interierit, præsertim cum is ab uno, cæterorum aliqui a pluribus scorpionis vel multo pluries, multoque profundius defixo aculeo faucibus, iisque promissæ tum maribus, tum femellis, jectique recens allatis, ut neque in fœtus varietatem, neque in venenum, forte in priores ictus omnino insensum, conjicere liceat discriminis causam, sicut merito Redius (z) non in viperis solum, sed etiam in scorpionis Africanis conjecit. Conjici tamen in alia, atque alia potest, & in aliquod fortasse eorum quæ a Maupertuisio indicantur. Quoniam vero tam raro accidit, ut gravem scorpionis æstent noxam; facilius crediderim, eorum plura simul convenire oportere, ut æstent, aut fortasse aliud aliquod addendum esse quod præcipuum sit. Exemplo rem declarabo.

26. Apud Veteres volucres erat animalculum, cui nomen asilo Romanum est; ut Virgilii (a) verbis utar; æstivum Graii vertere vocantes. Idem a Latinis tabanum quoque esse dictum, indicat M. Varro (b), sed Plinius (c) magis. Id animalculum sitne idem quod modo apud nos tabanus dicitur, si forte quæras; facile negabo: sitne vero quod Etrusci adhuc asilum vocitant; dubius hærebo. Nam id certe aut non Veterum asilus est, aut non semper idem efficit quod Veteres nobis descripserunt, ut vulgæra-

bum cute hos concitet in furorem. Hocque adeo verum est, ut Vir Præstantissimus Reaumurius (d) tibi querendam causam censuerit, cur interdum id faciat, alias non faciat. Itaque cum ipse nullum, fœcus ac Vallisnerius (e), in eo acrem, quem in vulnere relinquit fœcum agnoscat, minime quærit, aliasne plus relinquat, alias minus: sed neque credit, discriminis causam ab altius, aut minus alte defixo aculeo esse repetendam, propterea quia hic neque tenuior est, neque minus alte dehitur, quam bubulcorum stimulus, boum cutem alte perfodientium sæpe, at nunquam idcirco in furorem agentium. Ipse igitur censet, cum asili aculeus subcutaneum aliquem crassiusculum nervum forte compugit, tum bovem furere, cum eum non compugit, non furere. Ego vero ne tum quidem si essem in hujus animalculi diffecione vel maxime exercitatus, mihi tantum sumerem, ut in diffecione Viro-rum qui pares ætate hac minime habuerat in perdifficili Insectorum historia, aliquid adversus alterutrum pronunciam; sed potius, quod mea erga memoriam utriusque observantia postulat, darem operam, siqua fieri id posset, ut componeretur utriusque sententia, simul ad crassiusculum compunctum nervum, simul ad acrem infiltratum fœcum respiciendo, si forte hunc ex asilo alcunde in vulnus exiltere, invenire possem, eaque ratione scrupulum quendam mihi penitus evellere, factu perdifficile credenti, ne bubulci quoque stimulus in crassiusculum nervum unquam incidat, bovemque in furorem agat. Nunc vero Summi Viri conjecturam ab asilo ad scorpionum, in quo utramque componere sententiam liceat, transferentes, gravia ex ictu hujus tunc mala sequi, veri similiter suspicamur, cum crassiusculo cuipiam nervo, aut alii exquisiti sensus parti simul vulnus indigat, simulque acerrimum venenum immittit. Sane tum animalia quæ hinc mortua memoravimus (f), tum quæ Redius (g) per Africanum scorpionem occidit, convulsa periere, tum convulsa quoque ea mulier de qua supra dictum est (h), tum quæcunque alia symptomata in ipsa, & cæteris etiam qui mortui non sunt, hominibus apparuerunt, facile per convulsiones, licet explicare: & venena quoque alia, ictu, aut mortu venenosorum animalium communicata, per nervos potissimum nocere, laudabilis Cl. Meadii (i) sententia est.

27. De immisso autem simul cum aculeo etiam veneno, nulla amplius relict dubitatio. Nam etsi posteaquam Plinius (k) tenui fistula perforatos esse, tradiderat, scorpionum aculeos, venenum infundentes, & (l) hoc ab iis candidum effundi, Apollodorum auctorem esse; Galenus (m) extitit, qui nullum apparere foramen, scriberet, in eorum aculeo, ideoque aut perquam exiguum esse id quod injiceret, aut nihil omnino, quin etiam Redius (n) ne in majori quidem scorpis, nempe Africano, ullum videre foramen potuit, quantumvis oculo exquisitissimis vitris instructo; hic tamen non modo ex Aretino antiquo Scriptore (qui e Plinio exscribere potuerat) sed ex propriis multis in eodem illo scorpis observationibus, album ex aculeo prodire humorem, confirmavit: aliam tem foramina, nedum foramen, perviderunt, quos inter Vallisnerius (o) in primis fuit, qui deinde, nec semel, edidit, ostenditque tum quare ab Redio visa non fuerint, quippe in ipso extremo acuminis quærentes, tum quare in extremo esse non debuissent, videlicet ne si veneni canaliculus ad extremum usque aculei perduceretur, hujus necessarii tum subtilitati officeret, tum firmitudini, obturationi autem a minima quavis in quam incurreret, materiæ particula obnoxius fieret. Ne vero dubites, num foramina, eaque non in extremo aculeo, in nostratibus quoque sint scorpionis; qua ratione in his etiam perspexerit elegantissimo Vir ingenio Ferdinandus Antonius Ghedini, & ipse ad me scripsit A. 1707. & Vallisnerius communicatas a me Ghedini litteras vulgavit. Peculiaris hæc habet Vallisnerius, aculeum triangularis instar pyramidis tres facies habere: in harum singulis singula esse foramina: humorem per hæc exire quam maxime limpidum: hunc autem a canaliculo per internodia caudæ traductum, in ultimum ferri, ex quo extat aculeus. Tu in peregrinis illis grandioribus, ex quibus ipse videtur hæc descripsisse, quærere poteris, an perpetua sint, illudque præterea, quæ intima structura sit ultimi internodii. Nam præter vesiculam, quam olim indicavit Col-

(*) Exper. circa varia venena &c. Exp. 15. & seqq. (y) Tract. de Venenis Tent. 5.
(x) De Antidot. l. 2. c. 7. (a) Epist. 8. (b) De Medic. l. 5. c. 27. n. 10.
(c) Prælect. ad Inst. 6. 1131. (d) Nat. Hist. l. 11. c. 25. (e) Ex Satyr. l. 30. n. 23.
(f) De Finib. l. 2. (g) De Propri. Scorp. in Nepa. (h) Opere Hist. Med. Tom. 2. p. 1.
(i) Tract. de Tumor. c. 3. (k) Compos. Medic. 164. (l) c. 27. cit. (*) Ibid. n. 5.
(m) Epist. int. agl. Inf. (n) Annotaz. alla pag. 66. v. 23. della Lett. Filof.
(o) Vid. hujus Comment. in Dioscor. l. 6. c. 29. (p) De abditis Morbor. caus. c. 36. (q) Cent. 3. Obs. Med. 90. (r) n. 23.

(s) Opere Tom. 3. P. 4. alla voce Scorpione. (t) n. 23. (u) Eph. N. C. Dec. 3. A. 3. Obs. 20. (v) supra ad n. 16. cit.
(x) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1731. (y) cit. supra ad n. 23.
(z) Nat. Hist. l. 11. c. 28. (a) Memoir. pour serv. à l'Hist. des Insect. Tom. 8. Mem. 12. (b) De Re Rust. l. 2. c. 5.
(c) supra n. 25. (d) Exper. supra ad n. 23. cit. (e) n. 26. (f) Opere Tom. 1. P. 4.
(g) Ibid. c. 25. (h) De Loc. aff. l. 6. c. 5. (i) Exper. cit. (j) Insect. ad Exposit. Mech. Venen. (k) Nat. Hist. l. 11. c. 29.
(l) Vid. loca supra ad n. 23. & 24. indicata.

Conterus (p) scribens, *sub cauda aculeo*, quo scorpius ferit, *vesicam veneno plenam latitare*, credibile est musculi aliquid inesse, quo venenum exprimitur. Extima enim internodii pars id præstare per se non potest, ut pote quæ corneola est, & in Africano scorpione, externæ, ut Redius (q) expertus est, compressioni minime cedens. Sub crusta autem illa, quemadmodum in cancrorum videmus brachiis, includantur muscoli necessarii, quibus, ut internodia cætera, sic etiam ultimum moveatur; itaque carnea, aut tendinea aliqua expansio, intra ultimum internodium perveniens, validiore contractione quam qua illud movet, comprimere etiam posset vesiculam.

28. Sed hoc venenum in nostratibus quidem scorpiis, aliisque non æstuosarum regionum, ut Monspelienfibus, longe minus validum est, quam in Africanis. Itaque non sicut in Africa, ita apud nos sæpius, imo raro adeo gravia ex eo occurrunt symptomata, quemadmodum supra (r) ostensum est, ut nisi plures causæ, & in his præcipua fortasse, nempe crassiusculi nervi compunctio, in unum convenient, innocuum esse videatur. Quod ubi ponimus; facile cum Cel. Viro Maupertuisio (f) in eam suspensionem descendimus, ne forte plura quæ adversus scorpionum ictus laudantur, remedia ideo profuisse visa sint quod sæpius fuerint iis hominibus adhibita quibus vulnus quidem inflatum fuerit, sed innocuum venenum immixtum. Inter ea remedia a præcis usque temporibus illud de cuius vi nominatim Vir ille Cl. dubitat, potissimum recensitum esse, nostri, quod ex scorpione ipso petitur. Scorpio, inquit Celus (t), ipse sibi pulcherrimum medicamentum est, si ve contritus super vulnus impositus, si ve super prunas, ut vulnus suffumigetur. Verum laudati Viri dubitationem videtur confirmare tum suffumigium hoc frustra adhibuit ei mulieri quæ supra (u) memorata est, ex scorpionis ictu nihilominus mortuæ, tum contritus ipse scorpius, & vulnere impositus, qui parum profuit Petro a Castro, cuius quoque casum retulimus (x), in eo ictis a tarantula simillimum, quod insequenti anno dolor rediit eodem tempore. Hoc enim de faucibus a tarantula adnotavit Baglivus (y): qui & illud observatione constare, scripsit (z), a scorpione in Apulia punctos eadem fore pati symptomata, ac si a tarantula morfi essent. Sed nos ea symptomata, & mortes supra non recensimus, ut qui æstuosas Italiae partes exceperimus. Proferat insuper cunctuli, a tarantula occisi, dissectionem (a): nec reticet (b), ab illa ictorum multa symptomata a depravata imaginatione pendere videri. Hoc, atque alia quæ ad tarantulam attinent, magis explorata nos habitu speramus, si quando Vir Doctissimus Franciscus Seraus ea poterit quæ de insecto illo inchoata habet, perficere.

Interea tamen, quod ad nostrates pertinet scorpionis, non sine omni dubitatione fumus, quin plures ex iis qui ab his compuncti gravia quædam pati visi sunt, timore imaginationem turbante, non tam ex veneno quod profus innocuum fortasse fuerit, quam ex animi agitatione, corpus percellente, male habuerint. Hanc autem dubitationem, in qua ipsum Maupertuisium (c) esse, video, comprobare ex parte illud etiam potest, quod nonnulli eorum vix icti, continuo de iis queruntur quæ tam cito ne in illis quidem contigerunt qui ex veneno eodem occisi sunt, idemque antidoto aliquo adhibito, aut dato ex his quæ vulgus, ipsique magni faciunt, aut quod Medicus quispiam cui plurimum fidant, tanquam certissimum, commendaverit, illico nihil amplius se mali sentire, & plane sanatos esse, clamant. Nempe animi, non corporis, hæc esse videtur curatio: quæ sicuti forte antidoto famam conciliavit, ut immerito conciliaverit, simulque ut certiora querenda sint, vides.

29. Sed non ut scorpionum, ita Viperarum quoque apud nos sæpius innocuum venenum est: a quarum morfu plerumque interirent, aut certe gravissime laborarent, nisi multo quam scorpiis, essent illæ rariores, & propter magnitudinem facilius animadverti, & caveri possent. Gravissime, inquam, laborarent, cum remedium necdum inventum sciam cui quidem possint,

audeantve homines fidere, ut ab se arceant vehementissima symptomata, viperinos morfus excipientia. Laudata ut maxime ad id fuerant devorata capita, aliæque partes viperarum. Sed Redi (d), & Francini (e) experimentis res minime respondit. Postea magnis laudibus effertur audivimus viperarum pinguedinem, multoque etiam magis vulgare oleum, si demorsio loco adhiberetur. Et si vix credibile videbatur, per angusta adeo, nec parum profunda foramina per quæ mordens vipera venenum immittit, facis aditus patere oleosis præsertim linimentis; malum tamen iudicium temporis permittere, quod ut certiorum, & utilem vim novorum remedium, quemadmodum corticis Peruviani, ita ambiguum, & periculosum, quemadmodum transfusionis sanguinis demonstravit, & ne a proposita materia longius abeamus, quemadmodum tot alia adversus venenatos animalium ictus olim commendata præstidia inutilia esse, ostendit, & oblivione tanta obruit, ut, exempli causa, quod Abbatius (f) expertum esse, scripsit, admodum prodesse, & Patavii quidem expertum, ego intra annos propemodum quinquaginta ex quo hic versor, nunquam memorari a quocumque, nedum adhiberi, audivimus. Itaque anni vix pauci præterierant, cum Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis Commentaria illa (g) prodierunt: ex quibus per experimenta Cl. Viorum Geoffroyi, & Hunauldii demonstratum esse, intelleximus, quam leves, & dubie ictarum ex oleo inunctionum sint vires: hocque iudicium rectum esse, vel Anglorum Medicus doctissimus confirmavit Meadius (h). Qui tametsi viperinæ auxingie probabiliorum laudem tribui posse, addidit; tamen neque hanc curationem fidam esse, ingenue fassus est, & tu ex altero quod in memoratis Commentariis morfi hominis profertur, exemplo facile agnosces. Ipse vero præ cæteris auxiliis facile, & promptum illud commendat, quod significare supra volui, cum remedium esse inventum, negavi, cui fidere audeant homines, videlicet quæ ore statim fiat, veneni suctionem. Nam etsi Celus (i) adversus omnium serpentium morfus hanc fidenter adeo commendaverit, ut asseveraret, sic, & fugientem tutum fore, & tutum hominem esse præstaturum; eaque ab Dioscoride etiam laudata (k), non Galeni (l) modo temporibus, sed & Aetii (m), Pauli (n), & Actuarii (o), a quibus imperatur, ut Rhazem (p), aliosque omittam; in usu fuerit; quin ut ad propiores nobis descendam; a Tagaulio quoque (q), Vesalio (r), Abbatio (s), Severino (t), Redio (u), Charasio (x), aliisque (y) probetur: etsi, inquam, tot, tantisque auctoritatibus nitatur; non est tamen facile sperandum, populum eo posse adduci, ut Celso (z) aut cuiquam credat, venenum hoc non gustu, sed in vulnere nocere: quam vellet, clamat Severinus (a), exjugat nostra fide quisquis; immunitis a quaque labe, ab unoquoque detrimento, me fideiussore, futurus est exsuctor.

30. Quamquam populum in eo sapere, existimarem, si huic fideiussori minime crederet, nullo in periculo exsugentem fore (b), tametsi exsugens Celsi (c) monitum, a plerisque eorum quos laudavi, diserte confirmatum, non attenderet, ne quod in gingivis, palato, aliæque parte oris ulcus habeat. Quod Redius monuit, & iure quidem, meritoque, tanti faciebat, ut quod ab aliquo illorum qui cum eo tunc aderant, audivisse olim, meminisset, cum ex iis qui expressam a viperis venenum potabant, unus in illud identidem panis crustam intingeret, ederetque, increpuit continuo Redius, ne forte crusta gingivam, ut interdum fit, vulnerante, sibi homo per jocum præsens periculum crearet. Qui etiam inter cæteras causas, quamobrem circulator commotum sibi ab apide brachium, imo homines duo ictum sibi a vipera digitum cum fuxissent, nihilominus mortui sint, ut Aelianus (d), Matthiolus (e), & Amatus Lusitanus (f) scripserunt, hanc ponendam esse, conjectit (g), quod os illi haberent fortasse ulcusculum quopiam læsum. Hi tamen, aliique infra (h) commemorandi eventus homines terrent, dum quo alicui, quæcumque fuerit causa, accidit, idem sibi quoque accidere posse, timeant, ii præsertim quibus est gingivarum laxitas aut

scor-

scorbatica, aut ad ipsam accedens quando Matthiolus (i) vel sine hac animadvertit, sanguinem, a forti ipsa suctione facile e gingivis manare. Terrent etiam monita illa alia quæ plerique eorum quos probare diximus suctionem, astipulante quoque Avicenna (k), inculcarunt, ne fugens sit jejunos, utque in ore colluto oleum teneat, & quod exsuxit, continuo exsuxat. Quæ monita eo magis terrent, quod Doctissimus ipse Meadius (l) eadem ferme commendat, tametsi id eo dicat, ne veneni acredo inflammet labia, linguamque exsugentis, nec immerito, quando cum aliis viperæ venenum gustans, quamvis cum aqua mistum, sapore esse acris & igneo, percipit, ut si lingua fervido aliquo & arente corpore pertusa esset, hoc sensu duas trefve horas durante; quin socius qui non dilutum gustare voluit, inde retulit cum linguæ aliqua inflammatione & tumore ulcusculum, biduum permanentem. Longe minus terrebantur homines, cum aut Severinum (m) legebant testantem, sapore hoc venenum esse quasi forbi immaturum, ut percipit Branchinus, Pharmacopæus Senensis præcipuus, cum, ipso vidente, lingua liberet ac degustaret, nihil exinde noxæ percipit, aut Chararum (n) asseverantem, gustatum, & deglutitum; quod sæpe sæpius expertus erat; neque homini, neque ulli animali nocuisse; ut quod denique addit; non detrectaretur ipsamet in os proprium ingerere vel absque sequente, aut præcedente oris collutione, aut Redium (o) in primis confirmantem, se vidisse infinitis vicibus illud lambentibus, & delutientibus labra non intumuisse, descrebentemque Jacobum illum suum, cum id non sine voluptate identidem lamaberet, aut potaret, idem postmodum non facturum, si oris, aut ventriculi noxam inde retulisset, aut saporem acrem, & urentem perciperet, quem contra, scribit Redius, dulcem insipidum veneno illi esse, & simillimum saporis olei amygdalarum dulcium. Sed de tanto inter Auctores dissensu, de uno eodemque veneno loquentes, mox erit iterum dicendi locus. Nunc illud cogita, cum ex ista ipsa diffinitione hominibus addi possit animus, ut suctione utantur, præsertim cum pleoribus ipsam laudantur, non uni illi sere plus fidere, quam auxilio quod minus quidem, quam oris suctione, statim in promptu est, non dissimili tamen, & certe minus suspicionibus obnoxio, cucurbitularum videlicet; nam post utrumlibet alia, atque alia remedia imperant; indicio manifestissimo, non esse igitur exsugentem prædium illud quod semper credi liceat, venenum e fundo usque perangit vulnusculi, imo ex anfractibus, in quos inde precepisse interea potest, aditæ cellulosa membrana, aliisve flexuosis fectis totum penitus eductum fuisse. Quod & de cæteris seu per siphones, seu per hirudines, seu per alia quælibet, exsugendi modis dictum putato. Cæterum quod de efficacioribus Chirurgicis remediis, ut scarificationibus profundis, inuisione, aut amputatione verba non fecerim, hanc causam habeto, quod hæc plerique a vipera icti aut non admittant, dum sibi eundem quem multis a mitiori curatione fuisse, audiverint, felicem exitum pollicentur, aut nimis sere tandem postulant; perraro enim est quod scribit Kramerus (p), novisse se quemdam, cuius digito, a vipera morfo, totum jam brachium inflammatum erat, jamque febris, crebre animi defectiones, deliria, spasmi, alia ejusmodi accesserant, & hunc tamen horis 32. a vulnere jam elapsis, abscessione digiti demorsu curatum esse. Itaque intelligis, cur hæc omiserim, mitiora plerique consideraverim, quorum etiam infra (q) sum quædam alia memoraturus.

31. At enim, inquis, unde igitur tanta aut suctioni, aut tot aliis, etiam olim, adversus viperarum ictus mitibus auxiliis laus parta esset, nisi illorum ope homines vidissent servatos? Ego vero, ut illud omittam, perraro aliquem evasisse qui non pluribus esset remediis usus, ut cui potissimum salutem deberet, difficile esset constituere; hoc certe attendendum censebo, non pauca apud eos qui periculum sæpius fecerunt, exempla occurrere beatissimum quæ nullo dato, admotivo remedio, aut levius, aut nulla a viperarum moribus mala peresset, aut gravia etiam, nihilominus vitam servaverint. Sic Redio (r) accidisse, nec raro, leges. Sic Parisiensium tum quos olim Hamelius (s), tum quos ego supra (t) laudavi, aliæ sunt huc pertinentes Observationes. Quod si horum discriminum causam quæras; multiplicem esse

potuisse, dicam, seu mordentes vipersas, seu morfa animalia species, five utraque. Utrisque communia sunt ætas, constitutio corporis, vires, anni tempus, victus, & regio, a quorum varietate varius esse potest illatus, aut acceptæ læsionis gradus. Sic; ut de regionibus dicam; vides quas Severinus (u) excipiat, ut quarum viperæ innoxie sint ictu; quamquam quod de Anglicis ipsi ab Houghtono relatum fuerat (x), cum iis quæ alii, & quæ passim Cl. Meadius (y) scribit, minime consentit, præsertim ubi Redii Experimenta ita sibi in Anglia respondisse, ostendit, ut Verneyo antea in Gallia, aut ubi solere ubique, confirmat, eadem mala a vipera morfu simili sere modo oboriri; quamvis, id quod proposito huic nostro satis est, pro climatum, & aliorum ferme, quæ diximus, diversitate, illa aut augeri posse, aut deprimi, fateatur. Possit quoque alterutrum fieri pro varia mordentis viperæ magnitudine, ira, ejusque veneni acrimonia, facile intelliges, si a majori, & magis irata plus veneni in vulnus immitti, & hoc profundius infligi, cogitaveris; nam de acrimonia res vel magis est manifesta, eamque in aliis viperis allam esse, discrepantia ostendit, de qua supra (z) dictum est, inter laudatos Auctores de sapore, & effectibus in labris, & lingua, veneni hujus neque enim quisquam ausit dubitare, quin ea quæ pro observatis a quolibet eorum proposita sunt, revera fuerint observata. Ad hæc illud quod est præcipuum, addendum est, interesse plurimum inter viperam quæ modo sæpe sæpiusque momorderit, & inter illam quæ necdum post iustum temporis intervallum id fecerit. Hanc enim inter impostorum fraudes jam olim recensit Auctor libri de Theriaca ad Pisonem (a), ut viperæ antea quam ipsos, oblatas carnes assidue mordere clam cogerentur; sic enim Venenum quod ore continent, ejicerent necesse erat: unde tu e contrario unam deducere causam potes, quare nimirum jejuna viperæ perniciosius mordeant, causisque addere quas alii excogitaverunt. Cæterum quod vetus ille Auctor tradidit, confirmavit Redius (b), se pluries expertum scribens, ejicere vipersas venenum omne, si non primo, at saltem secundo morfu, ut tertius deinde, & quartus veneno careant: & quamquam infra indicet, tertio quoque posse aliquando venenum inferri, imo alibi (c) non modo experimentum proponat, unde tertium, sed & alterum, unde sextum lethalem fuisse, apparet, Parisiensis (d) autem unum, unde septimum; tamen si hæc etiam velis quæ rarius accidunt, spectare; vides, nostro proposito non officere; nam tandem ad eum morfum qui innoxius sit, pervenitur, necesse est, citius, aut serius, ut minor est vipera, aut major, vel certe ut minus, aut plus collectum habet venenati humoris, vel lentius hunc reparat, aut promptius, vel uberius in singulis moribus effundit aut parcius, vel denique minus, aut magis acrem pignit, ut minima etiam extrema guttula id possit quod grandior solet.

32. Huc adde quæ morfi animalis peculiaris sunt, ut magnitudinem corporis, aut parvitatem, cutis durtiem aut teneritudinem, humorum inertiam aut acrimoniam, morse partis pauciora, aut plura sanguifera vasa, nervos, alia hujusmodi. Nam parva, si paria sint cætera, ab eadem veneni copia, & acrimonia citius interire, & ratio indicat, & Redi (e), ac Parisiensium (f) experimenta confirmant. Quapropter mirandum non est quod apud primum legimus, cum eadem viperæ anates momorderet quinque, & continuo tres columbos, neque anates postremæ tres periissent, primum peritisse columborum, aut cum aves a viperæ morfu facillime intereant, equum, taurum, aliæque majora, & duriore cute animalia sæpiissime non interire; minus enim profunda vulnera accipiant, necesse est. Nec valde mirarer, si quæ in Sepulchretum (g) relata sunt experimenta, sæpius repetita ad eundem modum responderent; ut constaret, eas animantes citius necari quæ humoribus præditæ sunt acrioribus, & magis vividis, tardius autem quæ aquosioribus, & viscidioribus, & lenti motus, ut quædam sic interfici nequeant. Et certe cum in una eademque animantium specie alia aliis esse possit humorum, imo & firmarum partium constitutio; qua ratione accipiendum censeo quod sapienter a Parisiensibus indicatum est, credibile esse, ex eadem animalium specie quædam magis, aut minus graves effectus pati a vipereo veneno; ut quamvis hoc eadem immit-

(p) Obf. Anat. ex diversis brutis. (q) Esper. cit. (r) n. 23. & seq. (s) Comment. supra ad n. 25. cit. (t) Ibid. c. 7. & Hist. 3. (u) Ibid. c. 7. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c. 6. (q) Ibid. c. 6. (r) Ibid. c. 6. (s) Ibid. c. 6. (t) Ibid. c. 6. (u) Ibid. c. 6. (v) Ibid. c. 6. (w) Ibid. c. 6. (x) Ibid. c. 6. (y) Ibid. c. 6. (z) Ibid. c. 6. (a) Ibid. c. 6. (b) Ibid. c. 6. (c) Ibid. c. 6. (d) Ibid. c. 6. (e) Ibid. c. 6. (f) Ibid. c. 6. (g) Ibid. c. 6. (h) Ibid. c. 6. (i) Ibid. c. 6. (j) Ibid. c. 6. (k) Ibid. c. 6. (l) Ibid. c. 6. (m) Ibid. c. 6. (n) Ibid. c. 6. (o) Ibid. c. 6. (p) Ibid. c.

immittatur copia, & morbus videatur pares, non pariter, aut non æque sero, aut cito moriantur; cum hæc, inquam, credibilia sint; hinc videtur intelligendum, quare non semper eo quo ab eadem vipera sunt morfa, ordine animalia unius speciei intereant, sed aliquando, ut de quinque Charafii (b) columbis, illud primum quod mortuum exceperit quintum, & de tribus Parisiensium ipsorum pullos, illud tardius multo quod secundum: quamquam cum ille prorsus siluerit, eadem omnes columbæ, an alia parte corporis fauciatæ sint, hi vero antea dixerint, non omnes, sed *sermo omnes* in quibus periculum fecerunt, pullos eadem parte fuisse morfos; accedere aliæ causæ possunt quibus istam in moriendo ordinis mutationem tribuamus. Morfus enim illic exceptus ubi plura sint, & crassiora, aut perpaucæ, & tenuiora sanguifera vasa, aut nervi, perniciosior, aut levior esse adeo potest, ut ipso prompto & concitato multi sanguinis effluxu venenum simul eadem via rejiciatur, ut ab Redio (i) animadversum est: quæ rejectio an forte aliqua ex parte contingeret sero & vulneribus effluente, ipse cogitavit; feri enim parem effluxum Parisienses negant se vidisse in iis quæ perierunt, animalibus, ac in iis viderunt quæ sunt servata.

33. Facile hic quæres, per venasne, ut plerique autumant, an per nervos, ut Cl. Meadius (k) censet, viperæ venenum, aut noxia ejus vis in corporis intima deducatur. Cum primis ut sentias, præter cætera, fortasse illud te movebit experimentum quod in Sepulchreto (l) proponitur, ut in canibus non semel habitum, videlicet succo venenato, e viperarum capitibus extracto, paucæ aqua calida inter imprimendum ablutis, in sanguifera vasa injecto, brevi illos periisse. Veruntamen ubi animadverteris, alia etiam complura, quæ minime venenata sunt, ad eundem modum injecta, brevi pariter mortem afferre (m); libentius perpendes quæ a Meadio pro via nervorum producta sunt. Nam & ipse antea (n) non improbat venarum viam, præsertim ubi de venenis ageretur immixtis per animalium ictus, ut morfus. Sed postea mutavit sententiam, & quemadmodum sumpta, ita & per vulnus infusa venena aggredi potissimum nervos, credit, cum attendisset celeritatem illam mirificam quæ viperæ caudifera morsus canem occidit, non integro videlicet minuti temporis quadrante. Sed & vipera vulgaris cum hominis digitum momordisset, itque, ut supra (o) commemoratum est, os vulnere statim admovisset, sanguinemque exfluxisset; hoc factis repente mortuus concidit, five, ut alibi (p) loquitur idem qui vidit, Matthiolus, *derrepente in terram cecidit, ubi illico mortuus factus deperit*. Non funestus quidem, sed valde noxius, & subitus ab eadem causa in Venatore quem Sommerus (q) curavit, effectus fuit. Cum enim bina digito a vipera inflicta vulnuscula sibi iussisset; *actum intumuit lingua æque ac si pomum in ore teneret cum loquere, & deglutitionis impedimento, obnubilatione visus, capitis tumore, & gravedine*. Nec vero quia Redii conjecturam protulimus (r), ejusmodi eventum causam in quodpiam otis ulcusculum rejicientis; continuo credas, venenum hiantes in ulcusculum venas subisse; in hoc enim non venulas solum, sed & nervulos injuriis veneni patere, vicissim dicere possent illi qui cum Meadio sentiunt. Et ne suctionem magis, quam mortuum, culpes; vel apud Parisienses lege, quid Anglo illi acciderit qui in se periculum fieri voluit morfus viperini. Scilicet a demorsa manu violentus dolor per totum reliquum superiorem artum se extenderat statim, vel prius quam vipera mordere desisset. Atque ut intelligas dolorem nervis, non ut vulneratis, sed ut veneno infectis, esse imputandum, faciet quod Meadius (f) ut memorabilem adnotavit, *parum latrasse canem, dum vulnus acu chalybea acuta, forma simili viperini dentis, infligebatur, at veneno per eandem aciem immisso, tum vero ululasse*. Sed præter celeritatem, saltem aliquando, veneni hujus, aut ejus noxarum progressionem, minime ab lento sanguinis per venas motu repetendam, huc adde Cl. ejusdem Viri experimenta in sanguine humano, vitro calente vase excepto, ob adjunctum autem viperæ venenum neque colore, neque consistentiâ quidquam mutato, ut neque tum, neque postea internosci posset a pari sanguinis ejusdem portione, cui nihil fuerat additum. Neque te illud moritur quod in Sepulchreto (t) leges, in occisis hoc ve-

neno animantibus sanguinem repertum esse coagulatum, imo in corde, & venis omnibus in *polypos admodum tenaces concretum*. In eodem enim Sepulchreto contrariæ occurrunt Observationes (u) reperti *fluidi magis, quam coagulati*, aut *summe tenuis & acris* aut ex parte dissoluti, & *corrupti*, & nusquam coagulati. Quod si quas tamen inter has animadverses quæ grumos, & concretiones proponant; at tu sæpius laudatos Parisienses lege, qui ut referunt, duos in Anglia columbos sanguinem habuisse coagulatum, ita se testantur in eodem, totque aliis animantium generibus nullum coagulationis indicium, sed contra fluiditatis signa in sanguine deprehendisse. Sed & Redius (x), qui tamen in quibusdam coagulationem illam invenerat, diserte negat, semper in omnibus invenisse. Satis igitur apparet, non esse *immediatum*, ut loquantur, & proprium viperini veneni effectum sanguinem coagulare, ut neque dissolvere, sed pro variis hujus dispositionibus, & pro variis præsertim nervorum, sanguinis motum, ut supra (y) etiam dictum est, mire perturbantium, affectionibus vario modo tempore vitari, ut, quod plerique relegens indicatarum Observationum, intelliges, in aliis quoque fit rutilus, & vividus, in aliis ater, & ad corruptionem pronus. Quæ cum ita sint; facile per te vides, quodcumque volatilibus corpusculis referta medicamenta, a longo jam tempore commendata adversus viperinos morfos, prodesse visa sunt, vel in eos casus incidisse in quibus sanguis ad concretionem vergeret, vel nervis potius opitulando profuisse. Quod eo magis dicendum esset, si quod in botanico Viri Cl. Jusseii Discipulo (z) tribus in digitis a vipera vulnerato non sine eorum fere statim adveniente itupore, & tumore, nec levi, ad ipsam quoque manum extenso, feliciter successisset ab exhibitio, & vulneribus etiam affuso alkalico volatili remedio, cum oleo succini conjuncto, si idem, inquam, remedium, prompte in usum tractum, ut in magno brutarum animantium numero certe dicitur respondisse, ita in hominibus saltem plerique in posterum responderit.

34. Nec tamen propterea negandum est, vitiatum sanguinem eorum qui a vipera icti sunt, mortem accelerare: imo Parisiensibus (a) dandum est, multum ad id facere, præsertim cum a gangræna infectus, quæ fere solet cauciatam partem, eique proximas corripere, eandem labem in diffusas, intimasque partes traducit, quemadmodum in anferis corde, & jecinore ab ipsis confectum est, ab aliisque nonnunquam fuerat in jecinore, quod ex nigricante flavescerebat, alias in ventriculo, cuius color quodammodo obscurus, non sine livoris quadam specie, aut magis obscurus, itemque in mesenterio, & intestinis, in quibus manifestior is color, aut quæ maculis lividis hinc inde leviter picta, ad ingressum autem bilarii ductus, livore, seu potius nigrore gangrenoso erant infecta, ut perlegens indicatas supra (b) in Sepulchreto Observationes, Scholiumque reperies. Interdum tamen accidit, ut non modo hæc ab aliis non adnotentur, sed ne exterius quidem livor utquam ullus se ostendat, ut in canicula Francini (c) quæ nulla corporis parte tumorem habuit, aut livorem: verique simile est, ab irritatis venenato morfu nerveis ipsis qui ibi sunt, ramulis contractiones fibrarum fieri, sanguinem in proximis vasculis remorantes, unde tumoris, inflammationis, livoris, gangræne initium, nisi forte ea corporis, aut fauciatæ partis dispositio sit; ut quamvis alibi, ut in illa canicula, nervi citissime convelli incipiant; morfa tamen pars neque tumeat, neque liveat, aut quamvis alias celeriter adeo intumescat, ut Parisienses (d) scripserint, eodem quod mordetur, momento initium tumoris animadverteri; in illo tamen Nobili Juvene, cuius historiam a Charasio descriptam habes in Sepulchreto (e), post horas demum aliquot conspectum sit. Neque alia ferme, præter variam corporum dispositionem, causa videtur afferri posse, quamobrem tumor in quibusdam minus, in nonnullis autem adeo extendere se pergat, ut in illo eodem Juvene, toto artu jam occupato, qui ictus fuerat, & proximo hypochondrio, & mamilla, oppositum quoque latus jam impetere videretur, in altero autem Parisiensium exemplo manum oppositam fauciatæ vel multo citius prehenderit, quin Falloppius noster (f), & Albertinus (g) ex viperæ ictu videntur totum corpus intumuisse; ut Dioscoridem (h) omittam, cuius verba aliter

aliter ab aliis (i) legi, scio. Aliquando tamen incidunt casus in quibus si effectus explicare velis morfus veneficæ ejuspiam bestię, non satis sit peculiarem corporis dispositionem in medium asserre, velut cum equus (k) cujus posteriorem dextrum pedem mus raneus momordisse dicebatur, intra biduum mortuus, dissecantibus videndas exhibuit non tam adiposas cellulas a pede ad cervicem usque sero flavo turgidas, sparsimque fugillatas, flaccidos autem musculos, & hæc quidem a dextris, quam pulmonem dextrum maculis distinctum nigris, & ipsam cordis auriculam dexteram flavam, seroque repletam; sanissimis vero musculis, pulmone, & auricula sinistris: quod discrimen neque a virulentia e vulneris in sanguinem immixta, neque a certa sanguinis dispositione, sed ab irritatis potius nervis dexteris, si auricularas præsertim respicias, facile deduces.

35. Ut vero in iis de quibus paulo ante dicebam, ita etiam in aliis viperini veneni effectibus animadverendas varietates ab alterutra quam commemoravi, causa repetes. Quasdam ex præcipuis hic juvat proferre. Vomitus, si plerique attendas indicatarum Observationum, vix unquam abesse, credes. At vero Paulus (l), Aetius (m), Avicenna (n), nisi in pluribus deesse vidissent, hi esse aliquando, ille esse in quibusdam, non scripserint. Neque Courtenius (o) cum de multis loquatur canibus, neque inter cætera lethargicum quendam stuporem, a non multis aliocum memoratum, ut *solum* hujus veneni effectum reticeat, ullum de vomitu verbum facit; quod neque fit in Scholii illius 2. neque in Observationis illius VI. experimentis, quæ supra (p) ex Sepulchreto indicavimus: si unum excipias, cui tamen quod continuo subjicitur, diserte hæc habet: *Vomitus nullus sequitur*. Pariter in iisdem, & Courtenii experimentis dejectiones quæ dignæ quidem adnotatione fuerint, proponi haud video: quarum tamen vehementia, aut peculiaris natura a pluribus observata est, & Cl. Meadius (q) de cane quem hoc veneno infecerat peracum immisso, hæc scripsit: *orta sunt turbæ solite, vomitus, dejectiones &c.* & certe in tertio exemplo hominis a vipera morfi, quod a Parisiensibus (r) est descriptum, quam violenta fuerint utraque, manifestum est. Sed in duobus quæ illud præcedunt, exemplis dejectiones ne nominantur quidem, ut neque olim apud Dioscoridem (s), Aetium (t), Paulum (u), Avicennam (x): quorum tres priores *termina*, Avicenna *gravitatem in dorso*, omnes *urinae difficultatem*, quin pro hac Aetius *cruenta lotia* & fere omnes *cruentas gingivas* commemorant. Has tamen, & urinae difficultatem in recentioribus Observationibus non videor legisse. Cruenta autem lotia in utroque Harderi (y) cane; de renibus autem, dorso, & torminibus questum esse hominem in primo illo apud Parisienses, scio, ut Juvenem quoque Charafii (z) de acerbis, perstantibusque circa umbilicum doloribus: in eoque etiam laborum tumor fuit, quem Redius (a) ab Avicenna, ait, esse memoratum. Quod si hic igitur, illic alii veteres Medici minus frequentia symptomata non omisere, tanto magis dejectiones videntur fuisse proposituri, si tam crebro ab ipsis essent animadversæ. Neminem autem memini five priscorum, five recentium qui non viderit convulsiones, easque aut nomine hoc ipso, aut convulsivorum five motum, five tremorem, five tensionem, five horrorem non designaverit; aut symptoma aliquod, sine iis haud facile explicandum, non protulerit. Mitto cætera quæ producere non vacat: mitto quæ prodixi omnia præter vomitum, quem crebro adeo fuisse adnotatum, dixi, tanto autem magis hic attendendum, quod Parisienses qui fupervenire satis constanter, agnoverunt, in ventriculo tamen ullum ordinari inflammationis, nedum gangræne indicium ab se repertum esse, negarunt; ut in tot saltem quæ dissecuerant, animalibus a convulsis nervis videatur repetendus.

36. Nec vero facile dissentendum est ab Doctissimo quem sæpius laudavimus, Viro, cum indidem esse deducendum putat, quod morfi a vipera icti fieri; neque enim tam cito mutare in sanguine particularum naturam, aut miscelam admittum veneni paucillum potest, quam convulsione adstrictis in hepate biliariorum du-

ctum initiis, quæ a sanguine jugiter ejicienda essent bilis corpuscula, in hoc retinere. Credo autem ipsi, colorem totius cutis intra non integram horam fieri flavum, nonnunquam tamen; non sæpe adeo, ut ejusmodi effectum *huic veneno proprium* dicere possimus. Et memini quidem Cardanum (b) legisse mirantem, quod *persepe in ictu oculi, isti a viperis contrahant talem colorem*. Sed & Donatum (c) postea legi, *raro homines a virulento ictu fieri ictericos*, affirmantem, credentemque propterea, hoc iisdumtaxat accidere, quorum sanguis plurima abundet bile, quæ si flava fuerit, flavo; si nigra, nigro; si porracea, porraceo quoque colore cutem inficiat. Quo sane infectam fuisse, neque adeo cito, ex Galeni (d) exemplo constat, quod profert; citri autem colore ex altero, quod producit, Avenzoaris (e) exemplo, neque a morfu, ut in illo, viperæ, sed a veneno devorato. Huc adde observatum flavum icterum a punctione aranearum, ut est apud Ettmüllerum (f); non semper tamen, nec omnium. Videre enim, exempli causa, potes, quam graves noxas illa attulerit de qua Cl. Bernerus (g), & quam varias, & sæpe quanto perniciosiores eæ de quibus sub Etrusci phalangii nomine scripsit Vir Doctus Brogius (h), cuius Tractatus pervellem antea prodidisset, quam has, jam scriptas, Epistolas recenserem. Ab iis illud quoque adnotavit, per quod cum phalangio Apulo, & cum eo scorpione a quo punctum Petrum a Castro fuisse, dixi (i), videntur posse comparari, videlicet an insequenti eodem tempore symptomata redidisset. Ab neutro tamen Scriptore tot inter noxas icterum memorari, animadvertes. Porro Ettmüllerus est hæc subiicit, ex *viperæ morfu suboriri ordinario fere icterum*, jam Veteres annotasse, sicut Zacutus Lusitanus l. 5. Medic. Princ. Hist. 29. refert; hunc tamen si inspexeris, non plura de eo quidem invenies referre, quam Donatum, quem magis sequitur, quam suspicari possit qui utrumque non conferat; nec bene tamen ubi Brasavoli (k) in Tombeio Observationem describit, quasi Donatus hanc produxisset, ut ad icterum ex venenato morfu spectantem, Paulus quidem (l), & Aetius (m), quos uterque laudat, de morbo regio ex venenatis ictibus fecere mentionem; quin Aetius inde etiam *contingere consuevisse*, diserte ait. Sed utriusque horum sermo est de omnibus, non peculiariter de viperæ veneno, quam etsi alter exempli causa nominat, ex ea tamen porraceo colore tingi cutem, docet, imo cum peculiarem de ea habet tractionem (n), plumbeo, Paulus autem (o) generatim ponit *coloris vitiationem*, quam Avicenna (p) *decolorationem*, ait, ad *viriditatem*. Atque ut intelligas, icterum non semper, & in aliis alio colore fieri; animadvertas, velim, Dioscoridem (q) scripsisse, *subalbidum inde colorem concipi*, horum autem omnium vetustissimum Nicandrum (r),

Nigricat ipsa cutis, plumbi modo fusca colore, Cerulea interdum est, ævisque similima flor. Utque ad Zacutum redeamus; habet hic alibi (s) Observationem huc maxime attententem, & quam in Sepulchreto non relata esse, miror, propter gangrænam in jecinore deprehensam. Scilicet cum menses duos, alte dormientes, eadem vipera momordisset, amboque post horam convulsiones variæ concussissent, eorum alter in *flavissimum icterum*, post decem horas; alter, qui servari non potuit, in *nigerrimum*, post 14. horas lapsus est, ita ut *Ethiopsis formam repræsentaret*. Quas autem icterici coloris varietates, recentiores Zacuto Observatores adnotaverint, non possum dicere, cum in descriptis hominum exemplis, fortasse ob regiones, in quibus erant, minus æstuosas, ne icteri quidem mentionem factam esse, meminerim, sed neque in tot brutis animantibus, quorum certe oculi, dum etiam tum viverent, aut membranae passim in dissecis post mortem, insolitum colorem, præsertim flavum, vel cursum insipientibus ostendissent.

37. Habes longum, sed fortasse tuis studiis non prorsus inutilem, de Vipera sermonem ex comparatis inter se iis quæ nunc forte in manibus erant non veterum modo, sed & recentium Auctorum Scriptis; ut non videar expectare a te posse quod olim super Epistolis de Aspidis veneno ad Lancisium datis (t) retuli ab Doctissimis, & erga

(b) Sect. ead. Obs. 6. §. 8. (c) Lett. cit. (d) Tent. 1. cit. (e) Schol. 2. supra cit. (f) Vid. ex. gr. inter inject. Courtenii cit. supra ad n. 16. (g) Vid. Intro. ad Teniam. (h) n. 30. (i) Comment. in Præf. Diof. ad l. 6. (j) Eph. N. C. Dec. 3. A. 3. Obs. 152. (k) n. 30. (l) Tent. 1. cit. (m) in Addit. ad hanc 10. S. Obs. 1. & Schol. 2. ad Obs. 1. (n) Obs. ead. 2. & Sect. ead. Obs. 6. (o) Observaz. cit. (p) n. 9. (q) Hist. de l. Acad. R. des Sc. A. 1747. Obs. Anat. 1. (r) cit. supra n. 29. (s) Lettera cit. n. 29. (t) Ibid. cit. (u) Append. ad Obs. 6. hujus 10. Sect. (f) De Tumor. præf. nat. 6. 3. (g) Opus. 2. in Comment. Inst. Sc. Bonon. Tom. 1. (h) De Med. l. 6. c. 10.

(i) Severin. c. 1. cit. supra ad n. 31. (k) Vid. Murry Quest. Med. Paris. propos. die ult. A. 1749. n. 4. (l) De Re Med. l. 5. c. 12. (m) Tetrab. 4. §. 2. c. 21. (n) Canon. l. 4. F. 6. tr. 3. c. 32. (o) S. cit. supra ad n. 16. (p) n. 33. (q) Tent. 1. cit. (r) cit. supra, n. 29. (s) (t) (u) (v) capib. cit. (g) Sepulchr. S. hac 10. in Addit. Obs. 2. (h) supra, n. 34. (i) Observaz. cit. (j) Comment. in Hippocr. Aph. 62. l. 4. (k) De Med. Hist. Mirab. l. 1. c. 9. (l) De Loc. aff. l. 5. c. non 6. sed 7. (m) l. 1. tr. 13. c. 6. (n) Prax. l. 1. S. 17. c. 3. art. 4. (o) Eph. N. C. Cent. 9. Obs. 49. (p) De Venen. Anstam. p. 7. (q) l. 1. tr. 13. c. 6. (r) Comment. in cit. Aphor. 62. (s) De Re Med. l. 3. c. 50. (t) Tetrab. 2. S. 1. c. 17. (u) l. 4. §. 2. c. 21. (v) l. 1. c. 12. (w) cit. supra ad n. 35. (x) cit. supra ad n. 34. (y) apud Severin. Viper. Pyth. p. 3. c. 1. (z) De Medic. Princ. Hist. l. 2. Hist. 135. Obs. 20. (a) in Append. ad Metalotheca Vaticanam Mercati.

& erga me alioquin humanissimis Viris, scilicet *praefuisse* sorte propriis experimentis fuisse meum, quam *aut* *Fortitate Actii*, & reliquorum veterum, qui in his nimis saepe incaute procedunt. Nempe hic usus sum recentium quoque cautissimorum hominum experimentis, quibus pariter usus fueram in illa disputatione, si ulla eorumdem extitissent. Nam mea ne in vipera quidem habui quae ad te mitterem, quippe aliis, atque aliis, cum illa instituendi tempus peractum fuisset, occupationibus distentus, & periculi plena tentamina antea averfatus, quam mihi, ut aliis qui diu exercitati in iis fuerant, aut nocerent (x), aut abominationem, nedum fastidium (x), crearent. Verum ut hac me non retraxissent; non video, quomodo ab Eruditissimis illis Viris possent ex me experimenta in aspidibus expectari, qui in Africa, atque adeo in Egypto nunquam fuissent. Scribit enim Strabo (y), *Egyptiam aspidem*, de qua potissimum nostra fuerat disputatio, proprium quiddam habere praeter alias aliorum locorum. Nam quod aspides extra Africam etiam, in ipsaque Italia & prisci, & non prisci Scriptores aliqui memoraverint, nimirum vulgi opiniones, & voces secuti sunt. Quas enim vulgo vocamus *aspides*, nullam habent fere communem notam cum illis de quibus noster fuerat sermo, ut vere Salmastius (z) censuit. & certe nec Lucanus (a) de aspidē dixisset,

Ipsa caloris egens, gelidum non transit in orbem
Sponte sua, Nilque tenus metitur arenas,
neque ab Ovidio (b) sic esset designata,

Plenaque somniferis serpentes peregrina venenis;
nisi haec genera serpentum revera; ut Celsi (c) verbis utar; & peregrina, & aliquanto magis pestifera essent, maxime quae aestuosos gignuntur locis. Nec mirum, quando vel intra ipsam Italiam venenati quorundam animalium ictus alia vis est in aliis aut magis, aut minus calidis locis. Sic tarantula, inquit Baglivus (d), *venenifera dumtaxat est in Apulia*, & praesertim camporum incolae, nam quae in montibus Apuliae vicinis reperitur, vel nullo, vel non pernicioso pollet veneno, tantoque minus vel campestris illa alias in Italiae regiones translata, ut propolita etiam historia (e) confirmat. Non est certe apud nos ejusmodi terra, qualem apud Hibernos esse, animadvertit Lombardus (f), ex ea causam repetens, cur neque ibi ulla videre animalia potuerit quae venefica essent, & quae ex his varia illuc attulerat ex Anglia, fere statim ac in Hibernia solum emiserat, mori omnia cerneret, inflata pleraque, & convulsa. At si tamen aspidibus, ex Africa huc importatis, illud dumtaxat quod tarantulis, & Apulia alio translatis, forte accidisset; nonne me mea fefellerint experimenta? Cum igitur nulla esset experiendi sine dubitatione facultas, nec, si fuisset, continuo rescribendi officium, a me non una de causa debitum, faciendi periculi spatium daret; quid mihi erat reliquum, nisi ut eorum testimonio uter, qui morsum aspidis effectus aut vidissent ipsi, aut eorum qui viderant, Scripta legissent?

38. Hic facile ex me quaeres, in disputatione illa de genere mortis Cleopatrae quae mihi cum Viro Amplissimo Lancisio fuit, quid revera ipse animo sentirem, quando exercitationis causa, ut fit saepe inter Amicos, videtur illa a me suscepta, nec secunda ejus responsioni a me repositum quidquam extat. Ego vero in re quae ob vetustatem sine priscorum testimonio pro certo non posset definiti, cum forte in Vaticana Metallothea (g) ad morientis Cleopatrae simulacrum hac ab Lancisio (quem de accepto libro certiore facere continuo oportebat) adnotata animadvertissem: *In brachio aspis spectatur, cuius morfu Cleopatram occubuisse, vulgaris fert opinio, quamvis alii epoto veneno mortem sibi conscivisse, contendunt*, suspicatus, extare fortassis ignotum mihi veteris Scriptoris locum qui hoc tradidisset, nihil magis in utraque Epistola spectavi, quam ut eum locum, si quis forte esset, ex Lancisio elicerem. Eaque mente quae pro magis vulgata opinione proferri a me statim poterant, & confirmari, semel atque iterum ad illum scripsi. Quem locum ex ejus unis, & alteris Litteris cum esse nullum, intellexissem; facile ejus voluntati obsecutus sum, ut finem facerem disputandi, in controversia praesertim,

ea qua par fuerit, hinc modestia, inde comitate orta, & progressa, utramque eximie laudantibus Viris Doctis (b) ut minime dubium sit, quia ex his aliquis a quo acerrima fuisse dicitur, nihil aliud, quam exproptos utrinque, & contentos spectaverit nervos rationum. Nostrum enim utrique plurimum faret, mihi autem, quae ejus par doctrinae, & eruditioni humanitas est, tantum tribuit, quantum ne optare quidem ausim. Sed illuc redeo. Itaque ne tum quidem a me aliquid novandum censui, cum biennio ferme interfecto, accidisset, ut addere Lancisius Appendicem deberet ad Metallotheam, scripsissetque ad me, placere Sanctissimo utriusque nostrum Domino, ut simul disputatione illa quam benigne perlegerat, ederetur, & licere mihi, si quid in meis Epistolis additum, aut mutatum vellem; quod in suis fecit ipse; significare. Parendum enim imperanti rescripti. eo autem magis ab omnibus intellectum iri, non esse a me scriptas illas, ut vulgarentur, si ita, uti ex tempore fuisse erant, prodirent. Nec tanti sane erant quae adjicerem, aliqua erant tamen, quae tibi nunc indicabo, non ut postliminio controversiam instaurarem, neque vulgatam opinionem pro certa statuerem; sed ne forte quae pro hac aut confirmari, aut dici vicissim possent, nulla prorsus fuisset, arbitris. Eorum alia sunt ab Historicis, alia a Medicis, alia ab utroque; ab aliisque insuper Auctoribus repetenda. Ex Historicis Vellejus (i), Elianus (k), Florus (l) summo consensu, & sine ulla dubitatione, aspidis mortu Cleopatram se interemisse, tradiderunt. At enim Vellejus adulationis vitio supra quam credi possit, laboravit, neque inter Historicos a Quintiliano recensetur. Florus puerili desiderio mirabilia dicendi, veritatis dispendio se abripit, passus est: & si ad has accusationes, a Sigonio, Lipsio, Scaligero acceptas, aliam ex Verderio (m) sumptam, adversus Elianum adjungas; hic quoque dum alius ab Aristotele videri vult, a veritate recedit. Verum longe facilius esset singulorum laudationes ex multo pluribus proferre Auctoribus, quam accusationes istas ex nonnullis perquisivisse. Illas tamen omittimus, cum ad has satis sit animadvertere, nihil ad Aristotelem attinere, quo mortis genere olim esset Cleopatra peritura: nihilque mirabilis in eo esse quod, quam, facto in damnatis periculo, nullum citius simul, mitiusque in perimendo deprehendisse venenum constabat, quam ab aspidis morfu, ea se quoque hoc ipso necasset: nihil denique adulationis erga Augustum fuisse, feriendo, ab hoc illam morfu potius, quam ab epoto veneno, mortuam. Nam quod Vellejus non sit a Quintiliano (n) inter Latinos Historicos nominatus; nec Caesar ipse nominatus est, credo quod laudabilia quantumvis utriusque Scripta pro iusta historia, de qua ibi erat sermo, non haberet, quando sua Caesar ipse ut Commentaria, reliquerat, Vellejus autem amplius volumen non uno loco (o) pollicitus summa fere attigerat capita.

39. Sed iis tribus totidem obijciuntur Historici, qui non idem confirmaverint. Suetonius (p), Plutarchus (q), Dio (r): imo his duobus contenditur, majorem esse fidem habendam, quippe Graecis, eoque in historia verum diligentius inquirere solitis, quam Latinis, & in re praesertim ad Graecum imperium attinentem, si loca attendas, propioribus; si documenta, instructioribus. Non est mihi in animo illud Quintiliani (f) commemorare: *Graecis historiis plerumque poeticae similis est licentia*, multoque minus (r) quidquid Graecia mendax audeat in historia: quin ultro fateor; fuisse ex Graecis summos Historicos, quorum ope res etiam Romanas discimus, praesertim quod ad ritus attinet publicos. Hos enim, aliaque ejusdemmodi, ut in quadam Grotii Epistola legisse videor, adnotant, traduntque diligentius Exteri, quam Cives, qui cetera notissima omnibus, inutiliter scribi censent. Sed & res ab Romanis gestas ex magnis illis inter Graecos Historicis permultas discimus, in primis ad ea usque tempora quibus tandem Latini sui ipsi facta elegantius scribere coeperunt. Nam vel ab initio rerum Romanarum, ut testatur Cicero (u), usque ad P. Mutium Pontificem Maximum res omnes singulorum annorum mandabat litteris Pontifex Max. Quorum Annalium similitudinem multos secutos esse, dicitur qui

qui sine ullis ornamentis monumenta solam temporum, hominum, locorum, gestarumque rerum reliquerunt, ut major Cato, & Picior, & Piso: quae causa videlicet fuit cur ad nos eorum Scripta non pervenerint contra, ac multa illorum qui post eos Romanas res ornatius latine scribere instituerunt. Quo ex tempore me non injuria factum puto, si de modo rei praesertim, quam hic spectamus, neutrius partis gloriam augente, plus uni Latino credam in Romana quidem historia, quam Graecis duobus. Ad Romanam autem, an ad Graecam historiam spectet bellum ab Augusto, victis, & ad mortis necessitatem additis Antonio, & Cleopatra, confectum, quid attinet ostendere, cum & dux uterque Romanus, & belli praemium Egypti regnum fuerit, in Romanam provinciam redactum? At enim & Cleopatra Graeca erat, & Graecorum id regnum, ut quorum imperium, & lingua vigerent Alexandriae. Fuerit; quis enim negat? & Regina, & regi a Graecis vetusta origo. Num Graeca propterea & leges, & instituta, & lingua, an Aegyptia, an alia post annos jam prope trecentos in eorum regno dominabantur? Cujus Reges jam antea vel ne Aegyptiam quidem linguam didicisse, vel Macedonicam reliquisse, quidem ipse Plutarchus (x), populi autem illa pars quae ab antiquo ex Graecis fuerat, & communis Graecorum consuetudinis haud immemor, jam Polybii aetate, ut Strabo (y) docet, evanuerat. Nam quod Plutarchus, & Dio locis propiores, documentis instructiores fuisse dicuntur; tam longum est intervallum quod Boeotiam, & Bythiniam, unde illi erant, ab Aegypto disjungit, ut non tanto majus denique videri debeat quod inter hanc, Italianque interjicitur. At minus certe, id quod praecipue in Historicis spectandum est, intervallum temporis fuit, quo propior Cleopatrae mortis Vellejus, quam Plutarchus; & Elianus, quam Dio. Documenta autem num certiora Plutarchum accepisse credemus ex avo voce, narrante quod a Philota audiverat familiari cujusdam ex Antonii coquis, an Vellejum, tempore illi quam proximam, ex praestantibus Viris qui cum Augusto fuissent Alexandriae, saepius audire domi, militaque potuisse, utrobique (z), ut nobiles Majores sui, non sine illustribus muneribus, & ornamentis versatum? Quod si ut huic adulationi obiecta esse videntur Tiberium, & necdum omnino pessimum, sed inter bona, ut ait Tacitus (a), *malae mixtum, incolum matre*, in cuius obitu sua hujus Vellejus historiae finem fecit, mox ipsam ad Vinicium insequenti anno Consulem mittens, ita placeret Dionem, & Plutarchum accusare; non deessent Valesii, Rapinii, Bodini, Vossii, Lipsii censura, illum ut plagiarium, a vero deficiente, optimis insensum, saepe adulantem, saepe hallucinantem, diserte arguentium, neque aliorum in Plutarchum, majorem in ipso rerum Romanarum notitiam desiderantium, nec perveterum solum, sed & earum quae in tempora non ita antiqua inciderunt, cujusmodi exempla; ut mittam quod est apud Lambinum (b); vel uno in facto plura proferat Paulus Manutius (c), miraturque, tam turpiter esse lapsum, quod & alibi (d) ait, saepe eidem accidisse; quoniam mirum id esse negat Bodinus (e), in homine Graeco, qui se linguam Latinam non satis intellexisse, in Vita Demosthenis (f), confitetur. Quo & illud pertinet quod ab Rhodio (g) scriptum est, Plutarchum, Latinis codicibus usum, in rebus Romanis saepiusculum falli. Neque ignota sunt quae ejusdem vel in nominibus Romanorum errata notaverat Robortellus, alibi (h) a nobis laudatus, aut quod Lipsius (i), ubi non Plutarchum modo, sed universos Graecos Historicos in iis praesertim quae ad nationes externas attinent, Romanis esse praepositos, diserte negat, varia illos cum in rebus ipsis seipsis peccasse, tum in nominibus praecipue propriis turpiter lapsos esse, contendens. Verum non ob cetera eximii utriusque Historici, Dionis videlicet, & Plutarchi praesertim, merita, haec obijcere tanto libentius omitimus, quod neuter, ut neque Suetonius, ipse quoque tanto posterior Vellejo, negat, denique id quod de genere mortis Cleopatrae hic tradidit, sed est idem non affirmat, plura tamen habent, ex quibus, cum Medicorum, ad quos transimus, diagnostica doctrina conjunctis, Vellejii sententiam tueamur.

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

40. Nam Dio (k) puncturas tantum exiguis in mortu Cleopatrae brachio repertas esse, affirmat: quales & Plutarchus (l) memorat duas. Idemque Dio, & Suetonius (m) psyllas ab Augusto esse admotas, scribunt, qui venenum scilicet exsugerent. Unde autem exsugerent, nisi ex illis venenatis puncturis? quibus quam proficuum fuctio remedium sit, supra (n) ex veterum, recentiorumque Medicorum sententia satis demonstratum est. Punctura autem exiguae, & duae, ut apte congruant cum iis quae veteres iidem Medici summo consensu de aspidis morfu tradidere, altera ostendit Epistola nostra. Cum obscuris enim vulnusculis, quae acui inflata sint, omnes comparant, & diserte citra tumorem esse, fere omnes docuere, aliqui etiam binas esse, non omisere. Nec vero illos, tanquam sua ex aliis describentes, despicias; neque enim aliena semper, sed & propria scripserunt, quod ex attenta eorum lectione, aut ex Freindii Historia Medicinae, ubi de singulis verba fecit, proclive tibi erit cognoscere: & quae aliena proposuere, ex Observationibus fere sunt, quas nisi ipsi nobis servassent, prorsus ignoraremus, excellentium Medicorum. Nec quod Dioscorides, qui eadem tamen quae ab illis omnibus, aut ferme omnibus scripta esse, modo dicebamus, ipse quoque antea docuerat (o), aut non fuerit quem Cleopatrae familiarem fuisse, accepimus, aut nullam de hac ab aspidis morfu interfecta mentionem iniecerit; idcirco quae de exigua, & sine tumore punctura scripserat, illum consequente, non credemus: quam & facta fortasse Cleopatrae mentio potest, ut tot alia quae Maranta indicat (p), temporis injuria in Dioscoridis codice interciderit, nec desunt adhuc quae Suidae (q) credant, fuisse hunc ipsum Dioscoridem, qui vixisset apud Cleopatram sub Antonio, habentes, ut puto, nonnulla per quae rationes secus consensuum in dubium vocent. Verum ut hac praeteream: non illud certe moraturum te arbitror, quod tam perniciosi morfus tam leve, atque obscurum, quale Veteres docuerunt, videatur esse non posse vestigium; sed eo adductum potius, quod Eliani (r) tempore jam facere conati erant, ut ipse quoque admiranda hujus rei causam inquiras. Scilicet hanc illi esse ponendam in mirabili celeritate, existimabant quae id venenum ad intima transeat, licetque exterius nihil extet atque emineat: quare ab Octavianis Cleopatrae mors non facile, inquit, oculis comprehensa est, nisi tandem sero admodum ex duobus punctis difficiliter ad videndum. Quod si tibi vetus illud cogitatum recenti explicatione placeat illustrare; tanto facilius uti ea poteris quae saepius supra usi sumus, venenum ponentes nervos adoriri, quanto hoc ab eo veneno fieri manifestius est quod aspis mordendo immittit, soporiferum, ut ante (s) retulimus, ab Ovidio dictum, ut ipsa aspis dicta est somnifera a Luciano (t), eademque mente, doctissimorum Virorum judicio, ab Helvio Cinna (u) somnifera explicat, hypnale somno necat, teste etiam Cleopatra. Nam qua ratione, nisi tenuissimam dicas venenit vim per nervos celerrime transferri ad cerebrum, exponas haec quae Lucani (v) verbis proferam, ictum ab aspidē alloquentis,

nilloque dolore
Testatus morfus, subita caligine mortem
Accipis, & Stygias somno descendis ad umbras.
Non tam veloci corrumpunt pocula letbo &c.

Usus autem sum non unius Poetae verbis, non quod de somnifero aspidis veneno, & de veloci ex eo caligine, ut Dioscorides ipse (z) loquitur, verba mihi Medicorum deessent, sed ut intelligeres, vim hujus veneni maxime hypnoticam tam certam, & vulgatam esse, ut passim non in Medicorum modo, sed & in Poetarum quoque libris memoretur. Cerebro igitur celeriter adeo, vehementerque occupato mirum non est, si ab eo pendentes reliqui corporis vires mox ita collabescant, ut tanquam paralyti universali induta, ideoque sanguinis motu per tenues praesertim subcutaneos ramulos sufflaminato, in compuncto loco non magis propemodum rubor, livor, tumor se possint ostendere, quam si cadaver pungeretur. Sic autem ubi aspidis morsum praesentissimus interitus sequitur, res videtur

(u) Vid. Gentil. Annotaz. alla pag. 73. v. 25. della Lett. Filos. (x) Vid. Redi Lett. int. alle Oppoz. (y) De Situ Orb. l. 17. (z) Plin. Hist. l. 2. c. 124. in fin. (a) Annal. l. 5. c. 27. S. 10. (b) Diab. de Taran. c. 7. (c) Plin. Hist. l. 2. c. 87. (d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 3. Obs. 79. (e) ad fin. Armaz. 10. (f) Giornale de Lett. d'Ital. Tom. 33. P. 2. Art. 8. in fin. (g) Hist. Rom. l. 2. c. 87. (h) De Hist. Animal. l. 9. c. 61. (i) De Gest. Rom. l. 4. c. 11. (m) Censur. in Auctor. (n) Instit. Orator. l. 10. (o) l. 2. c. 48. 96. 99. 103. 114. 119. (p) De duodec. Caesar. l. 2. c. 17. (q) Hist. ad Vocem Dioscorides. (r) Hist. Rom. l. 1. c. 4. (s) Juvenal. Sat. 10. (t) De Oratore l. 2. (u) Instit. Orat. l. 2. c. 4. (v) Juvenal. Sat. 10. (u) De Oratore l. 2.

(*) in Antonio. (y) De Situ Orb. l. 17. (z) Vid. Voss. de Hist. Lat. l. 1. c. 24. & Boeceri Indic. Vellejanum in Vellejus, cui adde Vellejii l. 2. c. 124. in fin. (a) Annal. l. 5. c. 27. S. 10. (b) Diab. de Taran. c. 7. (c) Plin. Hist. l. 2. c. 87. (d) Eph. N. C. Dec. 3. A. 3. Obs. 79. (e) ad fin. Armaz. 10. (f) Giornale de Lett. d'Ital. Tom. 33. P. 2. Art. 8. in fin. (g) Hist. Rom. l. 2. c. 87. (h) De Hist. Animal. l. 9. c. 61. (i) De Gest. Rom. l. 4. c. 11. (m) Censur. in Auctor. (n) Instit. Orator. l. 10. (o) l. 2. c. 48. 96. 99. 103. 114. 119. (p) De duodec. Caesar. l. 2. c. 17. (q) Hist. ad Vocem Dioscorides. (r) Hist. Rom. l. 1. c. 4. (s) Juvenal. Sat. 10. (t) De Oratore l. 2. (u) Instit. Orat. l. 2. c. 4. (v) Juvenal. Sat. 10. (u) De Oratore l. 2.

detur posse explicari: & sane quam celer in Cleopatra fuerit, ex iis quæ Plutarchus (a) narrat, manifestum est. 41. At enim Aetius (b), inquit, ab uno quidem aspidum genere præsentissimam esse mortem, scripserat, ab alio autem in tribus ad summum horis: nec defuit qui tardiorum esse, ajant, & virente jam corpore ac discolorare. Quin libri Auctor de Theriaca ad Pisonem (c) etiam fatetur, revera aspidem velociter interficere, sicut sepe ipse in magna Alexandria spectavit; tamen non continuo inde homines cadere, satis ostendit, hæc statim subijciens: Cum enim aliquem hoc supplicii genere condemnatum sine longo cruciatu dilatione necare volunt, aspidem illorum pectori admovent, ambulareque parumper faciunt, atque sic ipsos brevi perimunt. Sed & Plutarchus (d) alteram e Cleopatrarum ancillis inventam refert capiti Regine diadema aptantem, nec loquendi facultate carentem. Utique; sed tamen semianimam, & quæ vix per paucis editis voculis, continuo cecidit. Nec qui parumper ambulabat, idcirco non brevi, & velociter moriebantur. Et si qui diutius vitam traherent, non illis demum mirum est ob id ipsum discolor, & virens corpus fieri potuisse: quod si hoc commune fuisset omnibus; psylli Cleopatrarum non essent admodum; satis enim ejus corpus, ut Plutarchus (e) narrat, neque deformatum, nec aliud ullum, præter puncta illa duo, ostendens veneni signum, non ab aspide ictum esse, demonstrasset. Verum hæc ita disputamus, quasi ubi inter venenatum istum, & mortem horæ aliquot intercesse- rint, fieri non possit, quin locus, per quem immissum venenum est, tumorem contrahat, & livorem. Tamen extant certissima exempla quæ ostendant, vel quinque, aut sex horis interjectis, quidquam livoris, aut tumoris in eo loco non apparuisse, ut in columbis quos Africanus scorpis ictibus occidit Redius (f). Sed neque in cane quem Monipeliensis fauciverat scorpius, quinque exinde hora mortuo, tumoris quidquam in faucibus parte ostendit Cel. Maupertuisius (g), cum aliquot tumor soleat vel apud, aut vespæ puncturam sequi; verum in cuiusque ictus loco parvum tantummodo rubrum punctum: negatque, in tot animalibus quæ ad idem adhibuit experimentum, unquam aliter se vidisse. Atque ut ad animal aspidi similis, id est viperam feronem convertam; ex iis certe quæ supra (h) scripsi, in Francini catella nostri partem nullam corporis lividam, aut tumidam fuisse vel plures post horas ex quo lethales a vipera acceperat morsus, in Nobilis autem Juvenis (i) digito quem altero dumtaxat dente vipera ita vulneraverat, ut, gravissima sint consecuta symptomata, post horas demum aliquot tumorem apparuisse, cum ad id usque tempus nil nisi punctura cerni posset non major ea quam infligit acicula, foramine in superficie minimo apparente, cum levissima rubedine, adeo ut solo colore innotesceret. Quod si interdum non plus a vipera est; quantum minus esse ab aspide illa poterit, cujus veneni vis ut celeritate ad cerebrum repit, sic tempus fauciat loco non relinquit, ut liveat, & in tumorem se attollat.

42. Nunc quid Plutarchus, & Dio, si cum aliis præterea conjungantur Auctoribus, nobis suppeditent, videndum est, unde facilius tueamur sententiam magis vulgatam. Igitur ex Plutarcho (k) hoc primum habemus, Cleopatram, neque stupido, neque humili animo scemnam, cum priusquam in Augusti potestatem veniret, quid sibi imminere posset, prospiceret, mori potius, quam ex regina servam fieri, & ante victoris curam per triumphum duci, statuisse. Hac mente vim ingentem venenorum parasse, & de singulorum effectibus in capite damnatis periculum fecisse, nempe ut sibi illud seligeret, per quod non modo sine dolore, sed & celeritate obiret, ne forte, si mors tardaret, in vita remedium ope vivere cogeretur. Quodnam igitur ex omnibus elegisse, credemus? Mineralia certe repudiasset, quippe utrique ejus voto adversantia, si tunc illis inter venena usi essent, quod factum non meminisse legisse, præsertim cum artificia illa chymica necdum essent nota per quæ perniciosæ eorum vires acuantur. Ex Vegetabilibus, & ex Animalibus in usu erant, nec ars varia deerat, ut quam celeritate necarent, quarum una ex Suetonio (l) intelligitur, cum venenum intra

quinque horas occidens, mox a Locusta iterum ac sepius recitum; credo, ut multo maxima parte dissipata aquearum particularum, venenæ confectiores forent; statim exanimavit. Quod venenum sive ex Vegetabilium, sive ex Animalium, sive ex utrorumque succis constabat, tamen Cleopatrarum notum fuisset, ut facile notum erat quod ex Animalibus educum esset: Nationes adhibebant ad tingendas sagittas, quale apud Scythas Plinius (m) memorat, irremediabile, quantum ipse ait, & mortem illico afferens levi tactu; tamen ut mortis celeritatem probaret, cruciatum brevem illum quidem, sed acerbissimum, averfaretur, cujus indicia cruciatu ex convulsionibus, ut opinor, vehementibus cognovisset, quas ut Locusta illud venenum statim consecutus esse, ex eo conjicio, quod lethalem ejus effectum per speciem comitalis morbi, cui Britannicus esset obnoxius (n), statim Nero occultari posse, credidit: Nicholli autem aquam, ex lauroceraso paratam, rapidissime quidem perimere; sed non sine vehementibus convulsionibus, refert Meadius (o); denique ex Reaumurii (p) experimentis constat, leviter puncta animalia sagittarum mucrone, venenata compositione quadam illo ab incolis oræ Maragoniæ cito quidem interiisse; sed, quod diserte de urlo narratur, ante mortem se concussisse, atque agitare. Ob has igitur, aut similes causas factum esse, existimo, quod Plutarchus narrat, ut Cleopatram, venenis primum aliis frustra tentatis, ut pote quæ minus ambobus suis responderent votis, ad animalia, quod & Dio (q) scribit, convertam, & per multos dies frustra pariter expertam, comperisse tandem, per solum ferre aspidis morsum se posse voti utriusque compotem fieri. Quæ si omnia attenderis; facile intelliges, cur rejectis aliis quæ illico necarent venenis, quorum aliqua in promptu habuisset, infra (r) ostendimus, longe credibilis sit, aspidis prætulisse morsum, præsertim cum cætera quæ de puncturis exiguis illis duabus & de admodum psyllis supra (s) dicta sunt, apprimè conveniant. Nam quod Doctus Vir iis qui minus attente legant videri fortasse potest istis de psyllis ita sensisse, quasi ab Augusto illud tantum studio adhiberi; satis est Suetonium (t), & Dionem (u) inspicere, ut eo animo id ab Augusto factum plane cognoscamus, quo Cleopatram servari triumpho magnopere cupiebat, & quo postquam per psyllas qui venenum ac virus exegerant, servari vidit non potuisse, magnopere doluit, omni se triumphi sui gloria spoliatum esse ratus. Quod si ipse qui statim adfuit, & corpus inspexit, & qua erat potentia, & ingenio tum perquirere ex omnibus, tum discipere omnia potuit, illam aspidis morsu eneclam credidit, ut refert Plutarchus (x); nam in triumpho, Cleopatra imaginem tulit cum aspidem mordicus affixa; cur non quod ipse, nos quoque credamus? præsertim cum alia insuper accedant quæ ex Plutarcho eodem, ex Dione, ex aliisque, etiam Medicis, Auctoribus continuo profereamus.

43. Quid enim potius significat quod pro certo tradit Plutarchus (y), eodem quo Cleopatra obiit, die, atque adeo paucis ante obitum horis illata ad ipsam ex agro cista, ficum plena, & solis aperta, nisi quod posita dictum esse, ait, aspidem in cista fuisse abditam? idque ex aliis refert Dio (z); tamen in urna dicat illam aspidem, aut inter flores quosdam, Auctor autem libri de Theriaca (a) contestam ficibus & uvis. Quæ cum attendo, illud simul videor posse conjicere, nempe cujus generis aspis fuerit. Cum enim tria esse genera, traderent (b) alias pythades, alias terrestres, alias chelidionas appellantes, primas autem bicubinales, alteras interdum quinque cubitorum longitudine, tertias cubito dumtaxat majores inveniri, docerent; has ultimas non modo ut facile reperirentur, quippe circa fluviorum ripas, proximi præsertim Nilis, latibula habentes, itemque ut celeritate præ cæteris necantes; ab harum enim ictu mors præsentissima adest, verum etiam ut quæ propter suam brevitatē multo facilius sub floribus, folisque abdi possent; has, inquam, cum Cleopatrarum opportuniore, tum præcipue ad fallendos qui januam custodiebant, aptiores fuisset, non dubito. Consentit autem pervertus, doctusque

etiamque Artifex simulacri Vaticanus, qui ut moribundam Cleopatram perite expressit quasi placide dormientem, ita & brevem aspidem brachio adjunxit, eique sinistro, credo, hoc quoque a prisco aliquo Scriptore accipiens, a quo & Orosius (c) Historicus aliquin sæculi quinti, videtur accepisse. Verum five res ad eum modum se habuerit, sive, ut alii ferebant apud eundem Plutarchum (d), servata aspis fuerit in vase quodam inclusa, & per fistulam auream a Cleopatra provocata; utralibet narratio eodem tendit, ut aspidi se mordendam præbuisse, censerent. Vides igitur, ut quæ Plutarchus, aliique referunt, cum iis congruant quæ Vellejus, atque alii, initio laudati, tradiderunt. Eandemque sententiam sibi magis placuisse, satis ostendit, quem paulo ante memorabam, libri de Theriaca (e) Auctor. Qui sive Galenus fuit, sive alius Galeni certe contemporaneus, ut qui non multis ante se annis fuisse Andromachum, scribat (f), Marcum autem Antoninum paulo ante Romanum imperium summa integritate administrasse (g); non est a nobis commendendus, ut pote qui, si ætatem spectes, neque Dione junior, nec tanto denique Plutarcho posterior fuit, quippe imperante Hadriano & Plutarcho vixisse, & Galenum esse natum, constat; si vero experientiam attendas, unus ex omnibus quos produximus, diserte ait, ut supra (h) legisti, se Alexandriæ sæpe vidisse, quomodo, & quam celeriter interficiantur admotæ aspides. Nec quia pythade; quod tamen ab superiorum nemine traditum invenimus; usam esse Cleopatram, scribit, id eo voluisse factum, intelliges, ut a pythade conspiceretur; tardius enim inde mors consequitur, ut proditum ab Aetio (i) est; sed ut morderetur; nam & morderet, ut idem subijcit, & mordendo, ut Galenus ait apud Paulum (k) celeritatem mortem inducit. Imo nisi forte Paulus alium aliquem in libris qui intercederunt, spectavit Galeni locum; hunc ipsum de Theriaca librum pro Galenico habuerit, necesse est, & hinc fumsperit quæ ut a Galeno dicta, proponit, videlicet tria illa aspidum genera, & in his pythades, in sputo diffitis affequatur, ingenium, & hac se occidentem Cleopatram. Utrobique enim hæc habentur. Sed quod in libro de Theriaca Regina dicitur sibi pythadem admovisse, id Paulus de morsu accipiendum esse, jure quidem meritoque non dubitavit; nam admovere, ut insuperet quæ eminus solita sit, minime necessarium. Quæ vero mox de celeri damnarum interitu per admotam pectori aspidem in eodem libro illo subiungitur, ea fortasse Paulus cum superioribus connectenda arbitratur, Piclorum, Sculptorumque licentia præterentem Galenum induxit, quasi Reginem scripserit, pythadi sinistram manum admovisse, & ab hac commissa peris. Quod ne credamus, Plutarchus, & Dio faciunt, negantes, ut supra (l) vidimus, in mortuæ corpore signum usquam ullum apparuisse veneni, præter duo exigua in brachio puncta. Quæ res ad id etiam valet, ut merito ab eodem libri de Theriaca Auctore factum esse, cognoscamus, cum aliam quorundam narrationem iis verbis retulit ex quibus ipsi minus probatam esse, intelligimus, de magno videlicet, ac profundo vulnere, quod brachio suo dentibus invulerit Cleopatra, & de veneno, quod prius ex aspide paraverat, in pside quadam ad se allato, & mox ei vulnere infuso.

44. At exigua ista in brachio puncta ut de magno, profundoque vulnere narrationem refellunt; sic, inquam, aptissime congruunt cum alia, quæ etiam non apud ejusdem libri Auctorem, at apud Dionem (m) extat, aliorum narratione. Scilicet acu qua capillos componebat solita esset Cleopatra, inter eosque gestare, tunc detraha, & præsentissimo veneno inuncta brachium sibi pupugisse. Tu vero fac, Redium (n) legas, ubi experimentis edoctus admonet, si vulnus quod infligis, angustum sit, difficile esse venenum immittere; & qualemque vulnus sit, non ita celeriter mori animalia per quorum vulnera viperinum injicias venenum, ut quæ vipera ipsa momorderit. Et post hæc cogita, num credibile sit, incerta & minus celeri moriendi ratione uti illam voluisse, quæ certam, celeritatemque mortem quærebat. Nec tamen de sic immisso veneno, sed de epoto nostra erat potissimum disputatio. De quo cum in tot narrationibus nulla usquam, ut supra (o) diximus, occurrat mentio; ne forte illuc trahi possit Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

se, putes, hunc Plutarchi (p) locum: venenum Cleopatram habuisse compertum est in laminula quadam concava, quam sub crine occultabat, fuisseque illud suspicere aut ejus simile quo illitis sibi convivalis coronæ floribus, hisque mox in scyphum coniectis, educum custodia bibere jusserat, illico expirantem, ut est apud Plinium (q), aut ab eo non diversum quod non multis ab Regine obitu lustris Alexandria Hierosolymam, ut Josephus (r) tradidit, missum est ad Herodem necandum, id est aspidum virus, aliorumque serpentum succi, quo epoto veneno quidam capitis damnatus statim mortuus est; ne igitur hæc suspicaris, non illud ex eodem Plinio (s) proferam: venenum aspidum potius quantalibet copia, non nocet. Non est enim tabifica vis, itaque occisa morsu earum animalia, cibis innoxia sunt, quæ eum Redii aliorumque in viperino veneno experimentis (t) consentiunt: neque alia in universum dicam, quæ in mea altera ad Lancisium Epistola attigi, unde conjicias, id venenum ad idem potius quo Dio crinalem acum inunctum scripsit, attinuisse, nihil vide licet, sicut aperte retulit, nisi per vulnus nocente. Unum modo ex Dione eodem, & Plutarcho adiciam, unde continuo præclare intelligas, non ex sumpto quod in concava lamella sub crine gestaret, veneno Cleopatram interiisse. Dio enim (u) pro certo narrat, priusquam se occideret, Epaphroditum, cui mandata erat ejus custodia, epistolam ad Augustum perferendam dedisse, ut is occasione epistola reddenda e medio removeretur, eoque digressio, rem propositam esse excusaret. Plutarchus (x) pariter sine ulla dubitatione tradiderat, se interfectorum, tabellas ad Augustum ferendas dedisse, & ceteris omnibus a se præter duas mulieres dimissis, januam clausisse. Quid, amabo te, ut ex lamella venenum fumeret, attinebat, Epaphroditum, ceterosque e medio remove, & januam claudere? Num, cum dormire noctu, crederent, non poterat, nemine advertente, lamellam sibi e capillis detrahare, & ex eaque venenum fumere? Aliud igitur, quod non nisi remotis arbitris, id prohibetur, fieri posset, sibi tunc faciendum constituerat, asperas videlicet tractare serpentes, ut atrum non ore, sed corpore, uti Horatius (y) loquitur, combiberet venenum. Cujus ego testimonium gravissimum credo cum aliis de causis quas datis ad Lancisium Epistolis indicavi, tum ob eam præsertim quod ille, ut verbis utar minoris Plinii (z), quæ statim, cum maxime vera memorantur, audierat, est persecutus.

45. Num tamen erat aliud præter aspidum tractationem, quod, remotis arbitris, ut se veneno inficeret, potuerit Cleopatra facere, & fortasse fecerit? Nam forte, cum hæcenus scripsissem, in locum incidi Græci quidem, sed gravis, & Vellejo contemporanei Auctoris, qui locus in hac controversia non videbatur omittendus. Strabo (a) enim hæc scripsit: ipsa se Cleopatra clam admoto aspidis morsu, vel veneno delibatorio confecit; nam utroque modo dicitur. Apparet ergo, si veneno isto voluit corpus sibi perungere, decuisse antea januam claudere, & neminem apud se præter ancillas retinere. At tu priusquam hoc dicas, Plutarchum (b) lege. Videbis, eo die Regiam balneo usam, corpus, ut tum solebant, nemine admittente, aut prohibente, unguento quo vellet, ungere potuisse, tum prandisse, & magnifice quidem (unde novum capere argumentum posses, non se igitur veneno mox devorando, aut potando necare constituisse quæ per tot facta pericula ignorare non posset, quantum præsumptus cibus ingesti veneni vim aut impediatur, aut tardet (c)) dum pranderet, cistam illam, ficibus, & uvis plenam, ut jussisset antea videtur, cum aspide fuisse illatam, tunc vero denique & tabellas obsignatas ad Cæsarem dedisse, & remotis arbitris, januam clausisse. Igitur ex hac ipsa rerum serie intelligis, num veri similis sit unguento venenato, an aspide se interfecisse. Huc adde, qui tam attente, & caute eam custodiebat Epaphroditus, ut captæ vestem, quod supra Plutarchus tradidit, continuo excuteret, ne quid sub ea occultaret veneni, illum unguentarias pyxides sine diligenti examine, & exploratione non fuisse facile relicturum, aut quod multo promptius, & tutius erat, in alias innoxio un-

(a) Vit. cit. (b) Tetrabibl. 4. S. 1. c. 20. (c) c. 8. (d) Vit. cit. (e) Ibid. (f) Esper. int. ag. Insecti. (g) Comment. supra cit. ad n. 25. (h) n. 33. (i) Hist. ibid. indicata. (k) Vita cit. (l) de duodec. Cæsar. l. 6. c. 33. (m) Nat. Hist. l. 11. c. 53. (n) Vit. Tacit. Anat. l. 13. (o) in Append. post Tentam. 5. de Venen. (p) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1727. Obs. Anat. l. 1. (q) l. 51. cit. (r) n. 44. (s) n. 40. (t) c. 17. cit. supra ad n. 39. (u) l. 51. cit. (v) Vita cit. (w) Ibid. (x) l. 51. cit. (y) c. 8. (z) Vid. Actis c. 20. supra ad n. 41. cit.

(a) Historiar. l. 6. c. 17. (b) Vita cit. (c) c. cit. (d) c. 5. (e) De Re Med. l. 1. c. 18. (f) n. 40. 41. (g) l. 51. cit. (h) c. 2. (i) n. 41. (j) c. 20. cit. (k) n. 38. (l) Vita cit. (m) Nat. Hist. l. 1. c. 3. (n) De Bello Jud. l. 1. (o) Nat. Hist. l. 29. c. 4. (p) supra, n. 30. (q) l. 51. cit. (r) Vita cit. (s) Carm. l. 1. Od. 37. (t) l. 6. Epist. 16. (u) De situ Orbis l. 17. (v) Vita cit. (w) Vid. supra, n. 10.

unguento quantivis pretii plenas mutaturum, quando ei mandaverat Augustus hoc maxime, ut provideret, ne illa sibi mortem inferre posset; ceterarum rerum omnium facultatem permitteret. Unum igitur reliquum est, ut conjicias, paucillum fuisse venenati istius unguenti, ut in lamella illa concava, de qua supra (d) dictum est, sub crine occultari potuerit. Sic enim in famosa quoque veneficiis Martina, subita morte, cum Romam accusata adduceretur, Brundisii extincta, apud Tacitum (e) legitur, venenum nodo crinium ejus occultatum, nec ulla in corpore signa sumpti exitii reperta esse. At si forte sic conjicias: argumentum redit quod supra (f) contra eorum opinionem adductum est qui ea lamella venenum inclusum fuisse, contenderent, quo Cleopatra devorato se interfecisset. Cum enim unguenti paucillum non toti corpori perungendo, sed certis dumtaxat partibus, ut puta naribus, aliisque ejusmodi, fatis esset; quid referebat interdiu januas claudere, & arbitros amovere, ut id faceret quod noctu, cum dormire videretur, nemine suspicante, facere potuisset? Accedunt tot alia, quae iterare non oportet, cum unguento illo minime, cum aspidis autem morfu apprime congruentia, admoti psylli, binæ in brachio animadversæ puncturæ, cætera: inter quæ sunt perantiqua simulacra, quibus nonnihil tribuendum est, illudque præsertim quod disputandi occasionem attulit, in quo aspis est sic brachio alligata, ut ipsa vinculi constrictione irritari, & ad mordendum incitari videatur. Nec te illud moretur quod objicitur, quasi nemo audere potuisset aspi-

dem vinculo ad brachium astringere, ne se potius, quam illud, morderet. Quid enim aliud illæ quærebant ancillæ duæ, nisi ut eodem simul cum domina fato interirent, contubernalis Eunuchi exemplum secutæ, quem Dio (g) refert, statim ac ea capta fuit, serpentibus se se ultro mordendum præbuisse. Reliqua autem quæ de molli, timidoque mulierum animo, de una aspide ad tres mulieres morfu interimendas non satis apta, & si quæ ejusmodi alia aut ex Redio, aut aliunde objici poterant, tum editis antea Epistolis, tum hac quoque mihi videor diluisse.

46. Hæc habui quæ ad easdem illas Epistolas adderem, non ut iis quæ contra ingeniose, & doctè a Viro Amplissimo scripta sunt, anteponerem, sed ut collatis inter se utrisque, facilius tibi esset dispicere, an pro ea saltem parte iterum quæ a veri similitudine non longe denique in disputatione hac abhorreat. Quæ etsi per se non magni momenti est; ob ea tamen quæ ejus causa tum ex Historia, tum ex Re Medica, tum aliunde etiam, proferre oportuit, tibi cui potest esse aliqua fortasse ex parte utilis, legendi fastidium, ut opinor, mihi certe extremum hunc scribendi laborem allevavit; ut quibus verbis, a me sapius laudatus, Auctor libri de Theriaca (h) suam Pisoni de Cleopatra interitu narrationem absolvit, iisdem propemodum & mihi licere credam hanc tibi ejusdem argumenti translationem concludere: Hæc non sine animi voluptate tractavi, ut tuo disciplinarum omnium desiderio satisfacere. Vale.

(d) n. 44. (e) Annal. l. 3. (f) n. 44. (g) l. 51. cit. (h) c. 8.

FINIS LIBRI QUARTI.



JO. BAPTISTÆ MORGAGNI DE SEDIBUS, ET CAUSIS MORBORUM PER ANATOMEN INDAGATIS LIBER QUINTUS.

Quo plura adduntur ad singulos quatuor superiores Libros attinentia.

Celeberrimo Viro

JOANNI FRIDERICO MECHEL

Illustri Anatomo, & Medico

Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.



UI ex Tuis primis ad me Litteris, Berolini datis die 23. Julii anno 1754. quanto minus opinatum, tanto pluri æstimabilem nuncium acceperim, REGIAM istam Scientiarum ACADEMIAM perbenigno omnium consensu me inter suos Honorarios Sodales retulisse, & abs Te, Vir Illustris, tunc petierim, ut Inclyto eidem Cœtui gratias meis verbis ageres quas posses, cumulatissimas, nunc pariter rogo, ut pro Tua eximia erga me Humanitate, quam vel ante ista pro me officia ex laudatissimis Tuis Scriptis perspexeram, meos hosce libros velis, exiguum quidem, sed quo majus in præsentia dare non possum, memoris, obsequiosique animi signum, Academicis Sapientissimis offerre. Satis mihi, superque fuerit, si propter ea quæ ex Vestris, Vestrique similium Summorum Virorum Observationibus sæpius indicavi, omni certe commendatione dignissima, æqui bonique feceritis non tam cætera quæ a me sunt, quam propositum ipsum meum. Præcipuum autem, si quæris, hoc fuit, ut me meliores Anatomicos excitarem ad id publici boni causa præstandum, ad quod Vir Experimentissimus Richardus Meadius excitare voluit Medicos exemplo suo. Mori enim, ut scis, noluit, quin antea colligens quæ longo usu cognoverat hominibus profutura, Monita, & Præcepta Medica, tanquam *legatum*, ut verbo ipso ejus utar, relinqueret. Utinam Anatomici quoque senescentes quæ inter dissecandum vidissent ad morborum causas spectantia, colligerent, ederentque, ne laborum, molestiarum, atque adeo periculorum suorum longe melior fructus secum periret.

Tanto enim *utilior* hæc Anatomies pars est, quanto ad causas morborum dignoscendas *magis idonea*, quemadmodum magnus & Medicus, & Anatomicus censebat, ut noster, Bartholomæus Eustachius (a), sero conquerens, tot annos non in hac potius secunda, quam in priore Anatomies parte, quæ sana corpora examinat, tantumque studium posuisse. At enim secunda sine priore stare non potest, nec sine priore cognoscere licet Partium usus ad medendum adeo necessarios; quasi vero & secunda ex certæ Partis læsione cum certæ Functionis impedimento conjuncta, ad veros usus non modo confirmandos, sed & illustrandos, imo nonnunquam inveniendos, ad falsos autem refellendos mirifice non interserviret. Nam quod secunda sine priore stare non possit, nos quidem ultro fatemur, qui aliquando vel nobiles Medicos, nedum vulgares Chirurgos, vidimus hoc, vel illud viscus propter mutatam, morborum vi, sedem, figuram, & cum colore speciem, non agnoscere, quod nos ex nexibus, & vasorum origine quodnam esset, continuo indicavimus, mox per dissectionem demonstrantes. Quin omnibus qui satis sint in priore Anatome exercitati, proclive esse, existimamus, errores graves, & in graves inducturos dignoscere, qui ob ejusdem exercitationis defectum in quâdam irrepererunt, quæ in Sepulchreto leguntur, Observationes; & bene de Anatome secunda meritis Peyerum (b), & ante hunc, Thomam Bartholinum (c) laudamus, qui aliorum Observationibus hujus generis, Observationes Anatomicorum longe esse præferendas, admonuerunt, & felices tum fore Artes, confirmarunt, si soli de illis judicarent Artifices. Sed cum hæc de priore Anatome fateamur, simul contendimus, verum esse quod initio ponitur vetusti libri, qui de *Anatomia Parva* inscribitur, perperam alioquin inter Galenicos inserti, priorem videlicet institutam fuisse a Medicis propter secundam. Quoniam interiorum membrorum corporis humani passiones erant ignotæ, placuit veteribus Medicis, ille Auctor inquit, ut per anatomen brutorum animalium, interiorum partes manifestarentur. Aut si Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

Y 4

hoc

(a) de Renib. c. 45. (b) Meth. Hist. Anat. Med.
(c) Consil. de Anat. Pract. & cert. n. 12.

hoc omittimus, illud certe negari non potest, priorem Anatomen ob id potissimum ab hominibus permitti, a Principibus autem etiam protegi adeo, & promovendi, quia pro secunda est necessaria. Permagni enim cum singulorum interest, tum universorum, internas morborum causas, & sedes a Medicis non ignorari, seu singulos illi, seu totas ex infelici hereditate familias vexent, seu civitates occupent, & provincias. Medici autem vel summi fatentur, vix tres, aut quatuor ex omnibus esse morbos qui suum habeant signum *παρανομονιδν*, ita videlicet proprium, ut ab aliis cunctis distinguat; ceteros autem non nisi per conjuncta plura signa internosci propterea quia fere non ex simplici sunt causa, & quæ unam tantummodo Partem afficiat. Valde igitur avent primum singularia illa signa, & maxime propria, si fieri potest, augere; deinde vero, si id non possint, at ex conjunctis pluribus, ut dictum est, signis quæ in quoque morbo præcipua sint, constituere. Animadversum est enim sæpius quæ præcipua, & ferme propria crederentur, reipsa non esse, cum sine ipsis eadem intus læsiones reperiuntur quas designare illa putabantur, aut cum longe aliis læsionibus signa eadem.

Hæc, atque alia, quæ Tibi, Vir Doctissime, non secus ac mihi, & legere, & audire, & videre non raro contigerit, & in iis occurrentes aliquando morborum causæ novæ prorsus, & inauditæ justas medentium querelas confirmant de abditis morborum causis, & sedibus non satis adhuc perquisitis. Quod cum minus certe Anatomicorum negligentia, quam rei ipsius naturæ immensæ propemodum, & interminatæ imputandum sit; nihil propterea fieri humano generi utilius potest, quam si primum quicumque Anatomen colimus, omnes, id quod Tu strenue facis, & ipse pro mea virili parte facere non prætermisi, omnes, inquam, conatu unanimi connitamur, ut quanto plures id genus Observationes possimus, in publicum bonum conferamus: tum deinde; ne in posterum accidat quod non semel antea accidisse, dolendum est, ut cum Auctoribus Observationes intereant; Professores cunctos rogemus, ut quas prius non ediderint, senescentes colligant, atque edant, si non meum, at Meadii certe, qui imitatione dignus est, exemplum sequentes, nec pauca tamen, ut ille, sed omnia quæ diligenter observarint, summa cum fide proponentes. Sic enim, aut non aliter, posse tandem aliquando fieri, sperandum est, ut posteris tantus suppetat numerus Observationum, quantus, si ab solertibus, attentis, & studiorum labori assuetis Viris morbi symptomata in earum singulis, & Partium læsiones, tum in aliis omnibus haud dissimilis generis & illa, & hæc inter se conferantur, quantus, inquam, satis sit, ut in pluribus saltem morbis ad id denique aut perveniant, aut accedant, ad quod nunc maturum non est, aspirare. Neque spes deest, meum hoc consilium haud esse iis Anatomicis displiciturum quibus cordi sit Rei Medicæ, & publicæ utilitatis incrementum; quando aliqui Egregii Viri, rumore dumtaxat de hisce a me edendis Observationibus, ut videntur, excitati, suarum editionem repræsentarunt. Quod si propositum hoc meum a Te quoque, ab aliisque Clarissimis Viris, & nominatim ab Inclita ista Academia probabitur; nihil mihi contingere optatius poterit. Vale.

D. Patavii Prid. Kal. Septembr. A. MDCCCLX.



JO. BAPTISTÆ MORGAGNI

A D A M I C U M

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LX.

Speculat ad Aploplexiam.



REDEBAM, me tibi satis jam, superque fecisse, & quod in extrema superiore Epistola non reticueram, novissimo de his quidem rebus scribendi labore perfunctum esse. Ecce autem litteræ tuæ, quibus ita gratias agis, ut simul non obscure significes, expectari a te Observa-

tiones illas meas quas suo quamque loco inferere non potuerim, quippe habitas postea quam singulas absolveram Epistolas, ad quas attinerent: idque esse a te satis intellectum, non modo quia nosti, quotannis alia a me, atque alia cadavera perlustrari, verum etiam quia nonnullas ex hujusmodi Observationibus, a me tibi subinde inter scribendum promissas, necdum accepisti. Quid dicam? Jus postulas, ab homine præsertim, nisi remittere ultro velis, promissorum ferventissimo. Fac igitur saltem, ut eadem qua priora, comitate hæc quoque excipias, quæ, ut potero, addam, initium repetens a morbis cerebri, & primum quidem ab eorum gravissimo, Apoplexia.

2. SENEX apoplecticus in Nosocomio Patavino decesserat circa initium Decembris A. 1744. quo ibi tempore studiosis Adolescentibus partes quasdam humani corporis ostendebam. Plura, ut solitus sum, diligenter sciscitatus, vix hæc scire potui, ante dies triginta apoplexia correptum, nuper demum sine ullo sensu, & motu, oculis valde rubentibus, in eum locum fuisse illatum.

CRANIUM dum circumsecabant, Thoracis viscera, paulo ante detracta, inspiciens, in pulmonis dexteri suprema parte duritiem animadverti qualis a vetere morbo relinqui solet. Continebat autem mediocre tuberculum in quo materia purulenta. Cor polyposas habuit concretiones, nihilque adnotandum præbui, nisi valvularum Semilunarium aggeres crassiores factos, & albicantes.

His amoris visceribus, ad retectum interim Cerebrum oculos, manusque converti. Exteriore meningem detracta, unum discrimen apparuit inter sinistram cerebri hemisphærum, & dexteram, quod hujus superficies posterior nigricare in medio, & multum rubere videbatur. Nigrities autem a vasis erat quæ per Ternuem meningem repunt, nigro sanguine valde ibi distentis; rubor a sanguine qui inter illa vasa, tanquam per exudationem, effusus, spatia, vasis interpolata, quasi crusta longe tenuissima occupasse videbatur: vel potius, quoniam nihil ibi revera effusi invenire licuit, a sanguine vascula omnia minima, quæ confertissima sunt, infarciens. Tum utroque Laterali ventriculo aperto, in singulis pariter serum valde cruentum conspectum est ad drachmam fortasse unam, anteriora dumtaxat tenens, plexu Choroide utroque pallidulo, integro autem septo Lucido. Integrum quoque erat intus extraque hemisphærum sinistram, & quicquid præterea est intra calvariam, sic satis sanum, uno excepto hemisphærio dextero. Namque intra hujus me-

dullarem substantiam erat cavea, medium ferme tenens secundum omnes hemisphærii plagas, longa digitos transversos minimum quinque, lata duos, & femis, totidemque profunda, plenissima nigro sanguine, magna ex parte fluido, ex reliqua autem quali in grumos concreto. Quo detracto, cavæ parietes fæde lacerati, & inæquales apparuerunt. Circumjecta ipsis substantia erat laxissima, non medullaris solum, sed & quæ totius corporis Striati, totiusque thalami nervi Optici extuberantia nonnullam partem faciebat.

3. Quomodo cavea istiusmodi in cerebro fieri, & quam exitialis illarum Protuberantiarum vicinia tunc esse videatur, cum alias (a) ad te scripserimus, hic iterare non est opus. Illud potius quæres, cum tanta, & ejusmodi in loco, cerebri labe quomodo vivere homo potuerit triginta dies? Noli existimare, sic rem statim ac apoplexia ingruit, se habuisse. Multo sane est veri similis, tunc ex intimo quopiam disrupto vasculo non multum extillantem sanguinem illam sibi caveam parare cepisse, ipsam vero non illico ad eum modum ad quem nos conspeximus, amplificasse: sed paulatim porro extillando, id paulatim quoque fecisse, donec tot viis spirituum perruptis, & tot aliis suo aucto pondere, & mole compressis externum omnem sensum, motumque, & postremo internum quoque sustulit, mortemque sic attulit: vel, quod facilius crediderim, novo demum quacunque de causa accedente impulsu, pluribusque simul disruptis vasculis, repentina, magnaue eruptione hæc quæ ultimo dixi, non ita pridem effecisse. Utralibet ratione cogitanti proclive erit tibi non modo quod quæris, sed illa etiam intelligere, cum signa quædam primum exstant quæ sanguineam minentur apoplexiam, quam utile sit alimentorum, acris præsertim, tenuibusque particulis abundantium, copiam minuere, ab nimis corporis, animique motibus abstinere, sanguinem educere, ubi vero ejusmodi ingruerit apoplexia, tanto magis illum imminuere, & quod alias videor ad te scripsisse, ea vitare auxilia quæ commovere, & agitare intempestive ipsum possint, ut remedia, volatilibus corpusculis fæta, & quæ vomitum cient, sternutationem movent, alia ejusmodi.

4. AGRICOLAM in idem intulerant Nosocomium, cum ibi docerem ineunte anno 1743. media ætate hominem, subpinguem, apoplexia, quæ tertia esse dicebatur, forti adeo correptum, ut e via in qua ceciderat, ab Nosocomio non ita distita, in hoc protinus exceptus, jam stertens, totoque corpore resolutus, ut nullum ullam sensus, aut motus indicium daret, pulsibus autem sic exilibus, ut mittere sanguinem non sint ausi, intra septem, an octo horas interierit. Quarto post die hæc mihi omnia narrata sunt, simulque cadaver ad dissectionem oblatum. Quod priusquam attingerem, frustra quæsi, quo tempore, quibus præcedentibus cau-

sis.

sis, aut comitantibus signis, aut relicis noxis duæ illæ quæ prægressæ dicebantur, fuissent apoplexiæ; nihil enim de illis, aut de hac ultima præter ea quæ dixi, rescire potui. Attamen cum vasa circa caput turgida conspicerem, & in subpingui corpore tam violentam apoplexiam fuisse, audirem; confertissima Studioforum coronæ dicere non dubitavi, mirum fore, si a sanguine illam fuisse, non ostenderem. CALVARIA igitur continuo adaperita, cum id fieret, multoque magis cum cerebrum eximeretur, niger non paucus sanguis defluxit; evidens autem erat, etiam ex Infundibulo exire. Ejusmodi sanguis non modo vasa omnia distendebat quæ per Tenuem meningem, cerebrum, & cerebellum convectientem, feruntur, verum etiam sub hac in medio hemisphærii sinistri, inter vasa effusus erat non ita multus: multus autem in ventriculis omnibus. In Lateralibus enim præter grumum qui duas, ne dicam tres, uncias pondere æquare videbatur, fluidus sanguis reliquam partem ferme omnem eorum ventriculorum, & tertium insuper, quartumque occupabat. Cum unde erupisset, inquirerem; sic reperiebam. Sinistri ventriculi superficies posterior, & Thalami qui in eo erat, nervi Optici sua inæqualitate lacerationem prædebat: quam multo magis prodebat superficies ventriculi dexteri, utpote quæ non modo ubique erat inæqualis, verum insuper vix ullum vestigium servabat Thalami sui, nullum autem prorsus Striatum corporis, cujus sedem tenebat substantia quædam lurida, colore ex subrubro, & subflavo quasi misto, mucosa, plane corrupta, sine ullo tamen gravi odore. Ventriculi utriusque cavum erat amplificatum, septum Lucidum perruptum, Fornix vestigium nullum, plexum Choroidum vix ullum, idque a sinistris dumtaxat, nec turgidis vasculis, sed pallentibus. Quorum rerum nulla esse poterat admiratio, ubi tanta effusi sanguinis copia fuerat, quantam diximus, & ex eo concreverat amplius ille grumum qui dexteram sinistramque cavi partem, sed hanc magis, tenuerat. Ob eam igitur effusionem sanguinis tantam ne hoc quidem sum miratus, quod ventriculi tertii latera non ita perspicue apparuerint sive a compressione, sive a distractione, sive etiam a laceratione subfederant; nam ipsa quoque natum, & testium proxima superficies ita lacerata erat, ut dignosci ex Protuberantiæ non possent. Ad hæc quæ præter naturam in capite conspecta sunt, duo supersunt quæ addam, nimirum Vertebræ arteriam sinistram, antequam in Basilarem conflueret, subduram, crassam, albam ex dimidia fuisse parte: Molares autem posteriores, inferioresque dentes plerosque aut truncos, nigrosque etiam in radicibus fuisse, ut a dextris, aut penitus excidisse, ut a sinistris, idque a tempore non ita brevi; nam alveolorum ne indicium quidem restabat ullum, imo ipsum ossem maxillæ corpus jam se ibi contraxerat, subsederatque. Et ne a capite ossem ejus fulcrum producantque in hoc crani caveam disjungam; cum vertebra cervicis omnes, pluresque thoracis referatas, inclusamque medullam Spinalem inspicere, vidi inter hanc, & Piam, quam vocant, meningem in superioribus quidem thoracis vertebra ad spatia non modica effusum sanguinem, huncque a facie posteriori, ab eademque meningem illam ita e carneo rubentem colore, nullum ut sanguiferum in ea vas a capite ad thoracis fere medium agnoscere liceret, cum ab anteriori facie arteria quæ simplex per medium ferebatur, distenta sanguine conspiceretur. Sed & Crassa meninx qua vertebrarum interna latera convectiebat, a subsistente sanguine quasi nigricabat. Thorax, quem, ut quædam ex paulo ante scriptis, diebus insequentibus perlustravi, cor habuit in homine subpingui non pingue; quod cum sanguine atro, & concreto haud multo, continebat paucas, & modicas concretiones polyposas, in dextero tamen ventriculo paulo majores, ut una Pulmonarem subiret arteriam. Cordis substantia erat valde laxa. Coronaria vena, qua basim cordis a tergo cingit, æquo latior: Pulmonaris arteria non ipsa quidem latior; sed tenuiores habere parietes, ut valvas quoque, visa est: amplior vero Sinus cordis sinister, qua venosus e pulmone excipiebat ramos. Valvulæ alterius Mitralis imus limbus crassior fuit: Semilunarium aggeribus non magnæ, sed crassiusculæ, increverant ossæ concretiones. Magna tamen arteria illuc usque unde sinistram emitebat subclaviam, sana. Inde vero albas ostendere in facie interiore, & posteriore præsertim, maculas non raris locis, incipiebat: quarum nonnullæ, & prima potissimum, in ossam squamam degeneraverant. Respondebat

illa prima canali arterioso, ibi osim patenti, nunc, ut solet, oculo; nisi, quod in hoc homine, raro exemplo, ejus, unde incipit, osticium in arteria Pulmonari hians vidi, ut specillum immittere ad sesquilineam Bononiensem potuerim. In Ventre quæ præter naturam essent, hæc adnotavi. Renis utriusque superficies fuit quasi tuberosa; sed leviter: alterius insuper quodam loco subsidebat, qui locus ambitu circumscriptus erat circuli, cujus diameter transversum digitum æquabat; suberat renis substantia, ibi dariuscula, ad modicam tamen altitudinem. Iliacæ arteriæ ambæ flexuosæ, atque, ut sic dicam, varicosæ ferme instar Splenicæ arteriæ: in sinistra vidi lamellam ossæ. Cætera quæ in cadavere hoc perlustravi, fuerunt intra naturæ modum.

5. Unde potissimum tanta sanguinis copia in Laterales cerebri ventriculos erupisset, plexum Choroidum universalis propemodum destructio indicat, quorum vasa forsitan hic illic dilatata, repente dissiluerint. Potissimum dixi; nam vasa quoque alia quæ per ventriculorum Lateralem superficiem ducuntur, in harum dilaceratione, quam sanguinis, e plexibus effluentis, impetus non solum, sed & copia distraxerunt, ipsa pariter dilacerari simul debuerunt. Veri autem simile est, sanguinis majorem partem e vasis dexteris exiisse; nam a dextris laceratas omnes superficies, & plexum totum absumptum vidimus. Nec vero quod magnus ille sanguinis grumum in sinistra magis, quam in dextera parte fuerit, obitare id credas huic conjecturæ; sed potius favere. Prima enim, & major resolutio cum in latere corporis fieri consueverit quod cerebri hemisphærio opponitur magis læso; credibilis est, hominem sinistrorsum cecidisse (b); ideoque sanguinis majorem copiam, perrupto Lucido septo, e ventriculo dextero in sinistram defluxisse. Casum autem in sinistram latum illud etiam indicat quod sanguis sub Tenui meningem effusus in sinistram fuit hemisphærii parte, non dexteri. Cujus in eo quoque major læsio fuit, quod pro Striato corpore mucosam habuit substantiam. Cujusmodi mutationem in substantia cerebri, alias (c) ad te scriptimus, non semel a nobis fuisse deprehensam. An vero his prægressæ in hoc homine apoplexiæ ista mutatio effectus ex parte fuerit, an vasorum dilatatio, an laxiores reddite certæ quædam cerebri partes, cum pro certo definire non liceat; ad tertiam præstat apoplexiæ sanguineæ historiam transire.

6. MULIER pinguis, & semper, quantum noti meminerant, clauda, annos nata quinque & octoginta, quæ olim nupta vigefies pepererat, apoplectico insultu correpta primum fuerat ætate proxima, altero autem diebus decem priusquam tertio conficeretur. Omnes ad eundem modum incepterant, vomitu præcedente. Sed duo illi priores brevi, & sine remediis, nullaque reliqua paralysi soluti fuerant. Hic autem novissimus intra horas sexdecim peremit illatam in Nofocomium sine ullo sensu, & motu, si respirationem, pulsusque excipias: quorum hi absque ullo vitio erant, & prementibus digitis resistentes; illa autem sine fletore pectus alterne attollebat, & ventrem. Kalendis Februarii A. 1754. cum in Gymnasio jam ventris viscera propemodum omnia ex alio cadavere demonstrarem; hoc deinceps uti ad reliquam Anatomem absolvendam incepti.

IN VENTRE hæc præter naturam animadverti. Vasorum Magnorum trunci ambo lateres visi sunt, præsertim ut in muliere. Quod si ad tot uteri gestationes referas; non eodem referes certe ossem inchoamenta; imo osses squamas quibus passim arteria Aorta, natæque ex hac Iliacæ, & bini in quos hæc singulæ dividuntur, rami interiore facie distinguuntur. Quæ si ab ætate fuisse, dixerimus; ætatis dicemus fuisse morbum. At neque ab ætate, neque ab uteri gestationibus profecto fuit vitium reni sinistro innatum, quod tibi alias (d) me pollicitum esse, memini, in cujusdam Veturæ, hujus videlicet, historia expositum. Ren ille a primo videri poterat præter omnem modum longus. Sed paulo attentius defixis oculis, transpicere aquam licebat, & quæ inclusa ejus augebat longitudinem. Oculorum judicium tactus, & multo magis ipsa dissectio mox confirmarunt. Nimirum sic educta est aqua subflava, quæ vase excepta, omnibus qui aderant, visa est pondus æquare unciarum quatuor. Hæc sub propria renis tunica qua superius ejus visceris extremum convexit, hanc ad eum modum furtim versus expanderat, ut producti renis speciem effingeret. Crassior facta erat expansa tunica, intusque extantes plicas, & quasi inflatas firmas, sed abnormiter positas, ostendebat.

ostendebat. Testis uterque spherulas habuit quas geminæ lineæ Bononiensis diametro, intus cavas, sed prorsus inanes, quarum parietes intus extraque albicantes, crassiusculi, & firmi adeo, ut in una præsertim spherula quæ extrorsum protuberabat, ossi viderentur; quamvis firmitudine revera essent inter cartilagineam, & nerveam media. Thorax pulmones exhibuit, quorum dexter lateri adhærebat, sanos, tamen in bronchiis multat inerat crassa, sed fluida sic satis, materia. In corde omnia secundum naturam, si valvulam Semilunarem unam excipias, cujus summi limbi particula prope aggerem jam ferme erat ossæ. Proxima tamen pars aliqua arteriæ Magnæ; nam reliquam in Thorace quidem non dissecui, nihil quidquam ossi habuit. Diaphragmatis centrum, ut vocant, nervum nec figura erat quæ solet, neque amplitudine; foramine autem non uno, sed tribus pertundebatur: quod tamen alias quoque, nec semel, vidimus (e); duobus scilicet, quæ majori attigua erant, minoribus ad duas ex jeciniore venas traducendas spectantibus, quæ si in Cavæ truncum infra diaphragma, ut plerumque solet, non, ut hic, supra, se immisissent, non tria, sed unum fuisset in tendine illo foramen. Artus quoque superiores peculiare quiddam habuere. Cum enim Longum Palmarem musculum in brachio dextero non ita ut ad originem solet, crassum, & carneum, sed vel ibi tenuem, & ferme tendineum esse, animadvertissem; rectum autem in sinistro, esse ad originem conspicerem duplo quam dextero, crassiore carne, & longius descendente; quis hujus discriminis effectus, & quæ ex parte causa fuisset, suspicatus, ex Anus domesticis quæri, jussi, an forte pro dextera, manu uti sinistra consueverit, qui sic reapse consuevisse, retulerunt. Verum hæc magis spectant quæ in artubus inferioribus claudæ hujus femina deprehendi. Claudæverat in latum dextero; neque causa in luxationem, quæ nulla erat, neque in acetabula referri poterat, quippe quæ inter se comparata, nec sede, nec posito, nec profunditate quidquam discriminis ostendebat. At si femoris ossa inter se conferres, evidens inter utrumque apparebat discrimen, ex quo intelligeres, artum dextero sinistram brevior, ut reapse erat, esse debere. Os enim femoris dextero tanto erat brevius sinistro, ut si utrumque juxta poneres, summa capitis illius pars infimæ hujus parti responderet. Causa autem hujus brevitatis erat major illius ossis, quam hujus, curvitas, eaque manifestissima. Nec præterea deerant in illo ossi vitia alia, ut minor capitis ad imum latitudo, subsidentia nulla inter majorem trochanterem, & cervicem, & quemadmodum hæc, ita ille æquo erat crassior; ut, si mulier unquam gracilis fuit, potuisset cupiam exploranti Chirurgus ista crassitudo imponere pro luxatione. Erat item os illud femoris a cervice ad longitudinis suæ saltim medium justo crassius, & curvatura convexam partem ad externum latum conversam habebat, & quod consequitur, ejus condylorum posterior facies sinistram femur spectabat, ut cras quoque, & pes non possent recte esse posita. Quæ omnia cum attenderis; facile intelliges; hæc artus inferioris vitia aut a primordiis, aut ab infantia extitisse; itaque non mirum esse, quod mulier semper claudicaret. Caput denique cujus potissimum causa hanc ribi dissectionem descripsi, adaperitum est, detractaque Crassa meningem, vasa quidem per Tenuem ducta sanguine distenta conspeximus; sed nihil hujus, aut feri effusum usquam repertum est, donec cerebri, cujus substantia erat firma, sinistram hemisphæriam secando, ad hujus ventriculorum perventum est. Tunc enim prodire cepit cruentum serum, nec paucum, ex non paucis videlicet sanguine qui in eo ventriculo concreverat. Ejusmodi serum in ventriculo quoque dextero, & in Transitu, quem vocant ad ventriculorum quartum, invenimus, sed nullam usquam pro certo lesionem, unde sanguis erupisset videretur: quanquam latuisse in sinistro ventriculo, arbitramur. Tunc cultro ad cerebellum, quod undique integrum exterius apparebat, translato, ecce intra ejus dexterum lobum caveam, neque ita parvam, ostendimus, sanguinis in grumos concreti plenissimam.

7. De claudicationis expositæ causis satis modo dictum est. De aliis alias & diximus (f), & dicemus (g). De duabus autem quæ hanc ultimam præcesserant, apoplexiis illud credibile est, reliquisse utramque in cerebro, & cerebello eas dispositiones quæ, nullis præsertim remediis adhibitis, faciliorem aditum paraverint tertæ, ut disruptis internis vasis mulierem necaret. Quæ quo-

niam vasa non intra cerebellum dumtaxat, sed intra cerebrum quoque perrupta sunt, ut effusus in utroque sanguis ostendit; duo idcirco quæ ex dissectione hac deduci potuissent ad cerebellum attententia, incerta ac dubia reddiderunt, nempe an lesionem alterius ipsius lobi resolutio in opposito corporis latere consequatur, itemque an a cerebello pulsus pendeant, & respiratio. Quid enim si tantummodo cum mors instabat, illa in cerebello cavea ab irruptente sanguine producta esset? vel quid, si resolutio quæ utrinque fuit, a sanguine in utroque cerebri Lateralem ventriculum effuso esset repetenda? Verum de utraque illa questione dilucidius agendi alia, quæ ad te scribetur, nostra observatio (h) occasionem præbebit. Nunc vero ne forte suspiceris, sanguineam illam quæ celerrime necat, apoplexiam sine disrptione vasorum esse non posse; tribus quæ cum hac disrptione propolite sunt, totidem quæ sine illa aut celerrime, aut satis cito necarunt, protinus subijciemus.

8. VIR, ut videbatur, quadragenarius cum A. 1756. ante Januarii finem Mediolano pedibus Patavium venisset, lassus adeo, ut mox Nofocomium peteret; in quod ob lassitudinem, non ob febrem ullam, exceptus est, dum ibi extra lectum adhuc, sedens cibum caperet, forti apoplexia repente percussus, sine ullo externi motus, & sensus indicio, nocentibus potius, quantum visum est, quam opitulantis, venarum sectionibus, intra biduum vivere desit. Cadaver nobis ad persequendam Publicam Anatomem datum est. Quod dum faceremus, antequam aperienda calvaria tempus adveniret, hæc pauca adnotavimus. IN VENTRE fellea vesicula bile turgebat. In Thorace figura cordis, qualem in homine alias vidisse non memini, referebat illam quam rudes pictores nobis effingunt, quasi cordis latus dexterum curva linea finiretur, summa videlicet basi, & mucrone infimo dextrorsum prominentibus. Quin eandem insolitam curvaturam septum ipsum cordis sequebatur. Cor parvum erat potius, quam magnum; sed valvas, aliasque ejusmodi partes vel infra hanc proportionem parvas habebat. Magna arteria postquam sinistram Subclaviam emiserat, intus ad aliquem tractum erat aspera ob prominentes fibras, tanquam intima deesset tunica. Cranii demum fornice, & Crassa meningem amotis, vasa quidem per Tenuem conspeximus nigro sanguine perquam distenta, ut & minima quoque illa quæ per medullarem cerebri substantiam confertissima ferebantur; sed nihil usquam effusi sanguinis deprehendere potuimus; tamen quod Laterales ventriculis serum inerat, nec ita paucum, esse vidimus sanguinolentum, in plexibus autem Choroidibus qua in ascensu sine se insectant, hydatides, in altero præsertim, non parvas.

9. Has certe in aliis pariter quos apoplexia non sustulit, sæpe ibi conspiciere soliti sumus: serum autem, dum cerebrum in quo conferta vascula sanguine distenta sunt, persecamus, vix fieri potest quin ab hujus guttulis illabentibus, etiam per paucos, sanguinolentum non appareat. Quod si forte in sero aut per acrimoniam irritante, aut per copiam, etiam non magnam, compressiones cerebri augente, causam hujus apoplexiæ ex parte aliqua velis agnoscere secundum ea quæ de serosis apoplexiis agens, alias (i) ad te scripsi; non repugnabo; difficile enim interdum est ab illis sanguineas separare, & de certis quibusdam historiis utrum ad genus attineant, pro certo constituere. Fac tamen, ut conjecturas quæ utrinque esse possunt, ante perpendas, atque ubi cerebri vasa externa simul, & interna sanguine sunt maxime distenta, velut in proposito. Viro, vide ne nimis facile neges, causam præcipuam ex parte a sanguine esse repetendam. Ad lassitudinem autem illam magnam, longi itineris laborem consecutam, eo anni tempore peracti, num aliquid conferre potuerit hominis constitutio, quem insolita illa forma cordis, & læsio illa intima Aortæ indicat, fortasse robustissimum esse non potuisse, ego quidem in medio relinquo: lassitudinem tamen universi corporis cerebri quoque robur, & ejus vasorum minuere, eoque illud compressionibus, hæc distentionibus opportuniore facere posse, non dubito.

10. FEMINA, eadem facile qua is Vir, ætate, non multis post eum diebus in Nofocomium excepta, indeque, ubi intra biduum decessit, in Anatomicum Theatrum illata est. Mortis causa apoplexia fuerat ejusmodi, ut quarto ab hujus initio die cum in Nofocomium advecta est, tunc certe nullum facultatis sentiendi, aut mo-

(b) Vid. Epist. 2. n. 25. & Epist. 3. n. 14. (c) Epist. 9. n. 16. & seqq. (d) Epist. 38. n. 41.

(e) Epist. 5. n. 9. (f) Epist. 26. passim (g) Epist. 69. n. 2. 10. & seqq. (h) Epist. 62. n. 25. (i) Epist. 4.

movendi retineret indicium, vixque oculos aperuerit, dum plantis candentes laminæ ad excitandum adhiberentur; sed frustra; mox enim clausit. CADAVER, si crura alterum exciperet ulcere deformatum, nihil exterius quod docendi usui repugnaret, usquam ostendebat: sed & interius vix aliquid in iis quas perlustravi, partibus ab naturæ norma alienum offendi.

In Aorta enim trunco qui per Ventrem descendit, leves intus alicubi erant albedines, quæ futuras olim ossæ squamas indicabant: quarum una jam erat, sed parva. Tubæ Falloppianæ sinistra medio in itinere cum teste cohererebat: hic erat, si cum dextero conferres, minor, paucosque intus habebat albos globulos, quorum unum difsecans, ex compacta substantia factum vidi, ad centrum cavæ. At dexter, cujus magnitudo vel juniori conveniret, nullo globulos, vesiculas nullas continebat, superficiei tamen erat tuberosa, & si oculos defigeres, non sine cicatricularum indicis. Illud quoque in hujus cadaveris dissectione animadvertum est, membranas passim scalpello magis quam æquum est, etsi pinguedo non deerat, fuisse resistentes. Calvaria denique reclusa, omnia intra hanc vasa, ne plexibus Choroidibus exceptis, inveni sanguine turgentia. Sed præter aquæ paucillimum in ventriculis Lateralibus, nihil usquam vitii in cerebro, cerebello, medulla Oblongata, quoque versum persequendo, potui deprehendere.

11. Si omnia quæ aut in vivis præcesserant, aut in mortuis conspecta sunt, inter se conferre volueris; minus, opinor, miraberis, quod mulier hæc mortem obierit tardius, quam vir de quo ante ipsam dictum est, multoque etiam tardius uterque eorum, quam vir alter de quo statim dicetur.

12. TONSOR annos natus quinque, & quinquaginta, capite maxima ex parte calvo, bibax adeo, ut ebrius domum deductus sit ad vespas, 16. Januarii die A. 1757. posttridie mane inventus est mortuus, humi jacent inter lectum, & parietem prope fractam matulam, nulla tamen corporis parte læsa. Hoc ad ejus anni Publicam Anatomem inchoandam cum uteretur, hæc quæ præter naturam essent, animadverti. VENTRE aperto, amplius ventriculus in conspectum venit, cujus interior facies vini colore infecta erat. Omentum multa pinguedine refectum, ut plerorumque intestinorum externa tunica, & mesenterium, in quo glandulæ quædam majori quam ea ferat ætas, magnitudine. Biliis e flavo fusca, reliquerat per cystis faciem anteriorem multa alba quasi arenæ granula, sed quæ, inter digitos conterendo, minime erant dura. Renum, quorum alter altero longior fuit, superficies non sine vitiorum vestigiis quibusdam, inter quæ erat sub tunica fovea adhuc parva, humore plena. Vesica lotio distenta adeo, ut pubis ossibus, nec paulo, summa ejus pars altior esset. Quam ut credibile erat, sæpe in vivo quoque præter modum fuisse expandam, sic mirum non fuit, solita non esse forma: etsi enim ad imum paulo erat latior, quam ad summum; tamen cylindrum potius, aut prismam, quam aliam figuram, primo aspectu referebat. Urethra intus ubique alba, nec paucioribus tantum, & minoribus, quam solet, canaliculorum nostrorum oculis prædita, verum in super caruncula Seminali quasi diffuente, ut in hac nihil perspicue offendi potuerit, & cum præterea ipsius omnino deesset rostrum, proclive esset existimare, majori olim labe nec carunculam, nec urethram reliquam caruisse. Arteriæ Magnæ quæ per vertebrae lumborum decurrit, interior facies ossium inchoamenta ostendebat, Illiæ autem lamellas habebant prorsus ossæ, eoque duriores, quo magis in Externas, Internasque divisæ ad inferiora accedebant, ut Crurales quoque passim, & inter femoris condylos ad popliteum jam exceptæ, duræ essent, & rigidæ, viderenturque arteriæ quo longius a corde remotæ descenderent, eo magis esse huic vitio obnoxie. Et supra Ventrem certe ubi Aorta Inferiores emittebat Intercoastales, apparebant ossium inchoamenta; sed prorsus levia. Præter quæ nihil in Thorace, nihil in reliquo corpore, si quæ dicuntur, excipias, vitiorum animadverti. Cranii enim fornice, & exteriori meninge ademptis, quorum utrumque crassius fuit, ut hæc, etiam quæ inter cerebellum, & cerebrum se interponit, scalpello magis quam consuevit, resisteret, cum omnia diligenter perlustrarem, nihilque eorum quæ intra calvariam sunt, sine dissectione prætermitterem; non modo quidquam

feri, aut sanguinis effusum, sed vitium omnino ullum præter id quod dicam, non deprehendi. Nimirum vasa quæ per Tenues meningem feruntur, referta adeo erant sanguine, ab eoque dilatata, ut nunquam magis vidisse meminim. Distenta quoque erant quæ Choroides plexus faciunt, & quæ per Lateralium ventriculorum parietes ducuntur, ubi aquæ aliquantum erat, præsertim a sinistris.

13. Observationem hanc cum ea conferas, velim, quam habui in Petro Fasolato (k). Plura in utraque reperies quæ convenient inter se, & plura pariter in iis quæ ad illam adnotavi, & hic non vacat repetere, ad hanc explicandam. Adjicere tamen quædam licet, hominis hujus peculiaria. Fuerat hic bibax, & quod non difficile inde consequitur, sæpe ebrius: quæ res quantum ad copiam sanguinis augendam, & ad vasa quæ intra cranium sunt, infirmam valeat, facile intelligis. Huc adde ossæ illa in arteriis inferioribus vitia, quæ ut sanguinis deorsum motui officiebant, ita sursum majori copia ferri cohebant. Sed illud præcipue addendum est, in tanta ista ultima ebrietate cum homo cubaret, atque dormiret, ad pristinam sanguinis copiam multum ex iis accedere coepisse quæ ingurgitaverat, ex vino præsertim, cujus accessum cum tantam partem vesicæ exciperet, ut plus posse admittere non videretur, neque homo, quippe ebrietate, & somno oppressus, mingendi necessitatem sentiret, quæ ratione locum in vesica iterum paravisset reliquæ lotii materię, interea in alveum sanguinis advectæ; cum hæc, inquam, ita se haberent, accidere debuisset, ut ab ea retenta materia vasa magis distenderentur, eaque potissimum quæ intra calvariam sunt, nempe jam diu antea infirmata, & in decubitu præsertim, repletioni magis obnoxia. Vides, ut ferme pariter Lowerus (l) a decubitu, somnoque post largiores lotii potationes, priusquam maxima epoti liquoris copia per vesicam prodierit, ortos explicet graves, ut sæpe videbat, cerebri morbos, & in his nominatim apoplexiam.

14. Credo igitur, hominem a me propositum, quod nimis fero vesicæ plenitudinem fenserit, dum matulam tandem capere vellet, aut potius cepisset, lotiumque ex nimis distenta vesica, quod facillimum non est, ejicere conaretur, in eo ipso nitu qui sanguinem magis in vasis capitis moratur, forti apoplexia correptum, cecidisse. Scilicet ad eum distentionis gradum pervenire denique potuerunt externa, internaque vasa quæ intra calvariam sunt, ut quidquid ipsa concludit, vehementissime comprimerent. Quoniam vero & his, & aliis sæpe ad te Litteris ab ejusmodi compressionibus petita causa est apoplexiæ; cave suspiceris, obitare nobis Cl. Laghii (m) experimenta, quibus per instrumentum illud sane elegans, ab Nobilissimo, eodemque Ingeniosissimo Comite Gregorio Casafio excogitatum, ostendit, in canibus cerebrum posse comprimi ad Londinenses lineas minimum sex absque ullo in illis molestia indicio: quin ubi queri incipiunt, paulatim mox quiescere, nisi compressio augeatur: nec prius quasi apoplexia prehensos cadere, quam compressionis gradus ad pollicem circiter pervenerit. Alia enim est illa compressio, alia ista de qua hic quidem nos loquimur. Illa exigue adhibetur cerebri parti; nostra circum undique, imo etiam ubique interius, simul cerebro, cerebello, & Oblongatæ medullæ, ut in eo de quo agimus, homine. Quod si quando in aliis non ejusmodi fuit, at alia addidimus, eamque intra cranium certe posuimus undique clausum, & resistens; non ex parte ulla apertum: quanquam fœminæ illi de qua Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensi retulit Poupertius (n), dimidium calvariæ deerat, & tamen cum Crassam meningem apice digiti leviter aliquis tetigisset, eam attulit molestiam, ut mille faculæ ante oculos obversari viderentur, magnumque edere clamorem cogeretur. Tu vero experimenta illa, quantum ad me attinet, accipito, iisque utitor cum ad alia, tum præsertim ad hoc sine admiratione agnoscendum, posse certo compressionis gradui absque molestia ferendo cerebrum par esse, eidemque ita auctæ, ut molestia esse incipiat, paulatim, modo non crescat, assuescere, donec illud denique addatur, sub quo succumbere necesse sit.

15. Hæcenus (alias enim ad hunc morbum attinentes Observationes præstabit ad Hemiplexiam (o), & ad Aphoniam (p) differre) hæcenus, inquam, de Apoplexia. A qua mox ad alios cerebri affectus pergemus. Vale.

EPI-

(k) Epist. 3. n. 26. (l) Traité de Corde a. 2. (m) De Sensibilit. &c. Serm. 2. (n) Hist. A. 1700. Obs. Anat. 20. (o) Epist. 62. n. 9. 11. (p) Epist. 63. n. 13.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LXI.

Pertinet ad Deliria quæ sine febre contingunt.

Gravis certe is est cerebri morbus de quo nuper ad te scripsimus, Apoplexia. Sed gravis quoque, atque adeo miserabilior est ille de quo scripturi nunc sumus, sine febre Infantia. Quæ ad hanc pertineant, tres adhuc dissectiones habemus.

2. MULIER stulta, post varios casus, media, ut videbatur, ætate in hoc obierat Nosocomio, ineunte A. 1746. Ne mihi deessent quæ ibi de Re Anatomica tunc ostenderem; quævisi, an cadaver ad id esse posset idoneum. Cum accipissem, ob maciem summam, itemque ob magnam, fetidissimamque ad os Sacrum gangranam, vix thoracem, & caput idonea fore; cætera omnia humari jussi, caput dumtaxat cum thorace, si modo hic sine pure esset, cujus tanta illa macies suspicionem faciebat, fervari.

THORACE igitur aperto, cum suspicionem haud vanam fuisse, appareret, quippe altero pulmone magna ex parte puris pleno, his quoque visceribus sepultura datis, capitis sectionem aggressi sumus. Cranio recluso, illud unum in meningibus animadvertum est, Tenues vix apprehensas, & tractas, facillime sequi, & ex anfractibus cerebri educi. Trastu fuisse igitur aquam, non erat dubium, cujus etiam in ventriculis copia modica inventa est; sed plus ex vertebrarum tubo profuxerat. Et tamen cerebri, & cerebelli substantia utraque durior procul omni dubio fuit, quam solet; Choroides plexus decolores quidem conspexi; sed quæ rimæ imponuntur ventriculi tertii, erant per sua vascula cum illius oris firme adeo conjuncti, ut nisi postquam sunt ea vascula diligenter soluta, rimæ nihil prorsus hiarer. Præter hæc, quidquam adnotatione dignum non occurrit, nisi Pinealis glandula, quæ visa major, & longioribus radiculis medullaribus ad suam sedem annexa, eademque mucosior.

3. Cum de stultis alias scriberem, meminisse potes, quæ in iis vitia, ab aliis, & a me præsertim animadverta, memoraverim (a) ad Pinealem glandulam attinentia: quæ in aliqua etiam alia Epistola (b) non reticui. Prodiit postea Justus Godofredi Gunzii Prolusio (c), quæ utinam illo tempore extitisset. Ut enim eruditissimus fuit, plerisque eorum laudavit qui de vitii ejus glandulæ fecerunt mentionem; itaque meam in iis Auctoribus producendis qualemcumque operam minuisse, five quod ad stultos, five quod generatim ad eos spectat qui lapillos, arenulasve in illa glandula habuerunt. (d) Sed tamen id accidit quod in ejusmodi rebus est facillimum, ut aliquis eorum qui a me nominati sunt, ipsum fugerit, & vicissim ut alii ex illis qui ab ipso adducuntur, me fugerint, non alios fere nominare solitum nisi qui inter scribendum succurrunt. Huc illud accedit, cur me meæ illius operæ minus pœnitet, quod ex ea, cum meis quas aut simul, aut seorsum proposui, Observationibus conjuncta, proclive est intelligere, non modo non corrigisse aliis quod Præclaro contigit inter viventes Anatomico, ut in omnibus cadaveribus hominum adultorum, morbo defunctorum, Pinealem glandulam pluribus arenulis repleta inveniret; verum hoc etiam, non esse cur ex ejus glandulæ aut integritate in non stultis, aut vitii in stultis speremus amplius posse Cartesii sententiam de sede in ea cogitantis animæ confirmari. Certe ego tibi tredecies saltem a me perspecta in illa, aut ad illam glandulam vitia descripsi. Novies (e) videbis, hæc fuisse sine stultitia. Contra videbis, stultitiam fuisse in aliis (f) quorum illam glandulam nihil quidquam vitii habuisse, ex silentio ipso meo intellexeris. Fere enim semper cum cerebrum dissecas, nedum in stultis; Pinealem glandulam attente solitus sum intus, extraque inspicere, & si quidpiam adnotatione dignum habeat, in adversaria, ex iisque in descriptiones referre.

4. Quæ mea ferme perpetua consuetudo fatis ostendit, non esse a me quidem laudabiles Gunzii adhortationes expectatas; sed diu antea tum quæ secundum naturam, tum quæ præter hanc essent in Pineali glandula, simulque, ut nosti, in reliquo & cerebro, & corpore, & quæ in viventibus præcessissent, quantum quidem videre, & sci-

re licuit, in meis Observationibus non fuisse neglecta, quanquam cum eam glandulam memorandi occasio incidit, non alia volui, nisi quæ proposito satis essent, attingere, nec me adhuc pœnitet, ob eas rationes quas an ipse prorsus dissolverit, non est hic videndi locus, de ejus natura glandulæ ita esse locutum, ut viderer, num ab reliqua substantia cerebri nil plane differret, dubitare. Nulla certe alia in tota hac substantia particula est quæ crebro adeo, ac illa glandula, peculiaribus sit vitiiis obnoxia, & arenulas præsertim, lapillosque contineat. Quod tu vitium etsi cum stultitia, & sine hac quoque deprehensum fuisse, supra intellexeris; nolim tamen obliviscaris, non sæpe adeo inveniri cum uno alio quoque morbo, ac cum stultitia, conjunctum. Cui rei ostendenda si forte non satis essent quas & proposui alias, & indicavi (g), Observationes; at sunt quas addas apud Gunzium. Non eas dico, in quibus alienatam mentem fuisse, ita ipse conjicit, ut, si velis, negare liceat. Sed alias dico, in quibus manifesta, & vera stultitia fuit, tum ex laudatis Auctoribus acceptas, tum præsertim ipsius proprias, ea curâ scriptas, ut dignæ, si quæ aliæ, sint quæ Sepulchreto adjiciantur. Eas si perlegeris; fac inter cætera animadvertas, lapillos quos in Pineali glandula deprehendit, eos etiam flavos fuisse, aut subflavos, tum quæ alia fuerint vitia, mox a nobis quoque commemoranda, ab eodem in stultorum cerebro, non modo in ea glandula, conspecta, quæ in propolita muliere qualia fuerint, vidisti, ut infra (h) in altera videbis.

5. VIR quadraginta circiter annos natus, ex quo remex in trirēmibus fuerat, primum hypochondriacus, deinde stultus est factus, sed læte stultus, idque annos ad decem, tandem ex cachexia toto corpore tumidus, non sine difficili respiratione in Nosocomio mortuus circa primos Januarii dies A. 1750. hæc quæ ad morbos attinent, nobis animadvertenda reliquit. THORAX multam habuit aquam, & duriorum quandam pulmonum partem. Caput cum amputaret, vix aliquid aquæ e cranio effluxit, quod etiam cum hoc circumferebant, animadvertent, itemque cum cerebrum eximerent. Quod ego certis de causis non nisi tertio, an quarto ex quo exemerant, die non potui dissecare, ut neque potueram quæ Ventre continebantur, inspicere. Cerebrum igitur diligenter perlustrans, si omittam illud quod dubium fuit, Pinealis glandulæ parvitatem, non alia quæ huc spectent, deprehendi, nisi medullarem utriusque hemisphærii substantiam duriorum, tractum autem per mediam faciem superiorem Callosi corporis secundum longitudinem nonnihil prominentem, non hic unum ab initio ad finem usque, sed quodam loco duplicatum.

6. De duritie videbis postea. Nunc quod ad Callosum corpus attinet, consideremus. Vir Cl. Joannes Fantonus, ad quem suam de Sede Cogitantis Animæ in Calloso corpore Dissertationem Lancisius scripsit, sicuti in Viro quodam (i) minime stulto Pinealem glandulam triplo crassiorum conspexerat, ita alterum (k), cujus in corpore Calloso tumorem durum, juglande majorem, deprehendit; diuturna quidem in vertice cephalæ, & epileptici insultibus vexatum, sed vix tandem postremis mensibus absurda locutum esse, adnotavit, neque id semper, sed tantum sæpe, idque, cum vehementius ille dolor urgeret. Nos vero in illo eodem Calloso corpore multo leviora animadvertimus. Pro tractu enim illo de quo novissime dicebamus, in aliis unico, & simplici, in aliis duplici ut Lancisius nervulos longitudinales duos vocaret, quemadmodum alias (l) commemoravimus, duo in stulto, nec parum profundi sulci nobis occurrerunt (m). In alio videbis Gunzium (n) animadvertisse tum Lancisii nervulos, tum sulcum flexuose procedentes, & qui hinc inde quasi deficere videntur. Et Lancisius ipse in fatuo illos adnotaverat non quæ solent ratione inter se parallelas fuisse. Num ergo in ejusmodi rebus stultitiæ causam agnoscemus? Dubitandi ratio non jam inde mihi est.

(a) Epist. 8. n. 14. & 16. (b) ut 59. n. 15. (c) De Lapillis Gland. Pineal. in quinq. mente alienat. invent. (d) Epist. 5. n. 12. (e) Epist. 1. n. 14. III. n. 14. V. n. 11. VI. n. 12. VII. n. 15. X. n. 17. XI. n. 11. XIV. n. 35. XVI. n. 24. (f) Epist. VIII. n. 4. 8. 21. (g) Epist. 8. n. 16. (h) n. 7. (i) De Obs. Med. & Anat. Epist. 8. n. 3. (k) Epist. 5. (l) Epist. 3. n. 6. (m) Ibid. (n) Prolusio supra ad n. 3. cit.

est quod suspicatus sim aliquando, tractus ibi illos, & sulcos non ab natura ipsa utilitatis ullius causa, sed aut a compressionibus formari utriusque hemisphaerii cerebri, ubi dexterum sinistrumque inter se accedentia in imani definunt oram, & corticalem faciem in medullarem illam mutant quae lacunaris instat, ut alibi dilucidius ostendam, se dextero sinistroque lateri imponit Callosi corporis, aut, quod nuper Solertissimo quoque Viro in mentem venisse, vidi, pulsationibus deberi arteriarum quae in longitudinem pariter eidem mediae Callosi corporis superficiei incumbunt. Utrique enim suspicioni adversari videntur humiliores, tenuioresque illi paralleli tractus qui hinc, & hinc ad medium ducuntur ejusdem superficiei, quorum conformatio ab illis de quibus suspicabar causis repeti non potest. Quin etiam utraque, & secunda praefertim suspicio stare, & aliter aliquis crederet ab diverso arteriarum ductu diversam conjicere, & noxiam constitutionem intimam corporis Callosi; istamen quomodo per hanc stultitiam non innatam, sed adventitiam explicaret? Dubitandi igitur ratio aliunde mihi est, animadvertenti videlicet, non solum perraro in stultis abnormes illas superficiei corporis Callosi conformationes reperiri, verum etiam esse a me visas in pluribus quorum mens fuerat sanissima. Itaque cum de his amplius videndum censeam; ad illud quod mihi in stultorum cerebro, si non semper, at ferme semper occurrit, & quod vel in duabus fuit propositis Observationibus, transibo.

7. FEMINA major triginta annis, ab ortu usque stulta, & quae novissime nihil alimenti capere volens, in Nosocomio decesserat eo tempore quo ibi solitus sum intermissis paulisper Anatomias exercitationes persequi, id est fuit initium Januarii A. 1757. VENTRIS partes examinanti; nam quae ad Thoracem attinent, ex aliis cadaveribus antea ostenderam; nihil mirabilius visum est, quam florentem adhuc aetate stultam, virginitatem, quantum apparuit, servasse. Neque enim ad vaginam orificium, quod, ut in virgine, angustum erat, hymenis annulus defuit, lato quidem foramine, sicut in maturioribus solet, nusquam tamen ruptus. Quo magis mox haesi, cum vaginam conspicerem, perpaucis exceptis ad infimam partem rugis, tota reliqua facie levissimam. Uteri osculum, & ipse uterus sana, & quae virgini convenirent. Tubarum neutra specillo vel tenui, permajus orificium immisso, ultra medium earum longitudinis viam dedit. Testis uterque durusculis, alba, & inaequali superficie, nullam intus vesiculam habuit. Cranio autem comprehensas partes attente persequens, omnes secundum naturam inveni. Quod si peculiariter queras de corpore Calloso, & de glandula Pineali; in illo tractus unus, & simplex; haec majuscula quidem, & ex fusco quasi subflava, sana tamen erat. Unum igitur adnotatione dignum fuit, quod cerebri, & cerebelli substantiam ubique incidere, manifeste duriorerem offendi.

8. Nempe hoc illud erat quod etiam in duabus propositis Observationibus, imo in ceteris stultorum ferme omnibus, a me quidem habitis, fuisse, dicebam. Relegas sis Epistolam VIII. (o) videbis in cunctis quos ad id tempus secuturam, rem ad eundem modum se habuisse. In quibus autem idem ab aliis compertum esset, ibidem (p) reperies. Addere nunc poteris Gunzium (q), qui in duobus siccum cerebrum vidit, atque compactum, eaque firmitate, ut pro sanissimo non posset habere. Huic tamen non contingit certe, ut neque aliis illis, quod sciam, idem quod mihi acciderat, ut plures stultos dissecando, in omnibus durius cerebrum invenirent. Sed & mihi tandem accidit, quemadmodum Epistola legeris LIX. (r) ut in eo qui delirio quodam melancholico laboraverat, valde laxum deprehenderem, an quod delirium fuisset levius? an quod jam esset curatum? quamquam mea parvi refert utram ob causam, an ob aliam sic fuerit, cum cerebrum in stultis laxum qui conspexerint, non retinuerim (s), & durum sine stultitia esse posse, non dissimulaverim (t), ubi illud quod diserte addidi, cerebrum adeo in hoc morbi genere observationem cerebri duri non esse quidem negligendam; sed tamen, quod nunc confirmo, non videri ipsam esse praecipue spectandam. Eo autem minus spectandam credent siqui Doctum Virum sequentes, cui placet stultitiae causam deducere a sanguine crassiore facto, & viscidior, lentiusque propterea per intimas cerebri arteriolas pergente, haecque distendente, & per harum distentionem substantiam medullarem cerebri attiguum comprimente, minu-

que aptam sic efficiente ad solitos usus praestandos, siqui igitur ad haec addent, pressam a distentis arteriis cerebri substantiam sic quidem compingi ac constipari, & quod consequitur, duriorerem fieri; verum stultitiae causam a mutata quocunque modo illius substantiae intima dispositione, non ab duritie quae ex accidenti mutationem hanc comiteretur, esse repetendam. Ceterum num saepe adeo in stultorum cerebro ut durities, ita vasa praeter modum sanguine distenta reperiantur, si forte velis ex nostris Observationibus existimare; fac relegas. & quando Viri alii Docti non defunt qui a polypis intra cerebri Sinus concretescentibus maniam esse posse, autumant, eaque mente duas tresve producant cerebri, & viscerum Maniacorum dissectiones; has tu quidem accipias, velim, quibus numerum Observationum augeas huc attinentium; sed quod ad polypos attinet, non tam queras, an mihi unquam in stultorum Sinibus occurrerint; quam eorum memineris quae alias (u) a me accepti de polypis non nisi in moribundo, aut mortuo homine agnoscendis. Verum jam ad alia veniamus.

9. Etsi non omnes delirant hydrophobi, ut VIII. Epistola (x) ostensum est; in eadem tamen, ne a Sepulchreti ordine recederemus, post Maniacos de Hydrophobis verba fecimus. Idem in hac quoque faciemus. Et quoniam hoc temporis intervallo non accidit, ut eorum cadavera incidere possemus; aliorum, quae tunc non exstabant, observationes in iis habitas commemorabimus. Quas utinam plenas dedissent: quod nonnullis infirmitatibus, aliis causa alia aliqua non permisit. Et Amplissimo quidem Viro Senacio (y) susceptum scribendi propositum non concessit, nisi ut hoc unum diceret, se pericardium vidisse in homine ex rabie mortuo adstrictum adeo, & cordis faciei annexum, ut ab hac separari non posset. Alexander autem Bruce in dissertatione (z) Edimburgi edita A. 1755. Cl. Rutherfordii Observationem referens in vivente, & mortuo hydrophobo nosocomio, postea quam caetera proposuit, & in his Crassa intestina aere mirum quantum distenta, Ileum leviter inflatum, rarique livoribus, ut jecinoris quoque portiones, affectum, & cum reliquis ventris visceribus extra suam sedem compulsum, in thorace autem nihil insoliti; cum expectas cerebri, laryngis, pharyngis constitutionem, haec, legis, inspicis, a consanguine prohibendum esse. Ob eandem fortasse causam factum crediderim, ne de tribus hisce Partibus quidquam scripserit is quem ante diem obiisse aegre tuli, Morandus Morandus (a), cum quasdam suas eodem morbo confectorum dissectiones illo ipso anno vulgaret. In uno enim nihil memoratum video, nisi musculos thoracis aliquot externos, internosque inflammatos, imo gangraenae, & quasi putredini proximis. In duobus autem de iis musculis nihil attigit: sed ventriculum, & intestina fuisse, dixit, gangraena affecta, & nigra graveolente bile conspurcata, vesicam, & cavernosa penis corpora inflammatione correpta, ex membranis multas aridas, tensasque, multasque alias arte, ut in peripneumonia, cum visceribus cohaerentes, pinguedinem quasi nullam, omentum propemodum arefactum, venas denique sanguine prorsus plenas quam fluidissimo, arterias autem omnino vacuas contra, atque alii, id quod minime ignorabat, sed non omnes, in aliis hydrophobis conspexerant.

10. Quae Observationes, si species quod in singulis deest, continuo ostendunt, per ipsas non augeri earum numerum, quas VIII. Epistola (b) nimis paucas adhuc esse, querebamus. Si tamen species quod singulae in cadaverum vel quibusdam tantum Partibus compertum proponunt, idque cum tot confersas cujusque modi Observationibus, quarum summam eadem illa Epistola (c) partite atque ordine indicavimus; fore utiles saltem videbis ad tantam inter hydrophobos varietatem, quantum ibi ostendimus, comprobendam: nec mirum, cum vel paucae haec quas nunc addidimus, ita discrepent inter se, ut quod habent aliqua, non habeant reliqua, aut certe non omnes. Quo magis autem novis Observationibus varietates illas video confirmari, eo magis intelligo, non aliunde aequae verisimilem conjecturam de hydrophobia causa peti posse, ac unde cum gravissimis Viris tunc (d) peti. Quomodo enim communem omnibus deglutientiae aquae difficultatem, exempli causa, a sanguinis vitio repetam, quem in aliis aliter se habentem conspici, sciam? Quin e venis emissus illius hydrophobi quem Edimburgensis Dissertatio (e)

proponit, per totum morbi decursum bonus fuit. At si ab hoc veneno peculiarem quandam mutationem in cerebrum, nervosque inducam suspicem, unde ad convulsiones ciendas externas, internasque facile adigantur; nihil ferme jam obstat quo minus & difficultatem illam deglutienti communem omnibus, & tot illas pro alia aliorum dispositione non modo in viventibus, sed & in mortuis varietates explicem: quod si a me satis non esse tunc factum videatur; poteris laudatam Dissertationem perlegere, quae cum eandem conjecturam sequitur, tum per hanc solus in viventibus praefertim, satis autem in demortuis omnia exponit.

11. Vides quatenus cerebrum, & a veneno hoc quidem affici, suspicer; ne forte cum iis facere me, credas qui imaginationis vi morbum hunc omnem tribuerunt. Equidem non is sum qui a conceptu terrore atgeri illum posse, negem. Sed neque is sum qui a terrore ipso fieri, censam. Quo enim modo a terrore in compluribus factus esset (quorum casus aliquot infra (f) commemorabo) qui cum animal a quo mors fuerant, esse rabidum, ignorarent, alia omnia cogitantes, repente se teneri jam morbo de quo ne suspicati erant quidem, per manifestissima, & mox funesta signa ostenderent? Admissum igitur venenum, quocunque id ratione agat, pro morbi causa esse agnoscendum. Quod sane quo magis latenter, & insidiosius vim suam conservat, & tandem exerit, eo magis ne admittatur, cavendum est, & si forte admissum fuerit, diligenter priusquam vires suas exarat, impugandum. Itaque si questio incideret, an carnes rabie affecti animalis eadem inficere comedentes possint, minus me moveret Scaramucci (g) exemplum de suis, a rabioso cane demorsi, carne innoxie sumpta, etiam si constaret, in suis illo rabiem fuisse jam manifestam; quam moveant contraria exempla, & nominatim Bauhini (h), accedente insuper Lemery (i) Observatione canis rabientis a comesto sanguine qui hydrophobo detractus fuerat: neque enim quod coctus non fuerit, ut carnes solent, rem valde mutat, cum longe alia, atque adeo extrema ignis vis requiratur, ut virus pertinacissime inhaerens, prorsus abigi potuisset, credamus. Etsi vero quae ex Zacuto (k) producuntur, Observationes sanguinis rabiosorum canum, gladio quo ii transfossi fuerant, sic adhaerentis, & venenum conferantis, ut inde immixtus in vulneratos vel multis post annis rabiem induxerit, etsi, inquam, mirabiliores sint, quam ut omnes adhibere fidem queant; tamen credibiliorem, ni fallor, aliam legisse videor apud Cl. Broganum (l), admonendosque esse Professores, non negaverim; ut in cadaveribus hydrophoborum perlustrandis, attente caveant, ne manus sibi forte compungant, neve si casu ulcuscule affectas habeant, temere illorum aut sanguine, aut succo alio aliquo audeant inquinare.

12. In his vero, aliisque cautionibus ne tam durum admittatur venenum, si forte in alteram partem peccandum est, satius fore nimis esse cautos, quam parum, nemo inficiabitur qui cogitet, quam difficile, incertumque sit, postquam admissum est, ipsum ante pervincere, quam bibenda aquae difficultatem, & formidine se prodant. Cum enim huc pervenit; rara adeo sunt felices, stabiles, perfectae, certaeque curationes, ut illud quod fit ut plurimum, spectantibus verum adhuc videri possit quod de Medicina suo tempore aiebat Ovidius (m),

nec formidavis auxiliatur aquis.

Quo magis ne eo perveniat, optandum est. Et balneum quidem, alibi adeo laudatum, cum ibi, ut alias (n) vidimus; tum apud nostrates quoque plerosque invenit, qui ei non fidant. Itaque non defuerunt qui ad argentum vivum, aut ad ea quae ex ipso parantur, confugerent. Quos alii, hac praefertim aetate sequentes, etiam inter Italos, eadem uti ceperunt praeservandi ratione. Sic Morandus (o) Observationes plures hujus generis protulit suas. Mercuriale tamen remedium cum aliis conjunxit, quae alexipharmaca sunt: quin & moschum addidit postea, Sineses imitatus, idque ut praeservatio, quemadmodum ipse ait, esse posset tutior. Quae tot res, & candens ferrum, in omnibus fere, alte impressum, non modo apud Medicos dubium relinquant, cui potissimum auxilio salus sit accepta referenda, verum etiam demorfi hominis, si dem uisuri, animum & pavidum fa-

ciunt, & incertum, num sic quoque in tuto futurus sit, dubitantis praefertim, an qui servati dicuntur, venenum revera contraxissent, & in hydrophobiam essent pro certo incursum. Quae dubitatio etiam de omnibus iusta non sit; attamen ipsa animi suspensio in re gravissima tantum molestiae afferat, necesse est, ut vel hujusmodi fugiendae causa, nulla in vitando rabiosum virus cautio nimia videri cuiquam debeat.

13. Nec remedio, cum Regia Scientiarum Academia Parisiensi (p) communicato, etsi non ad praeservationem solum, sed etiam ad curationem mire profuerit, tantum tribuendum est, ut in eo antea acquiescamus, quam constet, in omnibus, idque longo decursu temporis, idem praestitisse. Diuturno enim periculo facto, compertum est, multa quae olim in honore fuerant, hujusce generis auxilia non respondere. Itaque Academia pro ea qua pollet sapientia, in re tanti momenti non omittendum censuit, ut communicatam secum historiam ederet, suum tamen iudicium non interponeret. Historia autem illa digna certe est quae legatur, quippe exacte percripta, & illud adversus dubitantes confirmans, vera scripsisse qui ab rabido cane venenum sine vulnere, sed per assutam dumtaxat spumam, immixtum interdum fuisse, tradiderunt: quorum nomina ubi posset legere, alias (q) indicavi; addes autem praeter ceteros Cl. Professore Tinenensem Mazzucchellium (r). Utinam veniat tempus quo aut illud, aut aliud aliquod pariter simplex remedium satis sit usu multiplici comprobatum, aut etiam auxilium id quod Vir Doctus Arrigonius (s), haec dum scriberem, proposuit, arteriotomia in dorso pedis ea ratione instituta qua ipse est solitus, & felicitatis adjecta Observatione ostendit. Quae etsi una est, nec sine aliis peracta remediis quae alii quoque, & in his Morandus, exhibere consueverunt; tamen a te libenter legetur, ut tres aliae pariter quae ad Maniacos spectant, auxilio eodem sanos e Nosocomio dimissos, si unum excipias, quem fanitati jam restitutum, importune intra dies quinque phlegmon occidit. A metacarpo enim quem antea dum furens, vehementius se agitabat, circumjecta ferrea vincula contuderant, incipiens, ad brachium inde, & a brachio ad humerum magno impetu, & celeritate se extenderat. Quod dum leges, Valsalvae consilium, a me tibi alias (t) memoratum, laudabis, firmis quidem vinculis eos qui furant, sed minime duris, continendi.

Ceterum quod ad eam attinet arteriotomiam, nolo te ignorare, cum Studiosi Juvenes a me perissent, ut arteriam in illa ipsa tarsi parte ubi incidenda est, regei juberem, vidisse nos, eam non sub communibus foliis integumentis, verum etiam sub tendinibus, digitos extendentibus, in eo certe corpore jacuisse.

14. Antequam scribendi finem facio, placeat casum non omittere, quem Patavii A. 1754. observavit Medicus, cujus mihi fides spectatissima est. Non ille quidem ad hydrophobiam prorsus attinet; accedit tamen, & plura habet quae attinere videantur, quemadmodum ex brevi ejus narratione, & perpaucis, quas addam, animadvertionibus cognoscas. Felis ab adveniente catello timens, ne foetui quem enixa erat non ita pridem, noceret, adversa occurrit. Felis dominus catellum in ulnas recipit. Improba autem felis imum crus domini dentibus, & unguibus invadit, & paulo supra tarsum antierius fauciat. Homo diebus tribus primis quidquam mali neque sentit, neque metuit, quippe cum felis neque antea, neque postea ullum dedisset rabiei indicium. Sed quarto a morsu die tanta illum circa praecordia anxietas corripuit, ut cum amplius par ferendo non esset, ad Medicum, qui haec mihi omnia narravit, confugeret, opemque flagitaret ea contentione, iisque oculis, & vultu, ut proximi furoris metum incuteret. Itaque confestim hirudinibus, & cucurbitulis ad vulnere admodum (quibus postea diu impositus, sic aegro cupiente, lapis est ille exoticus quem *cobram* vocant) & sanguine, ut pulsus requirebant, de superiore, & inferiore artu opposito, nec semel, detracto, & multa aqua saepius data, quam homo sine ulla repugnantia, & difficultate potabat, cum per haec, aliaque nihil omnino proficeretur, imo vaniloquia accederent, unum modo auxilium fuit quod anxietates levaret, aquae balneum ita, ut quotiescunque illa gravius urgerent, in hanc

(o) n. 14. (p) n. 17. (q) Prolus. supra cit. (r) n. 25. (s) Epist. 8. n. 18. (t) Ibid. (u) Epist. 24.
(x) n. 19. & 22. (y) Traité du Cœur l. 2. ch. 1. n. 1. (z) De hydrophobia. (a) Della Cura preservat. della Rabbia Canina.
(b) n. 32. in fin. (c) n. 30. 31. (d) n. 32. (e) supra ad n. 9. cit.

(f) n. 15. (g) Eph. N. C. Dec. 3. A. 9. & 10. in Append. sub n. VI.
(h) apud Stalpart. Cent. 1. Obs. 100 in Schol. haud procul a fine. (i) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1707. Obs. Anat. 1.
(j) apud Stalpart. Schol. cit. (k) De Veneno Animant. P. 2. (l) De ponto l. 1. Eleg. 4. (m) Epist. 8. n. 26. & 29.
(n) supra ad n. 9. cit. (p) Hist. de l'Acad. R. des Sc. A. 1754. Obs. Anat. 2. (q) Epist. 8. n. 21.
(r) apud Morandus paulo ante cit. (s) Dissertaz. della Mania &c. P. 3. c. 2. (t) Epist. 8. n. 5.

hanc æger ultro se coniceret, quod sæpe: erat enim calidum anni tempus, faciebat. Postremo febre non levi, nec longa tamen, prehensus, cum multum sudasset, quartodecimo a morfu die jam sanus esse videbatur. Sed in pleniluniis deinde singulis, ab demorso loco, quem, nimis cito clausis vulneribus, lividus, quasi ut solet in Sugillationibus, color cingebat, sentire cœpit irritationes quasdam ascendere, quæ cum ad præcordia pervenissent, fummas anxietates easdem illas quæ prius fuerant, inferebant, a quibus non poterat, nisi per venæ sectiones, liberari. Postquam ad eundem modum, eodemque tempore hæc ad duodeviginti usque mensem redierant, cœperunt quarto quoque dumtaxat plenilunio redire: quod tempus jam quarto a morfu anno, hæc dum scriberem, adhuc fervabant.

15. Si canes excipias, non sapius fere quam a felibus hydrophobiam, aut graves, ad hanc accedentes, noxas illas memini legisse. Quod si canibus dumtaxat, & felibus illi dati essent folliculi qui graveolentem quandam humorem ad anum emittunt, non levis hinc confirmatio repeti posset conjecturæ eorum qui inter causas cur rabidi fiant canes, obstructionem recentem *sacculi*; imo sacculorum, duo enim sunt qui foetidam illam materiam continent, quæ humorum acerrima pars esse videtur, ut si in sanguinem resorbeat, vel ex eo rite minus seceretur, summo cuique morbo pariendo idonea sit. Et magna certe irritandi vi esse præditam, cum alias, tum præcipue tunc intellexi, cum multelam periculis, & ex istis sacculis, quos proportionem grandiores habebat, humorem effundens, continuo nares percussas sylvestri quodam acuto odore sensi, ut nulli alii magis assimilandus, quam accensi sulphuris, videretur. Verum non multum tantum, sed tot aliis animalibus hi obtingere, quot vel antequam alii in aliis, & nominatim Peyronius (u) in *Moschifero Animalis*, indicasset, in Adversariis nostris (x) jam legeris; ut mirum non sit, scriptum esse postea a Præstantibus Viris, in *quadrupedum pene toto genere*, aut saltem, quoniam plures tamen species sunt excipiendæ, maxime, ut Cl. Fantonus (y) loquitur, in *digitatis quadrupedibus & canis* reperiri. Illa igitur causa rabiei seposita, si rem tantummodo spectemus, vix dubium est, quin post canes, feles præ ceteris, ut dicebam, hydrophobiam inferant, aut noxas ad hanc proxime accedentes. Tria habet exempla Scaramuccius (z): in duabus videlicet foeminis, & in Presbytero: bina Brogians (a), alterum in Sacerdote, in viro quodam alterum: unum Lindernius (b): &, ne longius faciam, unus Stalpartius (c) novem produxerat a felibus rabie infectos, eaque occisos, quorum primum ipse viderat, reliquos Amatus, Hildanus, Zacutus memoraverant. Neque apud Patavinos exemplum defuit annis superioribus in Nobili Viro, qui, ut Brogiani Sacerdos, invisentes rogabat, ut longius abisterent, ne ipsos morderet, sic confirmans quæ non unus ex Medicis admonuerat, non omnes hydrophobos delirare. Sed & pleraque ex indicatis exemplis si inspicere volueris, insuper cognosces, accidisse non semel, ut nemo posset a terrore natum

esse morbum, contendere, ut qui ignaros, selem efferebam quæ ipsos invaserat, multis post mensibus prehenderit, ut in Stalpartii, & Hildani Observationibus. Quia ignari quoque fuisse videntur viri duo, ab Lindernio, & Brogiano memorati, secundum præsertim, quippe a selem quam percutiebat, demorsus; ut ita potius, quam rabie, quemadmodum in casu a me exposito (d), concita fuisse videretur. Ad eundem autem casum quadantenus id pertinet quod in Scaramuccii Presbytero accidebat, ut faucium angustia, a qua cito evaserat, rediret per multos annos eodem anni tempore quo fuerat a rabida fele impetitus, sola dentium impressione relicta, sine cutis laceratione. Sed attinent magis duo alia Auctoris ejusdem exempla. Scilicet in foemina, de qua, & de aliis similibus Epistola VIII. (e) nimis preste indicavi, prima hydrophobia signa se prodiderunt, cum a vulnere jam occluso quasi radium aliquem inflammatorio sensu per brachium versus pectus moveri sensit. In viro autem qui unus de tribus, ab eodem cane demorsus, postquam duo ob eam causam oberant, quatuor circiter annos vixit, ex vulnere cui ferrum candens impressum fuerat, quottannis; nunquam enim ad cicatricem pervenerat; multum sanguinis exibat per illud tempus quo morfus inflicto fuerat, usque dum in tibia, ubi vulnus contigerat, vena dissecta fuit. Et quando jam de rabido quoque cane mentionem fecimus; præter alias Observationes huc attinentes, legas velim quam ad Hildanum (f) Roscius scripsit. Videbis, quot, & quam gravia, nisi quod aquæ potio nunquam recusata est, Matrona pertulerit post acerbissimum brachii dolorem, quod septimo ante anno rabiosus canis momorderat, itemque post annos totidem principio malorum semper ducto ab eodem brachio, & deinde interjecto sexennio, tum anno dumtaxat uno, infestante autem anno bis, & ter proximo sic tamen, ut quo crebriores, eo breviores essent insultus. Fuerant post acceptum morsum auxilia plura confestim adhibita; sed post hæc vulnus ad cicatricem perductum. Quæ res cum male cesserit foemine quoque ex Scaramuccio commemorata, contra autem valde profuerit viro de quo ex ejus Observatione dictum est, nunquam vulnus coaluisse; facile apparere potest, egregium esse eorum omnium monitum, qui diutius apertum servandum, & si forte citius clausum sit, referendum statim esse, docuerunt. Quas sicut alibi (g) laudavimus; ita in exposito a nobis casu fuisse factum, vellemus.

16. Cæterum ut idem casus, cum aliis qui alias (b), & modo præsertim producti sunt a nobis, conjunctus, quæ de hujus veneni per nervos communicatione, & convulsiva natura coniecimus, non leviter confirmat, sic levamen unicuique ex aquæ balneo cum iis consentit quæ de hujusmodi auxilii usu non proflus contemnendo censuimus (i): multæ autem sudorosis profusionis utilitas ea comprobatur quæ de hac Veteres & Recentiores docuerunt. Quorum præcipuos; ne hic singillatim nominem; satis illa quam supra (k) laudavi, Edimburgensis Differtatio indicabit. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LXII.

Speñtat ad Epilepsiam, Convulsionem, Paralyfim.

NUNC quæ supersunt accipe de iis quæ ad reliqua tria gravia cerebri, & nervorum mala pertinent, Epilepsiam, Convulsionem, Paralyfim. Et de Epilepsia quidem nullam habere quam hic adderem, Observationem, nisi eam perire nollem quæ mecum Venetiis circa A. 1708. communicata est a spectatis, & tibi alias laudatis Amicis duobus Alexandro Bonis, & Joanne Hieronymo Zanichellio.

2. ADOLESCENS annos natus duodeviginti, nulla prævia manifesta causa, febre prehenditur, nec de ullius Partis, nisi capitis dolore, molestiaque conqueritur. Accedunt epileptici insultus, qui mortem afferunt intra horam a febris initio viginti quartam.

CRANIO aperto, nihil usquam vitii repertum est, si mucosum excipias serum quod super anteriorem cerebri partem inter Crassam, Tenuemque meningem

congestum, has multum diduxerat, illudque compresserat. Et Ventriculus quidem apparuit inflammatus, & lumbricorum teretium glomeramen in primis intestinis compertum est. Sed nullum rerum harum indicium fuerat.

3. An tantus fuit capitis dolor, ut ventriculi, & intestinorum dolorem, quemadmodum Hippocrates (a) loquitur, obscuraret? Certe alterum ejus aphorismum (b) confirmavit mors, convulsiones in febrecitante supervenientes consecuta. Sed ut hæc ægrotationem, non ita brevem futuram, fecerat brevissimam; quidnam fecit, ut ipsa essent adeo vehementes? Num lumbrici, Tenuia intestina irritantes? Crederem, si ulla in ventre molestia dolorem capitis antecessisset. Hunc vero quæ causa effecerat? An febris? Sed quæcunque ejus causa fuerit, si vehementissimum agnoscimus; remora-

tura ab eo in meningum vasis fuisse sanguinem, & hinc serum illud effluxisse, non mirabimur. Cujus vel minori copia posse epilepsiam fieri, cum alia Epistola (c) indicaverimus; non opus est hic illa iterare quæ ibi potes relegere. Quod si Bohnium (d) inspicias, ubi in dissecto ab se decenni puero ex cephalalgia primo immanni, hinc epilepsia, & torpore omnium sensuum defuncto, quid sibi apparuerit, proponit; facile intelliges quid de sero, aut si mavis lymphæ vel non effusa, sed circa anfractus cerebri in vasis remorante, censuisse in ejusmodi casu Vir doctissimus videatur.

4. Ad Convulsionem transeamus. Nam Epilepsia quidem esse nequit sine Convulsione; at Convulsio sæpius est sine Epilepsia, velut in eo quoque fuit, cujus tibi historiam continuo subijciam.

5. FORICARIUS annorum, ut videbatur, circiter quinquaginta, robustus, boni coloris, atque habitus, vel potius plethoricus, bibax, & sæpe ebrius, Nosocomii latrinas intempesta nocte, ut solent, suis cum ministris expurgabat. Quibus identidem, ut ea fordida ars requirit, ultro citroque commenantibus, cum forte ille solus esset, de improvviso spectrum, albis indutum, sibi videre visus est, & illico toto corpore contremiscens, simulque oris distortionem capitis, sic ab redeuntibus ministris repertus, & ad lectulum perductus fuit. Datiss continuo antispasmodicis, & cardiacis, cum remissis tremores, viresque pulsibus dissident, sanguis eadem nocte e brachio ad felibræ missus est. Mane autem tantumdem ex altero brachio detractum est, cum tremores jam magis remississent, & expansi, febrileque essent pulsus. Sed & postridie vena in pede secata est, levamine aliquo, sed brevi, a singulis venæ sectionibus relato, sanguine autem, præsertim in prima, spumoso, pernigroque exeunte, cujus crassamentum fuit durissimum, serum paucum. Perturbat febris, & pro clonicis jam tonice convulsiones subinde toto corpore vehementer urgebant. Loqui homo non poterat quæ intelligerentur, idque ex eo tempore quo ministris suis quid sibi contigisset, narraverat. Se tamen cognoscere, & internoscere adstantes, ostendebat: & gestu, cum poterat, graventem capitis dolorem molestum sibi esse, indicabat. Per hæc, quibus frustra interna alia, externaque opponebantur remedia, intra sex, an septem dies confectus est pridie Kal. Februarii An. 1747.

CADAVERIS, ut Publicam Anatomem abolverem, in Gymnasium postridie illati, brachia quidem erant non rigida, sed manuum digiti rigidissimi. Penis, & scrotum, sed cute tenuis, nigricabant.

Ventre aperto, & omento, cujus exigua pinguedo erat, sublato, Colon intestinum quod ab aere inclusio fere ubique, nec tamen nimis, tumebat, animadverti sic incedere, ut postquam ad jecur ascenderat, inde se demitteret infra umbilicum ad duos tresve digitos ab dextero humus latere, hinc vero cum in suam redisset sedem, eamque, ut solet, transversum sub ventriculo, obliquum autem in sinistra hypochondrii sinistri parte, & rectum per totam anteriorem faciem subjecti renis servasset, inde rursus in idem hypochondrium regrederetur, unde iterum descendens, pelvique subiens, sine ullo flexu in Rectum intestinum abibat. Tenuia Intestina, si tractus eorum quosdam, & in his partem Ileii non parvam exciperes, quæ intra pelvim valde profunde se demittebat, erant aere distenta, ibique per eorum tunicas flavedo quæ intus infecta erant, transpicebatur. Scilicet bilis quæ cystim hepaticam ferme implebat, ut exsudans, intestina proxima fecerat exterius flavæ, sic influendo, fecerat etiam interius. Jecur vero subcæruleo fuit colore, uti & lien; sed etsi ad illius crepidinem is color saturatior erat, nusquam tamen ultra superficiem pergebat, ut neque in liene. Hic modicus, jecur autem magnum; sed sanum viscus utrumque.

Thorace recluso, pulmones, qui vix alicubi, idque a tergo, ad pleuram adhærebant, erant potius turgidi, & quibusdam locis majusculas ostendebant areas, non nihil superficiei reliqua altiores, in quibus manifeste apparebant inclusæ quasi vesiculæ. Nullus omnino intermedius lobus fuit a dextris, sed ita res ibi se habebat, ut a sinistris. Pericardio incisio, nullam in eo humoris guttam inveni, faciemque ejus interiorem hæctenus humidam, ut non proflus cordi adhæreret, quamvis alicubi jam quasi adhæreere inciperet. In corde parum omnino sanguinis fuit; an quod dum majora sub diaphragmate fecerant vasa, antea defluxisset, præsertim cum Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

passim in hoc cadavere sanguis animadversus sit fluidus? Concretiones tamen duas polyposas deprehendi, quarum una ex auricula dextera in venam Cavam Superiorem, altera, quæ paulo erat spectabilior, ex ventriculo ejusdem lateris in Pulmonarem arteriam pergebat, teres. nec digittulo crassior. Cranium denique, & Crassa meninx cum secarentur, nihil occurrit adnotatione dignum. Sed Tenuis vasa habuit sanguine adeo plena, ut vel minima, quasi ab injectione ubique apparerent. Plena in ventriculis quoque, imo etiam intra ipsam medullarem cerebri substantiam erant: & cum initium Spinalis medullæ, quod cum Oblongata extractum fuerat, lente comprimerem; sanguinem animadverti non solum ex ejus medullæ rima, verum etiam ex sectione substantiæ ipsius quæ rimæ propior erat prodire. In laterali ventriculo utroque copiam aquæ limpide non ita modicam; rubentes tamen Choroides plexus, & in his non vesiculosæ, ut sæpius, sed minimas particulas rubras conspexi, easque solidas, ut glandulose viderentur. Cerebrum, & cerebellum naturali erant firmitate; sed laxus Fornix, laxaque medullæ Oblongatæ crura, & mox truncus; sed hæc facie dumtaxat interiore. Nec vero hoc prætermittam, quod, ut quædam alia ex hac dissectione tibi descripta, ad ea quidem pertinet quæ minus sunt consuetæ, sed ab ortu tamen, non a morbo repetenda; cerebri anteriores lobus qui inter se contingunt, ad medium ferme altitudinis partem aliquam habebant superficiem, alioqui intestiniformis, ita factam ut eorum alter ibi exciperetur, alter exciperet.

6. Quid terror, etiam vanus, possit, producta monstrat historia. Vides, ut illico & clonicæ, & tonicæ, ut ad os, convulsiones a perturbato spiritu motu obortæ sint, quæ sanguinem in vasis, cerebro inservientibus, remorando, sicque effusionem feri inducendo, novas facile attulerint causas ob quas convulsiones ipsæ ad mortem usque perstarent; nisi forte mavis limpida illam aquam in Laterales ventriculos esse effusam & compressis insuper vesiculis, quæ in Choroidibus plexibus, ut sæpe videmus, antea extitissent, quarum disrupturam in se contractæ reliquæ illa fortasse quasi glandulosa corpuscula repræsentaverint, qualia, nec dissimiles ob causas, iis quoque Anatomicis apparere olim potuerint, a quibus ejusmodi glandulæ iisdem in plexibus agnitasunt. Quibus ego de rebus, ut quæ mihi pariter venerunt aliando in mentem, etsi tibi fortassis non proflus reputarem; illud tamen quod de remorato sanguine dixi, tanto credibilis est, quanto is majori, quippe in bibaci, & plethorico, erat copia, & quanto in ægrotante evidenti fuit levamen, quantumvis breve; quod ex singulis venæ sectionibus relatum est, in mortuo autem vasorum, etiam minimorum, cerebri manifestior distentio, ut vel ex hujus appendicis, medullæ Spinalis compressione intellectum est; perraro enim ex ipsa ejus medullæ substantia licet sanguinem exprimere. Adde huc acres ex tam fordida arte in hominis sanguine particulas, ut posita hujus mora exeuntes, irritare magis, & vellicare potuerint. Verum de Epilepsia, & Convulsionibus satis, præsertim cum de opposito malo, Paralyfi plura supersint quæ huc adjiciamus.

7. VETULAM octoginta annis minorem, sed majorem septuaginta, repente apoplexia gravissima corripuerat. Continuo in Nosocomium intulerunt stertentem, pulsu debili, & quod huc maxime attinet, artu utroque dextero resoluta. Ibi intra biduum eadem qua primum apoplexia ingruerat hora mortua est post medium Martium A. 1750. CRANIL fornice postridie ibidem circumsecto, cum effluxisset nihil: priusquam ille attolleretur, magna audiente studiosorum Juvenum corona, dixi, etsi ob ignotum mihi ejus Vetulæ temperamentum, & genus tum victus, tum morborum quibus fuisset obnoxia, non auderem, quam inventuri essemus apoplexiæ causam pro certo definire; tamen non inficiaturum, vel in muliere id ætatis esse posse a sanguine, præsertim cum ab hoc valde tumerent in collo venæ, & fortis fuisset apoplexia: cæterum, quæcunque fuisset causa, dummodo in organica conspicua læsione consisteret; ex paralyfi dexterorum artuum conjici probabilius posse juxta Valsalvæ tot Observationes, & meas, in sinistro cerebri hemisphærio apparituram. Tunc avulso a subiecta meningis crani fornice, cum in ea morbo si nihil, mox autem per meningem Tenuem repentina vasa pleraque vididisse nigro sanguine turgida, & aliquid cruentæ aquæ circa inferiores Oblon-

(u) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1731. (x) IV. animad. 29. (y) Differt. Anat. Renov. 4. (z) supra ad n. 11. cit.
(a) P. 2. ibid. cit. (b) Commerce. Litt. A. 1735. Hebd. 11. n. 2. (c) Cent. 1. Observ. 100. & in Schol. (d) n. 14.
(e) n. 21. (f) Cent. 1. Obs. Chir. 86. (g) Epist. 8. n. 26. (h) Ibid. n. 21. & 32. (i) Ibid. n. 29.
(k) n. 9. (l) S. 2. Aph. 46. (m) Ibid. Aph. 26.

(c) IX. n. 10. & alibi. (d) Differt. de Trepanation. Difficult.

Oblongata medulla fines animadvertissimæ; ad cerebri, quod erat firmum, cum cerebellum esset laxum, dissectionem ventum est. Primum autem aperto Laterali ventriculo dextero, non pauca cruenta aqua se obtulit, quæ res videri poterat aliquid indicare quod paulo ante memoratis Observationibus non responderet. Sed cum in toto eo ventriculo nihil disruptum, aut laceratum, nisi Lucidi septi quandam partem conspicerem; ad finistram ventriculorum recludendum perreclusum est. Qui totus partim eadem cruenta aqua, partim vero, præsertim posteriora versus, nigro non paucio sanguine, foque concreto, erat plenus. Sicque intellectum est, aquam illam cruentam ferum fuisse e concretente eo sanguine expressum, quod sibi per septum, ventriculis interpositum, ab sinistro viam fecerat in dextero, qui nihil habebat adnotandum, nisi Choroidem plexum pallidulum, multique, sed parvis, hydatidibus, qua antrosum infestebatur, distinctum. At in sinistro ab erumpente sanguine læsus adeo fuerat Choroides plexus, ut quemadmodum se haberet, satis perspicere non liceret. Eruperat autem sanguis ex ampla, cui adhærebat, fovea, excavata in dilacerata parte ferme tota Striati corporis quæ ab hujus longitudinis medio ad posteriorem extenditur, & in simul lacerato contiguo nervi Optici Thalamo propemodum toto; vix enim parva hujus portio, eaque lurida, reliqua erat quæ ad oram est ventriculi tertii; pleni eadem illa aqua sanguinolenta: ab altero autem Thalamo ejusdem latere non ipsum dumtaxat, sed & aliquam attiguit partem hemisphærii sinistri erumpens sanguis dilaceraverat. Cætera quæ intra cranium erant, cum diligenter persequeremur, omnia intra naturæ modum deprehendi, ut ne arteriæ quidem duri quidquam haberent, cum cætera pene omnes, & vel ipse per collum Carotides non sine lamellis ossis in hac Vetrula invenirentur. Sed neque in ostendenda, dissecandaque diebus infrequentibus in sua sede Spinali medulla quidquam offendi quod esset præter naturam. Thoracis quoque, & Ventris vicinæ nihil obulerant adnotatione dignum, si Colon excipias, quod ab sua sub ventriculo sede infestebat se deorsum in arcus modum, nec breve ad spatium erat; quæ, ut ventriculus pariter, valde contractum. Animadvertum etiam est ad alteram axillam corpusculum forma, & magnitudine lupini, ambigua inter os, lapidemque natura, quod nisi pleuræ magis, quam axillaribus glandulis, vicinum fuisset; fortasse ex earum aliqua factum esse, existimasses.

8. Dissectio hæc, ut tot aliæ, simul Hippocratis aphorismum (*) solvere apoplexiam fortem impossibile, simul Valsalvæ dogma de quo sæpe, & supra diximus, comprobavit, tum insuper quam exitialis sit effusio sanguinis per Striata corpora, aut proximos Thalamos, aut eorum saltem viciniam. Quæ omnia proxima quoque confirmabit historia.

9. FEMINA jam cana, ibidem circa medium Decembrem A. 1756. ex eodem morbo intra paucas horas mortua erat, paralyti in dexterioribus artubus adnotata. CEREBRUM in sua sede incisurum, iis, qui post a me habitam de universis ossibus Exercitationem plures subliterant, studiosioribus Adolescentibus cum idem quod in superiore muliere prædixissem, tum Crassa meningē amota, vasa per Tenuem discurrunt pleniora sanguine a sinistris ostendi, ubi & quidpiam sub ea apparebat quasi gelatinæ simile. Deinde cerebrum secans, cujus erat substantia firma, cerebelli autem mollior, cum paucam aquam in Lateralibus ventriculis conspexissem, nihil autem in hemisphærio dextero, ut neque ulla alia in parte ex his quæ calvaria continentur, offensum quod ab naturæ norma recederet; sinistram hemisphærii alte secundum longitudinem dissecto, nigrum, concretumque sanguinem ad duas, ut omnibus visum est, uncias deprehendi. Erat is ad latus Striati corporis, & sub hoc ipso intra medullarem substantiam effusus: quam etsi laceraverat; nullam tamen sibi viam inde aperuerat per quam in proximum ventriculum, aut extra cerebrum perveniret. Nihil præterea, quippe aliis occupatus, in hoc cadavere dissecui.

10. Hactenus scripseram Kalendis Januariis A. 1758. cum postmodum, ut interruptas Anatomicas Exercitationes resumere, in Nosocomium redeunt continuo alia

habenda ibi Observationis occasio se obtulit, ad laudatas Valsalvæ adjungenda.

11. MENDICUS quinquaginta circiter annorum, cuius Spina sic præter naturam se habebat, quemadmodum infra describam, cum in foro esset, ante mensum apoplexia ictus ceciderat, dexterioribus quoque artubus reclusis, & ore distorto. Illico in Nosocomium excepto cum venæ sectiones, & alia quæ solent, essent administrata, hæcenus profecerat, ut loqui aliquid posset. Interpositis diebus iterum apoplectico insultu corripitur; iterumque medicis auxiliis levatur. Denique tertio insultu conficitur. CALVARIAM circumsecando, & mox a Crassa meningē, quæ artius illi adhærebat, avelendo cum effluxisset nihil adnotatione dignum, & ipse Auditoribus, qui confertissimi aderant, quæ solitus sum, prænucciassem; exitus prænucciationem confirmavit. Nihil enim usquam per sectionem deprehensum est quod intra cranium peccaret, nisi cerebri hemisphærium sinistram. Cujus intima pars medullaris, Laterali ventriculo adjacens, a sanguine disiecta, tantum hujus nigri, & semiconcreti continebat, quantum medio cre cochleare vix caperet. Hujus autem hominis Spina sic erat inflexa, ut in nullo magis vidisse meminerim. Ad inflexam enim thoracis vertebra adeo flectebat se dextrorsum, ut angulum faceret deorsum versus recto minorem, simulque & illius vertebra, & quatuor, an quinque, ipsi impostarum corpora sinistorsum convertebat, ut hæc non anteriorem thoracis parietem, sed prorsus latus sinistram spectarent. Et descripta quidem flexione multo erat minor quæ in vertebra universis lumborum, & quæ in superioribus thoracis, imisque cervicis conspiciebatur. Sed tamen erat manifesta utrobique Spinae inclinatio arcum referentis, cujus convexitas in lumbis ad dexteram, concavitas ad sinistram; in superiore autem dorso, proximisque cervicibus illa ad sinistram, hæc ad dexteram pertinebat. Denique ligamentum quod intra primam colli vertebra secundæ processum quem Dentem vocant, dimidiati annuli instar a tergo amplectitur; animadverti cum Dente, præsertim a dextris, conatum, fortasse ob assiduum aut certe creberrimum colli positum, sic facto homini commodiorem.

12. Prava adeo, quam descripsi, Spina figura, quantum infestebat adherentem arteriam Magnam, tantum expedito sanguinis cursui inferiora versus obstatat. Itaque efficiebat, ut plus ex ipso cerebro peteret, hoc quæ ad sanguinem apoplexiam disponderet. Quæ tamen ne citius occideret, tum illæ duæ illæ in ventriculo basi Protuberantiæ, tum opportuna venæ sectiones præstiterunt, quibus nimirum factum est, ne læsio in illas usque procederet, nec sanguinis effusio, nisi lente, & parce, & per intervalla fieret.

13. In eo autem cerebri hemisphærio quod paralytico opponitur corporis lateri, in hoc quidem apoplexiæ genere labem quam sæpissime deprehendi, non hæc solum Observationes, sed & aliæ plurimæ confirmant nostras, quarum etsi pleræque alibi (e) indicavimus, aut proposuimus, aliquæ sunt tamen quæ superius ex iis quæ quam proximis Litteris (f) ad te mitteremus. Nec tantum nostræ, sed etiam aliorum, pariter alibi (g) indicatæ, ad quas addes laudatam a Cl. Sulzeri (h) ex Archibaldo Adams, & quas olim in nosocomio non semel ab se habitas esse testatur Meadius (i), & eam tandem quæ simillima nostrarum Experimentissimo Viro occurrit M. Antonio Cالداني (k), cum post fortem apoplexiam, & totius lateris dexteri paralytum sinistram vidit Striatum corpus pro dimidio erosum, grumosoque sanguinis plenum. At enim sunt etiam Observationes resoluti lateris non oppositi, sed illi cerebri hemisphærio subjecti, quo in hemisphærio erat labes. Sunt vero: nec Valsalva (l) inter suas dissimulavit, nec ego (m) inter meas dissimulo. Quinimo in Epistolis Anatomicis (n) produxi septem ex aliorum libris acceptas. Quibus si forte accensere velis quandam ex Præcl. Bergonio (o), & unam, aut alteram quæ apud laudatum Sulzerum (p) est: non repugnabo: rogabo tamen, ut quæ ad earum plures possunt regeri, perpendas: quod & ego (q) ad quasdam feci, ut Sulzerus (r), qui Epistolas meas Anatomicas non viderat, postea ad alias, etsi nonnullas esse, credas, quibus nihil opponi liceat; tum exiguum harum numerum cum innumeris propemodum Valsalvæ, & aliorum confertas. Sic enim continuo intelligis, utris a Medico ea quæ ut plurimum

plurimum sunt, ut debet, spectante, utris inquam, magis fidendum sit, nec in theoria tantum, sed & in praxi, ut si præsertim, quod sæpe nominatus Sulzerus (s) indicat, terebra calvaria percussæ, ob sanguinem, aut pus sub hac effusum, sit adhibenda, & ad signa accedat alterutrius lateris resolutio, a qua nimirum compressionis cerebri, & quod consequitur, effusionis circa hoc sedes indicetur.

14. Et quod ad cerebrum quidem attinet, satis dictum est. Quid vero, si noxa ad cerebellum attineat? Num si in alterutro, aut ad alterutrum hujus lobum ea sit, hemiplexiam inducet, & si inducet, in opposito ne, an in subiecto corporis latere? Hoc ego problema Epistola Anatomica XIII. (t) proposui; nec me penitet consuetudinis meæ, quam tunc servans, nolui ex una Observatione quidquam definire; imo eam posse multifariam explicari, falsis, alias, & generis alius expectandas esse, monui. Nam incidi postea in unam minus recentem, legique alteram novam Observationem, in quarum utraque ei lobo cerebelli in quo læsio erat, hemiplexia respondebat subiectorum artuum, non adversorum, Quas tibi alius Litteris (u) significavi: quamquam is varietatibus admonitus quæ nonnumquam contra ipsum Valsalvæ dogma, tot alloquin constantibus exemplis comprobantur occurrerent, tutius consilium esse, censui, ne ex duobus quidem præpropere quidquam constituerem, sed alia, atque alia, quod priusquam suum dogma vulgaret, Valsalva fecit, his antea addere, ut par est, exempla occurrere, ut cognoscere potuisti ex iis, quæ ad Observationem quandam meam adnotavi (x), in qua non parvam caveam intra alterum lobum cerebelli deprehenderam, eamque sanguine plenissimam: & cognoscere ex altera poteris, ibi, & alio quoque loco (y) tibi promissa, quam protinus communicabo.

15. VIR annos natus circiter duodequingenta, cum vel magis quam ars ejus requireret, quæ erat Coquinaria, accensis carbonibus uti, & propius aditare capite consuevit; de hujus acutissimis doloribus jam ante annum conqueri ceperat. His accessit utriusque pariter inferioris artus debilitas tanta, ut neutro amplius posset insistere. Quæ re, illisque doloribus, & febricula, quæ his se addiderat, cubare coarctum e brachio, tum e pede emissio ea quoque de quidam solutus est; at cætera omnia perstiterunt. Medico dimisso, cephalicis quæ hic imperaverat, remediis uti perrexit; sed frustra adeo, ut postquam mensam jam quartum domi decubuerat, cunctis denique illatus, ibi dies vixit non amplius decem. Pulsus erat tensus, & vibratus, cætera mediocres, nunquam febriles. Respiratio naturalis, ut alimentis quoque appetitum attinet, resoluti; superiores, aut alia ulla corporis partes ejusdemmodi affectione tentabantur. Interdum plerumque somnus; noctu autem subdeliria. Inter cæterum, quantumvis supervacua, auxilia, cum venæ in brachio sectæ, & paucis interiectis diebus, in pede quoque facta esset; forte accidit, ut nocte insequente obiret, nullo defectionis toto eo die indicio dato: quin prandio ita, uti consueverat, usum, & prima nocte etiam parte cenulæ, de improviso animadvertum est, animam agere. Cum mente per intervalla vigeret; neque enim vigeat ut plurimum; tum domi non semel forori, tum in Nosocomio aliis dixerat, optare se, ut suo post mortem cranio aperto, atrocis morbi causa perquireretur. Id a me postmodum factum, qui dies fuit VI. Idus Januarii A. 1754. inspectantibus pluribus qui absoluta Anatomica CAPUT dum amputarent, & calvariam secarent, aqua effluerat. Priusquam cerebrum incidere, & magis mini cranii cavum, ejusque sinistram latus, ad posteriorem præsertim, magis, nec ita paulo, distare a medio, lium ventriculorum parietes reputant, plus habebant sanguinis, quam æquum sit: quod etiam de vasculis quæ per puncta magis conspicua significabant. Erat ea in hemisphæriis quidem substantia durior. Contra fuit laxum corpus Callosum, Fornix autem, & tractus medullaris qui ante co-

lumnas ejus basis ducitur, multo laxiores, eaque columnæ laxissimæ; ut dissoluta earum substantia videretur. Corpus quoque Striatum sinistram laxius, quam dexterum. At Lucidum septum satis firmum. Ventriculis tribus anterioribus multum inerat aqua limpida, in eaque alæ plexuum Choroidum, nec tamen pallidæ, natabant. Pinealis glandula, aqua eadem distenta, cum facile inter attollendum mediam illorum plexuum partem, disrupta esset, nihil de se præter exiguum basis particulam reliquit, suæ sedi affixam. Ventriculus tertius visus æquo brevior; at æquo longior certe apparuit quartus, postquam cerebrum per medium, ut solet, dissectum, & ad latera diductum fuerat. Quod cum ita, ut dico, fecerem; id offendi quod superficies, consuetæ similis, ne suspicari quidem sinebat. Scilicet vix cultro ad digiti transversum profunditatem perveneram, cum insolitam resistentiam percipiens, subitit, & eam quam dissecueram, partem diducens, magnopere miratus sum, nullum in sectionibus indicium medullaris arbusculæ apparere, sed ejus loco strias parallelas medullares inter corticalem substantiam ductas, quibus ex striis nihil usquam ramusculorum emittebatur. Tunc acutior, & validior cultro connixus, quidquid ex medio cerebello supererat, ad quartum usque ventriculum dissecui, vitiumque illud ob quod potissimum hanc tibi Observationem describo, cepti conspicerem. Erat non mollis, nec bicolor, nec profundis creberrimis sulcis interiecta substantia; sed scirrhusa, unius coloris, qui ad carneum dilutissimum accedebat; & quasi ex corpusculis subrotundis confans, inter se ita compactis, ut nullum usquam interstitium, nulla membrana, nulla sanguifera occurrerent vasa. Hujusmodi vitium hinc dextrorsum nonnihil, inde vero per totum pene cerebelli sinistram lobum se extendebat. Si enim exciperes hujus lobi superficiem, quæ ex naturali fiebat substantia, nonnullis locis exigua, ad infimam autem faciem nulla, reliquam omnem partem idem prorsus vitium, tenebat, & ad imum præsertim arte se cum Dura meningē neclebat; ut ex eo loco ortum, indeque in cæteras quas diximus, partes propagatum credi posset. Lobus autem dexter etiam ex molli erat substantia, eaque duplici, corticali videlicet, ac medullari; tamen in transversum dissectus, non eam ostendit utriusque dispositionem, quam in aliis solet, sed evidenter ab ea discrepantem, quamvis non adeo ut media illa cerebelli pars, quæ ubi mollis erat, & ex duplici substantia facta, sectiones obtulit ab iis quas semper conspiciamus, ita diversas, ut paulo ante indicatum est. Nec plura quæ ab naturæ norma aberrarent animadvertere potui, etsi omnia diligenter, & in sua quodque sede persequi. Nihil præterea in hoc cadavere inspicendi tempus fuit.

16. Cerebelli hic scirrhus quo ex loco videri possit incepisse, dictum est. Num vero ideo a sinistris incepit, quod cranii cavum ibi præter modum esset amplum, non magis dicam, quam unde originem habuerit insolita medullaris substantiæ per dexterum lobum, & mediam illam cerebelli sedem dispositio. Sic enim ab ortu usque rem fuisse; credibile in eo non videtur qui sine ullo capitis incommodo annos vixerit septem & quadraginta. Veri potius simile est; ut ad alia transeam; scirrhuso in crescente vitio, cum minus minusque sanguinis, in totam illam cerebelli partem admitteretur, in qua nulla amplius conspiceretur de tot vasis quæ alte inter segmenta (hic prorsus oblitterata) in omnibus passim descendunt, tanto plus sanguinis in cerebri tum extima, tum penitiora vasa propulsum esse, indeque & dolores, & creberrima subdeliria, & denique, cum multa simul aqua in cerebrum defluxit, mortem provenisse. Quæ eo facilius omnia accidere potuerunt non modo ob artem hominis, & minus cautam in ea exercenda consuetudinem, verum etiam ob pravam illam, ad quam hæc accesserant, cerebri dispositionem, quæ a cranii abnormi figura indicatur, siue hæc intra uterum, siue in ipso exitu ab utero fiat. Sapius enim accidere hanc, credo, cum in difficili partu infantis caput diutius in angustis moratur, imperitæ autem, socordesque obstetrices postquam rudi, & inæquali pressione arreptum, & violenter protractum deformatum, mox nesciunt, aut minime curant apta, blandaque contrectatione in naturalem formam restituere. Quantum vero tunc detrimentum capiat tenella cerebri, & cerebelli structura, neque tunc solum, verum etiam deinceps, cum intra male conformatam calvariam crescendo, ad hujus figuram accommodare se cogitur, profecto etiam me tacente, satis intelligis. Nec quia cum Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

(*) 42. S. 2. (e) Epist. II. n. 10. & seqq. III. n. 2. 3. 14. & seqq. V. n. 7. XI. n. 10. 12. LI. n. 47.
(f) Epist. 43. n. 12. (g) Vid. ead. Epistolas. (h) De Actione Cerebri deuss. §. 8. (i) Mont. Med. c. 2. §. 2.
(k) Littera sull' Insensitiv. &c. §. 51. (l) Tract. de Aure Hum. c. 5. n. 5.
(m) Epist. 57. n. 14. 15. & Epist. Anat. 13. n. 23. 25. (n) Ibid. cod. n. 25. (o) Ventriculor. Lateral. Cerebri nova Tab. not. 22.
(p) §. 23. (q) Vid. Epistolas indicatas. (r) §. 16. & seqq.

(L) §. 21. (s) n. 23. (u) Epist. 32. n. 24. (x) Epist. 60. n. 7. (y) Epist. 52. n. 26.

similem; nisi quod amplius erat ad occiput non a sinistris, sed a dextris cranii cavum; in viro alio conformationem deprehendi (z), cerebri morbis obnoxium hominem fuisse, non scivi, ut neque senem in Nosocomio a me dissectum sub initium A. 1755, cujus frons a dextris, occiput autem a sinistris adeo prominebant, ut longior cranii axis valde esset obliquus; idcirco non fuisse obnoxios, facile existimes; neque enim omnia quæ ignotos plebejos homines in vita male habuerint, facile est post eorum interitum scire. Quin potius in foeminis duabus quomodo se habuerit cerebrum, vide, quarum alterius (a) calvariam, ut in viro, alterius (b), ut in senne, male conformata offendit, & quam atroces capitis dolores primam vexaverint, lege, ad quorum diuturnitatem quantum conferat vitiosa capitis figura, de aliorum quoque sententia (c) cognosces. Huc adde puerulum (d), cujus posterior pars cerebri non ad sphaeram, sed potius ad cubi superficiem accedere videbatur, convulsivis moribus peremptum, & mulierem (e) cui cranii cavea pro longitudine erat angustior, apoplexia, nec semel fortasse, correptam, certe autem ab eadem occisam. Quod si forte dixeris, accessisse ad pravam capitis dispositionem alias causas, easque externas; nempe idem quod ego de proposito Coquo, dices.

17. Cujus cerebelli scirrhus, si neglectis omnibus quæ in cerebro erant, vitiis, quasi nulla eorum initia ante paralytim contra ac capitis acutissimi qui hanc præcesserant, dolores indicant, esse potuissent; si illi, inquam, scirrhus unice, & per se paralytim velis imputare; haud videberis meminisse, non eum dumtaxat artum inferiorum qui scirrhus erat subjectus, sed utrumque pariter fuisse resolutum: quæ res nimirum facit, ut illud quod dixeram (f) per alias Observationes adhuc esse confirmandum, per hanc certe confirmari ne possit. Idemque prohibuissent alia in duabus Observationibus in quibus alterutram cerebelli partem effuso intra ipsum

sanguine, vel affuso erodente pure aut magis, aut unice læsam Epistola II. (g) & XIV. (h) proposuimus. In altera enim ullane hemiplexia fuerit, animadverti non potuit: in altera certe nulla fuit.

18. At enim, inquires, descripta Coqui historia illud saltem confirmabit quod adversus tot illa quæ a Willesio fuerant cerebello attributa, nunc passim proferunt Viri Docti. Cum tanto enim visceris illius vitio, respiratio, & alimenti appetitus in Coquo erant naturales, pulsusque ipsi tensi quidem, & vibrati, cætera mediocres. Ego vero sicuti non omnia quæ de cerebello Willesius scripsit, agnosco, ita aliquando vereor, ne forte nonnulli cerebello nimium detrahant. Quapropter si aliquid pro hoc viscere, præsertim antequam objecta in ipsum adeo crevissent, in meis ad te Litteris (i) attigi, in eam partem accipias, velim, ut existimes, non aliis omnino repugnandum, sed caute, & pedetentim in hujus quoque doctrinæ mutatione esse a me incedendum, censuisses. Nec aliud me consilium permovit, ut cum de cerebelli vulneribus scribendum fuit (k), ea ne prætermitterem quæ tunc legisti, ut neque ea quæ ad læsiones ejusdem attinent, quæ non illico, ut vulnera, sed tempore aut minus, aut magis longo fiunt (z), ut præ cæteris scirrhi. Quæ cum relegere possis, non hic iterabo. Noli autem putare cum in cerebello vitium hoc tantum offendi quod tibi accurate, ingenueque perscripsi, me non minus quam te in perlegendis, fuisse miratum, hominis tamen respirationem, & pulsus ita, ut diligenter quaerendo comperi, se habuisse. Certe enim plus ante hæc novissima tempora ei visceri tributum esse, perpexi, quam conveniret, laudandosque illos esse Egregios Viros, qui non tantum esse ipsi tribuendum, monuerunt. Minus quidem, ut aliis quibusdam corporis Partibus alia in re, ita in iis quæ dicta sunt, cerebello deferendum esse, apparet, quam superiori tempore. Videndum tamen quatenus: idque puto melius quam nos, posteros esse constituturos. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LXIII.

Attinet ad Cæcitatem, ad Aphoniam, ad Anginam.

ET si præter eas quas ante edideram (a), non unam ad te misi (b) ex meis Cæcitatibus Observationibus, unam vero, haud amplius, quæ ad Aphoniam (c), itemque unam quæ ad Anginam (d) attineret; tamen sic accidit, ut ex iis etiam quas postea habui, singulas possim nunc tibi describere quæ ad singulos hos duos ultimos Affectus pertineant, cum plures suppetant quæ spectent ad Cæcitatem, a quibus propterea initium ducetur.

2. ANUS cujusdam oculis inter non paucos alios quibus A. 1747. ad Anatomem Publicam uteremur, oblatus est mihi, quem eo libentius dissecarem, quod cæcum fuisse indicabat ejus figura non satis sphaerica, Corneæ autem maxima pars a magnis albis maculis valde opaca.

TUNICÆ Scleroticae Choroides arctius, quam solet, adhærebant, præsertim posterius. CrySTALLINI humoris anterior facies in medio erat inæqualiter excavata, idque altiusculæ: reliquæ humoris ejusdem partes, quanquam luci objectæ flavum succinum referebant; sanæ pro ea ætate erant tamen. Iridem cum vellem a Cornea dimovere; totam auferre non potui, a medio præsertim. Cum enim ab una parte ad medium usque, imo ultra medium Corneæ adhereret; nusquam arcte adeo, ac in medio, adhærebant ubi illa Corneæ facies erat inæqualis, & lamellam habebat quasi abscedere incipientem, & introrsum nonnihil extantem, cum facies exterior lavisset, neque in eadem præter minutissima quædam quasi puncta, eaque subobscura, aliud possem animadvertere.

3. Quæ cum ita se haberent, nec ullæ usquam in exteriori oculi facie cicatrices conspicerentur, non fecus atque in altero quem Cl. Anatomicus incidit Phil. Conr. Fabricius (e), alia quidem, digna quæ a te legantur, habente, sed in sede excavationis humoris CrySTALLINI cum hoc nostro conveniente; non ita difficile mihi erat vitia quæ descripsi, omnia ad anteriorem, quæ olim præcessisset, causam, sive ea inflammatio fuisset, sive alia, referre. Contra in oculo quem anno insequenti pariter

in Gymnasio secui, anceps hæsi, an omnia quæ continuo dicam, ejusmodi causæ essent imputanda.

4. VIRI oculus habebat Corneam a longo, ut videbatur, tempore opacam, & geminæ cicatricis tenuia quidem, sed evidenter, vestigia retinentem. CRYSTALLINUS humor cum tunica modo dicta connexus erat, nec tamen durus, quanquam decreverat adeo, ut vix quarta ejus pars superesset. Uvea non pessime; at Vitreus humor, & Retina multo pejus se habebant. Nervus Opticus, tenuior factus, pro medulla substantiam arcte compactam, albidamque continebat toto eo tractu quo intra orbitam fuerat. Ab orbita autem interiorius qualis fuisset, cum cerebrum præpropere humascent, scire non potui.

5. Hoc autem quam ægre tulerim, & cur tulerim, ex iis quæ tum in Epistolis Anatomicis (f), tum alias (g) ad te quoque scripsi, facile intelliges. Quo magis, principio saltem, gavissus sum, cum in Nosocomio anno proximo 1749. sub initium Januarii occasio mihi se obtulit eum nervum a cæco oculo intra cranium persequendi. Quæ observatio, cum una sit de duabus quas tibi olim (h) indicavi, & cum alteram quidem postea (i), hanc autem necdum miserim, nunc diligenter describetur.

6. VIRO olim, cum puer esset, variolæ oculum dexterum male adeo affectum reliquerant, ut nihil videret. Parentes autem diu lambendo hæcenus profecerunt, ut tandem aliquid, sed vix, subvideret. Neque ab illo tempore ad mortem usque, ad annum videlicet quadragesimum, plus unquam vidit. Et sane is oculus non modo erat altero minor, sed Cornea etiam ipsa; in qua nullum cæteroquin apparebat læsionis vestigium, ut albedo quæ pone illam erat, præclare transpiceretur; Corneam alteram non æquabat.

SCLEROTICAM igitur cum a tergo vix incidere cœpissim; limpida aqua statim effluxit, in quam pars magna Vitrei humoris videri poterat abiisse, cum pars reli-

reliqua, naturali quadantenus similis, annexa, ut solet, CrySTALLINO humori restitisset, qui illam cum retrorsum traherem, secutus est. Is parvus erat secundum omnes dimensiones, crassitudine autem vel paulo minor quam ejusmodi oculo conveniret. Facie anteriore in medio erat albus, sicuti per Corneam transpererem; cætera albidus: & cum interdigito leviter comprimerem, mollis. Cum vero ejus tunicam incidere cœpissim; continuo aqua erupit, nihil purulenti habens, imo pura, & limpida, eaque copia pro parvitate CrySTALLINI, ut hic statim ad multo minorem crassitudinem redigeretur. Quidquid de substantia ipsius reliquum fuit, lentis pristina figuram retinuit: & cum per diametrum dissecuissim; utraque sectio quandam quasi seriem minimarum nigrescentium particularum ostendit; quæ per medium recta ab uno ad alterum sectionis extremum ducebatur, cum ubique alibi color obsoleto albidus appareret. Cætera in oculo non male adeo se habebant. In palpebra superiore Sebaceæ glandulæ, quas in priore Viro (k) vel pulchrioris, crassioresque conspexeram, in hoc, propter violas fortasse, minus copia solent, conspicuas animadverti: duas tamen inter se proximas perpexi, quæ fumum versus se decussabant: quod adnotare hic volui, ut ab nonnullis, qui minime, opinor, attendentes, cum Icon rerum minus bene antea picturam proponitur, hæc ex eo potissimum corpore esse describendas in quo magis eleganter se habeant, cum in mea, quasi non una, sed multiplex fuisset, varietates quas solite enumerant, desiderarent, hanc tamen quam modo dixi, visam non esse, intellexerim. Verum ad illud cuius præcipue gratia hanc tibi exscribo Observationem, veniamus. Nervus, ad describendum oculum pertinens, Opticus intra orbitam quidem sub crassioribus tunicis medullam comprehendebat æquo tenuiorem, & quam si comprimeres, humidioris agnosceres, quam par esset, quali aquam haberet admixtam. Sed intra cranium idem nervus omnino secundum naturam se habebat, nisi quod ubi cum scocio committabatur, ibi paulo minus quam hic, videbatur crassius: supra autem eum locum; nam alte quoad potui, sum persecutus; ne id quidem, sed nullum prorsus animadvertere discrimen aut ego potui qui omnifariam inquirebam, aut alii qui perattente inspectabant, a me in Re Anatomica exercitati, potuerunt.

7. De aqua loco Vitrei totius, nedum posterioris ejus partis, a me quoque alias reperta, quid traderim in Epistolis Anatomicis (l), videre potes: de Optico autem nervo, ad cæcum oculum attinente, quæ locis scripta supra (m) indicatis. Quoniam vero cum id agerem (n), duas tibi Observationes promisi, ex quibus non sine admiratione intellexeris, nonnunquam ejus nervi esse vitia, ipsamque extenuationem, nec esse tamen respondentis oculi cæcitatem; de iis Observationibus cum alteram dumtaxat miserim (o); nunc alteram habebis.

8. SENIS, diebus primis A. 1752. ex cachexia, ut aiebant, in Nosocomio mortui, cadaver cum ibi secerem, quamvis non ad morbi causas indagandas: hæc tamen quæ præter naturam essent, adnotavimus. THORAX, ut Venter quoque nihil quidem habuit effusæ aquæ; sed non sine duritie pulmones, sinistram præsertim, qui arcte insuper Spinæ adhærebant. Cranii fornx, qui non sine vi avelli poterat, consuetæ majori, intus erat foveæ pluribus excavatus in osse frontis, & in altero sincipitis, aliis quidem minoribus, sed grandioribus tribus, & profundioribus, quorum duæ ad os illud, reliquæ ad hoc spectabant, eaque non modo, ut illæ, exterius lamella dumtaxat tenui, sed tenui adeo operiebatur, ut foraminibus pervia appareret. Unde intelligis, cranium illud quam facile, & quanto cum periculo ablevibus etiam ictibus, nedum a Chirurgis terebra illuc forte admota, pertundi potuisset, cum sub ea lamina essent vix pauca quædam fibræ ossæ, in reticuli modum dispositæ, quibuscum Crassa meninx, foveæ, illas convectiens, implicabatur, unde illa in avellendo cranio major difficultas orta erat. Quæ non ideo tibi describo quod a prægresso morbo, cujus hic nullum usquam occurrebat indicium, potius quam a natura fuisset, crediderim, eorum oblitus quæ alias (p) ad te scribens, de his foveis attigi; sed quod tum grandiores erant, tum nulla e subjectis meningibus exibat protuberantia ex corporeculis quæ Pac-

Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

chioni glandulæ dicebantur, quorum ne unum quidem hic fuit, confecta, cujusmodi protuberantiæ, ut tunc ad te scripsi, solent aliqui intra eas foveas excipi.

ET si vero in cerebri dissectione septum Lucidum, & Fornicem laxa præter omnem modum, imo inter duas ejus septi lamina aquæ aliquid deprehendi, in Lateralibus autem ventriculis aquam ejus similem in qua recens caro lota sit, non multam quidem, neque cum pallore Choroidis plexus conjunctam; cerebri tamen ipsius, & Oblongatæ medullæ, & nervorum, ex hac orientium, substantiam satis firmam, & omnino secundum naturam inveni. Quo magis me percussit nervi Optici dexteri constitutio, qui cum ad unionem usque cum sinistro, sanus prorsus, hujusque simillimus fuisset, repente ab unionem minus quam sinister, evidentissime crassus, & ad cinereum colorem accedens conspiciebatur, & sic ad orbitam pergebat. Quamobrem continuo an cæcus oculo dextero homo fuisset, sciscitatus sum, & cum id diserte negaretur, oculum illum inspectavi, nec minus sinistro pulchrum, sanumque deprehendi: neque intra orbitam Opticum illius nervum ab sinistro quidquam jam diserte amplius, conspexi, nisi quod paulo minus tamen erat crassus.

9. Sed quæ difficillimos habent explicatus in aliud tempus rejicientes, ad planiora nunc redeamus. Observationemque aliam, & deinde conjecturam quandam adiciamus.

10. MOLITORIS quem cæcum fuisse, aiebant, nec alio tamen præter baculum suum duce, per urbem ire consuevisse, oculi, quos dissecarem, oblatis sunt in Nosocomio sub anni finem 1755. Exterius per Corneam inspecti, turbidi potius, quam albi, videbantur. CRYSTALLINUM utrumque humorem subopacum offendi, non ut alibi magis opacus esset, alibi minus; sed ut æqualiter ubique. Sub digito, imo inter digitos visus uterque æque durus. Sed tamen alter, qui erat tenuior, scitior substantia fuit, magisque compacta. Alter qui crassior, plus æquo humidus, ut humorem in dissectione totus emittere videretur, non qui exiliret tamen, sed qui exsudaret. Eorum alteri; nam utri adnotatum non habeo; amplior; alteri mediocrius diametri pupilla responderebat.

11. Si forte alia cupis opacitatis non tam CrySTALLINI humoris, quam ejus tunica, exempla; Cel. dabit Hallerus (q). Cujus (r), & Cl. Zinnii (s) Observationes, inventam a Præstantissimo Wachendorffio (t) pupillarem foveam membranæ confirmantes cum legerem; facile mihi conjicere posse visum sum, quid fuerit tegumentum quoddam membranaceum pupillæ obductum, ex infantis corpore, cera etiam liquidissima repletis arteriis id perperantibus, eximio Medico Richardo Meadio (u) ostensum, quo ipse usus est ad comprobandum, rarissime quidem, sed tamen revera membranæ Cataractæ esse deprehensam, cum videlicet membranula quædam infortunio aliquo ariditatem forte contraxit. Veri igitur simillimum censeo, pupillarem membranam in nonnullis fœtibus crassioris, & Iridi firmiter adhærentem, cum ante partum dissolvi nequeat, & evanescere, ibidem restitare; & clausam ab ortu pupillam facere, eoque cæcitatem non fecus inducere, ac surditatem quidquid crassius, magisque adhærens Membrana Tympani ex recens natorum Meatu Auditorio, ut in cæteris, non excidit, quemadmodum in Epistolis Anatomicis (x) non uno loco memoravi. Sunt & alia vitia, eaque etiam intima, quæ comparatis inter se Auditus, & Visus organis possunt illustrari: sed quæ oculo accidunt, tanto facilius possunt accidere, quanto subtilior ipsius structura est. Quæ res si aliunde non pateret, non difficile conjici posset ex varia dumtaxat ratione quæ nervæ Olfactorias, Auditorias, Visorias fibras in suum quasque organum Sapientissimus Conditor induxit. In nares enim perveniencia Ethmoidis ossis foramina, eoque crassiores ipsas immisit; per multo minora in aures, eoque tenuiores; per exilissima tandem, ut recentissimi Profectores ostenderunt, eoque tenuissimas in oculos; ut per quoddam quasi gradus mihi videatur subtilem, subtiliorem, & subtilissimam singulorum horum sensuum Instrumentorum fabricam indicasse. Verum hæc alias fortasse fusius.

Z 3

Nunc

(z) Epist. 33. n. 26. (a) Epist. 1. n. 14. (b) Ibid. cod. n. in fin. & Epist. 12. n. 2. (c) Epist. 1. n. 15.
(d) Epist. 20. n. 9. (e) Epist. 3. n. 6. 7. (f) n. 14. (g) n. 22. (h) n. 3. (i) Epist. 2. n. 24.
(k) Epist. 12. n. 27. (l) Ibid. n. 26. (m) Epist. Anat. 18. n. 22. 38. 49. (n) Epist. 13. n. 8. 9. 19.
(o) Epist. 14. n. 35. (p) Epist. 44. n. 3. (q) Progr. quo Obl. Anat. recent. A. 1754. (r) XVIII. n. 49.
(s) Epist. 13. n. 7. (t) Ibid. n. 10. (u) Epist. 52. n. 30.

(R) n. 4. (I) XVIII. n. 38. (M) n. 5. (N) Epist. 13. n. 11. (O) Epist. 56. n. 21. (P) Epist. 8. n. 3.
(Q) Opusc. Pathol. Obl. 3. (R) Opusc. Anat. XIII. (S) Defect. Anat. Oculi hum. c. 2. s. 3. s. 4.
(T) Commerce Litter. A. 1740. Hebd. 18. 1. (U) Monit. Medic. c. 11. s. 2. (V) n. 2. & 6. & XIII. n. 3.

Nunc ad morbos, ut promissimus earum Partium quæ vocis, & deglutitionis causa sunt conditæ, & potissimum ipsis intervientium nervorum transeamus.

12. De lethali exebrietate Aponia alias (y) ad te scripsimus, nostram quoque, cum dissectione conjunctam, Observationem mittentes. Hic alteram adjiciemus.

13. FAMULUS annos natus circiter sexaginta, statura alta, habitu corporis bono, ebrius, sæpe antea in Nosocomium exceptus, semel ob gonorrhœam Veneream gravem, ex qua laboranti tantum jam virosi humoris effluerat, ut de lumborum debilitate querebatur, at non semel ab ebrietate aponus ille delatus; sed aponia habens simul cum ebrietate discussa, postridie mane sanus abierat. Verum novissime cum ab eadem causa aponus in via jaceret noctu, pro moribundo habitus; & sane humillimus erat pulvis; eodem illatus, etsi vini plurimum, dum interiret, evomuerat; nunquam tamen amplius vocem edidit. Quin die infrequenti, magna febris mane correptus, & præterea facultate orbatus sentiendi movendi reliquæ partes sentire se, ostendebant; sanguine emisso, nonnihil quidem minus male habere visus est; sed vel erodentibus emplastris, quæ appellant vesicatoria, ad crura postremo adhibitis, nihil profusus agentibus, sic aponus, ut illatus fuerat, ad mortem usque perstitit: quæ, nullis unquam accidentibus convulsionibus, die quarta ineunte advenit pridie Idus Martias A. 1756. C. A. D. A. V. E. R. ante diem a morte septimum, improvise gonagra me domi retinente, inspicere non potui, ubi cum me diutius fore, timerem; jussi, caput saltem, & penem cum annexæ vesicæ parte servari. Dum Caput a collo dividerent, idque biduo ab obitu, multum nigri, & densi sanguinis effluerat. Quo minus miratus sum, reterato demum cranio, meningis Tenuis vasa non distenta sanguine a me conspici. In ventriculo Laterali dextero multum aquæ inveni, pleuræque Choroidem pallidum, & qua antrorsum se inflectit, parvis auctum, sed confertissimis, hydatidibus. In sinistro ventriculo aquæ, & hydatidum multo minus. Ab hoc tamen inter utrumque discrimine resolutio illa a sinistris non provenerat. Nam cum præter cerebellum, medullamque Oblongatam, sinistram quoque cerebri hemisphaerium recte se haberet, in dextero cavernulam deprehendi subrotundam, nuculæ juglandis capacem, nigri sanguinis plenam. Ea corporis Striati, & Thalami nervi Optici externum latus non modo contingebat, sed & utriusque partem aliquam occupabat sic tamen, ut intra ventriculum non hiaret. Quibus perceptis, oculos ad imam illam vesicæ partem, ad urethramque annexam converti. Vesicæ tunica crassiores erant, ut in eo qui gonorrhœa tempore ex urina difficultate laboraverat. Per anteriorem vero illam vesicæ faciem tot orificium versus sanguifera tendebant vascula, & sanguine adeo distenta, ut a primo crederes, tot ibi extare hæmorrhoides, cum locum operientes, quot erant quasi aggeries parallelorum vasculorum.

Ab eo orificio cum urethram ad finem usque aperuissem; nullum usquam ulcus; imo nihil usquam ab naturali colore alienum occurrit. Quin etsi ex osculis Prostatae glandulæ materiam expressi quasi putridam, & quæ ex albo ad cinereum colorem vergeret; id tot dierum moræ imputavi; hæc vero, quæ dicam, cætera prægressæ olim gonorrhœæ. In caruncula Seminali Sinus orificium mei laxius, Sinusque ipse quam soleat, longior fuit. A caruncula autem utroque latere lineolæ erant quædam parallelæ, secundum longitudinem ductæ. Sed hæc humillimæ. Non sic vero annulus ex intima urethra substantia, lacerti instar, prominens, ut aliquantum, ferme ad valvulæ parvæ modum, descendenti lotio, aliive humori potuisse obstare videretur. Transibat is annulus super carunculæ non infimum rostrum, huic, ut reliquæ circumcirca superficiei urethra affixus, nusquam solutus. Cum ad Littre glandulam, ad eamque sedem in qua oscula hiant ductuum Cowperi glandularum, nihil internoscere potuissem quod esset præter naturam: rursus in ea parte quæ tribus, aut quatuor transversis digitis supra finem urethra est, albas quasi fibras oblique, sed leviter, extantes animadverti. Teuebant hæc latera. Quæ autem inter hæc erant meorum Canaliculorum orificia satis erat inspicere, ut morbum olim

esse passa, intelligeret; adeo ipsa magis quam cæterorum orificia, contracta erant, & proxima utrinque superficies aliter ac reliqua omnis, se habebat.

Quæ ad graves morbos spectabant, descriptis, non agere feret, ut opinor, si pauca addidero in hujus hominis capite animadvertita, quorum unum ad morbum, sed levem, tria reliqua non ad morbum quidem, sed ad res præter consuetum naturæ modum pertinebant. Primum fuit tumor cysticus, mediocri usque acino haud major, in tempore prominens dextero non ita procul a fronte. Materia plenus erat alba lactis instar, sed lacte aliquanto minus fluida. Cavum tunica eam materiam continens sphaericum, dimidia ex parte ad cutem pertinebat; altera dimidia erat infra cutem. Secundum. Sinus frontis pituitarii nulli erant. Tertium. Sinus ejusdem generis Sphenoidæi erant quidem, nec tamen in dextero, sinistramque divisi, sed in superiorem, & inferiorem, quorum hic major fuit. Quartum denique. Processus Styloides sinistæ digito transversos propemodum quatuor longus, ut vix digitulo distet (servo enim adhuc) ab osse Hyoide, id intervallum vinculo implente illo terete per quod cum eo osse connectitur; nisi forte mavis, superiorem omnem ejusdem vinculi partem multo crassiorem factam esse, in osse conversam, quando vinculo quoque dextero in medio ferme suæ longitudinis accidit, ut ad sesquidigiti tractum crassius, & osseum fieret, idque manifestissime, cum supra, infraque nihil nisi vinculum sit.

14. Sed istud vinculum num; quod Weitbrechtus (z) facere non dubitavit; negandum sit, non est hic disputandi locus. Hoc tantum dicam, optandum fuisse, ut priusquam negaret, si non in ea quæ modo descripsi, at in series saltem incidisset ossiculorum, quales Vesalius (a), & Eustachius (b) ab se visas pinxerunt, & magna ex parte ipse vidi: quæ officula sic facta, & connexa sunt, sicque ab Styloide processu ad os Hyoide recta contendunt, ut tot particulæ fuisse illius vinculi, intelligas, quæ cartilagineæ primum, dein, sicut appendices solent ejusdem ossis, ipsæ quoque in os sint mutatae, & locum viceque retineant vinculi de quo loquimur. Weitbrechtus autem nunquam nisi in granulum osseum videretur incidisse unum vel alterum imatum osse Hyoide (c). Alibi igitur quatenus sit ejus sententiæ indulgendum, videbimus, ubi alia pariter ad os idem attentione examinabimus, ut, quod nonnullis ex Decefforibus etiam nostris excidit, vinculum de quo dictum est, in appendices inferi adjectas extremis cornuum apicibus, item num hæc alia appendices, aut certe quæ perbreve vinculo sæpe innascuntur, apices illos cum superioribus cartilaginibus Thyroidis processibus colligant, ita ab Anatomicis neglectæ fuerint, ut quidam Eruditi alioquin Viri credere videntur, Fabricii nostri ab Aquapendente (d), & Bauhini (e) obliti, aliorumque, etiam recentiorum, ut Verheyenit (f), Winslowii (g), Weitbrechti (h), quorum alii olim vel geminatas pinxerunt, alii descripserunt, alii usum aliquem proposuerunt, fere omnes satis memorarunt. Verum hæc alibi, ut diximus.

Hic præstat cætera quæ in proposita historia legisti, ad morbos proculdubio, nec leves attentione, tantisper considerare. Spectant enim ad res quas fuscæ tractavimus aliis Epistolis, velut ea ultima; ut ab ipsis incipiamus; quæ in urethra conspeximus. Fac igitur conferas cum illis quæ a virulenta gonorrhœa alias (i) vidimus esse relicta. Extantes tunc quoque in urethra lineas, & canaliculorum, nedum contracta, sed oblitterata orificia occurrerunt nobis, leges, unde prægressas exulcerationes conjiceremus, & obices, lotio, ac catheteri se opposentes, & pro carunculis perperam sæpius habiti, quid essent, perspiceremus. De cavernula autem sanguine plena in eo cerebri hemisphaerio quod resolutum erat artui oppositum, proximæque Striato corpori, & Thalamo nervi Optici deprehensa, non opus est indicem, quibus cum ex nostris Observationibus possis comparare, cum id fecerim novissimis ad te Litteris (k). De funesta vero ex ebrietate aponia cum supra (l) indicatum sit ubi scripserim, si historiam illam cum hac contenderis; utrumque hominem intra idem ferme tempus esse mortuum, animadvertes, utrumque sine convulsione, alterum etiam cum febris cito corripisset, ut si hæc ad Hippocratica dogmata, quæ tunc produxi, velis exigere: vel hinc intelligas, quam pauca extent Medicorum dictata quæ sine ulla exceptione possis accipere.

pere. Etiam quæ de febre tradita sunt, apoplexiam cui superveniat, solvete, non sine pluribus exceptionibus vera esse posse, ex iis quæ alias ad te scripsi, perspexeris. Nec sane hic uti licet exceptione illa quæ in extrema Epistola XI. (m) memorata est: cito enim febris advenit. Et de alia quam Epistola II. (n) indicavi, hic fortasse a primo dubitabis, cum in utriusque aponi cerebro fuisse aquam, videris: quanquam in hoc quem corripuit febris, non ferossam fuisse apoplexiam, sed propter cavernulam, ab sanguine excavatam, sanguineam potius credere liceat.

15. Quoniam vero cum de Aponia alias egi, non de funesta dumtaxat, eaque ex ebrietate, verum etiam de alia longe dissimili verba feci, curationem quandam referens meam; nunc quoque placet curationes duas alias in aponis duabus Virginibus tibi, sed perpaucis, significare. Pro utraque & consultus sum, & respondi. Et sanata quidem utraque est Adolescentula, altera fortasse a me, altera certe potius a casu. Cum enim, remediis non proficientibus, rus forte ducta esset vindemia tempore, ibi dum uvam gustaret, accidit, ut aliquid ex ea in laryngem incidens, tussim vehementem moveret, postquam statim loqui potuit; sed non longum ad tempus; nec mirum quippe in ea quæ & alias in diuturno aponia decursu cum libera aliquando ab hac fuisset, rursus in eandem recidisset. Quod pariter & Virgini illi alteri acciderat priusquam Generosissimi ejus Parentes a me pro ipsa consilium peterent. Sed hanc post remedium usum iterum vocem recuperasse certior factus sum; rursus autem amississe, necdum audivi. Quam autem ad tempus sanaverat tussis, qua ratione sanaverit, scire, siue aliquid forte, quod tamen sub sensu non cecidit, discutiendo, siue inertes laryngis musculos incitando, siue aliud aliquod ejusmodi in nervis præstando, id, inquam, scire Medicis haud inutile fortasse esset, ut in pari casu tanto fidentius experiri possent quid tussis, sed moderata, auxilio consequi liceret.

16. Jam vero ad alterum laryngis, aut pharyngis, aut utriusque morbum, Anginam videlicet, transeamus. Ex hac mortuorum dissectiones non extare, cum de ipsa ad te scribens mentionem injeci (o), non sine admiratione questus sum. Neque enim id videbatur accedere potuisse in morbo non solum adeo periculoso, verum etiam non infrequenti, imo aliquando epidemice grassante haud secus ac olim, ut ex Julio Modesto Macrobio (p) retulit, cum sacrificia instituta sunt Angeronæ Deæ, quod populus Romanus morbo, qui angina dicitur, præmissa voto sit liberatus. Propiore autem nobis tempore in pueros potissimum incumbens, magnas, & diuturnas strages edidit. Nec tamen etsi laudabilis cadavera humana dissecandi mos jam vigeat, & Medici aderant in Anatomone non mediocriter versari, ut apud Siculos Jo. Bapt. Cortesius, & apud Neapolitanos M. Aurelius Severinus, qui & ægros inviserunt, & de hoc eorum morbo scripserunt (q); ulla ad hunc pertinentem in illorum scriptis dissectionem invenies. Quin Cortesius ex iis fuit qui Messanensibus Senatoribus, eam requirerentibus, persuaserunt, aut certe recte persuasum esse censuerunt, cadaverum sectionem ad cognoscendum eum morbum esse prius inutilem, quippe cum in partium quæ ad aperto ore cerni possent, & tonillarum præsertim, inflammatione, gangrenæque consistere, existimaret. Severinus quoque satis per signa notum censens, ne verbis quidem (r) insinuvare voluit anximum laborem in delineanda sede affectus, aut vitio ipso. Igitur vix unam tandem ad typographum Francofurtensem misit Observationem, quæ libro, jam formis descripto inferi non potuit, quapropter inter alia, libris quoque antepositis adjicienda, in calce voluminis edita est. Eam habes quidem in Sepulchreto (s), ubi & ipse legeram; verum adeo oscitanter exscriptam, ut inter verba cætera, ad confirmandam Severini hypotheseim ferme spectantia, perpaucæ hæc, quæ una ad titulum de Angina attinebant, sint prætermissa: Pervestigata larynx crassata quadam pituita facie exteriori contestata citra ulceris speciem. Hæc autem ex quo ad te scripseram, unica fuit Observatio quam de inspecta mortui ob anginam larynge potui reperire, non dubitans, quin Severino, si non semel instituire, sed sæpius ejusmodi pervestigationes placuisset; occasio enim minime deerat, cum angina illa tot millia puerorum, ut ipse testatur (t), occideret Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

disset; non, inquam, dubitans, quin & alia in aliis occurrissent. Cum igitur præter eam unam Severini Observationem, alias non invenirem quæ in homine habitæ dicerentur; an ex beltiis saltem, aliquot extarent, quævisi; sed vix in canibus ex angina mortuis reperi hæc esse a Stegmanno (u) conspecta, colla externe intume facta: interna fauces, gutturisque musculos inflammatos. At si crebrius, ut aliorum morborum, sic hujus quoque sedes ab Anatomicis quæsitæ, & proposita esset; num putas, hoc nostro sæculo futurum fuisse qui, nulla producta istiusmodi perquisitione, affereretur, Thyroideam glandulam solam & unicam illam ipsam esse, quæ violentissimo morbo Angine sedem constituat?

17. Ex quo autem ego Observationem habui, postea ad te missam (*), faucium, & laryngis, & Asperæ arteriæ Juvenis quem angina interemerat; alias prodidisse, scio, anno eodem habitas, præsertim in pueris, quos ut olim in Regno Neapolitano, & Siculo diximus, angina violentissima tunc perdebant in Gallia. Non ibi Medici contenti fuerunt aut morbi signis, aut inspectione earum dumtaxat partium quæ, ægrotantium ore adaperto, sub oculis cadunt: neque id frustra, dissectis enim puerorum cadaveribus, quantum labis in arteria Asperæ lateret, manifeste deprehenderunt, quemadmodum ex duabus dissectionibus cognosces, ab Solerte Medico Aureliano Ar. nault ad Regiam Scientiarum Academiam missis, & ab hac editis (x). Sed etiam ex nostratibus aliqui spectatæ diligentia, & fidei Viri non sibi desugerunt, ut ex historia intellexi quæ ab uno eorum descripta ad meas pervenit manus. Summa erat, in viro ab angina occiso inflammatam laryngem, pharyngis vero fornicem cum palato mobili, & tonsillis gangrenæ, & sphaecelo prorsus nigricantem, & corruptum fuisse inventum.

18. Intelligis, hica me, non secus ac Epistola XIV. (y) sermonem hæcenus esse factum de legitima, id est Inflammatoria angina. Despuria autem, quam nunc Aquosam a Claris Medicis vocari video, a quibus alia quoque angina species, & in his Convulsiva, memorantur, si forte quæris, per dissectionem quid ipse viderim; sic habeto. Quod ad spuriam attinet, unum, aut alterum me secuisse, quos Epistola eadem (z) tibi descripsi, cum ea, si ita vis, certe non ex ea mortuos. Ad Convulsivam autem referre non possum quæ ad Paralyticeam, ut quidam vocant, potius accessit in muliere cujus historiam continuo subiiciam.

19. ANICULA, quæ diu jacerat in Nosocomio sic extenuata, ut nihil, nisi ossa, & pellis, esse videretur, accedente demum, aut manifestiore facta febre, cum deglutire non posset, neque os ita aperire, ut introspici satis liceret, credita est ex angina mortua circa finem anni 1755. CAPUT ibidem secantes, amplas quidem Maxillares Internas glandulas, & præsertim dexteram invenimus, ut maxillæ depressioni, quanta ad os valde aperiendum necessaria est, officere fortasse possent, & quadantenus etiam deglutitioni, nec tamen adeo ut omnino prohiberent. Sana autem larynx, sana Asperæ arteria, sanæ fauces cum palato mobili, tonsillis, & lingue radice compertæ sunt: neque illa glandularum Maxillarium amplificatio recens esse videbatur. Thorax medicam pulmonis alterius partem duram habuit; nec sine pure. Tunc etiam Spina animadverta est ab naturali incellu descedens, sed leviter. Quæ tamen inclinatio causa mulieri fortasse fuerat sic caput gerendi, ut de teretibus duobus vinculis per quæ secundæ vertebrae Dens ad oram maximi calvaria foraminis alligatur, dexterum sinistro longius, & crassius invenerim.

20. Et Meadius (a) sane in eo quem Convulsiva angina sustulerat, dissectis faucibus ne minimam quidem tumoris vel inflammationis in earum glandulis, aut musculis notam offenderat: sed crassiore sanguine vasa omnia turgida, & ubique prominentia. Quin & nervorum omnium convulsionem in angina hac memorat, ipsamque strangulationem faucium nominat. Cujus neque sensus, neque cætera quæ modo dicta sunt, cum in proposita Anicula fuerint, fuerint autem quadam alia ex iis quæ Boerhaavius (b) in angina commemorat nervos, & musculos resolutos habente, ut puta quod non modo sine ulla signo tumoris externi, interneve appareat, verum etiam in fine morborum diuturnorum, corpore maxime fucis exhausto, contingat, & fere semper tum sit signum imminenti moris, tum post hanc sup-

(y) Epist. 14. n. 34. & seqq. (z) Syndesmolog. S. 6. §. 15. & seqq. (a) De corp. hum. fabr. l. 3. c. 13. (b) Tab. 47. Fig. 14. (c) S. cit. §. 17. (d) De Larynge Fig. 2. (e) Theatr. Anat. l. 3. c. 44. & Tab. 33. Fig. 1. (f) Anat. corp. hum. tr. 3. c. 11. (g) Expos. Anat. tr. de la Tête n. 433. (h) S. cit. §. 20. (i) Vid. Epist. 42. n. 41. & Epist. 44. n. 9. & Epist. 60. n. 12. (k) Epist. 62. n. 13. (l) n. 11.

(m) n. 24. (n) n. 10. (o) Epist. 14. n. 39. (p) Saturnal. l. 1. c. 10. (q) Miscell. Medic. Dec. 9. Epist. 6. De reced. Abcess. nat. l. 8. five Diatribæ de Pedanch. (r) Part. 1. in fin. (s) l. 1. S. 23. Obs. 4. (t) De efflu. Med. l. 1. P. 2. ubi de Phlebot. c. 16. (u) Epist. N. C. Dec. 3. A. 7. & 6. Obs. 169. (x) Epist. 44. n. 3. (y) Memoir. A. 1748. (z) n. 39. (a) n. 24. & seqq. (b) Monit. Medic. c. 4. (c) Aphor. de cogn. & curand. morb. §. 784. & seqq.

puratum pulmonem demonstrat; idcirco anginam hanc non ad convulsivam affectionem, sed potius ad paralyticam, si ad alterutram referenda est, accessisse, crediderim.

21. Scripseram hæc, cum recens huc Lipsia importatum Actorum Eruditorum Volumen (c) versans, ex libris quibus hic caremus, quibusdam nonnulla cognovi ad unum, atque alterum morborum genus spectantia de quibus hac Epistola actum est, Anginam, & Cæcitatem. Ad illam Historica Dissertatio (d) attinet, gallice scripta, de gangrenosa puerorum angina, eadem, opinor, de qua supra (e) indicatum est; ad Cæcitatem vero Ob-

servatio Cl. Viri Philippi Adolphi Boehmeri (f) in fœmina quæ post diuturnos capitis affectus, correpta visus obscuratone, & tandem jactura, dissecanti exhibuit præter alia, & præsertim feri copiam ex parte fœtidi quod tres priores cerebri ventriculi, quippe cum Pituitaria glandula scirrhusa esset ac ulcerosa, distendebantur, exhibuit, inquam, excrecentiam fungosam, conjunctioni incumbens Opticorum nervorum. Simul plura, quæ alio pertinent, in cadaveribus observata, ibidem reperies; ut tibi pergratum fore, non dubitem, quod indicaverim, Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LXIV.

Ad Thoracis Morbos pertinet.

Quanto longius spatium inter illud tempus quo de Morbis Capitis primas ad te Litteras misi, & annum hunc intercessit, & quanto plures in Capite, quam in Thorace, sunt Partes; tanto pauciores de hujus Morbis Observationes potui instituire; ut facile omnes quem hac una Epistola comprehendere, deinde primo loco quæ in Pulmonibus conspexerim, quæ in Corde, Magnisque ejus Vasis, exponam.

2. MULIER consistente ætate mortua erat in Nofocomio ex pulmonis inflammatione sub finem Januarii A. 1755, cum ego Anatomen in Gymnasio docerem. Quod ut plenius facere pergerem, illata illuc sunt ex ejus etiam cadavere; nam & ex aliis habebam: simul cum iis Partibus quæ tum urinæ tum generationis gratia mulieribus sunt attributæ, Thoracis, qualiacunque erant, ipsius viscera cum diaphragmate. VENTRIS illas Partes cum examinarem; alia quæ a consueta naturæ norma dumtaxat discederent, alia quæ præter naturam omnino essent, deprehendi. Inter prima corpus subrotundum fuit diametro pollicis transversum, rubello colore, sua tunica cinctum, quod etiam in membrana erat adiposa renis sinistri, tamen neque ren Succenturiatus, qui ab eo latere duplex esset, nec ren alter parvulus, nec lymphatica glandula certe erat, sed potius splen alter exiguus, ut bifariam fecti natura ostendit. In ambitu enim, ut sæpe in liene animadverti, erat coccineum, cætera ex rubro fuscum; ut quamvis structura esset paulo magis resistens cultro, quam lien, lienem esse, omnes qui aspicerent, facile agnoscerent. Ren idem sinister longior fuit, quam dexter: nec mirum, cum pelvibus instructum Observe- retur, superiore, & inferiore, prorsus inter se visis non secus, ac ureteres qui singuli ex singulis pelvibus profecti, in consecutam vesicæ fedem influebant orificio (id quod exercitissimo Professori Eustachio (a) videre non contigerat; mihi autem casus ter saltem (b) obtulit) orificio, inquam, singuli proprio, alter parvulo infra alterum intervallo. Ad morbum autem, an ad instant fortasse menstruorum tempus id attineret quod in utero animadverti, dubium fuit. Nam fundi pars superior intus rubebat; sed quamvis sanguifera vascula per intimam membranam transpicerentur; tamen appressis subitis digitis, non, ut sæpenumero alias solet, quidquam sanguinis prodibat. At certe ad morbum referenda erant quæ in trunco arteriæ Magnæ, ejusque Iliacis ramis vidi. Nempe in illo maculæ intuserant albæ, futuri offis inchoamenta; in his autem ramis per internam pariter faciem lineæ extabant parallelæ secundum longitudinem ductæ, quæ, utrumque latus in diversa trahendo, minime poterant obliterari. Thorax quoque, & multo quidem magis, morbofa exhibuit, sed & aliqua tamen quæ sunt magis extra consuetudinem, quam præter naturæ modum. Diaphragma enim non per unum, sed per duo (quæ nuperrime quoque A. 1759, in viro offendi, & publice ostendi) per duo, inquam, inter se proxima foramina ita videlicet, ut alias vel per tria exposui, venosum e ventre ascendente sanguinem transmitteret. Cor vero orificium Coronariæ venæ habebat non membrana valvula instructum, sed tenuibus, crebriusque parallelis filamentis ab summo ad imum descenditibus tam a dextris, quam a sinistris, ita opertum, ut sanguis tamen inter filamentum, & filamentum, magis autem per orificii medium, ubi filamenta pror-

sus deerant, transire posset. Ad morbidam autem constitutionem sanguinis quidem, spectabant quæ ex Magnis cordis vasis ductæ sunt albæ concretiones polyposæ; solidarum autem partium cum ea tubercula, a quibus, ut alias, nec raro, vidi crassiores factum limbum valvularum Mitralium, tum præsertim id quod mortis causam attulit, pars magna alterius pulmonis tumens, dura, gravis, densaque intus, ac firma substantia, quæ colore erat non solum dilute subrubro quasi elixi jecino- ris, qualem in pulmonum inflammationibus sæpius conspexi, verum etiam albescente ex immista, ut facile erat conjicere, purulenta materia, eaque gelu, quod per eos videbat dies, concreta. Per Asperæ autem arteriæ dorsum cellulosa membrana sic erat a coercito humore distenta, ut glandulæ quas in illo olim (c) delineavi, minime, aut vix apparerent.

3. Non unam hanc quæ ad Thoracis inflammationes spectaret, habui dissectionem ex quo tot illas ad te misi Epistola XXI. Alias enim postea accepisti, aliis Litteris (d) descriptas, ultimam præsertim quam cum iis conjunxeris Epistola illa, & XX. propositis, in quibus pleura inflammatione non carebat, quamvis ægotantes sensu pungentis doloris caruissent. Quod etiam qua ratione accidere potuisset, cum illas proposui, conjicere non omisi, tamen cum pleuram ex instituto naturæ sensu defici, quod nemo facile tunc probasset, nunc Viri Experimentissimi doceant; non ægre feram, si ubi controversia ista in eorum tandem fuerit sententiam composita, ipso- rum dogmati conjecturas postponas meas, longe facilius sic explicans tum illas, tum alias earum similes Observa- tiones; in quibus sunt quam Vir Cl. habuit Ignatius Varr (e), & quam idem a Petro Crispo olim habitam indicavit. Certe earum utraque, quacunque ratione expli- care velis, digna est quæ in Sepulchretum referatur.

Cæterum quod ad pectoris, & laterum dolores attinet, alia, nec unius generis, sunt in quarum consideratione haud immerito verseris, illa in primis quæ ex acuto prope sterni sinistram latus dolore, cum peripneumoniz signis juncto, ad inflammationem anterioris partis pulmonis sinistri pertinere videbatur, cum post ægrum tunc inexpectatam mortem Præcl. Licetaudius (f) deprehendit, ad inflammationem, suppurationemque mem- branæ quæ interius pericardium, exterius autem cor amicit, pertinuisse. Sed hæc propter adeo spectabilem morbi sedem a te perlegenda Observatio, at cum aliis ejusdem- modi conferenda, quas ubi quæras, infra (g) indicabo, ad inflammationum tamen genus spectabat. Aliæ autem sunt ad aliud genus attinentes, ut puta quam apud au- ditorem quondam meum, nunc Doctum, & exercita- tissimum Medicum legeris Joannem Larber. Hic enim in Adnotationibus quas suæ Palsinii Editioni (h) interserit, narrat de Juvene quem ab diuturna tussi, spūto sanguinis, & recurrente dextri lateris dolore liberatum vidit, cum frustum extussisset lapideæ materiæ, albi corallii simili. Ibidemque Nobilis Viri qui nigrum Hippocratis morbum diu pertulerat, & marasmo confectus obierat, pulmones memorat flaccidos, in quorum pluribus par- tibus dura corpuscula deprehendit pisorum magnitu- dine, sphaerulæ autem forma. Quæ ut ipse adjicit ad eam Auctoris sui Observationem qua in pulmone mi- litis repertum ab se refert lapidem, columbino ovo non minorem, neque hujus figuræ dissimilem, ita ego hic etiam

etiam commemorare, ut tres hæc illis addas, & cum earum quibusdam conferas quas tibi bene multas col- legi Epistola XV. (i), cum de pulmonum calculis, eorumque effectibus sermonem haberem.

4. Ad ea vero quæ XIX. Epistola (k) nec pauca, & varia protulimus super agitata controversia, an sub- merforum pulmonibus, & ventriculo aqua infit, an non infit, dissectiones attinent quædam, a nobis lectæ non ita pridem. Meckelius enim diligentissimus Anatomicus inter suas Morborum Cordis observationes quincliam de- scribens (l) in milite habitam qui semet in flumen de- jecerat, pulmones, ait, omnino plenos aeris, sanguinis- que fuisse, hujus videlicet intra vasa, quæ in cæteris quoque visceribus, ut in submerfis aliis, fluido tumen- tia sanguine deprehendit. quod si ab aqua tumere ven- triculum, conspexisset; non videtur fuisse prætermisurus. Dissectio altera epileptici est, qui in balneum frigidum cum se immerisisset, mox in eo suffocatus inventus fuit. In nullis autem hujus visceribus quidquam aquæ repertum est a Cl. Welspremo (m), qui cum Aspera arteria per- forata est, aerem in pulmone contentum tum levi quodam sibilo erupisse, audivit: quamobrem non aquam, sed aerem esse, censet, qui repetita antea inspiratione accu- mulatus, & vesiculas pulmonales distendens, sanguinis per pulmones transitum, & quod consequitur, per uni- versum corpus circulationem prohibeat, sique submer- sos, forte & strangulatos, interimat. Et quod ad strangu- lationem quidem spectat, meminisse potes, quid ipse de re- tentione in eorum pulmonibus, & dilatante se aere in illa eadem Epistola (n) sim suspicatus. Attamen, quod ad submer- sos attinet, eorum memor quæ aliter alii, & ego experien- do conspeximus, tanto magis hæreo, quanto attentius alteram lego Observationem (o) quam priori Cl. idem Vir continuo subiecit. Cum enim quandam nautam, in Tamefi fluvio submersum, nec nisi post quadraginta ho- ras cum dimidio inventum, & extractum, in vitam cujus nulla supererant signa, revocare conaretur, non illico Asperam arteriam, sed hora integra jam in usum cætero- rum auxiliorum insumpsa, tum denique perforavit, nec ullum sibilum, aut aliud erumpentis aeris indicium, quod ajat, animadvertit; imo per illud foramen fistula immissa aerem iteratis vicibus impulit, ut sic inflatis pulmonum vesiculis, aliisque adhibitis (quæ omnia haud inutiliter leges) auxiliis hærentem sanguinem promove- ret, quod tandem est felicissime consecutus. Nec vero intra ejus curationis tempus, quod horas excessit duas, donec videlicet mortuus, ut a primo videbatur, navis in vivam revocatus est, quidquam ex ejus ore ejectum di- citur; ut hanc non possumus cum Observationibus nostris, aliorumve conciliare, Halleri in primis Solertissimi Vi- ri, cujus non tam in muliere quæ pluvialis horis, quam in se, & canibus, brevissimum ad tempus submersis, habitas dissectiones satis fuerit hic verbo indicasse tum quia tibi in mea illa Epistola (p) commemoratas, tum quia nuperrime ab ipso iterum propositas (q) videre potes, simulque cognoscere, ut viscidam illam spumam quæ ex aqua cum aere agitata in submerforum pulmo- nibus oritur, in iisque reperitur, diserte adhuc (r) ajat, nulla nobis nota arte inde posse depelli, & ejici, ubi do- nec subsistat, necessarium sanguinis transitum a dextero cordis ventriculo ad sinistram impediat. Quod tanto magis nunc dicit postquam ne in violentiore quidem ele- ctrozatione satis esse auxilii expertus est. Ipse quoque tamen fatetur, summæ esse difficultatis suas cum opposi- tis tot submerforum quos Ars excitavit, Observationi- bus ita conciliare, ut conciliatoris, nedum cæterorum, animus acquiescat, cujusmodi aliquas in suis novissime editis Physiologiæ Humani Corporis Elementis (s) in- ter argumenta pro re quam ibi tractat, ultro producit.

Inter experimenta autem quæ ad eam attinent con- troversiam, cum alia addiderit ad alteram spectantia, vi- delicet ex natantibus in aqua fœtus pulmonibus recte ar- guatur, vivum esse editum, an secus; hæc etiam velim, & quæ ex his deducit, attendas. Invenies enim quod is ad- jicias quæ de cauto istius Medico-Legalisi Experimenti usu adscripsi Epistolæ eadem XIX. (t) five cum fœtum cujus cadaver invaserit putredo, spectavi, five cum ip- sum inter exeundum e maternis locis aerem inspirantem, ibique mortuum, five demum cui per os aer immisus fuerit, animadvertens enim de tot fœtuum inflatis pulmo- nibus vix uno in agno exprimi aerem potuisse, ut am-

plius non natarent. Cætera, & siquæ alia ad pul- mones attinent, in præsentia omittimus. Jam enim ad alia de quibus plura scribenda sunt, id est ad Cordis, Ma- gnorumque ejus Vasorum affectiones transeamus, oportet, a Pulvis initium ducentes, & a rarissimis quidem il- lis quos cum in Sene a me perceptos indicarem (u); fieri posse, dixi, ut plenam ejus aliquando historiam, id quod nunc facio, ad te mitterem.

5. MERCATOR erat Patavii annos natus quatuor & sexaginta, quadrata statura, & obeso, non tamen nimium, corporis habitu. Is olim rheumatis, & nervorum contractionibus cum esset obnoxius, Medicis auxiliis sa- natus fuerat, ut quamvis pluribus, variisque negotiis af- fidue distineretur, valeret tamen ad eam usque ætatem quæ modo indicata est, cum improvise ea acciderent, unde vehementissimis animi affectibus terrore, timore, ira- que deinde, & mœstitia corriperebatur. Paucis post hæc diebus, quadam ingruente quasi vertigine, cecidit. Po- stridie autem motibus convulsivis cum insultu, epile- ptici simili, vexari cepit. Is erat brevis, sed frequens, & ructibus fœtidis erumpentibus solvebatur, subsequen- te faciei interdum rubore, interdum pallore, sensu autem angustia faucium, & ventriculi perpetuo gravis. Erant pulsus eo tempore validi quidem, sed duri, & rari: alvus autem, & vesica perpauca reddebant. Medicis jam inde a principio repetitis sanguinis detractionibus frustra usis, visus est morbus a ventriculo pendere, præ- fertim cum æger adventare insultus ex sensu fumi quasi cujusdam, ab hypochondriis ascendentes, præstiret. Igitur præter blandiora adversus epilepsiam remedia, lenibus ecoproticis ventriculum per intervalla repurgare, intestina autem quotidie clysterum ope studue- runt. Si quid vero morbi favitiem mitigavit, oleum fuit ex dulcibus amygdalis recens expressum, quo iden- tidem utebantur. Verum cum æger nunquam fortasse melius quam die ab initio morbi vigesimo septimo ha- buisse videretur, insultus, qui nonnullis ante diebus ab- fuerant, eo ipso die vehementes adeo redierunt, ut præ- ter cætera quæ dicta sunt, exinde æger cibum quem- cunque averfari coepit, sumptum vomitu subinde re- jicere, & singultu vexari, & fetente halitu esse, & quamvis nulla unquam esset respirationis difficultas, spu- ta sæpe cruenta, & putrida reddere. Huc accesserant su- dores algentibus extremis corporis partibus, & identi- dem vaniloquia. Per hæc modo graviora, modo mi- tiora ad diem morbi ventum est trigessimum quar- tum: eoque die postquam cruenta, grumosa, & pu- trida, trium ferme unciarum pondere, sunt dejecta, mirum in modum sedata sunt omnia, nec pulsus dumtaxat, raritate, & duritie deposita, ad naturalem statum mox redierunt; sed omnino pristina sanitas est restituta. Hæc menses perstitit circiter quatuor, donec post brevem ambulationem, & scalarum ascensum, prio- res illi convulsivi insultus, rariores tamen, & brevio- res, invadere iterum coeperunt, & pulsuum raritatem reducere. Mensis tum erat December. A quo tempore usque ad Junii initium cum morbus vinci non posset, tunc ego consulendi causa accersitus, & ea quæ tibi hæcenus descripsi, audivi, & ægrum qualem ex me- morata Epistola cognoscere potes, inveni. Raritas præ- cipue pulsuum illa tanta, ut eorum numerus duabus circiter tertius partibus minor esset quam oportere, tum inculcabatur, tum a me quoque reperiebatur. Ea au- tem perpetua a pluribus jam mensibus raritas, quoties- cumque insultus imminuebant, vel multo major percipie- batur; ut ex hoc ejus incremento nunquam fallerentur Medici, si instantem prædicere insultum: quo durante, pulsus non modo ex raro frequens, sed ita frequens fie- bat, ut in ægris frequentem vocamus. Hæc cum acce- pissim, & cætera omnia perpendifsem; respondi, im- plicitum mihi videri morbum, & qui propterea non omni ex parte sine erroris periculo dignosci posset. Hinc temere nihil audendum, sed iis quæ levaminis ali- quid asserre hæcenus consueverant, innoxius remediis utendum. Attamen cum & vetus ille morbus, & præ- sentis causa, initium, & symptomata pleraque nervos affici, aut certe in consensum trahi, significarent; ad convulsiva horum irritamenta saltem mitiganda ten- tari posse opii paucillulum, & si forte hic aliquid præ- staret, ut in meo illo Cive (x), non ita abfinitibus affectionibus laborante, multum præstiterat, cautum ejus,

(c) A. 1758. (d) Vid. M. Jul. (e) n. 18. (f) Vid. M. Januar.

(g) De Renib. c. 10. (h) Vid. Epist. 7. n. 17. & Epist. 34. n. 33. (i) Adv. l. Tab. 3. Fig. 1.

(j) Epist. 36. n. 23. & Epist. 75. n. 14. (k) apud P. Toletti (lul) Inscib. &c. Lett. 4. n. 24.

(m) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1754. l. Mem. (n) A. 1754. (o) Anat. Chirurg. Tom. 3. p. 61. c. 9.

(i) n. 19. & seqq.

(k) n. 40. & seqq. (l) Sect. 1. Vid. Hist. de l'Acad. R. des Sc. de Berlin. A. 1755.

(m) Obs. Med. 8. c. 2. (n) n. 38. (o) l. ubi n. 9. (p) n. 45.

(q) Mem. sur plusieurs phénom. de la respir. S. 4. (r) ut antea Opusc. Pathol. Obs. 62.

(s) Tom. 1. l. 4. S. 5. c. 11. (t) n. 45. & seqq.

(u) Epist. 24. n. 33. (x) Epist. 9. n. 6. 7.

ejus, & opportunum usum non deferendum. Et sane Cl. Jacobus Placentinus, quocum eam consultationem habueram, mihi postea retulit, id non sine ægri utilitate ab se fuisse tentatum. Sed morbus tamen ea æstimate perstitit. Sub cuius finem aucta respirationis difficultate cum tussi, & sputis plumbeo colore tinctis, infultus quoque crebriores, longiores, gravioreque sunt facti, & mens, quæ inter illos cum memoria vigeat, iis præsentibus abesse videbatur. Pulsus tamen validos, sed raros adhuc fuisse, scivi ab iis qui inviserant die ante mortem vigesimo. Quæ penultimo tandem accidit Septembris die anno eodem 1747. quo die tres, quatuorve insultus præcesserant. Ut liberum semper ægro fuerat, sive supinus vellet, sive in alterutrum latus cubare; sic in latus cubans sinistram, suffocati instar mortuus est, exerta lingua, & vasis faciei ad hujus usque nigredinem tumidis. A primo initio morbi ad finem usque, id est quindecim ipsis mensibus, nulla unquam se prodidit febris, nullus unquam fuit capitis dolor.

CADAVERIS dissectioni, ut rogatus fueram, postridie præfui. Thoracis cavum dexterum aquæ, locum referentis, libras plures; sinistram autem minus habuit. Pulmones usque ad pleuram adhærentes, nusquam duri, colore hic illic per anteriorem superficiem cinereo, incisi nihil usquam vitii ostenderunt, nisi quod inter disseccandum lobum superiorem sinistram, pluribus in locis ex se factis, opinor, bronchiis materiam albam fluidam puriformem potius, quam purulentam exire, animadversum est. Asperam quoque arteriam cum aliquo ex majoribus bronchiis secundum longitudinem aperiendo, vitii quidquam non potuit conspici, præter colorem ex rubro fuscum per interiorem illius arteriæ faciem. Intra pericardium aquæ ejusmodi, qualem in thorace fuisse, dixi, mediocri copia. Cor vero amplum valde ob dilatatos ventriculos, non ob parietes factos crassiores, amplificata tamen columna, quod in dextero præsertim ventriculo adnotavi. Auriculæ pariter, & valvulæ omnes amplificate, sana tamen: & majora quoque erant arteriarum Coronariarum orificia. Magna etiam arteria ad curvaturæ usque initium æquo latior. In facie ejus inferiore paulo supra valvulas animadversit paucas quasdam protuberantias, ibique substantiam arteriæ crassiorē, duriorē, magisque albam. Earum quoque aliquam vidi qua eadem arteria secundum vertebra thoracis descendebat; illuc enim usque aperiri, jussit. Pulmonaris autem arteria, & pars ima venarum ejusdem nominis, & Cava utraque prope cor, intus, extraque secundum naturam fuerunt. Nigri, fluidique sanguinis sine ulla vel levissima concretionē polyposa cum in venis Cavis, tum præsertim in auricula dextera, & ventriculo utroque multum vidi. Ventre ad aperto, turgida aere intestina occurrerunt. Tenuibus omentum, quod ad ventriculum retractum erat, operientibus. Jecur durissimum, & ad cæruleum colorem vergens. Lien paulo major, quam secundum naturam. Ventriculus quoque amplius, ejusque interior facies ex rubro fusca, & hic illic subnigra, credidi ab sanguine novissime restitantes; nam & Tenuia intestina exterius subrubra. Quæ, & Colon cum omnia contrectata, & versata etiam huc illuc essent; nihil morbidum potuit animadversum. Pariter neque in pancreate, neque in mesenterio durities, aut vitium aliud fuit. Illud denique non est omittendum, cum primum manu dimota sunt intestina, aquæ copiam non omnino paucam sub illis apparuisse. Cranium autem fecare nec locus, nec hora permiserunt.

6. De plena hac, ut promisi, atque adeo proluxa historia, omittis consulo quæ morbi effectus evidentes fuerunt, & quæ longiorem historiam sermonem requirent, ad ea dumtaxat redibo quæ statim a cadaveris dissectione Præclarissimo Placentino, & Solertissimo Professori Publico Mediaviæ, & aliis qui aderant, dixi, fuisse quidem universi cordis, & Magnæ arteriæ dilatationem a nobis conspectam, quæ certe antequam affectus illi vehementissimi animum hominis percellerent, nulla fuerat; optime enim valebat: itaque a maxime perturbato spirituum per nervos motu, eosque præsertim qui cor eamque arteriam adeunt, videri ejus dilatationis initium repetendum, ab iisdemque irritatis subinde nervis, ventriculo quoque subservientibus, tum sensum illum quasi sumi inde ascendit, tum convulsivos insultus qui eum sensum consequerantur, a certo autem quodam, necdum tamen aucto, confirmatoque spiritu, & nervorum vi-

tio primam illam non ita magnam pulsuum tarditatem facile deducendam. Quæsi omnia symptomata a cruenta illa dejectione primum quidem sedata sunt, non difficile ab iis causam quadantenus conjectum iri qui ab hæmorrhoidibus hanc repetant, & venæ Portarum radices cunctas, præsertim quæ a ventriculo in illius venæ truncum demum confluant, non ignorent. Nec tamen propterea negandum, eam quam diximus, cordis, & Magnæ arteriæ dilatationem, præsertim postquam adacta fuerat, quidquam ad pulsuum raritatem contulisse, quippe cum utrumque sic minus aptum esset ad se statim ac oporteret contrahendum, nervis præsertim ob dilatationem ipsam distractis. Sed neque ad ejusmodi causas aut solum, aut præcipue, pulsuum tantam raritatem esse referendam, vel hinc intelligere proclive fore, quod in tot aliis quorum cordis, & arteriæ Aortæ aneurysmata, multo etiam istis majora, deprehendimus, ejusmodi pulsus non fuere; ut nisi aliud aliquod accedat, eos non inde fieri satis constet. Hoc autem quod debet accedere, nisi certum quoddam spirituum & nervorum vitium sit, perdifficile est, conjicere. Hæc ferme dixisse tunc meminimus, & nunc placet altera quæ ad pulsus attineat, mea Observatione quo ad interea possum, confirmare.

7. **RUSTICUS** jam propemodum octogenarius, in Nosocomium admissus ob Tertianam febrem Intermittem, postquam sanatus fuit, ibidem propter paupertatem tandiu perstitit, donec mense octavo diarrhoea semel, iterum, ac tertium correptus, levi demum febre accedente, sensim est mortuus. Mense hoc ultimo urinæ fuerunt crassæ, sedimento quasi lacteo, inodoro. Respirationis vitium nullum, ut neque pulsuum, nisi quod cum antea molles, & sicut ætas, morbusque ferebant, humiles, & parvi fuissent, tribus extremis vitæ diebus imminuti erant adeo, ut minime perciperentur. **CADAVERE** in Gymnasium illato, ubi Anatomen tradebam: adventabat enim Januarii finis A. 1754. hæc in Ventre animadversit. Intra imum intestinum Rectum hæmorrhoidalia tuebant vasa. In testina reliqua, ut ventriculus quoque, & pancreas, & lien, sana. In mesaræ quidem glandula erant aliquot pro illa ætate non exiguæ, nec tamen morbidæ. Sanum quoque jecur, quamvis in se contractum, & parvum, vesicula autem valde a bile distenta. Renes, si exteriorē faciem aspiceres, non optime constituti. Vesica autem optime. Interea scrotum, de quo nunquam tam longo tempore questus in Nosocomio Senex fuerat, animadversum est utrinque morbo non vacare. A dextris enim intra Vaginalem tunicam, quæ non magis erat madida, quam secundum naturam, calculos deprehendimus duos, undique solutos, alterum majusculum, alterum minus, utrumque durum. Sinistra autem Vaginalis, crassior facta, nullum calculum, sed aquam continebat multam, colore lixivium referentem. Crassior quoque erat ea pars vasis semen Deferentis, quæ intra aquam erat, ut etiam Albuginea, quæ convolvebat Epididymidem, majori hic tractu ad testiculum arcte se annectentem, quam solet. Nec prope illius superiorem globum corpusculum deerat subrotundum, ex Albuginea existans, quale in hoc hydroceles genere invenire nos solitos esse, aliis ad te Litteris (y) scripsimus.

Thorax pulmones habuit sanos: cordis autem superficiem ferme totam multam, duraque pinguedine operatam. Venæ Pulmonaris Sinus ea fuit amplitudine, ut omnes tantam dilatationem mirarentur, carneis fibris per internam ejus faciem existantibus. In valvulis Magnæ arteriæ omnibus Arantii corpusculum in modicam quidem, sed inæqualem, & ex parte osseam excrescentiam mutatum vidimus, in facie autem anteriore ejusdem arteriæ toto eo tractu quo ab arcus sine, ad diaphragma usque descendebat, osseas passim bracteas, quamvis non magnas, & tenuiores: inde vero ad divisionem usque in Iliacas, & in Iliacis ipsis alba dumtaxat illarum bractearum inchoamenta, sed confertissima, & internam illam faciem inæqualem reddentia. Caput, quippe aliis deinceps usque cadaveribus, non attigimus.

8. Igitur, ut cætera, & vel istas valvularum Magnæ arteriæ excrescentias prætermittamus; satis vides, ne a tanta quidem Sinus venæ Pulmonaris dilatatione peculiare ullum in pulsibus vitium fuisse, cum tamen sinister cordis ventriculus, & quod consequitur, ex hoc profecta arteria Magna non ita ut pars est, justam, & æqualem semper copiam sanguinis ex adeo amplificato Sinu potuisset accipere videantur, sicuti nec Sinus ipse ex pul-

pulmonibus admittere, quippe ob dilatationem haud amplius satis aptus ad se ita contrahendum, ut alterne tantum sanguinis ex se ejiceret, quantum præcise ad naturam normam requirebatur, ne locus videlicet deesset novo & pulmonibus adventuro. Sed neque in respiratione vitium erat ullum: quod tamen esse confusisse, alias (z) agnovimus. Licet igitur hinc intelligere, ne consuetas quidem noxas semper, & necessario succedere vasorum Magnorum dilatationibus, nedum infrequentissimam illam pulsuum raritatem, cujus occasione hanc tibi historiam esse mittendam, putavi.

9. Cum de inæqualitate, & intermissione pulsuum ad te scriberem (a), & an vitia ejusmodi a polypis, ut complures fecerant, repeti possent, disquirerem; meminimus, ut puto, me tantum dubitationibus Viri Cl. Andreae Pasta tribuisse, ut donec Vir alter experiens, docuisset existeret qui perspicue, & solide cunctas illas nobis eximeret dubitationes, me quidem tandiu cum Pasta an polypus ante mortem, diu præsertim, formarentur, dubitaturum, nec tamen illas eximere ita facile esse, dixerim. Quod dixisse tanto minus me poenitet postquam in duos incidi Scriptores, quorum neutri esse notam Pasta illam Epistolam, nisi citarent, credidissim. At certe perlegisse attente, non puto. Uterque enim quædam objicit, quæ ab eo fuerunt satis superque dissoluta. Alter insuper una, quam proponit, Observatione, cunctis Pasta rationibus satis esse factum, putat, quasi vero perdifficile esset eam, non posito diu ante mortem polypo, explicare. At saltem is polypus ex paucis illis fuisset, quos ego quoque excipiendo esse, existimavi. Sed neque ad genus illorum spectat, neque ad eos accedit qui difficiles habent explicatus. Quos habuisset fortasse ille de quo litteras adhuc fero, A. 1707. postridie Nonas Junii ad me datas ab egregio, dum viveret, Bononiensi Professore, Amicoque optimo Joanne Antonio Stancario. Scribat is, fuisse sibi eo die ab nostro Laurentio Bonazollo ostensum muliebri venæ Cava segmentum suis cum Emulgentibus, quæ venæ erant omnes multum dilatata, tunicis instructæ magna ex parte cartilagineis, ex aliqua etiam ossis, plenæ autem substantia dura, & polyposa ita ut prorsus obturata viderentur: quamquam attentius inspicendo, sinus aliquis in ea substantia animadvertebatur, per quem sanguis poterat, quamvis difficulter, transire. Ad eundemque modum eadem polyposa duraque substantia venas quoque Iliacas, & Pudendas, & vel capillares per Abdominis musculos fuisse plenas, sibi esse a Bonazollo asseveratum. Qui cum ventrem ejus feminæ properanter, nullamque aliam ob causam aperuisset, nisi ut quæ ad generationis Partes ad requisitam ab se ostensionem, ut sit, præparandas extraheret, vix præter plenas illas capillares venulas, aliquid feri inter musculos effusi, & quasi saniosi animadverterat, in cavo autem ventris minimam aquæ copiam. Serius vero, jam quæ humato cadavere, præparationem inchoando, ea quæ de Cava, aliisque illis venis sunt dicta, perspexisset, ut ægre ruerit, se neque thoracem, neque caput refrasse, & quemadmodum se ibi venæ haberent, & reliqua, perquisivisse. Sed ut de mortua nihil aliud sciri potuit, sic de vivente nihil compertum esse, nisi in S. Maria de Morte Nosocomio, ubi decesserat, pro hydropica fuisse habitam, cum tota esset tumida, colore autem ubique livido, quali est cutis ubi plures ipsi venæ sanguine turgida subjiciuntur: summa cum difficultate respirasse, pulsusque humiles semper habuisse, & parum digitis explorantis Medici resistentes. Hanc tibi historiam, quippe mancā, non ut explicarem, descripsi; sed tum quia ex parte ad illam accedit Præstantissimi Halleri, quam alias (b) conatus sum explicare, tum quia ex rarissimis certe, nec una de causa, est.

Sed ab iis quæ de Polypis Epistola XXIV. scripsi, ad ea quæ de vehementibus arteriarum omnium pulsationibus in extrema eadem Epistola (c) attigi, transeamus.

10. Eas cum a meri abusu, tum præsertim ab nervorum irritatione provenire, tunc non conieci modo, sed & Mercatoris cujusdam exemplo me tibi vel magis esse alibi confirmaturum, promisi. Is qui me, etiam post id tempus, nec semel consuluit, a patre genitus fuerat, usque adeo hypochondriaca, vel potius melancholica mœstitia affecto, ut molestiarum finem per devoratum opium quaesiverit, & quamvis paulo post devorasse poenituerit, frustra tamen vomitu ejicere conatus,

illius vi interemptus sit. Qui casus animum filii, tunc adolescentuli, non mediocriter perculit. Accessit deinde Bacchi, & Veneris abusus nimius. Quem exceperunt convulsivæ tussis, & stuporis sensus in manibus, simul ita affectis, ut quæ vellent, stringere, atque attollere nequiret. Post hæc demum vehementes cordis, & arteriarum omnium pulsationes inceperunt; ut dubium non esset, quin & hæc ab nervis efficerentur, præsertim quoniam invitus caput, & cervicis sæpe inflectere, aut movere humeros cogebatur, & posteaquam, multis exactis mensibus, arteriæ minus vehementer micabant, ea crebrius, magisque cogebatur facere; & musculorum palpitationibus, quas egomet in suis vidi, & molestissimis contractionibus ad artus, ad ventrem, & ad cor ipsum factus erat obnoxius, a quibus vel cum somnum primum caperet, expergefactus, dormire amplius non poterat. Cor autem, etsi arteriæ, ut dixi, non amplius ita vibrabant, non modo vibrabat ipsum, sed & ejus vibrationes oculus, nedum admodum manus, percipiebat, præsertim in spatio intercostali, modico sub mamilla sinistra intervallo, ubi ad tractum duorum, aut trium transversorum digitorum se attollebat ad vibrationes singulas quidquid inter duas illas costas erat, quod si tunc manu tangeres, vesicæ instar cujusdam, cedebat. Quid mali homini postea acciderit, nescio. Quid morbus tunc minaretur, vel potius jam effecisset, certe autem unde primam originem habuisset, intelligis.

11. Nunc quando verba fieri de Aneurysmatibus cepta sunt, quas eorum Observationes, post tot alias ad te scriptas, habuimus, huc addere non omitemus. Altera ad Cordis, & Majorum Arteriarum, altera ad Aortæ dumtaxat aneurysma attinet. Quorum illud tamen non subito; hoc autem subito occidit.

12. **VIR** quidam menses jam duos in Nosocomio decubuerat propter incommoda plura, in thorace omnia. Nam præter fistulam, quæ ad hujus cavum non perveniebat, cordis palpitatione, & æquo majori pulsatione laborabat. Hæc duæ ante annum inceperant, non jugiter quidem, sed tamen sæpe vexantes adeo, ut nudato pectore, oculis omnium apparerent. Pulsus in carpis certe non erant vibrati. Expectabatur autem tanta puriformis materiæ copia, ut si quis a purulenta non internosceret, is fistulam in cavum thoracis pervadere posset suspicari. **MORTUI** denique pulmones dissecuit Medicus, ac Professor Spectatissimus Mediaviæ noster, & sanos deprehendit. Non ita cor; quod propterea cum vasorum Magnorum proxima parte in Gymnasium ad me curavit afferendum, cum ibi Anatomen haberem A. 1757. extremis Januarii diebus. Vidi igitur utrumque cordis ventriculum dilatatum, non imminuta tamen parietum crassitudine. Arteriæ quoque Pulmonaris truncus justo erat latior; Aortæ autem latissimus ad curvaturam usque incipientem; reliquum enim deerat. Interior ejus partis facies tota fuit alba, prædura, inæqualis.

13. **MENDICI** Viri easdem Partes, in Gymnasium per dies eosdem (sed biennio ante) allatas, inspexeram. Is quibus affectus antea fuisset incommodis scire pro certo non potui, nisi duo levia ulcera in crure altero, quæ etiam tum erant, gessisse, & diebus proximis creberrima tussi, noctu præsertim, vexatum fuisse, qua concussione internam, ut videbis, hæmorrhagiam esse acceleratam, existimo. Hunc syncopæ, ut aiebant, de improvviso correptum, & pro moribundo habitum, mox ad se reversum, sed omnium quæ tunc acciderent, prorsus nescium, in Nosocomium intulerunt, pulsus quidem turgido, sed prementibus Medici digitis non resistente. Is erat Hieronymus Trivisanus, meus olim Auditor assiduus, Vir Nobilis, & Doctus, qui hæc, & quæ sequuntur; adfuerat enim; diligenter narravit. Cum ex ægro quaesivisset, quid, & ubi tunc ipsi molestum esset; dolor quidam, respondit, hoc loco, imamque hypochondrii alterius partem designabat. Vix Trivisanus ad proximis invisendos ægros processerat, cum repente ille insultu altero prehensus est, qui certe syncopæ vera non fuit; nam quamvis pulsus essent nulli, facies tamen potius rubebat, & cum spiritus, quem vocant, salis armoniaci naribus subiceretur, æger se nonnihil agitabat. Itaque intra horæ dimidium ex quo novus hic ceperat insultus, vivendi finem fecit, alvi recrementis, unde ille videtur fuisse ad imum hypochondrium dolor, in lectulum prius effusus. **CAVAVER** cum laudatus Mediaviæ dissecaret, pericardium offendit sanguine plenum,

(y) XXI. n. 19. & XLIII. n. 16. & seqq.

(z) Epist. 24. n. 36. (a) Ibid. n. 30. (b) Ibid. (c) n. 35. & seqq.

num, Aortam autem arteriam, quanta quanta in thorace erat, dilatata. Hanc igitur, & annexum cor a me voluit inspicere. Et cor quidem, intus, extraque spectatum, iusta erat magnitudine, & constitutione. Sed arteria jam inde ubi a corde incipiebat, ad septum usque Transversum aequalior, quanto magis descendebat, tanto dilatata erat minus, nisi quod in medio ferme descensu magis latebat propterea quia ab uno latere in cavæ sphaeræ segmentum protuberabat, cujus cavæ orificium, intra Aortam hians, diametro erat bini digiti transversus. Similis huius, sed major, lateralis protuberantia inter cor, & primum ramum occurrebat qui ex Aortæ curvatura nascebatur; ut si homo diutius vixisset, appareret, ad dilatatum arteriæ truncum duo præterea sacciformia aneurysmata fuisse accessura, quorum non parva in duabus illis protuberantiis extabant initia. Iusto erant etiam latiores arteriæ tres ex curvatura illa profectæ, nec secus ac totus arteriæ truncus, albis ostium inchoamentis facie interiore passim distinctæ, non magnis tamen, nec crassis, neque introrsum prominentibus, neque intimam tunicam, ut sæpe fit, cum ostium fuit nacta duritiem, exulcerantibus, quod ne ibi quidem fecerant, ubi jam ad istam duritiem perducta deprehendi, in perpaucis videlicet trunculis. Attamen intervallo ferme sesquidigiti supra valvulas Semilunares transversam tenuem fissuram vidi, quæ longitudine femunciam Bononiensem æquasset. Et fissuræ in exteriori arteriæ facie respondebat, sed paulo inferius, foramen cuius diameter vix par fuisset duabus lineis uncia illius, idque oris cruentis, & femilaceris; ut palam esset, per fissuram sanguinem inter tunicas subisse, & hanc exitum demum perrupta, in pericardium exiisse.

14. Similes huius historias habes a nobis ad te scriptas Epistola præfata XXVI. (d), ad quas non pauca adnotavimus, interque illa, quædam huc attinentia, quæ repetere non est opus. Quod si forte alias potius legere cupis aneurysmatum Observationes; non ita dissimile nostrarum in Programmæ (e) invenies quod Waltherus, illustris olim Professor, Lipsiæ edidit A. 1738; complures autem, & varias apud Solertem Pistoriensem Medicum Antonium Matanum (f) five in corde habitas velis, quod immani vidit amplitudine, idque ex ingluvie perpetua (g), in alio autem magnitudine plurius duplo majori (h); five in toto arterioso genere, ut in Sene (i) cuius per corpus unum, innumera dispersa erant aneurysmata; five in Magna arteria, ut in Juvene (k) cui ex inveterata lue Venerea thoracis, & ventris caveam aneurysma occupabat, aut in Viro (l) cuius aneurysma, œsophago adhærens, per hunc viam aperuerat sanguini, quo ventriculus repletus erat. Utinam singulas voluisset, aut potuisset perscrutare historias, additis iis quæ præcesserant, peculiaribus aneurysmatum istorum indicibus, aut iis saltem quæ postrema omnium ante mortem apparuerant, ut in eo (m) fecit, cui paulo ante obitum intumescens abdomen ascitum mentiebatur, cum tumor non ab aqua, sed ab sanguine esset qui ex eroso circa Emulgentes arterias ejusdem Aortæ trunco in ventrem defluerat, itemque in eo (n) quem perrupta arteria Pulmonaris intra additum, opinor, bronchium, & per hoc in fauces immanem vim sanguinis effundendo, interemerat. Sed hoc nimirum illud est, de quo nos ipsi, nedum ceteri Medici Anatomici, subinde querimus, non semper posse eorum quæ morbum sint comitata, aut mortem prægressa, notitiam haberi cum propter alias nonnunquam causas, tum haud ita raro ob hanc quod corpora quæ plerumque diffecamus, ut hominum sunt infimæ fortis, sic multo sæpius quam vellemus, contingit, ut propter summam aut inopiam, aut incitiam, eorum morbi non fuerint aut observati, aut intellecti. Hæc ipsa Meckelii Cl. Viri (o) querela est, primæ de Sectionibus duabus præfixa, in quas divisit accuratas alioquin, & non vulgares suas Morborum Cordis Observationes, spatio plurium annorum collectas. Eas nihilominus attente perlege. Dignæ enim, siquæ aliæ, sunt, & huc, & ad Sepulchrum maxime pertinentes; nec omnes signis carent suis; quin aliquæ morbi historias habent diligentissime expressam. Huc adde interjectas, sane congruas, explicationes, utilesque animadversiones ad propositorum vitiorum naturam, & sedem internoscendam; ut puta nequando agrorum angoribus, & respirandi difficultate abrepti, pulmones temere incu-

femus; sed, omnibus bene perpensis, ubi eos incolumes dignoscamus, cordi, ut par est, morbum imputemus; nisi forte (sicut alibi (p) vere pariter admonuit) symptomatum illorum causa in ventre sit, quæ res sæpius quam creditur, minime animadversa, facit, ut curatio thoraci adhibita, noceat potius, quam faveat. Illas igitur Observationes cum leges live pericardii, & cordis inflammationum, huiusque, vel potius pinguedinis qua infestatur, suppurationum; five pericardii, & cordis cohesionum vel per steatomatosam, hoc insuper comprimentem, materiam, vel, ut sæpius, per telas quasi quasdam, & fibras, hasque ad mucronem potissimum alligatas; five valvularum ad cor attinentium autquam vocitant, ossificationis, aut intumescens, ut orificiorum viam ex parte impediunt, aut contra lacerationis, & propemodum destructionis, five unius, aut alterius cavearum cordis amplificationis; five arteriarum ab eo descenditum dilatationis, aut constrictionis; five internæ in ipsa Magna arteria scabietici, & ulcerculorum, & ossificationis; five demum non alterutrius, sed utriusque, id est tum cordis, tum Aortæ dilatationis; ejusmodi igitur Observationes cum leges, si forte quarundam in mentem venerit, a me olim ad te scriptarum, quæ ad harum aliquas propius accedant, non illibenter collaturum te, scio. Quæ causa etiam fuit, ut has tibi indicarem, simulque est, ut Descriptionem quoque indicem Aneurysmatis arteriæ ejusdem Magnæ, & cordis insuper, quam alter ex Incluta illa Regia Academia Egregius Vir dedit Roloffius (q). Poteris enim cum ea conferre descriptionem quam ad te misi Epistola XXVI. (r) viri quem idem Aortæ morbus, iisdem ex parte ossibus absumptis, & sanguine itidem extrorsum effuso interemerat, & cur tamen non illico, ut meus, perierit iste alter, cognoscere. Quod vero in ea Dissertatione quam de Trombelli casu verba faciens eadem Epistola (s) memoravi, sperabam te aliquid non prorsus dissimile Verlicchii Observationis reperiturum; ea spe excidi, cum Dissertationem illam tandem nactus, non de steatomatibus quæ in Magnæ arteriæ tunicis increviscent, agi, cognovi, sed de concretibus in bis dilatato huius cavo hærentibus, nec ullum cum arteriæ pariete intimum commercium habentibus, ut eas pro polyposis quæ in aneurysmatibus paulatim per strata creviscent, posse accipere, intellexerim. De duabus autem, quas tibi pollicitus sum (t), rupti cordis Observationibus, mihi a spectato, dum viveret, Medico, & vetere Amico Laurentio Mariano significatis, primam de qua scripserat A. 1750. præmittere nunc licet, quando postea ipso qui illam habuerat, Galeatio proponente (u) perlegeris, fuisse ut ab eo qui ægrum curaverat, & hoc potissimum agebat, perscriptam. Alteram vero, quemadmodum ex Mariani litteris accepi, A. 1755. XIV. Kal. Martias ad me datis, continuo describam tanto libentius, quia sic augebitur numerus earum Observationum, in quas; si ea quæ præcesserunt, & quæ deprehensa sunt, perpendamus cum sanguis intra pericardium effusus conspicius est; cadere dubium non possit, an is ante mortem vi morbi exierit, an postea prosectorum dumtaxat incuria, minime videlicet animadvertentium, se dum pericardium aperirent, scapello simul quæ pericardio includuntur, vulnerasse; neque enim defuit qui vel in plerisque, si Superis placet, harum Observationum sic accidere potuisse, suspicentur.

15. MEDICUS annos natus duodeviginti, valde, siquis alius, hypochondriacus, lurido colore, anno quem paulo ante dixi, ineunte, dolore gravi correptus est qui e ventre ad thoracem ascendebat, non sine convulsivis quibusdam motibus, anxique respiratione. Et hæc quidem per repetitam sanguinis missionem leviora sunt facta. Sed postmodum cum omnia ad priorem modum rediissent, hominem intra tempus brevissimum confecerunt. VENTER nihil vitii ostendit præter quam in hepate, & Ileo intestino, quorum hoc ad tractum aliquem erat sublividum, illud vero magnitudine multo quam par esset, majori. Thorax autem effusus intra pericardium habebat sanguinem, qui illuc per tria foramina ex sinistro cordis ventriculo exierat. Is ventriculus adeo erat dilatatus, ut cavum triplo majus quam secundum naturam, comprehenderet.

16. Hunc ego Medicum credo, ut ad Marianum rescripti, nisi ita esset hypochondriacæ affectioni obnoxius, non

non ex eo morbo, aut ferius fuisse moriturum, tum quia non ita crebris, validisque pressus fuisse hypochondriacis internis convulsionibus, a quibus finitri cordis ventriculi aneurysma, & demum perforationes repeti, sanguine videlicet sæpius cohibito intra eum ventriculum, irritatum propterea ad se fortius contrahendum, illumque expellendum, tum etiam quia mature occurrisset initio, & progressui aneurysmatis sui, nisi ejus indicia ad hypochondriacam affectionem, ut fit, retulisset. Scilicet hoc maximum ex illa affectione sæpenumero est detrimentum, ut ob pleraque signa quæ ei sunt, & organicis vitii communia, Medici cum in aliis, tum præsertim in se ipsis ita ut opus esset, curandis diutius hæsitant, & de morbis duobus eum esse quem mallent, nimirum leviores, facilius credunt.

Cæterum etsi cum hanc tibi tum Observationem pollicitus, multo rariora exempla esse, crederem, disrupti ventriculi cordis dexteri, quam finitri; rariora quidem esse, adhuc credo, sed non tanto rariora. Cum enim in Dissertatione quadam (x) Cl. Christiani Väteri aliud forte quaererem, incidi in militis dissectionem, haud ab similem ejus quam ex Bohnio produxeram (y), in æstu venere mortui, nisi quod vehemens quoque in diuturna chorea saltatio præcesserat, & quod ruptio in ventriculo dextero inventa est. Sed præter hoc, duo alia ab aliis causis rupti ejusdem ventriculi exempla indicari nuper vidi ab Illustri Hallero (z). Apud quem occurrunt tibi complures Auctorum allegationes, quorum ego aliorum li libros habere, aliorum li Observationes ad intimos thoracis morbos spectantes, a me quandam lætas, retinere omnes memoria potuissim: non eas tibi inter cæteras quas protuli, facile eram omisurus, sed nonnullas certe producturas quæ magis ad propositum meum facerent, magisque spectandæ esse viderentur. Ibi (a) igitur velim quæras, & felix quas adjungas iis quæ mihi, dum scriberem ad te Epistolam, succurrerunt, ubi cavearum cordis, adjectorumque huc valvularum dilatationes, harumque aut causas, in primisque valvularum vitia, aut esset, ut præternaturales respirationes, & pulsus, syncopem, internasque hæmorrhagias considerarem. Id si facias; quæ ad Sepulchrum addas, non pauca habebis.

17. Antequam de improvisis mortibus a Magnæ arteriæ, aut a cordis aneurysmatibus, horumque rutione scribendi finem faciam; illud fortasse ex me quaeres, an inter Veteres quoque accidisse illas ab iisdem causis, putem. Plures sane tunc etiam mortuos repente esse, negari non potest, quod aliis ad te Litteris (b) meministi ostendisse, & nunc confirmare, si opus esset, vel ex Cicerone ipso possem, cuius hæc nempe sunt verba (c): *At repentina morte perit. Quod si esset ita factum, tamen ea res propter multorum ejusmodi mortem, satis firmam venient suspicionem non haberet.* Igitur inter improvisas multorum mortes cur ejus quoque generis de quo dicebamus, tunc contigisse, non putemus? Num forte quod is temporibus ab illis animus, corpusque abstinerent, a quibus homines his nostris non abstinent? At ex eorum historiis, librisque constet, vel longe minus abstinuisset. Et quamvis ex iisdem minime constet, se lue Venerea infecisse, quæ postquam ab America tandem in alias regiones allata fuit, una ex tot causis ipsa quoque est vitiorum cordis, & arteriarum, illiusmodi; tamen cum cæteris horum causis vel magis quam nostri homines, abuterentur, cur pravis earum effectibus non ad eundem modum obnoxii essent, haud video. Tanto autem id minus video cum earum ad hos morbos dispositionum venit in mentem, quas a primordiis usque extare, cum Lancisio me alias (d) agnovisse, meminervis. Iis enim dispositionibus quæ Veterum corpora omnino caruisse, contendat. Itaque eos a me probari fa-

cile intelligis, qui illud quod tu, quaerentibus, ad eundem fere modum respondendum esse, consuerunt.

18. Jamque hanc eam Epistolam obsignaturus, cum occasio data est Observationem habendi quæ ad Litteras attineret in quibus de pulsuum vitio, & de aucta magnitudine cordis, ut in his ipsis, actum esset. Illam igitur huc adscribam.

19. VIR annos natus ad sexaginta, adventante die VI. Kal. Februar. anno hoc 1759. in Nosocomio decesserat inter difficilis respirationis angustias. Ibi nunquam, nisi de his, quaestus erat, nec levaminis quidquam, nisi a venæ sectione retulerat, idque exiguum, & breve. Decimo ante obitum die pulsus vix illius percipi poterat, multo autem minus cunctis qui insecti sunt, diebus, cum homo tamen ad extremum usque mente vigeret, libens alimentum sumpsit, in lectulo se movere valeret, quin, si ultimum excipias diem, semper quotiescunque major solito respirationis angustia cogeret, impetu quodam se ad sedendum continuo erigere. Facies erat ex rubro violacea. Nihil quod morbosum esset, expectorabat, nisi quod biduo ante mortem sanguinea aliquot sputa apparuerunt. Quæ vero ad initia morbi, causæque attinerent, cum homo esset alienigena, quaerenti mihi post mortem scire non licuit. Bibacem tamen fuisse, suspicabatur. VENTREM, & Thoracem Mediavia noster cum aperuisset in Nosocomio; in altero aquam, sed multo plus in primo fuisse, retulit, ventriculorum præterquam: in Thorace autem pulmonem dexterum arcte ad pleuram adhæsisse. Quem cum sinistro, & cæteris quæ intra Thoracem sunt, ex iis autem quæ sunt in Ventre, Magna vasa, & quidquid fere ad urinarias, & genitales partes attinet, ad me, ut petieram, afferenda curavit, in Gymnasio Anatomico docentem. Igitur inspicimus diligenter: neque in pulmonibus morbo quidquam vidimus. Pericardium erat dilatatum, & sicuti fluctuatio indicabat, humorem continebat, qui aqua non multa fuit, eaque flava: quo colore ut serum fuisse, dixerunt, emissi e vivente sanguinis, ita mox interiore dissecti cordis, & arteriarum faciem ubique infectam animadvertimus. Cor magnum, ejus omnibus caveis, una excepta sinistra auricula, amplificatis, non tamen extenuata parietum crassitudine; imo aucta passim æque ac longitudine in omnibus cordis partibus, & præcipue in columnis. Amplificata manifestius in longitudinem, & latitudinem auricula dextera, ipsa quoque interiores lacertos crassiores, & extantiores ostendebat. Sanguis in ea multus, ut in utroque etiam ventriculo, isque nigerrimus, & semiconcretus, nihil tamen polyposi habens. Valvularum utriusque arteriæ aggeres magis extabant; sed quamquam prope unam Semilunarium ossi quidpiam erat, nihil ejusmodi in ulla valvula usquam fuit. In aliqua ex valvulis quæ venæ Cavæ orificio subjiciuntur, itemque in minori Mitrali quandam alieubi duritiem cartilagineam animadvertimus. Non dilatata inventa est arteria Pulmonaris, non Magna. In hac autem ad Illiacas usque dissecta, & deterfa, etiam albedines illæ quibusdam locis non deerant, indicia futuri ossis; re tamen vera ossi nihil fuit, si unum excipias locum, eumque procul a corde, & parvum. Quod reliquum est, urinaria vesica, quam simul cum iis de quibus dictum est, Partibus ante septuagesimam a morte horam inspexi, ex sublivido virere jam coeperat; sed exterius solum; interius enim secundum naturam se habebat, ut ex eo quoque cognosces quod cum exponere hic paucis non possum; opportuniore & tempore, & loco (e) non omitam.

20. Intelligis, cum hanc historiam adjicerem, publicis fuisse me occupationibus distentum. Quamobrem non miraberis, quod super ea nihil addiderim. Vale.

(d) n. 13. & seq. (e) De Aneur. (f) De Aneurysm. Præcordior. Morbis. (g) S. 7. (h) not. ad S. o. (i) S. 27. (k) S. 50. (l) S. 62. (m) Ibid. (n) S. 63. (o) Hist. de l'Acad. R. des Sc. de Berlin A. 1755. & A. 1756. (p) Hist. A. 1757. (q) Hist. A. 1757. (r) n. 9. (s) n. 40. (t) Epist. 27. n. 10. (u) Vid. Comment. de Bonon. Sc. Inst. Tom. 4. in Opusculis.

(x) De Mort. subit. non vulg. caus. thes. 8. (y) Epist. 27. n. 1. (z) Elem. Physiol. corp. hum. Tom. 1. l. 4. S. 4. S. 13. (a) Ibid. S. 10. 14. 16. 18. & S. 3. S. 17. & l. 2. S. 2. S. 9. (b) Epist. 26. n. 1. (c) Orat. pro A. Cluentio. (d) Epist. 27. n. 6. (e) Vid. Epist. 66. n. 10.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LXV.

Ad plerisque attinet Ventris Morbos.

Quod in Thoracis Morbis feci, idem si in Ventris Morbis facere non potero, ut quas a me horum Observationes expectas, omnes his unis complectar Litteris; at certe operam dabo, ut quam paucioribus potero, comprehendam. Neque enim illa multae sunt, & pleraque breves. Sed ut raras novissimis annis occasiones habui mortuos ex Ventris affectionibus dissectandi; ita saepe in ea incidi quae alii interea, aut antea ejusmodi corpora fecantes, deprehenderunt. Quare ut Sepulchreto possis addere, subinde illa, quemadmodum in missis ad te Epistolis feceram, ipsarum fere servato ordine, indicabo.

2. Et primum, quod ad hanc attinet Deglutitionem, legas velim, qualem angustiam in imo oesophago ab intumescensibus hujus tunicis, necne indicis praegressa ibidem excrecentiae, animadvertit Abr. Vaterus (a), tum, nisi antea videris, quae ex pluribus Observationibus relata sunt apud Amplif. Swietenium (b) de gula, eodem, aut superiore etiam loco perangusta; quod tunicae essent in scirrhomam, & vomicae refertam, aut in cartilagineam scirrhomam, sive quod ejus cavum glandulosum obturaret tumor, sive quod ingens steatomatoditum, aut scirrhomam pulmonis pars comprimeret, ac coarctaret. De ruminantibus hominibus adea quae cursum attigi Epistola XXIX. (c) nihil est quod addam, nisi corniculum quod paulo supra frontem Parens ille gesserat, minime videri ad filii ruminationem pertinuisse; quando Sachsius (d) cum tot exempla protulerit cornutorum, hominum, non modo ullum horum, aut filiorum, praeter illum unum, ruminasse, adnotavit; sed denique admonuit, plerisque Aethiopes, ex verrucarum genere haec cornua esse, pronuntiasse; quas inter, & ruminationem, sive origo, sive natura spectetur, quis aliquid dicat esse commune? Ex verrucarum autem genere illud certe erit cornu quod nuperrime ipse in Sene vidi ex Agro Patavino. In illud enim verrucam quam diu in laeva lincipitis parte gesserat, ante annos quatuor degenerasse, aiebat, & sensim ad eam qua tunc erat, digitorum transversorum amplius quatuor longitudinem excrevisse. Nisi basim versus reprimeres; homo non dolebat: nec inijum; cutis enim quadam quasi phlogosi affecta circum basim ita se attollebat, cum eaque cohaerebat, ut ex cute cornu fieri, intelligeres juxta Malpighii (e) sententiam: & quid aliud denique sunt verrucae, nisi productae, morboque cutis papillae? Basim pollicem aequabat, unde, conici iustarum antrosum curvati, sensim exilescentes, in apicem abibat. Totum cornea erat duritie, superficie autem friata secundum longitudinem, facile id quoque ab intervallis inter papillas in longum pergentes, relicti. Singulae id fuit, quod ut stolo ex humo sua proxima arbori se attollit, & pullulat, ita ex cute proxima lateri majoris cornu, alterum jam crescere corniculum coeperat, illius simile, nisi quod ut subtriplo adhuc erat longitudine, & crassitudine, sic necdum se inflexerat. Sed de hoc satis.

De Ventriculi autem Doloribus praeter ea quae infra (f), cum cysticorum calculorum per angustos bilarios ductus egressum commemorabimus, a nobis facile indicabuntur, plures extant Observationes a Christiano Wenckero productae cum Historia Virginis per 27. annos ventriculam perforatam habentis (g): quae omnes, aut fere omnes ventriculi ulcera proponunt. In istis fere Vomitus creber memoratur, in una (h) nigricantis etiam materiae: de qua mentio quoque fit a Gothofr. Sandio in *raro ventriculi Abscessu* (i) describendo. Ceterum vomitionem frequentem Jo. Kämpfius (k) conjunctam profert cum omnium ventriculi vasorum ab nigro, & sphacelofo sanguine incredibili distentione, itemque cum illius angustia, & tunicarum crassitudine, & in cartilagineam propemodum naturam mutatione: Langguthus (l) autem ab istis tunicis immanem in modo crassis, scirrhomisque, ut pylorum undique adtingerent, & angustissimum redderent, qualis in memorata quoque fuit Wenckeri Virgine. Et harum quidem Observationum pleraque cum iis conveniunt quae jam pridem a me tibi descriptae sunt. Postremo quoque in super ad memoriam reducant Feltriensem Virum pro quo, Januario mense A. 1754. consultus fuera.

Cujus dissectionem idem postea mecum communicavit Cl. Pujatus, qui tunc per litteras ejus morbum exposuerat.

3. VIR annos natus quatuor & quadraginta, cum a patria abesset in montosis, & incultis locis, multa adversus levissimam gonorrhoeam virulentam ex argento vivo remedia sumpsit, qualia habere potuit, perperam fortasse & preparata, & servata. Quibus dum uteretur, ventriculus non modo irritabatur, verum etiam vomere cogebatur. Ab eo tempore quaecunque comederet, aut biberet, coepit fere omnia rejicere: ni rejiceret, ventriculi angore, quo semper propemodum, sed leviter, afficiebatur, multo magis torqueri, & singultu quoque, at postquam rejecerat, si nova fumeret alimenta, haec saepius retinere. Multam, eamque crassam, & pravi saporis, expuebat salivam. Pigra alvus, lacte injecto nihil, nisi duos recrementorum globulos, reddebat. Et quamvis pulsus necdum quidquam haberet quod ab naturae modo recederet; macies tamen non erat levis. Plura, & varia adversus hunc morbum in usum tracta sunt auxilia: sed in cassum omnia; ut denique homini moriendum fuisset. VENTRICULUS pylorum angustum habuit, & praedurum, & prope hunc ulcusculum; in reliqua autem interiore facie, multas quasi glandulas passim disiectas.

4. Nunc age, quae ad Intestinelum Morbos spectant, attingamus, & primum quae ad eos in quibus saepe etiam ventriculus affici solet. Cl. Anatomicus Phil. Conn. Fabricius (m) in Dyentericis subinde vidit praeter Crassa, Tenuia quoque intestina, & ventriculorum inflammationem. Sic in uno Crassa quidem magis corrupta, & pure sanguinolento obducta conspexit, Tenuibus tamen omnibus simul sphacelo affectis, & ventriculo ipso inflammato: quamvis in altero dyenteriae sedem in Colodumtaxat, Rectoque intestino deprehenderit. Henricus autem Henrici (n) in femina quam Cholera morbus vehementissimus per 35. horas summe infirmaverat, tenuem, flaccidumque ventriculorum reperit, hujusque supernam partem macula quadam affectam obscure rubicunda, fugillationem referente, cui similes erant hic illic in Colo intestino, sed minores. Quae Observatio facit, ne hoc loco omittamus nostram alterius feminae, quam alvi fluxus sustulerat, dissectionem, ante extremum Januarium habitam A. 1753.

5. ANUS ab diuturna diarrhoea ad summam denique macritudinem, virumque infirmitatem, mortemque ipsam redacta cadaver in Gymnasium illatum est. Ubi ejus dumtaxat ventrem perlustravimus, cum mox virile aliud, idque ad Anatomem persequendam longe magis idoneum, nacti essemus. ABDOMEN adeo emaciatum, ut sub cute non Adiposam, quod in mulieribus vel macilentis est rarum, sed inanem, telae instar, membranam haberet, vix alicubi exiguas reliquias pinguedinis retinentem, cum resecratum est, nec male oluit, nec aliquid ostendit adnotatione statim dignum, nisi quod cystis infra jecur, neque ita paulo, descendens, bilis quae non pauca, & obscurior inerat, colore suo proxima intestina multo latius quam plerumque solet, infecerat. Sed nec ullum Tenue intestinum, nec ventriculus, qui erat contractus, vitii quidquam habuerunt. Crassorum dumtaxat partes aliquae, ut quae in Colo, & vero Caeco proximae sunt valvulae Bauhini, ex inflammatione intus rubebant. Rectum vero ferme totum ab inflammatione jam livebat, & hic illic, ac praesertim in imo, introrsum tumebat, unde macula, quasi circuli forma, ad digiti pollicis latitudinem fursum se extendebat, mollicula, & promiens, ut si a sanguine fieret, ibi sub intima tunica semiconcreto. Superius autem exstabant disiectae, & ex rubro vel magis fuscae aut verae lenticulares glandulae, aut quaedam earum instar. Ceterum in mesenterio glandula nonnullae, quamvis sanae viderentur, majores tamen erant quam illi aetati conveniret. Hoc autem in ea frequentius, quod Magnae arteriae truncus hic illic erat subdurus, & interiore facie albidus ob plura ossium inchoamenta. Sed illud peculiare, quod si eandem faciem inspiceres, tunicae lateris arteriae finitimum, & posteriorem par-

partem facientes, ad angulum inter se jungi, non curvae instar lineae, videbantur.

6. Quae de Recto intestino scribebam modo, ad memoriam reducant membranam illam ex Mercatoris Hebraei (o) podice propendentem, nec sine sanguine, & pravo ichore, & praegressis intestini ejusdem molestissimis doloribus excussam ita ut postea sanus ipse vixit ab A. 1729. ad initium A. 1748. Nunc addo, ad annum usque vixisse 1758. quo longe alio, id est thoracis, morbo absumptum audivi.

Cur vero nihil praeterea ad Viri, & Anus propositas Observationes adnotem, facile intelligis, qui repetitiones quantum oderim, scias, & quae de morbis hujus generis ad te alias scripserim (p), satis, ut opinor, memoria teneas. Quod de plerisque etiam aliis dictum puta, qui infra memorabuntur. Praecipue de Ani rum Imperforatione, tum Prolapsu nihil habeo quod addam, nisi quod de illa nuper legi Cl. Phil. Adolphi Boehmeri (q) in recens editi infantis cadavere Observationem, cui propter podicem imperforatum acciderat, ut ex Coli intestini parte, sphacelo correpta, & rupta tantum meconii effunderetur, ut tumidum valde, ac durum esset abdomen: legique item in Regiae Parisiensis Scientiarum Academiae Historia (r) dissectionem triennis pueri, qui per urethram in quam Rectum intestinum desinebat, hujus recrementa semper emiserat, causamque ostensam cur haec demum retenta fuerant: De Ani autem Prolapsu id quod mihi illustris Hallerus per litteras anno datas 1758. V. Kal. Februarii significavit, hic tibi fideliter describam. Mirificum nuper vidi spectaculum, inquit, vix creditur alteri, prolapsum nempe crassissimis intestini, in quo ipsam coli valvulam facillime dignoscendam, & patentem videres. Ruberrima erat villosa tunica, nitroque conspersa humorem sudabat, ceterum immota. Vetus morbus est: frustra repositum intestinum, cum chirurgus ventriculum per colon palpasset. Solet subinde elabi.

7. Ad Intestinelum autem Dolorem, atque adeo ad Iliacam Passionem attinet Cl. Kalfschmidtii Programmata (s), quod te legisse non poenitebit. Nam praeterquamquod totum intestinelum tractum inflammatum invenit, ibique magis ubi prope Bauhini valvulam erat ileum dilaceratum, hoc alvi recrementis non eo tantum loco, sed ad ulnae longitudinem prorsus obstructum vidit, tam duris, ut argenti vivi libra una, aegro data, per ea sibi viam facere non potuerit, aliaque insuper adnotavit, & in his causam famis praeter naturam quae saepius homo vexatus fuerat, pylorum videlicet duplo quam solet, ampliorem. Nos qui de Iliacae Passione plura alias ad te misimus, nunc de intestinelorum doloribus unam dumtaxat Observationem addemus, quam in Gymnasio pariter, eodem anni tempore ac priorem, sed anno insequente 1754. habuimus.

8. ANICULA sex & octoginta annos nata, quae coquolim fuerat, quidem jam menses omnimodum pertulerat artuum inferiorem paralyticum, quorum mensium tres ultimos in Nosocomio exegit, cum ibi tandem acuta febri, & dolore sub regione hypochondriorum non sine magna siti, & genarum rubore correpta, his omnibus perstantibus, intra dies septem vivere desisset. ABDOMEN exterius aspectum, nihil vitii, nisi parvum ad alterum inguen tumorem ostendit: quem pro hernia habui; nec deceptus sum; intestini enim particulam continere mox vidi: quin etiam pro doloris causa habuissim, si unquam mulier, praesertim cum ille saeviret, de eo loco quae esset. Cum vero abdomen incidere, ejus virere musculos, & cum resecratum esset, intestina, & mesenterium ex viridi & rubro variegata, conspexi, nec sine gravissimo fetore, ut quamvis tertio, haud amplius, a morte die, eoque anni tempore, continuo humandum cadaver fuerit, vix nonnullis, quae protinus dicam, in genitalibus, & jecinore adnotatis. Vagina disiecta intus habebat maculas ex rubro obsolete flaventes. Testis vix supererant humillima reliquia. Quorum hoc aetati, illud inflammationi, ex proximo intestino contractae, & jam in gangrenam degenerare incipienti, erat tribuendum: ut peculiaris morbi inchoamento parum inaequalis ex rubro nigricans protuberantia, quae ex fundi uterini supremo interiore latere exstabat, & dissecando visa ex parte est paucis compingi vesiculis, pellucido humore plenis. In jecinore autem, cujus cystis valde erat bile

distenta, erant peculiaris, quaedam a primordiis, alia a prima fortasse juventute, alia a morbo repetenda. A primordiis quidem figura infimi limbi insolita, ut inter dexterum, sinistrumque lobum alte in arcum modum curvatus, hinc illum, hinc vero hunc lobum haberet ad parem prope tractum, quod sinistrali alioqui non solet, descendentes, a prima autem juventute, si quid dandum est suspitioni, alias (t) ad te scriptae, profundi paralleli sulci per convexam ejus visceris faciem a Summo deorsum versus ducti: certe autem a morbo hydatides duae in eadem facie, altera a dextris, altera a sinistris jecinoris tunica ambae operatae, intus autem membrana cinctae, quae rugis, vel potius quibusdam quasi infistis inaequalis, in illa non modicum, & valde profundum cavum, in hac exiguum comprehendebat. Ex hisce hydatidibus, & magis ex rara ista jecinoris figura hanc, illam fuisse Verulam, intelligis, ex qua tibi haec utraque cum alias (u) obiter indicaverim, hic plenius volui, & dilucidius describere.

9. Jam vero ad eas quae de Hypochondriorum Dolore, & Tumore, ad te scribens, Observationes produxi, has addas velim, quarum aliae ad jecur, aliae ad lienem, aliqua etiam ad ventriculorum spectant; de jecinore autem illam potissimum qua (x) ejus proponitur vomica in pectoris dextram cavitatem aperta. Utinam Solertissimus Richertzius, ut quae in mortuo invenit, diligenter descripsit, pariter quae mortem praecesserant, indicare potuisset. Nam certe meminere, cum rarissimam, & fortasse primam ejusdemmodi casus Observationem Valsalvae ad rescriberem (y), etiam non pauca quae in aegrafuerant, non omisit, me tamen plura desiderasse. Quod tanto magis facio in hac altera, quanto diutius videtur ex pulmonis dexteri, & pleurae ejusdem lateris inspectione ab ejusmodi singularis generis empyemate aegrum fuisse vexatum, ex magnitudine autem jecinoris, & purulentae in hoc caveae gravissimas ibi quoque molestias pertulisse. Ibi, inquam; Lutetiae enim Parisiorum accidit, ut cum aegrotus quidam (z) de summo dolore in dextro hypochondrio conquestus esset, pernegante Chirurgo contra ac Medicis ita tuebatur, dolorem illum esse hepatis adscribendum; in cadavere tandem hepar inflammatum deprehenderetur. Quod si forte ob aliquod adjunctum per intervalla delirium, contigui diaphragmatis inflammationi, quam tamen neque Chirurgus, neque Cl. Auditor fuisset tacituri; malles ipse in illa doloris causam suspicari; alias prius consideres Observationes oportet. & in his quaedam ad susceptum sermonem attinentes. Neque enim dubito, quin molestias gravibus in hypochondrio eodem illa quoque mulier conflictata sit, in qua ingens, nec inflammatum tamen jecur ibidem (a) videre potes descriptum, cujus utinam in vivente symptomata indicari potuissent. At certe scio, in Disputatione Cel. Rudolphi Jac. Camerarii, & Jonae Brunneri exhibente Hepatide desumtorum Extispicia (b) adolescentuli, itemque mulieris casum produci, quorum ut huic maxima erat de hypochondria dextera querela, illi autem dolor fere intolerabilis ibidem fuerat; sic jecur utriusque praegrande erat, & a calculosa materia durum, mulieri insuper a triplici auctum atheromate. Num ergo in his pariter dolorem omnem tribues adjacentibus partibus, quas tumor, & pondus hepatis comprimeret, ac distraheret? Quod si tanto facilius a te fieri posse, credideris, quia calculosa materia indurando jecur, hujus qualemque sensum hebetasset; non ultra ad laborabor tibi; nam quocunque tandem modo explices, semper quas hic tibi addidi, Observationes ad Dolores, Tumoresque dexteri hypochondrii, ut sum pollicitus, spectabant, quemadmodum ad hypochondrium sinistrum pertinebant illa quae protinus sequuntur.

10. Magnus certe, praesertim ut in novenni puero, lienis tumor fuit, quem descripsit Cl. Kalfschmidtus (c), quo in tumore, si manibus tentaretur, dolorem puer percipiebat; nisi forte tribuere hunc velis subjecti renis sinistri amplo pelvi, quem inclusus asper calculus, tunc appressus, compungeret. Aliquando autem e contrario non in lienis tumore occurrit dolor, sed in lateris sinistri ima parte ad dorsum vergente, ut in viro qui cum praeterea pluribus aliis symptomatibus, phthisim mentientibus, fuisset conflictatus, nihil denique in pulmonibus quod vitiosum esset, post mortem ostendit, sed lienem grandiolem, durissimum, & valde gravem, quippe ex densa compactum substantia quam

(a) Disp. de Deglut. Diffic. & imp. Nist. 3. (b) Comment. in Boerh. Aph. §. 797.
(c) n. 4. (d) in Schol. ad Obf. 30. A. 1. Eph. N. C. (e) Differt. Epistol. de Corn. Veget. (f) n. 12. & seq.
(g) Argentor. A. 1743. (h) Obf. 1. (i) Regiomont. A. 1701. (j) De Infart. valor. ventric. cas. 5. & 9.
(k) Progr. de Tab. ex callosa pylori angustia. Wittenberg. A. 1750. (l) Progr. quo Obf. Anat. & Helm. A. 1754. M. Oct. pag. 19. &
(m) Disp. de Cholera morbo c. 1. §. 20. (n) Comment. in Boerh. Aph. §. 797.
(o) Epist. 31. n. 19. (p) Epist. cad. (q) Vid. Act. Erud. Lips. A. 1758. M. Januar.
(r) Observ. Viscer. Abdom. Labus Epist. Obf. 2. (s) Epist. 36. n. 4. & seq.
(t) Vid. Bulewald. Obf. Quadriga. Obf. 2. Aetiol. §. 9. (u) Obf. 2. cit. (v) c. 1.
(x) Progr. de hoc Tumore.

(y) De Ileo a serupul. pitor. meipil. perior. Jenae A. 1747. M. Oct.
(z) Observ. Viscer. Abdom. Labus Epist. Obf. 2. (s) Epist. 36. n. 4. & seq.
(t) Vid. Bulewald. Obf. Quadriga. Obf. 2. Aetiol. §. 9. (u) Obf. 2. cit. (v) c. 1.
(x) Progr. de hoc Tumore.

Abt. Vaterus (d) cum dissecto petasone porcino, fumo leviter indurato comparavit. Decipit etiam lienistumor, cum valde se extendit, aut cum ea continet quæ rarissime solet. Cujusmodi constitutionis in uno eodemque homine exemplum Regiæ Scientiarum Parisiensis Academiæ præbuit Historia (e). Is enim ascitis correptus signis, in quibus manifestissima erat humoris in ventre fluctuatio, paracentesim bis expertus, & pro aqua ducto pure, a secunda hujus educatione postmodum mortuus, lienem tanta habuit magnitudine, ut ab sua fede ad pubis ossa perveniens, viscera a fronte, & ab lateribus operiret, atque comprimeret, quippe tantumdem propemodum continens puris, quantum e vivente extractum fuerat; plurimum autem fuerat extractum. Pus quidem, non modo aquam, in liene inventum nonnunquam fuisse, alias (f) tibi commemoravimus; sed immani adeo copia repetitum esse, non meminimus. In tanta non magis visceris extensione, & fluctuantis humoris sensu quis lienem potissimum culpasset? Doloris sedes, nisi forte inter initia, non id poterat significare. Colicem enim vehementes, qui denique ingruerant, dolores, cum ab intestinorum compressione facile essent, non ad illam unam ventris partem attinerere poterant. Suspicio ex hoc dumtaxat aliqua poterat oriri, quod febri quartanæ, duodeviginti, aut amplius, menses duranti, succederet morbus.

In admirando quoque illo casu quem legeris apud Præstantissimum Fantonum (g), quis in abscessu, ad umbilicum aperto, latere splenem, dixisset? Vix levissima conjectura duci poterat ab atrocissimis doloribus de quibus maxime infra sinistram hypochondrium quæstia ægra fuerat. Splen tamen ad umbilicum proclerat, unde & tunc extraxit fuit, & postquam fuerat anno quinduo muliere mortua, quæ interea conceperat, & pepererat, ne quis dubitaret, extractum esse, nullus in cadavere est usquam repertus; cicatrices tantum in proximis partibus apparuerunt, quibus ille naturaliter adherere solet.

11. Quoniam autem in sinistro hypochondrio aliud præter lienem est viscus, hujus quoque tumens singulari historiam mox indicabo; si prius de liene osco, aut lapideo factis, de hoc enim alias (h) ad te recordaberis me scripsisse, illud adjecero quod in Sene, propter cranii obliquam formam Epistola LXII. (i) commemorato, animadverti. Splenicæ membranæ pars, quantum circulus diametri gemini transversus digiti operire potuisset, ossa facta esse videbatur, eique arctius visceris substantia adhaerebat. Partem hanc membranæ cum detraxissem, & dies aliquot in aqua macerasset, adherentemque lienis substantiam abrasissem; nihil superesse aliud in membrana, vidi, quam tenuem & hic illic deficientem ex manifesta materia tartarea incrustationem. Itaque non me pœnituit tartareæ quoque materiam locum in illa XXXVI. Epistola reliquisse, ut neque ex convexa lienis facie indurationem fere incipere, dixisset, indeque alio se extendere. Nam proximam indurata parti membranam cum detraherem, non ipsam quidem ita duram, sed rigidam tamen jam factam sensi, & hæc omnia in ea splenis facie vidi quæ diaphragma contingebat. Id autem num recte conjecerim alternæ hujus musculi compressioni posse tribui, nonnunquam postea dubitavi, cum faciem illam jecinoris quæ eidem est compressioni obnoxia, non eandem, nisi forte rarissime, indurationem contrahere, animadverti. Nunc singularem illam ventriculi Observationem jugiter, nec sine molestia, tumens ex Cel. Viro Lieutaudio (k) indicabo. De molesto in regione ventriculi, quæ semper elatior erat, sensu plenitudinis, aut ponderis æger cachecticus primum, deinde hydropicus querebatur, & de quibusdam circa eam regionem minime acutis doloribus. Libera erat deglutitio, sed adstricta alvus, ut non nisi datis quæ cicerent, responderet unquam, imo vel tunc leviter. Vomendi erat cupiditas: vomitum autem neque natura, neque ars movere poterant: & quamquam de alimentis minimam toto hujus morbi tempore, ultimo autem nihil propemodum sumebatur, non ille tamen plenitudinis, aut ponderis sensus decrecebat. Post obitum denique supra modum extensus, & plenus ventriculus inventus est, intestina autem omnia, quamvis ita angusta, ut universa molem ventriculi non superarent, erant haud secus ac pylorus, omnino pervia, ut proclive fuerit ex his quæ in mortuo, & ex

illis quæ in vivo observata fuerant, existimare ad paralyticum ventriculi quandam morbum esse referendum. Et quoniam de Ventris Tumoribus verba facimus, non reticemus, si diutius is æger vixisset, facile tumorem alterius generis in eodem ventris latere fuisse apparitum. Acerbissimi enim doloris, qui diebus ante mortem quindecim ibi ortus fuerat, causa in sanguine repleta est inter Obliquos abdominis sinistros musculos ad duas libras effuso. Sed neque dexterum hypochondrium sine labe fuit. Jecur enim plures solidissimos continebat lapides, quorum aliqui supra ejus visceris superficiem manifestissime prominebant, accedebantque ad avellanæ magnitudinem.

12. Quibus de Calculis facile biliariis cum plurima ad te alias (l) scripserim, nec solum de hepaticis, verum etiam, idque præsertim, de cysticis; perpaucas restant quæ nunc addam, & primum quidem ex Epistola, quæ forte nuper in manus rediit, missa ante multos annos ab non ignobili Medico, qui meus olim per attentus Auditor fuerat. Sic autem scribebat quæ ipse tum viderat.

13. SENEX qui ad annum usque sexagesimum sextum sine ullo notabili morbo pervenerat, gravibus ad ventriculorum cruciatibus correptus est cum bilioso, & copioso vomitu, alvi adstrictione, & febri non valde acuta. Medicus oleo dato ex dulcibus amygdalis recens expresso, aliisque aliquo remedio ejusmodi, morbum levavit, sed non sustulit, doloribus identidem redeuntibus; donec duabus magnæ drachmis in usum tractis visus sibi æger est perlatatus. Sed, contra Medici consilium, cum ad priores curas, cibosque insalubres reversus esset; dolores quoque reversi sunt, cito autem abacti magnæ usui. Progressu interea dierum Medico displicuit, pulsus parvus esse factum, nec sine aliqua intermissione, appetitum ciborum decreverat, sed præcipue aliquot interjectis diebus per alvum nigerrima reddi, atram Antiquorum bilem referentia. Denique cum gravissimum ingruisset deliquium, & mox deflisset, subdelirare æger cepit, & de acerbissimo capitis dolore queri. Itaque post dies septem per hæc exactos, non sine pulsus intermissione, & magna virium infirmitate, sexto circiter mense a morbi initio, decessit. ABDOMINE inciso, & ducto, nihil vitii in ventriculo repertum est, neque in hepate, nisi quod paulo erat pallidius quam solet. Sed ejus vesicula, triplo propemodum naturalis major, nigerrimam bilem continebat, vel potius amurcam, in qua calculi erant octo alia aliis figura, omnes autem rara magnitudine: præter quos in ipsis vesiculæ parietibus alii conspecti sunt ad decem, milli granis haud majores.

14. Minimi hi calculi in cystis parietibus animadverti, ad eos facile attinebant quos tibi alias (m) in illius glandulis, aut certe inter ejus tunicas memoravi. Fortasse autem paulo iis majores per Cysticum, & Commune ductus exitum molientes, at ob parvitatem minime in alvi facibus animadverti, cruciatu illos ventriculi, & vomitus ciebat; cum maximi illi octo in vesicula ob magnitudinem quiescentes, nullum sui indicium darent ne ponderis quidem sensu; an quod iis quæ paulatim augentur, assuescamus? Vides hic quoque nullam de ictero mentionem fieri. Certe autem Vir Nobilissimus pro quo non ita pridem per litteras consultus sum, vix postquam diu noctes omnes insomnes duxerat obgravissimum ad regionem pylori corripientem dolorem, & perpetuos vomendi conatus, vix, inquam, ictericus tandem per intervalla fieri cepit. Morbi tamen causam ostendit sanatio; dolore enim a ventriculo paulatim umbilicum versus, indeque ad pubis regionem descendente, ubi aliquot substitit dies, denique corporibus dejectis duobus non parvis, ad cubi figuram accedentibus, cruciatus omnis tum ventriculi, tum jecinoris, & hoc dolebat; tum intestinorum solutus est. Erant ea corpora subflava, ex stratis composita, nucleum complectentibus, & flammam concipientibus, ut spectatis omnibus, cysticos esse calculos, non dubitares. Vides autem, quantum in eodem morbo variis in corporibus discernimen sit, Fr. Slare (n) nobilem feminam, hepaticis doloribus valde cruciatam, animadvertit statim atque duos cysticos calculos repositis vicibus in Duodenum intestinum ejecerat, maximum sensisse levamen, illos autem vix per aliquot horas in tota intestinorum via perstitisse, cum ipsi quoque non essent parvi; alter

ter enim ambitum crassioris superabat digiti, alter autem erat tenuior, nec tamen multo. De ejusdemmodi autem calculis illa quoque tibi legenda sunt quæ Præstantissimus scripsit Ellerus (o), cujus explicationem præsertim naturæ, & originis ejus lapidis qui per abscessum hypochondrii dexteri cum pure exierat, facile comprobabis tribus illis consimilibus quæ tibi Epistola XXXVII. (p) protuli, exemplis. Simul cognosces quæ Experimentissimus idem Vir de renalium quoque calculorum origine eadem occasione proponit, & lapidis etiam quem inter vesicæ urinariæ tunicas abditum conspexit.

Ad alia autem Renum vitia attinent tum eorum hydrops, five a sero flavo distensio, tum substantia ipsorum maximam partem deleta, tum indurata Adiposa eorum membrana, itemque in Ascitica renum alter duplo major, alter justo minor cum uretere, vasisque sanguiferis valde contractis. Quas Cl. Bohemerii Observationes in eodem libro relatas invenies in quo alias, a me tibi supra (q) indicatas. Quod si eum librum versans, in locum forte incidaris ubi Morgagnus dicitur nuper operam dedisse, ut sententiam de vis urinæ ex ventriculo ad vesicam novis argumentis confirmaret, noli mirari quæ scias in contraria huic sententia me semper fuisse, & adhuc esse; sed id nimia tribue erga me typographorum liberalitati qui alteram litterulam g addentes, non semel quæ ad alium omnino spectabant, mihi donare voluerunt.

15. Quæ de calculis paulo ante interjecta sunt, & ipsa quidem ad Morbos attinent Ventris; sed non modo ad istos, verum etiam ad susceptum de Tumoribus ejusdem sermonem, cuius tibi oblitus forte videbamur ea spectant quæ novissime ex Bohemero indicavimus de renum hydropis, & de Ascite. Ad nonnulla autem quæ de Tympanitide agentes, attigimus illustranda facere poterit Programma ab Hambergero editum de ruptura intestini Duodeni, quam brevissimus quidem, sed ingens, lethalisque tympanitidis tumor est confectus. Fac igitur perlegas. Nos enim tum eorum memores quæ de cæteris Ventris Tumoribus, & multa, & vapi ad te scripsimus, tum de alio hydropis non paucissima scribenda mox esse, cogitantes, non omnibus in quæ incidimus, immorari nunc possumus. Quamobrem haud alia, quod ad Mesenterium spectat, hic indicabimus, nisi ut ex Cl. Viris Henrico Henrici (r), & Joanne Fantono (s) excerptas quæ tunc nos fugerunt Observationes, Sepulchro adjuvandas. Hic enim magnum mesenterii tumorem, ille vero non paucos ejusdem abscessus proposuit. Et hæc quidem Observationes utiles sunt; illæ autem utiliores in quibus mutata viscerum sedes Medicum potest decipere. Itaque totidem viciemus quæ cum præclara illa Valsalvæ (t) conjungas, ventriculi & sua sede prolapsi, ibique tumorem efficiunt ubi ventriculus secundum naturam esse non formaturus, Cl. Langguthi: ut scirrhus enim tunc tum quæ pylorum cingebant, tumor immani crassitudine hunc arctaverat, ita & pondere ventriculum omnino loco moverat, ut orificium superius a diaphragmate ad maximam palmæ latitudinem distaret, hunc autem infra umbilicum in regionem hypogastricam protenderetur, & loco, ac mobilitate innatum omento magnum tumorem in vivente mentiretur. Altera autem Observatio est Cl. Schlenkeri (x), qui ventriculum vidit pyloro ad os pubis usque perpendicularilinea peringentem. Cujus prolapsus satis apta causa ex reliqua historia non apparet; præcipuum enim vitium in ovario sinistro fuit lapideo, magno, ponderoso, & omnino digno quod tot aliis accensas, a nobis alias (y) memoratis, Ovariorum Tumoribus. Quos inter deesse tamen credimus nonnullos ab laudato Fantono (z) propostos, ut cum ovarium sinistram decies erat naturalis majus, & scirrhus, aut cum dextero intus cavum, albicantem & durum globum ex materia sebacea, ovofiscæ instar, ambo turgebant sero subflavo.

16. Etsi vero nullius generis tumorum muliebrium testium plura, quam hujus tertii, exempla commemoravi ubi de Saccato hydropis ad te scribens (a), illic denique perveni, ut quaererem, num, & quomodo peritior Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

nari, utriusque, alique ejusmodi hydropes ab ovarii hydropis internosci possent; quædam tamen generis ejusdem Observationes superant, quas haud inutile censio hic tibi pretere quidem, sed ita indicare, ut facile quæcum prioribus illis, & cum iis quæ tum dixi, conferre, & quod melius tibi videatur tum de cognoscendis, tum de curandis ejusdemmodi morbis constituere. Ut a vetustioribus incipientes, ad recentiora veniamus; editum fuit A. 1671. a Ludovico Salzmanno (b) exemplum foeminae cui post diuturnam menstrui sanguinis suppressionem, abdomen sensim a sinistro hypogastrico sinistram versus hypochondrium attollebatur, abscentibus ascitis indicis, & facie sic satis colorata. Verum ex quo non sine impetu in terram cecidit, brevi ascitis indicia cum magno totius abdominis tumore, & paulo post mors accessit. In Ventre præter aquam, & pus ea copia quæ tantæ distentioni conveniebat, ingens tumor viscera operiens inventus est, plurimas continens cystes alia alias magnitudine, aliæ singulas fere materia plenas. Tumoris autem communis tunica est contigua partibus undique per membranas nectebatur, sanusque erat uterus; tamen cum tumor, ut in vivente inceperat, ita in mortua dicatur peculiariter sub inguine sinistro fuisse conspectus; non a veri similitudine procul abis, si sinistro ovario ortum existimabis: quamquam fortasse ad Saccatos alios, & aliunde natos hydropes referre males. Qualis certe erat is quem non ita pridem legi inter Observationes Medicas (c) Cl. Wetzpremi in viri cadavere qui per biennium pro ascitico habitus, graveolentem humorem in quo magnæ hydatides natabant, conclusum ostendit intra immanem quasi vesicam, cujus erat collum inter vesicam veram, & Rectum intestinum implantatum, cum pars reliqua per cellulofum tantummodo contextum vicinis partibus annexeretur: & qualem, nisi quod in nulla in aqua limpida continebantur hydatides, fuisse, nunc video exemplum illum in quo alias (e) merito hæseram, nempe Virginis cujus venter per decennium tumidus, estis finistris eminebat magis, neque ascitis notas, imo colorem faciei floridum conjunctum habebat; tamen cum temere & asciticis crederetur, & sero propterea pertunderetur, & nimia statim aquæ copia exhauriretur, sicque citam afferret mortem, magnum tamen dissecantibus obrulit membraneum saccum in quo aqua fuerat, nullis aliis annexum partibus, quam lienem, & reni sinistro, quibus cum ut vasa communia habebat, ita firmiter cohaerebat. Ut tibi igitur alias ovariorum hydropis de quo dubitare non possis, Observationes indicemus; ad eos qui suas post Ludovicum Salzmannum vulgaverunt, sicuti promissimus, veniamus. Abt. Vaterus (f) foeminam proposuit, quæ non ut duæ, de quibus paulo ante dictum est, aliæque, & in iis Vidua, de qua mox dicetur, anno morbi primo in falsa graviditatis suspitione apud Medicos fuerunt, quæ res quanto longius curationem differt, tanto redit difficiliorem, non, inquam, ejusmodi suspitione aspergi potuit, cum ex viro suo, non alio modo, sed & ipsa gravidam se crederet, jamque mammis humore, lactis non dissimili turgentibus, notos sibi ex quo gemellos, perquam difficili partu editos, utero gesserat, infantis motus vel manu adnota se percipere, confirmaret: quos motus post graviores lapsus cum amplius non sentiret, mortuum esse foetum quoad vixit; vixit autem tres annos cum dimidio; non dubitabat, tumore ventris duriore quidem, sed primum non adeo ponderoso, permanente, deinde vero mirum in modum aucto, & molesto. Huic igitur cum maxima foetidissima aquæ copia prægrandis tumor inerat, non ad uterum, quem in vaginam suo pondere detruerat, sed omnino ad dexterum ovarium attinens, quod in rotundis capsulas totum abierat, viscido, ac purulento liquore oppletas. Sed longissime tumorem hunc tumor superat in Cl. Nicolai Willi Dissertatione (g) legendus. Cum enim in Vidua sensim tumere cepisset abdomen, viribus interea, & appetitu integris, corporis habitu non cachectico, & lotio secundum naturam fluente, quinque annorum spatio majorem in molem accrevit, inæqualem tamen; nam a dextris magis prominebat; neque cum in lecto de latere in latus converteretur, ullum

(d) Dissert. de Scirrhis Viscer. (e) A. 1753. Obs. Anat. 5. (f) Epist. 36. n. 18.
(g) De Obs. Med. & Anat. Epist. 1. & 6. (h) Epist. 36. n. 14. & seqq. (i) n. 16.
(k) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1752. (l) Epist. 37.
(m) Ibid. n. 21. & 29. (n) in Epist. edita a Sigism. Koenig. in suo Lithogen. hum. Specim.

(o) Hist. de l'Acad. R. des Sc. de Berlin A. 1755. (p) n. 52. (q) n. 6. (r) Dissert. de Abscess. Mesenter.
(s) De Obs. Med. & Anat. Epist. 8. n. 9. (t) Epist. 39. n. 14. (u) n. 1. (x) Dissert. de singulari Ovar. sin. morbo.
(y) Epist. 38. n. 54. & seqq. (z) Epist. 39. n. 37. & seqq. (a) Epist. cit. 8. n. 13. & 16. (b) Epist. indicatis 38. & 39.
(c) Epist. 38. n. 63. in fin. (d) Dissert. de infelici hydr. saccati curat. (e) Dissert. de infelici hydr. saccati curat.
(f) Dissert. inscripta Gravidae Apparent. (g) Dissert. inscripta Suppensus Abdom. Tumor n. 5.

illum fluctuationis sensum faciebat. Quin cum intra annos aliquot sic esset auctum, ut in perpetuo corporis paulo altiore decubitu ad spithamæ longitudinem intra genua, procerioris alloqui mulieris, propenderet, nec pedes erant tumidi, nec facies multum decolor, nec appetitus defectus, nec sitis, nisi matutinis horis, & vel tunc levis, nec febrilis pulsus; somnus autem pacatus. Sed morbo dein ad duodecimum usque annum persistente, abdomine autem magis tumente, pleraque horum mutata sunt tandem, & quamvis e tumefactis, erofisque pedibus magna aquæ vis distillaret, ventre tamen non detumescente, illisque gangræna correptis, mors ingruit. Nihil aquæ in ventre, in thorace, in pericardio inventum est; immani ejus copia intra membraneum sacculum omnino conclusa. Cujus sacci duplex erat tunica, & exterior alba, crassa, fibrisque tenacibus compacta, cavum unum, origo una; ovarium enim dexterum in tam miram amplitudinem excreverat, vasis spermaticis quæ ad ipsum pertinebant, duodecuplo quam solent, crassioribus.

17. In eadem quoque Dissertatione (b) collectas invenies notas, per quas hydrops hic cognosci, & ab aliis, utriusque præsertim, distingui possit creditur, tum etiam (i) quam variis variis in corporibus reperiatur. Quæ omnia cum productis aliis, aut nunc a me exemplis, si conferas; quid crebris, quid rariis tum in viventibus, tum in mortuis occurrat, perpicies quidem: sed non propterea, si me audis, quidquam pro certo in diagnosi affirmare audebis, multo autem minus de effluviis, præsertim chirurgica, curatione promittere. Quid enim scribant nonnulli; Eruditus Dissertationis Auctor ipse quoque diserte fatetur (k), nullum medentium bacenus gloriarum potuisse, se in hydropse hoc ovarium pollicetur fidem adimplevisse: & quamvis ubi de paracentesi tentanda loquitur (l), hujus neque locum, neque modum, nec rationem præcipue omittat curandi, ut tumoris parietes inter se coalescant; tamen primum omnium monet Medicum, & Chirurgum, ne dubium ejus curationis eventum prædicere omittant. Urget enim, & inculcat (m) illud in primis, signa adhuc desiderari per quæ priusquam ea suscipiatur, scire liceat, sitne aqua intra unum cavum collecta, an dispersa in plura. Vides autem, vel quod venerat nobis in mentem (n), ex aquæ fluctuatione tunc sensibili, nunc vero nulla id discrimen conjicere, perfectæ Viduæ novissime propositæ historia esse procul dubio abjiciendum. Cæteras mitto satis animadvertas, & tibi alio loco a me expositas difficultates: quibus potius nunc velim addas quæ ex Observationibus eliciuntur Virorum Cl. Georgii Christ. Brehmii (o), & Stephani Welpreymi (p), quarum neutram antea memoravi, quoniam hæc est sine morbi signis, illa cum plurimum Partium morbis est complicata. Quid enim Chirurgus ageret, si, ut secundus, magnum in sacculum incidere, cum fetido humore non parvam concretione ossæm continenter, quem ad ovarium sinistram attinuisse, quidam quasi funiculum ostendebat cum hoc colligans, majori ex parte una cum proxima ruba, & ligamenti uteri putrefacto, & lacerato; ut pronum esset intelligere, unde orta esset Virginis illius ascites, aut quid ageret, si post non paucos Saccati hydropis indicia, ferro profundius in mollissimam tumoris partem adacto, pauca glutinosa aqua, hydatides autem plurimæ exirent: quæ post mortem a Brehmio inventæ sunt numero prope incredibili, cum erassissima scirrhusa carne singula quidem ovaria in magnitudinem duorum pugnorum extenderent, sed & ventris pene omnia viscera, & diaphragma quoque obfidentes.

18. Igitur Saccati hydropis non alia prudentius curatio laudari posse videtur, quam probata alias (q) a nobis palliativa. Sic enim sapius, & paucioribus quidem, levioribusque cum incommodis vivere diutius, multoque ad annos potuerunt egrotantes; quin etiam casu, & natura opulante, nonnunquam sanari. Vide sis quid acciderit Virgini, cujus historiam accurate scriptam diligentia Villi (r) debemus. Cum enim quatuordecim annos tantum ventris molem pertulisset, ut intra octo annos primos pondus corporis duplo majus ad lancem esset, quam antequam morbus inciperet annum videlicet agentis vigesimum secundum, tandem in ventrem prolapsa, crepitu intus percepto quasi tympani disrupti in regione sinistra epigastrica (quæ res, & initium tumoris ex latere eodem pelvis, & signa etiam quæ-

dam, ejusmodi hydropes de quibus hic loquimur, comitantia, ad horum aliquem hunc facile referendum esse, indicabant) tantam limpida, & inodora aquæ per intervalla mingere copiam cepit, ut intra novem dies ventris tumor evanuerit, nec longo post tempore sic convalescit, ut annos jam quinque, cum historia edita est, valetudine satis prospera uteretur. Antea vero a Cl. Christoph. Ernesto Cono (s) edita Observatio fuerat Matronæ, quæ primum gravidam tumido, sed florido facie colore, appetitu integro, somno tranquillo, respiratione satis libera, nullo pedum tumore, urina non immutata, deinde vero tumetibus pedibus, ventre autem adeo distento, ut mox diceretur, cum septem jam annos periret morbus, ipsa prolapsa, adflicta stratum gravissime abdomem allisit. Mox autem idem ipsi, quod Virginis, accidit, ut ejusdem generis urina ea copia subinde excreneret, quanta, largo etiam spontaneo sudore adjuvante, ad inanientem ventrem satis fuit, qui sic rugosus, ac plane collapsus, ultra genua extendebatur: itaque biennium sana vixit, donec epidemica dysenteria extincta est. His duabus igitur fortuitus lapsus tam felix fuit, quam totidem infelix de quibus supra (t) dictum est. Et ne forte suspicaris, Virginis huic, & Matronæ ideo aquam profuissse, quod non ventris, sed uteri cavo includeretur, ut in quibusdam a Cunrado (u) memoratis, quarum felix pariter lapsus fuit; pro certo habere, duabus de quibus dicebamur, aquam ex utero non effluxisse, ut pote quæ non præter voluntatem reddebant, imo pro arbitrio poterant cohibere.

19. De eo autem quem modo dicebam Uteri, aut de hujus Tubæ Hydropse sane perpaucæ sunt quæ indicem Sepulchreto adicienda. Nempe hydrops tubæ exemplum unum quidem, & a me tibi alias (x), sed nimis preste, cum liber deesset, memoratum, nec vulgare profecto exemplum, quippe tubæ libras aquæ centum circiter, & quinquaginta continentis in muliere quam, primum gravidam, deinde adflictam, putatam, diffecit Abr. Cyprianus (y), qui curandam suscipere noluerat, & sapienter quidem, nam præter aquam, intra tubam multos offendisset tumores carcinomatosos. Hydropici autem Uteri exemplum a Brehmio (z) habebis in Mariona quæ, cum a Medicis plurimis Saccato hydropis laborare jam per biennium crederetur, sumpto medicamento emmenagogo faccos ex utero edidit septem, quorum uno quidem foetum fetum continenter, reliquis autem serum gravissime olens; ut hydropem ab infelici graviditate ortum esse, intelligeres, intra faccos tamen conclusum. In historia autem quæ apud Cunradum (a) legitur, uno ingenti utre comprehensam vim aquæ immanem reperies in muliere quæ præter ponderis sensum, nulla alia de re querebatur, pedibus non tumidis, & sine ullo, dum corpus moveret, fluctuantis aquæ sensu, & quod maxime omnes mirabantur, per sexennium circiter; tot enim annos tumorem gesserat; non solum non erat emaciata, sed neque menstruis, rite provenientibus, purgationibus unquam caruerat. Quæ res, & ipsa diffectio dubium facere te potest, an uter ille sectioni intererant, corpus aliud potius quod uterum referebat, ejusque sedem obtinebat; indeque tumori pugni magnitudinem primum inceperat; revera uterum fuisse, suspicabantur. Sed quoniam id ipsum corpus & scirrhusum, & aliis vitis depravatum erat, neque cum vagina, sub ipso proflus oclusa, communicabat; communicabant autem sanguifera vasa, per uterum illum repentina, tu cum omnia perlegeris, attentèque perpendis, an saltem pro utero distenta parte uter ille sit accipiendus, conjicies, intereaque ex Dissertatione eadem (b) notas considerabis, per quas uteri hydrops posse dicitur ab aliis five hydropis speciebus, five uteri ipsius morbis, ut scirrhus, & Cancro, internosci.

20. Quod ad hos ultimos attinet, meis duabus, alias (c) propositis, Observationibus totidem poteris adjungere ex Cl. Viris Kieslingio (d) & Roederero (e), & cum ea quoque ovariorum, tubarumque, & uterinæ vesicæ constitutione, quæ a me, & quæ ab illorum utroque, aut altero tunc simul inventa est, comparare. Hic enim de Utero, & Vesica, cæterisque Uterinis, & Genitalibus Partibus a me alia non adduntur, quippe de ipsarum morbis plura insequentibus Epistolis scripturo. Vale.

EPI.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LXVI

Ad Urinariæ Vesicæ Morbos potissimum spectat.

DE Morbis qui ad Urinarias, & qui ad Genitales Partes attinent, ut superiore Epistola pollicitus sum, scripturus, primum Observationem afferam ad atrocem spectantem, deinde alia quæ ad illos, alia quæ ad hos singulatim pertinent, tecum hictæ, & proximis Litteris eadem qua solitus sum, ratione communicabo.

2. ANICULA, quæ doloribus ad infimam ventris partem, inter mingendum præsertim, septem jam menses laboraverat, primis quidem mensibus in Nofocomio fuerat. Unde domum reversa, novissime eodem rediit, cruciatibus illis acerbissimis sævientibus, & urina, quotiescumque reddebatur, multum pus deponente. Convulsionibus denique prehensa, decessit prope finem A. 1757. EX CADAVERE quod non nisi aliquot a morte diebus inspicere poteram, cum statim intestina saltem detrahi jussissem; præsens tandem omnia quæ urinæ, & generationis causa creata sunt, organa, tum deposita, perlustravi. Inter ovaria alba, scirrhusa, parva, parvus quoque uterus fuit, intus, extraque sic satis sanus, nisi quod exterius in fundi tergo habuit rotundam quasi papulam, subalbo pure plenam. Sed vagina, e cujus orificio fedissima prodibat materia, itemque vesica diffecta, universa utriusque interior facies apparuit quasi exesa, cinereoque, crasso, velles, sequebatur simul exese utriusque illarum substantia; ut manifestum esset, ambas terribili carcinomate laborasse. Puris autem tantum fuerat, ut vesica, quæ antequam incidere, lotio feminea visa erat, sic a pure, quod continebat, apparuerit. Cæterum cum uterque ureter, & præsertim dexter, latior esset, nihil vitii in perfectis renibus potuit deprehendere.

3. Historiam hanc protuli, ut cum aliis conferas, quas alias (a) indicavi, in quibus & mea (b) est, dissimilis in quibusdam, sed in eo similis quod gravis morbus simul genitalia, & urinaria instrumenta occupaverat. Nunc alia, ad hæc secunda singulatim pertinentia, adscribemus.

4. Et primum cum eam Epistolam releges in qua de Urinæ Difficultate a calculis præsertim verba facientes, de aquis artigimis quadam ad eos gignendos, aut præcavendos magis idoneis (c), adjungas velim experimenta, quæ multa, & diligenter in patris, alienisque aquis examinanda habuit is quem moerenti Bononiæ suæ mors immatura eripuit nuper, Vincentius Menghinus (d). Deprehendit enim vel inter puteales, quædam quæ non modo calculos non ageant, sed & immisculis aliquot epotæ, & ad vina, & jus conficiendum in usum tractæ, vires istas felici eventu comprobant.

Cum acu autem illa per virilem urethram intra vesicam traducta, & sibi increfcente calculo adaucta, triticam quoque spicam (nam de hordeacea (f) ibique arenarum mistum valde cruciaretur, candelæ tenuis gnantes, non sine acerbissimo videlicet dolore, aristarum aculeos non potuerat, retrahere autem ob repurum lithotomus denique ex ipsa vesica extraxit racemi instar quem petrosa materia incrustasset. Cum hæc congerimus, ea quoque confers, quæ tum adnotavi, ut magnum, quod inter meam esset, & aliorum ejusmodi Observationes, discrimen pateret.

5. De obice autem qui urinæ egressui ab excrefcentia Prostata glandula opponitur, non isdem tantummodo Litteris, sed & aliis, illique præsertim quæ eas proximè antecesserant (h), a me tibi scriptum esse, memineris. Nunc vero alia addenda sunt. Quod enim ego henderam, & pro excrefcentia Prostata, saltem inchoata, habueram, id tuberculum novissime legi, sine ulla dubitatione accipi pro naturali omnino, & omnibus communi particula. Uvulamque appellari a Cel. Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

Anatomico, cujus nomen hic non ideo omitto, quod ejus ingenium, diligentiam, & cætera merita non tantum faciam, quanti debeo, & hæc ipsæ meæ non uno loco ostendunt Epistolæ; sed ut meam consuetudinem ferrem, quotiescumque ab Docto aliquo, & Spectato Viro qui vivat, & præsertim qui ex Cœtu illo Inclyto sit ex quo ipse est, cogor pro veri studio dissentire. Igitur si in omnibus sua ista Uvula est; utarenim, brevitate causa, hic eo nomine, jure miratur, a me non esse conspectam. Multo autem magis mirari ipse hoc deberem, qui (i) cum ibi leviter extantem lineam quæ ad Seminalem descendit carunculam, imo in caruncula hac longe tenuissimam lineolam alteram, quæ videlicet conditi in ea Sinus orificium est, perviderim; corpus tanto extantius, & cum uvula comparandum, oculis assequi non potuissem: nec vero tunc solum cum lineolam caruncula primum animadverti; sed neque antea, neque postea cum eam urethræ partem, secundum naturam quidem se habentem attente inspicere, id quod a me quoties sit factum, non dico: hoc tantum dico, vel ante hujus initium sæculi a me fieri cœpisse, quot autem in cadaveribus, Bononiensibus, & Venetis Amicos scire; nam Patavii per hos annos quatuor, & quadraginta in quot fecerim annis singulis five in Gymnasio, five in Nofocomio, Studiosi omnes conspexerunt. Quid ergo est? Non quod aliis contigit, in dubium voco. Sed quod mihi contigit, ingenue expono. In tanto enim inspectionum mearum numero ut quam raro id viderim, plane intelligas, sic habeto, quotcumque huc pertinent, ad eas perpaucas redire quas tibi jam scriptas alibi, hic tantummodo commemorabo, aut si nusquam scribendi occasionem habui, huc fideliter ascribam. Vide igitur, ut in Sutore (k) uvulæ istius pyrifforme inchoamentum offenderim; erat enim aliquanto major, quam subjecta Seminalis caruncula, cum in Ascitico (l), itemque in Rustico (m) grandiore, quippe æquantem mediocrem uvæ acinum, deprehenderim, paulo autem in eo majorem, cujus ob id unum proptius hic describetur historia.

6. VIR sexagesimo anno proximus, lacertosus, procerus in Nofocomio ex suppurata thoracis inflammatione erat mortuus quindecimo morbi die. Ad me igitur qui ante Januarii finem A. 1755, in Gymnasio Anatomen inchoaveram, nulla ex illo nisi ventris viscera allata sunt. In quibus præter naturam quæ essent, hæc solummodo animadverti.

IN VENTRIGULO ex pylori annulo perparva exstabat subrotunda excrefcentia, intus, extraque concolor eidem annulo, cujus ex substantia erat facta. In mesenterio raræ quidem erant glandulæ; sed majores, quam pro ea ætate. Lien potius parvus, intusque diffusius propemodum. Arteria Magna intus ostendere incipiebat maculas albas, in os postea abituras. Vesica demum urinaria cum esset immisso aere satis distenta, parva apparuit si cum hominis statura, & ventris peristole visceribus conferres. Attamen aperta, non visa est habere tunicas valde crassas, nec vitium aliud ullum, nisi quod ab orificii posteriore parte intra illam exstabat corpus parvi cerasi figura, & magnitudine, quod per subjectæ urethræ initium quo magis descendebat, eo magis, magisque se extenuabat ita ut ad Seminalem carunculam non perveniret. Læve erat exterius, ibique, & interiorius album, & evidenter adeo cum Prostata glandula continuatum, cæteraque ejus substantiæ simile, ut ex ea excrevisse, non dubitares.

7. Nunc si quartam hanc & tres quas antea (n) indicavi, meas excrefcentiæ hujus descriptiones cum ejus uvulæ de qua loquimur, descriptione comparaveris; proclive tibi erit perspicere, eadem me vidisse, five parvum, five majus jam factum erat id corpusculum. Cur ergo si in omnibus esset, in aliis, innumeris propemodum, non vidissem, quorum eadem loca pari, ut soleo, attentione ad id usque tempus inspexeram, satis assequi non possum. At enim, inquis fortasse, vide, ne memoria te fallat; ex tuis enim scriptis in nonnullis quæ-

A a 2

que

(b) n. 10. (c) n. 10. (d) n. 16. (e) n. 18. (f) Ibid. & n. 16. (g) Epist. 38. n. 63. in fin. (h) Dissert. de Hydatidibus. (i) Obf. Med. I. (j) Epist. 38. n. 71. (k) Dissert. ad n. 16. supra cit. n. 6. (l) Dissert. de Hydr. Uteri c. 4. §. 3. (m) Epist. 38. n. 66. (n) Epist. 38. n. 66. (o) Epist. 38. n. 66. (p) Epist. 38. n. 66. (q) Epist. 38. n. 66. (r) Epist. 38. n. 66. (s) Epist. 38. n. 66. (t) Epist. 38. n. 66. (u) Epist. 38. n. 66. (v) Epist. 38. n. 66. (w) Epist. 38. n. 66. (x) Epist. 38. n. 66. (y) Epist. 38. n. 66. (z) Epist. 38. n. 66. (aa) Epist. 38. n. 66. (ab) Epist. 38. n. 66. (ac) Epist. 38. n. 66. (ad) Epist. 38. n. 66. (ae) Epist. 38. n. 66. (af) Epist. 38. n. 66. (ag) Epist. 38. n. 66. (ah) Epist. 38. n. 66. (ai) Epist. 38. n. 66. (aj) Epist. 38. n. 66. (ak) Epist. 38. n. 66. (al) Epist. 38. n. 66. (am) Epist. 38. n. 66. (an) Epist. 38. n. 66. (ao) Epist. 38. n. 66. (ap) Epist. 38. n. 66. (aq) Epist. 38. n. 66. (ar) Epist. 38. n. 66. (as) Epist. 38. n. 66. (at) Epist. 38. n. 66. (au) Epist. 38. n. 66. (av) Epist. 38. n. 66. (aw) Epist. 38. n. 66. (ax) Epist. 38. n. 66. (ay) Epist. 38. n. 66. (az) Epist. 38. n. 66. (ba) Epist. 38. n. 66. (bb) Epist. 38. n. 66. (bc) Epist. 38. n. 66. (bd) Epist. 38. n. 66. (be) Epist. 38. n. 66. (bf) Epist. 38. n. 66. (bg) Epist. 38. n. 66. (bh) Epist. 38. n. 66. (bi) Epist. 38. n. 66. (bj) Epist. 38. n. 66. (bk) Epist. 38. n. 66. (bl) Epist. 38. n. 66. (bm) Epist. 38. n. 66. (bn) Epist. 38. n. 66. (bo) Epist. 38. n. 66. (bp) Epist. 38. n. 66. (bq) Epist. 38. n. 66. (br) Epist. 38. n. 66. (bs) Epist. 38. n. 66. (bt) Epist. 38. n. 66. (bu) Epist. 38. n. 66. (bv) Epist. 38. n. 66. (bw) Epist. 38. n. 66. (bx) Epist. 38. n. 66. (by) Epist. 38. n. 66. (bz) Epist. 38. n. 66. (ca) Epist. 38. n. 66. (cb) Epist. 38. n. 66. (cc) Epist. 38. n. 66. (cd) Epist. 38. n. 66. (ce) Epist. 38. n. 66. (cf) Epist. 38. n. 66. (cg) Epist. 38. n. 66. (ch) Epist. 38. n. 66. (ci) Epist. 38. n. 66. (cj) Epist. 38. n. 66. (ck) Epist. 38. n. 66. (cl) Epist. 38. n. 66. (cm) Epist. 38. n. 66. (cn) Epist. 38. n. 66. (co) Epist. 38. n. 66. (cp) Epist. 38. n. 66. (cq) Epist. 38. n. 66. (cr) Epist. 38. n. 66. (cs) Epist. 38. n. 66. (ct) Epist. 38. n. 66. (cu) Epist. 38. n. 66. (cv) Epist. 38. n. 66. (cw) Epist. 38. n. 66. (cx) Epist. 38. n. 66. (cy) Epist. 38. n. 66. (cz) Epist. 38. n. 66. (da) Epist. 38. n. 66. (db) Epist. 38. n. 66. (dc) Epist. 38. n. 66. (dd) Epist. 38. n. 66. (de) Epist. 38. n. 66. (df) Epist. 38. n. 66. (dg) Epist. 38. n. 66. (dh) Epist. 38. n. 66. (di) Epist. 38. n. 66. (dj) Epist. 38. n. 66. (dk) Epist. 38. n. 66. (dl) Epist. 38. n. 66. (dm) Epist. 38. n. 66. (dn) Epist. 38. n. 66. (do) Epist. 38. n. 66. (dp) Epist. 38. n. 66. (dq) Epist. 38. n. 66. (dr) Epist. 38. n. 66. (ds) Epist. 38. n. 66. (dt) Epist. 38. n. 66. (du) Epist. 38. n. 66. (dv) Epist. 38. n. 66. (dw) Epist. 38. n. 66. (dx) Epist. 38. n. 66. (dy) Epist. 38. n. 66. (dz) Epist. 38. n. 66. (ea) Epist. 38. n. 66. (eb) Epist. 38. n. 66. (ec) Epist. 38. n. 66. (ed) Epist. 38. n. 66. (ee) Epist. 38. n. 66. (ef) Epist. 38. n. 66. (eg) Epist. 38. n. 66. (eh) Epist. 38. n. 66. (ei) Epist. 38. n. 66. (ej) Epist. 38. n. 66. (ek) Epist. 38. n. 66. (el) Epist. 38. n. 66. (em) Epist. 38. n. 66. (en) Epist. 38. n. 66. (eo) Epist. 38. n. 66. (ep) Epist. 38. n. 66. (eq) Epist. 38. n. 66. (er) Epist. 38. n. 66. (es) Epist. 38. n. 66. (et) Epist. 38. n. 66. (eu) Epist. 38. n. 66. (ev) Epist. 38. n. 66. (ew) Epist. 38. n. 66. (ex) Epist. 38. n. 66. (ey) Epist. 38. n. 66. (ez) Epist. 38. n. 66. (fa) Epist. 38. n. 66. (fb) Epist. 38. n. 66. (fc) Epist. 38. n. 66. (fd) Epist. 38. n. 66. (fe) Epist. 38. n. 66. (ff) Epist. 38. n. 66. (fg) Epist. 38. n. 66. (fh) Epist. 38. n. 66. (fi) Epist. 38. n. 66. (fj) Epist. 38. n. 66. (fk) Epist. 38. n. 66. (fl) Epist. 38. n. 66. (fm) Epist. 38. n. 66. (fn) Epist. 38. n. 66. (fo) Epist. 38. n. 66. (fp) Epist. 38. n. 66. (fq) Epist. 38. n. 66. (fr) Epist. 38. n. 66. (fs) Epist. 38. n. 66. (ft) Epist. 38. n. 66. (fu) Epist. 38. n. 66. (fv) Epist. 38. n. 66. (fw) Epist. 38. n. 66. (fx) Epist. 38. n. 66. (fy) Epist. 38. n. 66. (fz) Epist. 38. n. 66. (ga) Epist. 38. n. 66. (gb) Epist. 38. n. 66. (gc) Epist. 38. n. 66. (gd) Epist. 38. n. 66. (ge) Epist. 38. n. 66. (gf) Epist. 38. n. 66. (gg) Epist. 38. n. 66. (gh) Epist. 38. n. 66. (gi) Epist. 38. n. 66. (gj) Epist. 38. n. 66. (gk) Epist. 38. n. 66. (gl) Epist. 38. n. 66. (gm) Epist. 38. n. 66. (gn) Epist. 38. n. 66. (go) Epist. 38. n. 66. (gp) Epist. 38. n. 66. (gq) Epist. 38. n. 66. (gr) Epist. 38. n. 66. (gs) Epist. 38. n. 66. (gt) Epist. 38. n. 66. (gu) Epist. 38. n. 66. (gv) Epist. 38. n. 66. (gw) Epist. 38. n. 66. (gx) Epist. 38. n. 66. (gy) Epist. 38. n. 66. (gz) Epist. 38. n. 66. (ha) Epist. 38. n. 66. (hb) Epist. 38. n. 66. (hc) Epist. 38. n. 66. (hd) Epist. 38. n. 66. (he) Epist. 38. n. 66. (hf) Epist. 38. n. 66. (hg) Epist. 38. n. 66. (hh) Epist. 38. n. 66. (hi) Epist. 38. n. 66. (hj) Epist. 38. n. 66. (hk) Epist. 38. n. 66. (hl) Epist. 38. n. 66. (hm) Epist. 38. n. 66. (hn) Epist. 38. n. 66. (ho) Epist. 38. n. 66. (hp) Epist. 38. n. 66. (hq) Epist. 38. n. 66. (hr) Epist. 38. n. 66. (hs) Epist. 38. n. 66. (ht) Epist. 38. n. 66. (hu) Epist. 38. n. 66. (hv) Epist. 38. n. 66. (hw) Epist. 38. n. 66. (hx) Epist. 38. n. 66. (hy) Epist. 38. n. 66. (hz) Epist. 38. n. 66. (ia) Epist. 38. n. 66. (ib) Epist. 38. n. 66. (ic) Epist. 38. n. 66. (id) Epist. 38. n. 66. (ie) Epist. 38. n. 66. (if) Epist. 38. n. 66. (ig) Epist. 38. n. 66. (ih) Epist. 38. n. 66. (ii) Epist. 38. n. 66. (ij) Epist. 38. n. 66. (ik) Epist. 38. n. 66. (il) Epist. 38. n. 66. (im) Epist. 38. n. 66. (in) Epist. 38. n. 66. (io) Epist. 38. n. 66. (ip) Epist. 38. n. 66. (iq) Epist. 38. n. 66. (ir) Epist. 38. n. 66. (is) Epist. 38. n. 66. (it) Epist. 38. n. 66. (iu) Epist. 38. n. 66. (iv) Epist. 38. n. 66. (iw) Epist. 38. n. 66. (ix) Epist. 38. n. 66. (iy) Epist. 38. n. 66. (iz) Epist. 38. n. 66. (ja) Epist. 38. n. 66. (jb) Epist. 38. n. 66. (jc) Epist. 38. n. 66. (jd) Epist. 38. n. 66. (je) Epist. 38. n. 66. (jf) Epist. 38. n. 66. (jg) Epist. 38. n. 66. (jh) Epist. 38. n. 66. (ji) Epist. 38. n. 66. (jj) Epist. 38. n. 66. (jk) Epist. 38. n. 66. (jl) Epist. 38. n. 66. (jm) Epist. 38. n. 66. (jn) Epist. 38. n. 66. (jo) Epist. 38. n. 66. (jp) Epist. 38. n. 66. (jq) Epist. 38. n. 66. (jr) Epist. 38. n. 66. (js) Epist. 38. n. 66. (jt) Epist. 38. n. 66. (ju) Epist. 38. n. 66. (jv) Epist. 38. n. 66. (jw) Epist. 38. n. 66. (jx) Epist. 38. n. 66. (jy) Epist. 38. n. 66. (jz) Epist. 38. n. 66. (ka) Epist. 38. n. 66. (kb) Epist. 38. n. 66. (kc) Epist. 38. n. 66. (kd) Epist. 38. n. 66. (ke) Epist. 38. n. 66. (kf) Epist. 38. n. 66. (kg) Epist. 38. n. 66. (kh) Epist. 38. n. 66. (ki) Epist. 38. n. 66. (kj) Epist. 38. n. 66. (kk) Epist. 38. n. 66. (kl) Epist. 38. n. 66. (km) Epist. 38. n. 66. (kn) Epist. 38. n. 66. (ko) Epist. 38. n. 66. (kp) Epist. 38. n. 66. (kq) Epist. 38. n. 66. (kr) Epist. 38. n. 66. (ks) Epist. 38. n. 66. (kt) Epist. 38. n. 66. (ku) Epist. 38. n. 66. (kv) Epist. 38. n. 66. (kw) Epist. 38. n. 66. (kx) Epist. 38. n. 66. (ky) Epist. 38. n. 66. (kz) Epist. 38. n. 66. (la) Epist. 38. n. 66. (lb) Epist. 38. n. 66. (lc) Epist. 38. n. 66. (ld) Epist. 38. n. 66. (le) Epist. 38. n. 66. (lf) Epist. 38. n. 66. (lg) Epist. 38. n. 66. (lh) Epist. 38. n. 66. (li) Epist. 38. n. 66. (lj) Epist. 38. n. 66. (lk) Epist. 38. n. 66. (ll) Epist. 38. n. 66. (lm) Epist. 38. n. 66. (ln) Epist. 38. n. 66. (lo) Epist. 38. n. 66. (lp) Epist. 38. n. 66. (lq) Epist. 38. n. 66. (lr) Epist. 38. n. 66. (ls) Epist. 38. n. 66. (lt) Epist. 38. n. 66. (lu) Epist. 38. n. 66. (lv) Epist. 38. n. 66. (lw) Epist. 38. n. 66. (lx) Epist. 38. n. 66. (ly) Epist. 38. n. 66. (lz) Epist. 38. n. 66. (ma) Epist. 38. n. 66. (mb) Epist. 38. n. 66. (mc) Epist. 38. n. 66. (md) Epist. 38. n. 66. (me) Epist. 38. n. 66. (mf) Epist. 38. n. 66. (mg) Epist. 38. n. 66. (mh) Epist. 38. n. 66. (mi) Epist. 38. n. 66. (mj) Epist. 38. n. 66. (mk) Epist. 38. n. 66. (ml) Epist. 38. n. 66. (mm) Epist. 38. n. 66. (mn) Epist. 38. n. 66. (mo) Epist. 38. n. 66. (mp) Epist. 38. n. 66. (mq) Epist. 38. n. 66. (mr) Epist. 38. n. 66. (ms) Epist. 38. n. 66. (mt) Epist. 38. n. 66. (mu) Epist. 38. n. 66. (mv) Epist. 38. n. 66. (mw) Epist. 38. n. 66. (mx) Epist. 38. n. 66. (my) Epist. 38. n. 66. (mz) Epist. 38. n. 66. (na) Epist. 38. n. 66. (nb) Epist. 38. n. 66. (nc) Epist. 38. n. 66. (nd) Epist. 38. n. 66. (ne) Epist. 38. n. 66. (nf) Epist. 38. n. 66. (ng) Epist. 38. n. 66. (nh) Epist. 38. n. 66. (ni) Epist. 38. n. 66. (nj) Epist. 38. n. 66. (nk) Epist. 38. n. 66. (nl) Epist. 38. n. 66. (nm) Epist. 38. n. 66. (nn) Epist. 38. n. 66. (no) Epist. 38. n. 66. (np) Epist. 38. n. 66. (nq) Epist. 38. n. 66. (nr) Epist. 38. n. 66. (ns) Epist. 38. n. 66. (nt) Epist. 38. n. 66. (nu) Epist. 38. n. 66. (nv) Epist. 38. n. 66. (nw) Epist. 38. n. 66. (nx) Epist. 38. n. 66. (ny) Epist. 38. n. 66. (nz) Epist. 38. n. 66. (oa) Epist. 38. n. 66. (ob) Epist. 38. n. 66. (oc) Epist. 38. n. 66. (od) Epist. 38. n. 66. (oe) Epist. 38. n. 66. (of) Epist. 38. n. 66. (og) Epist. 38. n. 66. (oh) Epist. 38. n. 66. (oi) Epist. 38. n. 66. (oj) Epist. 38. n. 66. (ok) Epist. 38. n. 66. (ol) Epist. 38. n. 66. (om) Epist. 38. n. 66. (on) Epist. 38. n. 66. (oo) Epist. 38. n. 66

Job. Wilhelmi Albrecht (o), quam totam hic tibi describam oportet non ob varietatem modo, sed etiam ob illud quod adversus ceterorum Anatomicorum sententiam, consuetudinemque proposuit. In Vesica Urinaria robusti hominis per syphonem Wolfii Anatomicum sex distinctissimas separavi tunicas, quae protropici membrana ab Autoribus vulgo habentur. Quam vero muscularem appellant, non video, quo jure inter tunicas referri possit. Fibrae enim musculares in unam continuam membranam non coeunt, sed hinc inde collectae instar fasciarum unum digitum latarum, vel etiam angustiorum, vesicam amplectuntur, sine ordine sibi occurrunt, & ad diversos angulos se invicem secantes in membranis vel circa collum, vel circa ipsum sphincterem terminantur. Ego vero Auctorem neminem qui carneas vesicae fibras haud semel ea qua par est, ratione quaverit, non vidisse, credo, interstitia quae inter se relinquunt, eosdemque propterea, si forte interrogati essent, possetne ea fibrae sic inter se implicatae, ut areas, quemadmodum in Adversariis (p) designavi interstitia illa, comprehendant, possentne, inquam, reticularis musculi nomine appellari; non minus libenter affirmaturos fuisse, existimo, quam musculi urinae Detrusoris, aut quam musculosam propter eas fibras vocarunt illam vesicam membranam, quae ipsas sibi impositas, aut intertextas haberet, suoque interjectu conjungeret inter se. Vides igitur, quo sensu cum ceteris ego quoque membranam, aut tunicam carnosam dixerim, aut musculosam; cum ceteris, inquam. Et si enim is quem nuper merentes amissimus, Cl. Fantonus (g) viginti ante Albrechtum annis de iisdem fibris, eademque vesicae membrana haec scripsit, Completam vero membranam haec fibrae minime efformant; extensa enim vesica, multum distracta ab invicem occurrunt; non negavit tamen, quam fibrae non complent tunicam, interjectam ipsis membranam complere. Nec porro cum haec continuo subiecit, unde loquimur per intervalla earum fibrarum efflueret, ut exterior membrana densitate obstaret, interiori quandoque evasa; nec, inquam, propterea necesse est sic intelligere, quasi illa intervalla, si non densa, & firma, at tenui saltem membrana compleri, noluisse, praestertim cum docuerit, nihilominus ex tribus componi vesicam tunicis, quarum anteriorem peritoneum efformat, media carnosam est, intima nervosa ex candidis fibris densissime texta.

14. At membrana, inquis, sive tunica in illis interstitiis nulla est. Tu vero dic, quaelo, mihi, credidisse, si nulla esset, id summus inter Veteres Anatomicos non fuisse agnitus? Gravissimus certe, siquis alius, & perspicacissimus inter eos fuit Eustachius, quem animadvertisse interstitia illa satis superque ostendit Figura, qualis ea cunque est, quam vides sub numero VII. in ipsius Tabula XII. exhiberi. Num propterea e tunicis vesicae hanc de qua loquimur, exclusit? Imo vero diserte haec scripsit (r): vesica propria tunica gemina est, obtinetque exterior (de qua hic sermo est) fibras conspicuas crassas ac fere carneas, quae adeo varie quoque-versum distribuuntur, ut intuitibus multarum tunicarum speciem habere videantur. At enim, inquis, cellulosa telam, ut Veteres alii, a membrana non intertextabat. Nolo hic dicere, consuevisse illos res magis, ut in corpore humano inveniuntur, spectare, quam ubi aerem vi, ut Albrechtus, aut aquam impuleris, in qua resolvantur, attendere, quarentes videlicet, quales ab natura ipsa, & quare ita ut per se occurrunt, sint factae; non quoniam artificis redigantur. Satis est dicam, Eximium hoc tempore Anatomicum Winslowium (f) cum egregie nosset, vesicae carneas fibras inter se necesse per textum cellulosum, ideoque separari posse artificioso ope aeris immitti, sine ulla tamen dubitatione hanc musculosam ceteris vesicae tunicis annumerasse membranam, probe conscius, si quia membranae, pluresque partes eodem artificio queunt in cellulolum textum magis, aut minus manifestum resolvit, alio debeant, ac semper consueverunt, vocabulo appellari; multo hinc maiorem in Anatome tradenda confusionem, quam utilitatem, inestum iri. Utique si nunc imponenda essent nomina quae Facultatis huius Parentes, aut qui olim auxerant, primi imposuere, non dubito, quin plura excogitari possent meliora, & cum vero magis congruentia. Sed praestat, opinor, verum postea animadversum, docere, vetera autem, &

usitata vocabula retinere. Sic cordis venosis orificiis quae, & qualis, & quam varie ad imum divisa membrana subiacitur, opportune tradere non omitto; sed cum a Viris Solertissimis nuper imposita nomina valde probem, ipse tamen Tricuspidum, & Mitralium valvularum con-fuetis nominibus uti pergo, & dexterum, sinistrumque cordis ventriculum tanto libentius dicere, quod illorum aliqui diserte fatentur, se, cum eos designare novis aliis appellationibus maluissent, ab auditoribus vel bene Doctis non fuisse intellectos. Sed ut intentioni huic meae, si non laudem, at veniam saltem non esse negandam spero, ita hanc etiam spero, si Prostatae ausim, quemadmodum vidisti, inter glandulas adhuc referre, quod non modo ceteros, sed vel ipsos qui glandulis bellum indixerant, & fecisse, & facere, ignorat nemo. Qui nimirum est non omnes Prostatae partes fecerendo, aservandoque peculiari ipsius humori aptas esse posse, sciebant; ex huius tam glandulosi tubulis pene totam compingit prostatae, cognoscebant; ut verbis utar Santorini, qui non id solum eodem quo supra laudavimus, capite (t), sed & ejus glandulae musculum Levatorem, & Ligamentum, & Capsulam descripsit (u). Quanto autem plures, & confertiores sunt ii tubuli, tanto magis Prostatae inter glandulas retinendam esse, constat, & mea quaedam confirmatur opinio de causa cur Seminalium vasorum extrema, & tenuior pars per eam glandulam traducatur, nempe ut dum ii tubuli per venerem deplentur, simul vasorum illorum compressio assidua remittatur, semineque conclusum ejiciatur.

15. Sed ut redeam ad urinariam Partium Morbos; cum ea nuper legerem quae haec mihi pro me & pro aliis qui ad eundem modum & sentiunt, & loquuntur, haec, inquam, mihi interijcendi necessitatem attulerant, in illum quoque locum incidi ubi indicia proponuntur, Ischuria cujusdam, quae valde frequens esse dicitur, Mediae inter Renalem, & Vesicalem, sedem videlicet habentis in ureteribus extremum in modum ab lotio dilatatis, quod desuere in vesicam non possit propter illorum vehementem ad inflectionem strangulatum. Indicia autem haec afferuntur, conjunctus cum Ischuria dolor sordus, & sensus quidam ponderis in lumbis propius vesicam, quam renes. Extant quidem, ut nosti, non pauca ureterum dilatationis exempla, alia ab aliis causis quae illos ad inflectionem aut stringant, aut etiam obturent. Verum si tandiu haeruerint causa, ut extre-mum in modum eos possit urina dilatare, multo prius quam hoc fiat, jugiter secreta urina tenuissimas intra re-nes semitas sic opplebit, ut vim his afferat, & eam quae ibi fit, secretionem, premendo impediendo cito adeo, ut vix tempus sit Mediae illius Ischuriae signa animad-vertendi ab signis disjuncta, quae illa obscurant, ejusmodi Ischuriae Renalis: aut si Mediae indicia vel ante, vel postea adnotare satis liceat; certe si erunt propiora vesicae, quam renibus, non in lumbis, quos re-nes ipsi occupant, sed infra lumbos percipiuntur. Sed alia, nedum ista, ex conjectura, non ex observatione, proposita, libens omitto, ut potius inter plura quae sin-genue commendo, unum laudem, unde potest inter ca-teras illas tum incontinentiae urinae, tum Ischuriae Ves-icalis causas quae ad sphincterem attinent, nova quaedam referri. Quot, & quam varia de sphinctere vesicae ha-ctenus sint tradita, non ignoras, propter quae, meaf-que ipsas, alias alio tempore habitas, Observationes, ego quoque alias aliter de illo sentire coactus sum. Nunc autem cum pro sphinctere proponi videam fibras eas ipsas quae ad vesicae orificium fixae non musculi, sed li-gamenti natura, suo ipsa elatere circum prementes, urinae exitum intercludant, donec validioribus potentis urinae expellentibus cedant, hisque cessantibus suapte vi elastica se continuo restituunt, & ad pristinum of-ficium redeant; ipsa mihi se res simplicitas commendat, & quomodo fibrarum illarum distractioni, erosioni, in-cisioni impotentiam retinendi lotii imputare possim, ostendit. Nec minus placet gravis utique difficultatis solutio. Nam si nullum est in ligamenta, sed in muscu-losa dumtaxat partes voluntatis imperium; qui sit, di-xisses, ut pro arbitrio hominibus liceat urinae vel in medio cursu statim cohibere? Responsum est igitur, id licere non propter fibrarum illarum, sed propter mus-culi Levatoris ani contractionem sua illa parte quae in-culi Levatoris ani contractionem sua illa parte quae in-ter Prostatae, & urethrae bulbum huius subijcitur anas- instar.

instar. Quam ego musculi illius partem pseudosphincte-ris vesicae nomine designaverim, quod tamen nomen sphincterem supponit, qui nullus est. Verum ego ut intelligerem, eo nomine usus sum quo usi illi erant, ad-versus quos ibi disputabam: quanquam si forte ipse no-men istud; a qua consuetudine longe semper abui; ve-teris loco imponere voluissim; non video, qui confe-queretur, vesicae sphincterem supponi, cum satis sit, ve-ros alios sphincteres alicubi non deesse, quibuscum non verum conferens, hunc possit quilibet pseudosphincterem appellare. Illam igitur praecipue partem, si urinae pro arbitrio cohibet, posse, intelligi, si convulsione ali-quando corripiatur, ischuriam Vesicalem asserere tanto facilius quod etiam pro voluntatis imperio diutius ad re-tinendam urinae contracta, saepe istam ipsam ischuriam induxit, num sola, an cum aliis quoque musculis quos tunc iisdem ani Levatoribus Cl. Gysbertus Beudt (x) accensendos credidit, aut quos alii credidere, & praeser-tim Cel. Winslowius in calore suae ventris fatis lau-dat Explicationis Tractatu de Nentre (y) adjungen-dos describens, ab ipsis docuit formari in parte, & for-tasse praecipue id quod sphincter vesicae appellatur. Et si enim in iis quae nuper proposita sunt, simplicitatem

praestertim laudo; tamen in praesentia rem arbitrio relin-quo tuo, quippe morem conservans meum, & pro cer-to habens, si quid immerenti alioquin mihi ab Sum-morum Virorum benignitate donatum est, fecisse id ipsos non quod celeriter quidquam statuerim, sed quod lente festinaverim, imo ubi subsistendum esse, credi-di, ibi subsisterim donec satis repetitae observationes, & nunquam praetermittenda eorum lectio qui ante me idem fortasse in quo ego haerebam, pervidisse, & scri-psisse poterant, non amplius subsistendum esse, docue-runt. Utrumque autem, si unquam alias, certe nunc faciam. Prius enim quam istam quae novissime propo-sita est, uvulam ceteris quae secundum naturam sunt, Partibus adjungam, quid de ipsa visum interea fuerit aliis, legam, iis dico quibus nihil jure negari possit de tot adjumentis quae in magno, si ingenue loquimur, Anatomico requiruntur, simulque ipse, quantuluscu-que sum, ad eas quas retuli, alias addam perquisitio-nes. Quorum exitum fideliter tibi post absolutas inse-quente hyeme dissectiones significabo (z).

16. Cetera vero quae, sicut initio harum Litterarum promisi, ad morbos Genitalium attinent Partium, quam primum potero, perscribam. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LXVII.

Ad Partium utriusque Sexus, & Muliebris praestertim, Genitalium attinet Morbos.

Quae de Ventris Morbis scribenda restant, ad Ge-nitalia utriusque Sexus attinent Partes. Sed ple-raque erunt de Muliebris.

2. De Herniis quae in scroto accidunt, postquam ad te scripseram (a), dissecio prodit, a Cl. Richerzio (b) habita, quam, si legas, & accuratam, & ad chi-rurgicam curationem esse utilem, cognosces. Apud eundem (c) herniam quoque peculiariem videbis, an post ortum natam, an potius congenitam, in puella videlicet semestri, cujus ovarium sinistrum, & tubam adjectam intra eum sinum invenit per quem Teres ute-ri ligamentum & pelvi egreditur. Sed haec ad bubono-celas est referenda. De quibus, & de Ventralibus si hic sermo esset instituendus; duas inter ceteras commemo-rarem ob ea quae dilatatis intestinis continebantur, me-moria dignas, quae in Historia Regiae Scientiarum Pa-riensis Academiae (d) propositae sunt.

3. Ad ea autem quae de Uteri descensu, & excisione scripsimus (e), Sclenckeri (f) Observatio spectat illius descensus ob laxata ligamenta ab imposito ovarii pon-dere, quod amplificatum, & lapideum factum erat. Sic Abr. Vaterus (g) idem alteri mulieri accidisse viderat a gravante ovarii praegrandis tumore. Ex quibus ut per dissectionem confirmatur, utrum ipsum intra vaginam descendere, & quae causae interdum id faciant, osten-ditur; ita ex Cl. Kalfschmiedii Observatione (h), si ve ex inverso utero magnum excidit scirrhum, si ve molam scirrholam, cum utero certe ita cohaerentem, ut cunctello opus fuerit quo excideretur, suspicio nimi-um augeri potest deceptionis eorum qui minus quam hoc, illustri tempore utrum ab se amputatum fuisse, crediderunt.

4. Et si vero ubi de Hysterica Affectione verba feci (i) diserte professus sum, nolle me cum iis altercari qui illam ab Hypochondriaca distinguendam esse, con-tendant, neque cum iis qui contra negant; memineris tamen, generatim laudasse qui utramque ad nervorum passionem referunt. In hac me sententia magis magis-que nuperrime etiam confirmavit auctoritas Praestantissi-mi, & erga me Humanissimi Viri Comitis Sylvestri Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

Ponticelli, in Parmensi Aula Archiatri, & Consilarii Meritissimi (k), ut aliae quoque aliorum confirmave-rant Observationes, in iisque duae Docti Viri Antonii Fracassini (l), & praestertim altera quae cum dissec-tione cadaveris juncta est. Legendo quae, & qualia, & quomodo in descriptis duobus illis viris contigerint, cuc hoc dixerim, facile conjicies.

5. Nunc ad ea transeamus in quibus paulo amplius im-moremur, nempe ad ea quae spectant ad Veneris Impe-dimenta, & Sterilitatem. Cum de illis in maribus ser-monem habentes, urethrae vitium perpendamus non can-nalis forma, sed dimidiati canal, per inferiorem penis faciem productae, Salzmanni quoque Observationem me-moravimus (m) urethrae in femicanalis modum, sed per oppositam faciem, id est per totum penis dorsum aper-tae. Quam urethrae, quantumvis non aperte, sedem cum Ruyschius non bis, ut ille ait, si attente rem conside-res (n), semel dumtaxat viderit, & id se nunquam an-tea observasse, fateatur; non dubito, quin tibi gra-tum facturus sim, exemplum alterum communicando quod ab se A. 1758. accurate perspectum narravit mihi Joannes Gianella, Caroli Professoris quondam hic Em-eriti filius, ipse quoque olim auditor meus, tum morum, tum ingenii, & diligentiae causa dilectus, nunc Lem-niaci multa cum laude Medicinam exercens.

6. VIR erat ex Lemniacensi agro, qui tamen her-maphroditus esse dicebatur, tamen a muliere quae se gra-vidam ab ipso factam aiebat, in iudicium vocatus, non se defenderat, eamque dotaverat. Is cum sibi postea ux-o-ris quaereret, a fratre autem, ab aliisque tanquam ma-trimonio minime aptus deferretur, & Medici proximae Civitatis non ignobiles qui genitalia illius inspexerant, delationem confirmassent, repulsa dolore incensus, litibus-que cum fratre implicatus, ob has curas in adeo gravem incidit morbum, ut vivendi finem fecerit. CADA-VERIS inspicendi, non dissecandi, copia facta, scro-tum, & testes sede, magnitudine, & forma omnino se-cundum naturam apparuerunt. In pene autem, qui cetero-quin nec parvus erat, neque in vivo flaccidus fuisse vide-batur, haec desiderabantur, ne sursum ad abdomen conver-

A a 4 fus,

(g) Observat. Anat. 5. 5. (p) III. Animad. 36. (q) Anat. corp. hum. Dissert. 7. (r) Tract. de Renibus 6. 19.
(f) Exposit. Anat. 11. du bas Ventre n. 451. (t) 10. 5. 22. (u) 5. 17. 20.

(x) Dissert. de Fabrica, & Usu Viscer. Uropoieticor. Class. 3. (y) n. 650. & seqq. (z) Vid. Epist. totam 70.
(a) Epist. 43. & alibi. (b) Observ. Viscer. Abdom. labis Epist. Obs. 1.
(c) Obs. 3. (d) in Obs. Anat. A. 1752. n. 5. & A. 1753. n. 7.
(e) Dissert. 45. (f) De Singulari Ovar. Morbo in Proemio, & 5. 19.
(g) De Mola scirrholia in utero inverso extradata.
(h) Epist. 45. n. 17. (i) Tract. di tre Specie di Affez. Hster. e Ipocondr.
(j) Naturae Morbi Hypochondr. &c. Investigat. P. 3. c. 1. (m) Epist. 46. n. 8.
(n) Theat. Anat. 3. n. 5. not. 1. & 2. & n. 22. not. 1. 2. 3.

376
sus, neve glande, quæ naturali erat magnitudine, & figura, prorsus fuisset imperforata, denique ne urethram insolita brevitate, & sede, & constitutione haberet. Neque enim ad glandem usque perveniebat, neque per inferiorem penis faciem, sed per dorsum, ferebatur, neque perfecti canalis, sed semicanalis in modum aperta erat; ut canaliculorum meorum ostia quæ in opposito, ut solent, pariete cum esse non possent, in eo qui non deerat, statim oculis obvia fierent, quippe, quam in aliis sunt, ampliora; quibus inspectis, minus fuit mirum quod aiebant, hominem olim fuisse infectum gonorrhoea virulenta. Porro ejus semicanalis initio, quod reliqua parte erat latius, quadam imminuebat, ut matri, aliisque mulierculis videri olim potuerat, vulva, sed nulum ad hanc pertinebat foramen, nisi quod in semicanalis initium urinam ducebat, quam inter mingendum e semicanali exundare consuevisse, & sic aliqua sui parte conspurcare hominem, fatis aliunde constabat; non item quid ejaculato semini accideret, cui per illud idem foramen in semicanalem erat transeundum. Et foramini quidem specillum adhibere, id cavum ad vesicam attingere, per dissectionem autem id quod conjiciebatur, & cætera perspicere, minime, ut dictum est, licuit.

7. Cum hæc Gianella narrasset quæ videre ipse in eo viro potuerat; tum de multo admirabiliore in quadam muliere genitalis ostii sede, cujus imaginem tantum conspexisset, rem autem pro certa, & testata a Lemniacensis audivisset, narrare in hunc modum perrexit. Ante annos circiter quadraginta ancilla erat domi Patricii Veneti, qui Lemniaco præerat, confervo nupta; sed eam quam indicavimus, partem non eo quo debebat, loco, verum supra umbilicum habens, eamque angustam. Gravidam tamen facta, cum parere non posset; Chirurgum accessit, qui viam infanti, frustra exitum querenti amplificaret: quod ita præstitit, ut ab ima ostii illius parte sectione ad os usque pubis producta; siue omnino ex imperitia, sicut ibi creditum est, siue potius quod non satis sibi nota, cæsarea, quam vocant, sectione uti in animo haberet, infans, quod constat, servatus sit, & mater quoque post longam curationem tandem per sanata. Quid vero huic postea acciderit, quoniam cum marito; neuter enim indigena erat, inde discessit, Lemniaci quidem ignoratur; at certe, quod unum ad hoc propositum satis est, ibi adhuc imago extat, quam mulieris Medicus reliquit, illius abdomen, sicut ante sectionem erat, fideliter representans.

8. Nunc quando verba fieri de feminis cepta sunt, minus matrimonio idoneis; quæ ipse in duarum dissectione, non de sede quidem, sed de occlusionione, genitalium observaverim, continuo subjiciam.

9. MULIER annos nata septuaginta, jam diu propter asthmaticam affectionem in Nosocomio jacuerat; cum peripneumonia accessit, eamque sustulit circa medium Martium A. 1752. CADAVERIS macilentis pulmones detraxerat Mediavia, quos revera duos fuisse, affirmabat. Nonnullas vero alias Partes ego Studiofis Adolescentibus ibidem postea demonstravi, in Capite præsertim, & Genitalibus. Et in illo quidem nihil animadverti quod præter naturam esset, nisi tendinis Trochlearis musculi alterius oculi cum sua trochlea coactum; ut retrorsum trahentis digitos musculus non sequeretur.

In Partes autem quæ generandi causa creatæ sunt, multo plura quam voluissem, deprehendi ab naturali constitutione prorsus aliena. Primum enim de Falloppianis tubis altera extremo suo fimbriato ita cum teste coalescerat, ut interpositum fimbriarum osculum non appareret; altera autem illud osculum impervium habebat, suamque proximam partem immobilem propter alam vesperilionum, quæ ibi non, ut solet, latior, sed perangusta, tubam ad testem annexabat. Uteri parietes erant craffi, eorumque sectio vas sanguiferum, seu mavis finum comprehensum intra ipsorum substantiam ostendit ad transversum pollicis longitudinem, diametro autem sesquilineam uncie Bononiensis æquante; in eo sinu pauculum concreti sanguinis vidimus. Interior uteri superficies tota erat levissime humida; in fundo, & in cervicis infima parte fusca, in reliqua autem albida; quæ cur hic memorem, infra dicam. Eadem infima cervicis pars erat equo angustior, & uteri osculum parvum. Cum specillum per hoc vellem in vaginam aliquidque ostendat, ut infra dicam, ne infra osculum, nisi extrema sui parte, descenderet. Itaque per orificium vaginæ immittere specillum coactus sum. Verum ultra digituli transversum intervallum cum transire non posset; vaginam sequendum longitudinem profunde incidi, ut, si cavum

esset aliquod, in conspectum veniret. Cum frustra sic quærerem; tum non uno loco totam in transversum vaginam dissecui; sed nusquam apparuit cavum, & nec a vi vestigium quidem. Vagina rota; si initium, & finem exciperes; omnino erat solidi cylindri instar, ex substantia facti ubique pariter alba, & duricula; ut parietes, cum eo quod includebant, continuatos, ab hoc ipso internoscere non liceret. Cum hæc vaginæ acciderunt; nihil quidem, si exterius aspiceres, de sua diametro amittisse videbatur; sed longitudinis amiserat tantum, ut cum ab ejus orificio ad summum uterum intervallum esset digitorum transversorum octo; tres dumtaxat illa æquaret, quinque reliqui ad uterum attinerent, sic tamen, ut contra ac solet, cervix longior esset, quam fundus. Cæterum ipsa neque ullas veliculas, neque ullos qui introforum extarent, lacertos habuit. Frustra autem in ea, frustra in fundo, frustra in vaginæ, ubi obturata non erat, extremis; quorum inferius omni hymenis carebat vestigio; frustra denique in reliquo naturali ullius cicatricis indicia a nobis quæ sita sunt.

10. Attamen hunc tantum vaginæ coactum aberosione, aut ablacione aliqua, aut nullo modo, aut negligenter curata, fuisse, credo, puta ab ultimo partu; nupta enim mulier fuerat, annis antea non multis virum amiserat, quocum in matrimonio vivere; imo ne vivere quidem, sic clausa a primordiis vagina, potuisset. Quomodo enim censes, menstruum sanguinem, qui ab illiusmodi utero non scaturisse florente ætate non videtur, intra ejus cavum sine perniciem mulieris potuisse retineri? Ego certe vix intelligerem, qui posset humor, ut per paucos, & tenuis sit, quo secundum naturam, ut in hac quoque femina vidisse me, dixi, intus leviter madet uterus, huic labem non attulisse, nisi per lymphæ ductus, aut alia abforbentia vascula reveheretur. Sed hæc num sanguini quoque, & ea copia qua scimus in uteri cavum singulis mensibus influere, abducendo paria esse, existimabis? Quod vero de hac, idem ferme de muliere etiam altera ex te quæro, cujus tum fuerat in Gymnasio cadaver dissectum vix duobus ante mensibus, & hæc quæ sequuntur, a me adnotata.

11. ANUS in Nosocomio decesserat non ex alio, quantum apparebat, morbo, quam deficientium sensum virum; nec mirum in ea quæ annos exegerat nonaginta duos.

CORPUS erat strigosissimum. Ex Abdomine duæ prominebant herniæ, altera in medio hypogastrii, quæ puelli caput æquabat, altera ad prioris lateris dexteram. Utrique inerat pars intestini Ileii, minori vero pars omenti quoque: quæ nisi quod herniarum faccis adhærebant, nihil præterea habebant vitii. Ventriculus æquo inferior visus, an quod dorsum tractus fuisset ab illa omenti parte, herniæ, ut diximus, inclusa, an potius ab aliis causis, & in his quadam glandula, ut a primo videbatur, prope lienem omento innexa, magnitudine, & forma ovi majoris columbini. Quam cum paulo attentius inspicerem, & lienem alterum esse, suspicarer; suspicionem luculenter confirmavit dissectio, & cum proximo lienis collatio; eadem enim prorsus utriusque structura, & substantia fuit. Minorem crassiuscula omenti adibant sanguifera vasa. Majoris arteria erat magna; sed vix levissime flexuosa, neque in tanta ætate duri quidquam habebat; ut neque, si Iliacas excipias, alia, quæcunque examinavi, arteriæ aliquid ossi habuere, neque cordis valvulæ; tametsi quæ Aortæ præficiuntur, contractiores erant, & nonnihil vitiata. Erat tamen, quantum in ventre est, ipsius Aortæ truncus ad ossificationem dispositus, quippe superficie ubique propemodum tum albis maculis, tum inæqualitatibus quibusdam distincta, idque interius. Propterea autem idem truncus hoc habebat insoliti, quod statim infra Emulgentes se ad tractum inflectebat duorum, aut trium digitorum: quæ inflexio vertebis imputari non poterat, ut quas recte positas, & bene se habentes videbam. Sed ad viscera ut redeam; Mesaræi glandulæ neque exiguæ erant, neque duræ, neque atro, exterius saltem, colore, sed rubello: Vermiformis Appendicula duobus transversis digitis brevior, & tenuissima, & omnino solida, ut nunquam cavi aliquid habuisse videretur: jecur autem num semper fuisset sanum, facile dubitasset. Lobus enim dexter quæ jam sinistro propior erat, & unde se præter morem extendere deorsum pergebat, faciem convexam ostendebat nec levem, & subalbam, quam si ibi ad aliquam profunditatem secares; eundem colorem, substantiam autem funditatem accedentem ad ligamenti naturam. Reliquæ inveniæ accedentem ad ligamenti naturam. Reliquum est, ut de Genitalibus, quemadmodum pollicis sum, dicam. Tuba utraque ita suo quoque cum ova

rio connata erat, ut neutrius fimbriarum, nedum osculum, quod inter eas est, apparerent. Intra ovaria autem erant hydatides. Uteri fundus cum sectus esset: in medio posterioris faciei conspecta est altiuscula subrotunda excrecentia, quæ a primo quasi ex vesiculis facta videbatur; secta autem, ex solida uteri substantia constare inventa est. Cum specillum a fundo vellem in vaginam transmittere, nec possem; cervicem incidi, comperique hujus infimæ partis ad brevissimum tractum, sed & osculi ipsius uterini parietes sic inter se coaluisse, ut nullus, nisi forte aliquis tenuissimus, transitus superesset.

12. Coalitus hosce a difficili partu laceratione, ut dixi (o), aliqua relicta, facile induci posse, illud fortasse comprobatur; quod in utraque muliere tubarum occlusio, & cum ovarii concretio reperta est. Abrahamus enim Cyprianus (p) ad eundem modum, sicut adjecto quoque Iconismo (q) ostendit, tubas se habuisse, animadvertit in femina quæ ex partu quarti difficultate, multoque etiam magis ex imperitæ obstetricis violentissima traktionem cum in gravissimum uteri, & huic annexarum illarum Partium inflammationem, ut indicabant acerbissimi ventris, & præcipue circa lumbos dolores conspecta esset, & vix tandem evasisset, de fecunda sterilis quæ ad vixit, vixit autem annos decem, facta erat. Sed hæc, eadem, aut alia simili de causa mulieribus, atque utinam paucis, accidit quæ per se fecunda fuerant, & porro essent. Nonnullis tamen viarum quæ sunt ad gignendum necessariæ, occlusiones, aut impedimenta a primordiis esse, constat, neque abditurum tantum, sed earum etiam quæ visui, aut tactui obvia sunt, ut alias (r) commemoravimus. Hujusque generis ex Cl. Boehmero quoque (s) exemplum duplex habebis. Qui ut Virginem dissecuit quæ muliebri prorsus carebat orificio, cum cicatricis vestigium apparet nullum, sic & Mulierem incidens, cui maritus nunquam potuerat conjugale præstare officium, apertum quidem genitalis ostium invenit: sed unius loco vaginas duas, ad bipartitum, ut in vaccis, ovibusque, uterum pertinentes, adeo quantum intelligere licet, angustas, ut neutra viro excipiendo par esset. Sed ex his insipienti, aut tangenti non occultis five occlusionibus, five impedimentis sunt quæ tolli possint, & quæ non possint. Tolle enim facile possunt quæ in membrana, vaginæ orificio præterita, consistunt, aut in ejusmodi quasi infitis per quarum unam in Virguncula colligatos inter se, quemadmodum ad te scripsi (x), vaginæ parietes offendi. Quæ vero ejusmodi sunt qualia in nupta illa ex Boehmero indicabam modo, quis tollat?

13. Adventitii autem coacti, aut occlusionis causam non ab laceratione dumtaxat, aut ab inflammatione, sed ab erosione quoque esse posse, tum supra, tum alibi a me agnitus est, five erosio luem Veneream, five uteri fluorem consequatur. Ab hoc enim prægresso vel in Virginitate integerrimis, qualis erat illa cujus tibi dissectionem scripsi Epistola XLVI. (u) licere, credo, siquis forte velit, membranam subalbam repetere, quæ infimam cervicis partem, uteri osculo proximam, occludebat. Sed is fluor ex acrioribus sit, oportet; non ex frequentioribus illis de quibus meas plures Observationes ad te misi Epistola XLVII. Cum iis conjungere poteris quam subjicio, quamvis ob alia, quæ continebat, majoris momenti, libentius misissem eo tempore, si jam tunc habuissem, quo Epistolam scripsi LX. LXII. LXIII.

14. FEMINAM annos natam circiter sexaginta apoplexia confecerat intra quatuor, haud amplius, dies. Quorum tres cum domi exegisset, quarto denique in Nosocomium intulerunt jam toto corpore ab suo morbo adeo oppressam, ut indicium aliquod gravius in latere sinistro resolutionis peti non potuerit, nisi a vena quæ domi secta a dextris fuerat. Anatomen in Gymnasio tunc docebam ea frigidissima tempestate quæ sub Januarii finem A. 1758. permolesta omnibus esse pergebat, illuc quæ cadaver est importatum, cujus ut pleræque antea partes, sic præterea cerebrum dissectum est, idque octavo circiter a morte die, cum adesset Cl. Vir. Caldanus qui Bononia huc venire, meisque omnibus ejus anni Publicis Exercitationibus pro sua erga me humanitate interesse voluit.

CALVARIA cum meningibus Crassa arte adeo cohaerebat, ut sine validissimis conatibus avelli non potuerit. Per meningem Tenuem vasa erant sanguine distenta. Substantia cerebri exsucca erat, & dura, vi, opinor, summi Morgagni de Sed. & Caus. Morb. Tom. II.

frigoris, quæ certe cruentum serum, quod multum in sinistro Laterali ventriculo offendimus, congelaverat, in plurimasque lamellas concreverat. Porro etiam in posteriore ejusdem ventriculi extremo aliquantum sanguinis erat nigri, concreti, & durioris, ibique ventriculi basis videbatur quasi in cavum subfuisse quod eum sanguinem contineret; tamen ea feri quam dixi, copia eum extitisse tam paucum sanguine non posset; conieci, & ipsum, & maximam feri illius partem per disruptum Lucidum septum in ventriculum sinistrum ex dextero transiisse. Nec me conjectura fessellit. Aperto enim dextero, nihil feri, nisi aliquid forte erat in extremo anteriore, tantum vero sanguinis conspectum est, qualem in sinistro descripsi, atri, concreti, imo eam quam gelu inducit, duritiam nacti, ut hunc ventriculum totum dilatatum plurimum, cerebri substantia non ad basim tantum, sed etiam in externo latere vehementer extenuata, viderimus. Nihil autem in cerebello, nihil in medulla Oblongatæ facie exteriori vitii apparuit. Sed quod erat in basis ventriculorum, dexteri præsertim, facie interiore quantum, quale, & quibus potissimum in illius esset partibus cum propter sanguinis magnam effusionem, tum propter congelationis præcipue effectus, fatis discernere non potui. Thorax, qui antea apertus fuerat, bina, ut alias videram, pro uno qua Cava trajicitur vena, in diaphragmate ostendit foramina. In pingui autem corde, quale & reliquum corpus sic satis fuit, parvas ossæ squamulas animadverti ad valvulas Aortæ subjectas, & ad proximam ejusdem arteriæ faciem anteriorem, neque ibi dumtaxat, sed & passim in trunco reliquo. Imo qua parte desinebat ejus arcus; quæ pars, & arcus ipse erant dilatata; conspiciebatur insuper quadam superficie inæqualitas, colorque alius.

Ventrem autem dissectantibus in ejusdem arteriæ trunco tum lamellæ ossæ, tum superficie inæqualitates occurrebant majores, quin etiam passim erosionum sanguinolentarum species: quæ omnia & per Iliacas propagari conspeximus. Sed & Crurales quæ per femina descendeant, rigidiore erant, & intra sinum poplitis, quod in una saltem animadverti, ossæ. Nec in altera certe Carotide bracteolæ ossæ defuerant, nec in Spermaticis ipsis arteriis durities, quæ inchoatam ossificationem indicabat. Muliebri denique Fluori, unde occasio exitit hanc ad te Observationem his Litteris mittendi, feminam laborasse, non pauca indicavit crassa, & ex albo ad cinereum vergens materia, quæ cervix uteri, & proxima vaginæ pars sedebantur. Infimam autem hujus partem, ipsumque orificium, quod erat amplissimum, hujusque inferiorem viciniam cum rubere vidissem; inde propterea ad superiora scalpello pergens, tum materiam illam conspexi, tum osculum uteri, cervicemque ambo æque latissima. Per uterini autem fundi anteriorem superficiem, quæ erat cæteroquin levis, transpexi sanguiferam vasculam nec pauca, & conferta, & nulla certa norma disposita, quæ, subtus appressis digitis, & sanguine intumescebant quasi erupturo, non secus atque in iis videre solitus sum quæ nuper in menstruis fuerint.

15. Haud abimilem vasculorum constitutionem is, puto, videret qui narium interiorem membranam inspicere coryza affectam; cum hac enim affectione uteri fluorem istiusmodi convenire; Medicos agnovisse veteres, nedum recentiores, a me satis alibi (x) scriptum est. Satis etiam de cæteris scripsi quæ in hac quoque sunt dissectione animadvertenda ad Apoplexiæ Sanguineæ, & Hemiplexiæ causas attinentia. Quin alias (y) tibi effectus etiam gelidissimæ tempestatis significant intra cadaveris cranium a me deprehenso; quibus cum postquam hosce alios contuleris, tempestate minus aliquanto frigida adnotatos, utrosque autem cum dissectione, a Cl. Lipsiensis Professore Quelmalzio (z) in sene habita, quem mense Januario iter habentem frigus vehemens extinxerat; miraberis, huic in cerebri ventriculis lympham dumtaxat viscidam, non gelu concretam, fuisse: nam etsi blando calore solum antea cadaver fuerat; tamen cum in priore quoque illo nostro id vel magis factum esset, non propterea illud quod in ventriculis iisdem concreverat, serum est regelatum, nec sane ille a nobis dissectus senex, aut hæc anus vi frigoris in itinere oppressi fuerant, sed in Nosocomii lectulis uterque mortui; ut credere debeam, vel frigus quod interemit Quelmalzio senem, non acre adeo, ut tunc nostrum, fuisse, vel potius cadaver illud multo citius quam nostra quæ in aperto jacuerant, in tepidum locum esse translatum. Quod vero ad vitia arteria-

(o) n. 10. (p) Epist. ad Millington. (q) Tab. 1. (r) Epist. 46. n. 11. & seqq.
(s) Vid. Act. Erud. Lips. A. 1758. M. Januar. (t) Epist. 50. n. 51. & seqq. (u) n. 37.
(x) Epist. 13. n. 15. (y) Progr. quo frigoris acrioris in corp. hum. effectus expend. (z) Epist. 47. n. 13.

feriarum attinet, in anu eadem animadversa, meminisse potes, quot in cadaveribus viderim, & quot inde repetierim circumfessionis sanguinis detrimenta (a). Ea autem vitia cum hic in arteriis magis fuerint inferioribus, minusque propterea sanguis posset per has facile moveri, tanto majori copia crederem in superiores compulsum, intra anus cerebri effusum fuisse. Cum vero animadverteris, quo longius a corde arteria descendebat, eo lamellas offeas habuisse majores; noli statim cum iis facere, qui Boerhaavio id obijciunt, a validiori, qualis propius cor est, sanguinis impulsu deducendi arteriarum officinationem, eorum memor quæ responderi posse, non uno loco indicavimus. Neque enim semel idem quod in muliere ista, vidimus; tametsi nunquam in tot arteriis, in quot Cl. Buchwaldio (b) videre contigit. Qui cum in decepto sene arteriam Magnam a corde ad curvaturam ferme totam, cartilagini dumtaxat haud multum dissimilem, inde vero per universum propemodum corpus suis cum ramis offeam factam deprehenderet, singulare illud animadverit, quod extremitatum arterie, quo magis ad manus, & pedes accedebant, eo magis officinate fuerant. Cujus senis incommoda, & mortis genus utinam sic addere potuisset, ut ejusmodi constitutionum signa aliqua per conjecturam attigerit in adjuncta Ætiologia (c).

16. Nunc ab his sexus utriusque communibus morbis, ad feminarum proprios esse redeundum, nisi de ipsis longissima illa Epistola XLVIII. tot scripsissem, ut vix de infelici aut uteri gestatione, aut partu sive quod ad matrem, sive quod ad foetum attinet, hæc habeam adjicienda. Et de gestatione quidem; ut omittam, me non penitere eorum quæ attigi super vi maternæ imaginationis in foetum, postquam in quadam incidi quæ a Viris Doctissimis prodierunt, nihil magis ostendit, quam ne ingeniis quidem excellentibus licere in quibusdam exemplis quæ neque possunt negari, neque intelligi, aliter explicandis difficultates effugere, quin se in majores, si quæ ex propositis consequerentur explicationibus, spectare velis, plane conijciat; ut igitur hæc omittam; inter Boehmeri, quas sapius, meritoque laudavi, Observationes (d) præter alias ad affectionem hypochondriaco-hystericam, ad ovarii hydropem, ad infantem cum hydrorachitide natum pertinentes, unam legas, huc maxime spectantem, qua numerum augeas foetuum in Fallopii tuba deprehensorum. Infelicitas autem partus, aut puerperii Observationes Cl. Kierlingius (e) protulit duas, quas, ut illas, Sepulchreto addas. Altera puerpera est, quam nono a partu die inflammatione uteri extinxit. Altera autem parturientis, cui gemini infantes vitam, ut sibi quoque, ademerunt. Mihi vero nullam, quæ huc attineat, habere contigit præter unam, quæ tibi, qualis qualis est, describetur eo libentius, quod alias (f) id fortasse me facturum promisi.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LXVIII.

De Febribus quædam; de Tumoribus autem plura adjiciuntur.

POST Epistolam XLVIII. quæ de Morbis Ventris ultima fuerat, cæterarum quas deinceps ad te dederamus, argumenta ad eos Morbos spectabant, qui aut in totis corporibus sunt, aut si in partibus, Chirurgum magis, quam Clinicum, postulant. Nunc igitur ordinem quem tunc sequebamur, conservaturi, a Febribus initium, & a Tumoribus repetemus, de primis quidem perpauca, de alteris autem aliquanto plura verba facientes.

2. Quod ad Febres attinet, cum per alium ipsis adjunctum morbum noceant potissimum, atque interficiant, imo etiam sæpe ab ipso oriantur, & conserventur; facile intelligis, quanti referat adjuncti hujus morbi sedem, naturamque cognoscere. Verum sicuti diffectio interdum sub oculos utramque hanc ponit, ut viscerum inflammationem, aut ulcus aliquod; ita haud raro neutram offendit, cujus rei exempla obvia sunt, & nos cum de Febribus ad te scriberemus (a), eorum quædam ex Valsalvæ schedis produximus. Quod tunc magis dolendum est, quando in iis febribus, ut sæpenumero contingit, quæ & perniciosiores sunt, & plures eo-

17. FOETUM, aliunde adveclum, eumque feminei sexus, studiosi Juvenes ad me attulerant, ut in Nosophorio dissecarem, circa medium Martium A. 1751. Qui illis dederat, novimestrem esse, dixerat, duas vixisse horas, ejusque mortis parentis mortem paulo post successisse, quo morbi genere, sibi ignotum, at certe ante biduum hæc accidisse. Quæ ultima fuisse poterant vera: num autem & priora, vehementer dubitavi; nam corporis universi magnitudo non paulo minorem, funiculus autem umbilicalis non obligatus aliud videbantur ostendere, ea vero quæ dissecando ostendimus insuper confirmare.

THORACE enim aperto, pulmones ex rubro maxime fuscis inveni, eorumque partes, aquæ impositas, ruere ad fundum statim, conspexi. Abdomine recluso, plurimus sanguis occurrit in ventris cavem effusus. Quo exhausto, absterfoque, nullum apparuit intestinum; si Rectum, & partem aliquam excipias Coli, cum illo continuatam; sed neque mesarum, neque mesocoli pars maxima usquam conspiciebatur. Tunc jecinoris cum totam convexam faciem diaphragmatis, & proximis abdominis musculis adhærentem; alteram autem, sive cavam, non parum inaequalem animadverterem; ratus quod erat, sub hac quidquid intestinorum, & mesenterii deesse videbatur, coercitum deprehendi, obtestumque membrana crassiuscula, tenaci, & quibusdam quasi arenulis aspera, cum ea jecinoris facie connexa. Eadem facies non exiguum ad spatium erosa, aut lacerata, unde tantum sanguinis in ventrem effluxisset, monstravit. Et nihilominus de mox secta ad diaphragma vena Cava sanguis profluxit multus, isque ater, qualis & in ventre effusus, & in vasis totius corporis fuit. Mitto cætera quæ hujus loci non sunt, quippe secundum naturam in hoc foetu a me demonstrata, illud unum memorans, cum in quibusdam superioribus intestinis meconium esset, in Recto non fuisse; quæ res, & viscerum parvas, reliquo corpore respondens, novimestrem foetum non fuisse, confirmabat, juncta præsertim cum majori partium molitie, quod siqua in alia, certe in cerebro maxime fuit. Cranium enim cum aperissem, cerebri, & cerebelli substantiam vidimus tanquam gelatine cujusdam in modum ferme diffluentem. Cæterum nullus toto corpore foetor, nullum putredinis indicium animadversum est. Membrana autem omnes scalpello, & unguibus, si discerpere forte velles, præter modum renitebantur.

18. Qui ea quæ præcefferant, aut comitata fuerant partum, pro certo sciret, aut etiam placentam examinasset, eorum quæ in hoc foetu vidimus, non omnium, sed nonnullorum, & effusionis præsertim sanguinis causam, fortasse posset conijcere. Cujus, & ex lacerato quidem jecinore, sanguinis in foetu effusionis mentionem alias (g) a me tibi factam fuisse, memineris. Sed jam adlonge aliud morborum genus est transeundum. Vale.

dem tempore invadunt, malignis videlicet, ac epidemicis. Neque enim tunc febrem impugnare tanti interest, quanti adjunctam illam malignam vim, & quod difficultatem maxime auget, in singulis propemodum Constitutionibus peculiarem. Et certe nisi adversus hanc potissimum pugnes; idem agis, ac si febrem, a viperæ morfu natam, remediis vincere antiseptilibus, neglecto veneno, conareris; ut exemplo eodem utar quo Cl. Quenayum usum esse, intelligo ex Historia Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis (b). Quo magis Dei O. M. Providentiæ agendæ sunt gratiæ, quod in summa rei tum obscuritate, tum varietate remedium obtulit, cujus etsi obscurus sit verus agendi modus, vires tamen in quibusdam saltem perniciosissimis febribus abigendis experientia comprobavit, corticem dico Peruvianum. Qui, tametsi earum febrium alia alia cum malignitate, quantum externæ causæ, & symptomata significant, conjunctæ esse videantur, has, illasque pariter, variamque ipsarum potest malignitatem pervincere, quemadmodum nos & nostræ, & aliorum Observationes docuerunt. Nec vero salubri corticis efficaciam repugnat materia quæ aut ad cutem, aut

ad articulos ejici e sanguine cepta sit, inde autem interiorum vi frigoris externi repulsa. Persanavit enim Cortex Cardinale Eminentissimum qui post id in malignissimam incidit febrem, ut fuscæ ad te alias (c) scripsi, & persanavit quoque Famigeratissimum Virum Hallerum, quem ab sic repulsa podagra febris vehementissima cum erysipelate pariter faciei pene oppresserat, ut ipse narrat in iis quæ ad CLII. Disputationem adnotavit ex illis quas ab se collectas boni publici studio edidit ad morborum Historiam, & Curationem facientes. Scilicet non tam hæc, quam illud quod tunc diximus, attendendum est, an periodice sint febres, id est intermissionem, aut remissionem saltem habere consueverint, ut per tempestivum, ac iustum usum corticis sperare liceat, ipsas, adjunctamque iis malignitatem abactum iri. Neque enim dumtaxat quod febrile est; sed & illud quod non est, etiam abique manifesta febre sit, quamquam tunc non fere semper, abigit cortex, dummodo periodice id recurrat: quod cum alias (d) observatum jam esse, scripsimus, tum recentiore, & luculentiore Stephani Weizpremi (e) Observatione confirmare nunc possemus eodem remedio pervictæ aque atrocis, ac pertinacis hemiericæ, binas jam hebdomadas quarta quæque hora exacerbata, nec nisi post horas duas remissæ. Quod si hæc Observatio ut A. 1756. & edita est, ita ante hos annos quinquaginta extare potuisset, cum acerbissimam hemiericam illam (f), quotidie mane hora eadem revertentem, variis, & pluribus præscriptis auxiliis vix tandem profligavi; nullo certe libentius, & felicius quoque fortassis, quam hoc, usus essem, quantumvis rationem qua opituletur ignorassem.

3. Atque utinam febres malignæ, & epidemicæ, de quibus dicere cœperamus, essent omnes periodicæ, ut fere omnes cum varia, & obscura vi malignitatis conjunctæ sunt; haberemus in illo cortice medicamentum, quod etsi quomodo agat, nesciremus, non sine spe tamen possemus experiri. At synocha persæpe sunt, & quæ, si eorum quos sustulerunt, corpora ceciderint, aut nihil, ut initio dixi, ostendunt quod peculiarem præcipui morbi sedem, naturamque patefaciat, aut viscerum graves quidem, & manifestas læsiones ostendant, sed quas si cum iis conferas quæ sunt in agrotantibus observata, facile intelligas ab latente alio præcipuo morbo fuisse productas. Scilicet febris, exempli gratia, viscerum inflammatoria videnda exhibet in cadaveribus viscera inflammata, sive benigna fuerit, sive maligna; at in agrotantibus, si benigna sit, repetitis missionibus sanguinis levatur; si maligna, deterior fit, & citius occidit. Discriminis causa est præcipuum alter adjunctus morbus, ut in Rothomagensi illa febre, a Cl. Malovinio (g) descripta, quæ sub finem A. 1753. plures brevi tempore ibi interemit. Ob malignam enim materiam acrimoniam, ventriculum, & intestina irritantem, inflammationem demum illa fiebat, quæ in iis visceribus, jam in gangrænam degenerans, reperta est, reliquis internis illis partibus, & præsertim capitis, quod dolore aliquo, per consensum videlicet, in dies crescente, & delirio vexatum fuerat. Sapienter igitur, atque utiliter Medicorum Rothomagensium Collegium, non attendendam tunc inflammationem statuit, quæ aut nulla initio erat, aut exaccidenti in progressu nascebatur; sed materiam acerrimam & primis viis educendam esse operam dandam; ab hac enim, si intus relinqueretur, irritationem permanentem multo magis, quam transeuntem ab evacuantibus præsertim mitioribus esse timendam. Recte autem facies, si ad Sepulchretum addideris quæ in illis sint cadaveribus deprehensa, & quæ in aliis etiam, cum epidemicæ aliæ febres grassarentur, quorum aliqui, jus diffinitionem apud eundem Auctorem invenies, item quæ dum pestilentiæ hoc sæculo aut homines, aut, quod multo sæpius, & multo pluribus locis accidit, boves invaserant. Extant enim horum extispicia tum ab notarum memoria commissa. Nunquam tamen non cogitabis, quæ in visceribus sive inflammationes, sive gangræna, sive alia diffiantibus se obtulere, effectum potest facile fuisse. Quin aliqua in iis diffinitionibus tanquam præter naturam proposita, secundum consuetas naturæ leges fortasse esse potuisset, ut puta cum in bobus, lue

enectis, passim videbis adnotatam nimiam vesiculæ fellic plenitudinem, imo ab nonnullis pro causa habitam dysenteriam quæ boves cruciaverat, & inflammationis, sphacelique intestinorum, quo videlicet tanto majorem copiam immisisset erodentis bilis, quanto ipsa hac magis referta erat. Vix unus, quod sciam, Mauchartus (h) rem aliter explicari posse, censuit, sive non tam bile quam aeris, in putrescente bile se expandentis, particulis distendi vesiculam, conijciendo, sive, quando istam aeris expansionem aliquoties (non semper) observatam esse, dicit, ponendo, ab Duodeni intestini tunicis inflammatione tumebantibus, aut spasmodice, contractis, aut etiam statum expansionis compressis, liberum, pleniorumque influxum bilis in id intestinum prohiberi per Communis ductus extremam partem ob eas causas contractam, unde illa in vesiculam uberius tum regurgitando, tum influendo diverterat, sicque hanc distendat, præsertim (id quod addere poterat) cum multiplex per hepaticus ductus sit in bovinam vesiculam aperta via. Mihi vero antiquam Mauchartum legerem, in mentem venerat causa alia dubitandi, faciliior fortasse, & cum frequentiori lege naturalis consuetudinis valde conveniens. Cum enim bilis e vesicula plenior effluxum natura opportune eo tempore instituerit, cum ventriculus, proximave intestina alimentis referta, tumore ipsa suo vesiculam urgent; boves autem a primis usque contractæ luis diebus alimenta omnia averferunt, consequi hinc, cogitabam, ut nunquam compressa vesicula longe majorem quam alias soleat, influentis jugiter bilis copiam retineat, ab eaque præter modum expandatur. Quam dubitandi rationem, qualis ea cunque sit, cum in Theatro Anatomico proposuissem, non displicuisse iis qui me audiebant, & nominatim Professori Clarissimo, meique, dum viveret, amantissimo Carolo Gianellæ, ex edita ejus Dissertatione (i) cognovi.

4. Tumorum autem; de his enim post Febres ad te scripseram; & sedes, & natura cum sæpius per se, tum plane per diffinitionem patent; ut sine dubitatione referre in Sepulchretum possis quæ ab diligenti Observatore J. Alb. Henr. Reimaro in perutili Dissertatione de Tumore Ligamentorum, Fungo Articulorum dicto, proposita sunt, & commemorata. Nec ejus dumtaxat Tumoris Ligamentorum circa articulos, quamquam ejus potissimum; sed aliorum quoque Observationes in illa invenies, qui ad juncturas pariter, genuum præsertim, occurrerunt, ut puta aut ab acri humore (k) in cavo articuli acervato, & ossa, aut cartilagine erodente, hæve (l) in aliam substantiam mutante, tumidasque facientes, aut a mucilaginosi glandulis (m) tumebantibus, earumque & ossium læsionibus occasionem præbentibus, & vicissim ab eorum imminuta pressione causam magis intumescendi accipientibus. Omitto alia, quæ cum his reperies, exempla, suis quæque signis quo ad ejus fieri potest, distincta; ut desiderium moveant legendi cætera, quæ angustis temporis exclusus, adjicere non potuit, nominatim de articularum hydropem (n), cujus proposuerat notas. Sed & signorum causas ex iis quæ per diffinitiones conspiciuntur, dilucide explicat, ut ganglii (o) rotunditatem, mobilitatem, & a casu, vel ab ictu de industria inflicto diffinitionem, & ne plura memorem, ossium in Spina Ventosa expansionem (p), cujus morbi Observatio, & sectio producit eo notabilior quod non pueri, sed hominis quatuor & viginti annos nati tibiam invaserat.

Porro expansum ossium alias & Observationes, & diffinitiones alibi reperies quas Sepulchreto addas. Nam præter eas quas sæpius sibi occurrere, indicat Abrahamus Cyprianus (q), extat altera fuscæ descripta, & pertractata a Frid. Jac. Titmanno (r). Quæ autem commemoravimus expansionum ossium exempla, aliaque cum leges; facile animadverteres, eas debere copiam pravi humoris intra ossa redundantis, urgentisque extrorsum horum parietes, non difficile cedentes, ubi offeas fibras, laminasque interiores humoridem mollioribus, aut sic eroderit, dissolveritque, ut jam perpauca exteriores laminæ reliquæ sint. Utrolibet enim modo os duritiem amittit suam. Cujus mutationis complures historias indicatas videbis a Cl. Morando (s), ubi admirabilem illam proponit, quam ipse vidit. Lege fideandem, atque alteram quæ paucis post illam annis se obtulit Egregio Lipfensi Professori

(a) Epist. 26. n. 31. (b) Obs. Quadrig. Obs. 3. (c) §. 13. (d) Vid. Agt. Lipf. A. 1753. M. Januar. (e) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1753. (f) Disput. de Lue Vaccar. Tubingensi §. 18. (g) Dissert. inscripta, Non semper ex cadaverum sectione &c. (h) §. 48. (i) §. 58. (j) §. 50. (k) §. 46. (l) §. 65. (m) §. 61. (n) Epist. ad Millington. (o) Dissert. Osteo-Steatom. Cal. rator. &c. (p) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1753.

(a) Epist. 49. n. 30. & seq. (b) Ibid. n. 29. in fin. (c) Obser. Med. 4. (d) Epist. I. n. 11. (e) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1753. (f) Disput. de Lue Vaccar. Tubingensi §. 18. (g) Dissert. inscripta, Non semper ex cadaverum sectione &c. (h) §. 48. (i) §. 58. (j) §. 50. (k) §. 46. (l) §. 65. (m) §. 61. (n) Epist. ad Millington. (o) Dissert. Osteo-Steatom. Cal. rator. &c. (p) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1753.

feffori Ludwigio (†). Videbis in hac alia offa tam mollia facta, ut leuiori digiti impressioni cederent, alia lamina externa adeo extenuata, ut subiecta cellula transpici possent: in illa vero eandem externam laminam redactam alicubi ad formam vaginæ membranæ in ipsis femoris, & tibiæ ossibus, solida eorum substantia dissoluta, & in sanguinis alveum ut videbatur, relata, & per totas vias ejectionis, hujus enim sedimentum mirifica erat copia, & tunc majori, cum pejus membra se habebant, natura autem peculiari, album videlicet, terreum, cretaceum, & peracetum, aliave acida solubile, cuiusmodi humoribus injecta ossa emolliunt, constat (u). Hæc cum perleges; fortasse tibi Observationis Zelleri (x) veniet in mentem. Ator enim, qui exspirabat ex abdomine aperto undecennis pueri, insignis admodum atque penetrantissimus fuit; erat autem is puer rachiticus, ejusque ossa adeo mollia, ut tibiæ incurvatas, aliaque facili levique opera scalpello discindere potuerit. Quapropter minus mirum fuit, quod, ut rachitici solent, circa articulos haberet nodos, hosque insignes eo in locubi sternum jungitur costis, utroque in latere, qui discissi, isti pariter sanguinem stillarunt. Credibile autem est, pravo eodem humore quo fibræ ossæ emolliuntur, aut dissolvuntur, vascula erodi quo sanguinem vehunt, & hoc effuso medullare oleum reddere sanguinolentum, qualis & is erat humor quem intrat ossa de quibus diximus, invenit Morandus; grumis autem sanguineis refertam medullam in quibusdam fuorum offendit Ludwigi; qui in aliis eorum vix congelatam, sed maxime mollem & sepe fluidam deprehendit, imo fluidam & quasi aquosam. Quod hic memoro, ut cum medullari illo oleo conferas, quod tibi alias (y) a me animadversum descripsi intra virilis tibiæ exostosis, & caveam quoque ejusdem ossis, exostosis respondentem, liquidum adeo & multum, nisi enim multum sit, urgere extrorsum emollitas ossium laminas non potest, ut tunc, & paulo ante etiam diximus. Itaque in Morandi Observatione femoris os ad trochanterem externum, & fibulæ extrema facta erant crassiora, tum calvaria crassitudo duplo erat major, quam secundum naturam; sanguine autem, qui erat inter utramque ejus tabulam per non brevem compressionem expresso, magna tenuitas tantæ illi successit crassitudini. Hæc igitur ad illa potes adicere, quæ eo tempore de ossium tumoribus ad te scripsi (z), & de eorum emolliutione (a); sic enim alia magis confirmari, intelliges, alia autem in aliis posse interdum aliquanto aliter & se habere, & explicari.

5. Nunc age ab durissimarum partium tumoribus ad mollissimam, nempe ad Membranæ Adiposæ Tumores transeamus. Quorum mihi interea præter alias (b) indicatos, duo alii obtigerunt perlustrandi.

6. ANUS in Nofocomio decesserat, cum tempus instaret Publicæ Anatomies inchoandæ A. 1755. Cadaver, ob meliorem inopiam, in Gymnasium illatum cum inspicere, nec aliud de ea muliere constaret, nisi sensum esse mortuam; animadverti; ut alia omittam, & in his unguibus ex pollice utriusque pedis in corniculi modum excrecentes, quod se utrinque pariter supra duos, treve ex proximis digitis contorquebat; animadverti, inquam, ex femoris sinistri anteriore, & media secundum longitudinem parte protuberantem hemisphæricum tumorem, cujus diameter digitos transversos duos superabat, mollemque adeo, ut pro meliceride posset imponere. Cutis erat ibi reliquæ concolor, in qua nihil usquam erat icterici; sed levis tantummodo scabies. Quid, & quomodo contineret tumor, dicam, cum ea quæ ex viscerum inspectione adnotata sunt, indicavero.

VENTER laxa intestina habuit, & in his Rectum, ab introitus tumentibus hæmorrhoidibus male habitum: lienem aliquanto majorem æquo: in hepatis vesicula bilem subflavam, in eaque calculum spheræ formæ, magnitudine avellanæ quamvis maximam excedentem, colore nigrum, sed crassiusculis quasi punctis exterius distinctum ex albo flavis quorum unum prominebat. Intelligis, cur mulierem icterico non fuisse colore, supra adnotaverim: itaque hanc poteris ad tot alias addere Observationes, a me olim (c) tibi memoratas. Et ne cætera de hoc calculo animadversa desideres; sic habeto, statim atque extraximus, in aquam mediocriter calentem conjectum, illico fundum petiisse, indeque receptum, & mox leniter summæ aquæ im-

positum, statim iterum subsedisse. Cum vero sepositum inspicerem illo ipso die, & magna ex parte in plurima nigra frusta per se abiisse, viderem, hæc autem, chartæ inclusa, quadragesimo circiter post die rursus in manus sumerem, & plura ex parvulis, unum autem omnium maximum in summo aquæ ponerem; omnia primum innatarunt; sed ne sexagesima quidem adhuc exacta horæ parte ad fundum descendit illud maximum, quod paulo post cætera sunt confecta. Extractum porro, & statim aquæ impositum, statim subsedit. Unum vero, aut alterum ex his quæ aquæ non immiseram, cum flammulæ admovissem, flammam quidem conceperunt; sed non retinuerunt, nec liquata sunt, & quod plumæ combustæ, oluerunt. Sed alia accipe, in altero ovario, in tubis, uteroque confecta, quæ pariter ad noxas similes adjungas, quas alias scripsi. Ovarium maximum juglandem nucem æquabat, factumque erat ex albis, crassisque membranis, aquam interceptibus. Tubarum utraque cum Ligamentis uteri Latis sic erat confusa, ut majus illarum extremum non appareret. Uteri fundus habebat intus ab altero latere duas, trefve excrecentias; ab altero unius dumtaxat inchoamentum. Et omnes quidem constabant ex alba substantia; sed hæc in earum maxima ex albis fiebat membranæ, cellulas aquæ plenas continentibus. Figura ipsius erat ovalis secundum uteri longitudinem posita, cujus intimæ tunica per latiusculum, sed multo quam ipsa, angustius pedunculum continuabatur in facie illius cavi anteriore. In qua erant & duæ reliquæ, eidem tunica continuatæ, non per pedunculum quidem, sed per totam basim, depressæ, nec aquam continentem. In Thorace, & Collo; nam Caput non attigimus; duo quæ ad Vasa pertinent, animadvertimus. Magna intra illum arteria maculis erat albis intus distincta, ossæ, si longior fuisset vita, lamellas ibi prænuanciantibus. Jugularis autem Externa vena a sinistris percolum descendens, in medio cursu dividebatur in partes tres, quæ, duabus insulis effectis, rursus post tractum digitorum circiter trium, in unum confluebant. Sed hoc rarum magis, quam morbosum; illud ætate creberrimum. Illuc jam redeo quo sum pollicitus, ad tumorem videlicet, ut ante sectionem apparuerat, hemisphæricum, qui in femore meliceridem ob id etiam mentiebatur quod non per pedunculum inde penderat, sed suum alterum hemisphæricum condebat sub cute. Hæc igitur incisa, manifestum omnibus qui aderant, fuit, nihil aliud esse; nisi Excrecentiam, sicut ego intelligo, membranæ Adiposæ. Ex hac enim ipsa in tot parallelas quasi partes disposita, omnino constabat, nullo alio discrimine, nisi quod pinguedo, quæ sub fusca alibi erat, in tumore magis albebat. Cæterum neque sub cute membrana alia erat quæ cystis in modum tumorem complecteretur, neque sub hoc quidquam intersepti instaret, quod a continuata Adiposa membrana fecerneret.

7. Paucioribus nunc verbis alteram, quippe in viventi adhuc viri tumore habitam, Observationem describam.

8. VIR honestus ex Agro Patavino tumorem gerebat fici non parvæ instar ex altero femine pendente per brevem pedunculum, digito non crassiorum. Mollis erat tumor; ut si contrectares, intelligeres, nec farcoma esse, nec a multo qui inclusus esset, humore distentum. Eodem quo reliqua cutis, colore, hoc uno discrepabat, quod ex hemisphæricis hic illic, humilibus tamen, nec minimi digiti apice crassioribus, protuberantiis conspicebatur inæqualis. Nusquam pulsabat: nunquam, vel pressus, dolebat: nec unquam, nisi cum equitare opus erat, incommodum ullum afferebat. Ob hanc igitur unam causam, timori adjunctam, ne magis in dies, magisque cresceret, an sine periculo abscindi posset, ex me quaesivit. Qui cum ea quæ dixi, attenderem, neque aliud vas præter unam venam per tumoris cutem reperire, viderem, quæ ne in summo quidem ad columbini calami crassitudinem perveniebat, felices autem tumorum ejusmodi amputationes memoria tenerem; facile annui: præsertim cum Vir Experientissimus, Publicus in hoc Gymnasio Chirurgiæ Professor, Hieronymus Vandellius se recepisset effecturum. Quod & feliciter præstitit ineunte Junio A. 1757. paucis omnino sanguine effuso, etiam paulo profundius quam esset pedunculi initium, excussisset, & facile cicatrice obducta, intra breve tempus homine persanato. TUMOR, qui uncias circiter

citer quinque penderat, eodem mane per Filium, Parentem, & Doctissimis Patris dignum, ad me missus, & hoc inspiciente, a me continuo perfectus, id omnino erat quod censueram, nempe Adiposæ membranæ Excrecentia. Qualem, per Valsalvam abscissæ, pedunculum alias (d) tibi descripsi, talis hic fuit, id est ex eadem quæ in sanis est, membranæ Adiposæ structura, & substantia, quasi in cylindros aliquot contracta, intra pedunculum descendente, ex hoc vero intra tumorem continuata, subflava, molli, unctiosa, tumorem universum, & illa ipsa exterius protuberantia parva hemisphæria efficiente. Partes ex quibus compingebatur, non solum cuti, verum etiam inter se passim tenacius adherabant; ut per solos digitos pars a parte sejungere non posset; nulla tamen prorsus præter cutem erat tunica, quæ, ut in cysticis videmus tumoribus, hunc complecteretur: nec cutis ipsa, quamquam erat crassiuscula, in duas poterat dividi laminas. Cuti autem hic illic suberant, præsertim superiori versus, tenuia vascula sanguifera.

9. Parvi quidem hi quos persequimur, tumores fuerunt, si cum grandibus illis compares, quorum alias (e) exempla indicavimus videnda præsertim apud Palsinium, aut cum aliis etiam majoribus, quos ad eos addiderunt Præstantes Viri (f) pondo librarum sexaginta, ut amplius. Sed cum similes eorum censentur qui Cystici, & peculiariter Næte dicuntur; etsi pinguedinem continent, a nostris tamen intelligi fuisse discrepantes. Verum age, ab his qui singulares, & sæpe non parvi sunt, ad alios qui sunt multiplices, & exigui, aut certe modici, veniamus. Subsistemus autem in his de quibus Epistola L. vix pauca attigimus, in summa aliis lingua, aliis toto propemodum corpore succrescentibus.

10. LINGUARUM, quas Februario mense anno hoc 1759. in Gymnasio dissecimus, una erat tumida, in eaque linea quam medianam vocant, primum quidem ab apice ad tractum pollicis transversum in sulci modum nec levis, nec si hinc & hinc linguæ latera traheres, tollendi, subsidebat, deinde vero nulla usquam apparebat; imo æque mediam ac laterales superficiei illius partes occupabant tubercula, nullam prorsus ad normam disposita, humilia quidem, sed crassa ad sesquilineam usque uncia Bononiensis, facie inæquali, albo autem, ut lingua reliqua, colore. Definebant prope eam sedem ubi esse debuissent illa ultimæ crassiores papillæ: quarum locum perexilia, sed confertissima implebant tubercula. Post hæc denique succedebat tota illa sedes in qua extare solent glandulæ, at sine ullo harum vestigio plana omnino, & laevis.

11. Quid præciseret, unde ea sic facta esset lingua, & quid afferret incommodi, scire non licuit. Contra vero & post quæ incepit, & quæ attulerit non glandularum absumptio, sed amplificatio, & citissimum magna parte corporis intus, extraque novarum quasi glandularum proventus, apparet ex historia, hic minime prætermittenda, quæ ab laudato alias Laurentio Mariano, & ab Genero eo digno Josepho Bonio A. 1752. communicata, mihi eo gratior fuit, quod morbum non ita dissimilem annis superioribus spectare quidem, sed non per dissectionem, potueram, ut tibi de Tumoribus scribens (g), significavi.

12. ADOLESCENS Generosus annos natus quindécim, ab infantia usque sanus, & vivido colore præditus, duriori objurgatione exceptus, gravique timore tanto magis inde percussus, quod natura erat cogitandum, tunc quidem triduum quasi stupidus exegit, tertio autem post mense parvas per collum glandulas coepit animadvertere, quæ paulatim primum creverunt, mox vero morbus celeriter adeo auctus est, ut præter fallivarium, & Axillarium glandularum tumorem, brevi per dorsum, per pectus, & præsertim circa claviculas extiterint corpora, ovi columbini instar crassa, strumatosæ glandulas referentia, qualia paulo post in abdominis quoque integumentis, imo, ut tangendo cognoscerebatur, in ventris etiam cavo non desuerunt. Dolore carebant fere omnia; nam quod Pectorali musculo dextero infidebat, tres digitos transversos longum, colore autem lividum, ad tactum nonnihil dolebat, ut ventris quoque interiora, a sinistris magis, major etiam tenio, & renixus percipiebatur. Sive intus, extraque, id quod initio statim, magisque in progressu factum est, multa, & varia in usum traherentur remedia, etiam

validiora, quæ a Medicis Consultissimis proponebantur, sive nulla denique adhiberentur, tumorum moles increfcebat, cursu morbi adeo rapido, ut cum coepisset mense Decembri, simul cum vita circa Maji finem desierit. Non multo post morbi initium, acutus dolor in genu, & crure nunc dextero, nunc sinistro ingruerat, qui & postea semper male habuit, symptomaticis, & incerta periodo accedentibus febribus, vigiliis, macie stipatus. Cæterum ad extremum usque mens prompta, & hilaris, ciborum appetitus, imo acris fames, ultimis præsertim diebus, nunquam defuit: & quamvis aliqua ad jugulum molestia esset ex mucido catarrho, qui facile, & levi cum tussi ejiciebatur; nulla tamen spirandi difficultas unquam animadversa est, id quod, perfecta thoracis dissectione, miraberis.

COLLI, Pectoris, Abdominis tegumentis communibus incisis, tumores illos externos sedem in cellulæ habuisse membranæ Adiposæ, compertum est, archæ ibi ad subiectos musculos annexæ. Pleni erant omnes subalbæ materiæ, ex parte nonnihil fluidæ; at majorem partem solidæ, & sebaceæ. Eminentiorum aliqui, ut qui musculis adherabant Pectoralibus, unum cum Axillaribus glandulis continuatum corpus facientes, fecti subflava, & saniosa emiserunt. Ventre aperto, omentum omne corpusculis duris hic illic obfessum apparuit, subalba illa materia plenis. Jecur, lien, renes ipsa quidem secundum naturam se habebant, sed circa singula fuerunt hæc adnotata. Jecinoris parti dextera valenter annexum erat peritonæum: quod pluribus deinde locis quasi unum idemque cum attiguis musculis factum, antequam excrefcebat in corpus ovi gallinacei magnitudine, quod ea qua diximus, referunt materia, cum vesica urinaria connectebatur. Juxta splenem vero mesocoli sinistra pars in corpus intumescerebat constans ex pluribus colligatis quasi ovis columbinis, eadem illa materia farctis: quibus & pancreas plenum erat: per mesenterium autem disjectæ ejusmodi strumæ conspicebantur. Renum denique Adiposa tunica erat monstrum in modum crassior facta; nam qua parte vertebra spectabat, duorum, parte autem opposita quinque transversorum digitorum crassitudinem occupabat, materia quam diximus, ubique distenta: proptereaque ren sinistraliter, accedente etiam dura & strumosa, quæ materiam illam interferebat, linea, pondo fuit unciarum circiter sex & triginta. Nec vero intestina morbo vacabant. Nam Coli tum adiposæ appendices, tum ligamentorum, per ipsum ductorum, fasciolæ corpusculis ejusdemmodi conspicebantur distinctæ. Tenuia autem intestina per intervalla glandulas Peyeri habebant lupini figura, & magnitudine: quas inter quædam multo major, phlogosi affecta, corruptum continebat humorem. Thorace recluso, mediastinum conspectum est circa medium corporis sæpius dictis obfistum, & in his aliquo non minus crasso, quam modicum ovum gallinaceum, Asperæ arteriæ truncum in modo contingente, sed etiam comprimente. Pulmones intus erant sani, quamvis extimæ superficiei infixi essent duri, petrosique globuli, gramorum hordei crassitudine. Eadem superficies a tergo tota excavata erat utrinque, sed a sinistris præsertim, ob incurrentes in ipsam non parvas strumas, pleuræ innatas, alias quidem prope dorsi vertebra, alias autem in seriem quasi quandam ita dispositas, ut singule singulis costis ab ima ad summam infiderent. Cor secundum naturam se habebat, nisi quod auriculæ dextera facies exterior tota erat tanquam granosa a consimilibus corpusculis. Igitur (sic concludebatur missa historia) descripti tumores majores ex parte erant cystici, & particulis turgidi tophaceis, duris, & velut sebaceis intra cellulas depositis membranæ Adiposæ, præter æque dura, quæ descripta sunt, corpora glandulosa.

13. Redii in memoriam historiam hujus, cum aliam legerem super æthiopis duodecennis, quam Præcl. Anatomicus litteris mandavit Meckelius (h). Nam iniens ægri utriusque ætas, acrisque fames, cum morbo conjuncta, & persistans, usque adeo per interiores tunicas, ventris præsertim, diffuso in tuberculorum modum, quorum pleuraque sebacea implebat materia, hæc, inquam, faciunt, ut abs te cupiam utramque conferri historiam. Quod si Viri illius Solertissimi in eo, itemque in altero æthiopæ (i) accuratas, quod ad eorum quoque nigredinem spectat, Observationes simul perlegens, forte miraberis, in illa

(†) Progr. Observ. in cadav. cujus ossa emollita erant, propon. (u) Vid. Epist. 58. n. 7.
(x) Disput. de Morbis ex structura glandular. c. 2. n. 15. (y) Epist. 50. n. 60. (z) Ibid. n. 57. & seqq.
(a) Vid. etiam Epist. 58. n. 6. & seqq. (b) Epist. 50. n. 22. & seqq. (c) Epist. 37.

(d) Epist. 50. n. 23. (e) Ibid. n. 22. (f) Vid. in Italica Palsio, Edit. Part. 5. c. 4.
(g) Epist. 50. n. 28. in fin. (h) Hist. de l'Acad. R. des Sc. de Berlin. A. 1753. (i) A. 1756.

illa apoplectici æthiopis, quam tibi olim misi (k) ante hos quinquaginta annos Venetiis habita, dissectione adnotatum nihil fuisse de nigrescentibus, aut fuscis in æthiopum cerebro partibus, nihilque de eorum nigro potius, quam rubro, sanguine, scias velim, cadaver illud ante noctem incidere non licuisse, lucem autem aliam, nostri, esse solis, & lychnorum, nec pariter licuisse aliud in posterum diem servare, nisi cutis, & cuticulæ segmēta quædam, in quibus mihi quid acciderit videre, in Adversariis (l) est indicatum. Sed de his, & de cuticulæ natura neque hic est scribendi locus, neque antea facile scribam, quam aut dissecandi æthiopis iterum facultas detur, aut quædam saltem de æthiopum infantibus pro certo sciam, ut puta num forte umbilicalis funiculi initium non, ut nostri, cinctum cute habeant quæ postea in umbilicum se contrahat, num paucis illis a partu diebus cum primum infusari incipiunt, non ita albis prorsus, ut in adultis postea videmus, sint plantis, & volis, alia ejusmodi. Nunc enim a proposito non est divertendum. Collata igitur utraque rot sebaceorum tuberculorum historia, ut in eo quoque convenire videbis, quod viscera quædam sub tunica sic male se habent, erant tamen sana; ita discrepare tum symptomatibus, animadvertes, tum sede etiam tuberculorum, quæ in Berolinensi Observatione tantum abest, ut sicuti in quadam Roedereri quoque historia (*), scirrhusa corpuscula cellulosa occuparent substantiam; id singulare habebant, ut, hac prorsus salva, in propria ipsa, firmæque peritonæ, aut pleuræ haberent membrana; tum denique ut exterius tubercula essent nulla; sed interius omnia. Ad externos autem, si mulque internos tumores attinet Observatio altera, quam ante illam Meckelius indicat, ab se, & Clarissimo Professore Zinnio in infante habitam, cuius præter partes cerebri induratas, conglobatæ glandulæ toto ferme corpore scirrhisæ erant.

14. At five ad utroque, five ad externos, quos possitum hic attendimus, tumores exempla spectant quæ continuo memorabimus, illorum alii aut ea continebant quæ evidenter sunt præter naturam, aut ea, propter quæ ab sanarum glandularum modo vix, ac ne vix quidem viderentur discrepare, nisi ibi occurrerent ubi manifestas glandulas conspicere non solemus. Ad primum horum generum, præter eas quas modo protulimus, historici pertinent non paucæ in Sepulchreto (m) relatæ, ut, cum strumosa glandulæ, multæ præsertim, aut magnæ, exterius protuberarent; multæ quoque interius deprehenderentur insidentes non mesenterio solum, sed & omento, stomacho, intestinis, pancreati, vesicæ urinariæ, pulmonibus, ex Fontani observatione (n);

ex Heurnii (o) autem, etiam peritonæo, hepatis, lienis, renibus, uteri ligamentis, diaphragmati, mediastino, ipsique cerebri Duræ meningi. Mitto cæteras, quas descriptas ibi videre poteris, glandulas minus diffusas, sed omnes strumosas, & quasdam gypsea, pultacea, purulenta, serosa, alba, flava continentes. Quibus & tubercula addere potes illa plurima, quæ Laubius (p) in pulmonibus vidit materiæ sebaceæ plena, ejus similis quæ in glandulis colli induratis ejusdem hominis spectabatur. Ad secundum vero genus propter eam quam M. Aurelius Severinus simul profert, Aetii, imo Leonidæ sententiam, spectasset crediderim glandulas quas Severinus ipse (q) vidit tuberculorum instar in artubus, pectore, dorso, sub alis, & ad inguina extantes, quarum plus sexaginta per Senis universum corpus dispersas ob id maxime admirabatur, quod tubercula quam plurima circa loca conspiciebantur, quæ glandularum sunt prorsus expertia: itaque venit in mentem, inquit, illud Aetii, qui Tetrab. 4. cap. 5. professus est, ex integro nasci plerumque candidas, & rubras carunculas in corpore. Olaus autem Borrichius (r) cum in scirrhi dissectione cruribus in glandulas incidisset sub cute latentes infinitas; non ab integro ortas, opinabatur; sed in sano corpore esse adeo minutas, ut visum pene effugiant, in morboso conspectiores. Has quoque ad secundum genus referri posse, vix dubito. At quas Wharctonus Observatione pariter in Sepulchreto quoque (s) legenda, in militis brachiis, & femoribus conspexit, eodem referendas esse pro certo scio. Cum enim omnes sub cute mobiles, & vel pressu facile contrefactæ, essent indolentes, nec validissimis remediis cedentes; majusculam unam a Chirurgo extractam, deprehendit citra ullum putridum aut corruptum humorem totam exsolida glandulosa atque alba carne constantem; ut sic glandulas dari adventitias plane sanas, nisi quod in numero partium præternaturalium recensentur, experientissimus glandularum scrutator demonstratum esse, pronuntiaverit. Quæ Observationes ad exteriores quidem glandulas pertinent, quemadmodum Antonii etiam Cocchii (t), ubi de Mesentericis Morbis loquens, id quod Leonida ravo viderat, non semel sibi occurrere ait (Severino autem sæpe occurrerat) conglobatas videlicet externas glandulas non modo auctas, sed & ubi esse non videntur, quasi creatas. Quin exemplum insuper addit, in quo præter nonnullas non solitas conspici, ut in lateribus, carneas, neque pure scatentes, ad hunc eundem modum alias intra ventrem offendit. Quam tu, & Severini Observationem ut quæ nedum mihi in Sepulchreto occurrit, huic adjicies, & Valebis.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LXIX.

Ad Ictus, & Vulnere Capitis, & Thoracis, ad Juncturarum Vitia, & ad Luem Veneream pertinet.

Quæ ad Morbos attineant, Epistola LI. & infæquentibus deinceps cæteris a me comprehensos, non tot in præsentia habeo, ut his denique Litteris complecti non possim. Ad illam igitur Epistolam qua de Vulnere Capitis, & Ictibus scripti, hæc addes.

2. VIR necdum quinquaginta annos natus, cum bibacissimus esset, indeque ebrius, per scalas descendens, tanto facilius lapsus est, quod crure altero annos jam aliquot ex doloribus, Veneream, ut aiebant, luem consecutus, claudicabat. Cadens autem finitimum tempus adeo contudit, ut omni sentiendi, movendique facultate statim amissa, sic intra horas haud amplius quatuor interierit. Cadaver opportuno ad Publicam Anatomem inchoandam tempore, id est paulo post medium Januarii mensem A. 1756. Theatro concessum est, in quo, cum diligenter perfecaretur, hæc adnotavimus. VENTER pane, & vino maxime disten-

tum adhuc ventriculum exhibuit, ut ab ictu parum, vel potius nihil videretur evomuisse. Postquam ea omnia exhausta fuerant, ne minimam quidem intus rugam ventriculus ostendit. Jecur, & lien magna, nec tamen morbida, nisi quod dissectioni lienis visa mihi est substantia laxior, color autem dilutus. At renum uterque pluribus hydatidibus excavatus, quæ sub ipsa eorum tunica incipientes, eo perveniebant, ut tubulos qui papillas excipiunt, contingerent, inæquali intus superficie, sed sua undique membrana comprehensæ. Vesica urinaria amplior, in longitudinem præsertim, ut duplo propemodum longior esset, quam soleat. Sed hæc, ut in biboso, mira non sunt. Ad Veneream autem luem num pertineret, an a primordiis sic esset quod in Seminali caruncula animadverti, non facile dixerim. Sinus qui in illa est, orificium maximum erat ex omnibus quæ vidisse unquam memini, nec secundum longitudinem, sed, quod in nemine conspexi, in transversum posi-

(k) Epist. 5. n. 27. (l) II. Animad. 4. (*) Diff. de Uteri Scirrhi n. 18.
(m) I. 4. S. 2. (n) Obs. 6. §. 1. (o) Ibid. §. 2. (p) Aet. N. C. Tom. 2. Obs. 106.
(q) De recond. Abscess. nat. I. 4. c. 5. (r) Sepulchr. S. 2. cit. Obs. 17. §. 2.
(s) Ibid. Obs. 15. in Append. ad §. 1. (t) Dei Bagni di Pisa.

positum. Semen tamen, e vesiculis expressum, non per illud, sed per bina oscula, ut consuevit, prodibat, quæ ab lateribus illius sunt. Aortæ interior facies contra Cæliacæ ostium non lavis erat, ut per ventrem alibi, imo duas ibi offeas squamulas ostendebat. In Thorace quoque eadem Magna arteria nonnullis locis ident intus vitium fovebat; sed prope vulvas præsertim suas, quarum duæ offe non carebant. Supra ipsas autem; quamquam cor erat mediocre; major Valsalvæ finis æquo erat latior. Sed hæc a morbo. Ab natura vero id quod non videor alias vidisse. Subclavia vena dextera ex duabus constabat quæ in Axillari jam incipientes, non ante in unam confluebant quam ad ostium accessissent Jugularis Internæ, ut insula fieret longa digitos transversos quinque. Erant autem duæ illæ quæ insulam comprehendebant, venæ pari ambæ crassitudine; at a sinistris in Axillari vena erat insula multo brevior, quippe non longa digitos duos, imparibusque comprehensa venis, altera videlicet multo quam altera, tenuiore. Priusquam de Capite dicam, aliquot sunt interjicienda, quorum alia omittere hic nolo, alia autem nequeo. Cum pinguedo in abdomine, & intra abdomen non pauca esset; in cervicæ, dorso, lumbis non erat quidem ita multa; sed musculorum superficiei, & fasciculorum ex quibus ipsi compinguntur, adeo præter solum adhærebant, imo affixa erat, ut Professoribus molestia esset non levi. Ubi ad Artus inferiores ventum est; in eo qui sanus erat, mihi accidit quod raro, ut Posteriores nervum Cruralem immisso, ut solitus sum, cultri manubrio aut manu inter duos ramos in quos denique ad poplitem ventum dividi non possem, sursum versus tendendo, confirmare, non unum esse, sed ex duobus fieri, per totum femur, imo interdum supra quoque, coherentibus quidem, sed revera in unum minime coalescentibus. Cum vero, id quod in eorum singulis, aut certe in crassiore facere consuevi, secundum longitudinem incidere, ut parallelas, ex quibus constat, fibras demonstrarem; miratus sum tantum inter has pinguedinis interjectum conspiciere, ut hujus plus quam fibrarum, continere ubique videretur. Etsi enim plurimi sunt anni ex quo in cadaveribus non prorsus macilentis interjici iis fibris manifestam pinguedinem haud raro animadverti contra ac creditur ab iis præsertim quibus nervos placet cum intentis sibus comparare; attamen ea qua tunc vidi, copia interjici, nunquam antea conspexeram, nec in mentem venerat, posse, ut facile intelligis, si pinguedinis loco aliud quod præter naturam sit, aliquando huc conjiciatur, eos nasci morbos quos obstructis, aut aliter vitatis ipsis nervis fibris imputant. Sanus tamen, ut dixi, is artus erat.

Alter vero quo homo claudicabat, sic attractus erat, ut quacunque manu vi adhibita extendi crur non posset. Neque potuit satis extendi; etsi tunc aliquanto facilius extendebatur; cum Flexorum musculorum tendines, qui ad poplitem valde contenti erant, in transversum dissectioni sunt. Quorum musculorum, ut neque Extensorum, color fuit, ut cæterorum sane fuerat, rubens; sed fuscus, & obsoletus. Quin etiam perpaucæ mucilaginis quæ in genu illo erat, color ab naturali discrepabat, & Mucilaginosæ major glandulæ, albæ instar, subduræque pinguedinis apparebat. Sed hæc fere omnia a motuum cessatione illorum musculorum, ejusque juncturæ deducenda esse videbantur. Caput denique secundo, Temporalem quidem musculum qui ab ictu contusus fuerat, tumidum, nigrumque conspexi ob remorantem in eo sanguinem, interioremque structuram laxantem. Cranium vero neque ibi, neque alibi ulla fractura, fissura, & ne depressione quidem læsum offendi. Vasa autem per Tenuem meningem repentinanigro sanguine passim turgidissima occurrerunt, cujus supra eam meningem effusi grumuli non mediocriter conspicebantur. Hujus igitur, & concussionis cerebri mors illa tam cito effectus fuit.

3. Historiam hanc alius addes quas sub initium scriptimus Epistolarum LI. & LII. cranium pariter ab ictibus illæsum, at non ea quæ cranio subsunt, ostendentes; quamquam in illarum nulla tam cito mors secuta est. Nunc accipe quam adjicias alteri in proxima Epistola LIII. descriptæ (a). Secunda enim est in qua nobis se se obulit cordis vulnus. Sic a præcipuo viscere cerebro ad alterum viscus præcipuum cor, & a celeris mortis casu ad celerrimæ exemplum transibimus.

4. SUTORI annorum circiter quadraginta per scalas ascendenti inimicus descendens obviam venit, cultrumque in pectus defixit, & continuo aufugit. Ille vero se vulneratum esse, clamans, & cultrum e vulnere extrahens, tam cito ibidem mortuus est, ut qui de proximo accersiti, confestim accurrerant, vivum invenire non potuerint. CADAVER Studiofa Juventus non difficile obtinuit, & ad me, in Gymnasio tunc Anatomem docentem, mense videlicet Januarii A. 1753. afferendum curavit. Magnum erat, sanoque habitu, ut nisi aliquanto pinguius esset, quam vellemus, melius ad observandum, demonstrandumque optari non posset. Quorum utrumque factum a nobis est accurate: quamquam hic nihil præter ea quæ ad vulnus, & ictus in cadendo attinent, memorabimus;

Igitur vulnus perbreve intervallo ab sterni sinistro latere inter cartilagine tertie, & quartæ costæ inflatum, exterius vix longius erat semuncia pedis Bononiensis, inde autem per mediastinum, & pericardium ad dexterum ventriculum cordis pervenerat, ejusque parietem septo proximum, media fere inter basim, & cuspidem sede, pervaserat, non longius ibi lineis tribus. Itaque pericardium nigro sanguine grumoso distentum inveneramus, mediastini autem anteriorem partem, qua vulnus transierat, & supra, infraque ad non brevem tractum a sanguine nigricantem, & quasi turgidam, nihil autem sanguinis, in ventriculis cordis, ejusque auriculis. Neque intra thoracem quidquam præterea læsum fuerat. Exterius autem in summo dorso contusionis vestigia quæ a cute in pinguedinem usque se extendebant, Rotundis utriusque scapulae musculis interjectam. Capitis etiam integumenta contusionis signa in fronte servabant, credo inter cadendum relata, sicuti mortuum credo in scalis (in quarum gradus, surgere conatus, iterum cecidisset) ita denique jacuisse, ut in caput proclivius sanguini fuerit, quam in oppositam partem, defluere: certe quæ infra cor erant, vasa mediocrem sanguinis copiam, at quæ supra, plurimum continebant. Itaque cerebri superficies rubebat a distentis sanguine vasculis quæ per Tenuem meningem ducuntur, eorumque ramulculis non secus ac si rubens materia fuisset injecta. Nec minus plena vasa illa vidi, quæ intra medullarem substantiam apparent alias filorum instar; hic enim cavos esse tubulos, manifestum omnibus fuit.

5. Si vulnus hoc cordis cum eo contuleris quod tibi Epistola LIII. (b) ex Valsalvæ observatione descripsi, utrumque autem in ejusdem nempe dexteri ventriculi caveam, nec multo dispari in ejus pariete aperta rima pervenisse, animadvertes; miraberis fortasse, ab illo hominem octavo denique die, ab hoc vero tam cito fuisse interemptum; præsertim cum per illud tanta sanguinis copia in thoracem, & ventrem effusa videretur. Verum ob illam ipsam non modo extra cor, sed etiam extra pericardium defluentis sanguinis effusionem, cum hic non potuerit, ut in nostra Observatione inter pericardium, & cor subsistere, illudque distendere, hoc premere, disrumpere id extitisse, facile, ut opinor, existimabis. Quod si facias, ex utriusque hujus Observationis comparatione habebis unde illud confirmes quod alibi (c) inter cæteras causas posuimus, cur multo minor inter pericardium, quam plerisque aliis in locis, hæmorrhagia longe citius interitum afferat.

6. Dixi, quam plerisque aliis in locis, & dixi item inter cæteras causas, non ignorans, quam celeriter vel paucis intra cranium sanguis, aut plurimus, sed vel in ventrem ipsum effusus, homines soleat conficere, ut puta a liene disrumpo, id quod ex pluribus cognoscere eorum Observationum, quas, ut perlegeres, tibi, cum de Ictibus Ventris scriberem (d) indicavi. Quas inter si forte deessent (neque enim rursus vacat singula inquirere) quæ a Michaelæ Vanselowio (e), aut ab J. Valentino Scheidio (f) propositæ sunt; fac videas, vera a me dici, tanto magis intelliges.

7. Et harum quidem Observationum commemoratio me, si forte interea aut legendo, aut secundo in alia incidissem ad ea quæ fusc tunc scripsi, nunc adjicienda, opportune commonefaceret, ut hic adjicerem. Sed neque de illis, neque de Ulceribus cum in præsentia quidquam suppetat; ad ea transibo quæ ad juncturarum vitia pertinent, motui officientia. Nonnulla enim de his sunt quæ post datam ad te Epistolam LVI. aut

(a) n. 26. (b) n. 3. (c) Epist. 26. n. 18. (d) Epist. 34. n. 5. (e) Disp. exhib. Hist. de Ruptura Lien.
(f) Observ. Liemum disrup.

aut ipse vidi, aut visa ab aliis legi. Ad prima spectant historiae hae duae.

8. SENEX grat. Patavii, quem non sine difficultate caput in latera inclinare potuisse, ab iis qui diu cum ipso familiariter versati fuerant, post dissectionem accepimus. Is cum ex catarrho, ut agebant, ineunte Martio A. 1753. in Nosocomio decessisset, nobis qui tunc ibi quaedam, ad thoracis, & colli, & capitis anatomen pertinentia, ostendebamus, hanc observandi occasionem praeiit. THORAX in facie anteriore pulmonis dexteri hydatides exhibuit duas, maiorem unam, minorem alteram. Capiti intra cranium aqua inerat, cujus pars aquae in Lateralibus ventriculis supererat. Glandula Pinealis tenuis. Cum parvi muscoli qui anterior inter primam colli vertebra, & caput interjiciuntur, vix ac ne vix quidem apparet, neque id mihi persimae dumtaxat, id est laxissimae, ut in ceteris quoque musculis, constitutioni imputandum videretur; attentius inspectans, & profundius inquirens, in illud incidi cujus potissimum causa hanc scribere volui Observationem. Scilicet non modo quod Columbo (g) occurreret scribenti, primam vertebra occipitis ita adhaerentem bisce oculis vidi, ut moveri nequaquam posset, hic quoque erat; sed praeterea adhesio a sinistro praefertim anteriore latere ejusmodi conspiciebatur, ut unum idemque os essent tum ea vertebra, tum occipitium: idque a primordii usque fuisse, plura indicabant proxima conformationis vitia. Nam secunda vertebra corpus habebat, mitto cum tertia conatum; erat enim hic, quod inter primum, & occupat ibi ubi dixi, nullum profus erat, aliquod tamen antiquae divisionis vestigium; corpus, inquam, habebat, & Dentem lateri capitis magis dextero, quam sinistro, propinqua, Dentem autem ipsum brevior, processus vero qui Obliqui Superiores dicuntur, tota illa facie qua Inferiores primae vertebrae processus excipiebant, qui hic officio condylorum occipitis fungebantur, nequaquam inter se pares; quippe dexterum finitro tum arctiorem, tum altiore, tum anteriorum magis quam retrorsum vergentem. Sunt & alia, quae tanto libentius brevitate causa praetereo, quod offa hae poteris, cum Patavium veneris, apud me inspicere. Sed quae, ut erant, fervare non potui, ligamenta describere non omittam. Transversum, ut vocant, quidquid erat Dentis a tergo complectebatur, ima parte excepta, unde Lateralis longiora, quam solent, & tenuiora, praefertim dexterum, oriebantur. A sinistro tamen quasi summo Dentis latere per breve quoddam proficebatur, & crassius.

9. Sed ligamentorum quae modo dicebam, vitia alia, quamvis non ut haec, a primordiis repetenda viderentur, memineris superioribus unis, atque alteris Litteris (h) fuisse propolia. Multo autem magis memineris, quia saepius factum est, cum de Claudicatione esset injecta mentio, ut inter ceteras causas descripta sint vitia in ea junctura quae inter femoris caput, & Innominati ossis acetabulum intercedit. Huc sequens spectabit historia, peculiaris quaedam habens, quae in scriptis alias non legitur.

10. MULIER annos nata septem & septuaginta, in lucem edita fuerat, & vixerat sana, filium quoque feliciter pepererat. Secundo autem partu qui difficillimus fuit, enixa filiam (qua haec narravit) doloribus ad ichiadicam regionem dexteram corripit cepit, & claudicare. Haec mala neque ars ullis remediis, neque natura, essi tertius, quartusque partus felix fuit, tollere nunquam, aut minuire potuerunt: quin saepe etiam cadebat, quod pondus corporis satis firme artus dexter non ferret. Denique in Nosocomium propter paupertatem magis quam ob morbum, admitta, ibi annum, & menses aliquot fere semper cubuit propterea quia si surgere conaretur, dolores exasperabantur. Appetitu alimentorum vigente, viribus autem paulatim deficientibus, & subinde desipere visa, tandem sensim mortua est sub initium A. 1754. CADAVERIS macilentis partes quaedam non inutiles nobis fuerunt, tunc ibi plura, & varia recognoscantibus, & demonstrantibus. Cerebrum enim, cerebellum, medulla Oblongata sic satis firma fuerunt, nam essi Lateralibus ventriculis aqua limpida mediocri copia inerat; plexus tamen Choroides rubebant, nec Tenuis meninx detrahentem facile sequebatur, duo fere indicia non diu aquam illam intra cranium fuisse. Uterum quoque tametsi inclinatum vidi in eandem partem in quam ancilla haec claudicaverat,

& ovariis stipatum maxime contractis; ad reliqua tamen ostendenda fuit idoneus, & inter cetera ad monendos Studiosos Adolescentes, ne propter illud quod in I. Adversariis (i), vaccini, & muliebris uterini osculi situm comparans, olim scripseram, negare me, crederent, illius osculi, secundum naturam in muliere se habentis, coronam aliquanto; etsi non semper quanto Eustachii Icones (k) collatae inter se indicant; ab anterioribus magis, quam a posterioribus, descendere.

Femoris dexteri juncturam cum acetabulo novissime examinavi; & cum vitium haud leve, ob eam sedem extorsum in latera deformiter protuberantem, me deprehensum, existimarem; non unum, sed plura, maxime intuta dissectione, deprehendi, quae, ut facilius esset, certiusque ex comparatione iudicium; utriusque femoris superiorem partem, & ossis utriusque Innominati inferiorem primum reteximus. Innominatum igitur dexterum, sive anteriorem, sive inferiorem faciem inspicere, ampliore in latera gyro, quam sinistram, extendi videres, & crassiore exteriori pariete acetabulum comprehendere. Acetabulum autem hoc dexterum orificio erat majori, quam sinistram, nec flexili, ut illud supercilio quod vocant, sed osseo; figuraque, & dimensionibus, ut sinistram sano, sic ipsum ab natura norma alieno capiti femoris profus respondebat. Hujus enim capitis forma non hemisphaerica erat, sed conica. Coni autem basis externo quidem in latere ad radices ipsas incipiebat trochanteris majoris, cum in latere interno non parvo intervallo distaret a minori trochantere. Erat igitur acetabuli dexteri figura eadem quae cavi conici, profunditas autem ab exteriori quidem latere permagna, ut ibi duplo propemodum profundius esset, quam sinistram: glandulae autem mucilaginosae, quae in sinistram major esse, quam soleat, & ex sua fovea quasi prominere videbatur, ejus, inquam, glandulae, & foveae vix, ac ne vix quidem in dextero quidquam erat. Sed & cartilaginea crusta, quae alba, & nitida a sinistris tum acetabuli, tum capitis femoris superficiem secundum naturam convestiebatur, fusca, & lurida a dextris conspiciebatur, & praeterea hic illic rubens. Quae cum satis omnia, & simul quam flaccidum esset ligamentum quod teres vocant, capitis femoris dexteri, animadvertisset; tum caput idem terra, a vertice ad basin per axem ducta, fecari jussi, sectionemque in proximam quoque femoris partem produci, ut quid interius discernimus esset, cognoscerem. Quod manifestissimum fuit. Nam etsi haec, & illud firma sua ossa lamina undique obducta cernebantur; medulla tamen quam pars haec femoris proxima, & quam caput intra cancellos continebat suos, cum in hoc ex albo subflava, ad aquosam magis, quam ad oleosam, ubi premeres inter digitos, naturam inclinaret; in parte illa femoris ad rubedinem magis, & ad oleosam vergere naturam. Denique cum femur utrumque inter se compararem; animadvertione digna visa est ejus partis quae, interjecto aliquanto intervallo, trochanteribus suberat, tum figura quae a terete multum discrepans, ad angulosam propius accedebat, tum incurvatio ad modum segmenti arcus fua convexa parte anteriora spectantis: quae incurvatio major tamen in sinistro erat femore, quam in dextero; id quod facilius intelligeres, si dolores, & claudicatio eo tempore jam fuissent quod ossa adhuc flexilia magis cederent corporis ponderi in illo artu quo puellula, ut magis firmo, & dolores minus movente, magis niti consueverat.

11. Quid ergo est? Num filia non verum narrabat? an mater non sine structurae vitii quibusdam ex iis quae descripsimus, nata, modice jam ab initio, & juventute florens, claudicabat? Ubi autem ex difficillimo partu, unde aliis aliter claudicationem accidisse, a me alibi (l) memoratum est, nova causa ad structurae vitium accessit, tum vero acerbis dolores, & claudicatio manifestissima advenire? & mater, ut mulierum mos est, inde potius quasi per infortunium, quam ab ortu ipso, credi maluit suum morbum extitisse? Certe eas omnes, & ejusmodi, quales deprehensa a nobis sunt, mutationes in ossibus contigisse adultae mulieris, & duorum filiorum jam matris, non facile quispiam existimabit, praefertim cum humorem illum quem accessisse, & ichiadicis fecisse dolores, arbitrari possit, ne ea quidem acrimonia fuisse praeditum, animadvertet, quam in clauda altera, & ab ichiade male habita muliere (m) ex erosione cartilaginis, femoris caput obducentis, & ex sanguinolenta acetabuli facie cognovi. Quam tamen historiam, si vis,

si vis, relegito, & cum illa hanc conjungito, aut, si mavis, cum iis etiam in quibus ut in hac, simul claudicationem, simul uteri inclinationem proposui (n).

12. Haesitans quae ipse vidi; nunc accipe nonnulla in quae interea legendo incidi, ab aliis tum visa, tum animadvertenda de articularum morbis ad Ankylosim, ad Arthritidem, ad alia vitia pertinentibus, quae in Observationibus aut modo, aut alias a me allatis, commemorativae attinguntur. Nec ad plures te rejiciam; unam illam quam Epistola quoque superiore (o) laudavi, Reimari Dissertationem (p) inspicito. Quod ad Ankylosim spectat, primum narrat (q) quid Londini Cl. Hunterus in femoris osse viderit non ita pridem fracto, ut mollis adhuc esset callus utriusque extremo interjectus, propullulantes videlicet ab utroque horum osses fibras, sanguifera autem vasa ab ossis medulla evidenter profecta, indeque intra callum producta. Hinc animadvertit Reimarus, si forte ossium ad juncturam efficiendam inter se accedentium, crusta laedatur, progerminare utrinque posse fibras, & vasa, & cum oppositis conjungi, sicque ankylosim, quam veram vocat, & insanabilem, effecere. Sed quam in dissectione pueri genu confixit (r) faciliam a connectente extremas oppositarum partium cartilagineas quodam tela qualis fere ab inflammatione in thorace, alibi nati solet, eam vero non modo sanari, sed accidere etiam posse, non dubitat, ut casu a vi subito illata, ut puta in lapsu, extenso, aut flexo rigido articulo, rumpatur ejusmodi cohaesio, sicque Meekrenii Observationem quam feliciter explicat, non facile aliter intelligendam. Et tu fortasse eodem referendas existimabis subitas quaedam adventitiae juncturarum inflexibilitates per validam, a Chirurgis factam, subjecti membri flexionem, aut contra si extendi hoc per se non possit, extensionem, eodemque etiam crepitum pertinere qui tunc audiat, nempe ad tela ejusmodi jam satis firma, non ad alius partis disruptionem. Quo magis optandum esset, extare signa ankylosis facta ab hac tela: quae si vera habet vasa non secus ac quaedam earum telarum per quas pulmones cum pleura connectuntur; credibile est, ut ibi, sic quoque intra articulum, laesionis aliquid olim praecessisset, unde, veluti de ossium fracturum extremis diximus, & vasa, & fibrae, sed haec membranae, potuerint expululare.

13. Quod vero ad alios attinet articularum morbos, quam varia Observationes in Dissertatione eadem occurrant, cum in illa in qua laudatam a me dixi, Epistola presserim quidem, at sic satis indicaverim; hic ea tantummodo attingam quae ad morbum spectant, ut Reimarus ipse agnoscat (s), singularem, nimirum ad globulos intus ossis, exterius cartilagineos quos sicuti A. 1746. intra Vertebrae genu deprehenderam, tibi diligenter descripsi Epistola LVII. (t) In Anglia, ubi raro adeo apud nos morbus, non infrequens est, ut vulgo etiam vocent *mures in genu*, plura ille vidit, audivit, & legit ejusdem exempli. Libere per caveam articuli ejus vagantur haec illuc ista corpuscula, ut vix in uno, quantum sine dissectione percipere licuit, corpusculum adhaerere quasi ligamento cuidam visum sit, ut per totam commissuram vagari non posset. Per se, aut manu in eas articuli sedes compelluntur, ubi morui non officiant, nec dolores creent. Quibus in sedibus per remedia exterius adhibita, & circumjectas fascias nonnunquam sic retineri poterunt, ut vel auxilium ejusmodi postea omisso, rursus inde non exciderent. Sed alios motus impedimentum, aut, si movere conarentur, dolor coegit ad Chirurgos confugere, qui parietes articuli incidendo, illa eximerent, successu alias felici, alias ob ea quae eorum parietum incisionibus supervenire posse, atque adeo non semel supervenisse, diligens Auctor (u) adnotavit, sane funesto. De corpusculorum autem illorum origine, etsi duo exempla proferunt, unde videri possit, frustula esse quae vi illata ab ossium extremis discepta fuerint; tamen cum undique cartilagine equali vestita spectentur, nec morbum semper vis extrinsecus illata praecesserit; nihil definiri ab se posse, prudenter fatetur ante ulterius exemplorum plurimum examinem. Itaque me non poenitet quid non modo olim viderimus, ad te scripsisse. Fugit enim, ut sit, articulo sibi nota esse hujus morbi exempla; fugit, inquam, Halleri Observatio, qui morbum hunc in articulo maxilla offendit, offenditque simul ibi cartilagineas ex par-

te absumptas: quarum & ego nonnullas tunc vidi sulcatas, extenuatasque, nec tamen quantum ad multo pauciora quam ego invenerim, efficienda corpuscula satis esse potuisset; erant enim non viginti, sicut in Halleri Observatione, sed plura, & iniis non deerant quinque ea magnitudine, ut mediocres fere aequarent uvarum acinos: erantque omnia quae uterque invenimus, globulorum forma; cum Reimarus non nisi unum memoret, aut summum duo, nec de magnitudine aut figura quidquam indicet, nisi unum fuisse mole circiter phaseolum aequans. Mihi autem peculiariter accidit, ut non omnia cartilagineo cortice induta, sed plura invenerim omnino ossa; at soluta nulla, sed omnia cartilaginibus, vel potius mucilaginosi glandulis continuata deprehendi: quanquam non difficile fieri posse, intellexi (x), ut in genu agitationibus inde aliqua avellerentur. Haec igitur, quae non repetendi, sed comparandi causa a me dicta sunt, vide num Reimari exemplis adjuncta, inferire possint ad nonnullas de origine morbi istius conjecturas vel excogitandas, vel confirmandas, vel interea seponendas.

14. Neque hic omittenda est illa quam laudatus idem Vir per paucis verbis indicat (y), cum Cel. Gaubio habita Observatio; ad articularum enim morbos; imo ad eum qui ab articulis nominatur, Arthritidem spectat. Scilicet in viro qui, cum podagra laborasset, hac cessante asthmaticus obierat, hic illic intra pulmones materiam deprehenderunt albam, quibusdam partibus satis spissam & gypseam naturam referentem. Quod tu legens, eorum facile recordaberis, quae de arthritica materia ad te scripsimus (z), sive cum articulos deferens, in alias partes incumbit, sive contra cum opportune e corpore eliminatur, ut per intestina, quemadmodum Albertinum vidisse, retulimus, quasi ex calce esset, aut gypso recens coagmentato, aut per lotii vias, cujusmodi praeclearam historiam habes, ab Regia Scientiarum Academia Parisiensis (a) editam, viri quem levibus arthriticis insultibus per intervalla tentari incipientem, ab eorum reditu, multo, ut credibile est, graviore futuro, liberum fecerunt urinae, quas per novem circiter menses lacteas reddidit, subsidebat mox argillacea materia quae intra unam, aut alteram horam ad gypsi perveniebat duritiem. At si non exeat, in articulos autem irrere nequeat, aut non pergat irrere; quam funesta inferat mala, ut tunc exemplo ostendimus (b) Eminentissimi Cardinalis Cornelli, sic confirmare nunc possemus Auplissimi alterius Cardinalis, atque adeo Aug. Imperatoris Caroli VII. exemplis, a Cl. Jo. Godofr. de Hahn (c) propositis, nisi statutum a nobis esset in aliis hic arthriticorum historiis non immorari; sed de longe alio morbi genere aliquid adjicere. At tu nihilominus utrumque Hahnii exemplum cum iis quae de Cornelio Cardinali scripsimus, haud inutiliter comparabis; in primo enim illorum & constitutionem corporis, & suspensionem saltem de biliarie vesiculae calculo; in altero inventum calculum renum; in utroque autem symptomata quaedam ad thoracem, caputque attinentia reperies, quae in Cardinalis quoque nostri casu potes animadvertere.

15. Cum de Lue Venerea Epistolam ad te dedi LVIII. facile memineris, me eo pauciores in illa Observationes scripsisse, quod plures quas initio ibidem (d) singulatim indicavi, in aliis saepe Litteris miferam occasione variorum morborum quibuscum ea lues conjungebatur. Ad illas nunc alias addes, & praefertim quam, de Aphonia scribens (e) ad vitia simul, a virulenta gonorrhoea virili urethrae illata, pertinentem non omisi. In foemineis autem genitalibus quae mala ab lue illa producta viderit Cl. Roedererus, ex ejus Dissertatione de Uteri Scirrho (f) quae, cum primum scripti necdum prodierat, & ex mea hac quam eo tempore nondum habueram, Observatione quae mihi se obtulerint, cognosces.

16. MULIEREM consistente aetate, crurum cedemate, quod postea abierat, correptam fuisse, constabat; quis autem potissimum occidisset morbus, ignorabatur. Sed lue Venerea laborasse, dubium non erat. Nos, cum ad alia quae secundum naturam essent, examinanda, & ostendenda illius cadaver ante medium Martium A. 1754. in Nosocomio incidere; haec quae ab naturae modo aliena essent, adnotavimus. THORAX quidem nonnihil aquae; Cranium vero, & cerebri ventriculi, & Spinae cavum plus habuerunt. Venter autem uterum exhibuit in sinistram partem valde inclinatum.

(g) De Re Anat. I. 15. (h) Epist. 62. n. 11. & Epist. 63. n. 19. (i) Epist. 48. n. 32. (m) Epist. 57. n. 21.

(l) n. 15. (k) Tab. 14. Fig. 3. & 4.

(n) Epist. 48. n. 32. & seqq. (o) n. 4. (p) De Fungo Articulari. (q) s. 54. & seqq. (r) n. 12. (s) s. 26. & seqq. (t) n. 15. (u) s. 61. (v) s. 40. (x) Epist. 57. n. 9. (y) Hist. A. 1747. Obs. Anat. 3. (z) Epist. 57. n. 10. (a) Hist. Podagrae & cetera, ad finem. (b) n. 2. (c) Epist. 63. n. 13.

tum. Ab eademque parte nullum prorsus ovarii, nullum finis tubæ vestigium perattente inquirenti mihi licuit deprehendere. Tuba enim, quantum videre potui, non cava, sed solida, vix ab utero tractum digitorum transversorum emensa erat trium, cum ibi repente desinebat; neque indicium læsionis, corruptionis cicatricis ullum vel minimum illic, aut in vicinia apparebat; ut a primordiis usque se ita res habuisse videretur. A dextris tuba finem quidem ad ovarium habebat; sed ita cum hoc concretum, ut neque illius fimbriæ ullæ apparerent, neque ovarium, non excisa quæ super accreverat, tuba, posset in conspectum venire, parvum præfertim, ut erat. Ex subalba constabat substantia, quæ incisa, albedo humore intus madens, albidisque nonnullos concludens globulos conspecta est. Uterus, dum una cum vagina, & vesica, quæ erat maxima, & locio distenta, Rectoque intestino detraheretur, simul magna præter morem, in non pingui præfertim muliere, pinguedinis copia animadversa est intestino illi circumjecta, simul grave olens ichor, aquæ similis in quacaro recens lona est, e pudendo, & podice exibat. Uterini ante fundi interior facies tota uda erat humore lento colore subflavo fusco, & obsoleto, per quem ru-

mentia puncta, & lineolæ transpicebantur, quæ appressis subtus digitis crescebant, ab expresse videlicet sanguine. In cervice, & osculo nihil erat adnotatione dignum. Sed lurida intus, & fusca vagina universa in medio posteriore pariete, aliquanto propius imo orificio, quam uteri osculo, foramen habebat forma circuli, cujus diameter duos transversos æquabat digitos, oris comprehensum nigris, & pessime olentibus. Id foramen in Rectum intestinum patebat.

17. De Morbis a Veneno inducis, ad quos Epistola spectabat LIX. nihil habeo quod huc addam. Nam etsi non vulgaris fama laudes interea ad me pertulit, quas adversus tum viperæ, tum rabidi canis morsus antidotus consecuta est, a Spectato Medico quem tibi alias merito laudavi, adinventæ, Joanne Larber, tamen cum certior factus sim, Dissertationem a Clariss. eodem Viro nunc scribi, quæ suam per eandem antidotum non solum in canibus experimenta, sed in hominibus quoque felicissima curationum exempla complectitur; ad eam malo te rejicere, unde omnia plene, distincteque cognoscas, quam pauca ipse, eaque imperfecte, indicare. Illam igitur propediem, ut spero, proditura expectabis. Vale.

EPISTOLA ANATOMICO-MEDICA LXX.

Pertinet ad promissa in extrema Epistola LXVI. simulque ad quosdam Ventris, & Thoracis Morbos.

Quod de absolutis hæc etiam hyeme dissectionibus, & Exercitationibus gratularis; agnosco benevolentiam erga me tuam. At simul sentio quo præterea spectet ista gratulatio, nempe ut admoveat quid in extrema Epistola promiserim LXVI. me postquam illas absolvissim, esse facturum. Equum potius, neque committam, ut flagites. Quin continuo promissi mei summam non complebo solum, verum etiam cumulabo. Historias enim singulorum quæ post illam ad te missam Epistolam sunt a me inspectæ, cadaverum, quales ex cunctis sint, perscribam; quamquam aliqua per se digna est quæ scribatur; sic ultiorum in illa Uvula perquirenda sectionum quis exitus fuerit, cognoscet.

2. Quinque omnino fuerunt cadavera hæc hyeme dissecta. Exercitatis Professoribus, nedum Juvenibus Studiosis quos Anatomem docerem, frequentissimis, inspicientibus. Primum in Nosocomio seculum est ante medium Decembrem A. 1739.

3. MULIERIS herniæ, & ob hoc ipsum inflammatione intestinum sublate, cum viscera pleraque detraherent, ut partes ex reliquo corpore sumerent, quas ad anatomica elementa, ut mihi mos est, demonstranda apparerent; nihil nisi Caput, & Genitalia, ipse examinavi.

CEREBRUM, etsi firmum erat, imo durissimum; tamen intra Laterales ventriculos Choroidum plexum eam ipsam partem qua se ad angulum sursum reflectunt, ut Thalamos operiant nervorum Opticorum, obfessam utrinque habebant acervo quodam quasi mucii, cinerei obsoleti coloris, in sphaeroidis figuram conformati, transversæ digiti crassitudine. Nihil autem erat aliud, nisi hydatidum acervus, quæ ei potissimum plexuum parti, quantumvis non ea copia, haud raro solent insidere. In Genitalibus quidquam non fuit quod adnotatione dignum esset. Itaque annexam urinariam vesicam, quæ in se contracta erat, urethramque perscui. Et in facie quidem illius interiore priusquam ad orificium propius accederet, duas præter naturam exstantes parvas, subrotundas, depressas, subrubras, læves quasi glandulas conspeximus; ad ipsum autem orificium, aut intra hoc nihil prorsus videre potuimus quod vel leviter prominere. Atque ut intelligas, quam attente, & diligenter quasiverim; meos oculos lineola quadam infolita non fugit, quæ per anteriorem, posterioremque urethræ superficiem ad tractum pro urethræ brevitate non modicum recta secundum longitudinem descendebat, & medio in cursu nonnihil latius fiebat. Sed ealinea non nisi infra urethræ initium ipsa incipiebat, humilisque adeo erat, ut inter nigricantia illa quæ sæpius per urethram muliebrem parallela descendere vide-

mus sanguifera vascula, percipi vix posset: quæ humilitas, & sedes non ad eam pertinere possit quæ nobis descripta est, Uvulam, etiam tacente me, intelligis.

4. Secundum cadaver, sub initium A. 1760. ibidem incisum, plura quæ adnotarentur, digna obulit, quamobrem mea quoque longior erit descriptio.

5. BAJULUS annos natus ad quinquaginta, bibacissimus, & hinc sæpe ebrius, multi quoque cibi, nec tamen pravi, non modo erat valitudinarius, sed hætenus sanus, ut ab focis ob ea quæ dicuntur, sedulo interrogatis, nihil aliud sciri potuerit, nisi identidem de quadam molestia queri consuevisse, cujus sedem manu epigastrico imposita ad cordis scrobiculum designabat. Is igitur cum tres ante menses in Nosocomium venisset propter febrem Tertianam continuam; hæc cessante, obnoxius fieri cepit alimentorum vomitionibus: quæ tempore aliquo intermisso, redierunt iterum, nec postea ad vitæ usque finem desierunt. Itaque etsi nihil unquam, nisi quæ fumeret, eaque sine ullo malo sapore, aut odore evomebat, uno excepto generoso vino quod *moscatum* vocant, præter quod, cardiaci remedia loco datum, nihil quidquam toto ultimo vitæ mense potuit, unde viveret, retinere; tamen ob id ipsum macie summa, & febre iterum, sed lenta, pressus, ad finem properabat suum, non de ventris tumore ullo, aut dolore in Nosocomio unquam conquestus, neque pulsibus, præter aliquam nonnunquam intermissionem, quidquam ostendentibus quod peculiariter displiceret. Vana omnia fuerunt intrinsecus, aut extrinsecus ad vomitiones compescendas adhibita. Quin argentum ipsum vivum, quod uno circiter ante obitum mense, cum alvus minime respondens Iliacæ passionis metum incuteret, trium unciarum pondere datum fuerat, neque profuit, neque postea cum clysteres deicerentur, a quocumque visum est; quamquam famuli cum alvus postea nonnihil reddere incepisset, cum scæcibus exiisset, crediderant.

MORTUI denique cadaver cum inspicerem, ad eam maciem redactum vidi, ut in dorso manuum, & pedum metacarpi, & metatarsi ossa præclare possent demonstrari, oculi autem ob pinguedinis a tergo defectum, mire introrsum retracti essent, sani tamen, etsi ab lobulo sinistra auriculæ tenuis annulus ex oricalcho pendebat, indicium, ut sæpius solet, morbi in proximo oculo olim prægressi. Cum forte os haret; paucos superest dentes, animadverti. Hæc exterius; incidendo autem, in Ventre, Thorace, Capite ea deprehendi, quæ, ab hoc initium ducens, accurate describam. Cerebrum dissecans, in Laterilibus ventriculis aquæ aliquantum, in plexibus autem Choroidibus eo ipso loco ubi in superiore cadavere plurimas, unam saltem hydatidem vidi,

di, sed majusculam, quæ mucum pariter a primo mentiebatur: tum Pinealem glandulam exiguum, sed non exiguum pro ea parvitate corpusculum intus habentem, abnormi figura, durum, non friabile, colore subflavo obsoleto. Spinalis medulla; nam hanc quoque, & nobiliores quosque nervos suis in fedibus, ut solitus sum, ostendebam Discipulis; valde erat laxa. In Thorace cor vidi sine ulla, ut expectabam, pinguedine; sed, quod non expectabam in viro præfertim, cujus procera potius erat statura, & vita in laboribus attollendi, & ferendi onera semper fuerat, cordis eam parvitatē offendit quam in adultis unquam conspexisse non memini; pueri enim cor videbatur, non viri, & omnibus quidem dimensionibus, & his, proportionē, respondente parietum tenuitate. Caterum præter venas quæ in cordis superficie alicubi erant varicosæ, nihil extra, nihil intus vitii occurrit, ut neque in Aorta valvulis, cujus tamen truncus videbatur esse dilatatus.

Antequam de Ventre dico, omittē hic nequeo, diaphragma in centri sui, ut vocant, nervi parte dextera factum fuisse osseum, aut certe ibi interpleuram, & peritonæum osseam laminam fuisse non adeo tenuem, sed quiddam transversum longam, sed angustam quodam præfertim prope alterum extremum loco; ad extremum autem alterum quo magis accedit, eo latior fit, sed nusquam latitudinem superat apicis digiti minimi; asseravi enim, & cum hæc scriberem, sub oculis habebam.

Venter denique, si intestina, & ventriculū præfertim, excipias, nihil ferme habuit quod non esset intra naturæ modum. Intestina hic illic erant livida macula distincta; mitto id quod ex narrata diuturna refectione alimentorum consequitur, præter solum tenuiora, Crassa quoque; sed hæc ad breviores tantum tractus, nec sine recrementis, sed perpaucis. At ventriculus insolita in sede, & mira longitudine, atque inflexione spectaculum nobis præbuit inusitatum. Incipiens enim unde solet (neque enim hic oesophagi quiddam in ventrem descenderat) per sinistram ventris latius recta ad pubis usque os se extendebat, inde autem se reflectens sursum, ac dextrorsum, in Duodenum intestinum desinebat. Latitudine erat mediocri: nec aliud quam albam quandam, & tenuem quasi puliculam continebat, alimentorum, ut opinor, quorum partes quædam nonnunquam restitissent, reliquias. Nihilne igitur, inquis, in ventriculo erat argenti vivi, fuisse, credo; sed dum ventriculus dimoveretur, in Duodenum intestinum transiisse. In quo nimirum, paulo ante per injectum vinculum non multo infra pylorum contracto, ad fescunciam reptum est; at nullum in reliquis intestinis, sicut ii quibus inquirendi cura data fuerat, retulerunt. Sed hæc postea. Antea autem cum pylori sedem exterius contrectando, duritiem percepissem; ventriculum aperiendo, pylori anulum videram in duas, tresve non magnas quidem, sed duras, protuberantias quasi divisum. Dura erat etiam ventriculi pars pyloro proxima ad spatium bini transversæ digiti, crassioribus factis ibi tunicis, & ad osseam duritiem accedentibus, non tamen revera osseis, neque eam partem coarctantibus, sed quod flexiles minus essent, alimenta in Duodenum intestinum facis compellere non valentibus. Præter hæc, & levem in ventriculi interiore facie livorem, qui ab induratis illis tunicis ad brevem tractum extendebatur, nullum aliud vitium in eo visere animadverti. Sanam autem exterius vesicam, & lotii non multum continentem, cum antea in sua sede spectassem, & nonnulla quæ hujus loci non sunt, adnotassem; aperui, sanamque interius pariter comperi, ut annexam quoque urethram. Sed nullam omnino ad orificium, unde hæc incipit, videre potuimus subrotundam protuberantiam, id est Uvulam; cum ubi hæc esse debuisset, lineola illa dumtaxat tenuis in conspectum veniret, quæ, uti solet, in Seminalem carunculam desinebat.

6. Quamquam alias incidisse non memini in septi Transversæ ossificationem; cordis tamen illa tanta parvitas, & aliena adeo ab naturæ consuetudine ventriculi sedes meum longe magis animum perculerunt; non facile invenientem rationem qua utramque illarum cum iis conciliarem quæ in vivo tum fuerant, tum defuerant. Nam si ut cæteros musculos, ita cor quoque in macie extrema imminui unquam vidissem; non quærerem certe quomodo autem maciem bajulo robur præstare valuisset. Nunc igitur quod cor non poterat, supplebat arteriæ; sed quomodo a corde, omitto ut carne, ita viribus minus valido, at propter parvitatē paucum sanguinem, quem

in eas contruderet, habente, urgeri earum parietes satis poterant, ut mox valentius se restituerent, illumque propellerent? Hæc tibi qui ingenio polles, dispicienda libens relinquo, ut illud pariter quod ad istam attinet ventriculi sedem. Nam aut a primordiis, aut a causa repetas, necesse est, quæ ejus visceris attulerit prolapsum, cujus tibi alias (a) exempla memoravimus. Sed si hoc alterum malis; desuisse, mirum est, signa quæ novum hunc morbum insolito dolore, aut tumore indicarent homini præfertim minime valetudinario. At si a primordiis usque repetas; non minus esse mirum, intelligis, laborantis ventriculi indicia manifestissima non modo nunquam fuisse, imo quantum viscus id vigeret, ingestam assidue, & digestam non vini solum, sed & ciborum, haud satis a perpaucis dentibus subactorum, tantam copiam ostendisse, donec post febrem illam Tertianam vomitiones primum accessere. Nam quod ejusmodi vivendi norma pylorum denique, & proximam ventriculi partem ita vitaverit, ut inverti potius ventriculi motus, quam compelli alimenta in Duodenum intestinum debuerint, veri adeo simile est, ut ab illa visceris sede neque ut congenita, neque ut nova deducere vomitus opus sit, qui si a congenita, semper fuisset; si ab nova, non sine hujus recentis mutationis indicis accessissent. Sed scribere præstat quæ in tertio cadavere adnotaverim.

7. LANARIUS juvenis, aut certe non multo major, cum in Nosocomio triduum, an quadratum decubisset, instante jam tempore quo publice Anatomie erant inchoanda anno hoc 1760. evitæ decesserat. Itaque in Theatrum cadaver illatum est, quod qui aspexerant, præter staturam potius magnam, ex nitida cute, & bono, ut undique videbatur, habitu ad dissectiones idoneum existimaverant. VENTER cum brevi intumisset, ac virere coepisset, quamvis suspicarer quid mali in Lanarii corpore latere posset, nec mox deesset qui certiorē me faceret, hunc alias sanguinem expectorasse; tamen dam melioris cadaveris copia fieret, ventris interea visceræ demonstrare aggressus sum: quibus circumfusa quidem urinae similis aqua, nec pauca, erat; sed vix ullus fœtor, & levis intestinorum livor animadvertebatur. Ex sane omentum macrum erat; sed integrum: lien æquo major, nec paulo, sed neque durus, neque laxus: cystis fellæ tunica crassa, & bilis pallida; sed jecur sanum, & iusta magnitudine: mesenterii glandulæ iusto crassiores; sed non duræ. Nec in ventriculo, neque in ipsis, quamvis lividulis, ut dixi, intestinis vitii apparuit quidquam. Nam quod Colon in medio ferme suo illo transverso infra ventriculum tractu umbilicum versus descendebat, inde se ad hypochondrium sinistrum reflectens; inter varietates potius hic visum est, quam inter vitia referendum, ut illud certe, quamquam mihi antea non se obtulerat, quod arteria non tenuissima ab sinistra Emulgente ad vesicam usque urinariam ferebatur oblique adeo, ut in hujus posteriorem faciem prope dexteram Seminalem vesiculam se infereret. An vero ad varietates solum spectarent nulli flexus in Splenicæ arteria, aut sulci quidam pauci, qui per totam anteriorem utriusque renis faciem oblique nullo certo ordine ducebantur, ipse arbitraberis; certe renum structuram, atque substantiam, aliarumque omnium, quæ urinæ causæ creatæ sunt, partium sanitissimam deprehendi. Neque tamen intra imam vesicam, neque intra supremam urethræ partem videre ego, aut eorum qui plurimi aderant, quicquam potuit quidquam protuberans præter id quod in proximo superiore cadavere dictum est. Sed in hoc Partem ullam aliam demonstrare non perreximus; ad Thoracem enim fuisset transeundum, qui, ut suspicari eramus, & qui antequam tumulo mandaretur, obiter inspicere voluerunt, plane confirmarunt, pulmones continebat fracosos, & putridam, ac grave olentem, ex ipsis effusam, materiam.

8. Cadaver quartum, & quintum utrumque mulierum fuit, quæ interea obierant in Nosocomio. Sed ex prima quadam tantummodo thoracis, & ventris in Gynasium allata sunt viscera. Ab ea incipiamus.

9. ANUS ex ascite decesserat. CORDIS substantia erat pallida. Ren sinister minor dextero, & superficie ob leves perpaucos quasi sulcos nonnihil inæquali, nihil tamen intrus habuit quod ab naturæ consuetudine discreparet. Dum hæc inspicerem, animadverti, pro una duas inter se proximas, atque adeo contiguas, sed suo tamen singulas orificio præditas ex Aorta existerē arterias Cœliacas, duas quoque Spermaticas venas ab sinistro Pampiniformi corpore in lateris ejusdem venam

nam Emulgentem redire, alteramque tum de binis illis arteriis, tum de binis hifce venis esse altera minorem. Sed hac a variante natura. Illud vero a morbo, quod in fundi uteri cavo exibat ad latus rotunda, alba, dura, modica excrefcencia. Aperta demum vesica urinaria, quæ omnino erat sana, conspexi quidem corpora illa duo quæ ab ureteribus descendunt, inter se non ad angulum, sed per curvum in quod abibant, corpus æque ac ipsa, crassum ac prominens convenire; at quidquam ab hoc mitti ad vesicæ orificium, quod digitum saltem transversum ab eo distabat, videre non potui, multo autem minus subrotundam ullam protuberantiam toto illo intervallo, aut intra urethram extare.

10. VETULAM alteram pulmonis inflammatio, & ad hanc accedens alvi profluvium confecerant. Hujus cadaver, demptis omnibus, præter uterum, & vesicam urinariam, ventris visceribus, in Theatrum illatum est.

THORACIS aperti lateri dextero inferior pulmonis lobus arcte adhærebat, qui lobus, valde amplificatus, & gravis, cum diffectus esset, jecur elixum referebat. Cor quanto in Bajulo (b) minus fuerat, tanto ferme in hac muliere majus erat, cujus aliquin statura mediocri. Nec vero erat majus quod ejus cavearum parietes extenuati, distractique conspicerentur, imo erant, si non majori, at iusta saltem crassitudine, eorum autem columnæ, lacertique, ut auricularum etiam, crassiores; ut minus mirarer, quod cæteroquin alias vidisse non recordor, Coronarias arterias orificia habere diametro superantia lineas duas Bononienses, & quæ eorum alterius lateri erat proxima, Adiposam puta, ne ipsam quidem minimo esse osculo: in venæ autem Pulmonaris Sinu, præter oscula plura mediocria, orificium patere vix paulo minus, quam fuisse dixi arteriarum Coronariarum, quod cum incidissem, confluere in ipsum vidi venulas duas tresve, sanguinem ex Sinu parietibus redecentes. Eiusmodi cor ventriculos habuit plenos polyposis concretionibus. Magnæ autem arteriæ quantum thorace concludebatur, inspiciens, unum modo locum animadverti ubi interior ejus facies non lævis esset, in trorsumque promineret, ibique inter tunicas duritiem ossæam, non majus occupantem spatium, quam quod unguis posset digiti pollicis operire. Erat is locus a dextris ubi Aorta finito jam arcu, recta descendere incipiebat. Simul in oculos incurrit quidpiam adnotatione non indignum. Nam inter arterias quæ binæ, & binæ ab Aortæ jam descendens posteriore pariete ad partitionem usque ejus trunci egrediuntur, pro binis unam aliquando egredi, rarum non est. Verum hic infra arteriarum Intercoftalium Inferiorum duo suprema paria, tria proxima desiderabantur, uno ter continenter osculo pro duobus in medio occurrente, eoque non cæteris majori, neque statim, ut sæpius cum unum est, solet, in gemina diviso, imo ad tractum saltem transversum digiti, quantum videlicet depositæ Aortæ adhærens relictum fuerat, in arteriam unicam producto. Sed vicissim diaphragma (quando enim de varietatibus loqui cœpimus, hanc, quamvis non ita raro a nobis quidem & conspectam, & ostensam, nolimus prætermittere) unius vice foraminis pro vena Cava in thoracem transmittenda, duo habuit, tenuissimum quidem interstitio, sed evidentissimo, divisa.

Venter denique in iis quæ relictæ in ipso fuerant, infimis Partibus hæc exhibuit adnotanda. Ovarium utrumque, & præsertim dexterum, album, & grandius permulto quam consuevit, & tuberosum, ex tuberibus fiebat, sive ex hydatidibus, quas inter majores erant aliquæ, præcæteris aqua adeo distentæ, ut altiuscule, si

pungeres, profiliret. Tuba utraque tamen ab illis erat omnino soluta. Uterini fundi interior facies ex rubronigricabat, nempe a sanguine pluribus locis subsistente, quem si ut exprimeres, digitos exterius utero subijcibas, præ laxitate facies illa interior lacerabatur. Quæ res, atque altera, a me in eodem cadavere animadverta, & hic pro raritate non reticenda, nempe de duobus nervis (c), in quos manu dumtaxat interposita Cruralem Posteriores ad ventris pelvim usque diviseram, cum alterum, qui paulo erat socio crassior, cultro in duas secundum longitudinem partes discidissem, vas inter ejus fibras, hisque propemodum parallelum, nec procul ab nervi ejusdem axe offendi, sanguine plenum, cujus diameter vasis Bononiensem lineam ferme æquabat; hæc igitur, ut dicere inceperam, duæ res suspensionem incusserant sanguinis, ut in vasis pelvis, & quæ ad hanc pertinent, sic in vesica quoque, & urethra adnexa ea fortasse copia restitantis, ut meæ solitæ officeret perquisitioni. Sed utraque aperta, urethræ quidem internam tunicam a vasculis illis confertis, & secundum longitudinem parallelis totam nigricantem inveni, sed eo magis, quo magis ad imum orificium descendebat suum, quod laxum erat, & laxatam a dextris ejusdem tunice particulam, ut in quibusdam aliis vidi mulieribus (d), extrorsum prolabi sinebat; urethræ tamen superior pars præter colorem nihil habebat quod Observationi obstaret nostræ, vesica autem ne id quidem. Sanissima enim erat, & corpora illa duo exstantia ostendebat ab ureteribus profecta, & sic satis ad angulum convenientia qui transversum digiti intervallo a vesicæ orificio distabat. Neque autem in hoc intervallo, neque in eo orificio, neque in proxima urethra subrotundum quidquam, & vel leviter protuberans meis, & mecum attente inspectantibus oculis se se obtulit, & ut verbo dicam, Uvulæ illius nec vola, nec vestigium fuit.

11. Habes hujus meæ perquisitionis exitum in vesicis quinque repetitæ, quarum nullam morbus, aut urinæ copia, aut injectus aer distenderat, si tertiam excipias, in quam tamen vix tantum aeris immisissum fuerat, quantum esset ad ejus ostendendam figuram satis. Nec plura hac hyeme cadavera dissecimus; sed ex horum aliis alias partes quæ pro minus sanis substituerentur, accepimus, & sic nostris totam complectentibus Rem Anatomicam Exercitationibus hoc quoque anno, qui ab suscepto hoc gravissimo illam tradendi Munere quintus nobis fuit & quadragesimus, finem haud infeliciter imposuimus.

12. Quod reliquum est, si forte miraris, me in his Litteris consuetudinem minus servasse meam, ad historias videlicet fere singulas aliquid, imo interdum plurima adnotandi, & contra, quas inter dissecandum varietates animadverteram, vix paucas, nec sæpe adeo dissectionibus interjiciendi; quod ad primum attinet, sic habeto, non fecisse, tum quia cito quod pollicitus fueram, mittere placuit, tum quia de plerisque ejusdemmodi jam satis multa tot aliis Epistolis adnotaveram: quod vero ad alterum spectat, non tam fecisse, ne Litterulæ hæc tibi forte viderentur esse breviores, quam quia spes jam incipit me deficere, tantum mihi adhuc vivendi tempus fore, ut seorsum in unum colligam quas omittebam, varietates, & complura item quibus esse locum inter morbidarum Partium descriptiones, identidem negabam, nempe observationibus quibusdam meis, ad Anatomen earundem Partium secundum naturam pertinentibus. Utrumque igitur pro tua humanitate æqui bonique facies, & Valebis.

(b) supra, n. 5. (c) Vid. Epist. 69, n. 2. (d) Epist. 50, n. 51. & Epist. 56, n. 21.

